

But Co

W 22





R. 18  
4/10

Petri Andreae

# MATTHIOLI SENENSIS

Serenissimi Principis Ferdinandi Archiducis  
Austriæ &c. Medici,

COMMENTARII DENVOTI

IN LIBROS SEX PEDACII DIOSCORIDIS  
ANAZARBEI DE MEDICA  
MATERIA.

Adiectis quamplurimis plantarum, & animalium imaginibus, quæ in prioribus  
editionibus non habentur, eodem auctore.

*HIS ACCESSIT EIVSDEM APOLOGIA ADVERSUS  
Amatum Lusitanum, quin & Censura in  
eiusdem enarrationes.*



LVGDVNI,

Apud Gabrielem Coterium.

M. D. LXIII.





S E R E N I S S I M O  
A C P O T E N T I S S I M O  
P R I N C I P I F E R D I N A N D O

ROMANORVM, PANNONIAE,  
ET BOHEMIAE, ETC. REGI,

INFANTI HISPANIARVM, ARCHIDVCI  
AVSTRIAE, DVCI BVRGVNDIAE, ETC.

Comiti Tyrolis &c. Domino suo  
clementissimo.



VM vniuersam medicinam non modò vetustissimi qui-  
que scriptores, Serenissime Rex FERDINANDE, sed recen-  
tiorum quoque plerique Dijs immortalibus acceptam refe-  
rant, eamque ob id non immeritò sciētiam antiquissimam,  
celeberrimam, & diuinam existiment: tum eam præcipuè  
illius partem, quæ medicamentorum doctrinam pertractat, dignam esse  
centent, quæ Dijs ipsis accepta referatur, & planè diuina habeatur. Non  
enim fieri posse putant, vt homo ipse per se abditas stirpium, aut anima-  
lium, aut fossilium naturas facultatèsque inuestiget, adipiscatur, & per-  
spectas habeat, nisi eas primùm à maximo omnium rerum opifice fuerit  
edoctus. Quamobrem nō desunt probatissimi authores, qui reiectis nugis  
poëtarum, & aliorum, qui fabulosè de medicina inuentoribus scripserunt,  
certò credunt, ac rationibus comprobant, Deum opt. max. plantarum &  
reliquarum rerum omnium, quas terra procreat, facultates Adæ primo  
humani generis propagatori indicasse, eique illarum cognitionem insudis-  
se, simulatque illi è terra conformato, vitæ lumen inspirauit. Aquo subse-  
cutam ætatem volunt, rerum omnium notitiam hausisse, ac subinde, in-  
dustria adauctæ, res altius diligentiusque exquirere cœpisse: ita vt hinc pri-  
mùm rei medicæ plurimum cognitionis ac ornamenti accesserit. Quod

## Epistola

cum postea animaduertissent innumeri sapientes viri, nouissentque maximam esse huiusce facultatis præstantiam atque vtilitatem, eius voluptate capti, ipsi etiam rei herbariæ, & cæteris de quibus illa tractat, inuestigandis ac cognoscendis studium impenderunt. Id quod abunde testantur Pythagoras, Aristoteles, Theophrastus, Democritus, Zoroastres, Xenophō, Amphilocheus, Athenæus, Pausanias, Apollodorus, Aristander, Hipparchus, Aristomachus, Bion, Agathocles, Diodorus, Diocles, Carystius, Epigenes, Euagoras, Praxagoras, Crateus, Erasistratus, Metrodorus, Nicæsius, Pamphilus, Mantias, Herophilus, Hippocrates, Dioscorides, Galenus, Plinius, & alij antiquorum plurimi, quorum nomina, ne longior sim, quàm deceat, consultò prætereo. Si siquidem nobilitate ac iucunditate huius scientiæ ducti, studio item posteritatis iuuandæ, & perpetuæ sibi conciliandæ famæ, non dubitarunt variis sese vitæ periculis committere, dum permultas ignotas peragrarēt regiones, vt veram legitimamque simplicium medicamentorum cognitionem consequerentur. Porro quod plantarum peritia, aut inuentio, præter eam quam maximam secum adfert voluptatem & vtilitatem, gloriam quoque & laudem pariat sempiternam, nouerunt non tantum vniuersi orbis sapientes, diligentissimi rerum indagatores, sed summi etiam ac potentissimi reges. Quippe illorum claritatem, quæ hinc potissimum ortum habuerat, admirati, rati in hac antiquissima facultate summum splendorem, singularemque præstantiam esse, tantum otij ac studij ad eam percipiendam, & illustrandam contulerunt, vt eorum plerique de plantarū historia & viribus libros condiderint. Nonnulli generosa antidota composuerunt, vt ita suæ, & aliorum mortalium vitæ vsuique consulerent. Alij etsi ex rebus consilio & armis præclare gestis se illustres reddidissent, cum tamen illustriores effici se posse cernerēt, si clarissimam stirpidum facultatem ipsi quoque suo essent studio persecuti, è remotissimis terrarum regionibus raras nobilisque plantas ingenti pecunia conquistatas, ad se transferri curarunt, vt certam ac veram earum historiam describerent. Neque illud certè hos latuit, quod si hac in re studiose diutius versati, egregium quicquam inuenissent, aut scriptis tradidissent, suum nomen esset nullis non sæculis celebre duraturum. quandoquidem herbæ quæ singulis annis reuiuiscunt, repullulant, & reuirescunt, eos perpetuò in hominum memoriam reuocant, qui illas inuenerunt, vel de ipsarum historia & viribus aliquid posteritatis memoriæ prodiderunt. Quia in re eos minimè deceptos comperimus: nam satis persuasum est omnibus, Gentianam herbam à Gentio Illyriorum rege inuentā, ab eo quidem appellationem mutuata esse, illi verò claritatem, & immortalitatem retribuisse. Similiter Lyfimachia (vt Plinius est author) Lyfimachū Macedoniæ regem, qui eam inuenit & nominauit, perpetuis laudibus celebrat. Scordium item, Michridatem magnum illum Ponti regem, à quo Michridatiæ herbæ nomen accepit: quin & Eupatorium, eundem Eupatorem cognominatum,

## Nuncupatoria.

minatum, à quo herbam hanc inuentā & dictam esse volunt, nominis æternitati commendant. Clymenos præterea herba Clymeno regi inuentori suo, Euphorbium Iubæ Mauritanorum, Telephium Telepho Myfiæ regibus, Echium & Anchusa Alcibiadi Atheniensium duci, famam largiuntur æternam. Hinc etiam clarent, Attalus Pergami, & Euax Arabum reges. siquidem hic de simplicium medicamentorum viribus ad Neronem Imperatorem multa conscripsit: ille verò, dum plura (vt Galenus perhibet) aduersus venena, & animalium virus eiaculantium ictus conficeret antidota, plurimum laboris insumpsit, vt legitimas plantas nancisceretur. His accedunt Archelaus Cappadociæ, Masinissa Numidiæ, Agamemnon Argiuorum reges, quorum nomina nulla vetustate extingui poterunt, ob eam quam in cognoscendis prodendisq; stirpibus curam ac diligentiam adhibuerunt. Omittam Philometora, Hieronē, & alios plurimos magni nominis reges, ne verbosius, quàm oporteat, rem hanc prosequi videar, qui vel ipsi ex hoc immortalem gloriam retulerunt, quòd rei plantariæ studiosi extiterint, in easq; de posteris præclare sint meriti. Sunt etiānum poëtæ quàm plurimi, in quorum poematibus Sole clarius lucet, rem herbariam & antiquam fuisse, & semper laudibus decantatam. qua in re & ipsi nedum insigne, sed etiam perpetuum nomen sibi conciliarunt. Ex Græcis quidem produntur Orpheus, Musæus, Hesiodus, Homerus, Alcæus, Rufus Ephesius, quæ testatur Galenus, libros quinque de herbis, versibus scripsisse. ex Latinis autem sunt Vergilius, Ouidius, & Aemilius Macer, qui plura de plantis notatu digna, & nunquam interitura carminibus cecinerunt. Herbarum gloriam mulieres quoque affectasse, & affecturas esse, vt quæ multum curæ ac studij earum viribus inuestigandis impenderint, nō modò poëtæ, sed etiam historici tradunt. Etenim ob id Circen, à qua Circæa herba dicta est, poëtæ Solis filiam fuisse fabulantur. Sed hæc re vera eam demum exquisita herbarum notitiam adepta est, vt non temerè ob eius admirabilia facta illis seculis diuina potius, quàm humana sit habita. Talis quoque Medea fuit, quæ tantam herbarum notitiam habuit, vt eum compositis ex iis medicamentis, pluribus senectutem retardasset, Aesonem poëtæ finxerunt vltimo affectu senio, ab hac iuuentuti fuisse restitutum. Helena ad hæc Helenio herbæ, quam primum, vt quidā volunt, seuit, suum nomē imperita est: atque ideo in ea nunc etiā nominatissima viuit. Artemisia verò Mausoli Caræ regis vxor, alioquin præclari nominis mulier, vel ex hoc memorabilis & immortalis reddita est, quòd suum nomē herbæ inditum reliquerit. Illud insuper satis esse posset, vt quenque ad plantarum cognitionem capestrandā inuiteret, quòd hæc tantum in se vtilitatis habear, vt etiam animalia ipsa, natura docta plurimarum herbarum vires cognoscant, easq; mortalibus indicant. Quandoquidem cerui dictamnium herbam, quòd vulnerati, eius pastu celum eiecissent, sagittarum vulneribus mederi ostenderunt. Item cetæ sefeli herbam demonstrarunt: testudines cunilam, mustelæ rutā, accipitres hieracium,

## Epistola

racium, columbæ verbenacam, hirundines chelidonium, ciconiæ origanum, & alia denique animalia alias innumeras herbas inuenere ac monstrare. Quocirca si ad prædicta mentem animumq; homines conuerterent, si medicæ materiæ primordia spectarent, utpote cum plantæ suis diuinis præditæ viribus, statim ab elementis conditis, è terra emerferint, nullum mihi dubium est, quin omnes faterentur, hanc facultatem antiquitate, nobilitate, & diuinitate cæteras antecellere. Neque ob id solum illi tantum laudis, admirationis, ac gloriæ debetur, quod eius cognitio iucunda & delectabilis sit, sed etiam quia utilis ac necessaria existit. Ea nanque sanitatem (qua nihil homini exoptatius esse potest) tuetur, varia innumerâque morborum genera fugat, ferarum virus euincit, & venenorum vim demolitur. quietauit homines in vita diutius seruat, & sæpe deploratos, quorum scilicet salutis nulla spes reliqua est, ad vitam reuocat. Quod cum rectè quidem æstimassent Romanorum imperatorum nonnulli (vt libro primo de antidotis testis est Galenus) etsi in republica administranda, & prouinciis gubernandis ac tutandis plurimum essent occupati, eos tamè non medio cre studium tenuit colendæ atque illustrandæ rei herbariæ. Quippe vt legitimas plantas consequerentur, utq; veris aromatibus potirentur, in multis ac longinquis regionibus herbarios magnis sumptibus alebât, muneribusq; donabant: hac præterea animi inductione, vt inde non minus gloriæ quàm utilitatis referrent, quod ita quoque studerent mortalitatem beneficio demereri. Sanè memorabili suorum maiorum exemplo ducebantur, qui non solum exuiuis regum, quos in bello vicerant, trophæis dicatas, in triumphis portare, ipsosq; reges victos ante se ducere solebant, sed etiam peregrinas plâtas, & generosa aromata, quibus raræ præclaræq; dotes inerant, in eisdem magno cum honore ferebant. Nec putabant ij, se minorem laudem ac gloriam adeptos esse ex plantis illis, quas postea diligenter suis in hortis ferebant, itemq; ex aromatibus, quæ inter sua alia pretiosa reponabant, in suum & aliorum commodum, quàm ex trophæis, simulacris, & arcubus, quæ omnia erigi curabat senatus populusq; Romanus in perpetuam rerum gestarum memoriam, & eorû gratiam, qui se tali laude dignos exhibuerant. Magno etiam apud Romanos honore habiti sunt ij, qui de plantarum historia & viribus scripserunt, inque hac facultate claruerunt. Argumento satis manifesto, quod expugnata Carthagine, omnes bibliothecas, quas inuenerant, variis regibus ac principibus donauerint, præter duo & triginta volumina de re herbaria & agricultura tantum, à Magone Pæno scripta, quæ Romam attulerunt, & vt in Latinam linguâ verterentur, mandarunt: tantam nimirum solus cum Romanis iniit gratiam Mago ille rei herbariæ, & agriculturæ peritus. Verùm enimvero etsi medicæ materia nullis olim non seculis celebris, nec solum tractata, sed etiam exculta fuerit, accidit tamen vel regnorum euersionibus, vel seditionibus, & bellis tum ciuilibus, tum externis, vel grassantis pestilentiæ sæuitia, vel medico-

rum

# Nuncupatoria

rum qui nos præcefferunt incuria, ut tam præclara diuinæque facultas superiori nostro seculo obsoleta, intentata, & inculta iacuerit, adeo ut perpauci reperirentur medici, qui alias ferè plantas, quàm olera, quorum frequens est in cibis usus cognosceret. Qua quidè re animaduersa, complures ætatis nostræ clarissimi viri, & rei medicæ diligentissimi indagatores, Latini & Græci sermonis peritissimi, Hermolaus Barbarus, Nicolaus Leoniceus, Ioannes Manardus, Ioannes Ruellius, Marcellus Vergilius, Leonhartus Fuchsius apud Germanos claræ eruditionis medicus, Antonius Musa in academia Ferrariensi doctrina celebris, Otho Brûfelsius, Iacobus Syluius, Aloysius Mundella, & alij, strenuam nauarunt operam, ut discussa superioris seculi caligine, medicam materiâ è tenebris eriperent, & suæ luci restituerent. Quos equidè eo quo potui maiori studio atque industria secutus cum multis iam annis animaduertissem in vniuersis Italicæ pharmacopoliis cum à seplasiariis ipsis, tum maximè à medicis huius facultatis ignatis, quàm plurimos errores, eosque graues & detestâdos, committi in humanæ vitæ discrimen, ac sæpe in eiusdem perniciem, ut illorum errores tollerentur, habita nostrorum pharmacopæorum ratione, quorum pauci satis Latine sciunt, Dioscoridem Anazarbeum & Græcum, & antiquissimum scriptorem, ac in simplicium medicamentorum historia, & viribus reddendis facili principem, in Italicam linguam vertendum, & Italicis item commentariis, ut possem, illustrandum suscepi. In quos utique, quantum ingenio, quantum labore ac cura, quantum denique iudicio consequi potui, contuli, ut legitimas quas puto plantas proderem, meamque similiter de cæteris simplicibus medicamentis proferre sententiam. Qua in re coacti fuimus non modò seplasiariorum, & medicorum superioris ætatis, qui hanc medicinæ partem neglexisse videntur, errata passim explodere, sed recentiorum quoque, qui tamè materiam hanc diligentissimè tractarunt, opiniones sepe numero refellere. Nec certè mirum, quod viri alioqui doctissimi, & summa laude digni impeerint, lapsique fuerint, vel in tanto rerum discrimine vacillantes, vel interdum humana caligine cæcutientes: quod quidem & nobis aliquândo accidisse hoc opere non dubitamus. Porro plantarum & animalium historiam latè, quantum res postulare visa est, complexus sum. In viribus autè recensendis, eas cuique plantæ ex Galeno in fine reddidi, eoque ferè semper contentus fui, nisi quando quid ipse prætermisit. Præterea cum plura sint plantarum, aromatum, & aliorum simplicium medicamentorum genera, quæ frequentem in medicina usum obtinent, partim à Mauritaniis, partim ab aliis, qui per singulas ætates claruerunt, inuenta, de quibus nusquam, quod extet, meminerunt Dioscorides, Galenus, aliique veterum Græcorum authores, ea omnia nostris commetariis inseruimus, ipsorumque historiam & vires, ea qua potuimus diligentia, descripsimus. Hoc opus ubi ad vmbilicum perduxissem, vel amicorum horratu edidi, eo in primis animo, ut aliqua ex parte industria mea hominû vitæ prodessem, deque ea



## Epistola

bene meritis existimarer. Assecutus hoc sim necne, nostrum non est, ferre iudicium. Nisi temerè fortasse à nobis dictum videretur, illud certè testari possem, me ex eo coniecisse, non ingratum opus Italæ, neque inutile fuisse, quòd paucis post annis terriò, & quartò, & quintò (ni fallor) fuerit excusum & venditum. Adderèmiq; non vulgare de eo doctorum virorum iudicium, ex quo etiam cognouì, me non oleù nec operam planè luisse. Id profectò me mouere debebat, vt si quid de exteris quoque gentibus promereri possem, tentarem, ne viderer in hoc Italæ solis natus. Sed illud prætereà huc accessit, quòd ex illis etiam aliquos nostris commentariis, quauis Italicè conscriptis deletatos esse, ex iisque fructum aliquem cepisse intellexerim. Cuius rei illud mihi satis manifesto indicio fuit, quòd ex recentioribus tam Germanis, quàm Gallis scriptoribus inuenerim, quibus placuit nostras qualescunq; sententias interpretari, suisq; scriptis interserere, neque eas tantùm nobis ingenuè acceptas referre, sed de nobis etiam (quæ eorum fuit humanitas) admodum honorificè loqui. Quorum erga nos voluntatem vt augerè, & studium omnium externorum, si possem, adiuuarè, vtq; illis gratiam aliquam rependerem, & cum aliis omnibus inirem, nulla mihi còmodior ratio visa est, quàm vt Italicos nostros commētarios in Latinam linguam transferrem. Hos itaque vt primùm potui, Latinos feci, in quibus tamè plura mutauì (quod maxima rei difficultas tulit) plura auxi, & omnia quodammodo illustraui. Adiecimus insuper quamplurimas plantarum & animalium imagines, quanto fieri potuit diligentius, ad naturæ imitationem expressas, magnis cum laboribus, tum sumptibus: nō alia mehercle ratione, quàm vt iis, qui terras peragrarè non possunt, nec præceptores habent, quasi hortulum exhiberemus, in quo omni tempore, nullo cultu adhìbito, viuas ferè stirpium effigies spectarent. Quinetiam huic secundæ editioni quamplurimas adiecimus imagines, quæ partim plantas, partim verò animalia nonnulla referunt: de quibus præter ea, quæ Dioscoridi tradita sunt, in hisce commētariis peculiariter differuimus. Aucta sunt vel ipsa commentaria innumeris ferè locis, vt faciliè coniciant ij, qui diligenter priorem editionem perlegerunt. Enimuero, Serenissime REX FERDINANDE tanto semper cognoscendæ materiæ medicæ, & iuuandæ posteritatis desiderio exarsit, vt faciliè impulsus sim per varias ire solitudines, loca tum amœna, tum horrida perlustrare, & abditas terræ fibras scrutari, vt res ipsas oculata fide cognoscerem: quas modò, vel cum vitæ meæ periculo, in præruptis montiù locis quæsiui, modò in dēsis & asperis syluis, modò in conuallibus opacis, modò in collibus apricis, nunc in paludibus & lacubus, nunc in fontium & fluminum ripis, nunc in littoribus maris, aliàs in campestribus aruìs, pratis, & vinetis, aliàs in clarissimarum urbium viridariis, aliàs, in rudèribus, & collapsis ædificiis, aliàs in speluncis, & longis terræ meatibus, aliàs in subterraneis metallorum fodinis, & eorum fornacibus. Ex quibus sanè locis plura mecum detuli simplicia medicamenta, quæ ab adulterinis (quo  
rum est

## Nuncupatoria.

rum est in officinis vsus) maximè distant. Nec me certè labores aut pericula deterruissent à magnis longisq; itineribus, quòd Galeni exemplo mare traiecissem, & Cyprum, Cretam, Lemnum, Syriam, Aegyptum, aliasque regiones peragrassem, vt multa præclara simplicia, quæ hodie desiderantur, essem cõsecutus, ad mortalium cognitionẽ & vsum transferenda, nisi meæ animi propensione obstitisent negotia domestica, ægros curandi pietas, & corporis imbecilla satis constitutio, quæ me quidem maris, & longæ peragrationis incommoda ferre nõ diu permisisset. His tamen nostris secundis conatibus magnam opem tulerunt (nec enim me pudet verum apertè fateri) nonnulli huius ætatis medici clarissimi, & rei herbariæ peritissimi, quorum alij plantarum missione, alij consilio, alij rerum inuentarum cõmunicatione, mihi multum profuerunt. Inter quos potissimum nõ grauaret hoc loco commemorare, si possem illis ex beneficij accepti commemoratione aliquam referre gratiã, Lucam Ghinum Forocorneliensem, Medicum, ingenij & doctrinæ singularis, Pisis magna cum omnium laude rê herbariam profitentem: item Gabrielem Faloppium Mutinẽsem, medicum eruditione & experientia clarum, qui Patauij honoratissimè humani corporis fabricam pariter & materiam medicam proficitur: necnon Andream à Lacuna Secobiensem medicum præstantissimum: præterea Bartholomæum à Maranta Apulum medicum apprime eruditum: Vlyssẽ quoque Aldrouandum Bononiensem honestissimi generis, probatæ doctrinæ, & magnæ expectationis medicum. Quibus omnibus eò magis me deuinctum esse intelligo, quòd ij pro sua tantum humanitate ac liberalitate, me, quẽ non noverunt nec viderunt vnquam, amore & officio prosequantur: nisi fortè eorum in nos beneuolentiã ex eo orta sit, quòd iam aliquam de nobis conceperint opinionẽ ex nostris Italicis cõmentariis. Non defuerunt etiam amicitia & affinitate nobis coniuncti, quorum studio ac diligentia, mihi licuit hoc tempore nõ aliter peragranti, ex diuersis locis plures plantas cõsequi, earumq; picturas edere. Sed præsertim in hoc pro nobis assiduam nauauit operã Io. Odoricus Melchiorius Tridentinus medicus spectatæ eruditionis, & magnæ spei iuuenis, qui me in patris loco semper habuit. Et qui ob suam præclaram eruditionẽ à Serenissima Bohemiæ Regina in sui, & aulae suæ cõmodum in medicum honorificè ascitus est. Sanè is tum Patauio, tum Venetiis complures stirpes non vulgares ad nos perferri curauit. Adiunxit nos quoque mirum in modum Georgius Liberalis iuuenis artis pingendi peritissimus, qui dum assiduè plantarũ & animalium imagines deliniaret, nulli quidem labori ac diligentiæ pepercit. Est præterea summa probitate, & vitæ integritate vir Franciscus Parthinus Roboretanus, cuius egregiæ doctrinæ, singularisq; in re medica experientie tanta est apud multos huius ætatis Principes opinio, vt eorũ nonnulli, præcipuè verò Cardinales Tridentinus, & Augustanus, cuius aliquot annis Physicũ egit, magnæ sibi laudi duxerint, quòd talem hunc virum amplissimis muneribus, variisq; orna-

mentis

mentis decorauerint. Quo postea factum est, ut nunc in Srenissimi Regis Bohemix Medicum meritò euectus fuerit. Est etiam Hieronimus Donzelinus Brixianus, utraq; lingua, eruditione, & iudicio summo clarissimus medicus: qui quidē modis quā plurimis labores hosce nostros adiuuātes, maximo nobis fuerunt ornamento. Potuissē equidē hęc omnia dissimulare, & mihi soli vniuersam laudē vendicare: sed absit omnis inanis glorię cupiditas. Etenim benignum est (ut Plinius in epistola ad Vespasianum scitē inquit) & plenū ingenui pudoris, fateri per quos proficimus. Ceterū quandoquidem Dioscorides nō modò quinque libris tradidit vniuersam medicam materiam, quę plantis, animalibus, & metallicis comprehenditur, sed his etiam sextum attexuit, in quo ad mortalis generis vsum de antidotis descriuit, quibus venena omnia arcētur, ac omniū venenosorum animalium morsus ictusque curātur, ideo nos ipsum secuti in hunc quoque commentarios scripsimus, in quos plura regeſsimus, quę vitę hominum profutura speramus. Nam paterquā quod improborum veneficorum insidiis pateat cū vniuersum genus humanū, tum maximē reges ac principes, non desunt etiam innumera animalium genera, quę morsū vel ictū homines ex tempore interimunt. Quippe scorpiones, stelliones, phalangia nostris in domibus viuunt oberrantque, quę animalia cū nullam habeant personarum aut locorum rationem, vbique sese recipiunt, & latebras nidōsque parant: quo fit, ut interdū ab hominibus inscientibus molestata, ictū venenum inferant, & ictos in perniciem agant. Latent præterea modò in hortis & viridariis, modò in vinetis, modò in pratis, aliisque in locis inter flores & herbas, aspides, viperę, & alia venenosa reptilia, quę vel si tantillum quidem pede premantur, aut excitentur, illico exitiosum vulnus infligunt: ex quo statim, vel paulò post icti commoriantur, nisi eis quā primum antidotis succurratur. Est & canis, qui etsi homini familiarissimus sit, tamen cū in rabiem agitur, quos momorderit, in horrendum mortis genus plerunque deducit. Quos cū diligenter examinassent rectēque expendissent complures veterum sapientum, quorum superius meminimus, plantarum, aromaticarum, & aliorum quoruncunque simplicium medicamentorum vires altius perscrutati, & varia aduersus venena & virulentorum animalium morsus antidota composuerunt. Quorum vestigia secutus Mithridates magnus ille Ponti & diuersarum gentium rex, cuius etiam antē mentionē fecimus, cū non magnā satis sibi gloriā ex eo comparasse iudicasset, quod mortalium solus (ut tradit Plinius) duabus & viginti linguis loqueretur, adeo ut de subiectis gentibus nullum hominem per interpretem cōpellaret, nec quod plurimis potitus esset victoriis, ad maiorem adhuc immortalēque suam gloriā medicinę peculiariter curiosus fuit, & rei herbarię percipiendę maximum studium impendit. Quorum vtrunque planē assecutus videtur: nam ex herbarum cognitione antidoti genera inuenit, ex quibus vnum composuit, quod nomen etiam eius retinet, & suū authorem

## Nuncupatoria.

famæ immortalitati consecrasset. Huius antidoti vsu adeò corpus suum rex ille firmauerat, tutumque à venenis reddiderat, vt cum ipse vitam finire mallet, quàm Romanorum seruitutem pati, id sæpius fertur frustra veneno tentasse. Mithridatem imitatus est Andromachus doctissimus pariter & elegantissimus Neronis imperatoris medicus. Is siquidem theriaces compositionem inuenit, quæ, Galeni testimonio, à venenis seruauit nò solum plurimos Romanorum imperatores, ac innumeros principes, sed & alios quosque, qui eam opportunè sumpserunt. Quapropter Galeni tempore, ab ipso magnificè ac splendide, ita iubentibus imperatoribus, hæc parabatur antidotus. Præteribo Attalum Pergami regem, de quo etiam à nobis antè dictum est, quem quoniam idem studium tenuit antidota cõficiendi, ideo is ab ipso Galeno maximis laudibus celebratur. Veruntamen nostra hæc ætas ex horum antidotorum vsu non eum fructum neque vilitatem capite sentitque, quam sensit antiquitas. Nam etsi eorum nomina monumentis tradita habeamus, atque etiam antidota ipsa in seplasiariorum officinis parata reperiantur, non eos tamen effectus virèsq; hæc præstant, quas suis nominibus pollicentur, quasq; illa præstare veteres memoriæ prodiderunt. Cuius discriminis illud nimirum in causa est, quod plura à nobis desiderantur generosa & pretiosa aromata, quæ legitima ac omnium præstantissima suis antidotis immiscebant Mithridates, Attalus, Andromachus, Galenus, & alij complures veterum: quæq; ingenti pecunia, summo studio ac labore, ab Arabum, Aethiopum, Troglodytarum, aliarumq; diuersarum gentium regionibus, illius florentissimæ ætatis imperatores Romam adferri curabant. Vbi tamen nemini, præterquàm medicis imperatoriis (quod fateretur Galenus) licebat veram ac legitimam theriacem conficere: nisi quis fortè potètorum fauore, ab Imperatoribus esset iis præclaris donatus aromatibus. Id quod maximè facit, ne miremur, si theriace nostri vsus, itemq; antidotus Mithridatica non perinde pollent viribus, atque earum nomina promittunt, & veterum scripta testantur. At certè in hoc satis infelicitè actum esse constat cum vita hominis, vtpote quæ iacturam fecerit maximorum remedium ac aduersus venena, aliaq; grauissima incommoda, quibus obnoxia est: ac sæpe affligitur. Quamobrem hæc nostra ætas, in qua quidem reliqua ferè omnia in pristinum candorem reduci, & suæ integritati restitui videntur, gloriosus & verè fortunatissimus dici posset summus ille Pontifex, inuictissimus ille Imperator, serenissimus ille Rex, magnanimus ille Princeps, sapientissimus ille cuiuscunq; reip. Senatus, qui propriis animi dotibus Romanos illos imperatores, & alios potentissimos reges imitatus, nullis sineret se vel sumptibus, vel laboribus grauari, sed omne studium omnem operam, omnem deniq; suam facultatem adhiberet, vt iam dudum deperdita aromata, quæ omnino nobis desunt, ad antidota cõficienda, in lucem reuocarentur. Enimvero si horum aliquis id faceret, vel si omnes idem facere contenderent, non suæ tantum & aliorum mortalium

vita

## Epistola

vitz cōsulerent, déque posteris præclarè mererètur, sed præterea hinc famam assequerentur æternam. siquidem beneficium id posteri summa cum laude propriis authoribus perpetuò acceptum referrent. Equidem si id mihi non licuit, id saltem quod voti, omni studio industriaq; mea præstare conatus sum. nam cum viderem huius nostræ ætatis homines in iisdem quæ præter, atq; etiam in maioribus, vitz periculis versari, nobis tamen deesse vera illa ac generosa veterum antidota, ob ea quæ hodie in iisce desiderantur legitima ac præclara simplicia medicamenta, tentare volui, possentne ex legitimis quæ habemus, composita fieri medicamenta, quæ illorum vicem pensarent. Feci id quidem magno meo labore, longoq; rerum usu & experientia: sed assecutus sum necne quod contenderam, ignoro. Illud certè fateri possem, ea semper mihi visa esse longè felicius theriacæ & Mithridaticæ antidoti vires præstare, quàm quæ passim hac tempestate, ea rundem nomine conficiuntur. Verùm non omisi, quin in hoc, sicut in reliquis aliorum potius esset iudicium, quàm meum, quandoquidem eo promerendi animo, quem semper habui, in nostris commentariis in sextum Dioscoridis librum, non solum Dioscoridem ipsùm, quantum potui, illustravi, sed quædam etiam antidota nobis inuenta descripsi. Cæterùm cum veterem & vlitatum scriptorum morem secutus, patronum quærerem, qui hosce nostros cōmentarios ab invidis, malenolis, & vitiligatoribus protegeret ac tueretur, cuius item amplitudine, autoritate, & splendore maiores illi quodammodo, graviore, & illustriore redderètur, prima omnium mihi occurrit Serenissima maiestas tua, Potentissime Rex FERDINANDE, vt quæ pro sua summa virtute atq; immensa clementia, neminem vnquam iniquè depressum non exulerit, aut iniuria aliqua affectum non defende- rit. Præterea mihi admodum condecens visum est, vt opus, in quo ea tra- ctatur materia, cuius studio olim reges summopere delectati (quod supra retulimus) perpetuum nomen sibi conciliarent, non alij quàm Regi dice- tur, eiq; præsertim, quæ mira naturalis philesophiæ & rei medicæ voluptas tenet. Quarum facultatum dignitatem & excellentiam quia Serenissima maiestas tua summo studio & amore prosequitur, ideo iure aliquo hos no- stros commentarios illi dedicandos esse putavi. Illud quoque me adduxit, vt potissimum tuæ Serenissimæ maiestati eos nuncuparem, quòd certò sci- uerim, eam hilari admodum vultu, summaq; humanitate cuiusq; conditio- nis hominū munera suscipere: id quod Christianæ charitatis, ac religionis maximum præbet indicium. Huc etiam accedit immensa erga studiosos quoq; Serenissimæ maiestatis tuæ benignitas, quæ eos perpetuò promo- uet, fouet, ac tuerur: sed maximè in medicos, quos ea præ cæteris præcipua benignitate complectitur, vtpote qui diuinā potius, quàm humanā profi- teantur facultatē. Quod etiam apud Hebræos testatū reliquit Iesús Syrach diuino spiritu afflatus, dū sic inquit. Ab altissimo orta est medicina, & à re- ge accipiet munera, medicamēta de terra creauit dominus, & vir prudēs nō contemnit

# Nuncupatoria

contemnit illa. disciplina medici exaltabit caput eius, & in conspectu magnatum collaudabitur. hæc ille. Porro illud omnibus mirum videri posset, quòd Serenissima maiestas tua, etsi in grauissimis negotiis, sui imperij functionibus, & curis dies ferè noctesque versetur, præsertim cum ea sola in vniuersa repu. Christiana aduersus immanissimæ Turcarum gentes iugiter firmissimum se se offerat propugnaculum, nunquam tamen prætermittere soleat, quin succisuis quibusdam horis, variis sciètiarum studiis vacet. Sed quid plura referam de tanto Rege? cuius nimirum religionem, iustitiam, prudentiam, pietatem, generositatem, liberalitatem, beneficentiam, humanitatem, ac probitatem admirantur non modò vniuersæ reip. Christianæ principes ac populi, sed aliæ quoque gentes, quando nullis hominum præconiis præclarissimæ animi illius dotes satis explicari possint. Reliquum igitur est, vt Serenissimam maiestatem tuam humillimè rogem, vt hoc sui mancipij munusculum, qualecunque sit, in seruitutis meæ testimonium læta fronte accipiat, foueat, & tueatur. Id quod eam maximè facturam spero. nam si munus hoc quasi chartaceum perpendet, exiguum quidem, nec tanto rege dignum videbitur: at si animum donantis respiciet, maximum dicet, atque hoc nomine me (quæ illius erit immensa benignitas) suo fauore complectetur. Quod si ipsa, vt spero, fecerit, præterquam quòd quàm plurimos studiosos doctòsque viros excitabit, me quidem eò inuitabit atque alliciet, quòd maiora fortasse atque exoptatiora, quæ nostra in officina continuè cuduntur, diutius latere non sin-

nam. Quæ si in lucem quandoque prodibunt, ea vni-

uersa posteritas Serenissimæ maiestati tuæ ac-

cepta feret. Cui non solùm hæc, sed &

meipsum, & seruitutem meam

dedico, dono, ac voueo.

Goritiæ, Cal. Ian.

M. D. LIIII.

Sereniss. Maiestatis tuæ

Mancipium

Petrus Andreas Mat-  
thiolus medicus.

PET. AND.

# PET. ANDREAE MATTHIOLI

## ad medicæ materiæ studiosos,

### Præfatio.



**S**I VELLE eorum morem sequi, qui antequam opus suum aggrediantur, illud in primis profitentur, nihil sibi maiori curæ ac studio esse, quam ut vitæ usuiq; mortalium consulant, hoc ipse quoq; ingenuè facere possem. Nam ea animi propensione ab ipsa iuuentute, quantum mihi otij ab artis medicæ exercitatione, & cura familiari impetrare licuit, id totum ad bonorum authorum libros evolvendos, ad simplicium medicamentorum cognitionem assequendam, ac demum ad scribendum contuli. Quæ in re, ut certè apud omnes testatum relinquerem, me hæc mente animoque elaborasse, ut quantum studio, labore atque industria consequi possem, humanæ vitæ prodessem, deque ea optimè meritis existimarer, Dioscoridi omnem meam operam ac diligentiam adhibui, ut quantum in me esset, illustrior redderetur, atque omnium manibus tereretur. Ad quod ea mihi visa est ratio commodissima, ut ipsum Dioscoridem in nostram Italianam linguam transferrem, in eumq; commentarios à nobis Italicè item conscriptos adijcerem: quod tunc nos priuatum studium: maiorque cura subiret Italos adiuvandi, quam ceteros. Etenim pauci admodum sunt in Italia pharmacopole, ad quos tamen potissimum hæc de medicæ materiæ tractatio spectat, qui Latinam linguam norint. Hoc opus, quod summa animi alacritate susceperam, ubi absoluissem, emisi vel hortantibus amicis, ut quem fructum antea ex meis laboribus mihi proposueram, cum postea mortalibus percipiendam, ac omnibus æstimandum exhiberem. Verùm an is talis fuerit, qualis ut esset, contenderam, malim aliorum esse iudicium, quam meum. Illud cerò scio (si tamen id absque vitio nobis testari licet) à multis in Italia, quorum iudicium ceteris omnibus antepono, eo animi candore scripta vestra æstimata ac commendata fuisse, quo ipsi illa scripsimus, atque etiam Italici non inutilia, neque inuicenda fuisse. Quorum sanè exemplo, deque nostris commentariis iudicio non potui non mihi ipsi gratulari, ac omnibus, quibus illos legendos tradidimus. Accessit interea mihi non minor inde cupiditas externos quoque demerendi, eamque cupiditatem illud auxit, quod intellexerim ijs pergratum fore, si nostri commentarii Latini fierent. Hac igitur ratione adductus, ut etià ad externos gratiam aliquam inirem, utq; omnibus in uniuersum studio, cura, industriaque mea prodessem (quod ego quidem

antiquum semper habui, & præcipuum) nostros commentarios ex paruo, quod nobis superest otio, Latinos reddendos atque illustrandos suscepi. Quo in opere quid præstiterim, planè ignoro. vos in quorum gratiam, tantum in eo laboris insumpsi, quod iam absolutum quidem ipsum, sed mihi non deo clum emitto, legendo iudicabit. Neque a'ind ab omnibus petiitum velim, quàm ut hos nostros commentarios eà animi sinceritate, & æquitate æstiment, quæ suos ab alijs æstimari & perpendi vellent: vel quæ ipsi aggressi sumus illos conscribere. Nam etsi multorum eruditorum sententias refellere ausus sum, atque non pauca fortasse nimis acriter insequi, corrupta scilicet, quæ indoctorum pertinacia nunquam satis explodi possunt, id tamen eo consilio feci, ut quantum ingenio perficere, quantum mente elaborare, quantum denique iudicij in re medica ex studijs, laboribus, ac vigilijs mihi comparare potui, libere in publicum ad mortalitatis fructum & utilitatem proferrem. Sed certè in hoc longius, quàm statueram, digressa est oratio nostra: eò enim (nescio quo modo) irrepit, ut partem aliquam aperirem nostri scribendi instituti. Quod tamen non prorsus alienum fuisse, nisi eius consilij ratio cum alibi, tum præcipuè superius in epistola nuncupatoria à nobis latius exposita esset, atque à pluribus, opinor, comprobata, quàm ut hoc loco paucis attingi debuisset. Quare iam ad id nobis accedendum est, quod in primis medicæ materiæ studiosos admonendos esse putamus, utpote quod nonnihil priuatim ad rem præsentis operis facere videatur. Cum enim ab eo tria potissimum comprehendantur, Dioscoridis contextus, nostri in eum commentarij, & plantarum imagines, de singulis aliqua nobis reddenda ratio est, ut qualem me in unoquoque gesserim, quod consistendum sit, non dissimulem. De contextu itaque Dioscoridis, quem nequaquam prætermittendum censuimus, ob plures causas, quæ hic referre nimis longum esset, quæret aliquis, cur Ioannis Ruellij Galli medici eruditissimi interpretationem prætulerim, dignamque existimauerim, quæ præ cæteris in nostris commentarijs legatur, cum tamen duo alij viri summi pariter & doctissimi, Hermolaus Barbarus, & Marcellus Virgilius Florentinus in idem studium nauiter incubuerint. Fatror ingenuè me Ruellij versionem secutum esse, sed non propterea aliorum præclaros conatus contempsisse unquam: quin potius utriusque studium semper admiratum, quippe quod uterque in eo maximam laudem promeruerit. Illud autem me magis mouit, ut Ruellium admiserim, quod eius conuersio omnibus facta sit vulgatio, ac frequentior in studioforum manibus versetur. Adde etiam, quod hæc communi omnium ferè, medicorum præsertim, iudicio præferatur, cui nimirum nobis quoque libuit subscribere. Non tamen illud me certè latuit, Ruellium nimis fortè in ea religiosum fuisse, quippe qui interdum maluerat ipsum Dioscoridem deserere, quàm Plinium, modò Latini sermonis nitore captus, modò etiam rei cognitione incertus. Quare à nobis persecta, Ruellij quidem interpretationem recepi, ita tamen ut nonnunquam ausus sim ab eo desciscere, vel vetustissimorum probatissimorumque exemplarium, & vnius Oribasi codicis fidem secutus, vel certa rei experientia fretus. Eorum autem quæ immutavi, nonnulla obelisco adnotata reliqui, nonnullis etiam signum suppressimus. Sanè plura eiusmodi, pluresq; insuper varias lectiones exhibuissem, si maius otium & tempus nobis suppetisset: quæ tamen, Deo concedente, aliquando ad communem utilitatem, & ampliorem medicæ materiæ disquirenda campum, dabuntur. Hinc factum est, ut Ruellij nomen contextui præscribendum non duxerim, ne viderer cum eo nomine conuenire, re autem sæpe ab eo dissentire. Sæ-



tis enim fore putavi, si hic studiosos certiores facerem, me Ruellio Dioscoridis cōuerſionem acceptā referre. si præterea rationē reddidiſſem, cur illi nō ſemper addiſtus eſſe voluerim. Quod quia abunde, ut arbitror, præſtitimus, iam ad alterum nobis propoſitum, quod de noſtris commentarijs erat, progrediamur. De quibus profeſſo mihi melius eſſet tacere, quā pauca dicere, ſi vellem naſutulis & vitiligatoribus occurrere. Frequens nanque hodie eſt, indieſque magis pullulat huiusmodi genus hominum in Italia ( neſcio quid fiat in alijs regionibus ) qui nullum in toto vitæ ſue curſu fructum ſemēve proſerunt, alienos tamen auidē carpunt, max lacerant, & pedibus obterunt. Sed hos nunc miſſos faciam: alius enim locus, aliud ſtudioꝝ noſtrorum otium poſtulabit, ut cum ijs ſermonem conſeramus, vel eos ab hac mala mente deterrendi, vel ad ſua quoque proſerenda excitandi cauſa. Verum ad candidos, & æquos, quibus hæc ſcribimus, noſtra ſeſe conuertat oratio. Neminem velim moueat, leſtores optimi, nec id à nobis factum quiſquam admiretur, ſi nobis noſtris ſecundo auctis commentarijs, velut & in prioribus, me inueniat plantas ali quas non incognitis prodidiſſe, tam quarum meminit Dioſcorides, quā quæ à nobis adieſcē ſunt, neque tamen earum imagines pictura expreſſiſſe. Hoc ( mehercule ) factum eſt, non ſolum quòd plantæ nobis cognite, dum eas depingi curarem, non omnes nobis in promptu eſſent, ſed quòd etiam deſſent ſculptores, qui pictas iam in tabulis plantis inciderent. His acceſſit magna negotioꝝ moles, quæ ſtudia noſtra adeo impediunt, ut nullus ſerē fuerit reliquus lucubranda locus. Siquidem poſteaquā à Sereniſſimo Romanorum Rege Ferdinando in eius Sereniſſimi filij Ferdinandi Archiducis Austria Medicum aſcitus ſum, quum non ſolum quotidie præter opinionem multa emergerent negotia, ut medicis quibſcunque aulicis plurimum enenire ſolet, & longa quandoque itinera ſeſe offerant, & bella quò Medicos ſuos oporteat ſequi Principes, factum ſane eſt, quum hæc omnia exequi me oportuerit, ut hiſce negotijs impeditus, non potuerim per omnia, & vobis, & mihi ſatiſ facere. Atqui non nobis parum feciſſe videmur, ſi inter tot aulica, & bellica incommoda, ingraueſcente admodum etiam ætate, commentarijs noſtros vobis nunc damus, non ſolum ſexcentis ſerē locis auctos, ſed quā plurimis plantarum, & animalium imaginibus inſignitos, de quibus nos in iſdem commentarijs ſpeciatiim diſſerimus, quin etiam quibſdam, de quibus egit Dioſcorides, quæ in priori editione non habentur. Quæ verò nunc onuſſimus cogentibus cauſis præſcriptis, ea fortasſe aliquando prodemus, niſi quid nobis humanitas accidat. Nec pigebit unquam, ſi fortē fortuna ſucceſſurus aliquas horas nactus ero, quin totum id temporis in veſtrum, & totius rei publicæ impendam commodum. Ceterum, ut de imaginibus quoque ſeorſum aliquid dicam, equidem aliàs abhorruī ab hoc dītendi genere, rariuſ neminem unquam poſſe ex iconibus tam veram, & exactam ſimplicium medicamentorum peritiā aſſequi, ut eorum varietas poſſit vnicā pictura comprehendī. Siquidem non ea eſt pullulanti herbe facies, quæ adultæ, neque adultæ, quæ iam ſenſcēnti. Quòd ſi eiꝗſmodi herbarum mutationes omnes ſingulis picturis deberent reſpreſentari, quis dubitet id opus futurum infiniti laboris, ac immenſi ſumptus? Verum enim verò quum vididiſſem tales alioꝝ conatus ab omnibus propemodum commendari, atque in dies creſcere ſtudioꝝ virorum rerum effigies in publicum edentium, ne ſolus viderer in diuerſam ire ſententiam, re ipſa tandem melius perperſa, & aliter comperita, ac aliud docente ipſa experientia, nolui huic optimo, & minime inſrugifero deſſe ſtudio. Huc accedebat, quod non mediocriter ad hoc me incitaret, Typographi cuiuſdam Mantuanū va-

nitas, qui nostris operibus Italicè prius editis surtim quasdam inseruerat imagines minimè  
 à nobis adiunctas, quæ quoduis potius, quàm rem ipsam referrent. Gaudebam id adhuc me  
 superstite contigisse, ut turpem notam falsò mihi iniustam ipse deleverem. Ideò ut & alio-  
 rum conatus, adiuvarem, & malitiosi huiusce calcographi temeritati occurrerem, ipse  
 quoque experiri volui, si quid hac in re præstare possem, non tantum, ut mea in medium  
 proferrem, sed & ut de vobis studiosis, si possem, bene mererem. Sed quàm res hæc nobis  
 difficilis fuerit, non est; quòd pluribus explicem: omnes enim sciunt, quàm difficile inue-  
 niantur homines, qui res ipsas, ita ut sunt, ad vivum depingant, & qui depictas diligen-  
 ter insculpant. Quorum maior adhuc inopia est, id quod etiam facile diiudicabitis studiosi,  
 qui in hoc opere nonnullas effigies affabrè satis, nonnullas verò non satis solerter sculptas  
 offendetis. Sanè quod in rem communem nauare potui, licet illud exiguum esse intelligā,  
 in eo non commisi, ut meum studium, opera, aut diligentia à vobis desideretur. Quid au-  
 tem profecerim nescio, vestrum erit iudicium. Sed longè aliter quàm nos videtur fecisse  
 Cornarius, vir alioqui in utraque lingua doctissimus, & qui inter omnes alios fortè sin-  
 gularis haberi velit. Is enim suò in Dioscoride, quem nunc primum vertit, & emble-  
 matibus quibusdam auxit, non solum nullas appinxit imagines, sed eos etiam acriter da-  
 mnat, qui eas suis inseruerunt commentariis. Sed an liore potius, vel ratione ductus, vos  
 indices esse velim, si quandoque illius boni viri legeritis præfationem, & eius animum di-  
 ligenter exploraveritis. Nam etsi Galeno dictum sit (id quod & nos ante Cornarium scri-  
 psimus) plantarum imagines parum conferre ad earum indagandam cognitionem, non  
 tamen ob hoc accusandi sunt, qui plantarum, & animalium icones in suos conferunt li-  
 bros. Quippè quoniam nusquam inuenerim damnasse Galenum plantarum imagines, quæ  
 in libris appingi solent, sed eos, qui existimant se rei plantariæ peritissimos euadere posse,  
 non solum imaginum inspectione, sed & librorum quoruncunque lectione, licet fuerint  
 ij à summis, gravissimisque authoribus conscripti. Quamobrem non parum mirari subit,  
 Cornarium alioqui virum apprime doctum Galeni verba non modò non intellexisse, sed  
 in reprobum quoque distraxisse sensum. Quo fit, ut hinc facile sufficari quis possit, quòd  
 quum viderit Cornarius omnium ultimus Dioscoridis interpres, nullum sibi reliquum iam  
 esse locum, quò noui aliquid de plantarum imaginibus asserre potuerit, id sibi consilij asc-  
 iuisse, ut eos acriter detestaretur, qui plantarum picturas in suis libris habent, ratus for-  
 tasse hoc detestandi genere, non solum plurimum sibi laudis comparare, sed etiam suum  
 obtegere infortunium, suamque (quod eius pace dicam) in plantarum historia imperi-  
 tiam. Quæ enim sit alia ratio, cur aliorum damnat industriam? quasi posteris non sit id  
 licitum, ut & ipsi aliquid suo ingenio, & studio excogitent, quòd ab antiquis arte non sit  
 animaduersum. At non damnasse Galenum plantarum imagines, nec libros de plantarum  
 historia conscriptos, sed eos, qui horum tantum inspectione posse quenquam rei plantariæ  
 fieri peritum crediderant, id manifesto fuerit argumèto, quòd ipsemet Galenus libro primo  
 de alimentorum facultatibus posteritatis memoriæ prodidit, cum inquit, Comparatos nobis  
 esse hosce libros, ut nobis sint eorum, quæ antè dulcissime monumenta, non ut rudes &  
 ignari per illos doctrinam perfectam assequantur. Quod si qui sint qui præceptoribus ca-  
 reant, velintq; iis, quæ luculentè ac copiosè sunt scripta diligenter incumbere, magnum  
 inde fructum eos accepturos testatur idem Galenus, præsertim si ea relegere non grauen-

Cornarij  
 opinio ex-  
 plosa.

Cornelius  
C. 17.

sunt. Quibus pallam est longè magis detestandos esse eos, qui clarissimorum hominum laboribus invidentes, nil aliud, quàm blaterare, ac carpere sciunt, quàm eos, qui reipublica commodis semper prodesse cupientes, nil aliud agunt, quàm ut boni semper aliquid, & noni in publicum usum promant. At qua re imagines, & non libros damnauerit Cornelius, cum non minus ex Galeni sententia eorum lectione, quàm imaginum inspectione, quis nequitiam proficere valeat, non satis animaduorto. Cur tantum laboris, si nihil profuerit, in vertendo Dioscoride adiectis etiam emblematis incassum suscepit? Hocne ei erat studium, huncne capiebat animum, ut in vanum laboraret? Porro nil aliud vobis dandum, dicendumque superest. Spero tamen ab iis, qui grati sunt (ingratos, maleuolos, ac inuidos nihil sane moror) me gratiam imitum, quandoquidem mihi communis utilitatis cupidissimo hoc opus non agrediendi voluntas defuerit, sed perficendi facultas, quam tamen omni studio consequi assidue conamur. Bene valete, & nostra boni consulite.



# INDEX EORVM, QVAE IN HOC

OPERE CONTINENTVR.

Cuius primus numerus paginam, sequens verò columnam, tertiusq; columnæ lineam denotat.

A



Abietis historia	96. 1. 2	Acinos Dioscoridi	415. 2. 50
Abietis lacryma	96. 1. 26	acini consideratio	415. 2. 54
Abietis lacrymæ vires	96. 2. 10	Aconitum Dioscoridi	565. 1. 55
Abrotonum Dioscoridi	398. 2. 50	aconitum alterum Dioscoridi	565. 2. 55
abrotoni consideratio	399. 1. 40	aconiti genera, & consideratio	566. 2. 33
abrotoni maris genera duo	399. 1. 40	aconiti historia ex Theophrasto	566. 2. 50
abrotoni forminx consideratio	399. 1. 48	aconiti vires ex Galeno	568. 2. 54
abrotoni vires ex Galeno	399. 2. 40	aconiti veneni, & eius remedia Dioscoridi	780. 2. 33
Abfinthium Dioscoridi	396. 1. 10	aconiti veneni noxa, & eius curatio	781. 1. 1
abfinthium marinum Dioscoridi	396. 2. 20	Acontiz historia	830. 2. 7
abfinthium santonicum Dioscoridi	396. 2. 55	acontiz morsus notæ, & eius cura	830. 2. 23
abfinthij consideratio	397. 1. 1	Acorum Dioscoridi descriptum	23. 2. 30
abfinthium Ponticum	397. 1. 5	acori consideratio	24. 1. 24
abfinthij marini consideratio	397. 2. 44	acorum legitimum	25. 1. 16
abfinthij seriphij consideratio	ibidem	acori vires ex Galeno	25. 1. 56
abfinthij vires ex Galeno	398. 1. 55	Acuta spinæ Dioscoridi	132. 1. 48
Absque simplicium medicamentorum notitia		acuta spinæ consideratio	132. 2. 3
rehtë mederi nemo potest	3. 2. 53	acuta spinæ vires ex Galeno	135. 2. 26
Acacalis Dioscoridi	129. 1. 1	acutam spinæ non esse berberim vulgi	132. 2. 55
acacalis consideratio	129. 2. 3. 109. 46	Adami Loniceri errata, & sententiarum improba-	
Acacia Dioscoridi	149. 2. 30	ta 107. 2. 44. 130. 2. 34. 138. 2. 53. 165. 1	
acacia altera Dioscoridi	150. 1. 23	14. 326. 2. 7	
acaciz consideratio, & historia	150. 1. 37	Adami poma	176. 2. 30
acacia officinarum ficticia	150. 2. 21	Adarces Dioscoridi	737. 1. 45
acaciz alterum genus	151. 1. 46	adarcez consideratio	737. 2. 44
acaciz vires ex Galeno	151. 2. 5	adarcez vires ex Galeno	737. 2. 44
Acanthium Dioscoridi	388. 1. 60	Adeps omnis Dioscoridi	156. 1. 40
acanthij consideratio	388. 2. 10	adipis, & pinguedinis vires ex Galeno	159. 1. 4
Acanthus sativus Dioscoridi	388. 2. 40	adipis in cibis facultas	160. 2. 52
acanthi sagui consideratio	389. 1. 20	Adiantum Dioscoridi	608. 1. 56
acanthi vires ex Galeno	389. 2. 30	adianti consideratio	609. 1. 35
acanthus sylvestris Dioscoridi	389. 1. 12	adianti historia ex Theophrasto	609. 1. 36
acanthi sylvestris consideratio	389. 2. 24	adianti vires ex Galeno	609. 2. 40
Acarnæ historia ex Theophrasto	460. 2. 3	adianti vires ex Mesue	609. 2. 55
Acetum Dioscoridi	677. 2. 15	Aegilops Dioscoridi	610. 2. 30
acetum è betonica Dioscoridi	684. 2. 38	ægilopis consideratio	610. 2. 53
acetum mullum Dioscoridi	678. 2. 10	ægilops hordii vitium	611. 1. 43
acetum stillinum Dioscoridi	679. 1. 60	ægilopis vires ex Galeno	611. 2. 5
acetum ex stœchade Dioscoridi	684. 2. 18	Aeris flos Dioscoridi	692. 2. 40
aceti consideratio	678. 1. 6	æris floris historia	693. 1. 13
acetum contrariis constat facultatibus	678. 1. 7	æris floris vires ex Galeno	693. 1. 31
aceti fellini vires mirabiles ex Galeno	679. 2. 48	Aeris squama Dioscoridi	693. 1. 42
Acathæ lapidis historia, & vires	744. 2. 6	æris squamæ cõsid. & vires ex Galeno	693. 2. 42
Achillea Dioscoridi descripta	535. 1. 30	æris squamæ lethifera vis, & eius remedia	797
achilleæ consideratio	535. 2. 6	2. 5	
achilleæ vires ex Galeno	536. 1. 2	Aerugo Dioscoridi	695. 2. 38
Achras Dioscoridi	377. 1. 55	ærugio scolecia Dioscoridi	696. 1. 38
Acida maria Dioscoridi	679. 1. 18	æruginum consideratio	696. 2. 48
acida mariæ vires excoleuit	679. 2. 35	æruginum vires ex Galeno	697. 1. 1
		æruginis	

# Index.

æruginis venenum, & eius remedia	799. 1. 4	Althæa Dioscoridi	502. 2. 40
Æsc vltum Dioscoridi	692. 1. 40	althææ consideratio	503. 1. 40
æris vlti consideratio	692. 2. 20	althæa Theophrasto duplex	503. 1. 54
æris vlti vires ex Galeno	692. 2. 27	althææ vires ex Galeno	503. 2. 5
Aethiopis Dioscoridi	590. 1. 27	Alumen Dioscoridi	725. 1. 30
æthiopis consideratio	590. 1. 59	aluminum omnium consideratio	725. 2. 47
æthiopidis vires	590. 2. 10	aluminis rupei faciendi ratio	726. 1. 34
Acetites lapis Dioscoridi	750. 1. 18	alumina cognita & iam in lucem reddita	727. 1. 27
acetitæ lapidis historia, & vires	750. 1. 38	aluminum vires ex Galeno	727. 2. 27
Agallochum Dioscoridi	57. 1. 57	aluminum facultas calida, non frigida, vt quidam contendunt	727. 2. 40
Agallochi consideratio	57. 2. 18	Alypon Dioscoridi	647. 2. 10
agallochi fabulosa vulgi opinio	57. 2. 48	alypi consideratio	647. 2. 10
agallochi historia ex Serapione	58. 1. 7	alypi vires ex Paulo	647. 2. 49
agallochi facultates ex Auicenna	58. 2. 25	Alysson Dioscoridi	458. 2. 10
Agaricum Dioscoridi	367. 1. 42	alyssi consideratio	458. 2. 30
agarici consideratio	368. 1. 22	alyssi historia varia	459. 1. 6
agarici vires ex Galeno	368. 1. 58	alyssum Aetij	459. 1. 12
agarici facultates ex Mesue	368. 2. 24	alyssum Plinij	458. 2. 32
agarici nigri noxa, & eius remedia Diosc.	801. 1. 11	alyssum Galeni	459. 1. 31
agarici nigri noxa, & eius curatio	802. 1. 11	alyssi vires ex Galeno	459. 1. 59
Ageraton Dioscoridi	550. 2. 38	Amaracum Dioscoridi	414. 1. 15
agerati consideratio	550. 2. 7	amaracum quid	414. 1. 48
agerati vires ex Galeno	550. 2. 18	amaracini consideratio	76. 1. 50
Agnus Dioscoridi	152. 1. 2	Amaranti purpurei historia	549. 1. 10
Agria arbor	131. 2. 38	Amici Lusitani errata	149. 1. 57
Agrifolij consideratio	131. 1. 50	Ambari historia	57. 1. 6
Aiuga Dioscoridi	510. 1. 6	amhari genera, & vires	57. 1. 28
aiugæ consideratio	510. 1. 43	Ambrosia Dioscoridi	478. 1. 60
aiugæ vires ex Galeno	510. 1. 58	ambrosiæ consideratio	478. 2. 23
alabastritis lapis Dioscoridi	746. 2. 35	ambrosiæ vires ex Galeno	478. 2. 57
alabastritis lapidis consideratio	746. 2. 44	Amelli mentio Vergilio	607. 1. 30
alabastritis vires ex Galeno	746. 2. 63	Amianthus lapis Dioscoridi	747. 2. 55
Alberti Magni lapsus	234. 1. 33. & 235. 2. 20	amiantis lapidis consideratio	748. 1. 1
Alcea Dioscoridi	503. 2. 30	amixto lapide frans impostorum	748. 1. 20
alceæ consideratio	503. 2. 53	Ammi Dioscoridi	428. 2. 31
alceæ vires ex Paulo	504. 1. 10	ammios consideratio	429. 1. 1
Alciabidion Dioscoridi	529. 1. 31	ammios vires ex Galeno	429. 1. 43
Alcyonium Dioscoridi	736. 1. 48	Ammoditæ historia, & venefica vis	829. 2. 18
alcyonij historia, & consideratio	736. 2. 32	ammoditæ morsus signa, & eius curatio	829. 2. 47
alcyonij vires ex Galeno	737. 1. 8	Ammoniacum Dioscoridi	454. 2. 14
Alga consideratio	586. 1. 27	ammoniacy consideratio	454. 2. 51
Alhasser quid ex Serapione	270. 2. 42	ammoniacy historia ex Plinio	455. 1. 4
Alisma Dioscoridi	506. 2. 30	ammoniacy lacryma duplex	455. 1. 5
alismaticis consideratio	507. 1. 1	ammoniacy vires ex Galeno	455. 1. 22
alismaticis vires ex Galeno	507. 1. 37	Amomis Dioscoridi	46. 1. 43
Althææ herbæ consideratio, & vires	475. 1. 8	Amomum Dioscoridi	46. 1. 1
Allium Dioscoridi	334. 2. 1	amomi consideratio	46. 1. 52
allium sylvestre Dioscoridi	335. 1. 23	amomum spurium	46. 2. 18
alliij consideratio	335. 1. 13	amomi vires ex Galeno	47. 2. 22
alliij sylvestris consideratio	335. 1. 51	Ampelitis terra Dioscoridi	754. 1. 1
Alni consideratio, & historia ex Theophr.	321. 1. 25	ampelicitis terræ consideratio	754. 1. 10
alni vlti, & vires	321. 1. 53	Ampeloprasion Dioscoridi	332. 2. 20
Aloe Dioscoridi	393. 2. 50	ampeloprasii consideratio	332. 2. 35
aloës consideratio	394. 2. 23	ampeloprasii vsus ex Galeno	332. 2. 56
aloës vires ex Galeno	395. 1. 10	Amphisbænæ ictus nota, & curatio Dioscoridi	830. 2. 52
aloës vires ex Mesue	395. 2. 38	amphisbænæ consideratio	831. 1. 1
Alphalsat Aphris quid	330. 2. 41	amphisbænæ bicipitem esse, falsum	831. 1. 43
Alfine Dioscoridi	578. 1. 37		amphisbæ
alfinis consideratio	578. 2. 7		
alfinis vires ex Galeno	578. 2. 18		

# Index.

Amphibæna morsus signa, & curatio	831.	antidoti è scincò descriptio	773.2.40
2.11.		antidoti è terra Lemnia descriptio	774.2.12
Amurea Dioscoridi	155.1.1	antidotorum actio	762.1.40
Amurex vñs	156.1.2	Antipathes Dioscoridi	739.1.37
Amygdalæ amaræ Dioscoridi	185.2.1	antipathes vbi visum	740.2.40
Amygdalæ dulces Dioscoridi	185.2.52	Antirrhinon Dioscoridi	606.2.52
Amygdalarum consideratio	186.1.1	antirrhini consideratio	607.1.1
Amygdalarum vires ex Galeno	186.1.15	antirrhini vires ex Galeno	607.1.29
Amygdalini parandi ratio	66.2.30	Antispoda Dioscoridi	690.2.5
Amygdalini vires	67.1.12	Aparine Dioscoridi	458.1.20
Amygdalarum gummi Dioscoridi	185.2.43	aparine consideratio	458.1.51
Amylum Dioscoridi	184.1.60	aparine vires ex Galeno	458.1.58
Amyli consideratio	184.2.35	Aphaca Dioscoridi	330.2.50
Amyli vires ex Galeno	184.2.44	aphacæ consideratio	331.1.23
Anacardiorum mentio, & vires	189.2.34	aphaca inrybi genus	331.1.54
Anacardiorum veneni signa, & curatio	779.	aphacæ & vicicæ vires ex Galeno	331.1.50
2.44		Apiastrum Dioscoridi	467.2.10
Anagallis Dioscoridi	360.1.18	apiastrum consideratio	467.2.40
Anagallidis consideratio	360.2.18	apiastrum vires	468.1.8
Anagallidum vires ex Galeno	360.2.37	apiastrum facultates ex Galeno	468.1.30
Anagyris Dioscoridi	505.1.10	Apios Dioscoridi	643.1.40
anagyris consideratio, & genera	505.1.46	apij consideratio	643.2.10
anagyris vires ex Galeno	506.1.30	Apium hortense Dioscoridi	431.1.50
Anchusa Dioscoridi	529.1.45	apij hortensis consideratio	433.2.1
anchusarum consideratio	529.2.53	apij omnis generis vires ex Galeno	434.
anchusarum vires ex Galeno	530.1.7	2.25	
Andacocha Mauritanis quid	472.1.60	apium palustre	433.2.43
Andræ Lacunæ literæ	416.2.25	apium montanum	433.2.58
Androfacis Dioscoridi	493.1.10	apium risus	357.2.45
androsfacis consideratio	493.1.36	Apocymon Dioscoridi	572.1.30
androsfacis vires ex Galeno	493.1.49	apocyni consideratio	572.1.58
Androsfæmon Dioscoridi	508.2.27	apocyni vires ex Galeno	572.2.30
androsfæmi consideratio	509.1.8	Apollinaris herba Dioscoridi	557.1.30
androsfæmi vires ex Galeno	509.2.14	apollinaris herba consideratio	557.2.57
Anemone Dioscoridi	358.1.42	apollinaris herba vires ex Galeno	558.
anemones consideratio	358.2.37	1.22	
anemones vires ex Galeno	359.1.58	Apriecur Dioscoridi	220.1.29
Anethum Dioscoridi	426.2.51	apri vrina	266.2.18
anethi consideratio, & vires ex Galeno	427.	Apum consideratio	272.2.20
1.1		apum rex & regimen	272.2.34
Angelicæ historia, & vires	598.1.24	apes quibus gaudeant	273.1.7
Anguim senecta Dioscoridi	216.2.46	apum mira prudentia	273.1.27
anguim senectæ consideratio	216.2.55	apum mira in opere industria	273.1.29
Animalia ex ouis nascentia	232.1.48	apum reparatio ex Virgilio	273.2.22
animalka alia præter canem tentantur	810.1.57	apum idus curatio Dioscoridi	822.1.2
Anisum Dioscoridi	426.1.74	apum idus, & eius remedia	782.1.16
anisi consideratio, & vires ex Galeno	426.	Aqua Dioscoridi	675.2.8
1.48		aquarum differentia, & facultates	675.
Anonis Dioscoridi	389.2.49	2.22	
anonidis consideratio	390.1.14	aquarum non potabilium facultates	676.
anonidis vires ex Galeno	390.2.22	1.50	
anonidis historia ex Theophrasto	390.1.44	aquæ frigida noxa, & curatio Dioscoridi	
Anthemidis Dioscoridi	496.1.54	804.1.4	
anthemidis consideratio	496.2.50	aquæ anisicum noxa, & curatio	798.
anthemidis vires ex Galeno	497.1.2	2.48	
Anthyllidis Dioscoridi	495.1.36	aqua ex humano stercore	262.2.50
anthyllidis consideratio	495.2.58	Aquæ paup quousque exoritur in denoris	816.1.1
anthyllidis vires ex Galeno	496.1.41	aquæ paup quando, & quibus curetur	816
Antidota contra venena, & eorum descriptio	771.2.18 & deinde	1.32	
Antidoti è sanguinibus descriptio	773.2.20	Aqua marina Dioscoridi	677.1.25
		aqua mulla Dioscoridi	674.2.10

# Index.

aquæ mulse parandæ ratio varia	674.2.46	Aristotelis de lapidum generatione opinio	638.2.37
aquæ stillatitæ quæ cæteris præstantiores	147.	Armeniacæ malæ Dioscoridi	171.2.20
1.35		armeniæcorum malorum consideratio	175.
Aquifolium	131.2.4	1.24	
Aquilina, siue aquileia	363.1.49	Armenius lapis	706.2.35
Aquosa quæ ament loca	11.2.14	armenij lapidis consideratio	706.2.45
Arabicum gummi non esse acaciæ	150.	armenij lapidis vires ex Alexandro	707.1.52
2.36		armenij lapidis vires ex Actio	707.2.48
Arabicus lapis Dioscoridi	745.2.49	armenij lapidis vires ex Galeno	708.1.8
Arabis Dioscoridi	339.1.17	Armenia terre vires ex Galeno	717.2.30
arabidis consideratio	339.1.38	Armorica Dioscoridi	224.2.38
Arabum lapsus	335.1.60	Aron Dioscoridi	350.1.1
Arenæ piscis	112.2.52	ari consideratio	350.1.31
araneus Dioscoridi	243.2.30	ari vires ex Galeno	350.1.45
aranei consideratio	243.2.50	Arsenic sublimati venenum, & curatio	798.
aranei muris consideratio	248.1.30	2.45	
Arbores quæ plantæ scandant	12.1.52	Artemisia Dioscoridi	476.1.45
arboribus quæ innascantur	12.1.50	artemisia tenuifolia Dioscoridi	476.2.12
Arbutus Dioscoridi	184.2.40	artemisiz consideratio	476.2.29
arbuti consideratio	184.2.55	artemisiz vires ex Galeno	478.1.46
arbuti descriptio	185.1.9	Arundo Dioscoridi	125.1.1
arbuti usus & vires	185.1.40	Arundinum consideratio, vide Harundinum	
Arcticon Dioscoridi	590.2.28	Afarum Dioscoridi	34.2.25
arctij consideratio	590.2.41	asari consideratio	35.1.1
arctij vires ex Galeno	590.2.57	asari vires ex Mesue	35.1.43
Arena Dioscoridi	751.2.20	asari facultates ex Galeno	35.2.30
Argemone Dioscoridi	359.2.25	Asclepias Dioscoridi	459.2.15
argemones consideratio	359.2.40	asclepiadis consideratio	459.2.29
argemones caput adulterinum	359.2.51	asclepiadis vires ex Galeno	460.1.15
argemones vires ex Galeno	360.2.2	Ascyron Dioscoridi	508.1.45
Argentina herba	349.2.23	ascyri consideratio	509.1.8
Argenti recrementum Dioscoridi	702.	ascyri vires ex Galeno	509.2.14
2.52		Afininum recur Dioscoridi	229.1.17
argenti scoriz consideratio	702.1.60	asini ungula Dioscoridi	230.1.32
Argenti spuma Dioscoridi	703.1.25	Asius lapis Dioscoridi	740.2.1
argenti spumæ consideratio	704.1.44	asij lapidis consideratio	740.2.38
argenti spumæ vires ex Galeno	704.2.26	asij lapidis historia, & vires ex Galeno	741.
argenti spumæ noxa, & curatio Dioscoridi	796.2.22	1.5	
argenti spumæ mala	796.2.39	Aspalathus Dioscoridi	54.1.13
argenti spumæ sumptæ curatio	797.1.2	aspalathi consideratio	54.1.40
Argemum viuum Dioscoridi	712.1.60	aspalathi vires ex Galeno	54.2.29
argenti viui consideratio	712.2.28	Asparagus Dioscoridi	305.2.54
argenti sublimati parandi ratio	713.2.19	asparagorum vires	306.1.44
argenti viui noxa, & auxilia Dioscoridi	727.	Asphodeli consideratio, & historia	351.
2.30		2.1	
argenti viui pernicialis natura	797.2.34	asphodeli vires ex Galeno	351.2.27
argenti viui sumpti curatio	798.1.41	Aspidis ictus noctæ, & curatio Dioscoridi	
Aria arbor	131.2.28	835.1.60	
Arida loca quæ plantæ ament	11.2.58	aspidis perniciosus ictus, & genera	835.
Arisarum Dioscoridi	350.2.10	2.20	
aritari historia	350.2.31	aspidum historia, ictus signa, & cura	835.
aritari vires ex Galeno	350.2.58	2.45	
Aristolochia clematidis Dioscoridi	375.1.3	Asplenium Dioscoridi	493.2.4
aristolochia longa Dioscoridi	374.2.30	aspleni consideratio	493.2.44
aristolochia rotunda Dioscoridi	374.1.30	aspleni vires ex Galeno	494.1.30
aristolochiz consideratio	375.1.32	Asa fetida	450.2.28
aristolochiz clematidis examen	375.2.15	Aster Atticus Dioscoridi	599.2.24
aristolochiam longam vulgarem à Plinij pi-		asteris Attici consideratio	599.2.56
ristolochia non differre	377.1.20	asteris Attici vires	600.1.46
aristolochiz vires ex Galeno	377.2.3	Astragalus Dioscoridi	551.2.36
Aristolochis lapsus	240.1.35 & 243.1.46	astragali consideratio	552.1.1
			astragali

# Index.

astragali vires ex Galeno	552. 1. 10
Athera Dioscoridi	279. 2. 10
atheræ consideratio	279. 2. 18
Atractylis Dioscoridi descripta	467. 1. 12
atractylidis consideratio	460. 1. 40
Atramentum librarium Dioscoridi	754. 2. 12
Atramentum futorium Dioscoridi	718. 2. 30
atramenti futorij consideratio	719. 1. 14
atramenti futorij historia, & vires ex Galeno	719. 2. 35
Atriplex Dioscoridi	300. 2. 13.
atriplicis consideratio	300. 1. 46
atriplicis vires ex Galeno	301. 2. 27
atriplicis alia genera	300. 2. 60
Awellana nux Dioscoridi	190. 1. 28
auellanarum nucum consideratio	190. 1. 55
auellanarum vires ex Galeno	190. 2. 12
Avena Dioscoridi	279. 2. 55
avenæ consideratio	280. 1. 5
avenæ facultates	280. 1. 25
Auerrois vana calumnia contra Galenum	759. 2. 18
Auerrois locus restitutus	4207. 1. 10
Auicennæ lapsus 872. 1. 10. & 176. 2. 17. & 735. 9	
Auicenna contra Galenum	430. 2. 9
Auicennæ defensio 183. 2. 37. & 419. 2. 37. & 568. 1. 42	
Auicennæ de generatione lapidum opinio c6- probata	659. 1. 54
Aurantia poma	176. 2. 29
Auri historia, & præstantia	713. 2. 48
auri vires ex Auicenna	714. 2. 6
Auricula muris Dioscoridi	365. 1. 1.
auriculæ muris consideratio	365. 1. 28
auriculæ muris facultates	365. 1. 56
Auripigmentum Dioscoridi	724. 1. 10
auripigmenti consideratio	724. 2. 8
auripigmenti vires ex Galeno	725. 1. 1
auripigmenti noxa, & remedia Dioscoridi	798. 2. 10
auripigmenti venefica vis, & curatio 798. 2. 25	
Azadaracht arboris venenum, & remedia 784	
2. 39	
azaroli arboris descriptio	178. 1. 59

## B

<b>B</b> acca huri Dioscoridi	114. 2. 57
Baccharis Dioscoridi	416. 1. 35
baccharis consideratio	416. 2. 18
baccharis vires ex Paulo	417. 1. 45
Balaninum oleum Dioscoridi	67. 1. 30
balanini olei consideratio	67. 1. 40
balanini olei vires	67. 1. 45
Balsapitum Dioscoridi	166. 2. 50
balsapitij consideratio	166. 2. 52
Ballote Dioscoridi	467. 1. 12
ballores consideratio	467. 1. 12
Balsamina herba quæ	651. 1. 6

balsaminæ historia	651. 1. 12
Balsamum Dioscoridi	51. 1. 48
balsamum cur in Syria non reperitur 52	
2. 2	
balsami consideratio, & historia	52. 1. 21
balsami viduarum in Memphi	52. 2. 8
balsami historia ex Theophrasto	52. 2. 16
balsami fructum nō legitimū officinis	53. 1. 15
balsami vires ex Galeno	53. 1. 31
balsami loco quid supponendum	53. 1. 42
balsami factitij confectio	53. 2. 32
Barbula hirci Dioscoridi	327. 1. 40
barbulæ hirci consideratio, & vires 327. 1. 58	
Basilisci ictus noxæ, & curatio Diosc. 836. 1. 53	
basilisci varia historia 836. 2. 5. & in ea plura fabulosa	837. 1. 7
Bdellium Dioscoridi	83. 1. 20
bdellium plantæ genus	84. 1. 10
bdellij consideratio	83. 1. 56
bdellij vulgaris genera	83. 2. 16
bdellij historia ex Plinio	83. 2. 37
bdellij vires ex Galeno	83. 2. 52
Behen album & rubrum	630. 1. 35
Bellis, & eius historia, & vires	498. 1. 35
Belzoinum quid	450. 1. 4
Beneficium a Dioscoride in posteros collatum	758. 2. 45
Beta Dioscoridi	304. 1. 20
betæ consideratio	304. 1. 58
betæ facultates ex Galeno	304. 2. 43
beta sylvestris	305. 1. 3.
Betonica Dioscoridi	511. 1. 27
betonicæ consideratio	512. 1. 12
betonicæ vires ex Antonio Musa	512. 1. 18
betonicæ vires ex Galeno	512. 2. 42
Betula arboris consideratio	121. 2. 6
betulæ cortex bituminosus	121. 2. 34
betulæ vires	121. 2. 48
Bezahar lapidis historia, & vires	718. 1. 10
Bislingua herba	606. 1. 59
Bistorta herba quæ	513. 1. 34
bistortæ vires	513. 2. 18
Bitumen Dioscoridi	104. 1. 1
bituminis consideratio	104. 2. 1
bituminis historia, & vires ex Galeno	106. 2. 60
Blatta pituitaria Dioscoridi	218. 1. 32
blattarum consideratio	218. 1. 39
blattaræ herbæ historia, & vires	589. 2. 33
blatæ bifantis	205. 2. 6
Bliton Dioscoridi	298. 2. 15
bliti consideratio	298. 2. 22
bliti vires ex Galeno	299. 1. 3
Bœotica myrrha	81. 2. 23
Boli Armenij vires	717. 2. 30
Bonifacia	606. 1. 60
Borraginis consideratio	604. 1. 40
Botrys Dioscoridi	479. 1. 1
botryos consideratio	479. 1. 26
botryos vires ex Paulo	479. 2. 21
Branca vrsina	389. 1. 25



# Index.

C

Brassuoli lapsus, & eiusdem opiniones non acceptæ 14. 2. 11. & 30. 1. 60. & 34. 1. 18 & 50. 1. 10. & 80. 1. 42. & 88. 1. 33. & 181. 1. 4. & 185. 1. 18 & 121. 1. 7. & 120. 2. 4. & 291. 2. 43. 309. 2. 48. & 318. 2. 60. & 325. 1. 59. & 335. 2. 7. & 342. 2. 51. & 358. 2. 45 & 379. 1. 35. & 386. 1. 12. & 391. 1. 3 & 404. 1. 12. & 410. 2. 40. & 477. 1. 22. & 430. 2. 55. & 434. 1. 41. & 441. 1. 41. 448. 508 & 477. 1. 20 & 480. 2. 30. & 509. 1. 46. & 591. 2. 8 & 608. 1. 29. & 634. 2. 45. & 691. 2. 3. & 700. 1. 30. & 720. 2. 30. & 722. 1. 36. & 726. 1. 13.

Brassica Dioscoridi 302. 1. 20  
brassicæ sativæ consideratio 303. 1. 1  
brassicæ vires ex Galeno 303. 1. 57  
brassicam quæ oderunt 15. 34  
brassica sylvestris Dioscoridi 302. 2. 28  
brassicæ sylvestris consideratio 303. 1. 49  
brassica marina Dioscoridi 302. 2. 40  
brassicæ marinæ consideratio 303. 2. 54  
Britannica Dioscoridi 512. 2. 60  
britannicæ consideratio 513. 1. 12  
britannicæ historia ex Plinio 513. 1. 18  
britannicæ vires ex Galeno 513. 2. 43  
Bromus Dioscoridi 611. 2. 20  
bromi consideratio 611. 2. 27  
Brunfelsij lapsus 343. 2. 37. & 585. 1. 6. 606. 1. 49  
Bryon Dioscoridi 55. 1. 10  
Bryonia Dioscoridi 649. 1. 21  
bryoniæ consideratio 649. 2. 27  
bryoniæ noxa, & curatio 802. 2. 10  
Bubuli stercoris vires 265. 1. 2  
Buccina Dioscoridi 201. 2. 48  
buccini consideratio 202. 1. 54  
Buglossum Dioscoridi 604. 1. 1  
buglossi consideratio 604. 1. 41  
buglossi descriptio ex Auicenna 602. 2. 44  
buglossi vires ex Galeno 605. 1. 6  
Bulbus esculentus Dioscoridi 351. 2. 48  
bulbus vomitorius Dioscoridi 352. 1. 39  
bulborum consideratio 352. 1. 39  
bulborum vires ex Galeno 352. 2. 2  
Bunium Dioscoridi 602. 2. 10  
bunii consideratio 602. 2. 48  
bunii vires ex Galeno 603. 1. 12  
Buphtalmum Dioscoridi 498. 1. 12  
buphtalmi consideratio 498. 1. 40  
buphtalmi vires ex Galeno 498. 2. 21  
Buprestes Dioscoridi 241. 1. 26  
buprestium consideratio 242. 1. 6  
buprestis sumptæ notæ, & auxilia Dioscoridi 777. 1. 49  
buprestium venenum eiusq; curatio 777. 2. 1  
Bursa pastoris, & eius vires 338. 2. 46  
Butyrum Dioscoridi 251. 1. 30  
butyri fuligo Dioscoridi 251. 1. 60  
butyri consideratio 252. 2. 4  
Buxi arboris consideratio 149. 1. 34  
buxi usus 149. 1. 47

CACALIA Dioscoridi descripta 602. 1. 39  
Cacalix consideratio 602. 1. 53  
cacalix vires ex Galeno 602. 2. 9  
Cachrys Dioscoridi 443. 2. 60  
cachrys quid 444. 2. 25  
Cactus cardui genus 387. 2. 58  
Cadmia Dioscoridi 687. 1. 50  
cadmix consideratio 688. 1. 34  
cadmix historia ex Galeno 688. 1. 41  
cadmix historia ex Plinio 688. 2. 37  
cadmix facultates ex Galeno 688. 2. 13  
Cæcilix ictus notæ, & curatio Dioscoridi 830. 2. 50  
cæcilix morsus signa, & remedia 831. 2. 12  
Cæruleus, vide Cœruleus  
Calamus odoratus Dioscoridi 50. 1. 1  
calami odorati historia ex Theophrasto 50. 1. 33  
calami odorati vires ex Galeno 51. 1. 5  
calamus odoratus officinarum spurius 50. 2. 41  
Calamintha Dioscoridi 409. 2. 58  
calaminthæ consideratio 410. 2. 25  
calaminthæ vires ex Galeno 411. 1. 24  
Calcifraga Dioscoridi 648. 1. 18  
Callorum equi vires 230. 2. 29  
Calthæ consideratio, & vires 657. 2. 2  
Calx viua Dioscoridi 714. 2. 55  
calcis viua consideratio 735. 1. 19  
calcis vires ex Galeno 735. 1. 37  
calcis noxa, & remedia Dioscoridi 798. 2. 10  
calcis malicia vis, & curatio 798. 2. 25  
Canabel Aphris quid 397. 2. 36  
Cancamum Dioscoridi 59. 1. 30  
cancami consideratio 59. 1. 51  
Cancellorum consideratio 209. 2. 55  
Cancri Dioscoridi 208. 1. 1  
cancrorum consideratio 208. 1. 36  
cancrorum vires ex Galeno 208. 2. 39  
cancri fluuittiles in Hetruria frequentissimi 209. 1. 55  
Canis rubus Dioscoridi 135. 2. 50  
canis rubi consideratio 136. 1. 1  
canis rubi vires ex Galeno 136. 2. 22  
Canis rabidi iecur Dioscoridi 229. 2. 51  
canis rabiosi signa Dioscoridi 809. 1. 50  
canis rabiosi venefica natura, & signa 809. 2. 43  
canes quibus causis rabie exagitantur 810. 1. 28  
canis morsus neglecti discrimina 810. 2. 48  
canis rabidi morsus indicia salutifera 811. 1. 52  
canis rabiosi morsus curatio Dioscoridi 811. 2. 50  
canis rabiosi morsus curatio 812. 1. 58  
canis rabiosi morsus remedia suspecta 813. 1. 43  
canis rabiosi morsus auxilium religiosum 813. 2. 23  
caninum stercus, & eius vires 265. 2. 2  
Cannabis Dioscoridi descripta 504. 1. 20  
cannabis consideratio 504. 1. 56  
cannabis vires ex Galeno 504. 2. 18  
Cannella 41. 1. 40  
Cantha

# Index.

Cantharides Dioscoridi	241.2.8	castiam in cinnamomum mutari	41.2.2
cantharidum consideratio	241.2.57	castia fistula Græcis quid	41.2.11
cantharidum vires ex Galeno	242.2.3	castiæ odoratæ descriptio ex Plinio	41.2.43
cantharidum noxa, & remedia Dioscoridi 774.		castiæ odoratæ historia ex Theophrasto	41.
2.35		1.1.	
cantharidum malefica vis	775.1.50	castia lignea	42.1.18
cantharidum veneni curatio	775.2.45	castiæ vires ex Galeno	44.2.47
Caphuræ historia, & genera	93.1.53	Castiæ solutiæ consideratio	45.1.36
caphuræ probatio & conseruatio	99.1.30	castiæ solutiæ vires	45.2.10
caphuræ temperamentum, & vires	98.2.53	Castiæ siue cuscute historia, & vires	646.
Carnos Dioscoridi	592.1.50	2.57	
capni consideratio, vide Fumariz consider.		castanea Dioscoridi	158.2.48
Capparis Dioscoridi	354.1.40	castaneorum consideratio	158.2.58
capparum consideratio	354.2.40	castaneorum vires	159.1.30
capparum satio	355.1.4	castaneorum vires ex Galeno	159.1.44
capparis vires ex Galeno	355.1.10	castorium Dioscoridi.	210.2.52
Capræ ungula Dioscoridi	230.1.29	castorij consideratio	221.1.27
caprinum secur Dioscoridi	229.2.19	castorij vires ex Galeno	221.2.59
capriui stercoreis vires	265.1.17	castorei vires ex Plinio	222.2.33
Caput lactis	252.2.32	castorei virulenta vis, & curatio	795.2.43
Carcioli	387.2.12	catanance Dioscoridi	607.1.42
Cardamomum Dioscoridi	27.1.34	castanances consideratio	607.1.60
cardamomi consideratio	28.1.1	cataputia	637.2.15
cardamomi officinis genera plura	28.1.5	Catoblepas	836.2.56
cardamomi Mauritanis genera duo	28.1.15	caucalis Dioscoridi	323.2.22
cardamomi genera ex Plinio	28.2.45	caucalidis consideratio	323.2.50
cardamomi vires ex Galeno	28.2.60	caucalidis vires ex Galeno	323.2.61
Cardiæ consideratio, & vires	582.2.30	caudæ cerui venenum, & eius curatio	795.
Carduus Dioscoridi	387.1.22	1.9	
carduorum consideratio, & genera	387.1.38	caulium in plantis differentiz	15.2.58
cardui vires ex Galeno	387.2.57	causa metallorum efficiens	661.1.32
carduus pinea	387.2.33	cauterij visilitas	814.1.40
carduus benedictus, & eius vires	461.2.4	cedria Dioscoridi	111.1.60
Castina	382.1.5	cedrides Dioscoridi	111.2.49
Carnes quo modo diutius asseruentur	19.2.19	cedri historia	112.2.23
carnes noxiæ, & earum remedia	804.1.35	cedri & cedriæ vires ex Galeno	114.2.20
Carpasucci noxa, & remedia Dioscoridi 784.		cedromela Dioscoridi	171.1.50
2.58		cedrus Dioscoridi	111.1.60
carpasi consideratio	785.1.1	celticum nardum Dioscoridi	32.2.25
Carpesij consideratio	36.2.57	celtici nardi consideratio	32.2.26
carpesij vires ex Galeno	36.2.52	celtici nardi ex Galeno	33.2.22
Carobalsami consideratio	53.1.15	cenchri idus notæ, & remedia Dioscoridi	
carobalsami loco quid supponendum 53. 1.		834.2.38	
57		cenchri consideratio	834.2.57
Cartamum	654.2.27	centaurium magnum Dioscoridi	379.1.40
Carum Dioscoridi	426.2.1	centaurij magni consideratio	379.1.78
cari consideratio	416.2.23	centaurij magni vires ex Galeno	379.2.28
cari officinarum	ibidem	centaurium minus Dioscoridi	380.1.1
cari vires ex Galeno	426.2.40	centaurij minoris consideratio	380.2.23
Caryophyllatæ vires	526.2.1	centaurij minoris vires ex Galeno	380.2.
Caryophyllorum consideratio, & historia 341.		34	
2.33		cepa Dioscoridi	373.1.24
caryophylli floris mentio	342.1.20	ceparum consideratio, & historia 333.2.	
Caryotæ Dioscoridi	163.1.3	20	
caryotarum vires ex Galeno.	165.2.2	ceparum vires ex Galeno	334.1.35
Cateus Dioscoridi	551.1.1	cepea Dioscoridi	506.1.45
casei consideratio, & vires	252.2.40	cepeæ consideratio	506.1.1
Cassia Dioscoridi	38.2.58	cepeæ vires ex Paulo	505.2.17
castiæ odoratæ consideratio	40.1.10	ceera Dioscoridi	271.1.22
castiam odoratam non esse castiam coronariam	40.1.42	ceræ vires ex Galeno	272.1.18
		cerasia Dioscoridi	169.1.32
			ceralo

# Index.

cerasorum: consideratio	169.1.42	chamæpitys consideratio	570.1.43
cerasorum sitinorum genera	169.2.6	chamæpitys vires ex Galeno	570.1.58
cerasorum acidorum genera plura	169.2.28	chamælyce Dioscoridi	638.2.1
cerasorum vires ex Galeno	170.1.20	chamælyces consideratio	638.2.30
Cerastræ ictus notæ, & eius curatio Dioscoridi tradita	835.1.18	chamælyces vires ex Galeno	638.2.40
cerastræ morsus exitialis auxilia	825.1.29	Chamelæa Dioscoridi representata	640.1.48
Ceræta herba	514.1.59	chamelææ consideratio	641.1.30
ceruinum cornu Dioscoridi	238.2.24	chamelææ vires ex Galeno	642.2.22
cerui genitale Dioscoridi	230.1.12	chamelææ noxa, & curatio	642.2.28
ceruorum historia	238.2.57	Characis tithymalus Dioscoridi	632.2.28
ceruis vita longa	239.2.7	chelidonia herba ad hirundine inuenta	236.2.25
cerui dictamni herbarum inuectores	240.1.42	chelidonium minus Dioscoridi	362.2.35
cerui fel non habent	240.1.47	chelidonii maioris consideratio	363.1.20
cerui venenum atrocissimum in cauda habent.	240.1.61	chelidonii maioris vires	363.1.57
eius remedia	795.1.9	chelidonium minus Dioscoridi	363.2.18
Cerussa	277.2.37	chelidonii minoris consideratio	363.2.49
cerussa Dioscoridi	704.2.56	chelidonii minoris vires	364.1.60
cerussæ consideratio	705.2.1	cherisydi natura, morsus, & curatio	834.2.6
cerussæ vires ex Galeno	705.2.13	cherue oleum	66.1.34
cerussæ noxa, & curatio Dioscoridi	791.2.20	Chia terra Dioscoridi	753.1.16
cerussæ lethalis natura	791.2.46	chinæ radicis consideratio, & vires	144.2.60
cerussæ veneni remedia	792.1.18	condrilla Dioscoridi	315.2.44
Cestron Dioscoridi	511.1.42	chondrilla vniuersæ consideratio	316.1.30
chalcantbi genera, & historia	719.1.14	chondrilla vires ex Galeno	316.1.45
chalcantbi vires, & historia ex Galeno	719.2.37	Chrysanthemum Dioscoridi	549.2.1
chalcitis Dioscoridi	721.1.24	chrysanthemum consideratio	549.2.30
chalcitis consideratio	722.1.19	chrysanthemum lectio resitura	550.1.6
chalcitis historia, & vires ex Galeno	722.2.20	Chrysoalanus	630.1.19
Chamæ Dioscoridi	204.1.70	chryscolla Dioscoridi	705.2.48
chamarum consideratio	204.1.25	chryscolla fastidia	266.2.47
chamæastræ Dioscoridi	641.2.49	Chryscolla consideratio, & historia	706.1.18
chamæscifles Dioscoridi	603.1.22	chryscollæ vires ex Galeno	706.2.7
chamæscissi consideratio	603.1.43	Chrysocome Dioscoridi	548.1.12
chamæscissi vires ex Galeno	603.2.13	chrysocomes consideratio	548.1.16
chamædaphne Dioscoridi	616.1.50	chrysocomes vires ex Galeno	548.1.27
chamædaphnes consideratio	616.2.33	Chrysoanon Dioscoridi	548.1.40
chamædaphnes vires ex Galeno	617.1.10	chrysoanon consideratio	548.1.49
Chamædryas Dioscoridi	463.2.40	chymistiarum de chelidonio vanitas	363.1.38
chamædryos consideratio	464.1.12	cicadæ Dioscoridi	233.2.42
chamædryos historia, & vires ex Theophrasto	464.1.28	cicadarum consideratio	233.2.56
chamædryos vires ex Galeno	464.1.45	cicadarum vires ex Galeno	234.1.44
Chamæleo albus Dioscoridi	381.1.30	Cicer satium Dioscoridi	286.1.38
chamæleo niger Dioscoridi	381.2.30	ciceris consideratio, & vires ex Galeno	286.2.16
chamæleonis vniuersæ consideratio	382.1.4	ciceris vires ex Aërio	286.2.45
chamæleonis vniuersæ historia, & vires ex Theophrasto	383.1.37	cicer arietinum Dioscoridi	286.1.36
chamæleonis nigri venenum, & remedia	739.35	Cichorion Dioscoridi	313.1.20
Chamæleontis historia	247.1.43	cichorij vires ex Galeno	315.1.32
chamæleontis vires	247.2.2	cici Dioscoridi	631.2.59
chamæleuce Dioscoridi	603.2.25	cicini olei consideratio	66.1.33
chamæleuces consideratio	603.2.32	cicini olei vires ex Mesue	66.1.46
chamæleuces vires ex Galeno	603.2.58	Ciconiæ sterus	265.2.56
Chamæmelon	496.2.49	cicutæ Dioscoridi	570.2.27
chamæmeli consideratio	ibidem	cicutæ consideratio	571.1.16
chamæmeli vires ex Galeno	497.1.2	cicutæ vires ex Galeno	671.1.35
chamæpitys Dioscoridi	310.1.5	cicutæ potæ noxa, & curatio Dioscoridi	782.2.50
		cicutæ venefica vis	783.1.14
		cicutæ sumptæ remedia	783.2.1
		cimices	

# Index.

Cimices Dioscoridi	227.1.60	cochlearum vires ex Galeno	207.1.36
cimicum consideratio	227.2.24	cochlex pomariz quæ	207.1.20
cimices sylvestres	227.2.43	cochlex marinæ	207.2.38
Cimolia terra Dioscoridi	753.1.36	cochlex sine tella	207.2.41
Cinis fermenticius Dioscoridi	735.2.44	cochlearum lapis, & eius vires	207.2.47
cineris omnis vires ex Galeno	735.2.58	Cæruleus lapis Dioscoridi	708.1.37
Cinnabaris Dioscoridi	709.2.52	cærulei lapidis consideratio	708.1.48
cinnabaris consideratio	710.1.25	cærulei vires ex Galeno	709.1.25
Cinnamomum Dioscoridi	39.1.51	Colchicon Dioscoridi	575.1.47
cinnamomi consideratio	42.1.37	colchici & ephemeri consideratio	576.1.6
cinnamomi historia ex Galeno	42.1.54	colchici & ephemeri vires ex Galeno	577.
cinnamomi penuria vnde	43.1.20		
cinnamomi optimi notæ	42.2.44		
cinnamomi vulgaris aqua stillatitia	44.2.58		
cinnamomi differentiæ ex Theophrasto	43.2.58		
cinnamomi vires ex Galeno	44.2.38		
Cionia Dioscoridi	201.2.49	Colocasia Dioscoridi	288.1.54
Circeæ Dioscoridi	482.1.52	colocasiæ consideratio	158.2.58
circeæ consideratio	482.2.10	Colocynthis Dioscoridi	643.2.50
circeæ vires ex Galeno	482.2.42	colocynthis consideratio	644.1.35
Circunforaneus floris venenati olfactu inter-	761.1.27	colocynthis lésiones	644.1.41
emptus		colocynthis noxæ, & curatio	822.2.9
Circunforaneorū venena innoxie sumere pro-	770.1.26. & deinde	colocynthis vires ex Mesue	644.1.49
stentium fraudes	770.1.26. & deinde	colocynthis vires ex Galeno	644.2.11
Circunforaneorum diui Pauli stirpem men-	820.2.38. & deinde	Colophoniz resinæ consideratio	101.1.27
tientium fraus		Columellæ lapsus	195.2.44
Cirsum Dioscoridi	599.1.39	Colureæ colytræ consideratio	450.2.60
cirsiij consideratio	590.2.1	Colymbades oliuæ Dioscoridi	154.2.9
Cistus Dioscoridi	139.1.29	Communis curatio in omnes ictus virulentos	
cisti consideratio	139.2.31	Dioscoridi	816.2.27
cisti vires ex Galeno	140.1.8	Confiligo herba	620.1.55
Citria mala Dioscoridi	171.1.50	Consolida regalis	428.1.34
citrionum mira facultas	175.2.47	Conyza Dioscoridi	483.1.46
citrionum vires	176.1.13	conyzæ consideratio	484.1.1
citrui mali vires ex Galeno	176.1.44	conyzæ vires ex Galeno	484.1.30
Clematis Dioscoridi	516.2.34	Corallium Dioscoridi	739.1.10
clematis altera Dioscoridi	517.1.1	corallij consideratio	739.1.45
clematidum consideratio	517.1.23	corallij facultates	739.2.42
clematidum vires ex Galeno	517.2.40	Corallina, & eius vires	585.1.55
Clinopodium Dioscoridi	462.1.36	Cordi errata	46.2.58. & 343.2.17. & 538.2.62
elinopodij consideratio	462.1.55	Coriandrum Dioscoridi	429.1.58
elinopodij vires ex Galeno	462.1.60	coriandri facultas ex Galeno	429.2.34
Clymenon Dioscoridi	522.1.37	Coriandri feminis vsus	430.2.58
clymenai consideratio	522.1.54	coriandri vires ex Auicenna	430.2.10
Cneori consideratio, & descriptio ex Theo-		coriandri epoti noxa, & curatio Dioscoridi	782.1.38
phraſto	462.5.7	coriandri venefica natura	782.1.55
Cnicus Dioscoridi	654.1.42	coriandri veneni remedia	782.2.10
cnici consideratio	654.2.24	Coria veteramentaria Dioscoridi	230.2.45
cnici vires ex Galeno	654.2.42	coriorum veteramentariorum vires	230.
cniui sylvestris historia ex Theophrasto	460.1.46		
Coagulum Dioscoridi	255.2.10		
coaguli consideratio	255.2.54		
coaguli facultates ex Galeno	256.1.5		
Coccum Gnidium Dioscoridi	649.2.49. & 641.1.23		
coccum infectorium Dioscoridi	543.2.34		
cocci infectorii consideratio	543.2.59		
cocci infectorii vires ex Galeno	544.1.58		
Cochlex Dioscoridi	206.1.55		
cochlearum consideratio	206.2.53		

## Index.

coronopi sylvestris vires	312.1.1	cumini vires ex Galeno	428.2.18
coronopi hortenſis vires ex Galeno	312.2.10	Cunila Dioſcoridi	402.1.12
Corpora iſta fulmine non putrefcunt	19.1.20	Cupreſſus Dioſcoridi	107.1.30
Corrago Apuleio quid	605.1.2	cupreſſi hiſtoria, & conſideratio	107.2.20
Corrua Dioſcoridi	305.2.57	cupreſſus liquidam refinam fundit	108.1.3
Corrices quando ſiccandi, & reponendi	9.2.17	cupreſſus puſilla	108.1.9
Corydalis herba	593.1.30	cupreſſi vires ex Galeno	108.1.26
Cos Naxia Dioſcoridi	751.2.47	Cur pauci, cur multi lapides fiant	661.2.60
Coſtus Dioſcoridi	47.2.30	Curatio virulentorum icturn ſecundum quemdam eremitam	821.2.27
coſti conſideratio	48.1.1	Curmi Dioſcoridi	277.2.24
coſtum quæ ſuppleant coſti vires ex Galeno	48.2.8	curmitis conſideratio	277.2.34
Cor Aphriſi quid	330.2.39	Cyani mentio	29.2
Coronea mala Dioſcoridi	171.2.1	Cyclaminus Dioſcoridi	346.1.1
coroneorum malorum conſideratio	173.2.18	cyclaminus altera Dioſcoridi	346.1.16
coroneorum malorum genera	173.2.20	cyclamini vtriuſque conſideratio	346.2.36
Coryledon Dioſcoridi	580.2.29. & 580.2.58	cyclamini vires ex Meſue	346.2.58
coryledoni vtriuſque conſideratio	581.1.12	cyclamini vires ex Galeno	347.1.13
Cratægonum D'ſcoridi	486.1.44	cyclamini noxa, & curatio	802.1.10
Cratægoni conſideratio	486.2.1	Cynocrambe Dioſcoridi	655.2.58
Creſpi forma, & vires	134.2.3	cynocrambes conſideratio	656.1.20
Crimmon Dioſcoridi	178.2.30	Cynogloſſon Dioſcoridi	606.1.36
crimmi conſideratio	278.2.36	cynogloſſi conſideratio	606.1.45
Crithmum, ſeu crithamon Dioſcoridi	310.1.45	Cynorhorchi Dioſcoridi	487.1.47
crithmi conſideratio	310.2.46	Cypariſſas tithymalus Dioſcoridi	634.2.9
crithmi vires ex Galeno	311.1.24	Cyperus Dioſcoridi	26.2.12
Crocodili animalis hiſtoria	246.2.26	cyperii conſideratio, & genera	27.1.1
crocodilj animalis genera, & vires	247.1.10	cyperii apud a bor	27.1.36
Crocodilion Dioſcoridi	383.2.24	cyperii vires ex Galeno	27.2.18
Crocodilij conſideratio	383.2.38	Cyphi compoſitio Dioſcoridi	602.60
crocodilij vires ex Galeno	384.1.9	cyphi caput in Dioſcoride adſcriptum	611.25
Crocomagma Dioſcoridi	61.2.44	Cytinus Dioſcoridi	166.2.50
Crocum Dioſcoridi	61.1.40	cytini conſideratio	166.2.50
croci conſideratio	62.1.4	Cyrtus Dioſcoridi	594.2.47
crocum optimū mittit Vienna Auftria	62.1.16	cyrti conſideratio	595.1.1
croci vires ex Galeno	62.1.24	cyrtiſ furex eſt, non herba	595.1.40
crocum Saracenicum	654.2.23	cyrtiſ hiſtoria ex Columella	595.2.19
Croton Dioſcoridi	631.2.60	cyrtiſ hiſtoria ex Plinio	596.1.1
Cruciatæ conſideratio	374.1.14	cyrtiſ vires ex Galeno	596.2.10
cruciatæ vires	374.2.2		
Cryſtalli hiſtoria	749.1.8	D	
cryſtalli vires	749.1.57	DANASCENA pruna Dioſcoridi	181.
Cubebærum conſideratio	37.2.37	damaſcinum Dioſcoridi	506.2.32
eubebærum vires	37.2.43	Daphnoides Dioſcoridi	616.1.30
Eucumis ſitiuus Dioſcoridi	318.1.18	daphnoidis conſideratio	616.2.33
eucumeris conſideratio	318.1.48	daphnoidis vires ex Galeno	617.1.10
eucumeris vires ex Galeno	319.2.40	Daucum Dioſcoridi	438.2.24
Eucumis ſylveſtris Dioſcoridi	622.1.1	dauci conſideratio	438.2.3
eucumeris ſylveſtris conſideratio	613.1.16	daucum à ſylveſtri paſſinacea diſſerre	438.2.58
eucumeris ſylveſtris vires ex Galeno	623.2.45	dauci vires ex Galeno	439.1.50
Eucurbita Dioſcoridi	316.1.58	Delphinium Dioſcoridi	439.2.23
eucurbitæ conſideratio	317.1.5	delphiniij conſideratio	439.2.47
eucurbitarum varia genera	317.1.42	Dendroides tithymalus Dioſcoridi	634.2.18
eucurbitæ facultates ex Galeno	317.1.60	Deuteria Dioſcoridi	673.2.4
eucurbita ſylveſtris	649.2.18	Diapenſia	540.1.63
Eula quæ plantæ ament	12.1.10	Dictamnium Dioſcoridi	405.1.40
Euminum ſtrium Dioſcoridi	427.1.27	dictamnium Cretenſe	405.2.18
eumini ſatii conſideratio	428.1.22	dictamni conſideratio	406.1.9
euminum ſylveſtre Dioſcoridi	427.2.50	dictamnium caulem , florem , & fructum ſerre	406.2.1
euminum ſylveſtre alterū Dioſcoridi	428.1.10		
eumini ſylveſtris examinatio	428.1.23		

# Index.

Ditamnii albi consideratio	117.1.37. & 406.
2.38	
Ditamnii albi vires	117.2.43
Difficile vnum vni veneno proprium inuenire	
signum Dioscoridi	758.1.29
Dioscorides in simplicium medicamentorum	
materia primas tenet	6.2.58
Dioscorides à Galeno maximè commenda-	
tus	6.2.34
Dioscorides à calumnia defenditur	10.1.25
Dioscoridi varia simplicium nomina aduul-	
terina	10.2.10
Dioscoridis lectio in agallocho restituta	57.
2.25	
Dioscoridis lectio in lentiscino oleo deprava-	
ta	69.2.50
Dioscoridis lectio in thure tribus in locis ca-	
stigata & deinde	99.1.9
Dioscoridis lectio in pice restituta	103.2.56
Dioscoridis lectio quibusdam codicibus in me-	
spilo depravata	178.2.32
Dioscoridis locus in thlaspi restitutus	338.2.30
Dioscoridis lectio in moly restituta	421.1.9
Dioscoridis lectio in oreoselino restituta	433.
2.59	
Dioscoridis locus in asclepiade restitutus	
458.2.56	
Dioscoridis codex in leucade diuinitus	464.
2.7	
Dioscoridis locus in leucoio suspectus	485.2.46
Dioscoridis locus in aconito suspectus	566.2.5
Dioscoridis locus in squama stomomati de-	
prauatus	695.1.34
Dioscoridis locus in aleyonio suspectus	736.
2.63	
Dioscoridis locus in Brassica suspectus	303.
2.63	
Dioscoridis lectio castigata in lacte intus coa-	
gulato	796.1.31
diphyrges Dioscoridi	723.1.45
diphyrgis consideratio	723.2.28
Diphyrgis historia, & vires ex Galeno	723.2.40
Dipsacum Dioscoridi	384.1.25
dipsaci consideratio	384.2.3
Dipsaci vermiculus	384.2.28
Dipsaci vires ex Galeno	385.1.3
Dipsadis morsus notæ, & remedia Dioscori-	
dis	832.1.55
Dipsadis historia, morsus signa, & curatio	
833.2.4	
Domestica nobis noxia Dioscoridi	804.1.1
domesticarum rerum noxa	804.1.25
Domesticarum rerum noxæ remedia	804.
1.53	
Dofella quid	598.2.40
Doronic consideratio	328.2.6
Doryenion Dioscoridi	562.1.58
doryenij consideratio	562.2.19
doryenij vires ex Galeno	562.2.30
doryenij sumpti noxa, & remedia Diosco-	
ridi	780.1.34
doryenij veneni consideratio	780.1.58

Draba Dioscoridi	338.1.16
drabæ consideratio	339.1.39
draco marinus Dioscoridi	212.1.34
draconis marini consideratio	212.2.1
draconis marini ictus notæ, & remedia Dio-	
scoridi	826.1.40
dracunculus maior Dioscoridi	347.1.40
dracunculus minor Dioscoridi	348.1.1
dracunculorum consideratio	348.2.4
dracunculi species plures	348.2.47
dracunculi vires ex Galeno	349.1.20
dracunculus hortenfis	349.2.4
dracunculi seminis noxa, & auxilia	781.2.63
dryini ictus notæ, & remedia Dioscoridi	
831.2.35	
dryini historia, & eius ictus signa	831.2.49
dryini morbus curatio	832.1.25
dryopteris Dioscoridi	555.2.58.
dryopteridis consideratio	654.1.9
dryopteridis vires ex Galeno	654.1.32
dulcis radix Dioscoridi	377.2.43
dulcis radicis consideratio	378.1.20
dulcis radicis vires ex Galeno	378.2.11

## E

<b>E</b> BENVS Dioscoridi	141.1.54
Ebeni consideratio	141.2.33
ebeni genera duo	141.2.37
ebeni vires ex Galeno	142.1.22
Ebulum Dioscoridi	642.2.50
ebuli, & sambuci genera, & vires	642.1.33
ebuli vires ex Galeno	642.2.48
Ebur Dioscoridi	236.2.55
eboris consideratio	236.2.58
eboris vires	236.2.60
Echinus marinus Dioscoridi	198.1.50
echini marini consideratio, & historia	198.
1.60.	
echinometra	198.2.65
echinorum vires ex Galeno	199.1.51
Echinus terrestris Dioscoridi	199.2.18
echini terrestris consideratio	199.2.31
echini terrestris facultas	199.2.54
Echion Dioscoridi	530.2.42
echij consideratio	531.1.25
echij vires ex Paulo	531.2.7
Elaphoboston Dioscoridi	437.1.10
elaphoboston consideratio	437.1.40
elaphoboston vires ex Galeno	437.2.18
Elaterion Dioscoridi	621.1.50
elaterij vires ex Mesue	623.2.1
elaterij noxa, & remedia Dioscoridi	801.1.40
elaterij noxa & curatio	802.1.10
Elatine Dioscoridi	537.2.4
elatinis consideratio	537.2.30
Electarij in cura cantharidū descriptio	777.1.1
Electrum Dioscoridi	118.1.50
Elæomeli Dioscoridi	65.2.22
Elæomelitis consideratio	65.2.43
Elelispacos Dioscoridi	407.1.37
Eleoselinum Dioscoridi	432.2.27
Eleose	

# Index.

eleofelini consideratio 433.2.42  
 Elephantorum historia 236.2.58  
 Elichryson Dioscoridi 548.1.58  
 elichrysi consideratio 548.2.36  
 elichrysi vires ex Galeno 549.1.3  
 Elleborine Dioscoridi 592.1.19  
 elleborines consideratio 592.1.23  
 Elleborum album Dioscoridi 617.1.35  
 elleborum nigrum Dioscoridi 618.1.1  
 ellebori vtriusque consideratio 618.2.12  
 ellebori vtriusque vires ex Mesue 610.2.46  
 ellebori vtriusque vires ex Galeno 621.1.33  
 ellebori albi noxa, & remedia Dioscoridi 801.1.40  
 ellebori albi noxa, & curatio 802.1.10  
 ellebori nigri noxa, & cura 802.1.43  
 Empetron Dioscoridi 648.1.18  
 empetri consideratio 648.1.27  
 empetri vires ex Galeno 648.1.50  
 Encelij opinio vana 267.1.23  
 Ephemeron Dioscoridi 575.2.54  
 ephemer, & colchici consideratio 576.1.6  
 ephemer, & colchici vires ex Gal. 577.1.59  
 ephemer colchici noxa, & remedium Dioscoridi 779.1.35  
 ephemer colchici venenum, & curatio 779.2.8  
 Epimedium Dioscoridi 527.1.8  
 epimedij consideratio 527.1.24  
 epimedij vires ex Galeno 527.1.60  
 Epipactis Dioscoridi 192.1.16  
 epipactidis consideratio 192.1.23  
 Epithymum Dioscoridi 644.2.26  
 epithymi consideratio 644.2.40  
 epithymi disputatio 645.1.19  
 epithymum ubi plurimum 646.1.9  
 epithymi vires ex Mesue, & Galeno 646.2.33  
 Equisetum maius Dioscoridi 552.2.38  
 equisetum minus Dioscoridi 543.1.1  
 equiseti vtriusque consideratio 543.1.31  
 equiseti vtriusque vires ex Galeno 543.2.4  
 Equorum lichenes Dioscoridi 230.2.10  
 Eretria terra Dioscoridi 752.1.30  
 Erica Dioscoridi 118.1.25  
 ericæ consideratio 118.1.29  
 ericæ facultas ex Galeno 128.2.46  
 Erigeron Dioscoridi 584.2.24  
 erigerontis consideratio 584.2.58  
 erigerontis vires ex Galeno 585.1.9  
 Erinus Dioscoridi 532.1.20  
 erini consideratio 532.1.44  
 erini vires ex Galeno 532.2.10  
 Eruca Dioscoridi 324.1.10  
 erucæ consideratio, & vires 324.1.48  
 Erucæ olerum Dioscoridi 240.2.36  
 erucarum olerum historia 240.2.40  
 erucarum generatio 241.1.20  
 erucæ quomodo fuguntur ibidem  
 Erucæ pinorum Dioscoridi 241.2.25  
 erucarum pinorum consideratio 242.1.9  
 erucarum pinorum dolores, & remedia Dioscoridi 777.1.25

crucarum pinorum venenum, & curatio 777.1.1  
 Eruum Dioscoridi 291.2.37  
 erui consideratio 291.2.32  
 erui vires ex Galeno 292.1.15  
 Eryngium Dioscoridi 392.2.58  
 eryngium marinum non esse crocodilium 393.1.60  
 eryngium marinum 393.1.50  
 eryngij consideratio 393.1.40  
 eryngij vires ex Galeno 393.2.26  
 Erysimon Dioscoridi 339.1.58  
 erysimi consideratio 339.2.20  
 Erythrodanum Dioscoridi 501.1.46  
 erythrodani consideratio 502.1.1  
 erythrodani vires ex Galeno 502.1.15  
 Eupatorium Dioscoridi 538.1.6  
 eupatorii consideratio 538.1.44  
 eupatorii vires ex Galeno 539.1.10  
 eupatorium Auicennæ quid 538.2.8  
 eupatorium Mesui quid 538.2.12  
 Euphorbium Dioscoridi 452.2.40  
 euphorbij consideratio 453.1.23  
 euphorbium quis primum inuenit 453.1.45  
 euphorbij vires ex Aëtio, & Actuatio 453.1.50  
 euphorbij vires ex Mesue 453.2.8  
 euphorbij vires ex Galeno 453.2.46  
 euphorbij portio noxia, & eius curatio 748.53  
 Euphrasie descriptio, & vires 541.1.10

## F

Faba Dioscoridi 287.1.1  
 Fabarum confid. & vires ex Gal. 287.2.1  
 Faba Aegyptia 288.1.22  
 fabæ Aegyptiæ consideratio 288.2.10  
 Fax Dioscoridi 724.1.52  
 faxis, & tartari dicti consideratio, & vires 724.2.32  
 Fagus Dioscoridi 156.2.16  
 fagi consideratio 157.1.62  
 Farris consideratio 281.1.46  
 farris, & halicæ differentia ibidem  
 Fel Dioscoridi 261.2.28  
 fellis vires ex Galeno 262.1.37  
 fellis bubuli lapis, & eius vires 262.2.4  
 fellis parvi venenum, eiusque remedia 794.1.18  
 fellis viperæ venefica vis, & auxilia 794.1.40  
 fellis canis piscis venenum, & cura 794.2.1  
 Felis, eiusque cerebri maleficium, & remedia 794.2.8  
 ferri rubigo Dioscoridi 697.1.35  
 ferri rubiginis consideratio 697.1.57  
 Ferri stercore Dioscoridi 397.1.53  
 ferri stercoreis consideratio 697.2.3  
 ferri scobis noxa, & curatio 797.1.10  
 ferri squamæ noxa, & curatio ibidem  
 ferri recrementum noxa, & cura ibidem  
 Ferula Dioscoridi 445.1.10  
 ferulæ consideratio 445.2.38  
 ferulæ & ferulaginis historia ex Theophrasti, 445.2.50

ferulæ;

# Index

Ferulæ vires ex Galeno	446.1.31	44.1.54. & 47.1.7. & 49.2.1. & 50.2.55. & 53.2.5. & 57.1.40. & 58.1.53. & 60.1.54. & 82.1.12. & 88.1.4. & 89.1.60. & 98.2.27. & 105.1.47. & 113.2.58. & 139.2.53. & 147.2.30. & 161.2.45. & 183.1.15. & 189.2.25. & 205.1.61. & 246.1.55. & 269.1.16. & 270.2.55. & 284.1.16. & 291.2.37. & 293.2.51. & 294.1.57. & 319.2.30. & 343.2.69. & 345.2.47. & 358.2.54. & 364.1.50. & 368.1.36. & 377.1.22. & 385.2.13. & 397.2.48. & 419.2.37. & 434.2.9. & 445.1.48. & 459.2.44. & 461.1.49. & 470.1.1. & 477.2.44. & 489.1.10. & 490.1.30. & 492.1.10. & 496.1.1. & 517.1.54. & 518.1.58. & 534.2.58. & 539.1.10. & 543.1.61. & 550.1.27. & 561.1.44. & 567.1.40. & 567.2.23. & 576.2.53. & 577.1.13. & 581.1.46. & 583.2.25. & 589.1.50. & 591.2.4. & 591.2.59. & 605.2.45. & 608.2.1. & 636.2.50. & 650.2.40. & 726.1.15. & 732.1.28. & 741.1.26. & 743.2.49. & 747.1.20	
Ferulæ ubi maximæ	446.1.26	Fucus marinus Dioscoridi	585.2.55
Ferula tañta murgæa cõfẽstium moritur	446.1.27	Fuci marini confideratio	586.1.13
Fiber Dioscoridi	220.2.54	Fuci marini vires ex Galeno	586.1.53
Fibrini testes Dioscoridi	220.2.57	Fuligo è myrrha, resina, styrace Dioscoridi	86.1.39
Fibri confideratio	221.1.47	Fuligo liquidæ picis Dioscoridi	102.2.30
Fibros sibi testes amputare, vanum	221.2.13	Fuligo pictoria Dioscoridi	754.2.1
Fibri testium adulteratio	221.2.22	Fuligo thuris Dioscoridi	86.1.5
Fibri testium vires ex Galeno	221.2.50	Fuliginum omnium vires	103.2.20
Ficus Cypria	192.2.10	Fumaria Dioscoridi	592.1.50
Fici Dioscoridi	192.2.44	Fumariz confideratio	592.2.50
Ficorum confideratio	194.1.7	Fumariz alterum genus	578.2.40
Ficorum facultates ex Galeno	194.1.20	Fumariz genera ex Plinio	592.2.65
Ficus agrestis	195.1.7	Fumariz vires ex Mesue	593.1.34
Fici præcoces	195.1.14	Fumariz facultates ex Galeno	593.2.12
Ficus cinis Dioscoridi	193.2.33	Fungi Dioscoridi	573.2.11
Fidicula Theodoro	609.2.15	Fungorum confideratio, & genera	573.2.18
Filicula Dioscoridi	652.2.60	Fungorum alia genera	574.1.46
Filicula confideratio	653.1.32	Fungi lucernarum	574.2.13
Filipendula, & eius vires	483.1.33	Fungi corporis affectus	574.2.57
Filix mas Dioscoridi	651.2.24	Fungorum vires est Galeno	574.2.63
Filix femina Dioscoridi	651.2.55	Fungorum stragulaus, & remedia Dioscoridi	792.1.43
Filicis vtriusque historia	652.1.28	Fungorum venefica natura	792.1.55
Filicis vtriusque vires ex Galeno	652.2.42	Fungorum preparatio	792.2.14
Fimium Dioscoridi	262.1.60	Fungorum veneni remedia	792.2.45
Fimi vires, vide Stercoris vires			
Flammulæ historia, & vires	517.2.3		
Flammulæ noxa, & curatio	781.2.4		
Flores quo tempore decerpendi, ac recondendi	9.1.5		
Flores sicci quandiu durent	9.1.22		
Florum in plantis varietas	16.2.25		
Flos æris Dioscoridi	692.2.40		
Floris æris historia	693.1.14		
Floris æris vires ex Galeno	693.1.31		
Flos falsi Dioscoridi	730.2.45		
Flos punice Dioscoridi	166.1.29		
Flos sylvestris punice Dioscoridi	166.1.48		
Fluminibus quæ plâtes adnasci gaudeant	11.1.64		
Foeniculum Dioscoridi	437.2.25		
Foeniculum erraticum Dioscoridi	437.2.56		
Foeniculi vtriusque confideratio	438.1.29		
Foeniculi vires ex Gal.	438.1.57		
Foenum græcum Dioscoridi	285.1.12		
Foeni græci confid. & vires ex Galeno	285.1.52		
Foliorum in plantis varietas	5.2.23		
Foliorum in plantis comparatio, & similitudo inter se	13.2.41		
Foliorum in coloribus discrimen	14.2.48		
Fomes ignis ex tussilagine	475.2.57		
Fontium in quibus quæ plantæ proueniunt	11.2.50		
Fossilium facultates	665.2.34		
Fragariæ, & fragorum confid. & vires	540.2.35		
Fraxinus Dioscoridi	116.2.45		
Fraxini species	117.2.25		
Fraxini confideratio, & historia	117.1.25		
Fraxinæ vires ex Plinio	117.2.29		
Fructus quando decerpendi, & quomodo conseruandi	9.1.50		
Frutices	10.2.43		
Euchij errores, eiusque sententiæ reprobatæ	24.2.38. & 28.1.59. & 33.2.24. & 38.2.25. & 44.1.54. & 47.1.7. & 49.2.1. & 50.2.55. & 53.2.5. & 57.1.40. & 58.1.53. & 60.1.54. & 82.1.12. & 88.1.4. & 89.1.60. & 98.2.27. & 105.1.47. & 113.2.58. & 139.2.53. & 147.2.30. & 161.2.45. & 183.1.15. & 189.2.25. & 205.1.61. & 246.1.55. & 269.1.16. & 270.2.55. & 284.1.16. & 291.2.37. & 293.2.51. & 294.1.57. & 319.2.30. & 343.2.69. & 345.2.47. & 358.2.54. & 364.1.50. & 368.1.36. & 377.1.22. & 385.2.13. & 397.2.48. & 419.2.37. & 434.2.9. & 445.1.48. & 459.2.44. & 461.1.49. & 470.1.1. & 477.2.44. & 489.1.10. & 490.1.30. & 492.1.10. & 496.1.1. & 517.1.54. & 518.1.58. & 534.2.58. & 539.1.10. & 543.1.61. & 550.1.27. & 561.1.44. & 567.1.40. & 567.2.23. & 576.2.53. & 577.1.13. & 581.1.46. & 583.2.25. & 589.1.50. & 591.2.4. & 591.2.59. & 605.2.45. & 608.2.1. & 636.2.50. & 650.2.40. & 726.1.15. & 732.1.28. & 741.1.26. & 743.2.49. & 747.1.20		

## G

GAGATES lapis Dioscoridi	743.2.15
Gagaræ lapidis confideratio	743.2.44
Gagaræ lapidis historia, & vires ex Galeno	744.1.21
Galaçites lapis Dioscoridi	745.2.60
Galaçitæ lapidis historia	746.1.18
Galangæ confideratio, & genera	25.2.10
Galangæ vires	25.2.30
Galaxias lapis Dioscoridi	746.1.48
Galbanum Dioscoridi	454.1.1
Galbani confideratio. 454.1.49 eius vires ex Galeno	454.2.5
Galega quid, & eius vires	420.1.56
Galenæ nauigationes	3.2.1
	Galepi



# Index

Galeni lectio in thure rescriptura	87.1.19	Glandes Dioscoridi	156.1.16
Galeni in prunis defensio contra Brasauolum	182.1.25	Glandiferarum arborum consideratio	156.1.52
Galeni de pisciorum viribus opinio ab Auienna reprobata	187.1.13	Glandiferarum arborum vires ex Gal.	158.1.60
Galeni, & Dioscoridis in Seriphio, & Santonico absinthio sententia varia	398.2.13	Glans vnguentaria Dioscoridi	627.2.20. eius consideratio. 627.2.54
Galenus in coriandro à Dioscoride differtit	429.2.32	Glandis vnguentariae vires ex Mesue	628.2.25
Galeni locus suspectus de aspleno	494.1.48	Glandis vnguentariae vires ex Galeno	628.2.60
Galenus notatur in argento viuo	713.1.60	Glastrum satium Dioscoridi	365.2.1
Galeni sententia de trifolio asphaltite damna- ta	472.2.37	Glastrum syluestre Dioscoridi	365.2.13
Galeni liber de theriaca ad Pisonem suspen- sus	473.2.8	Glastrum vtriusque consideratio	365.2.30. & vires ex Galeno 365.2.42
Galerita Dioscoridi	235.2.58	Glaucium Dioscoridi	455.2.45
Galeritæ consideratio	236.1.13	Glaucii consideratio. 455.2.58. eius vires ex Galeno	456.1.25
Galion Dioscoridi	584.1.32	Glaux Dioscoridi	612.1.1
Galii consideratio. 584.1.60 eius vires ex Ga- leno	584.2.9	Glaucis consideratio. 612.1.17. & vires ex Ga- leno	612.2.3
Galiopsis Dioscoridi	583.1.30	Gleucinum Dioscoridi	75.2.39
Galiopsos consideratio	583.1.58	Gleucini consideratio	75.2.47
Galla Dioscoridi	159.2.8	Glirium-historia, & vires	248.2.54
Gallarum consideratio	159.2.55. & vires ex Galeno	Gluten piscium Dioscoridi	456.1.50
Galla omphacitis	159.2.61	Glutinum Dioscoridi	456.1.36
Gallarum prælagium	160.1.61	Glutinis consideratio, & vires	456.1.63
Galli, & gallinæ Dioscoridi	231.1.25	Gnaphalium Dioscoridi	481.1.20
Gallorum, & gallinarum consideratio. & vi- res	231.1.56	Gnaphalii consideratio	481.1.28. & vires ex Galeno 481.2.40
Gallitricum quid	407.2.37	Gnidium granum Dioscoridi	640.2.49
Gammatorum lapilli	209.1.51	Gnidium oleum	68.1.22
Garum Dioscoridi	227.1.20	Gobius Dioscoridi	225.2.15
Gari consideratio	227.2.42	Gobiorum consideratio	225.2.50
Gattaria herba	410.2.47	Gobij facultas ex Galeno	226.1.2
Genistæ consideratio	627.1.7	Gobij fluuiales	226.1.10
Genistæ historia, & vires	627.1.23	Gossypij consideratio	481.2.6
Genitale cerui Dioscoridi	230.1.15	Gramen Dioscoridi	532.2.20
Genitalis cerui consideratio	230.1.19	Gramen arundinaceum Dioscoridi	532.2.47
Gentes tutæ a serpentibus eorumque ictibus medentes	820.1.56	Gramen Parnasi Dioscoridi	532.2.50
Gentiana Dioscoridi	373.1.34	Graminis confid. & historia ex Plinio	533.1.10
Gentianæ consideratio. 373.2.48. eius vires ex Galeno	373.2.58	Graminis vires ex Galeno	533.2.5
Gentiana minor	374.1.18	Grandinis impetum quæ arceant	19.2.8
Geodes lapis Dioscoridi	751.2.58	Gratiolæ historia, & vires	401.2.26
Geodæ lapidis consideratio	752.1.1	Grossi Dioscoridi	193.2.13
Georgij agricolæ lapsus	249.1.27	Guaiaci ligni consideratio	142.1.30
Geranium Dioscoridi	479.1.55	Guaiaci genera tria	142.1.43
Geranii consideratio	479.2.58	Guaiaci cortices	143.1.30
Gesneri lapsus	566.2.25. & 596.1.37	Guaiaci plâta 143.1.50 eius facultates	143.1.58
Gingiber Dioscoridi	342.1.50	Guaiacium lignum præstantius	142.2.15
Gingiberis consideratio, & historia	342.2.20	Gummi amygdalæ Dioscoridi	185.2.43
Gingiberis vires ex Galeno	343.1.1	Gummi cerasi Dioscoridi	169.1.36
Gingidion Dioscoridi	322.1.18	Gummi elemi facult. & consideratio	166.2.56
Gingidij considerat. 322.1.30. & vires ex Ga- leno	322.1.55	Gypsum Dioscoridi	735.1.58
Gith Dioscoridi	447.1.60	Gypsi confid. 735.1.1. & vires ex Gal.	735.2.18
Gith consideratio	448.1.30	Gypsi strangulatus remedia Dioscoridi	793.1.1
Gladolus Dioscoridi	527.2.10	Gypsi veneficium, eiusque curatio	793.1.23
Gladoli consideratio. 527.2.54. eius vires ex Galeno	528.1.18		

H

**H**ÆMATITES lapis Dioscoridi 742.1.8  
 Hæmatitæ lapidis consideratio 742.1.55  
 Hæmatitæ lapidis vires ex Galeno 742.2.16  
 Hæmatitæ lapidis vires ex Alexandro 742.2.47  
 Hæmorrhoi ictus notæ, & curatio Dioscoridi  
 832.1.55  
 Hæmorrhoi perniciosus ictus, & historia 832.  
 2.50

Hæmorrh

# Index.

Hæmorrhoi morfus notæ, & remedia	833.1.36	Hermolai lapsus, & opiniones improbatæ	31.1.5. & 37.1.56. & 65.2.47. & 78.1.60. & 97.2.47. & 197.1.12. & 327.1.13. & 339.2.55. & 356.1.20. & 460.1.42. & 480.2.15
Halica Dioscoridi	180.2.18	Hermolai à calumnia vindicatur	565.1.10
halicæ confid. 280.2.40. & vires ex Galeno	281.1.26	Hieracium magnum Dioscoridi	431.1.46
halicæ & farris differentia	281.1.48	hieracium paruum Dioscoridi	431.2.45
Halitacabum solanum Dioscoridi	560.1.1	hieracii vtriusq; consideratio & vires ex Plinio	431.2.50
Halimus Dioscoridi	130.1.30	Hieropili lapsus	618.1.57
halimi consideratio	130.1.51	Hiericuntam non esse Amomum	46.1.50
halimus Mauritanis molochia	130.2.8	hiericuntæ vires	39.1.54
halimi vires ex Galeno	130.2.37	Hippocampus Dioscoridi	100.1.23
Handachocha Arabicis quid	597.1.10	hippocampi consideratio	200.1.60
Harundo Dioscoridi	125.1.1	hippocampi vires ex Galeno	201.1.43
harundinum consideratio	125.1.45	hippocampi vires ex Aeliano	201.1.55
harundinum genera plura	125.1.48	Hippoglosson Dioscoridi	606.1.50
harundinis, & filicis odium	125.2.27	hippoglossi consideratio	606.1.60
harundinis vires ex Galeno	125.2.42	hippoglossi consideratio	606.1.22
Hastula regia Dioscoridi	351.1.1	Hippolapathon Dioscoridi	297.1.52
hastula tegiæ consideratio, vide in Asphodelo		hippolapathi consideratio	297.2.52
Hedera Dioscoridi	361.1.34	hippolapathi facultates	297.2.60
hederae consideratio, & genera	361.2.58	Hippomarathon Dioscoridi	437.2.60
hederae facultas	362.2.10	hippomarathri descriptio, & vires	438.1.45
Hedychroon Dioscoridi	76.2.20	Hippophaea Dioscoridi	631.1.44
hedychroi compositio ex Galeno	76.2.31	hippophaeis consideratio	631.2.33
Hedysaron, vide Securidaca		Hippophaeston Dioscoridi	631.2.12
Helicycina Dioscoridi	702.1.54	hippophaesti consideratio	631.2.33
Helenium Dioscoridi	61.1.48	Hippopotami testes Dioscoridi	220.2.9
helenij consideratio	61.2.40	hippopotami histioria	220.2.12
helenium alterum Dioscoridi	61.2.24		220.2.40
helenij Aegyptij consideratio	63.1.20	Hipposelinon Dioscoridi	433.1.32
helenij vires ex Galeno	63.1.48	hipposelini consideratio	434.1.35
Helichryson, vide supra in Elichryso		hipposelini vires ex Galeno	434.2.29
Helioscopius tichymalus Dioscoridi	634.1.55	Hirci barbula Dioscoridi	327.1.40
Heliotropium magnum Dioscoridi	656.1.45	hirci barbulae consideratio	327.1.63
heliotropium paruum Dioscoridi	656.2.58	Hirculus Dioscoridi	32.1.58
heliotropij vtriusq; consideratio	657.1.10. & vires.	Hirudinum deuoratarum remedia Dioscoridi	800.2.30.
	657.1.14		
Helleborine vide Elleborine		hirudinum deuoratarum noxa	800.2.47
Helleborum, vide Elleborum		hirudinum deuoratarum curatio	800.2.63
Helxine cissampelos Dioscoridi	537.1.15	Hirundines Dioscoridi	236.1.48
helxines consideratio	537.1.35	hirundinum histioria	236.2.12
helxines vires ex Galeno	537.2.3		236.2.40
Helxines altera Dioscoridi	577.2.30	Historia rustici à serpente hasta transfixo infecti	760.2.10
helxines consideratio	578.1.1. vires ex Galeno	historia rustici factu mortis feræ perempti	761.1.20
	578.1.16		
Hemerocallis Dioscoridi	484.1.55	historia fraudis circumforanei venenum innoxie famere profuturis	770.1.26
hemerocallis consideratio	484.2.23	historia casus ex cicuta sumpta.	783.1.25
hemerocallis vires ex Galeno	485.1.49	Holostium Dioscoridi	520.2.40
Hemionitis Dioscoridi	494.2.20	holostij consideratio	520.2.53
hemionitidis consideratio	494.1.40 & vires ex Galeno		521.1.58
	495.2.20	Hordeum Dioscoridi	276.1.1
Herba mirabilis ad excitandam venerem	489.2.50	hordei consideratio	276.2.1
Herbarum formæ descriptæ parum conferunt ad cognoscenda simplicia	5.1.2	hordei facultas	276.2.31
herbæ quo pacto legendæ, secandæque sint	8.1.60	Horminum Dioscoridi	489.2.45
herbas colligere certis temporibus non est ab re	8.1.24	hormini consideratio	490.1.5
herbæ quæ	10.2.52	horminum cereale	490.2.11
herbæ quæ in alias prosiliunt plantas	12.1.58	Humani stercoreis vires	264.1.50
Herba Paris, & eius histioria, & vires	567.1.44	Hyacinthus Dioscoridi	552.1.27
Hermoadyli coniectura	576.2.21		hyacin

# Index.

hyacinthi consideratio 331.1.55. eius vires ex Galeno	552.2.12
Hydri historia, morbus, & curatio	834.1.49
Hydromeli Dioscoridi	674.2.39
hydromelon Dioscoridi	681.1.58
Hydropiper Dioscoridi	343.2.50
hidropiperis consideratio	344.1.10
hydropiperis vires ex Galeno	344.2.37
Hyoscyaminum Dioscoridi	67.2.25
hyoscyamini olei vires	67.2.58
hyoscyamini parandi ratio	68.1.14
Hyoscyamus Dioscoridi	557.1.30
hyoscyami consideratio 557.2.56. eius vires ex Galeno	558.1.22
hyoscyami noxa, & auxilia	785.2.38
hyoscyami noxia vis	785.2.58
hyoscyami variisq; noxæ curatio	786.1.31
Hypocoon Dioscoridi	555.2.49
hypocoi consideratio	556.2.53
hypocoi vires ex Galeno	557.1.32
Hypericon Dioscoridi	507.2.30
hypericæ consideratio 509.1.8. eius vires ex Galeno	509.2.14
Hypocistis Dioscoridi	439.1.30
hypocistidis consideratio	439.2.30
hypocistidis vires ex Galeno	440.2.8
hypopomum Dioscoridi	400.1.45
hyssopi consideratio 400.2.24. eius vires ex Galeno	401.1.50
hyssopi vires ex Mesue	401.1.53
Hyssicis mentio	200.1.3

## I

<b>I</b> A C E A herba	601.2.30
Iacobi Syrii in acacia opinio improbata 151.1.36	
Iasinum Dioscoridi	78.1.29
iasmini vnguenti consideratio	78.1.43
Iaspis Dioscoridi	749.2.15
iaspidum genera plura, & vires	749.1.30
iaspidum natura	749.2.47
Iaspidis vires ex Galeno	749.2.55
Iberis Dioscoridi 196.1.1. eius consid.	196.1.30
iberis, & lepidium idem	196.1.54
iberis à Damocrate carmine descripta	196.1.58
iberis altera	196.2.56
Ibiscus, vide Althæa	
Ichthyocolla Dioscoridi	456.1.52
Ictum virulentorum communis curatio Dioscoridi	216.2.30
Idæa radix Dioscoridi	541.2.50
idææ radicis consideratio	541.2.58
idææ radicis vires ex Galeno	542.1.5
Iecur apri Dioscoridi	229.1.25
iecur asinum Dioscoridi	229.1.17
iecur canis rabidi Dioscoridi	229.1.29
iecur caprinum Dioscoridi	229.1.19
iecur mergi Dioscoridi	229.1.38
iecurorum diuersorum consideratio	229.1.54
Iesemia vnde dictum	78.2.48
iesemini vires ex Serapione	78.2.58
Ilex Dioscoridi	156.1.37
ilicis consideratio	157.2.26

Imperatoris consideratio 3 historia, & vires 436.2.28	
Impia herba Plinij	481.1.43
Impostores quandoque etiam peritos decipiunt	5.1.35
Indica harundo	126.2.20
Indicum Dioscoridi	709.1.40
indici consideratio	709.2.55
Inrybus Dioscoridi	313.1.20
intybi consideratio	314.1.2
intybi vires ex Galeno	315.1.32
Ioannis de Vigo lapsus	79.1.7
Iouis glandes Dioscoridi	158.2.52
Iriini vnguenti consideratio	76.2.18
Irio Dioscoridi	339.1.58
irionis consideratio	339.2.20
Iris Dioscoridi descripta	21.1.20
iridis consideratio, & genera 21.2.50 eius vires 22.2.47	
Iris cognomine astragalitis	23.1.2
iridis mentio à Galeno	23.1.38
Isoopyron Dioscoridi	600.2.54
isopyri consideratio	601.1.1
Iua muscata	473.2.53
Iudaicus lapis Dioscoridi	747.2.29
Iudaici lapidis vires ex Galeno	747.2.35
Iuglandes nuxes	187.2.1
iuglandium consideratio	187.2.55
iuglandium vires ex Galeno	188.1.6
Iuglandes conditæ	188.1.50
Iuuenis Dioscoridi	546.1.23
iunci consideratio, & vires 546.1.58. & deinde	
Iuncus odoratus Dioscoridi	48.2.35
iunci odorati consideratio	49.1.1
iunci odorati vires ex Galeno	49.2.43
Iuniperus Dioscoridi	108.1.60
iuniperi consideratio	108.2.39
iuniperi caput in Dioscoride deprauatè ibidè	
iuniperi domesticæ	108.2.60
iuniperi gummi 109.1.10. eius vsus	109.1.39
iuniperi vires ex Galeno	109.2.10
Ius galli veteris Dioscoridi	231.1.41
Ius piscium Dioscoridi	217.1.30
Ixia Dioscoridi	381.1.32
ixiani nigri chamæleonis radicibus innasci 382.2.32	
ixia venenum mortiferum	383.2.2
ixiæ venenæ, & remedia Dioscoridi	790.2.35
ixiæ venenæ natura 791.1.1. eius cura. 791.1.18	

## K

<b>K</b> A 1 1 Mauritanorum mentio	301.1.45
Karabe Mauritanorum	120.2.3
Keiri quid	485.2.39
kakis quid	118.2.27
Kerua quid	632.1.48

## L

<b>L</b> A B R V M Veneris Dioscoridi	384.1.25
Labri Veneris consideratio	384.2.2
Labri Veneris vires ex Galeno	385.1.3
Labrusca	

# Index.

**Labrusca Dioscoridi** 666. 2. 35  
**Lactis Dioscoridi** 150. 1. 1  
**lactis consideratio** 351. 2. 32. 330. 2. 1  
**lactis probatio** 159. 2. 66. eius facultas 152. 1. 19  
**lactis bibendi ratio** 152. 1. 36  
**lactis facultates ex Galeno** 153. 2. 44  
**lactis coagulati vires** 152. 1. 47  
**lac humanum Dioscoridi** 150. 2. 40  
**lac schiston Dioscoridi** 150. 1. 32  
**lactis serum Dioscoridi** 150. 1. 32  
**Lactis intus coagulati noxa, & auxilia Diosc.** 795. 2. 8  
**lactis coagulati consideratio** 795. 2. 28  
**lactis in ventriculo coagulati noxa** 795. 2. 54  
**lactis in ventriculo coagulati curatio** 796. 1. 31  
**Lacca, & de ea Arabum opinio varia** 159. 2. 15  
**lacca inferorum est Arabum lacca** 159. 2. 18  
**lacca facilius genera** 160. 1. 39  
**Lacerta Dioscoridi** 145. 1. 33  
**lacertarum consideratio** 145. 2. 13  
**lacertarum Chalcidicarum consideratio** 145. 2. 23  
**Lacrymæ, resinæ, & gummi** 10. 1. 4  
**Lacruca Dioscoridi** 320. 1. 50  
**lacruca sylvestris Dioscoridi** 320. 2. 57  
**lacruce consideratio** 321. 2. 25  
**lacruce sylvestris consideratio** 321. 1. 46  
**lacruce vires ex Galeno** 321. 2. 2  
**Ladanum Dioscoridi** 140. 1. 55  
**ladani consideratio** 140. 2. 49  
**ladani vires ex Galeno** 141. 1. 6  
**Lagopus Dioscoridi** 326. 1. 30  
**lagopi consideratio** 326. 1. 35  
**lagopi vires ex Galeno** 326. 2. 29  
**Lagrimo vulgò quid** 326. 1. 28  
**Lamium herba** 328. 2. 52  
**Lampas Dioscoridi** 328. 1. 35  
**lampasæ consideratio** 328. 1. 48  
**lampasæ vires ex Galeno** 328. 2. 6  
**Lana Dioscoridi** 354. 2. 1  
**Lanaria herba Dioscoridi** 345. 1. 44  
**lanaræ herbe consideratio** 345. 2. 7  
**lanaræ herbe vires ex Galeno** 345. 2. 40  
**Lapathum Dioscoridi** 296. 1. 50  
**lapathi consideratio** 297. 1. 44  
**lapathi vires ex Galeno** 297. 2. 59  
**Lapides cur pauci, cur multi fiant** 661. 2. 60  
**lapidum colores vnde varij** 662. 1. 29  
**lapidum diuersa discrimina** 662. 1. 23  
**Lapis plumbatus** 662. 2. 10  
**lapis plumbarum consideratio** 668. 2. 55  
**Lapis bezahar Arabum** 718. 1. 22  
**lapis bezahar historia, & vires** ibidem  
**lapis in felle bubulo repertus, & eius vires** 161. 2. 4  
**lapis in oculo cernorum natus** 718. 2. 4  
**Larix arbor, & eius historia** 942. 2. 38  
**larix agaricum profert** 95. 2. 36  
**Larigna resina** 95. 2. 10  
**Laser Dioscoridi** 448. 2. 36  
**laseris consideratio** 450. 4. 1  
**laseris vires ex Galeno** 450. 2. 30

**Laserpitium Dioscoridi** 449. 1. 10  
**laserpitij consideratio** 450. 1. 1  
**laserpitij historia ex Theophrasto** 451. 1. 2  
**laserpitij vires ex Galeno** 451. 2. 30  
**Lathyrus Dioscoridi** 637. 1. 30  
**lathyrus consideratio** 637. 2. 15  
**lathyrus vires ex Actuano** 637. 2. 23  
**lathyrus vires ex Galeno** 637. 2. 33  
**lathyrus noxa, & curatio** 802. 2. 10  
**Lauanda vulgò quæ** 312. 2. 30  
**Lauer Dioscoridi** 308. 1. 1  
**laueris consideratio** 308. 1. 39  
**laueris vires ex Galeno** 308. 2. 12  
**Laurus Dioscoridi** 114. 2. 35  
**lauri bacchar Dioscoridi** 114. 2. 38  
**lauri historia** 115. 1. 20  
**laurini olei consideratio** 69. 1. 53  
**laurini olei vires** 69. 1. 60  
**laurus lapidea** 115. 2. 38  
**lauri vires ex Galeno** 115. 2. 50  
**laurus ex se ignem producit** 115. 2. 55  
**laurus Alexandrina Dioscoridi** 615. 1. 50  
**lauri Alexandrinæ consideratio** 615. 2. 1  
**lauri Alexandrinæ vires ex Galeno** 616. 1. 6  
**Leden Dioscoridi** 140. 1. 55  
**Lemnia terra Dioscoridi** 715. 1. 60  
**lemnix terræ consideratio** 715. 2. 15  
**lemnix terræ historia** ibidem  
**lemnix terræ vires** 716. 2. 22  
**lemnix terra quid censetur** 717. 1. 24  
**lemnix terræ adulteranda fraudetesta** 717. 2. 60  
**Lens Dioscoridi** 289. 1. 20  
**lentium vires ex Galeno** 289. 2. 25  
**Lens palustris Dioscoridi** 578. 2. 45  
**lensis palustris consideratio** 578. 2. 54  
**lensis palustris vires ex Galeno** 578. 2. 60  
**Lentiscini olei parandratio** 69. 2. 20  
**Lentiscus Dioscoridi** 97. 1. 26  
**lentiscina resina Dioscoridi** 97. 1. 55  
**lentisci consideratio** 97. 2. 10  
**lentisci vires ex Galeno** 98. 1. 8  
**Leonici errata, ac eius opiniones dilute** 312. 2. 46 & 375. 2. 7. & 417. 1. 22. & 470. 1. 1. & 494. 2. 43. & 834. 1. 12  
**Leontopetalon Dioscoridi** 462. 2. 45  
**leontopetali consideratio** 463. 2. 4  
**leontopetali vires ex Galeno** 465. 1. 24  
**Leontopodium Dioscoridi** 605. 1. 220  
**leontopodij consideratio** 606. 1. 33  
**Lepidium Dioscoridi** 355. 2. 27  
**lepidij consideratio** 455. 2. 42  
**lepidium Plinii** 355. 2. 30  
**Leptocarya Dioscoridi** 190. 1. 30  
**Lepus marinus Dioscoridi** 217. 2. 35  
**leporis marini consideratio** 217. 2. 60  
**Leporis marini hausti notæ, & curatio Diosc.** 799. 1. 34  
**leporis marini sumpti indicia** 699. 2. 1  
**eius noxæ remedia** 799. 2. 33  
**Lepus terrestris Dioscoridi** 217. 2. 10  
**leporis**

# Index.

leporis terrestris consideratio 217. 2. 34  
 lepores ubi candidi 217. 2. 48  
 lepores ubi bina habent iecinora 118. 1. 25  
 leporis facultates 218. 1. 40  
 Leporinum coagulum Dioscoridi 255. 2. 12  
 Leucacantha Dioscoridi 390. 2. 40  
 leucacanthæ consideratio 391. 1. 5  
 leucacanthæ vires ex Galeno 391. 2. 32  
 Leucas Dioscoridi 464. 1. 60  
 leucadis consideratio 464. 2. 29  
 Leucodon Dioscoridi 485. 2. 1  
 leucodii consideratio 485. 2. 33  
 leucodii vires ex Galeno 486. 1. 8  
 Libri explodendi 7. 1. 20  
 Lybisticum Galeno ligusticum 423. 1. 60  
 Lichenes equorum Dioscoridi 260. 2. 10  
 lichenum equorum vires 260. 2. 29  
 Lichen Dioscoridi 546. 2. 28  
 lichenis consideratio 546. 2. 50  
 lichenis genera ex Plinio 547. 1. 2  
 lichenis vires ex Galeno 547. 1. 57  
 Lignum aloës 57. 2. 19  
 Lignorum marcor Dioscoridi 124. 2. 2  
 lignorum marcoris vires 124. 2. 50  
 Ligusticum Dioscoridi 423. 1. 10  
 ligustici consideratio 423. 1. 60  
 ligustici, seu libistici vires ex Galeno 423. 2. 18  
 Ligustrum Dioscoridi 423. 2. 30  
 ligustri consideratio 423. 1. 1  
 ligustri vires ex Galeno 423. 2. 16  
 Lilium Dioscoridi 465. 1. 54  
 lilij consideratio 465. 2. 40  
 lilij historia ex Plinio 465. 2. 51  
 Lilia quomodo in totum annum viridia feruntur 466. 1. 36  
 Lilia quomodo diuersis temporibus florent 466. 1. 45  
 Lilia alba quomodo purpurea fiant 466. 1. 19  
 liliorum vires ex Galeno 466. 2. 20  
 Lilium conuallium nescit hemerocallis 484. 2. 51  
 lilij conuallij historia, & vires 385. 1. 10  
 Limonium Dioscoridi 525. 1. 50  
 limonii consideratio 525. 2. 50  
 limonii vires ex Galeno 526. 1. 20  
 Limonia poma 176. 2. 29  
 limoniorum pomorum aqua stillatitia quibus conferat 176. 2. 48  
 Linaria herba 612. 2. 50  
 Lingua ceruina est phyllitis 459. 1. 58  
 lingua ceruina non est hemionitis 470. 1. 3  
 Lingua serpentina 349. 2. 20  
 lingux serpentinæ descriptio, & vires ibidem  
 Linzozosis Dioscoridi 654. 2. 54  
 linzozosis consideratio 655. 1. 29  
 Linum Dioscoridi 285. 2. 5  
 lini consideratio 285. 2. 47  
 lini vires ex Galeno 286. 1. 23  
 lini feminis oleum, & eius vires 285. 2. 52  
 Lithargyros Dioscoridi 703. 1. 25  
 lithargyri consideratio 704. 1. 44  
 lithargyri vires ex Galeno 704. 2. 25  
 Lithocolla Dioscoridi 751. 1. 23

Lithospermon Dioscoridi 500. 1. 30  
 lithospermi consideratio 500. 2. 30  
 lithospermi historia ex Plinio 501. 1. 13  
 Lixiuji saponis noxa, & curatio 798. 2. 47  
 Locustæ Dioscoridi 234. 1. 55  
 locustarum consideratio 234. 2. 25  
 locustarum ingens numerus quando Italiani inuasi 235. 1. 1  
 locustæ in cibis 235. 1. 6  
 Lolium Dioscoridi 283. 2. 40  
 lolij consideratio 284. 1. 6  
 lolij vires ex Galeno 284. 1. 49  
 Lonchitis Dioscoridi 502. 1. 35  
 lonchitis altera Dioscoridi 502. 2. 1  
 lonchitis consideratio 502. 2. 12  
 lonchitis vires ex Galeno 502. 2. 30  
 Loniceri lapsus, vide Adami Loniceri errata  
 Lora Dioscoridi 673. 2. 1  
 Lorz parandæ ratio ex Galeno 673. 2. 32  
 Lotus arbor Dioscoridi 179. 2. 15  
 loti arboris consideratio 179. 2. 25  
 lotus Italica 180. 1. 12  
 loti arboris vires ex Galeno 180. 1. 54  
 Lotus Aegyptia Dioscoridi 596. 2. 20  
 loti Aegyptiæ historia ex Theophrasto 596. 2. 38  
 loti Aegyptiæ mentio ex Galeno 597. 2. 7  
 Lotus syluestris Dioscoridi 593. 2. 45  
 lotus vrbana Dioscoridi 593. 2. 35  
 loti syluestris, & vrbane consideratio 594. 1. 20  
 loti herbarum vtriusque vires ex Galeno 594. 2. 30  
 Lunaria minor 495. 1. 58  
 lunaria minoris vires 495. 1. 27  
 Lupinus Dioscoridi 292. 1. 45  
 lupinorum consideratio 292. 2. 37  
 lupinorum facultates 292. 2. 45  
 Lupinorum sumum 295. 2. 13  
 Lupus salictarius 614. 1. 49  
 lupuli historia, & vires ex Mesue 614. 1. 52  
 Lychnis coronaria Dioscoridi 464. 1. 40  
 lychnis syluestris Dioscoridi 464. 2. 52  
 lychnidis vtriusque consideratio 465. 1. 1  
 lychnidis facultas ex Galeno 465. 1. 46  
 Lycium Dioscoridi 148. 1. 18  
 lycij consideratio 148. 2. 26  
 lycij vires ex Galeno 149. 1. 5  
 Lycopsis Dioscoridi 630. 1. 52  
 lycopsis consideratio 630. 2. 8  
 lycopsis vires ex Galeno 630. 2. 24  
 Lygos Dioscoridi 151. 2. 28  
 Lyncurium ex vrina lyncis coalescere, vanum putatur 266. 2. 60  
 Lysimachia Dioscoridi 514. 1. 23  
 lysimachiae consideratio 514. 1. 45  
 lysimachiae vires ex Galeno 514. 2. 49

## M

**M**acer Dioscoridi 122. 1. 55  
 Maceris consideratio 122. 2. 5  
 macrem non esse officinarum macem 122. 2. 54  
 maceris facultates ex Galeno 122. 2. 40  
 Macis Arabum consideratio 188. 2. 59  
 Mæne Dioscoridi 225. 1. 35  
 mænarum

# Index.

Marrarum, & smaridum consideratio	225.1.55	Marcelli Secretarii Florentini lapsus, & opinio	
Magnes lapis Dioscoridi	745.1.18	nes reiectæ 78.1.60. & 136.1.48. & 137.1.	
magnetis lapidis historia	745.1.29	44. & 168.1.20. & 175.1.6. & 218.1.50. & 279.	
magnetis lapidis vires ex Galeno	745.2.39	1.7. & 291.1.4. & 400.2.42. & 434.1.43. &	
magnetis venefica vis, & remedia	797.1.56	669.2.25	
Maeduris Dioscoridi	449.1.53	Marcor lignorum Dioscoridi	124.2.2
Mala infana	565.1.13	Margaritarum historia	202.1.22
malorum infanorum vires	565.2.2	margaritarum vires	203.1.7
Mala aurea Italici quæ	565.2.15	Marium, & fluminum litora, quæ plâtes ament	
Malabathrum Dioscoridi	37.2.58	11.2.33	
malabathri consideratio	38.1.35	Marrubium Dioscoridi	468.1.60
malabathri vice quid supponendum	38.2.20	marrubij consideratio	468.2.39
malabathri vires ex Auicenna	38.2.53	marrubij vires ex Galeno	468.2.47
Malicorium Dioscoridi	167.1.1	Marrubium nigrum Dioscoridi	467.1.13
Malua Dioscoridi	299.1.30	marrubij nigri consideratio	467.1.45
malua mixte magnitudinis	299.2.40	Martagon, lilij genus	466.1.51
malua vires ex Galeno	299.2.59	Marum Dioscoridi	415.1.30
Malum Dioscoridi	171.1.1	mari consideratio	415.1.42
malorum consideratio	172.2.44	mari mentio ex Galeno	ibidem
malorum genera plura	ibidem	marum Italiz peregrinum	415.2.33
Mala Armeniaca Dioscoridi	171.2.20	Mastiche Dioscoridi	97.1.57
malum coroneum Dioscoridi	171.2.1	mastiches consideratio	97.3.55
malum dulce Dioscoridi	172.2.7	mastiches vires ex Galeno	98.1.9
malum Medicum Dioscoridi	171.1.40	mastichini parandi ratio, & vires	70.1.12
malorum Medicorum consideratio	171.1.48	Matricariam non esse artemisiz genus	476.2.60
malum orbiculatum, siue Epioticum Diosco-		Matrifylia	522.2.55
ridi	172.2.10	Matthæi Sylvarici errata	304.2.3. & 384.2.58.
malum Persicum Dioscoridi	171.1.20	& 521.2.46. & 526.1.50. & 528.1.62.	
malum Punicum Dioscoridi	155.2.50	Mauritanorum, & sequacium error	576.1.16
mali Punici consideratio	166.1.57	Mauritanorum tutela in Cereulo lapide	708.
mali Punici genera tria	166.2.5	2.30	
mala Punica acris quomodo dulcia fiunt	166.	Meconium Dioscoridi	554.1.10
2.18.		meconij mentio	555.1.4
mala Punica quomodo diutius incorrupta ser-		meconij sumpti noxa & remedia Dioscoridi	
uentur	166.2.31	787.2.8	
Mali punici vires ex Galeno	167.1.17	meconij venefica natura	787.2.48
Manardi Ferrariensis errata, ac eius opiniones		meconij noxæ curatio	788.1.27
confutatae	30.1.1. & 82.1.57. & 269.1.16. &	Medica herba Dioscoridi	330.2.4
270.1.49. & 291.1.25. & 329.2.50. & 356.1.		medicæ herbe consideratio	330.2.20
23. & 416.1.17. & 469.2.60. & 540.1.42. &		Medica mala Dioscoridi	171.1.40
628.1.41. & 590.2.46. & 715.1.22. & 789.1.7.		medicorum malorum consideratio	175.1
Mandragoras Dioscoridi	562.2.40	Medicamenta adulterabantur etiâ Galeni tem-	
Mandragoræ variisq; consideratio	564.1.12	pore	3.2.30
mandragoræ humanam formam referentes fa-		medicamenta simplicia venenis aduersantia	
cticiæ	564.1.30	769.1.55	
mandragoræ vires ex Galeno	565.2.22	medicamenta composita venenis aduersantia	
mandragoræ sumptæ signa, & curatio Diosco-		773.1.1	
ridi	786.1.50	Medicorum error	668.1.50
mandragoræ noxia vis	786.2.10	Medium Dioscoridi	526.2.35
mandragoræ noxæ curatio	786.2.30	medii consideratio	526.2.50
Manna thuris Dioscoridi	85.2.50	medij vires ex Galeno	526.2.59
mannæ thuris consideratio	87.2.14	Medulla Dioscoridi	261.1.5
Mannæ cœlestis historia, & genera	87.2.32	medullæ vires ex Galeno	261.1.32
manna cœlestis Mauritanis duplex	88.1.20	medullæ in cibis facultas	261.2.10
mannæ historia ex Theophrasto, Galeno, &		Mel Dioscoridi	267.2.30
Plinio	88.1.52. & deinde	mellis consideratio	268.1.60
manna in comitatu Goritienfi, & Foro Iulij		Mel Heracleoticum venenosum	243.49
quo tempore abundantissima reperta sit		mellis Heraclei venenâ, & eius remedia Dio-	
88.2.35		scoridi	782.1.14
manna secto fraxini cortice manans	89.1.10	mellis Heracleotici noxa, & curatio	782.1.24
manna cœlestis temperamentum, & vires	89.	mellis genera non rosida	268.2.45
1.42		*** 3	Mel

# Index.

Mel frugum	596.1.54	millepedarum consideratio	128.1.13
Melantheria Dioscoridi	721.1.19	Minium Dioscoridi quid	711.1.33
melantherix consideratio	722.1.19	Misy Dioscoridi	721.1.12
Melanthium Dioscoridi	447.1.60	misfos consideratio	722.1.20
melanthij consideratio	448.1.37	misfos historia, & vires ex Galeno	722.1.20
melanthium sylvestre	448.2.20	Mituli Dioscoridi	103.1.58
melanthij vires ex Galeno	448.2.52	mitulorum consideratio	203.2.30
melanthium oleum	68.1.36	Moly Dioscoridi	420.2.15
Melia terra Dioscoridi	753.2.25	moly consideratio, & historia ex Theophrasto, & Plinio	420.2.30
melix consideratio	636.2.45	moly, seu myles vires ex Galeno	420.2.62
Melice consideratio, & vsus	282.2.7	Molybdæna Dioscoridi	702.1.18
Melilorus Dioscoridi	414.2.20	molybdænx consideratio	702.1.43
meliloti consideratio	414.2.48	molybdænx vires ex Galeno	702.2.29
meliloti vulgaris vsus illegitimus	414.2.53	Molybdoides Dioscoridi	698.2.10
meliloti vires ex Galeno	415.1.5	molybdoidis consideratio	698.2.15
Melimela Dioscoridi	172.2.4	Momordica 480.2.47. & 651.1.8 & 651.2.11	
Melini consideratio	711.2.37	Monachorum, qui Messem commentati sunt, lapsus, atq; opiniones explose	25.2.40. & 28.1.46. & 49.1.52. & 56.52. & 88.2.53. & 123.1.16. & 130.1.3. & 136.1.52. & 161.2.37. & 196.2.48. & 325.1.43. & 382.1.40. & 392.1.33. & 398.1.4. & 411.1.24. & 418.1.52. & 426.2.30. & 428.1.46. & 429.1.38. & 477.2.37. & 489.1.20. & 509.2.5. & 544.1.18. & 577.1.45. & 646.1.50. & 724.1.1.
Melissophyllon Dioscoridi	467.2.12	Montes quæ plantæ ament	11.1.55
melissophylli consideratio	467.2.38	Morochthus lapis Dioscoridi	746.1.45
melissophylli vires ex Arabibus	468.1.9	morochthi lapidis consideratio, & vires ex Galeno	746.2.1
melissophylli facultates ex Galeno	468.1.30	Morsus diaboli descriptio, & vires	360.2.50
Melites lapis Dioscoridi	746.1.10	Morus arbor Dioscoridi	190.2.30
melites lapidis historia	746.1.18	mori arboris consideratio	191.1.20
Melomele Dioscoridi	681.1.49	mori arboris, & fructus vires ex Galeno	191.1.18
Meloeponium consideratio 319.1.49. eorum vires ex Galeno	320.2.5	Moschi odorati historia	56.1.18
Memphites lapis Dioscoridi	749.2.36	moschi odorati vires	56.2.20
memphites lapidis consideratio	748.2.58	Mullus piscis Dioscoridi	219.2.55
Mentha Dioscoridi	408.1.44	mulli piscis Dioscoridi consideratio	220.1.13
menthæ consideratio	408.2.53	mulli piscis facultas ex Galeno	220.1.24
menthæ vires ex Galeno	409.1.9	Mulsium Dioscoridi	674.1.48
mentha sylvestris Galeno calamintha dicitur 409.1.46		Munia sepulcrorum	106.1.30
Mentha Græca	409.1.55	mumix consideratio	105.2.33
menthæ Græcæ vires	409.2.46	mumix vires	106.2.11
Menthastrum Dioscoridi	408.2.48	Muria Dioscoridi	730.2.35
Meon Dioscoridi	25.2.52	Mures Dioscoridi	248.1.60
mei consideratio	26.1.30	murium consideratio	248.2.18
mei vires ex Galeno	26.1.58	murium mirum	248.2.30
Mercurialis Dioscoridi	652.2.52	murium montanorum consideratio	249.1.36
mercurialis consideratio	655.1.29	murium alia genera	249.2.30
mercurialis historia, & vires ex Plinio	655.1.37	Mus araneus Dioscoridi	248.1.16
mercurialis vires ex Galeno	655.2.44	mus aranei consideratio	248.1.32
Mergi iecur Dioscoridi	229.1.38	mus aranei morsus noctæ, & remedia Dioscoridi	767.59
Meluis errata 422.1.56. & 441.1.50		mus aranei morsus signa	817.1.10
Mespilus Dioscoridi	178.1.26	mus aranei morsus curatio	817.1.54
mespilorum consideratio	178.1.44	Muris auricula Dioscoridi	365.1.1
mespilus altera	179.1.13	muris auriculæ consideratio	365.1.38
mespilorum vires ex Galeno	179.1.35	Musæ arboris, & fructus consideratio & historia	164.1.1
Metallorum differentia plures	662.2.11	Muscus Dioscoridi	55.1.10
Metopium vnguentum Dioscoridi	77.1.1		musci
Milium Dioscoridi	281.2.45		
milij vires ex Galeno	282.1.1		
milium Indicum Plinio quid	282.2.28		
milium Solis	500.2.31		
Millefolium Dioscoridi	597.1.34		
millefolij consideratio	597.1.46		
millefolij, seu myriophylli vires ex Galeno	597.2.34		
Millemorbia herba	583.2.9		
Millepedæ Dioscoridi	227.2.50		

# Index.

musci arborei consideratio	55.1.35	nardum Celticum Dioscoridi	32.1.28
musci arborei vires ex Galeno, & aliis	55.2.28	nardi Celtici consideratio	32.2.26
Muscus marinus Dioscoridi	585.1.45.	nardi Celtici vires ex Galeno	33.2.21
musci marini consideratio	585.1.53	Nardus Italica	31.2.26
musci marini vires	585.2.44	nardi Italice vires	31.2.30
Mustella Dioscoridi	222.2.55	Nardum montanum Dioscoridi	33.2.35
mustelle consideratio	223.1.23	nardi montani consideratio	33.2.49
mustelle natura, & vis	223.2.40	nardi montani lectio in Dioscoride depravata	33.2.57
Myagron Dioscoridi	598.2.15	nardi montani vires ex Galeno	34.1.41
myagri consideratio	598.2.26	Nardinum vnguentum Dioscoridi	78.1.1
myagri vires ex Galeno	698.2.45	Nasturtium Dioscoridi	337.5.3
Mye, moly Galeno	420.2.25	nasturtij consideratio	337.2.17
Myrica Dioscoridi	127.1.1	nasturtij vires ex Galeno	337.2.28
myricæ consideratio	127.1.38	Natrix, & eius lectus curatio Dioscoridi	834.1.20
myricæ vires ex Galeno	127.2.30	natrix historia, morsus signa, & remedia	734.1.42
Myrobalanorum Arabicorum genera	619.1.35	Naxius lapis Dioscoridi	751.2.45
myrobalanorum omnium vires ex Mesue	619.2.40	naxij lapidis consideratio	752.1.1
Myrrha Dioscoridi	79.1.15	Nepeta Dioscoridi	410.1.30
myrrha Bœotica Dioscoridi	79.2.38	nepetæ mentio	410.2.30
myrrha consideratio	79.2.46	Nerion Dioscoridi	572.2.45
myrrha officinarum illegitima	79.2.50	nerij consideratio	573.1.10
myrrhæ historia ex Plinio	80.2.10	nerij vires ex Galeno	573.1.44
myrrhæ historia ex Theophrasto	80.2.48	nerij malefica natura	784.1.46
myrrhæ arboris historia	80.2.19	nerij sumpti noxæ curatio	784.2.20
myrrhæ vires ex Galeno	81.1.48	Nitrum Dioscoridi	732.2.50
myrrhæ vice quid supponendum	81.2.7	nitri spuma Dioscoridi	732.2.56
myrrhæ Bœoticæ mentio	81.2.23	nitri, & eius spumæ consideratio	733.1.36
Myrrhis Dioscoridi	597.2.40	nitri, & aprenitri vires ex Galeno	724.1.10
myrrhidis consideratio	598.1.5	Numularia herba	495.2.6
myrrhidis vires ex Galeno	598.2.3	numulariæ vires	ibidem
Myrteum oleum, & eius vires	68.1.48	Nux auellana Dioscoridi	190.1.28
myrtæ olei parandi ratio	68.2.60	nucis auellane consideratio	190.1.56
Myrtidanium Dioscoridi	168.2.25	nucis auellane vires ex Galeno	190.2.12
Myrtidani consideratio	168.2.69	Nux Iadica, & eius historia, & consideratio	188.2.1
Myrtus fatiua Dioscoridi	167.1.40	nucis Indicæ vires	188.2.22
myrti consideratio	168.1.1	nucis Indicæ oleum, & eius vires	188.2.26
myrtus exotica, & Tarentina	168.1.35	Nux Iuglans Dioscoridi	187.2.1
myrti usus	168.1.55	nucum Iuglandium consideratio	187.2.55
myrti vires ex Galeno	169.1.6	nucum Iuglandium vires ex Galeno	188.1.6
Myrtus sylvestris Dioscoridi	614.2.45	Nux metella, & eius historia	189.1.45 & deinde
myrti sylvestris consideratio	615.1.12	nucis metellæ sumptæ noxæ, & eius curatio	689.1.38 & deinde
Myxa, & myxaria quid	182.2.50	Nux myrsitica, & eius historia	188.2.40
myxorum consideratio	ibidem	nucis myrsiticæ vires	189.1.15
N		Nux pinea Dioscoridi	91.1.21
Naphtha Dioscoridi	104.1.16	nucleorum pinorum vires	187.1.40
Naphthæ consideratio	105.2.4	Nux vomica, & eius historia	189.1.45
Napelli consideratio, & historia	567.2.34	Nymphæa Dioscoridi	491.2.10
napelli vis lethalis	567.2.40	nymphæa altera	491.2.50
napelli venenum, eiusq; remedia	790.1.3	nymphææ consideratio	491.1.5
Napus Dioscoridi	294.1.35	nymphææ vires ex Galeno	492.1.47
napi consideratio	294.1.49	O	
Narcaphthon Dioscoridi	58.2.50	Ochra Dioscoridi	769.2.19
narcaphthi consideratio	58.2.57	Ochreæ consideratio	769.2.29
Narcissus Dioscoridi	630.2.20	Ochros legumen	280.2.50
narcissi historia ex Theophrasto	631.1.1	Ocimum Dioscoridi	531.2.20
narcissi vires ex Galeno	631.1.30	ocimastri consideratio	531.2.47
Nardum Indicum Dioscoridi	29.1.15	+ ocimastri	
nardum Syriacum Dioscoridi	ibidem		
nardi Indicæ consideratio	29.2.29		
nardi Syriacæ consideratio	ibidem		
nardi Indicæ vires ex Galeno	32.1.6		



# Index.

ocimastri vires ex Galeno 532. 1. 7  
 Ocimum Dioscoridi 524. 2. 33  
 ocimi consideratio 325. 1. 20  
 ocimi degeneratio. 325. 2. 55  
 ocimi vires ex Galeno 326. 1. 12  
 ocimi ab ocymo differentia 326. 1. 28  
 Oenanthe herba Dioscoridi 482. 2. 50  
 oenantes herbae consideratio 483. 1. 1.  
 Oenanche vitis sylvestris Dioscoridi 669. 1. 15  
 oenantes vitis sylvestris consideratio 669. 1. 50  
 Oesophyllum Dioscoridi 254. 2. 42  
 cefvot mentio 255. 1. 56  
 Officinarum lapsus, & abusus 4. 1. 18. & 46. & 8  
 2. 40. & 70. 1. 12. & 581. 1. 37  
 Olea sylvestris Dioscoridi 153. 2. 30  
 olea sylvestris consideratio 155. 1. 31  
 olea, & quercus odium 155. 2. 26  
 Olea Aethiopicae lacryma Dioscoridi 154. 1. 58  
 olea Aethiopicae lacrymae consideratio 155. 1. 31  
 Olei vires Dioscoridi 63. 2. 18  
 olei consideratio 64. 2. 22  
 olei usus apud veteres qualis 64. 2. 34  
 olei facultates ex Galeno 65. 1. 13  
 olei omnis generis parandi ratio 68. 1. 40  
 Oleum amygdalinum Dioscoridi 66. 1. 50  
 olei amygdalini parandi ratio. 66. 2. 30  
 olei amygdalini vires 67. 1. 12  
 Oleum balaninum Dioscoridi 67. 1. 30  
 olei balanini consideratio 67. 1. 42  
 olei balanini facultates 67. 1. 47  
 Oleum caryinum Dioscoridi 67. 1. 40  
 olei caryini, siue e nucibus Juglandibus 67. 2. 12  
 oleum cicinum Dioscoridi 66. 1. 1  
 olei cicini consideratio 66. 1. 33  
 oleum cicinum Dioscoridi 67. 2. 40  
 olei cicini consideratio 68. 1. 30  
 oleum ex humano stercore 264. 2. 50  
 oleum Gnidinum Dioscoridi 67. 2. 40  
 olei Gnidini consideratio 68. 1. 22  
 Oleum hyoscyaminum Dioscoridi 67. 2. 25  
 olei hyoscyamini vires 67. 2. 57  
 olei hyoscyamini parandi ratio 68. 1. 15  
 Oleum laurinum Dioscoridi 69. 1. 26  
 olei laurini consideratio, & vires 69. 1. 53  
 oleum lentiscinum Dioscoridi 69. 2. 8  
 olei lentiscini parandi ratio, & vires 69. 2. 20  
 Oleum mastichinum Dioscoridi 70. 1. 1  
 olei mastichini parandi ratio 70. 1. 12  
 oleum melanchinum Dioscoridi 67. 2. 50  
 olei melanchini consideratio 68. 1. 36  
 oleum melinum Dioscoridi 172. 1. 52  
 oleum myrteum Dioscoridi 68. 1. 48  
 olei myrti consideratio 68. 2. 19  
 olei myrti parandi ratio 68. 2. 67  
 Oleum ex ovorum luteis 233. 1. 53  
 oleum ex lini semine, & eius vires 285. 2. 52  
 Oleum oenanthinum Dioscoridi 71. 2. 46  
 oleum olivae sylvestris Dioscoridi 63. 2. 56  
 olei olivae sylvestris facultas ex Galeno 65. 1. 54  
 oleum omphacinum Dioscoridi 63. 2. 15

oleum omphacinum quomodo arte parari possit 64. 1. 36  
 oleum picinum Dioscoridi 102. 2. 15  
 Oleum raphaninum Dioscoridi 67. 2. 51  
 olei raphanini consideratio 68. 1. 35  
 Oleum sesaminum Dioscoridi 67. 1. 39  
 olei sesamini consideratio, & vires 67. 2. 4  
 oleum Sicyonum Dioscoridi 64. 1. 40  
 oleum sinapinum Dioscoridi 67. 2. 52  
 olei sinapi consideratio 68. 1. 39  
 oleum styracinum Dioscoridi 82. 1. 32  
 oleum susinum Dioscoridi 73. 1. 60  
 olei susini mentio 74. 1. 30  
 Oleum terebinthinum Dioscoridi 69. 2. 17  
 olei terebinthini consideratio, & vires 69. 2. 42  
 olei nostri de scorpionibus descriptio, & eius vires 772. 2. 50  
 Oliuarum genera plura 155. 1. 57  
 oliuarum vires ex Galeno 156. 1. 13  
 Olera quo pacto ab erucarum iniuria vindicentur 221. 1. 36  
 Olophoenos Dioscoridi 546. 1. 41  
 Olustrum Dioscoridi 433. 1. 1  
 Olyra Dioscoridi 278. 2. 52  
 olyra consideratio 279. 1. 1  
 Omphacium Dioscoridi 669. 2. 60  
 omphacii consideratio 670. 1. 32  
 omphacii vires ex Galeno 670. 1. 51  
 Omphacomeli Dioscoridi 681. 2. 4  
 Onagra Dioscoridi 598. 2. 55  
 onagrae consideratio 599. 1. 5  
 onagrae vires ex Galeno 599. 1. 28  
 Onobrychis Dioscoridi 597. 1. 55  
 onobrychis consideratio 597. 2. 4  
 onobrychis vires ex Galeno 597. 2. 18  
 Ononis Dioscoridi 389. 2. 45  
 ononidis consideratio 390. 1. 14  
 ononidis vires ex Galeno 390. 2. 22  
 Onosma Dioscoridi 491. 1. 24  
 onosmatis consideratio 491. 1. 48  
 onosmatis vires ex Galeno 491. 1. 61  
 Opacis locis quae plantae latentur 11. 1. 1  
 Ophioglossum 349. 2. 20  
 Ophioleoron Dioscoridi 534. 2. 25  
 ophioleoroni consideratio 335. 1. 50  
 Ophites lapis Dioscoridi 750. 2. 10  
 ophites lapidis historia 750. 2. 23  
 ophites marmor 750. 2. 33  
 ophitis descriptio, & vires 621. 1. 50  
 Opium Dioscoridi 553. 2. 6  
 opij 554. 2. 39  
 opium, quo utimur, adulterinum 554. 2. 60  
 opij venefica natura 787. 2. 48  
 opij veneni curatio 788. 1. 27  
 Opobalsami Dioscoridi 51. 2. 2  
 opobalsamivis ex Galeno 53. 1. 35  
 opobalsamum sacitum 53. 2. 32  
 Opocarpasum Galeni quid 775. 1. 23  
 opocarpasi consideratio 785. 1. 1  
 Opuntia Plinii 594. 2. 41  
 Oreoselinum Dioscoridi 432. 1. 40  
 oreosc

# Index.

oreoselinī consideratio.	433.2.60	palma elate Galeno duplex	165.1.6
oreoselinī vires ex Galeno	434.2.25	palmae Indicæ vinum fundentes	164.1.61
Origanum Heracleoticum Diosc.	402.2.10	palmae Thebaica	163.1.4
origanum onitis Dioscoridi	402.2.43	Palmae Christi consideratio	488.2.40
origanum sylvestre Dioscoridi	402.2.49	palmae Christi genera duo	488.2.45
origani historia varia	403.2.48. 374.45	palmae Christi vires	488.2.56
origani Heracleotici, & onitidis consideratio	404.1.37	Panaces Asclepij Dioscoridi	422.1.1
origani sylvestris consideratio	404.1.30	panaces Chironium Dioscoridi	422.1.34
origani vires ex Galeno	404.1.50	panaces Heracleum Dioscoridi	421.1.28
Ornithogalum Dioscoridi	327.2.25	panacis omnis generis consideratio	422.1.43
ornithogali consideratio	327.2.43	panacis cuiusque vires ex Galeno	422.2.25
Orobanchē Dioscoridi	326.2.30	panacis lacrymae facultas ex Mesue	422.2.50
orobanches consideratio	326.2.45	Pancration Dioscoridi	353.1.50
orobanches facultas ex Galeno	327.1.31	panerati consideratio	353.2.10
Oryza Dioscoridi	280.1.50	Panicum Dioscoridi	282.1.34
oryzae consideratio	280.1.58	panici vires ex Galeno	282.1.42
oryzae facultas ex Galeno	280.1.60	Panis optimi conficiendi ratio	275.2.39
Ossifragus Dioscoridi	235.1.40	panis hordeaceus	277.1.26
ossifragi consideratio	235.1.45	panis filiginosus omnium sincerissimus	279.1.40
Ostracites lapidis Dioscoridi	751.1.35	Pannum in larice nascens	95.2.52
ostracitæ lapidis consideratio, & vires	751.1.50	Papaver corniculatum Dioscoridi	555.2.40
Osyris Dioscoridi	612.2.30	papaveris corniculati consideratio	556.1.34
osyridis consideratio	612.2.50	papaveris corniculati vires ex Galeno	556.2.10
osyridis vires ex Galeno	613.2.19	papaveris corniculati noxa, & auxilia Dioscoridi	787.2.40
Oshonna Dioscoridi	364.2.15	Papaver erraticum Dioscoridi	552.2.30
oshonnæ consideratio	364.2.50	papaveris erratici consideratio	554.1.25
Othorum natura Dioscoridi	232.1.5	papaver sativum Dioscoridi	553.1.15
oui candidum Dioscoridi	232.1.15	papaveris sativi consideratio	554.1.50
ouorum consideratio	232.1.48	papaveris lacrymae facultas	554.2.40
ouorum partes, & coctura varia	233.1.7	papaverum vires ex Galeno	555.1.6
ouorum vires ex Galeno	232.2.50	Papaver spumeum Dioscoridi	556.1.18
ouorum lutei oleum	233.1.53	papaveris spumei consideratio	556.1.57
oua testudinum	233.2.23	Papyrus Dioscoridi	126.1.1
Oxalidis Dioscoridi	296.2.30	papyri consideratio	126.1.22
oxalidis consideratio	297.2.44. 271.20	papyri conficiendi ratio	126.1.48
Oxalmæ Dioscoridi	679.1.20	papyri nouum genus	126.2.1
Oxycedri consideratio	113.1.3	papyri vires ex Galeno	126.2.30
Oxylapathum Dioscoridi	296.2.30	Paralios tithymalus Dioscoridi	634.1.42
oxylapathi consideratio	297.1.49	parietaria herba	578.1.2
Oxymel Dioscoridi	678.2.11	Paronychia Dioscoridi	547.2.20
oxymelitis confectio triplex Galeno	678.2.28	paronychiæ consideratio	548.2.28
oxymelyris confectio ex Mesue	678.2.55	paronychiæ vires ex Galeno	548.2.50
Oxys Plinio	471.2.32	Parthenium Dioscoridi	497.1.38
		parthenij consideratio	497.2.9
		Pasum Dioscoridi	670.2.47
		Pastinaca herba Dioscoridi	423.2.26
		pastinacæ herbæ consideratio	423.2.52
		pastinacæ vires ex Galeno	424.1.61
		Pastinaca marina Dioscoridi	218.2.5
		pastinacæ piscis consideratio	218.2.25
		pastinacæ piscis, & eius radij vires	219.1.1
		pastinacæ marinæ ictus noxæ, & eius curatio Dioscoridi	826.1.36
		pastinacæ marinæ ictus signa	826.2.5
		Pastinacæ marinæ ictus remedia	826.2.30
		pauli Iouij errata, ac eius opiniones resutatæ	199.1.6. & 203.2.32. & 224.2.37
		Pecten Veneris	323.2.7
		Pedicularis herba Dioscoridi	624.1.20
		pelecion Dioscoridi	490.2.33
		pelecini consideratio	490.2.56
			peplis

## P

PAEDEROTA, acanthus Diosc.	388.2.42
Pæonia Dioscoridi descripta	499.1.20
pæoniae consideratio	499.2.1
pæoniæ vires ex Galeno	499.2.19
Paliurus Dioscoridi	130.2.55
paliuri consideratio	131.1.10
paliurus diuersi generis apud authores	ibidem
paliuri vires ex Galeno	132.1.31
Palma Dioscoridi	162.2.30
palmae consideratio	163.2.1
palmarum vires ex Galeno	165.1.30
palmarum facultas ex Galeno	165.1.57
Palma elate Dioscoridi	163.2.30
palma elate quæ pars in palma	164.2.61

# Index.

Peplis Dioscoridi	638.1.10	phœnicis consideratio	541.2.29
peplos Dioscoridi	637.2.50	Phrygius lapis Dioscoridi	740.1.12
pepli, & peplidis consideratio	638.1.38	Phrygijs lapidis consideratio	740.1.37
pepli, & peplidis vires ex Galeno	638.1.46	phrigijs lapidis vires ex Galeno	740.1.44
Pepo Dioscoridi	318.2.4	phu Dioscoridi representatum	36.1.23
peppanum, & melopeponum consi.	319.1.50	phu confid. 36.1.50. & vires ex Galeno	36.1.23
peponum vires ex Galeno	318.2.48		
Periclymenon Dioscoridi	522.2.13	Phucus marinus Dioscoridi	585.2.55
periclymeni consideratio	522.2.55	Phyllitis Dioscoridi	469.1.58
periclymeni vires ex Galeno	523.2.12	phyllitidis consideratio	469.2.15
Peristereon, verbenaca Dioscoridi	550.2.40	phyllitidis vires ex Galeno	470.1.16
Persea 3-bor Dioscoridi	195.1.25	Phyllon Dioscoridi	486.2.18
persea arboris consideratio	195.1.52	phylli consideratio	486.2.38
persea arboris mentio, & vires ex Galeno	195.2.23	phylli mentio ex Theophrasto	487.1.14
Persea mala Dioscoridi	171.1.30	Phyteuma Dioscoridi	605.2.57
persicorum malorum consideratio	172.2.43	phyteumatis consideratio	606.1.1
Personata Dioscoridi	591.1.10	Picea arbor Dioscoridi	90.1.30
personata consideratio	591.1.38	piceæ consideratio, & historia	96.1.2
personata vires ex Galeno	591.2.30	Picinum oleum Dioscoridi	102.2.15
Personata, Plinio persolata	591.1.55	pice liquidæ fuligo Dioscoridi	102.2.32
Petasites Dioscoridi	591.2.45	Piceis fuliginis consideratio	103.1.18
petasitis consideratio	591.2.54	Pilosella descriptio, & vires	521.1.13
petasitis vires ex Galeno	592.1.8	Pimpinella genera, & vires	545.1.20
Petri bellonij errata	91.2.7. & 93.1.50 & 96.2.22. & 106.1.52. & 110.2.30. & 113.1.58. & 135.2.13	Pineæ nucleis Dioscoridi	91.1.21
Petri Criniti errata	89.1.36. & 162.1.2	pinæ nucleis	187.1.40
Petrofelinum Dioscoridi	432.2.30	Pinorum erucæ Dioscoridi	241.2.18
Petrofelini consideratio	434.1.29	pinorum erucarum historia	242.1.9
petrofelinæ vires ex Galeno	434.2.25	pinorum erucarum haustiarum notæ, & remedia Dioscoridi	777.1.25
Petimborsa	374.2.16	pinorum erucarum venenum, & curatio	777.2.1
Peucedanum Dioscoridi	446.1.40	Pinus Dioscoridi	90.1.30
peucedani consideratio	446.2.56	pin: historia, & genera	91.1.40
peucedanum officinarum supposititium	447.1.34	Piper Dioscoridi	340.1.20
peucedani vires ex Galeno	447.2.10	piperis consideratio	340.2.27
Phalangium herba Dioscoridi	470.1.25	piperis planta in Italia	341.1.46
phalangij herba consideratio	470.1.49	piperis plantæ varietates	341.1.52
phalangij herba vires ex Galeno	470.2.4	piperis vires ex Galeno	341.1.58
Phalangiorum animalium consideratio, & genera	243.2.51. & 244.2.1	piper Indicum	18.1.60
phalangiorum morsus notæ, & curatio Dioscoridi	822.1.50	Piscium ius Dioscoridi	227.1.30
phalangiorum genera ex Actio	244.2.1. & 822.2.33	Pissaspalthos Dioscoridi	104.1.18
phalangiorum genera, & morsus notæ ex Nicandro	823.1.7	pissaspalthi consideratio	105.1.33
phalangiorum morsus signa, & curatio	823.2.10	Pisselgon Dioscoridi	102.2.18
Phalaris Dioscoridi	500.1.50	Pistacia Dioscoridi	186.2.30
phalaridis consideratio	500.2.39	pistaciorum consideratio	186.1.60
phalaridis vires ex Galeno	501.2.10	pistaciorum vires ex Galeno	187.1.7
Pharicon, & eius veneni notæ, & curatio Dioscoridi	788.1.50	Pistacia sylvestris quid	187.1.29
pharici veneni consideratio	788.2.8	Pitolochia	376.1.18
Phanoli Dioscoridi	290.2.15	Pityusa Dioscoridi	636.1.55
phasolorum consideratio	290.2.36	pityusæ consideratio	636.2.24
Phellodrys arbor quæ	158.1.57	pityusæ vires ex Galeno	637.1.20
Phillyrea Dioscoridi	137.2.40	Pix liquida Dioscoridi	102.1.40
phillyreæ consideratio	138.1.10	pix secca Dioscoridi	102.1.52
Phœnix Dioscoridi	541.1.60	piceis conficiendæ ratio	103.1.30
		piceis faciliates ex Galeno	103.1.62
		Plantago Dioscoridi	306.2.26
		plantaginis consideratio, & genera	307.1.38
		plantaginis vires ex Galeno	307.1.53
		Plantæ quæ colligi possunt, dum florescunt	2.15
		plantarum degeneratio	11.1.1
		plantas meliorescere celi clementia, & loci amicitia	11.1.41
		plantarum	

# Index.

plantarum situs naturales	11.1.55	polypodij vires ex Galeno, & Actuatio	653.
plantarum in radicibus varietas	11.2.15	2. 32	
plantæ pro loco pro ac climatum differentia,		Pomatæ conficiendæ ratio	260.2.15
facultates variant	382.2.40	Pomp. holys Dioscoridi	689.1.35
Platanus Dioscoridi	116.1.5	pompholygis consideratio	690.2.34
platani consideratio 116. 1. 33. eius vires ex		pompholygis, & spodij historia ex Galeno	
Galeno	116.2.23	691. 2. 42	
Platearj in captura error	98.2.42	pompholygis vires ex Galeno	691.2.50
Plinij lapsus, & sententiæ non probatæ 22. 2.		Populus alba Dioscoridi	118.1.20
35. & 30.2.55. & 76.1.1. & 93.2.50. & 94.1.		populus nigra Dioscoridi	118.2.20
38. & 94.2.15. & 95.1.16. & 117.1.39. & 118.		populi utriusque consideratio	118.1.57
2.46. & 123.2.54. & 138.2.38. & 140.1.4. & 140.		populi lacrymam non esse fucinum 119.	
140. 2.61. & 165.1.15. & 174.2.60. & 203.1.		1. 45	
14. & 214.1.46. & 215.1.8. & 235.2.20. & 237.		populæ vnguenti examinatio	119.1.10
2.30. & 240.1.38. & 308.1.50. & 340.2.50. & 375.		Porrum capitatum Dioscoridi	331.2.50
1.45. & 378.1.35. & 379.2.20. & 403.2.		porri consideratio	332.1.30
61. & 408.1.4. & 469.1.43. & 474.1.4. & 475.		porri facultates ex Galeno	332.1.50
2.38. & 476.2.47. & 482.2.35. & 490.2.2. & 491.		porrum quo mangonio capitatum eat	332.1.44
1.1. & 509.1.33. & 531.1.44. & 556.2.2.		porri agrici consideratio	332.2.35
605.2.36. & 608.2.24. & 609.2.2. & 613.1.		Portulaca Dioscoridi	305.1.25
18. & 646.1.41. & 648.1.40. & 659.2.35. & 694.		portulacæ consideratio	305.2.8
1.15. & 710.2.52. & 739.2.25. & 744.1.		portulacæ vires ex Galeno	305.2.13
46. & 749. 1. 17		Potamogeron Dioscoridi	586.1.60
Plinius à Brasauli impugnatione vindicatur		potamogeronis consideratio	586.2.19
35.1.14		potamogeronis vires ex Galeno	586.2.26
Plinius à Dioscoride in Gladiolo dissentit 528.		Potentilla	539.1.30
1. 12		Poterion Dioscoridi	388.2.13
Plinius à Dioscoride in malabathro dissentit		poterij consideratio	388.1.34
38. 2.10		poterij vires ex Galeno	388.1.50
Plinius in colligendo balsamo à Theophrasto,		Præcipitati vocati facultas	12.1.16
& Dioscoride discordat	52.2.60	Præcipitati vocati facultas	814.2.15
Plinius in personata defenditur	521.1.60	Propolis Dioscoridi	272.1.35
Plumbago Dioscoridi	702.1.18	propolis consideratio	272.1.50
plumbaginis consideratio	702.1.43	propolis vires ex Galeno	272.2.4
Plumbum elotum Dioscoridi	697.2.36	Pruna, & prunus Dioscoridi	181.2.35
plumbum vsum Dioscoridi	698.1.15	prunorum consideratio	182.1.10
plumbi recrementum Dioscoridi	698.1.50	prunorum vires ex Galeno	182.1.25
plumbi scoriz consideratio	698.2.15	prunorum vsus	182.2.31
plumbi facultates ex Galeno	699.1.9	Pseudobunij Dioscoridi	602.2.40
plumbi senbis noxa, & curatio	797.1.15	pseudobunij consideratio	603.1.4
Pnigitis terra Dioscoridi	752.1.50	Pseudodictamnus Dioscoridi	405.2.10
Polemonia Dioscoridi	518.1.18	pseudodictamni consideratio	406.2.30
polemoniz consideratio 518.1.40. eius vires ex		Pseudomelanthum	448.2.20
Galeno	518.2.7	Psericon Dioscoridi	721.1.45
Potentæ consideratio	277.1.30	Psyllion Dioscoridi	558.1.58
Polion Dioscoridi	473.1.45	psyllij consideratio	558.2.46
polij consideratio	473.2.45	psyllij vires ex Galeno	559.2.13
polij vires ex Galeno	474.1.15	psyllij facultates ex Mesue	558.2.55
Polycnemum Dioscoridi	461.2.50	psyllij epti signa, & remedia	782.2.26
polycnemum consideratio	462.1.1	psyllij veneni noxa, & curatio	782.2.34
polycnemum vires ex Galeno	462.2.4	Ptarmica Dioscoridi	344.2.54
Polygala Dioscoridi	612.2.14	ptarmicæ consideratio	345.1.7
polygalæ consideratio	612.2.19	ptarmicæ vires ex Galeno	345.1.30
Polygonatum Dioscoridi	516.1.10	Ptilanæ consideratio	277.1.9
polygonati consideratio	516.1.43	Pulegium Dioscoridi	404.2.10
polygonati vires ex Galeno	516.2.17	pulegij consideratio	404.2.50
Polygonon Dioscoridi	515.1.27	pulegij Plinio genera duo	404.2.60
polygoni utriusque consideratio	515.2.27	pulegij vires ex Galeno	405.2.4
polygoni utriusque vires ex Galeno	515.2.30	Pulmo marinus Dioscoridi	228.2.10
polypi piscis mira magnitudo	219.2.6	pulmonis marini consideratio	228.2.14
Polypodium Dioscoridi	652.2.60	Pulmones animalium Dioscoridi	228.2.30
Polypodij consideratio	653.1.32	pulmonum animalium consideratio	228.2.50

# Index.

Pulmonariæ historia, & vires	547.1.20
pulmonariæ alterius descriptio, & vires	547.1.39
Pulsatillæ historia, & vires	358.2.57
Pumex Dioscoridi	729.1.50
pumicis consideratio	729.2.15
pumicis vires ex Galeno	729.2.27
Purpura Dioscoridi	201.2.48
purpurarum consideratio, & historia	201.1.28
Pycnocomon Dioscoridi	643.1.1
pycnocomon consideratio	643.1.24
Pyra Dioscoridi	177.1.38
pyrorum consideratio	177.2.8
pyrorum genera	177.2.11
pyrorum facultates	177.2.38. & inde
pyrorum vires ex Galeno	177.2.45
Pyraffer Dioscoridi	177.1.55
Pyrethrum Dioscoridi	442.2.4
pyrethri consideratio	442.2.35
pyrethri vires ex Galeno	443.1.3
Pyrites lapis Dioscoridi	741.1.45
pyritæ lapidis consideratio	741.2.12
pyritæ lapidis vires ex Galeno	741.2.36

## Q

Q V E R C U S Dioscoridi	156.1.37
Quercus consideratio	156.2.52
Quercus plura alia fert præter fructum	157.1.15
Quercus vires ex Galeno	158.1.61
Quercus, & oleæ inimicitia	159.1.15
Quinquefolium Dioscoridi	539.2.1
Quinquefolij consideratio, & genera	540.1.5
Quinquefolij vires ex Galeno	540.2.22
Quirici Augusti lapsus	419.2.15

## R

R A D I C E S quando effodiendæ	7.1.50
Radicum optimarum notæ	7.2.17
Radices quomodo mundandæ, siccandæ ac conservandæ	7.2.32
radices quibus in locis reponendæ	7.2.60
radicum differentiarum in coloribus, & saporibus	13.1.24
Radicula Dioscoridi	345.1.43
radiculæ consideratio	345.2.6
Radix Dioscoridi	294.2.6
radicis consideratio	294.2.45
Radix dulcis Dioscoridi	377.2.44
radicis dulcis consideratio	378.1.20. & vires ex Galeno
	378.2.10
Radix sylvestris Dioscoridi	294.2.37
Rana Dioscoridi	224.1.1
ranarum consideratio	224.1.31
ranarum partes	224.1.50
ranæ palustris sumpta noxa, & remedia Dioscoridi	799.2.50
ranæ palustris venenum	800.1.18
ranæ maleficæ signa, & curatio	800.1.54
Ranunculus Dioscoridi	356.1.40
ranunculi consideratio	357.1.42
ranunculi vires ex Galeno	358.1.19
Raphanus Dioscoridi	294.2.6

raphanus sylvestris Dioscoridi	294.2.37
raphani Theophrasto plura genera	295.1.10
raphani consideratio	294.2.46. & vires ex Galeno
	295.1.23
Raphaninum oleum	67.2.44
Rapum Dioscoridi	293.1.32
rap: consideratio	293.2.20
rap: vires ex Galeno	293.2.56
Ratio commentariorum in librum sextum	759.1.35
Recocta quid, & vires	253.1.61
Recrementum argenti Dioscoridi	702.2.50
Remedia ad varia medicamentorum noxiarum	802.2.50
symptomata	803.2.12
Remedia ad convulsiones	803.2.12
Res quæ venena produnt, iisque suspensæ aduerfantur	766.2.1
Resina lentiscina Dioscoridi	97.1.55
resina liquida è pinu, & picea Dioscoridi	99.2.45
resinæ alix Dioscoridi	ibidem
resina terebinthina Dioscoridi	99.2.24
resinæ terebinthinæ consideratio	100.2.40
resinarum omnium consideratio	100.2.60
resinarum omnium vires ex Galeno	101.2.16
Resia bovis	390.1.33
Rha Dioscoridi	368.2.60
Rhabarbarum Italicum	373.2.4
Rhamnus Dioscoridi	129.1.30
rhamni consideratio	129.2.30
rhamni vires ex Galeno	130.1.13
Rhaponticum Dioscoridi	368.2.59
rhapontici consideratio	369.1.35
rhapontici, & rhabarbari discrimen	370.1.5
rhapontici vires ex Galeno	370.2.45
Rheon Dioscoridi	368.2.60
rhei Barbarici nomenclatura vnde	371.2.15
rhei Barbarici, seu rhabarbari vires ex Mesue	372.1.57
	371.1.36
rhei Indici nominatio	371.1.18
rhei Turcici nomenclatio	371.1.18
Rhodia radix Dioscoridi	542.1.20
rhodiæ radicis consideratio	542.1.40
rhodiæ radicis vires ex Galeno	542.2.22
Rhododendron Dioscoridi	572.2.48
rhododendri consideratio. vide Nerij consideratio	
Rhus Dioscoridi	161.1.1
rhois consideratio	161.1.55
rhois vires ex Galeno	162.2.7
Ribes Mauritanis quid	135.1.23
ribis officinarum consideratio	135.1.22
Ricinus Dioscoridi	631.2.58
ricini consideratio	632.1.24
ricini vires ex Mesue	632.1.55
ricini vires ex Galeno	632.2.5
rici sumpti noxa, & curatio	802.2.10
Ricini olei consideratio	66.1.33
ricini olei vires ex Mesue	66.1.46
Risigalli venenum, & curatio	799.1.18
Rosa Dioscoridi	145.1.36
rosarum consideratio	145.2.46
	rosarum

# Index.

rosarum genera plura	ibidem	
rosarum succus, & dilutum	146.1.16	
rosarum dilutum absque noxa aluum deicere		
146.1.25		
rosæ sylvestres	146.2.3	
rosæ aureo colore	146.2.11	
rosarum differentiz, & genera ex Plinio	146.	
2.13		
rosarum partes, & earum vires	146.2.48	
rosarū aqua stillatitia quæ præstantior	147.1.35	
rosarum facultates ex Galeno	148.1.2	
Rosaceum Dioscoridi	70.1.45	
rosacei consideratio	71.1.20	
rosaceum num conueniat in noxa mandra-		
goræ	786.1.46	
Rosaceum omphacinum	71.1.30	
rosacei omphacini vires	71.1.42	
Rosæi pastilli Dioscoridi	145.2.10	
Rosmarinum Dioscoridi	443.1.35	
rosmarinum coronarium Dioscoridi	444.1.10	
rosmarini consideratio	444.1.26	
rosmarini historia ex Theophrasto	444.1.48	
rosmarini vires ex Galeno	444.2.13	
Rubeta, & eius noxæ remedia Diofco-		
rubetæ veneni signa 800.1.18. eius curatio		
800.1.53		
Rubia Dioscoridi	501.1.46	
rubicæ consi. 502.1.1. & vires ex Gal.	502.1.15	
Rubigo ferri Dioscoridi	697.1.35	
rubiginis ferri consideratio	697.1.58	
Rubrica fabrilis Dioscoridi	715.1.32	
rubricæ fabrilis consideratio	715.1.42	
Rubrica Sinopica Dioscoridi	714.2.34	
rubricæ Sinopicæ consideratio	714.2.53	
Rubus Dioscoridi	336.1.15	
rubi consideratio	336.2.10	
rubi vires ex Galeno	336.2.44	
Rubus canis Dioscoridi	135.2.48	
rubi canis consideratio	136.1.1	
rubi canis vires ex Galeno	136.2.22	
Rubus Idæus Dioscoridi	336.1.58	
rubi Idæi consideratio	336.2.28	
Ruellij errata, ac eius opiniones reprobatæ		
28.1.58. & 31.1.6. & 37.1.55. & 54.2. & 68.		
2.20. & 94.2.18. & 97.2.45. & 119.1.17. &		
129.2.45. & 180.1.41. & 197.1.12. & 282.1.		
60. & 304.1.9. & 339.2.54. & 344.1.33. &		
346.2.40. & 356.1.22. & 359.1.52. & 370.2.		
6. & 386.2.32. & 391.1.35. & 411.1.10. &		
423.2.61. & 429.1.18. & 433.2.51. & 436.		
2.42. & 437.1.57. & 440.2.30. & 459.1.47.		
& 460.1.42. & 461.1.30. & 470.1.11. & 477.2.		
4. & 480.1.50. & 490.1.30. & 514.1.53. & 514.		
2.38. & 524.1.35. & 534.2.45. & 589.1.50. &		
591.2.58. & 605.2.45. & 607.2.11. & 612.		
1.48. & 657.1.20.		
Rumex Dioscoridi	297.1.52	
rumicis consideratio	297.1.44	
rumicis facultas ex Galeno	297.2.59	
Rufum Dioscoridi	614.2.45	
rufci consideratio	615.1.12	
Ruta Dioscoridi	417.1.55	
ruta montana Dioscoridi		418.1.10
ruta sylvestris Dioscoridi		418.1.31
rutæ fatiæ, & sylvestris confid.		418.1.40
rutæ vtriusque vires ex Galeno		418.2.46
Ruta sylvestris altera Dioscoridi		419.1.10
rutæ sylvestris alterius consideratio		419.1.36
rutæ sylvestris alterius vires ex Galeno		420.
1.40		
Ruta capraria, & eius vires		420.1.55
S		
SABINA Dioscoridi descripta		109.2.30
Sabinæ consideratio		109.2.60
sabinæ vires ex Galeno		111.1.22
Saccharum Dioscoridi		268.1.32
sacchari consideratio		268.2.58
saccharum antiquorum à nostrate non differ-		
re		269.1.44
sacchari factitij inuentio		269.2.36
saccharum candidum		271.2.2
Sacra herba Dioscoridi		550.2.40
Sagapennon Dioscoridi		452.1.1
sagapeni consideratio		452.1.30
Sagapeni vires ex Mesue		452.1.44
sagapeni facultates ex Galeno		452.2.18
Sal Dioscoridi descriptas		730.1.1
salis omnis generis consideratio		731.1.10
salis facultates ex Galeno		732.1.48
Sal ammoniacus Dioscoridi		730.2.5
salis Ammoniaci consideratio		731.2.15
sal Armeniacus officinis		731.2.25
Sal Indus quid Paulo, & Auicennæ		731.2.46
salis Indi consideratio		731.2.37
Salis flos Dioscoridi		732.1.11
salis floris consideratio		732.1.3
Salis spuma Dioscoridi		730.1.25
salis spumæ consideratio		731.2.57
Sal nitri, sive	731.2.54.	& 732.1.60
Salamandra Dioscoridi descripta		242.2.43
salamandræ consideratio		242.2.56
salamandram igni non absumi, falsum		243.1.47
salamandra aquatica		243.2.19
salamandræ huius signa, & remedia Diofco-		
ridi		777.2.19
salamandræ venefica natura		777.2.42
salamandræ veneni curatio		778.1.19
Salua humana, & eius facultates		267.1.46
Saluaris herba, Pyretum Dioscoridi		442.2.8
Saluina, & eius consideratio		33.1.55
Salix Dioscoridi		152.2.53
salicis confid. 153.1.16. eius vires ex Galeno		
153.1.55		
Salua parilla quid, & vires		145.1.18
Salua Dioscoridi		427.1.56
saluiz consideratio		407.1.36
saluiz vires ex Galeno		408.1.8
saluiz sylvestris consideratio		407.1.60
saluiz Theophrasto dux species		407.2.49
saluiz vires ex Aetio		408.1.10
Salua Romana		409.2.3
saluiz Romanæ vires		409.2.47
Sambucus Dioscoridi		641.2.35
sambuci,		

# Index.

fambuci, & ebuli genera	642.1.33	faxifragæ consideratio, & vires	524.2.49
fambuci, & ebuli vires	642.1.50	faxifragæ nomen pluribus plantis comune	525.1.18.
fambuci vtriusque facultates ex Galeno	642.2.48	faxifraga alba	525.2.1
Samia terra Dioscoridi	752.1.58	Saxosis locis quæ plantæ gaudent	525.2.58
famiæ terræ consideratio	752.2.35	Scabiosæ consideratio	525.2.49
Samius lapis Dioscoridi	752.2.20	scabiosæ vires	525.2.5
famij lapidis consideratio	752.1.7	Scammonia Dioscoridi	638.2.50
Sampfuchum Dioscoridi	414.1.7	scammoniz, & eius succi confid.	639.1.60
fampfuchi consideratio	414.1.46. eius vires	scammonium officinarum vicarium	639.2.39
ex Galeno	414.2.7	scammonij læsiones ex Mesue	639.2.56
Sampfuchinum Dioscoridi	72.1.37	scammonij vires ex eodem	640.2.17
fampfuchini consideratio	72.2.6	scammonij noxa, & eius curatio	802.2.9
Sandaracha Dioscoridi	724.1.46	Scandix Dioscoridi	322.2.15
fandarachæ consideratio	724.2.8	scandicis confid.	322.2.35. eius vires ex Galeno
fandarachæ vires ex Galeno	725.1.8	leno	323.1.43
Sandarachæ potæ noxa, & eius remedia Dioscoridi	798.2.10	Scariola quæ species intybi	314.1.32
fandarachæ malefica vis, & curatio	798.2.25	Schistum lac Dioscoridi	250.2.1
Sandaracha gummi	109.1.10. & 733.1.55	schistos lapis Dioscoridi	743.1.35
fandaracha ceruginosi mellis genus	109.1.59. & 724.2.53	schisti lapidis consideratio	743.1.50
fandarax Arabum quid	109.1.22. & 724.2.33	schisti lapidis vires ex Galeno	743.2.49
Sandyx Dioscoridi	705.1.50	Scilla Dioscoridi	312.2.49
fandycis consideratio	705.2.1	seillæ confid.	353.2.8. eius vires ex Gal.
fandycis facultas ex Galeno	705.2.14	seillæ præparatio	354.1.5
Sanguinaria mas Dioscoridi	515.1.25	seillæ venenose noxa, & curatio	731.1.32
fanguinaria forma Dioscoridi	515.1.51	Seillinum acetum Dioscoridi	679.1.60
fanguinariæ confid. & vires, vide in Polygono	262.2.20	seillini acetii vires admirabiles ex Galeno	679.2.48
Sanguis Dioscoridi	262.2.20	Scincus Dioscoridi	246.1.8
fanguinis consideratio	263.1.3	scinci consideratio	246.1.38
fanguinis quorundam animalium vires peculiare à Galeno improbatæ	263.1.8	scinci Vicentini	246.1.30
Sanguis taurinus, eiusq; eptoti notæ, & curatio Dioscoridi	793.1.50	scinci mentio, & vires ex Plinio	246.2.29
fanguis tauri venenata potio	793.2.18	Scolopendra Dioscoridi	213.1.7
fanguinis menstrui venenum, & eius remedia	793.2.63	scolopendræ marinæ consideratio	213.1.14
Saniculæ genera, & vires	520.1.1	scolopendræ icus noxæ, & curatio Dioscoridi	824.1.31
sanicula, quinquesolij species	540.2.18	scolopendræ venenose consideratio	824.1.53
Santalorum consideratio, & genera	54.2.39	scolopendræ morfas remedia	824.1.20
santalorum vires	54.2.42	Scolopendriion Dioscoridi	493.2.10
Sapa Dioscoridi	670.2.47	scolopendrij consideratio	493.2.45
Sapphirus lapis Dioscoridi	748.1.38	Scolymos Dioscoridi	357.1.25
sapphir confideratio	748.1.43	scordion Dioscoridi	474.1.30
sapphirus nostri vsus suspectus	748.1.52	scordij consideratio	474.2.8
Sarcocolla Dioscoridi	455.1.35	scordium vbi optimum	474.2.40
sarcocollæ consideratio	455.1.44	scordij vires ex Galeno	474.2.53
sarcocollæ vires ex Arabibus	455.2.6	Scoria ferri Dioscoridi	697.1.53
sarcocollæ facultates ex Galeno	455.2.33	scoria ferri consideratio	697.1.58. eius vires ex Galeno
Sardianæ glandes Dioscoridi	158.2.50	Scoria plumbi Dioscoridi	696.2.12
Sardoniz herbæ noxa, & remedia Dioscoridi	785.1.40	scoria plumbi consideratio	698.1.50
Sardoniz herbæ venenæ, eiusq; curatio	785.2.1	scoria omnis vires ex Galeno	698.2.15
Sarmentitius cinis Dioscoridi	735.2.45	Scorodoprasum Dioscoridi	697.2.12
Satureia Dioscoridi	412.2.20	scorodoprasi consideratio	335.2.60
satureiæ consideratio	412.2.46	Scorpanæ piscis consideratio	211.2.53
satureiæ vires ex Paulo	415.1.13	Scorpioides Dioscoridi	657.2.20
Satyrion Dioscoridi	488.1.21	scorpioidis confid.	657.2.26. eius vires ex Galeno
satyriam erithronium Dioscoridi	488.1.54	Scorpiurus herba Dioscoridi	657.2.54
satyriz confid.	488.2.5. eius vires ex Gal.	scorpius marinus Dioscoridi	211.2.35
Saxifraga Dioscoridi	524.2.25	Scorpiij marini consideratio	211.2.53
		scorpionis marini icus notæ, & curatio Dioscoridi	826.1.56
		Scorpius	

# Index.

Scorpius terrestris Dioscoridi	210.2.25	seridis consideratio	314.1.1
scorpionis terrestris consideratio	210.2.40	Serpens marina Aristoteli quid	212.2.20
scorpionum genera	211.1.41	Serpyllum Dioscoridi	413.1.28
scorpiones aligeri	211.1.36	serpylli consideratio	413.2.13
scorpionum facultates	211.1.58	serpylli vires ex Galeno	413.2.60
scorpionum oleum mixtæ facultatis	211.2.4. & 772.2.35	Serrula Campana Dioscoridi	414.2.20
scorpiones aliquibus admotis stupidi redduntur	19.2.33	sertulæ Campanæ consideratio, vide Meliloti consideratio.	
scorpiones quibus admotis reuiviscant	19.2.37	Serum lactis Dioscoridi	250.1.52
scorpionis ictum prohibentia	19.2.40	seri vires ex Galeno	253.2.10
scorpionis ictus notæ, & curatio Dioscoridi	824.2.38	seri vires ex Mesue	253.2.20
scorpionum genera ex Nicandro	825.1.35	Sesamum Dioscoridi	282.1.44
scorpionum ictum indicia, & remedia	825.2.21	sesami consideratio	283.1.22
Scrophularia 583.2.17. eius vires	584.1.5	sesami vires ex Galeno	283.1.62
Secale frumenti genus	279.1.8	Sesamoides magnum Dioscoridi	621.2.20
Secacul Arabum	393.2.3	Sesamoides paruum	621.2.36
Securidaca Dioscoridi	490.2.35	sesamoidis versusque consideratio	621.2.50
securidacæ consideratio	490.2.56	Seseli Aethiopicum Dioscoridi	424.2.35
securidacæ vires ex Galeno	491.1.10	seseli Creticum Dioscoridi	425.1.28
Sedum Dioscoridi	579.1.30	seseli Massiliense Dioscoridi	424.2.3.5
sedî consideratio, & genera	579.2.59	seseli Peloponnesse Dioscoridi	425.1.2
sedî vires ex Galeno	580.2.2	seselis omnis consideratio	425.1.55
Selago quid	110.1.10	seselis vires ex Galeno	425.2.45
Selenites lapis Dioscoridi	748.2.45	Sicyonium oleum Dioscoridi	64.1.40
selenitæ lapidis consideratio	748.2.58	Sideritis prima Dioscoridi	533.2.35
Selinusia terra Dioscoridi	753.1.28	sideritis secunda Dioscoridi	534.1.25
Semperuivum maius Dioscoridi	579.1.30	sideritis tertia Dioscoridi	534.1.40
semperuivum minus Dioscoridi	579.1.58	sideritis omnis consideratio	534.1.57
semperuivum tertium genus Dioscoridi	579.2.38	sideritis vires ex Galeno	535.1.19
semperuivui consideratio, & genera	579.2.58	Siena in commune veneni sumpri	767.2.40
Semen sanctum	397.2.22	Siliquez Dioscoridi	290.1.50
Semina quomodo demerenda	9.1.27	siliquarum consideratio	170.1.60. & vires ex Galeno
seminum, & fructuum in plantis discrimina	17.2.35	Silurus Dioscoridi	170.2.38
Sena herba, & eius historia	440.1.52	siluri piscis consideratio	224.2.10
senæ, & eius diluti vires	442.1.3	Silybum Dioscoridi	627.2.1
senæ diluti præparatio	442.1.21	silybi consideratio	627.2.10
senæ vinum	442.1.35	Simplicium peritia acquiri non potest ex librorum tantum lectione	4.2.53
senæ folliculorum vires	442.1.45	Simplicium peritia à præceptoribus, non ex libris comparatur	5.1.17
Senecta anguium Dioscoridi	216.2.45	Simplicium nomina varia Dioscoridi	adulterina
senectæ anguium consideratio	216.2.55	Sinapi Dioscoridi	10.2.10
Senecio Dioscoridi	584.2.24	sinapi consideratio	336.1.58
senecionis consideratio	584.1.60. eius vires ex Galeno	sinapi vires ex Galeno	337.1.29
Sepia Dioscoridi	585.1.9	Sion Dioscoridi	337.1.45
sepiarum consideratio	219.1.10	Sij consideratio	308.1.1
sepiarum facultates	219.1.36	sij vires ex Galeno	308.1.19
Seplasiariorum lapsus	219.2.35	Siser Dioscoridi	308.2.13
2.46. & 70.1.16. & 419.2.5		siseris consideratio	295.2.48
Seps Dioscoridi	245.1.55	Sferis vires ex Galeno	295.2.52
sepis feræ consideratio	241.2.31. & 830.1.7	siferis forma	296.1.22
sepis morfus signa, & remedia	830.1.47	Sifon Dioscoridi	295.1.35
Serapionis errata	27.1.56. & 37.2.35. & 46.2.32. & 89.1.40. & 179.1.28. & 535.2.49. & 576.1.48. & 600.1.6	Sifonis consideratio	425.2.55
Serica Galeno quid	183.2.26. & 184.1.32	Sisymbrium Dioscoridi	426.1.1
serici consideratio, & vires	191.2.6	sisymbrij consideratio	308.2.24
Seris Dioscoridi	313.1.20	sisymbrij in mentham mutatio	309.1.40
		sisymbrium aquaticum	309.1.58
		sisymbrij versusque vires ex Galeno	310.1.8
		Smarides pisces Dioscoridi	310.2.2
		smaridum consideratio	225.1.12
			225.1.52
			Smil.x



# Index.

Smilax hortensis Dioscoridi	319.1.55	spodij, & pompholygis consideratio	690.2.33
Smilacis hortensis consideratio	329.2.24	spodij, & pompholygis historia	691.2.40
Smilax aspera Dioscoridi	613.1.40	Spongiz Dioscoridi	738.1.1
Smilacis asperæ historia ex Theophrasto	613.1.57	Spongizum historia ex Aristotele	738.1.40
Smilax lævis Dioscoridi	613.2.40	Spongizum vires ex Galeno	738.2.33
Smilacis lævis historia	614.1.28	Spongizum lapides Dioscoridi	750.2.60
Smilacis vtriusque vires ex Galeno	614.2.25	Spuma nitri, vide Nitri spuma	
Smilacis glandiferæ consideratio	157.2.49	Spuma salis, vide Salis spuma	
Smyris lapis Dioscoridi	751.2.5	Spuma argenti, vide Argenti spuma	
Smyridis confid. & vires ex Galeno	751.2.25	Squama, æris, vide Aeris squama	
Smyrion Dioscoridi	435.1.44	Squama stomomatis Dioscoridi	693.2.34
Smyrion confid. 435.2.38. eius vires ex Galeno	436.1.48	Squamæ stomomatis consideratio	693.2.42
Sodomeus lacus	104.2.5 & 105.2.20	Squama stomomatis quæ legitima	694.2.1
Solanum halicacabum Dioscoridi	560.1.1	Squillarum consideratio	209.2.18
Solanum hortense Dioscoridi	559.1.50	Squinanthum	49.1.4
Solanum manicum, seu furiosum Dioscoridi	560.2.40	Stachys Dioscoridi	469.1.10
Solanum somniferum Dioscoridi	560.1.40	Stachys consideratio. 469. 1. 32. eius vires ex Galeno	469.1.48
Solani omnis generis consideratio	561.1.70	Stactis Dioscoridi	77.1.14
Solani historia ex Theophrasto	561.2.10	Stactes consideratio	77.1.54
Solani vires ex Galeno	562.1.7	Staphis agria Dioscoridi	624.1.15
Solani manici noxa, & curatio	780.2.6	Staphidis agriæ consideratio	624.1.56
Solbafirella, & eius vires	545.1.47	Staphidis agriæ vires ex Galeno	624.2.3
Soldanella quæ	303.2.57	Staphidis agriæ noxa, & curatio	780.1.10
Solidaginis minoris, & mediæ vires	519.2.20	Staphylodendron	187.1.31
Solidago regalis	520.1.35	Stellariz historia, & vires	600.1.60
Sonchus Dioscoridi	312.2.20	Stellionum consideratio	778.1.50
Sonchi confid. 312. 2. 44. eius vires ex Galeno	312.2.57	Stellionum morfus remedia	779.1.13
Sorba Dioscoridi	181.1.40	Stercoris vires	264.1.47. & inde
Sorborum consideratio	181.2.4	Stercus ferri, vide Ferri stercus	
Sorborum vires ex Galeno	181.2.20	Stibium Dioscoridi	699.2.40
Sory Dioscoridi	721.2.44	Stibij consideratio	700.1.12
Soreos consideratio	722.1.19	Stibij vires ex Galeno	700.2.6
Soreos historia, & vires ex Galeno	722.2.20	Stibij vis deiectoria	700.2.13
Sparganion Dioscoridi	528.1.30	Stimmi, lege suprà Stibium	
Sparganij consideratio. 528.1. 50. eius vires ex Galeno	528.2.10	Stoebe Dioscoridi	521.2.1
Spartium Dioscoridi	626.1.23	Stœbes consideratio. 521. 1. 12. eius vires ex Galeno	522.1.20
Spartij consideratio	626.1.42	Stœchas Dioscoridi	401.2.33
Spartij vires ex Plinio	626.2.35	Stœchadis consideratio	402.1.8
Spartij viles ex Galeno	627.1.54	Stœchadis vires ex Galeno	402.1.34
Spatha Dioscoridi	163.1.33	Stœchadis vires ex Mesue	402.1.46
Sphacelus	407.2.50	Stomoma Dioscoridi	693.2.35
Sphondilium Dioscoridi	444.2.50	Stramonia herba	561.2.50
Sphondilij consideratio. 445.1. 35. eius vires ex Galeno	445.1.54	Stratiotes Dioscoridi	586.2.32
Sphragis ægos Dioscoridi	715.2.4	Stratiotes consideratio	586.2.44
Spinacia	300.2.46	Stratiotes millefolium Dioscoridi	586.2.52
Spina acuta Dioscoridi	132.1.48	Stratiotes millefolij consideratio	587.1.27
Spinæ acutæ consideratio	132.2.4	Stratiotes millefolij vires ex Galeno	587.1.52
Spinæ acutæ vires ex Galeno	135.2.26	Strigmenta balnearum	64.2.4
Spina acuta legitima quæ	133.2.20	Struthium Dioscoridi	345.1.44
Spina alba Dioscoridi	385.1.15	Struthij consideratio. 345. 2.6. & vires ex Galeno	345.2.40
Spinæ albæ consideratio	385.1.48	Styrax Dioscoridi	81.2.35
Spinæ albæ vires ex Galeno	386.1.53	Styracis consideratio	82.1.40
Spina Arabica Dioscoridi	386.2.10	Styracis calamita vnde dicta	82.1.45
Spinæ Arabicæ consideratio	386.2.18	Styracis vires ex Galeno	82.2.57
Spinæ Arabicæ vires ex Galeno	387.1.7	Suberis consideratio, & historia	158.1.18
Spodium Dioscoridi	689.1.35	Suberis vires	158.1.36
		Succedanea quando admittenda	774.1.23
		Succi quomodo exprimendi, servandique sint	9.2.24

# Index.

Succinum Dioscoridi	118.1.50	Testæ fornacæ Dioscoridi	753.2.6
succini historia varia	119.2.30	Testiculus Dioscoridi	487.1.45
Sudoris animalium virus, & remedia	795.1.24	testiculus alter Dioscoridi	487.2.50
Suffrutices qui dicantur	10.2.45	testiculorum consideratio	488.2.3
Suillus pulmo Dioscoridi	218.2.30	testiculorum vires ex Galeno	489.2.3
suillus talus Dioscoridi	238.1.50	Teucrium, Teucri Dioscoridi	463.1.35
Sulphur Dioscoridi	728.1.32	teucrij consideratio	463.1.58
sulphuris consideratio	728.2.10	teucrij vires, & historia ex Plinio	463.2.7
sulphuris facendi ratio	728.2.45	teucrij facultates ex Galeno	463.2.28
sulphuris vires ex Galeno	729.1.15	Thalassomeli Dioscoridi	677.2.1
Sycomoros Dioscoridi	191.2.43	Thalictron Dioscoridi	585.1.20
sycomori historia	192.1.38	thalictri consideratio	585.1.28
sycomori confid. & vires ex Gal.	192.1.60	thalictri vires ex Galeno	585.1.35
sycomorus Italiæ adulterina	192.2.30	Thapsia Dioscoridi	624.2.20
sycomoro ficus Cypria similis	192.2.14	thapsiæ consideratio	625.1.52
Sylus quæ plantæ adamant	12.1.46	thapsiæ radices turpeti vicem illegitimè ex- plent	625.2.20
Sympathia, & antipathia rerum	19.1.4	thapsiæ vires ex Galeno	625.2.29
Symphyton petraon Dioscoridi	518.2.20	thapsiæ noxa, & remedia Diosc.	801.1.35
symphyti petraei consideratio	519.1.33	thapsiæ potionis signa, & curatio	802.1.10
symphytum alterum Dioscoridi	519.1.1	Theamedes lapis, & eius mira natura	745.2.31
symphythi alterius consideratio	519.1.50	Theodori lapsus	175.2.8
symphythi veriusque vires ex Gal.	520.1.53	Theophrasti sententiæ non probatæ	123.
Symphoriani Campegiij lapsus	175.1.7	2.55. & 327.1.28. & 457.2.10	
Syrupus violaceus	602.1.14	Theophrasti loc <sup>o</sup> in corni hist. suspect <sup>o</sup> 181.1.4	
T			
<b>T</b> A L V S suis Dioscoridi	238.1.50	Theophrasti de generatione lapidum opinio	659.1.22
Tali suilli consideratio	238.1.58	Theriace cõponendæ ratio depravatæ	76.2.62.
Tamarix Dioscoridi	127.1.1	theriaca laudibus a Gale. celebrata	819.2.57.
tamaricis confid.	127.1.36.	Thlaspi Dioscoridi	337.2.48
Tamarindorum consideratio	164.2.17	thlaspi consideratio	338.1.25
tamarindorum vires	164.2.40	thlaspi vires ex Galeno	338.1.40
Tanacetum	497.2.40	Thracius lapis Dioscoridi	744.2.50
Tarantule consideratio	344.2.40	thracij lapidis mentio ex Galeno	744.2.58
tarantule ictus mirabiles effectus	ibidem	Thunus Dioscoridi	226.1.59
tarantule ictus musica remedium	245.1.7	thunni consideratio	226.2.13
tarantule venenum, & eius auxilia	824.1.22	thunnotum captura, & nomina varia	226.2.34
Tauri sanguis, vide Sanguis taurinus		thunnotum in cibis facultas	226.2.57
Taxus Dioscoridi	571.1.53	Thus Dioscoridi	85.1.9.
taxi consideratio	571.2.23	thuris consideratio, & historia	86.1.44
taxi historia ex Theophrasto	571.2.40	thuris facultates ex Galeno	86.2.50
taxi historia ex Plinio	572.1.1	thuris cortex Dioscoridi	85.2.25
taxi vires ex Galeno	572.1.20	thuris fuligo Dioscoridi	86.1.5
taxi noxa, & eius remedia Diosc.	783.2.15	thuris manna Dioscoridi	85.2.50
taxi venefica natura	783.2.24	thuris mannæ consideratio	87.2.13
taxus verum calida, vel frigida	784.1.2	Thyites lapis Dioscoridi	747.1.8
Tedæ consideratio	93.2.55	Thymelæa Dioscoridi	640.2.47
Telephium Dioscoridi	365.2.60	thymelææ consideratio	641.1.30
telephij confid.	366.1.36.	thymelææ noxa, & eius curatio	802.2.12
566.2.24		thymoxale Dioscoridi	679.1.44
Tellinæ Dioscoridi	203.2.10	Thimum Dioscoridi	411.2.30
tellinarum consideratio	203.2.32	thymi historia	412.1.6
Tembulum Arabum	38.2.12	thymi genera duo	412.1.30
Terebinthus Dioscoridi	99.1.55	thymi vires ex Galeno, & Aëtio	412.1.39
terebinthi confid. & historia	100.1.53	Thymbra Dioscoridi	412.2.20
terebinthi vires ex Galeno	101.2.4	thymbræ consideratio	412.2.45.
Terebinthina Dioscoridi	99.2.25	Paulo	413.1.13
terebinthinæ resina confid.	100.2.40	Tigname officinis quid	59.1.6
Terra omnis Dioscoridi	752.1.18	Tiliæ confid.	139.1.4
terrarum brevis enarratio	665.1.2	Tithymali omnes Dioscoridi	632.2.18
terra fornacum Dioscoridi	752.2.18	tithymalorum omnium consider.	634.2.32
terræ alias quære in suis propriis nominibus		tithymali cogniti	635.1.30
Tetrantula Italici quid	245.2.49	tithym	

# Index.

cichymali Theophrasto tria tantum genera  
635.2.15  
cithymalorum vires ex Mesue 635.2.42  
cithymalorum vires ex Galeno 636.1.1  
cithymalorum noxa, & remedia 802.2.10  
Tordilium Dioscoridi 425.2.30  
Tormentilla descriptio, & vires 513.2.1  
Torpedo piscis Dioscoridi 213.1.27  
torpedinis consideratio 213.1.47  
torpedinis mira facultas 213.1.53  
torpedinis vires ex Galeno 213.2.18  
Toxicū, & eius veneni curatio Diosc. 788.2.30  
toxici consideratio 788.2.57  
toxici sumpti notæ ex Nicandro 789.1.60  
toxici, & napelli discrimen 789.2.25  
Tragacantha Dioscoridi 391.2.44  
tragacanthæ confid. 392.2.20 & vires ex Gal. 392.2.20  
Tragium Dioscoridi 544.2.10  
tragium alterum Dioscoridi 544.2.30  
tragij confid. 544.2.43 & vires ex Gal. 545.2.6  
Tragoriganum Dioscoridi 403.1.42  
tragorigani consideratio 404.1.50  
Tragos Dioscoridi 279.2.35  
tragi cerealis consideratio 279.2.42  
Tragum Dioscoridi 545.2.23  
tragi herbæ consideratio 545.2.40  
Trasi, & eorum descriptio, & vires 318.1.48  
Tribulus Dioscoridi 523.1.55  
tribuli vtriusque consideratio 524.1.18  
tribuli vtriusque vires ex Gal. 524.1.62  
Trichomanes Dioscoridi 609.1.15  
trichomanes consideratio 609.1.36  
trichomanis historia ex Theophr. 609.2.5  
trichomanis vires ex Galeno 609.2.40  
Trifolium Dioscoridi 471.1.20  
trifolij omnis generis consideratio 471.1.60  
trifolij prænse tepestates prænuñciat 471.2.59  
trifolium odoratum 471.2.38  
trifolium acetosum 471.2.32  
trifolij vires ex Galeno 472.2.28  
Trinitas herba, & eius historia, & vires 472.1.42  
Tripolion Dioscoridi 607.2.24  
tripolij confid. 607.2.40 & vires ex Gal. 608.2.30  
Trisago Dioscoridi 463.2.40  
trissaginis consideratio 464.1.12  
trissaginis historia, & vires ex Theophr. 464.1.28  
trissaginis vires ex Galeno 464.1.45  
Triscum Dioscoridi 273.2.55  
tritici genera ex Theophrasto 274.2.4  
trititicum Italicum optimum 275.1.6  
tritici electio 275.1.34 & vires ex Gal. 275.2.39  
tritici oleum 275.2.33  
Tubera Dioscoridi 328.2.20  
tuberum consideratio 328.2.40  
tuberum vires ex Galeno 329.1.28  
Turbit Arabum 607.2.55  
Turpetum, & eius consideratio, & historia 647.2.15  
turpeti noxa, & curatio 802.2.10  
Tussilago Dioscoridi 475.1.45

tussilaginis cōf. 475.2.15 & vires ex Gal. 476.1.2  
Typha Dioscoridi 481.2.52  
typhæ consideratio 482.1.6  
typhæ vsus, & vires 482.1.30

## V

**V**ALERIANA maior 361.1.22  
Valeriana minor 361.1.33  
Varia de generatione lapidū sententia 658.2.28  
varia de metallorum ortu sententia 660.2.6  
Veneficorum doli Dioscoridi 755.2.23  
Venena præcauendi modi Diosc. 755.2.20  
venena quot modis mortem adferant 760.1.37  
venena perunt diuersa membra 762.2.27  
venena calida non possunt in nutrimentū verti 764.1.55  
venena præcauendi modus 765.1.51  
Venena curandi ratio generalis Diosc. 765.2.10  
venena curandi ratio vniuersalis 767.1.45  
venena incognita vomitu deprehenduntur Dioscoridi 757.1.20  
Venenata animalia Dioscoridi 804.2.4  
Veneni operatio qualis 759.2.33  
veneni humidū exemplum 761.2.14  
veneni sumpti in commune indicia 766.2.50  
venenis, quorum nulla cognitio, quæ opitulentur Dioscoridi 765.2.44  
Venenorum genera vnde 760.1.2  
venenorum effectus à diuersis causis 761.1.34  
venenorum præcautio quædam explosa 765.1.57  
venenorum præcautio ex medicamentis 767.1.7  
venenorum remedia in generali 768.2.46  
venenorum animalium diuersi gradus, & affectus 818.1.48  
Venenum quandoque morbis, & alteri veneno remedium est 765.1.70  
venenū serpentium frigidum esse, falsum 818.2.25  
Veneris pecten 323.2.7  
Veneris vmbilicus Dioscoridi 580.2.28  
veneris vmbilicus alter Diosc. 581.1.11  
veneris vmbilici vtriusque confid. 581.2.16  
veneris vmbilici vtriusque vires ex Gal. 581.2.16  
Veratrum album, lege suprà in Elleboro albo.  
veratrum vtriusque triginta perdurat annos 812.24  
Verbascum Dioscoridi 587.2.50  
verbasci consideratio, & genera 589.1.39  
verbasci vires quædam 589.2.13  
verbasci genera, & vires ex Galeno 590.1.6  
verbasci syluestris mehtio 589.1.39  
Verbenaca Dioscoridi 550.2.14  
verbenacæ vtriusque consideratio 551.1.10  
verbenacæ vires ex Galeno 551.2.8  
Vermes terreni Dioscoridi 247.2.18  
vermium terrenorum vires 247.2.30  
vermium terrenorum oleum 247.2.35  
vermium in lignis nascuntur vsus 124.2.29  
Veronicæ herbæ historia, & vires 399.2.5  
Vescicaria solani genus 561.1.23  
vescicaria altera 561.2.29  
Vesparum ictus curatio Diosc. 822.1.1  
vesparum ictus, & remedia 822.1.16  
Vgonis Solerij de nigro veratro opinio explosa.

# Index.

fa.	619.2.12	vinum melomeli Diofcoridi	681.1.49
Viburnum quid, & eius descriptio	162.1.47	vinum è myrrha Diofcoridi	685.1.60
Viciæ vires ex Galeno	331.1.37	vinum myrsinites Diofcoridi	682.1.50
Victus ratio in morfu rabiosi canis Diofcoridi	814.2.38	vinum myrtites Diofcoridi	682.1.35
victus ratio demorforû à cane rabioso	815.2.18	Vinum à nardo sylvestri Diofco.	685.2.34
victus ratio eorum, qui venena fumpferunt	768.2.3	vinum nectarites Diofcoridi	685.2.9
Vincetoxicum, & eius descriptio	459.2.47	vinum nouum Diofcoridi	670.2.6
Vina marina Diofcoridi	680.2.58	Vinum onanthinum Diofcoridi	681.2.30
vina picata Diofcoridi	671.1.13	vinum omphacomesites Diofcoridi	681.2.4
vina refinata Diofcoridi	ibidem	vinum omphacites Diofcoridi	673.1.45
Vineta quæ plantæ lætè nascantur	12.1.22	vinum organites Diofcoridi	685.1.10
Vini natura, & genera Diofcoridi	670.1.59	Vinum palmeum Diofcoridi	681.2.18
vini facultates variae pro modo vsus	672.1.24	vinum panacites Diofcoridi	686.1.30
vini vifus cui ætati conueniat	672.1.15	vinum passum Diofcoridi	670.2.42
vini vsus moderatus quantum proficit	672.2.39	vinum è petrofelino Diofcoridi	686.1.19
vini vsus immoderatus quantum obicit	672.1.52	vinum phthorion Diofcoridi	686.1.30
vinorum factiorum confideratio	687.1.8	vinum picatum Diofcoridi	683.2.40
Vinum ablegnum Diofcoridi	683.1.58	vinum pineum Diofcoridi	683.1.58
vinum abrotonites Diofcoridi	685.1.14	vinum Pucinum, & eius vires	672.2.59
vinum absinthites Diofcoridi	683.2.58	vinum è pulegio Diofcoridi	685.1.14
vinum acorites Diofcoridi	686.1.4	vini ex Punicis malis varia confectio	681.2.55
vinum adynamon Diofcoridi	673.2.19	Vinum refinatum Diofcoridi	681.2.20
vinum anechinum Diofcoridi	686.1.19	vinum rhodites Diofcoridi	682.1.18
vinum apites Diofcoridi	681.2.20	vinum rhoites Diofcoridi	681.2.44
vinum aromatites Diofcoridi	685.1.25	Vinum flauatum Diofcoridi	685.2.50
vinum asarites Diofcoridi	685.2.30	vinum è fatureia Diofcoridi	685.1.19
Vinum bunites Diofcoridi	684.2.49	vinum scammonites Diofcoridi	686.1.32
Vinum calamithites Diofcoridi	685.1.14	& 686.2.60	
vinum catorchites Diofcoridi	682.2.43	vinum scillinum Diofcoridi	680.1.54
vinum cedrinum Diofcoridi	683.1.55	vini scillini vires ex Galeno	680.2.30
vinum cedrites Diofcoridi	683.2.22	vinum stœchadites Diofcoridi	684.2.10
vinum è Celtica nardo Diofcoridi	685.2.27	vinum strobilites Diofcoridi	685.1.45
vinum celstrites Diofcoridi	684.2.21	vinum è lycomoritis Diofcoridi	683.1.11
vinum chamædrysites Diofcoridi	684.2.4	vinum è Syriaea nardo Diofcoridi	685.2.14
vinum è camelæa Diofcoridi	686.1.46	Vinum terebinthinum Diofcoridi	682.1.2
vinum chamæpitynum Diofcoridi	686.1.54	vinum thymites Diofcoridi	685.2.23
vinum è conyza Diofcoridi	696.1.20	vinum à thymelæa Diofcoridi	686.1.49
vinum cupressinum Diofcoridi	683.1.58	vinum tragoriantes Diofcoridi	684.2.40
vinum cydonites Diofcoridi	681.1.34	Vinum vetus Diofcoridi	670.1.60
vinum daucites Diofcoridi	685.2.44	vinum Vipacum, & eius vires	672.1.60
vinum dictamnites Diofcoridi	684.2.53	Viola alba Diofcoridi	485.2.1
vinum è dulci radice Diofcoridi	686.1.4	Viola purpurea Diofcoridi	601.1.30
Vinum è flore falis Diofcoridi	681.1.21	violæ purpureæ confideratio	601.1.44
Vinum guaiacum, & eius conficiendi, exhiben-		violarum vires ex Mesue	601.2.40
dique ratio	144.1.18	violarum vires ex Galeno	602.1.20
vinum gypfatum Diofcoridi	671.1.6	Vipera ex hominis ventre fugata	231.1.16
Vinum helleborites Diofcoridi	686.1.30	viperæ Aegyptiis cibis	216.2.30
vinum hyssopites Diofcoridi	684.1.50	viperæ vino defectantur	215.2.18
Vinum ex iride Diofcoridi	685.1.60	viperæ ictus notæ, & curatio Diofco.	827.2.44
vinum iuniperinum Diofcoridi	683.1.58	viperarum confideratio	214.1.30
Vinum è labruſca Diofcoridi	674.1.8	viperarum facies fexusq; difcrimen	214.2.45
vini è labruſca vires	674.1.15	viperarum morfus indicia	828.1.50
vinum laurinum Diofcoridi	683.1.58	viperarum morfus remedia	828.2.43
vinum lentifcenum Diofcoridi	682.2.1	viperarum venatio, & earum paſtilli	215.2.39
Vinum malabathrinum Diofco.	685.2.14	Viperinæ carnes Diofcoridi	213.2.55
vinum mandagorites Diofco.	686.1.56	viperinæ carnis vires ex Galeno	215.1.18
vinum marathrites Diofcoridi	686.1.19	Virga aurea, & eius hiftoria, & vires	534.2.53
vinum è marrubio Diofcoridi	684.2.57	virga paſtoris, & eius confideratio	384.2.36
vinum melites Diofcoridi	681.1.34	Virulentorum ictuum, vel morſuum curatio	
vinum melicites Diofcoridi	674.1.27	818.2.48	
		Vifcum Diofcoridi	456.2.25
		vifci confideratio	456.2.60

# Index.

vifci vitilias in Hetruria 457.1.21  
 vifci vires ex Galeno 457.2.55  
 Vitex Dioscoridi 151.2.26  
 viticis confideratio 152.1.13  
 viticis vires ex Galeno 152.1.38  
 Viticellæ herba hiftoria 651.1.22. eius vires  
 651.1.45  
 Vitis alba Dioscoridi 649.1.20  
 vitis albæ confideratio 649.2.28  
 vitis vires ex Galeno 650.1.1  
 Vitis nigra Dioscoridi 650.1.25  
 vitis nigræ confideratio 650.2.1  
 vitis nigræ vires ex Galeno 650.2.36  
 Vitis fylueftris Dioscoridi 648.2.10  
 vitis fylueftris confideratio 648.2.38  
 vitis fylueftris vires ex Galeno 649.1.10  
 Vitis vinifera Dioscoridi 666.1.50  
 vitis viniferæ confideratio 667.1.15  
 vitis, & brafficæ odium 19.1.20  
 Vitruuij in larice error 95.1.16  
 Vimus Dioscoridi 123.1.40  
 vini confideratio, & hiftoria 123.2.20  
 vini facultates 124.1.17  
 vini vires ex Galeno 124.1.48  
 Vinea quæ 586.1.40  
 Vmbilicus Veneris, vide fuprà Veneris vmbi-  
 licus.  
 Vnedo, Arbutus, ideo quære in Arbutu.  
 Vnguentorum ratio Dioscoridi 70.1.26  
 vnguentorum confideratio 71.1.1  
 Vnguentum abrotonium Dioscoridi 73.1.34  
 vnguentum amaracinum Dioscoridi 76.1.18  
 vnguentum anethinum Dioscoridi 73.1.47  
 Vnguentum butyrum Dioscoridi 74.2.34  
 Vnguentum cinnamominum Dioscoridi 77.2.25  
 vnguentum crocinum Dioscoridi 74.1.60  
 vnguentum Cyprinum Dioscoridi 74.2.40  
 Vnguentum elatrinum Dioscoridi 71.1.54  
 Vnguentum gleucinum, vide Gleucinum.  
 Vnguentum hedychoon, vide Hedychoon.  
 Vnguentum iafminum, vide Iafminum.  
 Vnguentum irinum Dioscoridi 75.2.24  
 Vnguentum lilinum Dioscoridi 73.1.60  
 vnguenti lilini confideratio 74.1.25  
 Vnguentum malabathrinum Dioscoridi 78.1.22  
 vnguentum megalinum Dioscoridi 76.2.1  
 vnguentum melinum Dioscoridi 71.2.6  
 vnguenti melini conficiendi ratio 71.2.36  
 vnguentum Mendefum Dioscoridi 77.1.32  
 vnguentum metopion Dioscoridi 77.1.1  
 Vnguentum narciffinum Dioscoridi 74.1.33  
 vnguentum nardinum Dioscoridi 73.1.1  
 vnguentum nicandri 82.2.60  
 Vnguentum ocimum Dioscoridi 73.1.12  
 vnguentum onanthinum Dioscoridi 71.2.46  
 vnguentum onychinum Dioscoridi 74.2.34  
 Vnguentum rofaceum, lege Roseaceum.  
 Vnguentum fampfuchinum Dioscoridi 72.1.1  
 vnguenti fampfuchini confideratio 72.2.5  
 vnguentum ftyracinum Dioscoridi 74.2.34.37  
 vnguentum fufinum Dioscoridi 73.1.60  
 Vnguentum telinum Dioscoridi 72.1.1

Vngula afini, & capræ Dioscoridi 230.1.35  
 vngularum animalium vires 230.1.55  
 Vnguis odoratus Dioscoridi 204.1.43  
 vnguium odoratorum confideratio 204.2.15  
 Vniones qui præftantiffimi 203.1.7  
 vnionum vires 203.1.43  
 Vrina Dioscoridi 266.1.15  
 vrinarum facultates 266.2.10  
 Vrtica Dioscoridi 581.2.35  
 vrticæ confideratio 582.1.33  
 vrticæ vires ex Galeno 582.1.44  
 vrtica lactea 583.2.38  
 vrticæ feminis noxa, & curatio 781.2.36  
 Vltio auxilium contra virulentos iclus Dio-  
 scoridi 813.2.55  
 vltionis vitilias. 814.1.40  
 Vtrum venena in flatum diem interimere pos-  
 fint 763.1.18  
 Vtrum quis affuefieri poffit, vt venena innocue-  
 fumat 764.1.1  
 Vtrum animalia, quæ cibis venenosis vitantur,  
 exitiofum vim retineant 764.2.10  
 Vua Dioscoridi 666.2.45  
 vuæ confideratio 667.1.14  
 vuarum vires ex Galeno 667.2.3  
 Vua paffa Dioscoridi 667.2.36  
 vuæ paffæ confideratio 667.2.57  
 vuæ paffæ vires ex Galeno 668.2.23  
 Vuæ fpirita, & eius vfus 134.2.54  
 vua taminia quæ 650.2.4  
 Vulpinus pulmo Dioscoridi 228.2.33

X  
 Xanthion Dioscoridi 610.1.34  
 Xanthij confideratio 610.2.6  
 Xanthij vires ex Galeno 610.2.10  
 Xiphion Dioscoridi 527.2.10  
 Xiphia Picis 226.2.23  
 Xylon, & eius confideratio 286.1.10. & 481.2.5  
 Xyli vires 481.2.32  
 Xylobalfamum Dioscoridi 512.35  
 Xylobalfamum officinarum fpirum 53.1.26  
 Xylobalfami vicem quid expetiat 53.1.45  
 Xylacinnamomum Dioscoridi 39.2.49  
 Xyris Dioscoridi 528.2.20  
 Xyridis confideratio 528.2.56  
 Xyridis vires ex Galeno 528.2.63

Z  
 Zæa Dioscoridi 277.1.25  
 Zææ confideratio 278.1.43  
 Zææ vires ex Galeno 278.2.17  
 Zedoarie confideratio, & vires 343.1.42  
 Zibetti hiftoria, & facultas 562.50  
 Zizypha, & eorum confideratio 183.2.10  
 Zopiffa Dioscoridi 103.1.9  
 Zuccharum alhufar 270.1.56  
 Zurbet Arabibus, idem quod græcis Ar-  
 nabo 343.2.2  
 Zurbet quid 343.2.18  
 Zythum Dioscoridi 277.2.10  
 Zythi confideratio 277.2.35



# SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM FACVLTATES SECVNDVM

locos ex Dioscoride.



## AD CAPITIS DOLOREM ex frigidityte genitum.



**I** s. Illyrica cum aceto, & rosaceo illita.

Oleum sylvestris oliuz inunctum.  
Oleum amygdalinum illitum per se.

Viticis fescen emplatri modo adhibitur.

Amygdala amara cum aceto vel rosaceo fronti vel temporibus illita.

Torpedo marina viua per se tantum admota.

Lana succida cum aceto, & rosaceo imposita.

Sisymbrium fronti, & temporibus illitum.

Hederæ corymborum, vel foliorum succus cum aceto, & rosaceo perflusus.

Aloë temporibus, & fronti ex aceto, & rosaceo illita.

Mentha fronti per se illita.

Serpyllum coctum, adiecto rosaceo, acetoque madefactum, & appositum.

Melilotus rosaceo, aut aceto madefacta, & imposita.

Baccharis folia illita per se.

Ruta cum rosaceo, & aceto illita.

Anisum potum per se.

Sphondylium cum ruta illitum.

Peucedanum ex aceto & rosaceo illitum.

Melanthium fronti per sese illitum.

Conyza minor per se illita.

Anagyris tenera folia drachmaz pondere ex vino pota.

Rhodia radix recens cum rosacei momento imposita.

Hippoglossum pro ferto capiti impositum.

Chamaedaphnes folia trita, & imposita.

Elaterium ex lacte naribus infusum.

Rufci folia, & bacce in vino pota.

Scammonia ex aceto, & rosaceo perflusa.

Aqua marinæ vapor aperto capite receptus.

## AD CAPITIS DOLORES

A CALIDA CAUSA

EXORTA.

Oleum sylvestris oliuz inunctum.

Vnguentum rosaceum linimenti modo impositum.

Ligustri flores fronti ex aceto illiti.

Rosarum aridarum ex vino maceratarum expressus liquor appositus.

Viticis semen appositum.

Portulaca per se imposita.

Melilotus cum aceto aut rosaceo aspersa.

Nymphaeæ radix pota, & per se naribus indra.

Rhodia radix cum rosaceo fronti, temporibusque adhibita.

Papaueris liquor fronti cum rosaceo illitus.

Psyllium ex rosaceo, acetoque, aut aqua impositum.

Hippoglossi sertum appositum.

Sedum maius cum rosaceo illitum.

Solani hortulani folia adhibita.

Vinifera vitis folia, & capreoli imposita.

Ophites lapis adalligatus.

## Ad expurgandum caput.

Brassicæ succus naribus infusus.

Animonis succus naribus infusus.

Betæ succus naribus infusus.

Chelidonij ma. succus naribus infusus.

Cyclamini ma. succus naribus infusus.

# Capitis.

Cepæ succus naribus infusus.  
Pyrethrum diu mansum.  
Staphis agria diu manfa.  
Colocynthis in catapotis deuorata.  
Vua passa cum pipere comanducata.  
Atramentum futorium lanis naribus inditum.

## Capitis dolores excitant.

Stryacinum oleum olfactum.  
Oliuæ flauæ in cibis acceptæ.  
Glandes in cibis acceptæ.  
Palmulæ Phœnicæ in cibis acceptæ.  
Iuglandes nuces in cibis acceptæ.  
Arbuti fructus deuorati.  
Ferulæ caules deuorati.  
Mei radices largius sumptæ.  
Abſinthij liquamentum haustum.

## Ad veterinosos.

Viticis semen cum rosaceo, & aceto perusum.  
Castoreum ex aceto, & rosaceo naribus infusum.  
Cepa decocta, & in cibum sumpta.  
Sinapi deraſo capiti appositum.  
Sphondylium suffitū, & ex oleo capiti illitum.  
Peucedanum cum aceto, & rosaceo inunctum.

## Ad somnum conciliandum

Iris Illyrica pota.  
Anomum fronti illitum.  
Amygdalæ amaræ deuoratz.  
Viticis semen potum.  
Lactuca in cibum sumpta.  
Aloë illita per sese, vel ex rosaceo.  
Baccharis odorata.  
Iunci Aethiopici semen potum.  
Papaueris erratici quinque, sex ve capita in vini cyathis tribus ad dimidium decocta, & potui data.  
Papaueris foliorum, & vasculorum decoctum, tum bibitum tum perusum.  
Hyoſcyami semen potum, ac appositum.  
Solani somnifici radicum cortex drachmæ pondere in vino potus.  
Mandragoræ radicis ex vino decoctum cyathi vnius mensura potum.  
Mandragoræ poma olfacta naribus.  
Mandragoræ liquor sedi pro balano subditus.

## Somnia terribilia tumultuosaque representant

Fabæ in cibum acceptæ.  
Lentes in cibum acceptæ.  
Pnicocomi semen drachmæ pondere potum.  
Snilacis leuissimum cum dorycnio potum ternis singulorum obolis.

## Ad sternutamenta cienda.

Sinapi semen tritum, & naribus admotum.  
Parmicæ flores admoti.  
Struthij radix trita, & admota.  
Ranunculi radix sicca, & in puluerem trita, naribus indita.  
Daphnoides naribus indita.  
Veratri albi radix trita & imposita.

## Ad vertiginosos.

Balsami semen per se potum.  
Peucedanum ex aceto, & rosaceo illitum.  
Galbanum olfactum.  
Brionæ radix pota per continuū annum quotidie drachmæ pondere.  
Vitis nigre viticulæ primæ recentes decocta, & in cibis acceptæ.  
Vinum Scillinum potum.  
Acetum Scillinum potum.

## Ad apoplexiam.

Vitis albæ radix continuo anno quotidie drachmæ pondere hausta.

## Ad comitiales.

Cardamomum ex aqua potum.  
Cancamum per se potum.  
Balsami semen haustum.  
Bitumen Naptha suffitum comitiales deprehendit.  
Populi nigre semen ex aceto.  
Ficus sicca in cibum acceptæ.  
Conculæ Iodicæ suffitæ excitant.  
Coagulum leporinum potum.  
Mustelæ ventriculus coriandro infarctus, inuenteratūque deuoratus.  
Mustelæ eiusdem sanguis potus.  
Asinum iecur tostum in ieiuno sumptum.  
Vngula asini combusta epota.  
Equorum lichenes triti, & ex aceto hausti.  
Lapis in hyrundinum pullorum primæ feturæ ventriculo inuentus pro amuleto in cerui aluta suspensus.  
Serum lactis potum quousque aluum citet.  
Phocæ coagulum bibitum.  
Vrsinum fel ad lingendum datum.  
Testudinis fel naribus inditum.  
Testudinis terrestris sanguis potus.  
Ciconiæ sinum ex aqua potum.  
Plantago cū lenticula decocta, in cibis sumpta.  
Sinapi tritum naribus inditum.  
Piper diu mansum.  
Scilla hausta.  
Agaricus drachmæ pondere cum oxymelite haustus.  
Eryngij radix ex dulci aqua ebibita.  
Rucæ syluestris semen potum.  
Seselis Massiliensis radix, & semen potum.  
Peucedanum ex aceto, & rosaceo capiti inunctum.

# Capitis.

Sagapenum potum.  
 Lalerpitij liquor cum aceto mulso bibitus.  
 Ladanum olfactum.  
 Ammoniacum in eclegmate cū melle datum.  
 Trifolij semen, & folia pota.  
 Conyza cum aceto bibita.  
 Anthyllis altera ex oxymelite pota.  
 Betonicæ folia hausta.  
 Quinquefolium triginta diebus haustum.  
 Papaueris Spumæ Semen cum multa aqua potum.  
 Veratrum nigrum potum.  
 Hippophæsti succus trium obolorum pondere haustus.  
 Vitis alba drachmæ pondere anno toto quotidie hausta.  
 Vitis nigræ viticulæ primæ virentes coctæ, & in cibis sumptæ.  
 Acerum mulsum potum.  
 Vinum, & acetum Scillinum potum.  
 Selenites lapis tritus ebibitus.  
 Actites lapis cum cyprino vnguento, aut glaucino, vel alio excafciente illitus.  
 Cotes naxia pota.

## Ad phrenesim.

Vnguentum crocinum perfusum, aut naribus admotum, vel illitum.  
 Vitex cum aceto, & oleo instillatus.  
 Asparagus in vino albo potus.  
 Serpillum cum aceto & rosaceo impositum.  
 Sphondylium suffitum impositum, & capiti ex oleo inunctum.  
 Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.

## Ad cerebri inflammationes, quas syriacis vocant.

Cucurbitæ ramenta fincipiti apposta.  
 Peponis ramenta fincipiti adhibita.  
 Heliotropij folia fronti adhibita.  
 Acetum fronti illitum.

## Ad melancholiam.

Ocimi semen potum.  
 Veratrum nigrum potum.  
 Betonicæ folia pota.  
 Epithymum potum.

## Ad crapulam & ebrietatē arcendam.

Crocum ex passo præsumptum.  
 Punicorum malorum succus haustus.  
 Myrti baccarum succus haustus.  
 Brassica summo cibo sumpta.  
 Absinthium præsumptum.

## Ad capitis defluxiones.

Vnguentum irinum naribus illitum.

# Neruorum.

Syrax illita, suffitque.  
 Bitumen naphtha suffitum.  
 Cinnamomum potum.  
 Mei radices tritæ cum melle in eclegmate deuoratæ, vbi fluxio pectus afficit.  
 Nuccæ auellanzæ tostæ, & cum exiguo piperis potæ.  
 Dracunculi maioris radix tosta, vel elixa deuorata.  
 Tragacantha in eclegmate cum melle sumpta.  
 Hyssopum cum fico, ruta, mellèque ex aqua decoctum potum.  
 Helibrysi coma trium obolorum pondere in vino diluto pota.  
 Hyoleyami semen oboli pondere, addito papaueris semine haustum.

## Ad cerebrum roborandum.

Agallochum potum

## Ad capitis manantia vlcera.

Thus cum Nitro confricatum.  
 Fici & caprifici lacteus succus cum polenta appositus.  
 Vrina inueterata apposta.  
 Fœnum græcum appositum.  
 Cicer adhibitum.  
 Malua ex vrina humana emplastata.  
 Allij cinis ex melle inunctus.  
 Cyclamini decoctum fomenti modo adhibiti.  
 Bulbi cum cremato Nitro adhibiti.  
 Melilorus ex aqua cum creta chia, vinoque, aut galla inuncta.  
 Rubi folia imposita.  
 Lilij cremata radix ex melle adhibita.  
 Adiantum in lixiuo decoctum.  
 Acida muria inspersa.

# NERVORVM.

## Ad conuulsionem.

Iris Illirica ex aceto pota.  
 Acori decoctum bibitum.  
 Cardamomum ex aqua potum.  
 Iunci odorati radices drachma vna cum pari pondere piperis per dies aliquot data.  
 Costus ex vino, & absinthio exhibitus.  
 Bassanum ex aqua haustum.  
 Helenium ex melle in eclegmate exhibitum.  
 Vnguentum Sampsuchinum more cataplasmatibus appositum.  
 Vnguentum Metopium illitum.  
 Bdellium illitum.  
 Iuniperi baccæ bibitz.  
 Cedrides deuoratæ.  
 Halimi radix drachmæ pondere in aqua multa hausta.  
 Ficulneus cinis ex oleo illitus.  
 Erinæei terrestris caro in cibum sumpta.  
 Castoreum inunctum, & potum.



# Neruorum

Serpillum potum.  
 Finum caprinum cum aceto bibitum.  
 Dracunculi radix tosta, & elixa deuorata cum melle.  
 Asphodeli radix drachmæ pondere pota.  
 Capparis semen potum.  
 Capparis cortex pariter haustus.  
 Argemone emplastrata.  
 Agaricus sumptus trium obolorum pondere cum mello.  
 Rhaponticum potum.  
 Galbanum deglutitum.  
 Gentianæ radix drachmæ pondere pota.  
 Aristolochia rotunda bibita.  
 Centaurij maioris radix ex vino pota.  
 Spinæ albæ semen potum.  
 Acanthij radices pota.  
 Abrotani semen cum aqua potum.  
 Leucacanthæ radicis ex vino decoctum exhaustum.  
 Origanum estum cum fisco.  
 Eryngij radix pota cum aqua mulla.  
 Pulegium cum posca potum.  
 Calaminthæ decoctum haustum.  
 Eaccharis radix in aqua decocta, & pota.  
 Panaces herculeum linitum.  
 Libanotis radices cum liliacea farina emplastrata.  
 Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.  
 Clinopodium bibitum.  
 Chamædryi decoctum potum.  
 Laser oboli pondere datum & deuoratum.  
 Sagapenum potum.  
 Galbanum deuoratum.  
 Betonice folia denarij pondere cum hydromelite data.  
 Xyridis radix ex passo bibita.  
 Symphytum ex aceto mulso bibitum.  
 psyllium illitum.  
 Serpyllum potum, aut illitum.  
 Verbasci decoctum bibitum.  
 Bryoniz eclegma ex melle.  
 Vinum scillinum haustum.  
 Vinum chamædrytes bibitum.  
 Vinum tragoriganites bibitum.  
 Satyrj radix ex vino nigro austero bibita.  
 Coris ex vino pota.

## Ad resolutionem neruorum.

Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.  
 Capparis semen, & cortex potus.  
 Sagapenum potum.  
 Rubiz radix hausta.  
 Colocynthis clistere perfusa.  
 Vitis nigræ viticulæ primæ recentes, coctæ, comestæ.  
 Vinum Scillinum haustum

## Ad tremorem.

Cerebrum leporinum tostum comestum.  
 Castoreum potum, & inunctum.

Brassica in cibo sumpta.  
 Althææ decoctum potum.

## Ad fluxiones.

Farina tritici cum Apollinaris herbe succo apposita.  
 Farina hordei ex aceto adhibita.

## Ad ægritudines & dolores.

Oleum Sicyonium inunctum.  
 Oleum laurinum illitum.  
 Elæmeli illitum.  
 Vnguentum cyprinum inunctum  
 Vnguentum Gleucinum inunctum.  
 Vnguentum Metopium inunctum.  
 Vnguentum Amaracinum inunctum  
 Bdelium malignati inferum.  
 Lixiuum ex cinere ficus ex oleo illitum.  
 Castoreum potum, & illitum.  
 Erinacei terrestriis caro deuorata in cibis.  
 Viperinæ canes decoctæ, & esui datæ.  
 Poterij radices decoctum potum.  
 Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.  
 Laser oboli pondere deuoratum.  
 Centaurium minus ebibitum.  
 Lilij radix massata, melleque excepta imposita.  
 Satyrj radix ex vino nigro austero pota.  
 Althææ radix per se, vel decocta in vino, aut aqua mulla emplastri modo imposita.  
 Coccum insectorium cum aceto illitum præciosius iuuat neruos.  
 Senecij folia ad eadem præstant illita.  
 Narcissi radix illita, ad eadem vtiliter imponitur.  
 Hippophæsti succus trium obolorum pondere potus.  
 Aqua marina perfusa.  
 Acetum Scylinum potum.  
 Vinum de fleechade haustum.  
 Vinum de thymo potum.  
 Sesamum illitum crassitiem iuuat.

## Ad Neruorum vulnera.

Cochleæ terrestres tustæ, & impositæ.  
 Terreni vermes tusti, & illiti.  
 Buryum illitum.  
 Senecionis folia emplastri modo imposita cum thuris nianna.  
 Dracunculi minoris folia illita.  
 Poterij radix tusta, & imposita.  
 Lilij radix ex melle subacta, & illita.  
 Coccum insectorium cum aceto illitum.  
 Narcissi radix illita.

## Ad Neruorum crassitiem

Sesamum emplastri modo impositum.  
 Samentitius cinis cum axungia, vel oleo illitus.

# Oculorum.

## OCULORVM.

### Ad Palpebrarum pilorum defluuium.

Nardi Indicæ decoctum fori adhibitur.  
Cochleæ terrestres acu traiciuntur vt effluat  
humor quo postea palpebræ illiniuntur.  
Oculus illitus.  
Condrillæ gummi, ac pariter lac impositum  
Lapis armenius illitus.

### Ad Palpebrarum oculorumque scabritiem.

Thuris cortex tostus, & appositus.  
Picis fuligo illita.  
Licium appositum.  
Sepiæ os leuigatum & illitum.  
Fel Marini Scorpionis illitum.  
Fel Marinæ Testudinis illitum.  
Fel Perdicis illitum.  
Fel aquilæ illitum  
Fel Gallinæ albæ illitum.  
Fel sylvestris Capræ illitum.  
Sinapi tritum ex melle inunctum.  
Omphacium impositum  
Squama aris illita.  
Rubigo ferri illita.  
Chalcitis inuncta.  
Hæmatites lapis melle exceptus adhibitus.

### Ad Palpebrarum inflammationes.

Amaraci folia cum polenta illita.  
Alfine cum polenta imposita.  
Ricini folia cum polenta trita & emplastri mo-  
do adhibita.

### Ad minuendam Palpebrarum crassitiem.

Mitulorum cinis plumbi modo lotus & il-  
litus.  
Conchulæ Indicæ cinis inunctus.

### Ad Palpebrarum scabiem.

Cappæ succus cum pari Spodio impositus.  
Aloe illita.  
Fici lac inunctum.

### Ad Oculorum albugines.

Opobalsamum illitum, instillatumque.  
Cancanum vino maceratum, & impositum.  
Myrrha illita.  
Bitumen naphtha impositum.  
Mitulorum cinis plumbi modo lotus & illi-  
tus.  
Conchulæ Indicæ cinis oculis inditus.

Cochlearum putaminum cinis melle exceptus  
linitus.

Marini Scorpionis fel instillatum.  
Idemque præstat fel testudinis, perdicis, aui-  
le gallinæ albæ & sylvestris capræ.  
Vrina humana æreo vase decocta illita.  
Lactucæ sylvestris lacteus succus instilla-  
tus.

Dracunculi succus immixtus.  
Caparum succus persufus.  
Gingiber illitus.  
Chamæfices succus cum melle inunctus.  
Argemones folia imposita.  
Ammoniacum impositum.  
Horminum ex melle impositum.  
Loti domestici succus ex melle illitus.  
Sal impositum.  
Salis flos eodem modo adhibitus.  
Sapphyrus lapis appositus  
Aëris Squama imposita.

### Ad Oculorum cicatrices delendas.

Cancanum vino maceratum & infusum.  
Myrrha illita.  
Bitumen naphtha instillatum.  
Cedria illita.  
Cochlearum terrestrium cinis cum melle im-  
positus.  
Vrina humana æreo vase decocta, infusa.  
Fœni græci oleum cum myrteo impositum.  
Sagapenum inditum.  
Chamæfices succus cum melle illitus.  
Aerugo immixta.  
Vini fixa adusta imposita.  
Corallium tritum inditum.  
Hæmatites lapis immixtus.  
Sapphyrus lapis adhibitus.  
Cochleæ terrestres cum suo putamine vstæ, &  
ex melle impositæ.

### Ad oculorum nubeculas.

Acori succus instillatus.  
Cassia aliis medicamentis ocularibus excepta,  
& iniecta.  
Cinnamomum impositum.  
Cerasi gummi inditum.  
Acacalis distillum ad collyria additur, quæ ocu-  
lis claritatem faciunt.  
Acaciæ succus elotus, & infusus.  
Punicorum malorum cyreni tres quantumvis  
minimi deuorati integro anno, ab omni lip-  
pitudine præseruant.  
Thus immixtum.  
Crocomagna illitum.  
Ebeni tenuissima ramenta vino optimo mace-  
rata, & in collyria addita.  
Lycium inditum.

# Oculorum.

Cedria inuncta.  
 Pruni arboris gummi illitum.  
 Viperae caro decocta, & in cibis desumpta.  
 Hirundines ficedularum modo in cibis deuoratae.  
 Cinis hirundinum collyriis adhibitus.  
 Adeps piscium inunctus.  
 Feeniculi succus infusus.  
 Fel Marini Scorpionis infusum.  
 Fel marinae Testudinis infusum.  
 Fel Perdicis infusum.  
 Fel aquilae infusum.  
 Fel Gallinae albae infusum.  
 Fel syluestris Caprae infusum.  
 Vrina humana aereo vase decocta instillata.  
 Lactuca syluestris lacteus succus illitus.  
 Dracunculi ma. rad. succus inunctus.  
 Ceparum succus inditus.  
 Loti domestici succus infusus.  
 Hirundinariae ma. succus aereo vase cum melle decoctus inunctus.  
 Othonnae succus instillatus.  
 Centaurij minoris succus impositus.  
 Ruta in cibis sumpta.  
 Omphacium instillatum.  
 Panaces Herac. inunctum.  
 Libanotis foliorum, & radices succus infusus cum melle.  
 Laser ex melle inunctus.  
 Apiastris succus cum melle inditus.  
 Marrubij succus ex melle illitus.  
 Pumex indita.  
 Salis flos immixtus.  
 Vini faex cremata imposita.  
 Pyrites lapis inditus.  
 Thyites lapis impositus.  
 Geodes lapis impositus.  
 Sapphyrus lapis impositus.

## Ad oculorum vngulas.

Sepiae piscis os tritum & impositum.  
 Glycyrrhizae radices puluis inspersus.

## Ad oculorum ictus, & recentia vulnera.

Lac humanum cum thure iniectum.  
 Sanguis Palumbi illitus.  
 Sanguis Columbæ illitus.  
 Sanguis Turturis illitus.  
 Sanguis Perdicis illitus.  
 Scorbis folia emplastris modo imposita.  
 Hamatites lapis cum lacte iniectus.

## Ad oculorum vlcera.

Fuligo Thuris illita.  
 Fuligo Terebinthinae illita.  
 Fuligo Butyri illita.  
 Thuris cortex impositus.  
 Myrrha iniecta.

Corna ceruinum vsum impositum lotum.  
 Amylum linitum, & peculiariter cauis vlceribus.  
 Stimmi iniectum.  
 Lapis Galactites cum lacte infusus.  
 Lapis Sapphyrus cum lacte infusus.  
 Lapis Samius cum lacte infusus.

## Ad oculos oculorum angulos.

Oesypum inunctum.  
 Omphacium illitum.

## Ad oculorum sinus & xgilotas.

Iuglandium veterum nuclei triti, & illiti.  
 Myrti decoctum infusum.  
 Malua cruda commanducata cum exiguo sale adhibita.  
 Plantago emplastris modo imposita.  
 Auriculae muris altera illita.  
 Baccharis folia emplastris modo in principio indita.  
 Anthemis illita.  
 Solani hortulani concisa folia imposita.  
 Eiusdem succus cum rubenti gallinarum fimo illitus.  
 Aegilops adhibita.  
 Oenanthes. v. labruscae flos impositus.  
 Cadmia illita.  
 Aeris squama indita.  
 Scimmi inditum.

## Ad procidentes oculos, & vuas.

Fabarum farina cum rosas, ouorum albo, & thure emplastris modo imposita.  
 Rubi folia trita, & imposita.  
 Sapphyrus lapis adhibitus.

## Ad oculorum inflammationes.

Amomum ex vna passa illitum.  
 Fuligo Thuris illita.  
 Fuligo Picis illita.  
 Cupressi pilulae cum polenta illitae.  
 Myrti baccae cum poline polenta impositae.  
 Coroneorum malorum flores emplastris modo.  
 Caseus illitus.  
 Saccharum infusum.  
 Sesameae herba ex vino decocta, & imposita.  
 Portulaca cum polenta illita.  
 Inrybus per se, & cum polenta adhibita.  
 Cucurbitae ramenta imposita.  
 Anemones radix illita.  
 Auriculae muris cum polenta emplastris modo adhibita.  
 Geutianae succus inunctus.  
 Abrotanum cum cydonio malo decoctum, aut pane, & emplastris modo adhibetur.  
 Melilotus cataplasmatibus addita.  
 Baccharis folia illita.

# Oculorum.

Sedi maioris folia imposita.  
 Apium cum pane, aut polenta impositum.  
 Rubi Idei flos ex melle inunctus.  
 Elatinæ folia cum polenta imposita.  
 Papaveris liquor cum tolla oui vitello, & croco impositus.  
 Hyoscyami semen, & folia cum farina, polentæ imposita.  
 Mandragoræ folia recentia cum polenta adhibita.  
 Verbasci aureum florē ferentis folia imposita.  
 Aster Atticus illitus.  
 Violæ purpureæ folia illita.  
 Ricini folia cum polenta imposita.

## Ad oculorum dolores.

Oui vitellus tostus addito rosaceo, & croco illitus.  
 Sefamæ herba in vino decocta illita.  
 Ocimi succus infusus.  
 Absinthium ex passo decoctum adhibutum.  
 Ruta cum polenta emplastri modo imposita.  
 Aconiti pardalanches radix permiscetur ocularijs medicamentis, quæ doloribus oculorum auxiliantur.

## Ad lusciosos.

Iecoris Caprini emanans succus dum assatur iniectus.  
 Iecoris Hyrcini emanans succus dum assatur iniectus.  
 Caprinum iecur tostum in cibis sumptum.  
 Sylvestrium caprarum fel inunctum.  
 Sanguis Palumbi illitus.  
 Sanguis Columbæ illitus.  
 Sanguis Turturis illitus.  
 Sanguis Perdici illitus.

## Ad oculorum suffusiones.

Fel marini Scorpionis inditum.  
 Viperaæ adeps admisto cedrino liquore, Attico melle, & vetere oleo. Galenus verò non probat.  
 Fel testudinis marinae illitum.  
 Fel Perdici illitum.  
 Fel Aquilæ illitum.  
 Fel Gallinæ albæ illitum.  
 Fel Capræ sylvestris illitum.  
 Fabarum farina vino macerata, & illita.  
 Caprarum succus instillatus.  
 Cyclamini succus infusus.  
 Sagapenum impositum.  
 Euphorbium impositum, cum cautela tamen.

## Ad oculorum hebetudinem.

Cancanum ex vino maceratum infusum.  
 Populi albæ pilulæ, quæ primo foliorum exornu exiliunt ex melle illitæ.

Marini Scorpionis fel inunctum.  
 Brassica in cibo sumpta.  
 Sinapi cum melle inunctum.  
 Anagallidis succus naribus exceptus.  
 Absinthium cum melle impositum.  
 Thymus in cibo sumptus.  
 Thymbræ obsoniis addita.  
 Rutæ succus in malicorio servescit, addito feniculi succo & melle infusus.  
 Rutæ sylvestris succus cum vino melle, gallinarum felle, & feniculi succo iniectus.  
 Solani somnifici succus inunctus.  
 Flos salis inditus.

## Ad oculorum fluxiones cohibendas.

Crocum illitum cum humano lacte.  
 Thus ex oui vitello impositum, vel eiusdē albo.  
 Thuris fuligo imposita.  
 Picis fuligo illita.  
 Plarani tenerima folia in vino decocta & illita.  
 Ebeni ramenta tenuissimè trita indita.  
 Oleæ sylvestris foliorum luccus iniectus.  
 Cornu cervinum vsum, lotum, & iniectum.  
 Butyri fuligo illita.  
 Amylum impositum.  
 Pompholix elota iniecta.  
 Fabæ sine cortice commanducatæ, & fronti impositæ.  
 Ocimi aquatici semen duarum drachmarum pondere ex quatuor mellis cyathis temperatum, inunctum.  
 Elatinæ folia cum polenta imposita.  
 Squama æris elota iniecta.  
 Plumbum elotum iniectum.  
 Galactites Lapis cum lacte iniectus.  
 Morocethus Lapis cum lacte iniectus.  
 Sarmius Lapis cum lacte iniectus.  
 Hyoscyami sem. cremor expressus infusus.  
 Sarcocolla infusa.  
 Alumen impositum.  
 Corallium iniectum.  
 Pumex impositus.  
 Hæmatites lapis iniectus.

## Ad oculorum lippitudines.

Portulaca, & eius succus impositus.  
 Plantaginis succus infusus.  
 Sedi maioris folia illita.  
 Chalcitis inditus, cum cautela tamen.  
 Spongiarum crematarum cinis illitus, & praesertim in arida lippitudine.  
 Hæmatites lapis tritus, cum lacte iniectus.

## Ad oculorum caligines.

Chamædrys trita inperfa, aut ex oleo inuncta.  
 Loti domesticici succus cum melle impositus.  
 Veratrum nigrum in ocularibus collyriis additum.  
 Flos aris inditus.

# Aurium

## AVRIVM. Ad aurium dolores.

Lauri baccarum succus vino vetere, & rosaceo exceptus instillatus.  
 Populneorum foliorum succus infusus.  
 Ladanum ex vino illitum.  
 Rosarum aridarum decoctum ex vino infusum.  
 Salicis foliorum, & corticis succus cum rosaceo in malicorio seruefactus illitus.  
 Malorum acidorum puniceorum succus cum melle coctus infusus.  
 Opium cum amygdalino oleo, croco, myrrhaeque in acetum.  
 Anguium senectis in vino decocta instillata.  
 Millepedae, siue onisci concissi, & cum rosaceo in malicorio calefacti infusi.  
 Vulpini pulmonis adeps instillatus.  
 Vermes terreni cum asserino adipe elixi inditi.  
 Asserinus adeps instillatus.  
 Gallinaceus adeps instillatus.  
 Vulpinus adeps instillatus.  
 Urina Tauri cum myrrha cocta instillata.  
 Urina Apri cum myrrha cocta instillata.  
 Mel cum trito fossili sale infusum.  
 Sesami semen ex rosaceo in acetum.  
 Betae succus inditus.  
 Plantaginis succus immixtus in calida materia.  
 Cucurbitae ramentorum succus cum rosaceo infusus.  
 Draconceli utriusque succus instillatus.  
 Porri succus cum aceto, thure, & lacte iniectus.  
 Sinapis succus, vel eius decoctum instillatum.  
 Hederae, & eius corymborum succus cum oleo inditus.  
 Absinthium suffitum, & cum melle impositum.  
 Origanum virentis succus cum lacte infusus.  
 Mentae succus inditus.  
 Melilori succus cum passo iniectus.  
 Rutae succus in malicorio seruefactus infusus.  
 Peucedani succus cum rosaceo inditus.  
 Aparinæ succus iniectus.  
 Marrubij succus in rosaceo instillatus.  
 Cannabis domesticæ succus impositus.  
 Polygoni mari succus infusus.  
 Helixæ succus inditus.  
 Ocimi aquatici succus cum sulphure, & nitro iniectus.  
 Hyoscyami seminis cremor instillatus.  
 Solani hortensis succus impositus.  
 Alinae succus infusus.  
 Cucumeris asinini foliorum succus inditus.  
 Sal cum aceto iniectum.

## Ad aurium internas inflammationes.

Crocum iniectum.  
 Sesamum cum rosaceo impositum.

## Ad aurium parotidas

Oesypum impositum.

Caprarum montanarum simus, vino vel aceto decoctus illitus.

Lini semen tritum, & emplastri modo impositum.

Fabrarum farina cum melle, & saeno graeco illita.

Rumex decoctus adhibitus.

Plantago emplastri modo illita.

Irionis semen cum decoctumque appositum.

Hyssopum suffitum incensum & impositum.

Vitum cum pari resinae, ac cere commixtum adhibetur.

Althea decocta illita

Psyllium ex rosaceo, acetoque, aut aqua impositum.

Solani hortulani folia cum sale illita.

Galiopsis ex aceto adhibita.

Cimolia terra imposita.

## Ad purulentas aures.

Myrrha cum meconio, castoreo & glaucio iniecta.

Thurs ex vino dulci infusum.

Resina Terebinthina ex melle, & oleo indita.

Resina Larigna ex melle, & oleo indita.

Resina Abiegna ex melle, & oleo indita.

Resina Picea ex melle, & oleo indita.

Lycium infusum.

Rhois decoctum iniectum.

Myrthi baccarum succus instillatus.

Olea sylvestris foliorum succus ex vino infusus.

Taurinum fel cum caprillo, humanove lacte instillatum.

Urina infusa.

Vmbilicus Veneris cum medulla cervina iniectus.

Asphodeli radicum succus per se, & additis thure, melle, vino, & myrrha instillatus.

Caprae succus impositus.

Absinthium cum melle inditum.

Ansum cum rosaceo instillatum.

Sphondilij florum succus instillatus.

Polygonij succus infusus.

Stæbis decoctum iniectum.

Psyllij succus inditus.

Omphacium cum melle inpositum.

Alumen sanguinalis herbae succo exceptum infusum.

Flos salis iniectus.

## Ad contusas aures.

Bulbi cum polenta impositi.

Sulphur cum vino & melle illitum.

## Ad exulceratas aures.

Oesypum impositum.

Suillum fel instillatum.

# Aurium.

## Ad aurium surditatem.

Hastulæ regię radicum ex oleo decoctum in-  
tectum.  
Cepæ succus instillatus.  
Veratrum nigrum immisum, & relictum vsq;  
in diem tertium.  
Bryoniæ succus cum melle instillatus.  
Flos æris candidus per fistulam statim impulsus.  
Sulphur raptim per fistulam suffitum.

## Ad aurium tinnitum, & in- certos sonos.

Cedria infusa.  
Lauri baccharum succus cum vino vetere, &  
rosaceo instillatus.  
Ficus siccæ tritæ cum sinapi, & liquore aliquo  
exceptæ iniectæ.  
Taurinum sel infusum.  
Mel cum trito fossili sale inditum.  
Porri succus cum thure, aceto, lactœque instil-  
latus.  
Cepæ succus impositus.  
Sinapi tritum, & cum sico iniectum.  
Acetum calidum suffitum per traiectorium in  
strumentum.

## Ad vermiculosas aures.

Cedria cum aceto instillata.  
Urina humana in malicorio decocta instil-  
lata.  
Capparis radice succus iniectus.  
Calaminthæ succus instillatus.  
Psylli succus inditus.  
Acetum infusum.

# N A R I U M.

## Ad sanguinis narium fluxiones.

Thus in puluerem tritum iniectum.  
Cocleæ terrestres cum suo putamine tritæ, &  
impositæ.  
Porri seminis succus cum thuris polline instil-  
latus.  
Ruta trita indita.  
Viticæ variusque folia cum succo imposita.  
Cuminum ex aceto impositum.  
Ferulæ medulla inuomissa.  
Lyfimachia imposita.  
Clymeni succus inditus.  
Gaiopis flos impositus.  
Equiseti succus infusus.  
Acetum tum potum, tum iniectum.  
Serapientes adhibita.  
Chalcitis succo porri instillata.

## Ad sanguinem è Naribus eliciendum.

Crocodilij radice decoctum bibitum.

# Narium.

## Ad Narium Polypum.

Cupressi pilulæ cum sico tustæ, & impositæ.  
Dracunculi maioris radix imposita.  
Lasertij liquor cum calchantho, aut rasili  
ærugine illitus forcipe prius exciso polypo.  
Flos æris inditus.  
Sandaracha cum rosaceo immissa.

## Ad Narium vlcera & carcinomata.

Dracunculi maioris radix imposita.  
Hederæ succus infusus.  
Sandaracha cum rosaceo iniecta.

## Ad Narium tedia.

Hederæ succus infusus.

## Ad Narium destillationes.

Melanthij semen tritum, & in lanceolocolligat-  
um, sepe ac sepius olfactum.

## Ad trahendum per nares.

Cepæ succus infusus.  
Origani variusque succus iniectus cum Irino  
unguento.  
Cyclamini maioris succus instillatus.

## Adicienda sternutamenta.

Fibrorum testiculi iniecti.  
Ocymi semen, aut succus naribus infusus.  
Sinapi tritum inditum.  
Ranunculi radix sicca, tritaque iniecta.  
Parmicæ flores olfacti.  
Struthij radix imposita.  
Veratrum album tritum iniectum.

# ORIS ET LINGVAE.

## Ad erodentia vlcera.

Cyperij radice farina in os indita, etiam si vl-  
cera depascantur, vorèntque.  
Aspalathi ex vino decoctum ore collutum, ad  
tetraoris vlcera.  
Acacia indita.  
Plantaginis succus in ore detentus.  
Capparis in aceto decocta in collusione.  
Glycyrrhizæ succus in ore detentus.  
Origani succus in ore contentus.  
Leucoij flores ex melle impositi.  
Testiculus serapias impositus.  
Anthemis manfa.  
Britannicæ succus infusus.  
Tribuli succus ex melle delinctus.  
Rubi decoctum in ore detentum.  
Quinquefolij radice decoctum ore collutum.  
Verbenaca altera ex vino affusa.  
Staphis agria cum melle indita.

# Dentium.

Labruscæ bos ori inpersus.  
Alumen cum melle impositum.  
Sal cum polenta tostum, & iniectum.

## Ad oris halitum commen- dandum.

Resina lentiscina manducata.  
Myrrha mansa.  
Mala medica manducata.  
Anisum mansum.  
Bromus cum siccis rosis decocta, in ore re-  
tenta.

## Ad linguæ scabritiem.

Mentha confricata.  
Rhoisemen cum melle fricatum.

## DENTIVM.

### Ad dentes purgandos.

Cinis Purpureæ dentibus affricatus.  
Cinis Buccinæ dentibus affricatus.  
Cinis Mitulorum dentibus affricatus.  
Cinis Conchulæ Indicæ dentibus affricatus.  
Cinis cochlearum terrestrium dentibus affri-  
catus.  
Cinis Sepiæ piscis dentibus affricatus.  
Cinis Ceruini cornu dentibus affricatus.  
Plantaginis radices decoctum in collutio-  
nibus.  
Aristolochia rotunda confricata.  
Aleyonium quintum dentibus affricatum.  
Pumex dentibus affricata.  
Arabicus lapis dentibus affricatus.  
Samius lapis, dentibus affricatus.

### Ad dentium dolorem.

Piceæ, & pini folia trita ex aceto decocta fre-  
quenti collutione.  
Cedria dentium cauis indita.  
Platani corticis ex aceto decoctum ore collu-  
tum.  
Tamaricis foliorum ex vino decoctum in ore  
detentum.  
Olei amurca in cupreo vase ad mellis crassi-  
tatem decocta ex aceto, aut vino, aut mullis  
collata.  
Mori corticis decoctum, aut pariter foliorum  
in collutionibus adhibitum.  
Ficulinum lac lana exceptum, & cauis denti-  
bus inditum.  
Anguim feneſta ex aceto decocta in collutio-  
nibus.  
Pastinacæ piscis aculeus in eius cauda promi-  
nens, dentibus adhibitus.  
Ranarum ex aqua & aceto decoctum in collu-  
tionibus.  
Lacertæ iecur cauis dentium impositum.

Vermes terreni oleo elixi, & in contrariam  
aurem instillati.  
Rumicis decoctum in collutionibus.  
Asparagi radicem decoctum in ore conten-  
tum.  
Asphodeli radicem succus in contrariam au-  
rem infusus.  
Allij, tedæ, thurisq; simul decoctum in ore  
contentum.  
Ononis radices ex posca decoctum in collutio-  
nibus.  
Capparis seminis decoctum in collutionibus.  
Idem præstat Capparis cortex. Quin & radix  
commanducata.  
Lepidij (vt aiunt) radix collo suspensa.  
Ranunculi radix imposita.  
Anagallidis succus in contrariam narium par-  
tem infusus.  
Hederæ corymborum acini quinque cum rosa-  
ceo in malicorio seruati in contrariam  
aurem instillati.  
Chamæleonis nigri decoctum in ore conten-  
tum.  
Spinæ albæ decoctum in collutionibus.  
Leucacanthæ radix commanducata.  
Abſinthij decoctum suffitum.  
Hysſopi ex aceto decoctum in ore retentum.  
Panaces Heracleum dentium cauis inditum.  
Pyrethri decoctum ex aceto in ore acceptum.  
Peucedani succus cauis dentium indicus.  
Nigellæ decoctum, vni cum tedæ ex aceto in  
ore detentum.  
Laserpiij liquor cauis dentium impositus.  
Galbanum illitum, & eorum cauis inditum.  
Apiastri decoctum in collutionibus.  
Aithææ decoctum ex aceto in ore detentum.  
Beronicæ decoctum ex vino, vel aceto.  
Clematis prima commanducata.  
Polemonij radix commanducata.  
Quinquesolij radices decoctum in ore reten-  
tum.  
Hyoscyami radices ex aceto decoctum in collu-  
tionibus.  
Solani somnifici ex vino decoctum in ore re-  
tentum.  
Ephemerij radices decoctum in collutionibus.  
Verbasci decoctum collutum.  
Arction ex vino decocta, & in ore detenta.  
Cucumeris sylvestris decoctum in os sumptum.  
Colocynthidis decoctum in collutionibus.  
Staphis agricæ decoctum ex aceto in ore con-  
tentum.  
Tithymali caraciæ lac dentium cæuicis indi-  
tum, deinde prius cera munito, ne lac in fau-  
ces incidat.  
Acetum calefactum in collutionibus.  
Sory dentium cauis inditum.

### Ad dentes cariosos frangendos.

Cedria eorum cavitatibus indita.  
Amurca olei cum omphacio recocta ad mellis  
crassitudinem, & imposita.

Pastina

# Gutturis & Gulæ.

*Passinacæ piscis aculeus impositus.*  
*Ranunculi radix iniecta eorum cavitatibus.*  
*Chamaeleonis nigri radix cauernis dentium in-*  
*ditæ.*

## Ad firmandos commotos dentes.

*Lentisci decoctum in ore retentum.*  
*Colymbadum muria in collutionibus adhi-*  
*bita.*  
*Syluestris oleæ oleum in ore contentum.*  
*Sory in collutionibus.*  
*Alumen cum aceto, & melle solutum, & adhi-*  
*bitum.*

## Ad dentium torporem.

*Portulaca manducata.*

## Ad fluidas gingiuas.

*Cyperî farina imposita.*  
*Rosarum aridarum ex vino decoctarum ex-*  
*pressus liquor, in collutionibus impositus.*  
*Colymbadum muria in ore contenta.*  
*Oleum syluestris oleæ in ore detentum.*  
*Gallæ quoquo modo adhibitæ.*  
*Mali punici flores cytini in decoctis mace-*  
*rati, & in collutionibus additi.*  
*Prunorum foliorum decoctum in ore reten-*  
*tum.*  
*Lac asinum in collutionibus.*  
*Pulegium siccatum, crematumquo & in pulue-*  
*rem tritum appositum.*  
*Rubi decoctum in ore detentum.*  
*Staphis agricæ decoctum in collutionibus.*  
*Omphacium cum melle impositum.*  
*Acetum in collutionibus adhibuitum.*  
*Rubigo ferri illita.*  
*Alumen quocunque modo adhibuitum.*  
*Sal tostum cum polenta impositum.*  
*Alabastrites Lapis tritus impositus.*  
*Smyris Lapis tritus impositus.*

## Ad erosas putridasque gingiuas.

*Cancanum impositum, nihilque eo efficacius.*  
*Lycium attritum impositum.*  
*Plantaginis succus in ore detentus.*  
*Aloe ex vino, & melle illita.*  
*Tribuli vniuersus fructus ex melle impositus.*  
*Labruscæ florum combustorum cinis cum mel-*  
*le illitus.*  
*Acetum in collutionibus.*  
*Chalcitis trita, & imposita.*  
*Alumen tritum, & impositum.*  
*Pumex trita, & imposita.*  
*Aerugo trita, & imposita.*

## G V T T V R I S E T

G V L A E.

## Ad Anginam.

*Pix liquida peruncta.*

*Mori fructus succus in æreo vase decoctus, in-*  
*folatûsque cum mellis exiguo illitus.*  
*Multipedæ siue Orosij ex melle inuncti.*  
*Cinis crematarum hyrundinum ex melle more*  
*emplastri adhibitus.*  
*Hyruindines sale inueteratæ drach. j. pondere*  
*cum aqua potæ.*  
*Fel taurinum cum melle inunctum.*  
*Fel testudinis illitum.*  
*Acetum gargarizatum.*  
*Mel gargarizatum.*  
*Cæpæ succus inunctus.*  
*Piper cum melle inunctum.*  
*Abfinthium cum melle, & nitro illitum.*  
*Raphani semen ex aceto raulso gargarizatum.*  
*Hyssopi cum sico decoctum gargarizatum.*  
*Laserpitij liquor cum multa aqua gargariza-*  
*tus.*  
*Violæ purpureæ ex aqua cocta, & potæ,*  
*Elæterium efficacissimè illinitur cum melle, ve-*  
*tere oleo, aut felle taurino.*  
*Sal ex melle, oleo, & aceto illitum.*  
*Spartij succus è ramis in aqua maceratis, &*  
*mox tufis, extractus, & illitus.*

## Ad Gutturis inflammationes.

*Cinis crematarum hyrundinum ex melle more*  
*emplastri applicius.*  
*Lac gargarizatum.*  
*Renæ oleo elixæ ceruicis & colli abscessibus*  
*illitæ.*  
*Mel illitum.*  
*Origanî virentis succus gargarizatus.*  
*Helixine succus gargarizatus, forisque inun-*  
*ctus.*  
*Vericæ vniuersus succus gargarizatus.*  
*Chalcitis imposita.*  
*Alumen illitum.*  
*Sal tostum cum melle inunctum.*  
*Acetum gargarizatum.*  
*Aloe cum vino aut melle apposita.*  
*Britannicæ succus illitus.*  
*Tribuli fructus ex melle impositus.*  
*Rubi mororum succus gargarizatus.*  
*Ficum siccatum decoctum gargarizatum.*

## Ad columellam reprimendam.

*Laserpitij liquor cum melle inunctus.*  
*Pruni foliorum ex vino decoctum gargariza-*  
*tum.*  
*Omphacium impositum.*  
*Acetum gargarizatum.*  
*Flos zris in puluerem subtilissimum imposi-*  
*tus.*

## Ad Gulæ destillationes.

*Papaueris vasculorum decoctum ex melle in*  
*eclegmatis forma redactum, sepiusque lin-*  
*ctum.*  
*Bdellium cum ieiuna salina dilutum, & illi-*  
*tum.*

Verbe



# Pectoris.

Verbenaca altera ex vino gargarizata.  
 Omphacium impositum.  
 Flos æris pulverizatus, & impositus.  
 Alumen impositum.  
 Accetum gargarizatum.

## Ad Faucium & Tracheæ arteriæ asperitates.

Myrrha linguæ subdita, ibique liquata.  
 Prifana hordeacea gargarizata.  
 Amylum delinctum.  
 Sinapis succus gargarizatus.  
 Glycyrrhizæ succus linguæ subditus.  
 Tragaecanthæ in eclegmate cum melle sumpta.  
 Læserpitiij liquor aqua dilutus in delinctu.  
 Symphytum petraeum commanducatum.  
 Quinquefolij radicis decoctum gargarizatum.  
 Aethiops cum melle in eclegmate.  
 Lac gargarizatum.  
 Licium attritum, & delinctum.

## PECTORIS ET PVLMONIS.

### Ad cruenta sputa & sanguinis reiectiones.

Ouum tepidum bibitum.  
 Cornu ceruini cinis lotus, & ebibitus cum tragaecanthæ.  
 Climenon potum.  
 Serpilli succus drachmarum duarum pondere cum aceto potus.  
 Fimum caprinum tritum, in vino, aquæ potum.  
 Triticea farina glutinis modo elixa, in delinctu data.  
 Amylum potum.  
 Ferulæ viridis medulla pota.  
 Portulacæ ad summum cocta deuorata.  
 Plantago quoquo modo exhibitæ, præsertim succus.  
 Eiusdem semen potum.  
 Porri semen drachmarum duarum pondere cum paribus myrti baccis.  
 Agaricus trium obolorum pondere cum aqua multa potus.  
 Rhaponticum haustum.  
 Lyfimachiz succus haustus, & persusus.  
 Centaurij maioris radix pota.  
 Spinæ albæ radix hausta.  
 Arabizæ spinæ radix pota.  
 Aloë cochlearium duorum pondere cum frigida aqua vel sero pota.  
 Polygoni maris succus potus.  
 Saluæ succus in orbiculos concretus cum melle sumptus.  
 Symphytum petraeum cum aqua potum.  
 Mentizæ succus cum aceto potus.  
 Althææ decoctum potum.

Betonizæ folia trium obolorum pondere in diluta vini portione hausta.  
 Symphyti alterius radix pota.  
 Achillea hausta.  
 Tragi cacumina decem in vino bibita.  
 Personatæ radix cum pineis nucibus pota.  
 Ispoyri semen potum.  
 Adiantum potum.  
 Tricomanes pota.  
 Vitis vinifera foliorum, & capreolorum succus haustus.  
 Labruscæ flores poti.  
 Omphacium porcæ potum.  
 Corallium haustum.  
 Hæmarites lapis cum mali punici succo pota.  
 Morochthus lapis cum mali punici succo pota.  
 Samia terra cum mali punici succo pota.

### Ad Phitism, seu Tabem.

Pistacia per se, aut ex melle sumpta.  
 Pinæ nuces per se, aut ex melle sumptæ.  
 Terebinthina, resina per se, vel ex melle more eclegmatis deuorata.  
 Pix liquida in eclegmate ex melle cyathi mensura deuorata.  
 Iuniperi baccæ haustæ.  
 Lauri baccæ tritæ cum melle vel passò, deuorata.  
 Ficus siccæ cum hyssopo feruifacitæ, & potæ.  
 Canceri fluuiatiles elixi cum suo iure sumpti.  
 Lac humanum ex vberē succum.  
 Ius esulentum omnium adipum datum.  
 Plantago in potu exhibitæ.  
 Porrum cum melle decoctum.  
 Agaricus drachmæ pondere sumptus cum passò.  
 Acanthi radices potæ.  
 Marrubij folia, siue expressus succus potus.  
 Betonizæ folia cum melle data.  
 Myrrhis in forbitione pota.  
 Asij lapidis flos ex melle delinctus.

### Ad pulmonis abscessus.

Semen cyclaminis secundæ speciei quadraginta diebus potum.  
 Tragoriganum cum melle in eclegmate exhibitum.  
 Tussilaginis siccæ, incensæque fumus ore haustus, apoftemata interna pectoris rumpit.

### Ad suspiriosos.

Lauri baccæ tritæ cum melle, vel passò, & exhibitæ.  
 Ficus siccæ cum hyssopo decoctæ, & potæ.  
 Vulpinus pulmo exiccatu bibitus.  
 Ius fenugalli potum.

Vinum

# Et pulmonis.

Vinum hyssopites bibitum.  
 Plantago cum lenticula decocta comesta.  
 Rhaponticum bibitum.  
 Aqua mulla pota.  
 Aristolochia rotunda bibita.  
 Centaurij maioris radix pota.  
 Hyssopum decoctum cum fico, aqua, melle, rutique potum.  
 Stoechas ex aqua decocta pota.  
 Pulegium cum melle, & aloë potum.  
 Scylla ex melle trium obolorum pondere delincta.  
 Thymum cum melle decoctum potum.  
 Satureia eodem modo pota.  
 Baccaris radice decoctum potum.  
 Ruta pota.  
 Peucedani succus in ovo sumptus.  
 Nigella in vino pota.  
 Galbanum deglutitum.  
 Marrubij decoctum, siue expressus succus potus.  
 Parchenium ex oxymelite sumptum.  
 Anagyris folia cum passo bibita.  
 Periclymeni semen potum cum vino.  
 Adianti decoctum potum.  
 Fidicula siue Trichomanes hausta.  
 Elaterium optima suspensio est purgatio.  
 Thapsie succus exhibitus.  
 Bryonia cum melle in eclegmate sumpta.  
 Sandaracha non resina in catapotis data.  
 Sulphur in ovo sumptum, vel suffitum.  
 Agaricum drachmæ vnius pondere datum.  
 Cancamum haustum ex aqua vel mullis.

## Ad Tussim.

Iris Illyrica assumpta.  
 Cardamomum ex aqua potum.  
 Cinnamomum deoratum, vel potum.  
 Calamus odoratus suffitus per se, vel ex resina terebinthina.  
 Helenij eclegma ex melle deglutitum.  
 Myrrha ad quantitatem fabæ deorata.  
 Syrax data in eclegmate.  
 Bellium datum in eclegmate.  
 Terebinthine resinæ ex se, vel ex melle eclegma delinctum.  
 Malix pota.  
 Iuniperi bacce bibitæ.  
 Cedri fructus deuorati.  
 Palturi semen potum.  
 Ladanum in medicamentis, & malagmatibus insertum.  
 Cerasi gummi cum vino diluto exhaustum.  
 Amygdalæ amaræ cum melle, & lacte in illinctu data.  
 Gummi amygdalarum amararum cum vino diluto potum.  
 Nuces auellaneæ cum aqua mulla potæ.  
 Ficus sicca deuorata.  
 Camedryi decoctum potum.  
 Scordium potum.

Tussilago sicca sumpta, siue incensa, accepto fumo per os.  
 Propolis suffita.  
 Mel deglutitum.  
 Farina tritici glutinis modo elixa, & ad lingendum cum mentha, & butyro data.  
 Farinæ auenæ cremor in sorbitione receptus.  
 Semen lini cum melle, & pipere sumptum.  
 Fabæ in cribis acceptæ.  
 Raphanus elixus manducatus, præsertim in vetere tussi.  
 Dracunculi maioris radix testa, & elixa deuorata.  
 Asphodeli radix trium drachmarum pondere pota.  
 Allium crudum, & coctum assumptum in vetere tussi.  
 Irionis semen cum melle linctum.  
 Piper delinctum acceptum.  
 Scilla cum melle in eclegmate in diutinis tussibus.  
 Centaurij maioris radix hausta, in antiqua.  
 Tragacantha in eclegmate cum melle.  
 Hyssopum cum melle, fico, rutique ex aqua decoctum.  
 Stoechas eodem modo parata.  
 Origanum in eclegmate cum melle linctum.  
 Tragoriganum eodem modo paratum.  
 Baccharis radicum decoctum potum, in diutina.  
 Panaces cum vino dulci potum.  
 Sefelis Massiliensis radix, & semen haustum.  
 Smyrnij radix comesta.  
 Dauici semen potum, in diutina.  
 Peucedani succus in ovo sumptus.  
 Laserpitij liquor in forbili ovo datus.  
 Marrubij decoctum, siue expressus succus bibitus.  
 Galbanum deglutitum, in vetere.  
 Sagapenum deuoratum, in diutina.  
 Hellebori succus cyathi pondere bibitus in diutina.  
 Equiseti radix: & herba pota.  
 Iunci decoctum bibitum.  
 Papaueris vascula in aqua ad dimidium decocta, decoctoque addito melle, vt eclegma fiat ad lingendum.  
 Hyoscyami semen potum.  
 Verbasci decoctum potum, in antiqua.  
 Cacaliæ radix vino madefacta comesta.  
 Bryonia cum melle in eclegmate delincta.  
 Vux pastæ albæ caro exiccata deuorata.  
 Aqua mulla pota.  
 Taphsa illita.  
 Vinum hyssopites bibitum.  
 Sandaracha suffita cum resina, accepto vapore per stilulam vel traiectorium.  
 Sulphur in ovo sumptum, vel suffitum.

## Ad pectoris asperitates.

Glycyrrhizæ succus in ore retentus quousque colliquefact.

Radix

# Pectoris.

Radix cacaliæ in vino madefacta, & delin-  
cta.

## Ad vocem expediendam.

Myrrha linguæ subdita, quousque tota li-  
queſcat.  
Tragacantha ex melle in delinctu adhibita.  
Laser aqua dilutum, & in sorbitione ſum-  
ptum.  
Stryx delinctu.  
Brassica commanducata.  
Vinum hyssopites.

## Ad pleuretim.

Suillus adeps ex vino lotus & cum cinere, &  
calce coactus impositus.  
Pastinacæ erraticæ semen potum.  
Sagapenum emplastri modo illitum.

## Ad Lateris dolores ubi febris absit.

Fimum caprillum cum cera, & oleo subactum,  
impositum.  
Hordeacea farina vna cum meliloto, & papa-  
uerum vasculis ex mulſo elixa, illita.  
Brassicæ caules virides cremati, & ſuillo adipe  
excepti, & impositi.  
Leucanthæ radicis ex vino decoctum hau-  
ſtum.  
Aſphodeli radix drachmæ pondere ex vino  
pota.  
Gentianæ radicum succus drachmæ pondere  
ſumptus.  
Aristolochia rotunda ex aqua bibica.  
Centaurij maioris radix pota.  
Laser in sorbitionibus datum.  
Galbanum illitum.  
Marrubij folia ex melle adhibita.  
Trifolij bituminosi folia, ſemenæ potum.  
Aethiopis pota.  
Acori decoctum potum.  
Costus cum abſinthio, & vino potus.  
Agallochum ex aqua potum.  
Myrrha ſabæ pondere deuorata.  
Bdellium hauſtum.  
Refina terebinthina illita, appoſitaue.  
Bryonia ex melleo eclegmate delincta.

## Ad Pulmonis inflammationes.

Ocimum cum polenta illitum.  
Viticæ vtriuſque ſemen cum melle delin-  
ctum.  
Tragoriganum ex melle in eclegmate ſum-  
ptum.  
Chryſocome pota.  
Aqua mulſa hauſta.

## Ad purulentas excreationes.

Irionis ſemen cum melle delinctum.  
Betonice folia drachmarum duarum pondere  
in aquæ mulſe cyathis quatuor pota.  
Perſonate radix cum pineis nucibus ſum-  
pta.  
Aethiopis hauſta.  
Vinum hyssopites.  
Sandaracha ex mulſo data. (Hoc medicamen-  
tum ego nunquam probauerim.)  
Sulphur in ovo potum, vel ſuffitum.  
Vinum hyssopites bibitum.

## Ad aſthmaticos.

Lauri bacæ ex melle, vel paſſo acceptæ.  
Ficus ſiccæ cum hyſſopo ſeruefactæ, & potæ.  
Vrina impubis pota.  
Ruta epota.  
Cyclamini alterius ſemen potum.  
Dracunculi maioris radix toſta, & elixa cum  
melle in eclegmate ſumpta.  
Aqua mulſa pota.  
Spondilij ſemen, & herba ipſa in ſorbitione.  
Equiseti radix, & folia hauſta.  
Abrotani vtriuſque ſemen tritum, & cum aqua  
potum.  
Hyſſopum cum ſico, melle, rutæque ex aqua  
decoctum, potum.  
Calaminthæ decoctum potum.  
Vinum hyssopites hauſtum.  
Thymi cum melle decoctum potum.  
Saturnia cum melle hauſta.  
Seſeli Maſſilienſe potum.  
Fidiculæ ſue Trichomanis decoctum bibitum.  
Cuminum cum poſca ſumptum.  
Smyrniæ radix comecta.  
Tapſia ſilira.  
Ammoniacum bibitum.  
Meliphylly ſolia in eclegmate delincta.  
Tuſſilago ſicca & ſuffita, adeo vt ſumus in os  
ingredietur.  
Hippophæſi ſuccus trium obolorum pondere  
hauſtus.  
Botrys pota, vel in eclegmate data.  
Periclimeni ſemen potum.  
Adianti decoctum bibitum.

## Ad renitentes excreationes.

Iris illyrica pota.  
Coagulum ſeræ omne potum.  
Raphanus elixus deuoratus.  
Porrum cum piſſina coctum eſui datum.  
Naſturtium coctum, in ſorbitione datum.  
Bulbi breui coctura elixi, & in cibum ſumpti.  
Ammoniacum in eclegmate datum.  
Scordium potum.  
Tapſia ſilira.

## Cordis.

Lini semen in eclegmate delinctum.  
 Scillæ sicæ oboli tres ex melle in eclegmate  
 exhibiti.  
 Marrubium sicum potum cum iridis farina.  
 Vinum hyssopites haustum.

### Ad pectoris destillationes.

Irionis semen cum melle delinctum.

### Ad omnia pectoris incommoda.

Porrum cum melle decoctum comestum.  
 Glycyrrhizæ succus bibulus.  
 Thymus mellis mistus in delinctu sumptus.  
 Thymbra eodem modo parata.  
 Tordilij radix in eclegmate cum melle sumpta.  
 Libanotis radices potæ.  
 Symphytum petræum in mulso decoctum bi-  
 bitum.  
 Quinquefolij radiceis succus potus.

## C O R D I S.

### Ad Defectum animi.

Cucumis olfactus.  
 Polegium ex aceto naribus admotum.  
 Buglossum potum.

### Ad Cardiacam.

Intybus per se & cum polenta illita.  
 Absinthium in passio decoctum, & appositum.  
 Rubi folia illita.

### Ad Præcordiorum duritiem.

Rhaponticum potum.  
 Vinum absinthites potum.

### Ad Verustas præcordiorum In- flammationes.

Scordium cum cera coactum impositum.

## M A M M A R V M.

### Ad Mammarum inflammationes.

Thus cum cimolia, & rosaceo inunctum.  
 Cydonia mala cataplasmatibus adiecta, & illita.  
 Noces iuglandes cum ruta, & exiguo melle  
 imposita.  
 Fabarum lomentum per se, & cum polenta il-  
 litum.  
 Asphodeli radices, & folia ex vino adhibita.  
 Irionis semen illitum.  
 Hemerocallis radix emplastrum modo imposita.  
 Alchæa decocta, & superposita.  
 Vuarum vinacei cum sale illiti.

## Mammarum.

Ostræites lapis cum melle impositus.  
 Geodes lapis cum aqua illitus.  
 Terra Samia ex rosaceo, & aqua imposita.

### Ad Rigentes à partu mammas.

Triticij surfures ex rutæ decocto elixi, & ap-  
 positi.  
 Baccharis folia emplastrum modo adhibita.  
 Epimedij folia concisa ex oleo cataplasmatibus  
 addita.  
 Hyoscyami semen tritum ex vino illitum.  
 Ricini folia imposita.  
 Vuarum vinacei cum sale illiti.

### Ad Mammarum duritiem.

Erui farina emplastrum modo imposita.  
 Chamæpitys prima ex melle illita.  
 Vuarum vinacei cum sale triti & impositi.

### Ad Mammæ exulceratas.

Conchulæ Indicæ cinis illitus.  
 Asclepiadis herbæ radices impositæ.

### Ad Lac in mammis concretum.

Ceræ grumi decem granorum millij magnitu-  
 dine sumpti.  
 Fabarum lomentum per se, & cum polenta im-  
 positum.  
 Lentium farina illita.  
 Apium, & eius succus illitus.

### Ad Extinguendum Lac.

Cicuta imposita mammis.

### Ad Lactis Vbertatem præstandam.

Halimi folia in cibus sumpta.  
 Viticis semen potum.  
 Pisana hordeacea cum fœniculi semine cocta,  
 & in cibum sumpta.  
 Malux decoctum potum.  
 Sonchi succus haustus.  
 Lactuca in cibus recepta.  
 Ocimum deuoratum.  
 Eruca comesta.  
 Anemone & eius caules cum pisana hordea-  
 cea deuorati.  
 Anisum potum.  
 Aneti aridi seminis, & comæ decoctum han-  
 sum.  
 Fœniculum in cibo sumptum.  
 Nigella pluribus diebus pota.  
 Ciceræ semen in sorbitione potum.  
 Clematis prima in cibus accepta.  
 Echij radix in sorbitione, vel cum vino hau-  
 sta.

# Ventriculi.

Glauz cum hordeacea farina sale, & oleo cocta, & deuorata in forbitione.

Polygala pota.

Eryoniz succus cum tritico coctus, in cibum sumptus ( sed hic prudentia opus est. )

## Ne Lac in mammis concreascit.

Menta cum polenta imposita.

Fax vini cum aceto peruncta.

## Ad Mammis cohibendas, ne nimis augeantur.

Cicuta contrita, & imposita.

Cores naxia illita.

## VENTRICULI.

### Ad Vomitiones & nauseam.

Coroneorum malorum maceratorum liquor haustus.

Nardus Indica ex aqua pota.

Nardus Celtica ex aqua pota.

Palmula in cibo sumpta.

Palmularum involuorum cataplasmatibus conferentibus adiectum.

Gallinaceorum ventriculi interior folliculus siccus, tritusque cum vino potus.

Succinum haustum.

Faba in postea decocta, & in cibum sumpta.

Lentis xx. grana sine cortice deuorata.

Phaselus in cibo acceptus.

Sisymbrium haustum.

Rubi folia exterius illita.

Lactuca illota deuorata.

Lens syluestris esui data.

Scilla sicca epota.

Agaricus trium drachmarum pondere per se absque liquore sumptus.

Gentianae radice succus cum aqua potus.

Albae spinæ radix hausta.

Mentæ duo, tresve rami cum acide punice succo poti.

Proniz semen ex vino nigro potum.

Betonica commenducata, moxque vino aqua misto superbibito.

Vitis viniferae foliorum, capeolorumque succus potus.

Myrtites vinum potum.

Vini fax illita.

Scillinum vinum potum.

### Ad cælicos.

Lycium potum, & inditum.

Coronea mala cruda comesta.

Mora immatura siccata, tusaque obsonij immista.

Ficuli cineris lixiuum pondere cyathi exhibitum.

Myrica in potu data.

Gallæ cum aqua aut vino trita, & illita.

Rhois semen obsonij inspersum.

Myrti folia trita, & ex aqua illita.

Oleæ syluestris folia cum polenta illita.

Coagulum leporinum, & equinum trium obsoniorum pondere ex vino potum.

Faba in postea decocta, & deuorata.

Aegyptiæ fabæ farina, & corticis ipsius decoctum, ex melle datum.

Oxylapathi, aut oxalidis semen in aqua, aut vino potum.

Plantago elixa in aceto, & cum sale sumpta.

Hyacinthi semen potum.

Coronopus decoctus in cibo sumptus.

Rhaponticum potum.

Spinæ albæ radix pota.

Ferulæ viridis medulla bibita.

Laserpitij liquor in vix acino sumptus.

Nymphææ radix siccata, & in vino bibita.

Clymeni succus potus.

Limonij herbæ semen acetabuli pondere ex vino sumptum.

Tragi herbæ acini decem ex vino bibiti.

Papaueris vasculorum decoctum ex melle in eclegmate redactum in delinctu. Si verò efficacius reddere velis, adiungito hypocistidis, & acaciæ succum.

Vuarum vinaceorum decoctum potum.

Vinaceorum nucleis in farinam polentæ modo inspersi.

Aqua vel vinum in quibus ferrum extinctum fuerit pota.

Morochthus lapis potus.

Vinum myrtites potum.

Adiantum ex vino bibitum.

Trichomanes ex vino pota.

### Ad vomitiones ciendas.

Lauri folia pota.

Cochleæ vepribus inherentes deuorata.

Peponis radix sicca drachmæ pondere ex hydromelle pota.

Bulbus vomitorius deuoratus.

Origanum cum Rhois semine, & capis in cupreo vase diebus quadraginta, dum caniculæ sydus flagrat insolutum potum.

Lemnia terra pota.

### Ad ventriculi dolores.

Iuncus odoratus potus

Bulbi comesti.

Rhaponticum bibitum.

Abinthium in passo decoctum potum.

Melilorum ex vino decoctum haustum.

Arthemisæ tenuia folia ex oleo contusa emplasti modo imposita.

Nymphææ radix illita.

Senecionis caulis in passo decoctus, deuoratus vel potus.

Alabastrites lapis cum cerato impositus.

### Ad ventriculi erosiones.

Nardus Indica ex aqua pota.

# Ventriculi.

Nardus Celtica ex aqua pota.  
Iuncus odoratus potus.  
Sycomorî succus potus.  
Pinæ nuce deuorata.  
Lac humanum potum.  
Sonchi succus bibitus.  
Fulegium cum posca sumptum.  
Hieracij vtriufque succus haustus.  
Scordium duarum drachmarum pondere cum mulla potum.  
Præniæ semen ex vino nigro potum.

## Ad ventriculi ardores.

Portulaca cum polenta illita.  
Sonchus emplastri modo impositus.  
Vmbilici Veneris succus illitus.  
Intybus vtrique ex aceto deuorata.  
Glycyrrhizæ succus potus.  
Apium ebibitum.  
Forniculum cum frigida aqua potum.  
Polygonum illitum.  
Solani hortulani folia apposita.  
Chamedaphnes folia hausta.  
Vitis viniferæ folia, & capreoli emplastri modo adhibita.  
Labruscæ flos illitus.

## Ad ventriculi flatus.

Mei radices ex aqua feruesfactæ, vel citra coctionem tritzæ potæ.  
Nardi Indicæ, & Celticæ ex aqua potæ.  
Castoreum bibitum.  
Gallinaceorum senescentium ius potum.  
Absinthium cum seseli, aut gallica nardo potum.  
Ligustici semen, & radix pota.  
Smyrnijs semen haustum.

## Ad singultum.

Sisimbrij semen in vino potum.  
Rhaponiticum haustum.  
Aristolochia rotunda bibita.  
Menthæ duo, & tresve rami cum acidæ punicæ succo poti.  
Anethi comæ, & feminis decoctum potum.  
Cuminum erraticum cum aceto potum.  
Alysson potum, siue manibus gestatum, vel nartibus infusum.  
Aspleni decoctum potum.  
Periclimeni semen potum.  
Saxifraga bibita.

## Ad acidis ructus.

Agaricus drachmæ pondere sumptus.  
Tragoriganum potum.  
Betonicæ folia fabæ pondere ex despumato melle sumpta.

## Ad sanguinem & lac in ventriculo concreta.

Ficulnei cineris lixiuum potum.

# Iecinoris.

Coagulum Equinum trium obolorum pondere ex vino potum.  
Coagulum Leporinum trium obolorum pondere ex vino potum.  
Coagulum Agninum trium obolorum pondere ex vino potum.  
Coagulum Hædinum trium obolorum pondere ex vino potum.  
Coagulum Hinnulinum trium obolorum pondere ex vino potum.  
Coagulum Vitulinum trium obolorum pondere ex vino potum.  
Coagulum Bubalinum trium obolorum pondere ex vino potum.  
Helichrysi coma cum mullo pota.  
Laser potum.

## Ad inflammationes ventriculi.

Hieracium maius & minus emplastri modo impositum.  
Vitis viniferæ folia & capreoli cum polenta impositi.  
Viola purpurea ex polenta illita.

## Ad cibi appetentiam ciendam.

Piper comestum.  
Acetum in obsoniis additum.  
Absinthium potum.

## Ad concoctionem adiuvandam.

Eruca in cibo comesta.  
Piper omne comestum.  
Gingiberis vsus.  
Scylla cum melle cocta, & deuorata.  
Absinthium haustum, vel ventriculo adhibitum.  
Tragoriganum potum.  
Pulegium potum.  
Ligustici semen & radix pota.  
Seselis Massiliensis semen cum vino potum.  
Carum potum.  
Betonicæ folia post cenam sumpta addiso melle despumato fabæ magnitudine.  
Vinum absinthites.

## Ad stomachi fluxiones.

Adiantum potum cum vino.  
Perfici mali siccî decoctum, & bibitum.  
Cotonei mali macerati liquor potus.

# I E C I N O R I S.

## Ad iccinoris obstructions.

Nardus Indica ex aqua frigida hausta.  
Nardus Celtica ex aqua frigida hausta.  
Lauri cortex tribus obolis in vino odorato potus.  
Picæ folia drachmæ pondere in aqua, aut mulla pota.  
Amygdalæ amaræ cum melle, & lacte in illinctu datæ nucis æuellanæ magnitudine.  
Gentianæ radice succus cum aqua potus.  
Agaricum potum.

# Iecinoris.

Rhaponticum exhaustum.  
 Eryngium ex vino assumptum.  
 Anthemidis decoctum potum.  
 Chamæpityos folia septē diebus in vino pota.  
 Betonica in aceto mullto drachmæ pondere bibita.  
 Eupatorii herba aut semen in vino potum.  
 Papaveris corniculati radix pota.  
 Rubrica Sinopica hausta.  
 Glycyrrhizæ succus delinctus.

## Ad regium morbum.

Nardus Indica hausta.  
 Nardus Celtica hausta.  
 Ceruinum cornu vsum, ac lotum potumque.  
 Millepedæ suæ ouisci ex vino poti.  
 Cicer cum roremarino decoctum comestum.  
 Rumicis radices in vino decoctæ & bibitæ.  
 Atriplicis semen bibitum cum mulla aqua.  
 Asparagi radicem decoctum potum, cum ficis & ciceribus.  
 Cithmi, & eius radicem seminum decoctum potum.  
 Iro cum melle linctæ.  
 Scilla cum melle in eiegmate pondere trium obolorum pota.  
 Hyrundinaræ radix cum aniso, & vino pota.  
 Sphondylii semen potum.  
 Agaricus drachmæ pondere sumptus.  
 Rhaponticum haustum.  
 Absinthij decoctum, distillatumve trium cyathorum pondere quotidie haustum.  
 Aloë drachmæ pondere pota.  
 Origani decoctum corpori persusum.  
 Calamintha cum vino pota.  
 Fœniculum erraticum potum.  
 Libanotis radices potæ cum vino, & pipere.  
 Rorismarini decoctum potum.  
 Nigella trita cum Irino inunguento, naribus apposta.  
 Chelidonij radix cum aniso, & vino albo pota.  
 Laser cum caricis datum.  
 Marrubij succus naribus infusus.  
 Polij veriusque decoctum bibitum.  
 Conyze folia, & flores poti.  
 Asplen decoctum potum.  
 Lichen ex melle inunctus.  
 Adianti decoctum potum.  
 Trichomanes decoctum haustum.  
 Anthemides decoctum potum.  
 Bupthalmum potum statim à balneo.  
 Præniæ radix bibita.  
 Hyacinthi semen cum vino potum.  
 Rubiæ radix cum mulla aqua bibita.  
 Chamæpityos folia septē diebus in vino pota.  
 Betonica folia cum dulci aqua pota.  
 Elaterium potum.  
 Anchusæ radicis decoctum potum.  
 Quinquefolij succus trium cyathorum pondere aliquot diebus potus.  
 Osyris decoctum potum.

Chrysanthemum decoctum balnei more adhibetum.  
 Vinum Scillinum potum.  
 Verbenacæ lupinæ folia drachmæ pondere cum thuris obolis tribus, & vini veteris hemina vna ieiunis 40. diebus pota.  
 Lycij herba in aceto decocta, & bibita.  
 Myricæ decoctum potum.  
 Halycaabi fructus poti.  
 Chamæcissi folia trium obolorum pondere senis diebus in aqua pota.  
 Rufi folia, & bacce in vino pota.  
 Vinum Scillinum haustum.  
 Ceruini cornu cinis potus binis ligulis.  
 Sulfur forbili ouo sumptum.

## Ad hydropem.

Astrum potum.  
 Cinnamomum ebibitum.  
 Calami odorati decoctum cum semine apij potum.  
 Erinaces terrestris caro.  
 Cochlearum terrestrium experimentum, & caro simul contrita tumoribus hydropicorum imposita.  
 Amura in villosa pelle peruncta, & imposita.  
 Vrina humana simplicius bibita.  
 Vrina capræ quotidie cum spica pota.  
 Cicer cum rore marino decoctum.  
 Raphanus emplastri modo impositus.  
 Plantago cum lenticula decocta.  
 Ebuli radix in vino decocta, & pota.  
 Allium decoctum manducatum.  
 Ebuli cum melle, & trito pipere emplastri modo impositi.  
 Scilla præparata sumpta.  
 Anagallidis succus in vino potus.  
 Chamæleonis albæ radix cum vino pota.  
 Absinthium bibitum cum sicibus, nitro, & liliacea farina.  
 Adianti decoctum potum.  
 Trichomanes decoctum potum.  
 Hyssopum cum fico, nitroque emplastri modo impositum.  
 Fidiculæ decoctum potum.  
 Origanum cum fico decoctum.  
 Sampsuchi decoctum potum.  
 Ruta cum fico emplastrata & eius decoctum ex vino tum potum, tum corpori persusum.  
 Pastinacæ erraticæ semen potum.  
 Anisum potum.  
 Smyrnij semen potum.  
 Laserpitij liquor cum caricis datus.  
 Chamedrij decoctum potum.  
 Polij veriusque decoctum bibitum.  
 Androsaces in vino pota duarum drachmarum pondere.  
 Betonica folia cum aqua dulci pota.  
 Cucumeris asinni radicis succus sesquiboli pondere, & cortex eius acerabuli quarta parte.  
 Aquæ marinæ balneum.  
 Vitis syluestris radix in aqua feruifacita, & in vini

# Lienis.

in vini cyathis duobus marina aqua diluti  
pota.  
Vinum Scillinum potum.  
Vitidis semen potum.  
Ficus sicca in vino cum polenta, & absinthio  
decocta, & illita.  
Sal.  
Alcyonium tertium.  
Arenæ litoribus sole feruifacita capite tenui  
hydropicis obruta.

## Ad refrigeratum iccur.

Nardus indica ebibita.  
Nardus Celtica ebibita.  
Amomi decoctum potum.  
pinorum, & picæ folia ex aqua, vel mulso  
pota.

## Ad iccinoris dolores.

Acori decoctum potum.  
Absinthij decoctum ex passo appositum.  
Periclymeni semen potum cum vino.

## Ad iccinoris duritiem.

Ammoniacum illitum, & ebibitum.

## LIENIS.

### Ad induratos lienes.

Cotoneæ mala cruda cataplasmaticis addita &  
imposita.  
Sycamori liquor haustus, & illitus.  
Raphanus emplastri modo impositus.  
Brassicæ folia cum aceto deuorata.  
Chamædrii decoctum potum.  
Lupinorum farina illita.

### Ad lienis obstructions.

Nardus Celtica ex vino pota.  
Adiantum bibitum.  
Trichomanes hausta.

### Ad lienis inflammationes.

Iris Illyrica ex aceto pota.  
Acorum potum.  
Nardus Celtica ex vino pota.  
Nardus montana ex vino hausta.  
Sarmenticus cinis ex aceto rosaceo, & ruta  
illitus.  
Myricæ ex vino decoctum potum.  
Vitidis semen potum.

### Ad lienis dolores.

Discamnum potum, & illitum.

### Ad minuendos lienes.

Iris Illyrica ex aceto pota.  
Acorum potum.  
Nardus Celtica ex vino bibita.  
Nardus Montana ex vino bibita.  
Myricæ ex vino decoctum haustum.  
Vitidis semen potum.

Cyclamini secundæ semen quadraginta diebus  
haustum.  
Sagapenum ebibitum.  
Ammoniacum drachmæ pōdere ex aceto sum-  
ptum.  
Chamædrys ex aceto pota.  
Nasturtium haustum.  
Piperis radix illita.  
Polij vtriusque decoctum cum aceto potum.  
Cyclamini succus inunctus.  
Capparis semen drachmarum duarum pondere  
quadraginta diebus ex vino bibitum.  
Eiusdem radix ex vino bibita eodem pondere.  
Lepidium cum benenij radice impositum.  
Hederæ tenella folia ex vino decocta, vel arida  
ex pane coacta imposita.  
Ictis Sylvestris tum pota, tum illita.  
Agaricum drachmæ pondere cum aceto mul-  
so datum.  
Rhaponticum potum.  
Smyrnijs radix comesta.  
Gentianæ radix duarum drachmarum ponde-  
re pota.  
Aristolochia rotunda pota.  
Crocodilij radicis decoctum potum presenta-  
neo remedio prodest.  
Hyssopum cum ficis, nitroque illitum.  
Tragoriganum cum aceto potum.  
Fulegium cum sale illitum.  
Sison potum.  
Peucedani succus haustus.  
Vistum cum calce, gagaræ lapide decoctum  
illitum.  
Teucrium cum posca potum, vel cum ficis ap-  
positum.  
Leucoij radices cum aceto illitæ.  
Nymphaeæ radix ex vino bibita.  
Aspleni folia pota, vel eius decoctum cum ace-  
to quadraginta diebus haustum, vel folia ipsa  
ex aceto illita.  
Bnnij semen potum.  
Hamionici cum aceto pota.  
Rubie semen ex aceto mulso potum.  
Lonchitis alterius folia cum aceto hausta.  
Betonice folia ex oxymelite ebibita.  
Polemonij radix ex aqua sumpta.  
Periclymeni semen quadraginta diebus in vi-  
no potum.  
Xyridis semen ex aceto sumptum.  
Anchuse radix cum multa aqua pota.  
Vrtica vtrique cum cerato imposita.  
Trichomanes pota.  
Vini scillini vsus.  
Glans vnguentaria cum crui farina pota ex-  
multa aqua.  
Bryonia trium obolorum pondere triginta die-  
bus ex aceto hausta, aut cum ficis illita.  
Vitis nigra viticulæ primæ recentes coctæ, ac  
comestæ.  
Filicis maris radix hausta.  
Aqua, vel vinum, in quibus chalybs, aut fer-  
rum resinctum fuerit in potu.



# Intestinorum.

Alcyonium tertium bibitum.  
Coralium ex aqua bibitum.  
Aflus lapis ex aceto, & viua calce illitus.  
Coris naxie delimata à ferro scobes ex aceto bibita.

## INTESTINORVM.

### Ad colicos affectus.

Amigdalæ amaræ illinctu adhibita.  
Cochlææ terrestres cum suo putamine tostæ ad-  
dita pauca myrrha, ex vino bibita.  
Alauda avis tosta in cibo sumpta.  
Suillus talus crematus ad albedinem vsque po-  
tus, vbi status excreciat.  
Butyrum infusum, vbi colon exulceratum  
fuerit.  
Gallinæ finum cum aceto vel vino haustum.  
Rutæ decoctum ex oleo infusum.  
Petroselinum potum.  
Colocynthis infusa clismatibus.  
Gnici decoctum infusum.

### Ad intestinorum dolores.

Iris illyrica pota.  
Acori decoctum bibitum.  
Mei radices tritæ cum melle in eclegmate sum-  
pta.  
Cardamomum ex aqua potum.  
Agallochum ex aqua haustum.  
Nuces iuglandes cum suo putamine Perustæ.  
& vmbilico admotæ.  
Ficuum cum ruta decoctum clystere infusum.  
Halimi folia drachmæ pondere in aqua malsa  
pota.  
Crocum in potionibus bibitum.  
Dauci semen potum.  
Libanotidis radices haustæ.  
Ferulæ semen in potu sumptum.  
Peucedani succus in ovo haustus.  
Melissophilli decoctum clystere infusum.  
Castoreum potum.  
Butyrum clysmatibus infusum.  
Serpillum ebibitum.  
Calaminthæ decoctum haustum.  
Eryngium ad potandum datum.  
Cera in forbitionibus data.  
Anani ex vino sumptum.  
Triticeæ surfures ex decocto rutæ elixi, & illiti.  
Milium calefactum, in sacculis adhibitum.  
Orobi farina aceto macerata imposita.  
Sisymbrij semen in vino potum.  
Piper cum lauri tenellis foliis haustum.  
Scilla in eclegmate cum melle.  
Rhaponticum potum.  
Samplichi decoctum ebibitum.  
Centaurij maioris radix pota.  
Ruta vna cū siccato anetho elixa in potu sum-  
pta.  
Panaces cum vino haustum.  
Anethi comæ, & seminis decoctum potum.  
Ligustici semen & radix pota.  
Cumini decoctum cum oleo clystere infusum.

Phalangij folia, flores, ac semen haustum.  
Centunculum austero vino potum.  
Coniæ folia, & flores poti.  
Premiæ radix in vino pota.  
Pseudobunium ebibitum.  
Aqua marina foru adhibita.  
Chamæpitis hausta.  
Graminis decoctum ebibitum.  
Chamædaphnes folia in potu data.  
Sal calefactum in sacculis adhibitum.  
Nitrum cum cumino ex hydromelite hau-  
stum.  
Seselis Mafiliensis semen ex vino potum.  
Aselepiadis radices ex vino potæ.  
Alisma per se, aut cum pari powdere seminis  
dauci haustum.  
Suillus talus combustus ad albedinem vsque  
ebibitus.  
Lini seminis decoctum per sedem infusum.  
Agaricum duorum obolorum pondere sum-  
ptum.

### Ad dysentericos.

Aspalathi decoctum clystere infusum.  
Myrrha fabæ magnitudine deuorata.  
Lentiscus ebibita.  
Piceæ cortex potus.  
Maceris cortex in potu sumptus.  
Paliuri folia, & radix hausta.  
Acutæ spinæ fructus deuorati vel poti.  
Rubi canini fructus deuoratus.  
Cisti folia, & cyrini in potu data.  
Hypocistis hausta.  
Ladanum cum vino vetere potum.  
Rosarum fructus in potu sumptus.  
Lycium potui datum.  
Acaciæ succus haustus.  
Glandium interior tenuiorque tunica decocta  
pota.  
Castanearum interior pariter tunica ebibita.  
Gallia omphacitis ex vino, aut aqua trita illita,  
aut hausta.  
Rhois foliorum decoctum clystere infusum,  
vel in potu acceptum.  
Eiusdem femina pro sale cibis, obsoniisq; a-  
spersa.  
Palmæ inuolucri decoctum, tum infusum, tum,  
bibitum.  
Punicorum acidarum nuclei siccati, & eb ibiti  
vel in defensionibus additi.  
Myrthi semen, & folia pota.  
Corosæ mala comesta cruda, vel cocta, vel eo-  
rum succus potus.  
Pyra tam domestica, quàm syluestria deuo-  
rata.  
Mespila in cibum accepta.  
Lori arboris bacce comestæ, vel haustæ.  
Corni arboris bacce siue in edulis, siue in de-  
fruto assumptæ.  
Sorba sicca quoquo modo sumpta.

Prunorum

# Intestinorum.

Prunorum sylvestrium bacca deuoratz.  
 Siliqua siccata deuoratz.  
 Cochleæ terrestres suis cum putaminibus vsta  
 (vt Gal. inquit) esui data.  
 Siluri piscis salismentum fomento adhibetur.  
 Leporinus sanguis frigus deuoratus.  
 Garum piscium clystmate infusum.  
 Ceruinum cornu potum duorum cochlearium  
 mensura.  
 Cera in forbitionibus data.  
 Lac ignitis iniectis calculis decoctum clystere  
 infusum.  
 Leporinum coagulum trium obolorum pon-  
 dere ex vino potum.  
 Equinum coagulum trium obolorum pondere  
 ex vino potum.  
 Asparagus altissimis elixus, vel assus in cibo sum-  
 ptus mitigat.  
 Idæa radix bibita.  
 Althææ decocta succus ex vino haustus.  
 Alceæ radices cum vino, aut aqua potæ.  
 Phyllitis pota.  
 Portulaca ad summum cocta in cibis sumpta.  
 Plantago per sedem infusa.  
 Equiseti succus potus.  
 Caprillus adeps cum polenta, & Rhoe datus,  
 vel clystere infusus.  
 Melissophyllum bibitum.  
 Tragium scolopendræ similis elixum, & sum-  
 ptum in cibo.  
 Faba in posca decocta, & comesta.  
 Alismatis radix cum pari pondere seminis  
 sylvestris pastinacæ bibita.  
 Oxylapathi aut oxalidis semen, in aqua aut  
 vino bibitum.  
 Lyfimachia potui data.  
 Tragi cacumina x. in vino pota.  
 Clematis folia cum vino hausta.  
 Stœbis decoctum clystere infusum.  
 Limonis semen in vino potum.  
 Elatine elixa pota.  
 Polemonij radix ex vino sumpta.  
 Eupatorii semen, & folia in vino hausta.  
 Nymphææ siccata radix ex vino ebibita.  
 Sedum maius cum vino potum.  
 Sanguis hyrci, capræ, leporis, ceruicæ in sar-  
 tagine frigus, in cibo sumptus.  
 Viri yiniferæ foliorum & capreolorum suc-  
 cus potus.  
 Vinaceorum decoctum ebibitum.  
 Vinaceorum nucleis in farinam polentæ modo  
 illiti.  
 Vua passa alba comesta per se cum suis nucleis.  
 Omphacium clystere infusum.  
 Vinum cenantium potum.  
 Vinum Cydonites potum.  
 Vinum rhoites potum.  
 Terra leuonia ebibita.  
 Muria clysmatibus infusa, vbi diutina dysen-  
 teria intestina exulcerata extiterint.  
 Scordium duarum drachmarum pondere cum  
 aqua dulci potum.

Hederæ flores trium digitorum capræ bis in  
 die ex vino hausti.

## Ad cohibendum aluum.

Coagulum leporinum potum.  
 Lac omne, in quo igniti calculi marini extin-  
 cti fuerint.  
 Cafeus elixus, & ab elixatione statim seposi-  
 tus, moxque inassatus in cibo sumptus.  
 Finus caninus ardente Syrio acceptus, & in  
 aqua bibitus.  
 Panis triticeus siccus inueteratus comestus.  
 Hordeacea farina cum myrti baccis, aut sylue-  
 stribus pyris, aut malicorio ex vino illita.  
 Puls ex zea in cibum sumpta.  
 Puls ex Avena in cibum sumpta.  
 Puls ex milio in cibum sumpta.  
 Oryza in cibum accepta.  
 Lentesci cum suo cortice decocta deuoratz, præ-  
 sertim si decoquantur ex aceto cum adstrin-  
 gentibus aliis.  
 Oxylapathi, aut oxalidis semen in vino, aut  
 aqua potum.  
 Brassicæ percoctus cibus.  
 Beta nigra cum sua radice, & lente decocta  
 esui data.  
 Plantago ex aceto elixa, cum sale comesta, quin  
 & eius semen ex vino potum. Præterea cly-  
 steribus infusa.  
 Ictybus tam hortensis, quam erraticæ in ci-  
 bum accepta.  
 Cendryllæ succus coctus potus.  
 Lens sylvestris quoquo modo sumpta.  
 Acinos pota.  
 Anisum ebibitum.  
 Anethum, quin etiam eius coma, & semen  
 haustum.  
 Apium in cibo sumptum.  
 Phyllitis potui data.  
 Acanthi radices bibitz.  
 Fœniculum erraticum potum.  
 Ruta in cibo vel potu sumpta.  
 Orchis Serapias ex vino potus.  
 Præonix radix ex vino decocta hausta.  
 Althææ decoctum bibitum.  
 Alismatis radix pota.  
 Polygoni succus potus.  
 Clematis prima in vino bibita.  
 Lagopus ex vino, vel ex aqua sumpta vbi  
 bris sit.  
 Xyridis radix in melle pota.  
 Anchusæ folia ex vino sumpta.  
 Rubi ramorum decoctum potui datum.  
 Quinquæfolij radices decoctum bibitum.  
 Phoenix in vino aultero hausta.  
 Idæa radix bibita.  
 Iunci, præsertim marini semen frigus, & in  
 diluto vino potum.  
 Astragali radix ex vino hausta.  
 Hyacinthi radix ebibita.  
 Papaueris nigri semen ex vino haustum.  
 Verbasci radix, & flores potui dati.

# Intestinorum.

**Labrusca flores potum.**  
**Punicorum acidorum Vinum potui datum.**  
**Rubrica Sinopica in ovo hausta, aut clystere infusa.**

**Vini fex illita.**  
**Sedum maius ex vino haustum.**  
**Adianci decoctum potum.**  
**Trichomanes decoctum bibitum.**  
**Accutum cibus incoctum.**

## Ad diurnas alui fluxiones.

**Sanguis Hyrcinus in sartagine frixus & comesus.**  
**Sanguis Caprillus in sartagine frixus & comesus.**  
**Sanguis Leporinus in sartagine frixus & comesus.**  
**Sanguis Ceruinus in sartagine frixus & comesus.**

## Ad ciendam, & emolliendam alium.

**Ceruisa comesta.**  
**Melimela esui data.**  
**Perfica in cibum sumpta.**  
**Mora matura comesta.**  
**Ficus maturæ deuorata.**  
**Marinus echinus in cibus.**  
**Tellinorum, chamarumque ius cum sale haustum.**  
**Sepia in cibo sumpta.**  
**Silurus piscis in cibus.**  
**Gobij ius bibitum.**  
**Piscium in vniuersum ius per se, aut ex vino bibitum.**  
**Gallinaceorum veterum ius epotum.**  
**Iac haustum.**  
**Serum lactis potum.**  
**Cassus recens in cibo sumptus.**  
**Butyrum comestum vel bibitum.**  
**Medulla ossium deuorata.**  
**Cicer in cibo sumptum.**  
**Rumex decoctus & in cibus sumptus.**  
**Blitum decoctum & in cibus sumptum.**  
**Malua decocta & in cibus sumpta.**  
**Atriplex decocta & in cibus sumpta.**  
**Beta candida decocta & in cibus sumpta.**  
**Asparagus decocta & in cibus sumpta.**  
**Lactuca decocta & in cibus sumpta.**  
**Brassica leuiter feruefacta, esui data.**  
**Tragorum potum.**

## Ad intestinorum inflationes.

**Farina tritici cum hyoscyami succo illita.**  
**Farina hordei cum lini, & fœni græci semine imposita.**  
**Ocimi semen potum.**  
**Rhaponticum bibitum.**  
**Anethi comæ, & seminis decoctum potum.**  
**Cumini decoctum cum oleo clystere infusum, vel eius semen cum polenta & hydrelao maceratum & illitum.**

**Peucedani liquor in ovo coibitus.**  
**Anthemidis decoctum potum.**

## Ad latas intestinorum tineas.

**Cardamomum potum.**  
**Mali puniceæ radicum decoctum bibitum.**  
**Nuces iuglandes largius esitæ.**  
**Mori radices corticum decoctum haustum.**  
**Allium porai datum, vel comestum.**  
**Chameleonis albi radix acetabuli pondere, ex castorei, & origani decocto pota.**  
**Filicis femine radix trium drachmarum pondere ex melle hausta.**  
**Melanthij semen potum, vel ex aqua vmbilico illitum.**  
**Attramentum sutorum drachmæ pondere sumptum, vel cum melle delinctum.**  
**Heliotropij maritimi folia, tum semina cum hyssopo, nitro, & nasturtio pota.**

## Ad teretes intestinorum tineas.

**Lupinorum farina cum melle lintha, vel cum aceto, pipere, & ruta pota.**  
**Brassicæ semen potum.**  
**Portulacæ succus porri datus. Præstat idem & semen.**  
**Nasturtium bibitum.**  
**Abinthium maritimum per se, vel cum oriza decoctum, cum melle sumptum.**  
**Abinthium fantonicum, vt maritimum, haustum.**  
**Hyssopum cum melle linctum.**  
**Menta bibita.**  
**Calaminthæ decoctum cum sale, & melle sumptum.**  
**Thymum haustum.**  
**Thymbra potui data.**  
**Rutæ decoctum ex oleo bibitum.**  
**Coriandrum cum passo sumptum.**  
**Anchusa tertia cum hyssopo, & nasturtio pota.**  
**Vinum abinthites potui datum.**  
**Sedum maius ex vino haustum.**  
**Filicis femine radix drachmarum trium pondere cum vino pota. Sed qui sumunt prægustare alia debent.**

## Ad alium fluentem ab expurgante medicamento.

**Gallorum gallinaceorum senum ventriculus sale inueteratus, & in vmbra siccatus potus.**

## Ad intestinorum vulnera.

**Equiseti radix, & folia cum aqua, pota.**

## Ad intestinorum vlcera.

**Iac omne ignitis calculis calefactum, infusum.**  
**Sapphyrus lapis bibitus.**

# Renum?

## SEDIS.

### Ad sedisrimas.

Pix liquida illita.  
 Amurca in cupreo vase ad mellis spissitudinem decocta illita.  
 Viciis semen cum aqua illitum.  
 Cancri fluuiales combusti cum melle cocto illiti.  
 Labri veneris radix in vino decocta, & subinde rufa imposita.  
 Leucioj flores cera excepti, & emplastri modo adhibiti.  
 Labrusæ flores illiti.  
 Plumbum elotum impositum.

### Ad sedis vlcera.

Thus tritum cum lacte, & linamento exceptum impositum.  
 Punicorum acidorum succus cum melle decoctus illitus.  
 Oxyopus impositus explet & emollit.  
 Plumbum elotum illitum.

### Ad condylomata.

Coronea mala cruda cataplasmatibus adiecta.  
 Ovi vitellus affatus, & ex rosaceo, & croco illitus.  
 Aloe cum passo adhibita.  
 Anethi cremati seminis cinis illitus.  
 Libanotis emplastri modo imposita.  
 Ballores folia in seruenti cinere cocta imposita.  
 Rubi folia adhibita.  
 Hefine imposita.  
 Quinquefolij radix illita.  
 Sermentius cinis, quin & vinearum ex aceto illitus.  
 Rubigo ferri illita.  
 Plumbum elotum impositum.  
 Sandaracha cum rosaceo inuncta.  
 Suillus adeps illitus.  
 Crocum cataplasmatibus inditum.

### Ad sedis inflammationes.

Lens cum fertula campana, siccis rosis, cydonio malo, malicorio & rosaceo illita.  
 Sunchi succus illitus.  
 Melilotus cum feni græci farina, & lini semine ex passo impositus.  
 Libanotis adhibita.  
 Althææ radix decocta illita.  
 Symphyti maioris radix cum folijs Senecionis cataplasmatibus modo.  
 Senecionis flores, & folia, ex modico vino illita.

### Ad induratos sedis tumores.

Pix liquida illita.

### Ad procidentem sedem.

Lentisei succus, & folia illita.

Malorum cydoniorum decoctum in deflessionibus.  
 Torpedo marina apposita.  
 Cyclamini succus ad mellis spissitudinem decoctus, illitus.  
 Cærulei anagallidis flores appositi.  
 Aster Atticus illitus.  
 Acetum illitum, & foru adhibitum.  
 Acida muria in deflessionibus.

### Ad tenasmos.

Lac ouillum, caprillum, bubulumque ignitis calculis calefactum, & clystere infusum.  
 Feni græci seminis decoctum infusum.  
 Lini semen quoquo modo appositum.  
 Erui farina vino macerata illita.

### Ad penfiles sedis thymos.

Capræ tyneestris fel illitum.  
 Fimm ouillum ex aceto inunctum.  
 Laser in malicorio cum aceto seruata.  
 Acetum illitum.

### Ad hamorrhoidas ciendas.

Capra conficata.

### Ad hamorrhoidum defluxiones.

Aloë cum passo illita.  
 Libanotis emplastri modo imposita.  
 Rubi felia adhibita.  
 Palmule illitæ.

### Ad hamorrhoidas sanandas.

Rhois semen illitum.  
 Palmule illitæ.  
 Ononis decoctum, ut quidam aiunt, potum.  
 Plumbum elotum impositum.  
 Arabicus lapis illiens.  
 Portulaca ad summum cocta imposita.

## RENUM.

### Ad renum dolorem.

Cardanorum ex vino potum.  
 Nardum Celticum ac linitum.  
 Amomi decoctum bibitum.  
 Harundinis radix lumborum doloribus proficit cum aceto illita.  
 Tragacantha drahma pondere in passo dissoluta cum adusto, elatoq; cerui cornu, & scissilis aluminis tantillo potum.  
 Peucedani succus potus.  
 Vua passa alba in cibum sumpta.  
 Alecyonium tertium potum.  
 Fœniculi comæ decoctum subdium.  
 Anagallis pota.  
 Agarici drachma pota.  
 Glycyrrhizæ succus cum passo potus.  
 Tordilium bibitum.  
 Athyllis pota.  
 Præoniz radix ex vino pota.  
 Symphytum petraeum ex aqua potum.

# Vesicæ.

Anchusæ decoctum ex aqua haustum.  
Vinum Melitites ebibitum.

## Ad renum calculos & arenulas.

Nardus Indica potui data.  
Nardus Celtica potui data.  
Nardus montana potui data.  
Verum Celtica cæteris præstat.  
Lauri folia pota, quin & radicis cortex qui  
longè potentior est, potus.  
Cerasi gummi ex vino haustum.  
Amygdalæ amaræ gummi ex passò sumptum.  
Ononis radicis cortex cum vino potui datus.  
Anisum potum.  
Cumini alterius sylvestris semen potum.  
Artemisæ decoctum in defensionibus adhibi-  
tum.  
Chamæmeli decoctum potum, vel fotu adhi-  
tum.  
Parthenij folia hausta.  
Althææ decoctum bibitum.  
Alismatis decoctum potui datum.  
Tribuli vtriusque fructuum succus haustus.  
Rubi radix pota.  
Papaveris corniculati radicis decoctum hau-  
stum.  
Umbilici veneris folia cum radice pota.  
Vinum absinthites bibitum.  
Adiantum potui datum.  
Trichomanes potui data.  
Vua passa alba comesta.  
Melitites vinum assidue potum.  
Alcyonium tertium potum.

## Ad renum vlcera.

Iac omne potum.  
Plantaginis radices, & folia ex passò sum-  
pta.  
Vua passa alba comesta.  
Melitites vinum assidue potum.

## Ad renum obstructiones.

Rhaponticum haustum.  
Vinum absinthites potum.  
Vinum Melitites potum.

## VESICÆ.

### Ad ciendam remorantem vrinam.

Acori decoctum potum.  
Mei radices ex aqua decoctæ, vel tritæ citra  
coctionem, & potæ.  
Nardus Indica potui data.  
Nardus Celtica potui data.  
Nardus Montana potui data.  
Cardamomum ex vino haustum.  
Afarum bibitum.  
Phu sicca pota.  
Malabathrum potum.  
Cassa in potu hausta.  
Cinnamomum potum.  
Costus ebibitus.

Iuncus odoratus in potu sumptus.  
Calamus odoratus cum graminis, aut apij semi-  
ne sumptus.  
Aspalathi decoctum haustum.  
Crocum ebibitum.  
Helenij radicem decoctum potui datum.  
Crocomagma potum.  
Pinæ nuces repurgatæ comestæ, aut cum pas-  
sò, vel cucumeris semine potæ.  
Lentisci decoctum haustum.  
Terebinthi fructus comestus.  
Resina omnis, præsertimque terebinthina.  
hausta.  
Cupressi folia ex passò, & exiguo myrrhæ  
pota.  
Cedrides deuorata, vel potæ.  
Lauri foliorum decoctum in defensionibus.  
Albæ populi cortex vniæ pondere haustus.  
Paliuri foliorum, & radicem decoctum in po-  
tu sumptum.  
Phillyræ folia pota.  
Ladanum ex vetere vino haustum.  
Oleæ Aethiopice, ac nostratis lachryma potui  
data.  
Glandes in potu sumptæ.  
Palmæ inuolucri decoctum bibitum.  
Punicæ acidæ succus potus.  
Cerasi gummi haustum.  
Amygdalæ amaræ lachryma bibita.  
Erinaceus marinus in cibum sumptus.  
Erinacei terrestriis caro inueterata ex aceto  
muiso pota.  
Vermes terreni triti, & cum passò poti.  
Mel haustum.  
Pisana hordeacea deuorata.  
Zythum ex hordeo paratum potum.  
Cicerum decoctum potui datum.  
Eruæ decoctum haustum.  
Lupinorum radicem decoctum bibitum.  
Raporum cauliculis elixus, & in cibum sum-  
ptus.  
Raphanus comestus, quin & eiusdem semen  
potum.  
Siferis radix in cibum accepta.  
Asparagi breui coctura elixi, & in cibum  
propinati.  
Sion quoquo modo sumptum.  
Cucumeris semen potum.  
Eruæ vtriusque semen bibitum.  
Dracunculus minor haustus.  
Hortensis similacis siliquæ cum semine elixæ,  
& in cibum datæ.  
Asphodeli radix pota.  
Bulbus vomitorius in cibum sumptus, vel  
eius decoctum potum.  
Porrum domesticum, & sylvestre comestum.  
Cæpa decocta in cibum sumpta.  
Allium in cibum sumptum.  
Capparis fructus quadraginta diebus potus.  
Anagallidis succus bibitus.  
Calaminthæ decoctum potum.  
Saluæ decoctum haustum.

# Vesicæ.

Crocodilij semen bibitum.  
 Thymi decoctum potui datum.  
 Thymbre decoctum bibitum.  
 Serpyllum in potu sumptum.  
 Ruta quoquo modo sumpta.  
 Spinæ albæ radix pota.  
 Achanthi radices potæ.  
 Ononis radices cortex ex vino haustus.  
 Eryngij radix pota.  
 Absinthium potui datum, vel eiusdem decoctum bibitum.  
 Hyssopi decoctum in potu assumptum.  
 Origanum haustum.  
 Tragorigani decoctum ebibitum.  
 Ruta sylvestris pubi illita.  
 Ligustici semen, & radix pota.  
 Pastinacæ erraticæ semen haustum.  
 Cari semen potum.  
 Anethi comæ, & feminis decoctum bibitum.  
 Apium crudum, coctumque in cibum sumptum.  
 Petroselinum in potu haustum.  
 Fœniculi decoctum potum.  
 Nigella pluribus diebus bibita.  
 Polij montani decoctum potui datum.  
 Artemisæ decoctum in defensionibus adhibetum.  
 Anthemidis decoctum haustum, vel in defensionibus additum.  
 Lithospermi semen ex vino albo sumptum.  
 Rubiæ radix pota.  
 Lonchitis radix ex vino sumpta.  
 Hypericum bibitum.  
 Betonice folia pota.  
 Periclymeni semen haustum, Est enim valentissimum medicamentum.  
 Saxifraga potui data.  
 Xyridis radix tritum obalorum pondere bibita.  
 Sed semini vis longè maior.  
 Iunci marini semen frixum, & ex diluto vino haustum.  
 Ageratum suffutum.  
 Vesicariæ siue halicacabi rubentes acini folliculis inclusi deuorati.  
 Solani somnifici semen potum.  
 Rusci folia, bacce asparagi, radicisue in vino potæ.  
 Sparrij semen deuoratum.  
 Vitis albæ cauliculi teneri decocti, & deuorati.  
 Cytisi decoctum potum.  
 Dauci semen haustum.  
 Coris semen in potu sumptum.  
 Equiseti succus potus.  
 Umbilici Veneris folia cum radicibus manducata.  
 Buni, & pseudobuni semen potui datum.  
 Astragali radix ex vino sumpta.  
 Hyacinthi radix bibita.  
 Vitis nigre viticulæ primæ coctæ, comestitijs.  
 Chamædaphnes foliorum succus ex vino sumptus.  
 Vinum Cydonites potum.

Vinum Hyssopites potum.  
 Vinum Scillinum potum.  
 Vinum absinthites potum.  
 Aqua multa in potum accepta.

## Ad vrinæ angustias.

Cimices lectularij triti, & vrinariæ fistulæ impositi.  
 Millespedæ ex vino potæ.  
 Cicadæ inassatæ manse.  
 Locustæ sufficæ præsertim in foeminis.  
 Ceruini cornu cinis elotus binis legulis epotus.  
 Maluæ decoctum in sessione adhibitum.  
 Portulaca in cibum sumpta.  
 Asparagi radicum decoctum haustum.  
 Crithami radix semen, & folia ex vino decocta pota.  
 Sandycis decoctum potui datum.  
 Caulicis olerum modo in cibum sumpta.  
 Amaraci decoctum potum.  
 Baccharis radicum decoctum haustum.  
 Ocimi semen bibitum.  
 Smyrniæ radix pota.  
 Agaricum drachmæ pondere datum.  
 Peucedani succus potus.  
 Rhaiponticum potum.  
 Phalaridis succus ex aqua, aut vino haustus.  
 Lotus sylvestris trita per se, aut cum maluæ semine ex vino, aut ex passo pota.  
 Chamæpitys potui data.  
 Chamæleonis albi radices decoctum bibitum.  
 Abrotani semen tritum, & ex aqua calefactum potum.  
 Pastinacæ sylvestris semen potum, vel pubi illitum.  
 Tordilij semen in potu sumptum.  
 Polemonij radix ex aqua pota.  
 Sisonis semen haustum.  
 Ammi cum vino sumptum.  
 Petroselini semen potum.  
 Galbanum bibitum.  
 Chamædrys decoctum potui datum.  
 Trifolij bituminosi semen, & folia in aqua hausta.  
 Scordij decoctum ex vino, vel ex aqua paratum potum.  
 Anthyllis altera drachmarum duarum pondere bibita.  
 Prænia potui data.  
 Althææ decoctæ succus ex vino potus.  
 Graminis radicum decoctum potui datum.  
 Arctij radix cum semine decocta, in potu sumpta.  
 Adiantum potum.  
 Trichomanes hausta.  
 Alcyonium tertium potum.  
 Lapis Hamarites ex vino bibitus.  
 Lapis Morochthus ex aqua bibitus.  
 Lapis Iudaicus ciccris magnitudine ex aqua calida potus.  
 Lapis Spongix ex vino haustus.

# Vesicæ.

## Ad vrinæ stillicidium.

Acori decoctum potum.  
Silybrij semen in vino bibitum.  
Panaces heradium ex vino haustum.  
Seseli Massiliense potui datum.  
Cumini sylvestris alterius semen in potu sumptum.  
Olusatris radix cum semine ex mullis pota.  
Polycnemum ex vino bibitum.  
Clinopodium haustum.  
Oenanthes radix cum vino epota.  
Conyza folia, & flores in potu.  
Aspleni decoctum potui datum.  
Cepæ cum asparagi radicibus decoctum, in potu sumptum.  
Onobrychis bibita.  
Polygoni succus haustus.  
Saxifraga in vino decocta potui data.  
Xyridis radix ex mullis pota.  
Tragij liquor semen, & folia in potu sumpta.  
Rufci folia, radices, baccæ bibitz.  
Lauri Alexandrinæ radix sex drachmarum pondere potui data.  
Elichrysi coma ex vino hausta.

## Ad vesicæ vlcera.

Myrti folia, & semen pota.  
Lac omne bibitum.  
Cucumeris semen ex lacte, & passo haustum.  
Glycyrrhizæ succus ex passo sumptus.  
Vua passa alba comesta.

## Ad vesicæ vulnera.

Butyrum insusum.  
Equiseti folia ex aqua pota.  
Ad eiiciendos vesicæ calculos.  
Ossifragi avis ventriculus paulatim in potu haustus.  
Muris finus, qui Muscerda dicitur, cum mullis, & thure potus.  
Vrina apri potui data.  
Rumicis radicum ex vino decoctum bibitum.  
Sion crudum, coctumque haustum, vel comestum.  
Silybrij semen potum.  
Raccharis decoctum haustum.  
Aprij semen, vel radix vino bibita.  
Feniculum erraticum potum.  
Sagapenum potui datum.  
Adianti decoctum bibitum.  
Trichomanes decoctum in potu sumptum.  
Vitis viniferae lachryma in caudice concreta ex vino pota.

## Ad vesicæ calculos frangendos.

Cardamomum, cum corticis radicis lauri drachma, potum.  
Bdellium potum.  
Cerasi arboris gummi bibitum.  
Aspleni decoctum haustum.  
Lichospermum ex vino albo potui datum.

# Virilium.

Saxifraga ebibita.  
Graminis decoctum haustum.  
Tragij femina pota.  
Rufci radices, ac baccæ in potu sumptæ.  
Iudaicus lapis coti delimarum, ex aqua calida potus.  
Lapis spongiæ potui datus.

## Ad vrinæ incontinentiam.

Rutæ sylvestris semen fruxum, & in cibis sumptum.  
Phoenix in vino austero bibita.

## Ad vesicæ scabiem.

Panaces herculeum cum mullis aqua aut vino potum.  
Cepza herba bibita.

## Ad mictum grumorum sanguinis.

Cumini sylvestris alterius semen potum.  
Elichrysi coma in mullis pota.

## Ad cruentos mictus, ex fractis calculis provenientes.

Acida muria illico clysmate infusa per vrinæ fistulam.

# VIRILIVM ET PV-

## DENDORVM.

## Ad Venerem ciendam, stimulantâmque.

Costus ex mullis bibitus.  
Crocum potum.  
Semen lini cum melle, & pipere deuoratum.  
Rapum decoctum in cibum sumptum.  
Eruca largius in cibis comesta.  
Eruce semen haustum.  
Dracunculi maioris radix rosta, vel clixa ex vino bibita.  
Asphodeli radix assumpta.  
Nasturtium potum, vel comestum.  
Porri semen potui datum.  
Bulbus decoctus manducatus.  
Allium cum coriandro tritum in cibis.  
Viticæ semen ex passo potum.  
Galij radix assumpta.  
Mentæ succus potus.  
Pastinacæ erraticæ radis comesta.  
Anisum potum.  
Testiculi canis quæ vegetior est bibita, vel comesta.  
Saryrij radix estata.  
Horminum in vino potum.  
Gladioli superior radix ex vino sumpta.  
Scincorum renes drachmæ pondere ex vino hausti.  
Lac omne haustum.  
Ad augendam genituram.  
Coriandrum bibitum.

# Et pudendorum.

Omnia medicamenta quæ venerem excitant, præterea, quæ in calore & siccitate excellunt.

## Ad Venerem in hibendam.

Vitis semen potum, & folia testibus illita.  
Portulaca manducata, pudendisque inuncta.  
Lactucæ semen potum nocturnas veneris imaginationes arceat.  
Anethi seminis, & comæ decoctum assidue potum.  
Ruta in cibo, potuque sumpta.  
Canini testiculæ herbæ languidæ, flaccidique radix potui data.  
Cannabis sativæ semen in cibum largius sumptum.  
Gladioli inferior radix pota.  
Cicutæ cum sua coma trita, & genitalibus illita, & est potentissimum medicamentum.

## Ad seminis profluvium.

Nymphææ radix bibita.  
Iridis Illyricæ radix ex aceto pota.

## Ad pudendorum ulcera.

Ocypus illitus.  
Aloe illita, & in pulverem imposita.  
Polygoni succus in vino decoctus cum melle adhibitus.  
Alumen quocunque modo adhibitur.  
Flos salis inspersus.

## Ad testium inflammationes.

Cicer cum uruo decoctum appositum.  
Faba in vino decocta cataplasmatibus adhibita.  
Senecionis folia cum floribus emplastri modo imposita.  
Aphrodeli radix, & folia illita.  
Cimolia illita.  
Melilorum emplastri modo adhibitur.  
Geodes lapis illitus.  
Ruta illita cum lauri foliis.  
Sal cum origano & fermento illitum.  
Cuminum cum passâ uva, sabæq; lomento, aut cera impositum.  
Coriandrum cum passâ uva, & melle illitum.  
Lilij conicis radix cum apollinari herbâ, & triticea farina cataplasmatibus modo.  
Samia terra ex rosaceo & aqua illita.  
Hyoscyami semen tritum ex vino impositum.

## Ad genitalium pruritus.

Saluæ decoctum ex vino illitum.  
Resinæ omnes, præsertimque terebinthina illita.

## Ad induratos testes.

Ironis semen impositum.

## Ad eos qui natura præputio carent.

Thapsee succus circumliniatur. Tumorem enim excitat, qui deinde pinguium foris emollitus præputij iacturam resarciat.  
Mel triginta diebus à balneo illitum.

# Vteri.

## Ad genitalium phagedenas exulcerationes.

Taurinum fel ex melle illitum.  
Labruscæ flos tritus cum melle, croco, myrrha, & rosaceo impositus.

## Ad genitalium thymos.

Smaridis salsæ cremarum caput illitum.  
Fel sylvestris capræ inunctum.  
Fimur ouillum ex aceto impositum.  
Thymus emplastri modo adhibitus.  
Thymbra apposta.  
Ruta cum pipere, nitroque confricata.  
Tithymali characiæ lac inunctum.  
Chamaejasces rami tritici, & impositi.  
Mercurialis succus illitus.  
Heliotropij semen illitum.

## V T E R I.

## Ad vteri strangulatus.

Mei radices tritæ, & cum melle in eclegmate deorata.  
Iuniperi bacce potæ.  
Vngues odorari suffiti.  
Cimices leſtularij naribus illiti.  
Bitumen olfactum, suffitum, & admotum.  
Phocæ coagulatum potum.  
Vrina cum ligustrino oleo seruescens infusa.  
Plantaginis succus potus.  
Sinapi tritum naribus illitum.  
Agaricum drachmæ pondere sumptum.  
Ruta trita excepta melle, pudendis & fedi illita.  
Panacis herculei semen cum vino bibitum.  
Seselis Massiliensis radix, & semina potum.  
Peucedanum olfactum.  
Sagapenum naribus ad olfactendum illitum.  
Trifolij bituminosi semen, & folia pota.  
Prænox nigri seminis grana x v. bibita.  
Alismatis radix pota.  
Betonice folia drachmæ pondere in aqua dulci hausta.  
Gagates lapis suffitus.

## Ad menses ducendos.

Iris Illyrica ex vino sumpta, & foris adhibita.  
Mei radicem decoctum defensionibus adhibendum.  
Acori decoctum in sessionibus.  
Cyperi radicem decoctum foris adhibendum.  
Asari radices senis drachmis ex aqua bibitæ.  
Phu decoctum potui datum.  
Cassa odorata in potu sumpta.  
Cinnamomum haustum, vel ex myrrha suppositum.  
Amomum pessis, aut sessionibus additum.  
Costus ebibitus.  
Odoratus iuncus potui datus.  
Calamus odoratus haustus, & suppositus foris.  
Cancamum ex aqua multa potum.



Helenij radicem decoctum potum.

Myrrha cum absinthio, lupinorum cremore, vel rutæ succo admotæ.

Styrax pota, & apposita.

Bitumen ex vino, & castoreo bibitum.

Cedrides ex polline piperis haustæ.

Lauri foliorum decoctum potui admotum.

Phillyræ folia potui data.

Viticis semen drachmæ pondere ex vino haustum.

Olex Aethiopice, ac nostratis lachryma pota.

Amygdalæ amaræ admotæ.

Ficulinum lac cum detrita nuce Græca ebibitum.

Cochlæ terrestres cum suo operimento tuse, & femineis locis admotæ.

Castoreum drachmarum duarum pondere haustum.

Capræ succus pudendis illitus.

Oesophum in lana suppositum.

Anserinus, & gallinaceus adeps illitus.

Caprarum montanarum finum ex odoramento aliquo potum.

Scandulaceum bibitum.

Seminis lini decoctum potui admotum.

Lupinorum decoctum cum myrrha, & melle suppositum.

Rhaphanus in cibum sumptus, vel eius succus haustus.

Alphodeli radix potui data.

Eryngij decoctum haustum.

Brassicæ, succus ex liliacea farina suppositus, vel eiusdem decoctum bibitum.

Sium pro olera sumptum.

Crichum, vel eius decoctum in potu sumptum.

Centaurei maioris radix bibita, vel eiusdem succus suppositus.

Condryllæ gummi ex myrrha subditus.

Lactucæ sylvestris lacteus succus bibitus.

Porrum domesticum, & sylvestre comestum.

Allij comarum decoctum in defensionibus additum.

Cyclaminus tum pota, tum supposita.

Abrotani semen ex aqua haustum.

Capparis cortex, & semen potui datum.

Anemones radix ex vellere apposita.

Hederæ Corymbi triti subditi.

Pulegium bibitum.

Agaricum cum oxymelite drachmæ pondere haustum.

Origanum potum.

Absinthium haustum, vel ex melle subditum.

Tragoriganum potui datum.

Salutæ decoctum potum.

Ammi ex vino haustum.

Thymi, thymbræque decoctum in potu sumptum.

Serpyllum potui datum.

Smyrnijs semen ebibitum.

Amaraci decoctum haustum, vel pudendis illitum.

Baccharis radicis decoctum potum.

Ruta utraque tum pota, tum subdita.

Panaces Herculeum ex vino haustum.

Ligustici radix, & semen potum, & illitum.

Pastinacæ erraticæ semen potum.

Seselis Malsiliensis radix, & semen haustum.

Tordilium potui datum.

Feniculum ex vino sumptum.

Sison bibitum.

Libanotis radices potæ.

Peucedoni succus potus.

Petrofelinum potui datum.

Daucum haustum.

Hammoniacum in potu sumptum.

Nigella pluribus diebus hausta.

Sagapenum potum.

Laserpiz liquor cum pipere, & myrrha bibitus.

Galbanum suppositum, & suffum.

Clinopodium haustum.

Chamaedrys decoctum potui datum.

Lilij cremata radix ex rosaceo subdita.

Melissophylli decoctum in defensionibus.

Trifolij semen, & folia pota.

Polij utriusque decoctum haustum.

Scordij succus bibitus, vel herba ipsa subdita.

Artemisii decoctum sessionibus additum.

Myrrhis bibita.

Conyza folia, & flores poti.

Hemerocallis radix cum vellere subdita.

Rufci folia & bacca ex vino sumpta.

Leucoij decoctum potum, & sessionibus admotum.

Eiusdem semen duarum drachmarum pondere ex vino sumptum.

Anthemidis decoctum tum potum, tum foris adhibitur.

Pæoniæ radix amygdalæ quantitate hausta.

Rubiz radix supposita.

Adianci decoctum bibitum.

Trichomanes potui data.

Anagyris trita folia ex passio sumpta.

Hypericum tam bibitum, quam suppositum.

Coris semen potui datum.

Viticæ utriusque folia trita, & cum myrrha subdita.

Betonice folia drachmæ pondere cum vino sumpta.

Medij semen haustum.

Chamaedaphnes foliorum succus ex vino bibitus.

Gladioli superior radix supposita.

Tragij liquor bibitus, quin etiam semen, & folia pota drachmæ pondere.

Chrysocome ex mellierato sumpta.

Elacrium in pesto subditum.

Helichrysi coma ex mulso potui data.

Mâdago liquor semiboli pondere subditus.

Eiusdem semen bibitum.

Daphnoides hausta.

Veraeum Nigrum suppositum.

Veratrum Album suppositum.

Vitis nigræ renellæ viticule in cibum sumptæ, decoctæ olerum, vel asparagorum more.

Heliotropij folia supposita.

Vinum scillinum bibitum.  
Vinum absinthites haustum.  
Vinum hyssopites potum.

## Ad menses cohibendos.

Nardus Indica.  
Mustus arboribus innascens in sessionibus additum.  
Thuris cortex in pesto subditus.  
Oxyacanthæ baccæ in potu vel in cibo sumptæ.  
Hypocistis tum pota, tum indita.  
Oleæ sylvestris succus pudendis admotus.  
Rhois semen potum alba profluvia sistit.  
Palmulæ immaturæ manducantur.  
Palmularum involucrium potui datum.  
Punicorum acinorum nuclei siccati in sole, & obsonis inperis, concoctiue sumpti.  
Gallæ in decoctis additæ ad infestationes paratis.  
Glandium tenuior cortex tum bibitus, tum in pesto suppositus.  
Myrti semen foru subditum, vel defessionibus additum.  
Coroneorum maiorum decoctum foru adhibetur.  
Acacia tum pota, cum indita.  
Lycium subditum.  
Lori ligni decoctum haustum, aut foru admotum.  
Lentisci folia tam pota quam subdita.  
Coagulum Leporinum potum, ac etiam subditum.  
Coagulum Hædini potum, ac etiam subditum.  
Coagulum Agnini potum, ac etiam subditum.  
Coagulum Ceruinum potum, ac etiam subditum.  
Coagulum Hinnulinum potum, ac etiam subditum.  
Coagulum Vitulinum potum, ac etiam subditum.  
Cerinum cornu vsum, lotum ex adstringenti liquore aliquo haustum.  
Caprarum montanarum simum siccatum tritumque cum thure in lana suppositum.  
Rumicis radices subditæ.  
Plantago tum bibita, tum foru adhibita.  
Barbæ hyrcinæ succus ex vino sumptus, vel suppositus.  
Porri comæ decoctum ex aqua marina, & aceto in defessionibus.  
Rubi ramorum decoctum potum.  
Arabicæ spinæ radix manducata.  
Phoenix ex vino austero bibita.  
Papaueris nigri semen potum.  
Achillea subdita.  
Idæa radix hausta.  
Rubi decoctum potui datum.  
Equiseti folia bibita.  
Menta foru subdita.  
Iunci marini semen frictum, & ex vino diluto potum.

Ocismastrum potum ex vino.  
Anisum haustum, præsertim ad alba profluvia.  
Cumini ex aceto impositum.  
Nymphææ, flore luteo, radix, & semen ex vino nigro pota.  
Præniæ feminis grana xij. ex vino austero sumpta.  
Lysimachiæ succus subditus.  
Moly herba cum loliacea farina indita.  
Polygoni succus suppositus.  
Symphyti petræi ex vino decoctum haustum.  
Clymeni succus bibitus.  
Limonij semen acetabuli pondere ex vino bibiturum.  
Medij radix elixa, & ex melle in eclegmate sumpta.  
Tragi acini numero x. ex vino hausti.  
Hyoscyami semen oboli pondere in multa aqua potum.  
Solani hortensis succus in lana inditus.  
Mandragoræ semen cum sulphure, & vino suppositum.  
Semperuium maius in vellere subditum.  
Vuarum vinearum decoctum haustum, & foru appositum.  
Labruscæ flos pessulo inditus.  
Omphacium inditum.  
Rubigo ferri subdita.  
Chalcitis cum succo porri indita.  
Vini fœx imo ventris, ac pudendis illita.  
Hæmarites lapis ex vino haustus.  
Morochthus rapis in vellere inditus.  
Ostracites lapis drachmæ pondere ex vino sumptus.  
Samia terra cum sylvestris punicæ floribus hausta.

## Ad secundas pellendas.

Castoreum drachmarum duarum pondere cum pulegio bibitum.  
Cyclaminis alterius semen haustum.  
Allij comæ decoctum foru impositum.  
Aristolochia longa cum myrrha, & pipere sumpta, vel pessulo indita.  
Pulegium bibitum.  
Thymi decoctum potui datum.  
Thymbæ decoctum haustum.  
Apij semen in potu sumptum.  
Marrubij decoctum bibitum.  
Stachyos decoctum potui datum.  
Artemisæ decoctum in defessionibus adhibetur.  
Circæ radix quatuor librarum pondere contusa, & in septem dulcis vini heminis macerata per noctem, diemque tribus diebus pota.  
Oenanthes semen, caulis, & folia ex melle bibita.  
Leucoij semen drachmarum duarum pondere ex vino haustum.  
Rubicæ radix supposita.  
Anagyris trita folia ex pesto bibita.  
Chamæpitys ex melle subdita.

Chrysocome ex aqua multa pota.  
Thryomanes hausta.  
Bryonia supposita.  
Myrrha pota.  
Peucedani succus potus.  
Bunij semen potum.  
Smyrniij semen potui datum.  
Adiantij decoctum bibitum.

## Ad expellendum foetum.

Castoreum duarum drachmarum potere cum  
pulegio sumptum.  
Canticulæ lac primæ foeturæ haustum mor-  
tuum pellit.  
Oesypus, in lana suppositus.  
Caprarum montanarum sinum cum aliquo  
odoramento potum.  
Vulturni sinum fustum.  
Ciceris decoctum bibitum.  
Lupinorum decoctum cum myrrha, & melle  
fotu adhibitum.  
Sium pro olera in cibo sumptum.  
Dracunculæ maioris decoctum infusum.  
Piper haustum.  
Cyclaminis radix foetori adalligata.  
Hederæ foliorum pediculi melle illiti subditi.  
Gentianæ radix subdita.  
Centaurij maioris radix indita.  
Centaurij minoris succus infusus.  
Pulegium potum.  
Dictamnus bibitum, inditum, incensumque.  
Thymi decoctum haustum.  
Thymbrae decoctum potui datum.  
Baccharis recentissima radix supposita.  
Panacis Herculei acuminata radix indita.  
Pastinacæ erraticæ radix subdita.  
Seselis Mastiliensis radix pota, quin etiam &  
semen.  
Galbanum cum myrrha, & vino potum, sus-  
sumque.  
Clinopodium potum.  
Chamaedrys decoctum haustum.  
Scordij succus drachmæ pondere sumptus.  
Artemisæ decoctum in fessonibus adhibitum.  
Conyzae folia, & flores bibita.  
Leucosij semen duarum drachmarum pondere  
ex vino potum.  
Onosmatis folia ex vino hausta.  
Rubix radix supposita.  
Anagris trita folia cum passo pota, quin &  
adalligata, sed statim post partum auferan-  
tur.  
Anchusæ radix apposta.  
Mandragoræ liquor infusus.  
Myrrhis pota.  
Heliotropij folia indita.  
Sulphuris fumus in vterum permeans.  
Dauci semen bibitum.  
Ammoniacum haustum.  
Periclymeni semen drachmæ pondere in vino  
potum.  
Lauri Alexandinae radix sex drachmarum pon-

dere ex dulci vino sumpta.  
Alumen subditum.  
Iaspis lapis foetori adalligatus.  
Aërites lapis pro amuleto foetori suspensus.  
Samius lapis adalligatus.

## Ad conceptionem inhibendam.

Salicis folia per se, & cum aqua sumpta.  
Leporinum coagulatum post triduum à purga-  
tione menstrua sumptum.  
Sanguis menstruus illitus.  
Brassicæ flores à puerperio in pessulo subditi.  
Asparagi radix suspensa.  
Piper à coitu illico subditum.  
Hederæ corymbi drachmæ pondere à purga-  
tione hausti.  
Hedysarum ante coitum foetinis subditum.  
Cedria virili membro illita.  
Ostracites lapis scilicet pondere quatuor die-  
bus à purgatione potus.  
Asplenium (ut quidam credunt) silente luna  
nocturno tempore decerptum cum muli lie-  
ne ventri adalligatum.  
Periclymeni semen, & folia diebus triginta sex  
pota.  
Epimedij folia trita illico à purgatione quinque  
diebus continuis bibita.  
Gladoli inferior radix hausta.  
Filicis foeminæ radix potui data.  
Heliotropium adalligatum.  
Rubigo ferri pota.  
Mentha ante coitum vulvæ admota.

## Ad conceptionem iuuandam.

Leporinum coagulatum cum butyro subditum  
statim à mensium purgatione.  
Loliaceæ farina cum myrrha, thure, bitumine,  
& croco fustita.  
Pastinacæ erraticæ semen potum.

## Ad foetum mortuum educendum.

Dictamnus tum potum, tum subditum.  
Saluæ decoctum bibitum.  
Galbanum cum myrrha ex vino potum.  
Marrubij decoctum haustum.  
Tussilaginis decoctum potui datum.

## Ad prohibendum abortum.

Aërites lapis sinistro brachio adalligatus.  
Samius lapis pro amuleto suspensus.

## Ad puerperia iuuanda.

Dictamni radix bibita.  
Baccharis radicis decoctum fotu adhibitum.  
Fœxiculum erraticum potum.  
Peucedani succus haustus.  
Præonix siccata radix potui data.  
Althææ decoctum infusum.

## Ad prægnantium malicias.

Vitis viniferæ foliorum capreolotumq; succus.  
potus.

# Vteri. Extrem. membrorum.

## Ad vteri inflammationes.

Nardi Indicæ decoctum fotu adhibitum.  
 Lunci odorati decoctum in defeffionibus adhi-  
 bitum.  
 Vitis foliorum, & fēminis decoctum fotu ap-  
 positum.  
 Butyrum recens illitum.  
 Sonchi succus inunctus.  
 Agaricum drachmæ pondere cum oxymelite  
 potum.  
 Pulegij decoctum fotu subditum.  
 Melilotus cum paffo emplaftri modo impo-  
 situs.  
 Panacis Herculei lachryma ex melle indita.  
 Artemifia decoctum in defeffionibus adhibi-  
 tum.  
 Leucōij decoctum fotu appositum.  
 Anthyllidis radix ex rofaceo, lactēque indita.  
 Parthenij decoctum in defeffionibus additum.  
 Althæa decocta, ac fubinde anferino, fuillove  
 adipe, aut refina terebinthina fubacta, fub-  
 dita.

## Ad exulceratos locos.

Aspalathi ex vino decoctum infufum.  
 Lac in quo igniti calculi extincti fuerint infu-  
 fum.  
 Oefypum inditum. Explet enini & emollit.  
 Fœni græci folia ex aceto illita.  
 Afclepiadis folia adhibita.

## Ad induratos locos.

Myrrha cum abfinthio, lupinorum cremore, vel  
 ruta admota.  
 Stryax illita.  
 Anferinus & Gallinaceus adeps illitus.  
 Bdelium inunctum.  
 Malux decoctum inditum.  
 Ladanum peflis imiffum.  
 Panaces Herculeum ex melle inditum.  
 Ebuli, fambucique decoctum fotu admotum.  
 Parthenij decoctum in defeffionibus.  
 Fœni græci ex aqua expreffus succus cum an-  
 ferino adipe in pefluo fubditus.  
 Lilij radix admota.  
 Ageratum fuffum.

## Ad vteri inflationes.

Rutæ ex oleo decoctum clyftere perfufum.  
 Geranium, & eius radix drachmæ pondere  
 pota.

## Ad procidentem vterum.

Cafia fotu vel fuffu adhibita.  
 Myrri baccarum succus in defeffionibus.  
 Coronæorum malorum decoctum fotu adhi-  
 bitum.  
 Gallarum decoctum in defeffionibus additum.  
 Acacia fubdita.  
 Hypociftis fubdita.  
 Vitis viriufque folia impofita.  
 Acetum fotu adhibitum.

## Ad vteri dolores & erosiones.

Adeps Anferinus illitus.  
 Adeps Gallinaceus illitus.  
 Vrina cum ligultrino oleo feruefacta impofita.  
 Lini feminis decoctum infufum.  
 Malux decoctum fotu adhibitum, vel infufum.  
 Portulacæ decoctum clyfmate inditum, pro-  
 priè facit ad erosiones.  
 Rhaponticum potum.  
 Centaurij maioris radix bibita.  
 Anechi decoctum in defeffionibus.  
 Verbenacæ rectæ folia ex recenti fuillo adipe,  
 vel ex rofaceo fubdita.  
 Hyofcyami fēminis cremor inditus.  
 Mandragoræ liquor pefulis impofitus.

## EXTREMORVM MEM-

### BRORVM.

## Ad podagram.

Amomum illitum.  
 Mei radices impofitæ.  
 Populi nigra folia ex aceto illita.  
 Amurca cruda, ac recens fotu adhibita.  
 Salicis foliorum, & corticis decoctum fotu im-  
 pofitum.  
 Ficulneum lac cum farina fœni græci, & aceto  
 cataplafmatis additum.  
 Cochleæ terreftres, fuo cum operimento tuxæ,  
 impofitæ.  
 Mustelæ crematæ cinis ex aceto inunctus.  
 Marinus recens pulmo concifus impofitus.  
 Lac humanum cum opio, & cera illitum.  
 Adeps ouillus, capillus, hircinufve ex eius-  
 dem animalis fimo coctus inunctus.  
 Sanguis menftruis inunctus.  
 Caprarum montanarum fimo ex earum adi-  
 pe illitum.  
 Hordei farina cum cotoneis malis impofita.  
 Lens cum polenta decocta, & emplaftri modo  
 adhibita.  
 Raporum decoctum fomentis additum.  
 Braffica cum feno græco, & aceto in catapla-  
 fmate.  
 Intybus per fe & cum polenta illitus.  
 Cucurbitæ ramenta impofita.  
 Ari radix fimo bubulo emplaftri modo exce-  
 pta.  
 Aphodeli radix drachmæ pondere ex vino  
 pota.  
 Cyclaminis decoctum fotu adhibitum.  
 Bulbi per fe, & cum melle impofiti.  
 Panaces Herculeum cum paffa vva illitum.  
 Libanotis cum liliacæ farina, & aceto catapla-  
 fatis addita.  
 Scordium ex aceto, aut aqua impofitum.  
 Leucoium ex aceto illitum.  
 Androsaces impofita.  
 Helixines succus cera, & hircino adipe exce-  
 ptus illitus.  
 Hyofcyami fēmen, & folia cum polenta cata-  
 plafmatis adhibita.

# Extremorum membrorum.

Sempernitum inunctum, ubi calor exuperat.  
 Vetrica emplastri modo illita.  
 Muscus marinus impositus.  
 Cucumeris affinni radix ex aceto inuncta.  
 Thapsiz succus illitus.  
 Glans vnguentaria illita.  
 Sambuci & Ebuli folia cum seuo taurino, aut hircino imposita.  
 Bryonia cum caprino stercore cataplasmatibus addita.  
 Heliotropij folia illita.  
 Vicia passa a nucleis repurgata, & cum panacis succo inuncta.  
 Acetum calido foci cum sulphure adhibitum.  
 Rubigo ferri illita.  
 Sulphur cum aqua, & nitro inunctum.  
 Sal cum aceto impositum.  
 Afus lapis cum fabarum lomento illitus.  
 Gagate lapis inunctus.  
 Fornace testæ exustæ impositæ.

## Ad coxendicos affectus.

Mei radices impositæ.  
 Helenij folia ex vino cocta imposita.  
 Iridis Illyricæ decoctum clymate infusum.  
 Cardamomum ex aqua potum.  
 Asarum potum, vel clystere infusum.  
 Populi albæ cortex vnicæ pondere haustus.  
 Iberis confusa, & emplastri modo imposita.  
 Siluri piscis fassamentum clysteribus infusum.  
 Piscium Garum clysteribus iniectum.  
 Smyrnijs semen potum.  
 Bubulum simum ex bubus in pascuis degentibus illitum.  
 Lolij farina ex aqua mulla decocta imposita.  
 Lupinorum farina ex aceto illita.  
 Ammoniacum bibitum.  
 Ascyri semen ex aqua potum.  
 Asparagi radicum decoctum bibitum.  
 Aithææ decoctum potui datum.  
 Sinapi tritum cum fico impositum donec ruborem excitet.  
 Nasturcium clymate infusum.  
 Irionis semen clystere iniectum.  
 Bulbi per se, & cum melle impositi.  
 Capparidis semen potum.  
 Lepidij folia, & radices, cum helenij radice trita, & imposita.  
 Agaricum trium obolorum pondere in aceto mullo potum.  
 Rhaponticum potum.  
 Androsæmi semen bibitum. Sed à purgatione aquam exorbere oportet.  
 Centaurij maioris decoctum clystere infusum.  
 Leucacanthæ radices ex vino decoctum bibitum.  
 Abrotani semen cum aqua potum.  
 Rubiæ radix pota.  
 Pulegium illitum, quousque rubescat cutis.  
 Calamintha imposita, recens tritaque donec exuratur locus.  
 Thymus ex fimo cum polenta impositus. Idem præstat & Thymbra.

Rutæ sylvestris semen quadraginta diebus potum.  
 Panaces Herculeum ex melle inunctum.  
 Laster cera, ligustino, & Irino oleo subactum illitum.  
 Euphorbium in odorata potione sumptum.  
 Leontopetalum clysteribus infusum.  
 Hyperici semen quadraginta diebus potum.  
 Chamæpityos folia quadraginta diebus ex dulci aqua bibita.  
 Beronicæ folia ex aqua bibita.  
 Polemonis radix ex aqua sumpta.  
 Xyridis radix ex mullo pota.  
 Ocimastri semen cum vino, myrrha, & pipere sumptum.  
 Quinquefolij radices decoctum potum.  
 Heliochrysi coma ex vino hausta.  
 Papaveris corniculati radices decoctum potum.  
 Aethiopis decoctum bibitum.  
 Arction ex vino haustum, & illitum.  
 Chamæcissi folia trium obolorum pondere in aquæ cyathis tribus tricenis quadragenisve diebus pota.  
 Colocynthis clystere infusa, & recens loco confrita.  
 Cucumeris sylvestris radix clymate infusa.  
 Sparij ramorum ex aqua marina dilutum infusum.  
 Scammonia ex aceto decocta, & cum hordeacea farina imposita.  
 Acetum mullum haustum.  
 Sory ex vino clystere infusum.  
 Muria clystere indita.  
 Adarces illitus.

## Ad articolorum dolores.

Gallorum senescentium ius potum.  
 Brassica cum feno græco, & aceto illita.  
 Ruta cum hausta, tum cataplasmatibus adhibita.  
 Agaricum drachmæ pondere ex aceto mullo sumptum.  
 Melissophyllum ex sale impositum.  
 Quinquefolij radices decoctum bibitum.  
 Psyllium ex rosaceo, & aceto, aut aqua illitum.  
 Mandragoræ radix cum polenta imposita.  
 Vetrica cataplasmatibus modo adhibita.  
 Veractum nigrum potum.  
 Fucus marinus recens impositus.  
 Thapsiz succus inunctus.  
 Narcissi radix trita, & ex melle imposita.  
 Acetum mullum potum.  
 Vinum melitres frequentius potum.

## Ad articolorum collisiones.

Sarmentitius cinis cum axungia vel oleo illitus.

## Ad articolorum topicos.

Cannabis sylvestris radix decocta, & illita.  
 Ochra inuncta.

## Ad perniones.

Thus cum suillo adipe aut asnerino impositum.

# Extremorum Memb.

Pix liquida inuncta.  
 Acacia illita.  
 Myrti feminis decoctum fori adhibitum.  
 Ficus cremata cum cerato imposita.  
 Cancrorum fluuiatiliū cinis cum decocto melle illitus.  
 Pulmo marinus recens concisus, & impositus.  
 Afuinæ vngulæ cinis oleo maceratus illitus.  
 Vrinus adeps inunctus.  
 Vmbilici veneris succus impositus.  
 Lentes cum melidoto, siccis rosæ, malicorio, cydonio malo & rosaceo adhibita.  
 Orobi decoctum fori impositum.  
 Raporum decoctum fomenti modo.  
 Betæ decoctum impositum.  
 Dracunculi maioris folia ex vino decocta, & imposita.  
 Oleum in excavaia asphodeli radice decoctum illitum.  
 Cyclamini decoctum fori adhibitum, quine-tiam oleum cum pauca cera in eius excava-ia radice seruetur, illitum.  
 Scilla cremata imposita.  
 Ranunculi decoctum inunctum.  
 Arction ex vino illitum.  
 Alumen aqua aspersum.

## Ad pedum inflammationes ex cal- ceorum attritu.

Pulmo Agninus impositus.  
 Pulmo Vrinus impositus.  
 Pulmo Snillus impositus.  
 Calceamentorum veterum soleæ combustæ, & illitæ.  
 Cæpæ succus cum adipe gallinaceo impositus.

## Ad pedum rimas.

Cancrorum fluuiatiliū cinis cum decocto melle illitus.  
 Scilla oleo seruetur, & cum resina im-po-sita.

## Ad digitorum reduuias.

Punicorum malorum succus illitus.  
 Myrti folia trita, & inspersa.

Oleæ syluestis folia trita, & imposita.  
 Eboris ramenta in puluerem adhibita.  
 Aloe cum passo imposita.  
 Paronychia concisa & illita.  
 Bryonia oleo decocta, quousque liquecat, in-uncta.  
 Labruscæ cremati flores ex melle impositi.  
 Rubigo ferri illita.  
 Acacia illita.  
 Rhois folia ex aceto, aut melle illita.  
 Marrubij folia ex melle imposita.  
 Quinque folij radix illita.  
 Tithymali characiæ lac illitum.  
 Acetum illitum.  
 Alumen aqua aspersum.  
 Sal impositum.

## Ad paronychia.

Thus cum melle illitum.  
 Eboris scobes inspersus.  
 Paronychiæ folia illita.

## Ad scabros vngues au- ferendos.

Pix liquida illita.  
 Lini semen cum pasi nascutio & melle.  
 Cupressi pilulæ impositæ.  
 Lapathi cuiusque radix in aceto decocta illita.  
 Ranunculi folia, & radices admoxtæ.  
 Chelidonium minus illitum.  
 Viscum cum tizio auripigmento appositum.  
 Alumen cum aqua aspersum.  
 Sulphur cum resina terrebithina inunctum.  
 Sandaracha cum pice imposita.  
 Fex vini cremata ex resina.

## Ad mobiles vngues extra- hendos.

Vua passa illita.

## Ad contusos vngues.

Bulbi cum potentia impositi.

7 SIM



# SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM FACULTATES SECVNDVM

genera ex Dioscoride.

FEBRIVM.

*Ad tertianas.*



**A** R A N E V S plagellæ confrictus, lineæ olivæ illitus, mox frons, aut temporibus impositus. Vases terreni cū asserino adipe decocti, & illiti.

Plantaginis radices integræ tres cum vini cyathis tribus, & pari aqua potæ.

Trisoliij bituminosi tria folia trita, totidémque semina epota.

Hypericuni ex vino bibitum.

Verbenacæ supinæ tertius à terra geniculus cum adiacentibus foliis bibitus.

Heliotropij feminis grana quatuor pota ante febris accessionem.

Portulacæ succus haustus.

*Ad quartanas.*

Cinices lectularij septem cauis fabarum inclusi, & poti.

Plantaginis radices integræ quatuor, cum vini cyathis quatuor, & pari aqua bibite.

Verniculi, qui in Diplaci echino internis partibus conclusi reperiuntur, in aluta collo, brachiis adalligati.

Ruta sylvestris cum vino pota.

Hypericum ex vino haustum.

Quinqsoliij rami quatuor sumpti.

Verbenacæ supinæ quartus à terra geniculus vna cum adiacentibus foliis haustus.

Heliotropij feminis grana quatuor hora vna ante accessionem pota.

*Ad diurnas febres.*

Galli senis ius Dioscoridis modo paratum potum.

Agaricum haustum.

Vinum melitres haustum, vbi ventriculus magna imbecillitate laboret.

*Ad hepicas.*

Hyosciami tria, vel quatuor folia pota.

*Ad febrium circuitus.*

Sinapi cibus inspersum.

Smirniij semen potum.

Piper bibitum.

Ruta pota.

Sagapenum haustum.

Anthemis clysmate iusula.

Polygoni succus hora ante accessionem sumptus.

Quinque solij folia ex dulci aqua, aut diluto vino cum exiguo pipere bibita.

*Ad eticam.*

Portulaca tum ventriculi osculo, tum hypochondriis illita.

*Ad febrium algores.*

Piper haustum.

Agaricum drachmæ pondere sumptum.

Aristolochia rotunda ante accessionem bibita.

Abrocanum ex oleo inunctum.

Calaminthæ decoctum potum.

Panaces Herculeum illitum.

Smyrniij semen, & radix ex melle pota.

Pyrethrum inunctum.

Lasæ cum pipere, & thure ex vino haustum.

Conyza ex oleo inuncta.

Coris semen cum pipere haustum.

Buglossi radix cum semine bibita.

Periclymeni semen ex oleo inunctum.

# Tumorum Præter naturam.

Ad pestilentes febres.

Myrrhis bis, vel ter qualibet die ex vino pota.

## TVMORVM PRAETER

### NATVRAM.

Ad inflammationes.

Harundinum virentia folia tusa illita.

Glandes intrita, & illitu appositæ.

Rohis semen ex aqua illitum.

Lupinorum farina cum polenta, & aqua imposita.

Vmbilici Veneris succus circumlitus.

Plantago emplastri modo imposita.

Aphodeli radix cum polenta adhibita.

Acerum in succidis hâis, aut spongiis impositum.

Rhaponticum cum aceto illitum, vbi diutius perseverauerit inflammatio.

Pulegium cum polenta illitum.

Tussilaginis folia contrita, & ex melle imposita.

Parthenium emplastri modo impositum.

Louchitis altera imposita.

Cannabis sylvestris radix emplastri modo adhibita.

Polygonum illitum.

Tribuli fructus cataplasmati additus.

Xyridis radix ex aceto imposita.

Achillea illita.

Helxine cataplasmati addita.

Lichen herba adhibita.

Verbenacæ sapinæ folia illita, vbi inflammatio diutius perseverat.

Papaveris folia, vna cum calycibus illita, vel calyces tantum cum polenta adhibiti.

Hyosciami semen, & folia imposita.

Mandragoræ recentia folia cum polenta illita.

Bryoniæ radix ex vino decocta adhibita.

Sambuci ebullique præterea folia cum polenta illita.

Indicum illitum rumpit.

Tritici suffures acerrimo aceto elixi impositi.

Tritici pollen ex hydrelgo, vel aqua malsa illitus.

Triticæ panis ex aqua malsa decoctus, & herbis ad idem conferentibus additus, & impositus.

Sesamum illitum.

Ad carbunculos.

Ligustri folia imposita.

Pix liquida ex melle, & vna passa illita emarginat, disumpitque.

Cupressi folia trita & imposita.

Sabinae folia ex vino illita carbunculos circumscribunt.

Oliæ maturæ æræfactæ illitæ emarginant.

Nucum iuglandium veterum nuclei peruncti.

Columbinum sinum cum melle, & lini semine subactum.

Erui farina emplastri modo imposita.

Lupinorum farina ex aceto adhibita.

Brassica cum sale illita rumpit.

Nasurtium impositum.

Porrum cum sale appositum.

Panaces Herculeum illitum.

Coriandrum cum passa vna ex melle impositum.

Lasercipij liquor inunctus.

Tichymali caraciz lac illitum.

Vua passa à nucleis repurgata, & cum ruta imposita.

Ad firnuculos & tubercula.

Fermentum triticeum impositum.

Helxine illita.

Sal cum vua passa aut sullo adipe, aut melle impositum.

Hastula regiz radix in fæce vini decocta, illita.

Ephemeriz folia ex vino cocta, & imposita.

Vtrialque vriticæ folia illita.

Leontopodij radix suspensa.

Cucumeris sylvestris radix cum resina terebinthina imposita.

Scammoniz succus cum melle, aut oleo illitus.

Mori radices liquor illitus.

Thapsiz succus ex melle illitus.

Pycnocomi folia inuncta.

Sandaracha cum adipe imposita.

Alius lapis liquida pice, aut resina terebinthina exceptus, illitus.

Cimolia terra ex aceto illita.

Ad gangranas.

Rhois folia ex aceto, & melle illita.

Punicorum succus inunctus.

Nucum iuglandium veterum nuclei peruncti.

Ficulnei cineris lixiuum spongiis exceptum & impositum.

Loliacæ farina cum sale, & raphano cataplasmati addita.

Cicerum farina cum hordeo, & melle adhibita.

Lentis cum fertula campana, rosaceo, siccis rosis, malicorio, & salsa aqua illitæ.

Erui farina illita.

Brassica elixa cum melle, cataplasmati addita.

Bulbi per se, & cum melle impositi.

Lasercipij liquor illitus, loco prius scalpello exciso.

Galiopsis folia, semina succus, & caulis, ex aceto imposita.

Verbasci florem aureum ferentis folia adhibita.

Tichymali caraciz lac impositum.

Bryoniæ radix, fructus, & folia cum sale illita.

Vua passa à nucleis repurgata, & cum sale imposita.



# Tumorum.

## Ad erysipelas, & sacroignes.

Crocum illitum cum refrigerantibus.  
 Cupressi folia per se, & cum polenta imposita.  
 Rhizanni folia illita.  
 Ligustri folia adhibita.  
 Rosæ illitæ.  
 Acaciæ succus inunctus.  
 Oleæ sylvestris folia contrita, & imposita.  
 Myrti folia cum onopliacino oleo, aut exiguo rosaceo, & vino illita.  
 Menstruus mulierum sanguis circumlitus,  
 Caprarum montanarum finum ex vino, vel aceto decoctum impositum.  
 Urinæ humanæ sedimen inunctum.  
 Lentes cum meliloto, siccis rosæ, rosaceo, & malicorio adhibita.  
 Melle ex oleo decocta, & illita.  
 Brassicæ utraque incisâ, & cum polenta emplastrî modo imposita.  
 Portulacæ cum polenta cataplasminatis addita.  
 Plantago illita cum cinolia, & cerussa.  
 Ineybiradix, & folia cum polenta imposita.  
 Ictidis folia illita,  
 Acinos cataplasminatis addita.  
 Rutæ succus cum aceto, cerussa, & rosaceo inunctus.  
 Coriandrum cum pane, polentave illitum.  
 Lilij folia ex aceto illita.  
 Tussilaginis folia trita, ex melle imposita,  
 Parthenium cum floribus emplastrî modo impositum  
 Polygonum illitum.  
 Anchusæ radix cum polenta adhibita.  
 Lycopsis radix cum polenta imposita.  
 Rubi Idæi flos illitus.  
 Helixine imposita.  
 Quinquesfolij radix decocta cataplasminatis indita.  
 Verbenacæ recta ex aceto inuncta.  
 Papaueris vâscula concisa cum polenta imposita.  
 Solani hortensis folia cum polline polentæ illita.  
 Quin & eiusdem succus inunctus.  
 Mandragoræ radix ex aceto illita,  
 Cicutæ succus inunctus.  
 Umbilici Veneris succus circumlitus.  
 Psyllium, & eius spissamentum inunctum.  
 Lens palustris illita.  
 Ricini folia ex aceto illita.  
 Sempervivum maius inunctum.  
 Stratiotes imposita.  
 Acenium circumlitum.  
 Rubigo ferri illita.  
 Chalcitis inuncta.  
 Sal cum aceto, aut hyssopo illitum.

## Ad herpetas.

Acaciæ succus inunctus.  
 Myrti folia cum onopliacino oleo, aut exiguo rosaceo ex vino imposita.  
 Oleæ sylvestris folia contrita, & imposita.

Caprarum montanarum finum ex vino, vel aceto decoctum illitum,  
 Lentes cum fertula campana, rosaceo, siccis rosæ, & malicorio cataplasminatis indita.  
 Helixines succus cum cerussa inunctus.  
 Plantago imposita.  
 Chelidonium maius ex vino illitum.  
 Rubi folia illita.  
 Solani hortulanæ succus cum cerussa, rosaceo, & argenti spuma illitus.

## Ad epiniçtydas.

Ouillum, caprillumve finum ex aceto illitum.  
 Brassicæ concisa cum polenta imposita.  
 Plantago quoquo modo adhibita.  
 Cucumeris folia cum melle inuncta.  
 Porri folia cum Rhoe obfonsiorum cataplasminatis indita.  
 Absinthium cum aqua illitum.  
 Coriandrum cum passa uræ, & melle impositum.  
 Viscum ia spenio adhibitum.  
 Heliotropij semen illitum.  
 Ura passa a nucleis repurgata, cum ruta imposita.

## Ad strumas.

Iridis Illyricæ radix cocta, & illita.  
 Pix liquida cum farina hordeacea, & pueri impubis urina decocta, illita.  
 Ficus siccæ coctæ, & impositæ.  
 Grossi coctæ & illitæ.  
 Viperinæ carnes coctæ, & in cibum sumptæ.  
 Mustellæ sanguis inunctus.  
 Asinini vaguis cinis ex oleo maceratus illitus.  
 Bubulum finum & bubus herbas pascencibus sumptum illitum.  
 Hordei farina cum pice, & impubis pueri urina excepta, imposita.  
 Loliacæ farinæ cum fimo columbinæ ex vino decocta, adhibita.  
 Fabarum farina cum melle, & feno græco illita.  
 Lens in aceto cum meliloto decocta illita.  
 Lupinorum farina ex aceto inuncta.  
 Rumex decoctus circumlitus.  
 Plantago cum sale imposita, vel radix collo suspensa.  
 Sinapi cum sulphure illitum.  
 Nasturtium ex urina inunctum.  
 Piper cum pice impositum.  
 Coriandrum cum fabæ lomento adhibitum.  
 Galbanum illitum.  
 Aparine cum axungia inuncta.  
 Melissophylli folia cum sale cataplasminatis addita.  
 Althæa ex vino, vel aqua multa decocta imposita.  
 Quinquesfolij radix decocta, ac concisa adhibita.  
 Lasterpitij liquor ex cæra illitus.  
 Umbilici Veneris succus circumlitus.

Mandra

# Tumorum præter naturam.

Mandragoræ recentia folia cum polenta imposita.  
Semperuium tertium impositum.  
Galioſis folia, caulis, ſemen, & ſuccus cataplaſmatis indita.  
Pſeudobuniſi rami quaterni ex aqua poti illitique.  
Adiantum impositum.  
Fornacæ teſtæ toſtæ ex cerato illitæ.  
Capparis radix, & folia trita & imposita.

## Ad panos.

Olex ſylueſtris folia cum melle inuncta.  
Ficus ſiccæ coctæ, & illitæ.  
Bubulum ſimum ex paſcuis ſumptum impositum.  
Lupinorum farina ex aceto adhibita.  
Atriplex tam crudum, quàm coctum illitum.  
Plantago cum ſale imposita.  
Bulbi elixi cum polenta, & ſuillo adipe illiti.  
Iſatidis folia imposita.  
Eryngium aſſigatum.  
Abrotanum cum farina hordeacea, & hydrelæo ſubaſta illitum.  
Acinos herba imposita.  
Panacis Aſclepij flores, & ſemen cataplaſmatis indita.  
Coriandrum cum ſube lomento appositum.  
Ammoniacum inunctum.  
Onobrychis concifa, & emplaſtri modo imposita.  
Gladioli ſuperior radix, cum loliaceæ farina, & dulci aqua illita.  
Pſyllium ex roſaceo, acetove, aut aqua impositum.  
Mandragoræ folia recentia adhibita.  
Galioſis folia, caulis ſuccus, & ſemen illita.  
Perſonacæ radix cum axungia ſuo ſuper folio imposita.  
Pyncocomum adhibitum.  
Conyza emplaſtri modo imposita.  
Vini ſax illita.

## Ad tumores diſcutiendos.

Canceri ſtuitiales impositi.  
Lini ſemen illitum.  
Fœni græci farina cataplaſmatis addita.  
Capparis radix, & conuſa folia imposita.  
Smyrniſi radix illita.  
Ammoniacum inunctum.  
Bupthalamii folia, & flores cera excepta, & imposita.  
Mandragoræ recentia folia cum polenta illita.  
Galioſis folia, caulis, ſuccus, & ſemen adhibita.  
Aegilops imposita.  
Diphryges cum reſina terebinthina, aut cerato.  
Pyrites lapis illitus.  
Alabaſtris lapis crematus, reſina, aut pice exceptus.  
Cimolia terra illita.

## Ad ſcirrhum.

Taurinus ſanguis cum polenta illitus.  
Bubulum ſimum ex paſcuis aſſumptum ex aceto illitum.  
Loliacea farina cum ſimo columbino in vino decocta.  
Lini ſemen cum nitro, & lixiuio ſculnei cineris decoctum.  
Hydropiper illitum.  
Cannabis ſylueſtris radix imposita.

## Ad carcinomata.

Cancrorum ſtuitilium cinis cum melle decoctus, & illitus.  
Iriſis ſemen tritum, & impositum.  
Vtraque vrtica adhibita.  
Galioſis folia, caulis, ſuccus & ſemen imposita.

## Ad tumores in vniuerſum.

Suillus adeps illitus.  
Braſſica vtraque concifa, cum polenta imposita.  
Cucurbita imposita.  
Xanthij ſemen illitum.  
Bulbi elixi cum polenta, & adipe ſuillo illiti.  
Lini ſemen cataplaſmatis inditum.  
Fœni græci ſemen illitum.  
Cæpa decocta, & cum paſſa vva, & ſeu adhibita.  
Narciffi radix illita.  
Bryoniæ radix ex vino decocta, & imposita.  
Iſatidis folia applicata.  
Smyrniſi radix illita.  
Tragoriganum cum polenta impositum.  
Mentha cum polenta cataplaſmatis addita.  
Amaraci folia cum cera coacta, & illita.  
Daucum illitum.  
Libanotis radices emplaſtri modo impositæ.  
Nigella ex aceto inuncta.  
Horminum ex aqua illitum.  
Bupthalamii flores cera ſubaſti.  
Althæa decocta imposita.  
Cannabis ſylueſtris radix emplaſtri modo adhibita.  
Anagyris folia illita.  
Polygonon cataplaſmatis inditum.  
Xyridis radix ex aceto inuncta.  
Helxine imposita.  
Quinquefolij radix decocta emplaſtri modo.  
Verbenacæ ſupinæ folia imposita.  
Pſyllium ex roſaceo, acetove, aut aqua illitum.  
Ephemerii folia ex vino decocta, illita.  
Cyiſi folia cum pane inter initia imposita.  
Cucumeris agreſtis radix cum polenta imposita.  
Chamaſyceæ rami triti, & impositi.  
Pyncocomi ſemen cum polenta illitum.  
Indicum inunctum.  
Vini ſax cruda per ſe, vel cum myrto illita.

# Vulnerum.

## Ad fteatomata.

Chryſanthemi flores cum cerato triti, & im-  
poſiti.

## Ad meliceridas.

Rumex cum roſaceo, & croco illitus.

Melilotus ex aqua inuncta.

Vua paſſa à nucleis expurgata trita, cum ruta  
impoſita.

## Ad tumores ex iſtu.

Brasſica conciſa cum polenta impoſita.

Cucurbita emplaſtri modo illita.

Hydropiper impoſitum.

Thymus, Thymbraque illita.

## Ad fugillata.

Cafeus recens illitus.

Succida lana oleo, acetove perſuſa.

Fabarum farina ex melle, & ſeno græco.

Lupinorum farina impoſita.

Raphanus ex melle.

Allij cinis ex melle.

Sinapi illitum.

Hydropiper impoſitum.

Pearmica cum floribus illita.

Bulbi per ſe, aut ex oui vitello.

Rhaponticum ex aceto.

Aloe ex melle.

Laſerpicij liquor illitus.

Absinthium ex melle.

Aqua maris caſida ſotu adhibita.

Hyſſopum ex feruenti aqua.

Calamita ex vino.

Amaraci ſiccata folia ex melle.

Cuminum erraticum commanſum ex melle,  
& paſſa vua illitum.

Ammi ex melle.

Acetum ex melle.

Thapſiæ ſuccus, & radix cum thuris, & cere  
æquali portione duabus tantum horis im-  
poſita, & ſubinde marina aqua ſotu adhi-  
bita.

Bryonia ex oleo decocta quouſque liqueſcat.

Sal ex melle inunctum.

## V V L N E R V M.

### Ad vulnera conglutinanda.

Cupreſſi folia trita.

Vlmi folia ſed multo magis corticis tilia ſi fa-  
ſciæ loco interqueatur.

Sycamori liquor illitus.

Amurca in cupreo vaſe decocta illita.

Palmulæ immaturæ illitæ.

Viticis folia, & ſemen impoſita.

Punicorum cytini impoſiti.

Thus inſperſum.

Lanæ cinis impoſitus.

Sylueſtris brasſicæ folia impoſita.

Argemone illita.

Glycyrrhizæ ſuccus illitus.

Centaurij maioris recens radix impoſita.

Centaurij minoris folia tuſa, & illita.

Achillea impoſita.

Poterij radix conciſa illita.

Smyrniæ radix impoſita.

Aloe in puluerem inſperſa.

Sarcocolla impoſita.

Polycnemum ex aqua impoſitum.

Polium emplaſtri modo impoſitum.

Scordium impoſitum.

Equiſeti folia inſperſa.

Lonchitis folia impoſita.

Althæa in vino, aut muſſa aqua decocta im-  
poſita.

Sideritis folia impoſita.

Chamaepityos, ex melle adhibita.

Sideritis altera impoſita.

Polygonum emplaſtri modo adhibendum.

Polygonatum emplaſtri modo admotum.

Symphitum petraea inditum.

Symphitum emplaſtri modo impoſitum.

Clymeni ſuccus impoſitus.

Sideritis quælibet illita.

Lycopſis radix cataplaſmatis indita.

Ocimi ſemen illitum.

Graminis radix conciſa, & adhibita.

Conyza illita.

Quinquefolium adhibendum.

Coccum inſectorum tritum, & inſperſum.

Verbenaca illita.

Erigeri folia, & flores cum thuris manna ad-  
hibita.

Verbſci folia ex aceto.

Spongæ recentes ſine pinguedine ex aqua vel  
poſta.

Succida lana vino, aceto, oleove inſuſa.

Dracunculi folia ex vino decocta.

Iſtidis folia illita.

Stratiotes millefolium impoſitum.

Morochthus lapis inſperſus.

### Ad fluxum ſanguinis vulnerum.

Sylueſtris oleæ ſoliorum ſuccus admotus.

Galiz crematæ vino, aceto, aut muria extin-  
ctæ inſperſæ.

Punicorum cytini impoſiti.

Perſæ arida folia illita.

Cupreſſis pilulæ cum arboris coma trita &  
admotæ.

Thus inſperſum.

Ranzum crematarum cinis illitus.

Araneorum tela adhibita.

Caprarum montanarum ſinum ex aceto.

Aſininum ſinum tum crudum, tum crema-  
tum ex aceto.

Stæbis folia impoſita.

Portulaca illita.

Plantago admotæ.

Idæa radix admotæ.

Iſtidis folia inuncta.

Salvia adhibita.

Galij ſlos inditus.

Androſami folia illita.

# Vulnerum.

Quinquifolium admotum.  
Phœnix herba cum punicea lana corpori alligata.  
Lichen herba adhibita.  
Astragali radix indita.  
Hyoſcyami ſemē oboli pondere in muſſa aqua potum.

Stratores millefolium admotum.  
Cinnabaris, & Sanguis draconis inditus.  
Alumen admotum.  
Sulphur impositum.  
Gypſum inſperſum.  
Spongiæ ficcæ recentes, & vacuæ impositæ.  
Spongiarum crematarum cinis ex pice.  
Ætæria terra inſperſa.  
Subium inſperſum.

**Ad ſanguinem ex cerebro erumpentem.**

Gallinaceorum cerebrum ex vino potum.  
Subium tritum inſperſum.

**Ad ſanguinis grumos.**

Thymus impositus.  
Thymra illita.

**Ad vulnera telis venenatis illata.**

Diſtanni ſuccus cum potus, tum inſtillatus.

**Ad oſſa carne veſtienda.**

Iris Illyrica illita.  
Panacis Herculei radix imposita.  
Myrrha cum cochleæ carnibus peruncta.

**Ad vulnera membranarum cerebri.**

Buryrum admotum.

**Ad vulnerum inflammaciones.**

Bubulum recens ſinum ex paſtuis ſumptum ac ſubinde foliis inuolutum, & in feruenti cinere calefactum impositum.  
Pinorum, & piſtæarum folia trita, & illita.  
Fabarum farina cataplaſmaticis indita.  
Lupinorum farina admotæ.  
Stratiotes impositæ.  
Millefolium ex aceto illitum.  
Labruſæ flores cataplaſmaticis inditi.  
Ærugo illita.

**Ad inſixa vulneribus extrahenda.**

Cochleæ terreſtres cum ſuo operimento tuſæ, & appoſitæ.  
Siluri falſi caro admotæ.  
Lacertæ concuſum caput impositum.  
Bulbi cataplaſmaticis inditi.  
Horminum ex aqua illitum.  
Anagallis adhibita.  
Narciſſi radix cum lolij farina imposita.  
Ariſtolochia rotunda imposita.  
Diſtannum admotum.  
Gladioli radix ſuperior ex vino, & thure illita.

# Ulcera.

Xyridis radix admotæ.  
Tragij folia, ſemen, & liquor illita.  
Pycnocomi ſemen cum polenta impositum.  
Acutæ ſpine radix illita.  
Harundinis radix admotæ.  
Sinapi impositum.

**Ad carnis excreſcentias.**

Gallæ tritæ, & inſperſæ.  
Palmarum nuclej exuſti, lotij, illiti.  
Erinacei marini operimenti cinis admotus.  
Crematæ purpuræ cinis inditus.  
Conchulæ indicæ cinis illitus.  
Smaridis piſcis exuſtum caput impositum.  
Lanæ crematæ cinis inunctus.  
Scordium ſiccatum inſperſum.  
Æs uſum impositum. Quia etiam æris ſoſ admotus.  
Plumbum elotum tritum, inſperſum, illitum, vel quoquo modo admotum.  
Scibium tritum, inſperſum, illitum, vel quoquo modo admotum.  
Argentī ſpuma trita, inſperſa, illita, vel quoquo modo admotæ.  
Ceruſſa trita, inſperſa, illita, vel quoquo modo admotæ.  
Chryſocolla trita, inſperſa, illita, vel quoquo modo admotæ.  
Ochra trita, inſperſa, illita, vel quoquo modo admotæ.  
Diphyrges tritum, inſperſum, illitum, vel quoquo modo admotum.  
Auripigmentum tritum, inſperſum, illitum, vel quoquo modo admotum.  
Pumex tritus, inſperſus, illitus, vel quoquo modo admotus.  
Corallium tritum, inſperſum, illitum, vel quoquo modo admotum.  
Aſij lapidis ſoſ ſiccatus tritus, inſperſus, illitus, vel quoquo modo admotus.  
Pyrites lapis cum reſina impositus.  
**Ad vulnera cicatrice obducenda.**  
Cadmia elota inſperſa, vel illita.  
Plumbum elotum impositum.

## V L C E R V M.

**Ad depaſcentia ulcera, quæ Græci *Caridææ* vocantur.**

Pini picæq; cortex cum chalcantho tritus illitus.  
Lentiſci decoctum ſoru adhibicum.  
Cupreſſi folia trita inuncta.  
Sabinæ variuſque folia trita, & admotæ.  
Rhamni cuiuſque folia impositæ.  
Cisti flores per ſe iuncti.  
Olex ſylueſtris folia trita & adhibita.  
Lignorum marcor illitus.  
Oliuæ maturæ exuſtæ, tritæ & inſperſæ.  
Palmarum cortex ſine inuolutum admotum.

# Vlcerum.

Myrti folia trita, cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo ex vino imposita.  
 Amygdalæ amaræ ex vino inunctæ.  
 Sinaridis piscis crematum caput, tritum, & illitum.  
 Garum piscium admotum.  
 Testudinis fel inunctum.  
 Loliacea farina cum sale, & raphano illita.  
 Lini semen ex vino decoctum.  
 Erui farina admotæ.  
 Raphanus tritus inunctus.  
 Betæ folia imposita.  
 Plantago quoquo modo indita.  
 Dracunculi maioris radix concisa, ex melle, bryonia addita.  
 Asphodeli radix, & folia ex vino.  
 Anagallis trita addita.  
 Hederæ decoctæ folia ex vino.  
 Chelidonii maioris radix ex vino.  
 Ifacidis folia superposita.  
 Aristolochia rotunda adhibita.  
 Chamæleonis nigri radix cataplasmatæ addita.  
 Pulegium virens appositum.  
 Marum admotum.  
 Panacis Asclepij flores, & semen illitum.  
 Pastinacæ erraticæ folia contusa ex melle.  
 Coriandrum cum pane polentæ & illitum.  
 Marrubij folia ex melle.  
 Tithymali characiæ lac illitum.  
 Omphacium ex aceto inunctum.  
 Cicutæ succus illitus.  
 Sedum maius impositum.  
 Sphondilium cum ruta admotum.  
 Polygonum superpositum.  
 Verbenacæ ex aceto.  
 Solani hortulani folia cum polentæ polline illita.  
 Acetum fori adhibiturum.  
 Acida muria fori imposita.  
 Petasites admotæ.  
 Aeris squamma inspersa.  
 Aerugo illita.  
 Sal coctum cum polenta adhibiturum.  
 Salis flos inspersus.  
 Chalcitis illita.  
 Diphryges iunctum.  
 Alius lapis tritus ex aceto.  
 Alumen cum gallæ crematæ pari podere ex aceti facie.

## Ad vlcerâ diuturna.

Cisti flores per se illiti.  
 Centaurium minus admotum.  
 Panacis Herculei acuminata radix imposita.  
 Viscum cum thure inunctum.  
 Chamædryes ex melle.  
 Lilij foliorum succus in æreo vase decoctus ex aceto, & melle.  
 Scordium tritum ex melle.  
 Anchusæ radix oleo incosta ex cera.

Verbenacæ trita ex melle.  
 Astragali radix illita.  
 Thalsitri radix inuncta.  
 Personatæ folia imposita.  
 Omphacium ex aceto.  
 Spongiæ recentes siccatæ, & vacuæ impositæ.  
 Asij lapidis flos siccatæ illitus.

## Ad malefica dolosâque vlcerâ.

Plantago quoquo modo imposita.  
 Dracunculi concisa radix cum bryonia ex melle.  
 Petasites illita.  
 Psyllium tritum ex melle.  
 Bryoniæ folia, fructus radix cum sale imposita.  
 Filicis femine radix trita, & illita.  
 Cadmix pulvis inspersus.  
 Salis flos illitus.  
 Asij lapidis flos ex melle.  
 Ostracites lapis ex melle.

## Ad sinus & fistulas.

Iridis Illiricæ radicum decoctum infusum.  
 Suillus adeps infusus.  
 Mel infusum.  
 Plantaginis succus inditus.  
 Dracunculi maioris radices succus ex melle.  
 Aristolochia rotunda cum iride ex melle.  
 Sphondilij ramenta circumligata sinuum callos erodunt.  
 Quinquefolium cum sale ex melle.  
 Stratiotes millefolium infusum.  
 Tithymali characiæ lacteus succus inditus.  
 Omphacium cum aceto.  
 Chalcitis collyrij modo infusa.  
 Cadmia illita.  
 Spongia recens sine pinguitudine ex decocto melle imposita.  
 Gentiana quoquo modo adhibita.

## Ad vlcerâ in callum indurata.

Capparis radix excicata imposita.  
 Aerugo cum ammoniaco collyrij modo imposita.  
 Spongiæ aridæ lino ligatæ, & in ponicilli modo impositæ.

## Ad vlcerâ ab erodentibus prouenientia.

Lac omne, & præsertim bubulum illitum.  
 Ad phthiriasim.  
 Staphis agria trita, & ex oleo illita.

## Ad fordida vlcerâ.

Oleæ syluestris folia tusa ex melle.  
 Iris Illyrica ex melle.  
 Colymbades tritæ & impositæ.  
 Resina terebinthina illita.  
 Pix liquida cum melle indita.  
 Erinacei marini operimentum exustum impositum.

# Vlcerum.

Purpuræ crematæ cinis illitus.  
 Conchulæ indicæ cinis inspersus.  
 Orobi farina admota.  
 Brassica cum fœno græco, & aceto illita.  
 Asphodeli folia, & radices imposita.  
 Capparis cortex siccatus, & adhibitus.  
 Anemones radix illita.  
 Hederæ decocta folia ex vino.  
 Chelidonium maius cum xungia admotum.  
 Aristolochia rotunda imposita.  
 Libanotidis radices siccatae ex melle.  
 Ballote ex melle.  
 Marrubij folia ex melle.  
 Verbenacæ supinae folia illita.  
 Narcissi radix cum erui farina ex melle.  
 Bryoniae radix, fructusque cum sale admota.  
 Aerugo ex melle cocta, & imposita.  
 Aes vltum inspersum.  
 Vreica vtraque trita, & illita.  
 Peucedani radix trita inspersa.  
 Cadmia indita,  
 Mel illitum.  
 Pompholyx admota.  
 Muria indita.  
 Alumen quoquo modo adhibitur.  
 Assij lapidis flos exsiccat, & illitus.

## Ad ambusta.

Platani pilulæ adipe exceptæ illitæ.  
 Ligustri foliorum decoctum foris adhibitur.  
 Cisti flores cum cerato impositi.  
 Acaciæ gummi ex ouo illitū pustulas prohibet.  
 Myrti folia cruda seu cremata cerato excepta.  
 Mori folia trita ex aceto illita.  
 Thus ex fuillo vel asferino adipe exceptum.  
 Buccinæ cinis illitus.  
 Mitulorum combustorum cinis admotus.  
 Conchulæ Indicæ cinis inunctus.  
 Calciamentorum veterum cinis inpositus.  
 Suillus adeps inunctus.  
 Finum Ousillum cera & rosaceo subactum.  
 Finum Columbinum cum lini semine ex oleo.  
 Finum Gallinaceum cum lini semine ex oleo.  
 Sesamum ex rosaceo.  
 Malua decocta ex oleo.  
 Betæ virentia folia illita.  
 Brassicæ cinis ex oui albo.  
 Lactucæ sylvestris lacteus succus ex humano lacte.  
 Hederæ flores ex cera. Quin & decocta folia ex vino.  
 Acanthi radix illita.  
 Rutæ sylvestris semen, & folia admota.  
 Gutinum calida aqua maceratum illitum pustulas prohibet.  
 Typhæ flos vetere fuillo adipe eloto exceptus.  
 Hemerocallis radix illita.  
 Althææ folia ex exiguo oleo admota.  
 Hyperici semen, & folia imposita.  
 Afcyni semen, & folia adhibita.

Androsæmi folia imposita.  
 Anchusæ radix in oleo decocta ex cera.  
 Helxine admota.  
 Papaueris corniculati folia ex oleo.  
 Verbasci sylvestris folia cataplasmatitis ad dita.  
 Scimmi ex recenti adipe illitum pustulas prohibet.  
 Alumen ex aqua.  
 Sal ex oleo pustulas prohibet.  
 Cimolia terra illita pustulas prohibet.  
 Phrygius lapis cerato exceptus.  
 Atramentum scriptorium ex aqua.  
 Cinnabaris, & sanguis draconis illitus.  
 Galij flos inunctus.  
 Liliij radix cremata ex rosaceo. Quin & folia illita.  
 Cynoglossæ folia ex veteri fuillo adipe.  
 Sambuci prætenera folia inuncta.  
 Narcissi radix ex exiguo melle.  
 Oleum ex cauatibus asphodeli radicibus decoctum illitum.

## Ad fauos.

Peponis radix ex melle.  
 Nasturtium illitum.

## Ad ficos.

Bulbi in cinere tosti, & cum capiti mazarum cinere impositi.

## Ad intertrigines.

Calciamentorum crematorum solæ illitæ.

## Ad vlcerum inflammationem.

Aranei tela imposita.

## Ad vlcera caua explenda.

Thus inditum.  
 Pix liquida cum melle.  
 Pix arida imposita.  
 Medulla ossium quadrupedum quælibet inuncta.  
 Mel infusum.  
 Cadmia inspersa.  
 Corallium inditum.  
 Assij lapis flos ex melle.  
 Eretria terra illita.  
 Pumex inspersus.

## Ad vlcera cicatrice obducenda.

Purpararum crematarum cinis illitus.  
 Mitulorum cinis illitus.  
 Conchulæ Indicæ cinis illitus.  
 Aloe inuncta.  
 Eupatorii folia confusa ex fuillo adipe.  
 Filicis feminæ radix sicca in puluerem aspersa.  
 Cadmia admota.  
 Aes vltum impositum.  
 Squama æris inspersa.  
 Aerugo ex oleo & cera.

# Luxationum & Frac. Venenorum.

Stimmi quoquo modo adhibita.  
Molybdæna quoquo modo adhibita.  
Argenti spuma quoquo modo adhibita.  
Ceresa quoquo modo adhibita.  
Chalcitis quoquo modo adhibita.  
Pumex quoquo modo adhibita.  
Fex vini cremata quoquo modo adhibita.  
Calx lota quoquo modo adhibita.  
Corallium quoquo modo adhibita.  
Assij lapidis flos quoquo modo adhibitus.  
Fornaceæ testæ testæ quoquo modo adhibita.

## LUXATIONVM ET FRACTVRARVM.

### Ad artuum luxationes.

Harundinis radix cum aceto adhibita.  
Persenæ radix trita illita dolores artuum à contorsionibus sedat.  
Acaciæ decoctum foris adhibita.  
Vitici semen cum folijs cataplasmatibus additum.  
Stercus caprillum cum cera, & rosaceo inunctum.  
Asparagi radix ex aceto, vel vino adhibita.  
Cyclamini decoctum somenti modo.  
Bulbi cataplasmatibus more adhibiti.  
Acanthi radices impostæ.  
Sampuchii folia cum cera coacta impostæ.  
Anchusæ folia cum melle, & farina adhibita.  
Vitis veraque impostæ.  
Narcissi radix cum melle trita.  
Vitis nigre folia cum vino impostæ.  
Filicula impostæ.  
Heliotropij folia linita.  
Samentorum vitis, & vinaceorum cinis ex aceto linitus.  
Sal cum farina, & melle.

### Ad ossa fracta.

Myrti foliorum decoctum foris adhibita.  
Succida lana oleo, vino acetique persusa.  
Verbasci decoctum potum.  
Fuligo pictoria cum rosaceo cerato impostæ.  
Vini foliorum, aut corticis radicum decoctum persusum.

### Ad ossa fracta euellenda.

Aristolochia rotunda cataplasmatibus mere impostæ.  
Peucedani radix in puluerem impostæ.  
Euphorbium impostum.  
Xyridis radix addito flore æris.  
Eryonia trita, & impostæ.  
Vitis nigre radix.

### Ad eos qui ab alto deuoluuntur.

Gentianæ radicis succus drachmæ pondere haustus.  
Baccharis radicis decoctum potum.

Millefolium cum aqua, & sale potum.  
Lixiuum ex cinere fermentitio factum cum aceto, sale & melle.

### Ad ruptos.

Acori decoctum potum.  
Cardamomum ex aqua potum.  
Calami odorati decoctum cum graminis, aut apij femine potum.  
Helenij radices in eclegmate cum melle deuorata.  
Edellium haustum.  
Iuniperi bacce bibita.  
Cedrides deuorata.  
Halimi radix drachmæ pondere in aqua mulsa pota.  
Dracunculi maioris radix tosta, & elixa cum melle sumpta.  
Asphodeli radix drachmæ pondere in vino pota.  
Bulbi elixi in aceto, & in cibo sumpti.  
Agaricum trium obolorum pondere deuoratum cum melle.  
Gentianæ radicis succus drachmæ pondere haustus.  
Aristolochia rotunda bibita.  
Serpillium potum.  
Centaurij maioris radix hausta cum vino.  
Acanthi radices potæ.  
Smyrnij radix comesta, vel pota.  
Leucacanthæ radicis ex vino decoctum potum.  
Abrotani semen ex aqua potum.  
Origanum cum sicu deuoratum.  
Equiseti radix & folia pota.  
Calaminthæ decoctum haustum.  
Baccharis radicis decoctum bibitum.  
Libanotis radices potæ.  
Sagapenum bibitum.  
Laserpitij liquor cum lixiuo potus.  
Galbanum deglutitum.  
Polycnemum bibitum cum vino.  
Scordium additis nasturtio, melle, resinaque deuoratum.  
Althææ decoctum potum.  
Alceæ radix in vino vel aqua, pota.  
Beronicæ folia drachmæ pondere in dulci aqua bibita.  
Symphytum petrarum cum aceto mulso potum.  
Symphyti radix pota.  
Xyridis radix ex mulso pota.  
Herichrysi coma in vino pota.  
Verbasci decoctum potum.  
Eryonia cum melle in eclegmate deuorata.  
Schistus lapis potus.

## VENENORVM.

### Ad omnium venenosorum mortuum, istum que.

Iridis illyricæ radix ex aceto pota.  
Cardamomum ex vino potum.  
Nardus Celtica cum absinthij decocto hausta.  
Phu anti

# Venenorum.

Phu antidotis inferitur, quæ venenatis refi-  
sunt moribus.  
Cinnamomum bibitum.  
Cassia potui data.  
Helenij radicis decoctum potum.  
Bdellium potui datum.  
Platani pilulæ ex vino haustæ.  
Ericæ flores poti. Quin etiam coma.  
Viticis semen in potu sumptum.  
Giandes esitare.  
Nuces comefre.  
Sycomori lachryma illita.  
Ficulinum lac plagis inditum.  
Pix liquida cum trito sale illita.  
Paliuri foliorum, & radicis decoctum po-  
tum.  
Gallinaceorum cerebrum cum vino potui da-  
tum.  
Ericæ, quæ in oleribus reperiantur ex oleo il-  
litæ.  
Coagulum Leporinum potum ex vino trium  
obolorum pondere.  
Coagulum Agninum potum ex vino trium  
obolorum pondere.  
Coagulum Hinnulinum potum ex vino trium  
obolorum pondere.  
Coagulum Aprinum potum ex vino trium  
obolorum pondere.  
Coagulum Ceruinum potum ex vino trium  
obolorum pondere.  
Coagulum Vitulinum potum ex vino trium  
obolorum pondere.  
Coagulum Bubulinum potum ex vino trium  
obolorum pondere.  
Coagulum Hædium potum ex vino trium  
obolorum pondere.  
Coagulum Capræ potum ex vino trium obo-  
lorum pondere.  
Coagulum Laticornis potum ex vino trium  
obolorum pondere.  
Marinæ testudinis sanguis cum leporino coa-  
gulo, & cumino potus.  
Mel ex calido rosaceo bibitum.  
Triticæ farina ex aceto, & vino imposita.  
Porri succus ex melle sumptus. Quin & coma  
illita.  
Porrum sylvestre esitatum.  
Piper quoquo modo sumptum.  
Eryngium ex vino haustum.  
Teucrium ex aceto inunctum.  
Atgemone ex vino epota.  
Agaricum trium obolorum pondere ex vino  
haustum.  
Rhaponticum potui datum.  
Chamaedrys ex vino bibita.  
Gentianæ radix drachmæ pondere cum pipe-  
re, & ruta ex vino pota.  
Aristolochia longa drachmæ pondere potui  
data, ac etiam plagæ admoda.  
Origani decoctum haustum.  
Leucas ex vino sumpta, vel cataplasmatibus ad-  
dita.

Pulegium ex vino potui datum.  
Dictamni succus ex vino potus.  
Baccharis radix ex vino bibita.  
Panacis Herculei semen cum aristolochia sum-  
ptum.  
Ligustici tum radix, tum semem haustum.  
Pastinacæ erraticæ semen potui datum.  
Anisum potum.  
Asclepiadis radices ex vino sumptæ.  
Cumini ex vino haustum.  
Ammi cum vino potui datum.  
Delphinium morsui admodum.  
Laserpitij liquor tum inunctus, tum bibitus.  
Galbanum inunctum homines tutos reddit.  
Climopodium haustum.  
Trifolij bituminosi folia ex oxymelite sumpta.  
Polij decoctum potum.  
Beronicæ folia trium drachmarum pondere  
ex vini sextariis duobus hausta, vel admo-  
ta.  
Polygoni succus bibitus.  
Clematis prima illita.  
Sparganii radix ex vino pota.  
Acida muria plagæ indita.  
Terra Lemnia hausta.  
Sal cum origano melle, & hyssopo illitum.

## Ad viperarum morsum.

Costus, semiuncie pondere potus.  
Cassia potui data.  
Pix liquida illita.  
Iuniperi folia, & foliorum succus potui datus.  
Fraxini folia, vel eorum succus haustus.  
Lauri folia admoda.  
Abrocanum illitum.  
Galbanum Splenij loco superiectum.  
Origanum virens inditum.  
Pulli gallinarum discepti, & confectum ad-  
moda.  
Anchemis detrita cum hordeacea farina, &  
multo aceto cataplasmatibus modo admoda.  
Sed locus antea aceto multo calido fouea-  
tur.  
Rubi folia ex vino illita.  
Porri succus ex meri hemina haustus.  
Apiastri succus ex vino potus.  
Leporis coagulum potui datum.  
Omotarichi piscis salicæ carnes in ebum sum-  
ptæ, hausto deinde copiosiore vino. Quin  
etiam admoda.  
Cerui genitale tritum, & ex vino sumptum.  
Vina ipsiusmet demorsi bibita.  
Furfures tritici in decocto rutæ elixi, admoda.  
Erui farina ex vino maccata illita.  
Raphanus inunctus.  
Brassicæ succus cum nitro, & iride potus.  
Chondrylla manducata.  
Allium ex vino sumptum, & illitum.  
Scilla decocta in aceto, & imposita.  
Anagallidis succus ex vino sumptus.  
Ferula medulla in vini portione.  
Aparinæ succus ex vino potui datus.



# Venenorum.

Rubiae radice succus cum foliis potus.  
 Tribuli terrestris succus drachmae pondere potus, plagaq; admotus.  
 Anchuse Alcibiadis nomine folia, radicesque tum comesta, tum bibita, tum adalligata.  
 Ocimastri semen ex vino haustum.  
 Sambuci, ebullique radix ex vino cocta, potui data.  
 Bryoniae radix duarum drachmarum pondere hausta.  
 Vitium fermentorum cinis ex aceto illitus.

## Ad serpentum & aspidum morsum.

Canci fluuiales crudi, tritique cum asino lacte potui dari.  
 Equi fluuialis testiculus potus.  
 Callorini bibitum.  
 Mustelae salitae, & in umbra exsiccatae puluis drachmarum duarum pondere ex vino sumptus.  
 Ranæ cum sale in oleo decoctae comestae.  
 Gobius piscis deuoratus.  
 Cimices lectularij septem quoquo modo hausti.  
 Aprinum iecur, & recens, & siccum ex vino sumptum.  
 Gallinaceorum carnes dissectae, ita, vt tepebunt appositae, crebroque mutatae.  
 Butyrum illitum.  
 Caprarum montanarum fumum in vino, vel aceto decoctum illitum.  
 Mel ex calido rosaceo bibitum.  
 Asphodeli radix trium drachmarum pondere sumpta. Quin & folia, flores, & radices in cataplasmatibus.  
 Nasturtium haustum.  
 Spinæ albae semen potum.  
 Abrotanum ex vino sumptum.  
 Hyssopum tritum cum melle, sale, & cumino impositum.  
 Nepeta pota, vel cataplasmatibus indita.  
 Panacis Asclepij semen cum floribus haustum, & inunctum.  
 Panaces chironium bibitum, & illitum.  
 Hieracij succus ex vino potus.  
 Elaphobosci semen in vini portione sumptum.  
 Euphorbium incisae capitis cute ad os, usque in vulnus impositum, statimque confutum.  
 Leonopteralum bibitum illico dolorem auferit.  
 Lilij folia illita.  
 Melissophyllum ex vino haustum, & plaga admotum.  
 Marrubij folia hausta.  
 Serpyllum tum potum, tum impositum.  
 Ruta cum nucibus juglandibus, & caricis sumpta.  
 Phyllitis ex vino hausta.  
 Smyrnijs radix illita.  
 Foeniculum ex vino sumptum.  
 Sagapenum ex vino potui datum.

Libanotis radices cum vino bibitae.  
 Scordium siccatum ex vino sumptum.  
 Conyza illita.  
 Clematis in aceto bibita.  
 Echij radix ex vino pota. Praepota verò demorari prohibet, id quod praestant semen, & folia.  
 Ocimastri semen potum.  
 Eupatorij semen, & folia in vino sumpta.  
 Helichrysi coma ex vino bibita.  
 Verbenacae supinae radix, & folia ex vino hausta, tum etiam admotae.  
 Mandragorae radix ex melle, aut oleo illita.  
 Nerij radix ex vino sumpta.  
 Acetum calidum fotu adhibitum, ubi illatum venenum frigidum sit: frigidum verò ubi calidum.  
 Adianti decoctum bibitum.  
 Aqua maris fotu adhibita.  
 Sal cum origano, melle, & hyssopo inunctum.  
 Sarmenticus cinis ex aceto illitus.  
 Samia terra ex aqua pota.  
 Ophites lapis pro amuleto gestatus.

## Ad hæmorrhoi morsum.

Allium bibitum, & illitum.  
 Merum copiosius haustum.  
 Vitium viniferarum folia decocta, & ex melle subacta imposita.

## Ad cerastæ morsum.

Sesamum cum rosaceo inunctum.  
 Raphani semen ex vino bibitum.  
 Sal cum cedria, aut pice, aut melle illitum.

## Ad scolopendræ morsum.

Asphodeli radix, & semen ex vino pota.  
 Sal ex melle, & aceto.  
 Ruta syluestris admoda. Quin, & bibita ex vino.  
 Muria acida fotu adhibita.  
 Aristolochia ex vino pota.  
 Serpyllum potui datum ex vino.  
 Calamintha ex mero sumpta.

## Ad dryini morsum.

Aristolochia cum vino hausta.  
 Trifolij bituminosi folia in potu sumpta.  
 Asphodeli radix potui data.  
 Glandes quæcunque bibitae.  
 Illicis radices tustae, & icto loco illitae.

## Ad natricis morsum.

Origanum tritum, & aqua subactum ex lixiuo, & oleo inditum.  
 Aristolochiae cortex minutim contritus cum querna radice, & hordei farina ex melle illitus.  
 Aristolochiae binæ drachmae in portione postea pota.  
 Marrubij succus ex vino haustus.  
 Eauus recens ex aceto sumptus.

# Venenorum.

## Ad cenchri morsum.

Lactuca semen cum lini semine illitum.  
Satureia cum sylvestri ruta, & serpyllo, &  
asphodeli radice ex vino sumpta.  
Gentiana potui data.  
Cardamomum decoctum.

## Ad muris aranei morsum.

Mus araneus ipse discerpitur, & impositus.  
Allium cum ficulneis foliis, & cumino illitum.  
Absinthium vino bibitum.  
Chrylogoni radix concisa, & ex aceto imposita.  
Galbanum in Splenio admotum.  
Hordeacea farina ex aceto mulso illita.  
Punica dulcis acini decocti, & inuncti.  
Porrum contritum impositum.  
Abrotani decoctum ex vino haustum.  
Serpyllum ex vino potum.  
Eruca ex vino sumpta.  
Cupressi recentes pilule ex aceto potui datæ.  
Cyclaminus ex aceto mulso sumpta.  
Pyrethrum ex vino potum.  
Chamaeleonis radix bibita.

## Ad pastinacæ marinæ, scorpionis, & draconis marini morsum.

Saluiz decoctum potum.  
Simplicia omnia, quæ viperinis moribus conueniunt.  
Absinthij, aut Sulphuris ex aceto decocti portio.  
Animalia ipsa dissecta suo cuiusque ictui admota.  
Mulus piscis dissectus, & impositus.  
Ocimum cum polenta, & aceto impositum.  
Plumbum confricatum.  
Sulphur admotum.

## Ad morsum mustelæ.

Eruca comesta, & post eam bibitum vinum odoriferum.

## Ad morsum basilisci.

Castoreum drachmæ pondere ex vino potum.  
Papaveris succus haustus.

## Ad calcidicæ lacertæ morsum.

Portulacæ percocta.

## Ad rabidi canis morsum.

Lycium in catapodio datum, aut ex aqua bibitum.  
Cancrorum fluuiatiliū cinis cochlearium duorum pondere ex gentianæ radice vino, per triduum in vino potus.  
Smaridis piscis salis caro.  
Omotharichi piscis salitæ carnes illitæ.  
Garum omnium piscium fomento adhibitum.  
Canis rabidi epas tollum, & in cibo sumptum

à metu aquæ præferuat.

Caninus sanguis bibitus.

Canina vrina bibita.

Mel bibitum cum rosaceo calido.

Triticum commanducatum, & appositum.

Cappæ cum ruta, sale, & melle mixtæ.

Allium cum vino potum, & cataplasmati inditum.

Panaces Herculeum pici mistum, & cataplasmati additum.

Fœniculi radices concise, & ex melle impositæ.

Lafer impositum.

Ballote cataplasmati modo cum sale illita.

Melissophyllum cum vino bibitum, & cataplasmati inditum.

Alyssum in edulio contusum.

Allium sylvestre in cibo sumptum & illitum.

Salsamentum inditum.

Succus Cyrenaicus.

## Ad canis non rabidi morsum.

Amygdalæ amaræ ex melle exceptæ.

Mitulorum caro imposita.

Gobius piscis impositus.

Orobi farina vino macerata indita.

Plantago cataplasmati modo adhibita.

Cucumeris folia imposita.

Bulbi cum melle & trito pipere cataplasmati more impositi.

Menta imposita.

Vrtica vtraque cum sale adhibita.

Cynoglossi radix, & folia cum sullo adipis venter imposita.

Sambuci, & ebulli folia illita.

Samentitius cinis ex aceto illitus.

## Ad phalangiorum morsum.

Myricæ fructus poti.

Myrtus ex mero hausta.

Mori foliorum succus cyathi mensura potus.

Lixiuum ficulne cineris potum, adiecto sale trito, & vino.

Canceri fluuiatiles crudi, tritique cum asinino lacte poti.

Mulus piscis dissectus, & impositus.

Maluæ decoctum impositum.

Myrrhis ex vino pota.

Aparagi radicem decoctum haustum ex vino.

Lactuca sylvestris bibita.

Coris semen potum in vino.

Hederæ succus cum aceto potus.

Abrotanum cum vino bibitum.

Dauci semen ex vino assumptum.

Nigella drachmæ pondere cum aqua pota.

Apatine ex vino pota.

Melissophyllum cum vino bibitum, & cataplasmati more additum.

Phalangij folia, flores, semenque potum.

Iunci marini renella folia prope radicem erumpentia imposita.

Hyacin

# Venenorum.

Hyacinthi radix pota.  
Semperuium maius in potu datum.  
Aqua maris foru applicata.  
Punica fyluestris radix, quam tenuissimè trita aut aristolochia cum hordei farina, & aceto subacta.  
Apiastrî decoctum foru adhibitur, aut eius folia.  
Abrotani semen propinatum binarum drachmarum pondere cum hemina vini.  
Anisi semen propinatum binarum drachmarum pondere cum hemina vini.  
Cumini æthiopici semen propinatum binarum drachmarum pondere cum hemina vini.  
Ciceris fyluestris semen propinatum binarum drachmarum pondere cum hemina vini.  
Cedrides trita admotæ, vel bibita.  
Platanî cortex potus.  
Cupressi viridium pilularum aduisto vino decoctum.  
Chamæpityos decoctum bibitur.  
Trifolij semen propinatum.

## Ad stellionis morsum.

Sesamum cum rosaceo.

## Ad crocodilorum morsum.

Salimpositum.

## Ad quadrupedum morsum.

Aprinum epar cum recens, tum siccum bibitur.

## Ad scorpionum ictus.

Cyperus impositus.  
Cardamomum in vino potum.  
Anomum ex ocimo illitum.  
Lauri bacca ex vino bibita.  
Myrti succus ex mero haustus.  
Ficus sativæ lacteus succus plagæ infillatus.  
Canceri fluuiatiles crudi, tritiq; cum asinino lacte poti.  
Scorpius ipse tritus, & impositus, vel tostus deuoratus.  
Delphinium appositum.  
Mutus piscis dissectus, & impositus.  
Smaridis piscis salita caro apposita.  
Lacera dissecta, & apposita dolorem sedat.  
Mures domestici dissecti, & impositi.  
Fimum Asini herbas pascensis vino dilutum haustum.  
Fimum Equi herbas pascensis vino dilutum haustum.  
Vrina humana pota.  
Farina triticea ex aceto, & vino posita.  
Ichnidis semen cum vino potum.  
Oxylapathi, & oxalidis semen vino, aut aqua potum.  
Sonchi succus comestus, & cataplasmatibus more appositus.

Inybus more cataplasmatibus.  
Phalangium herba pota.  
Lactuca fyluestris bibita.  
Ocimum cum polenta impositum.  
Asphodeli semen, & flores in vino poti.  
Abrotanum in vino potum.  
Sampfuchum ex aceto, & sale impositum.  
Hieracium maius, & minus cataplasmatibus more appositum.  
Lacer oleo dilutum impositum.  
Colus rustica cum vino piperæque bibita, & manibus gestata dolorem puncturæ omnino fugat.  
Melissophylli folia adhibita.  
Polemonij radix alligata.  
Rubi flor, & mora.  
Verbasci anreum florem ferentis folia imposita.  
Chamæsyces succus illitus.  
Scorpioides illita.  
Heliotropium potum cum vino, & illitum.  
Aqua maris foru imposita.  
Sulphur ignem non expertum cum resina rebenthinæ exceptum admotum.  
Calamintha trita illita, vel cum posca, foru.  
Galbanum Splenis more ductum impositum.  
Hordei farina cum vino parata.  
Rutæ decoctum foru adhibitur.  
Trifolium tritum iniectum.  
Cupressus cum vino, & ruta.  
Peucedani succus haustus.  
Pulegij decoctum potum.  
Gentianæ decoctum potum.  
Aristolochiæ præsertim cortex drachmarum duarum pondere.  
Sal cum lini semine.  
Sapphiras lapis illitus.

## Ad vesparum & apum ictum.

Lauri folia trita, & illita.  
Malua concisa ex oleo imposita.  
Silybrij folia imposita.  
Althææ decoctum ex posca bibitur.  
Sal cum sipo vitulino.

## Ad fugandum animalia venenosa.

Iuniperi sexcentis fumus.  
Cedrides peruncto corpore adipe vel medulla certum exceptæ.  
Viticis folia suffita, vel sublata.  
Canceri fluuiatiles crudi cum ocimo triti scorpiionibus admoti.  
Cervinum cornu crudum incensum, suffitumque.  
Cervi, & Elephantis adeps inunctus.  
Cervina medulla.  
Nasturtium suffumigatum.  
Abrotanum stratum, suffitumque incensum.  
Origani folia stratis subiecta.  
Diclammum ossatum omnia, quæ ictu, aut morsu venenum relinquunt, cucur.  
Calaminthæ suffitus.

Peucedani

# Venenorum.

Peucedani suffitus.  
 Lyfimachia incensa fugat serpentes, & mu-  
 scas.  
 Nigellæ suffitus.  
 Galbani suffitus.  
 Polium utrumque incensum, stratumque.  
 Conyzæ suffitus.  
 Gagates lapis suffitus.

## Ad venena omnia.

Phu antidotis inferum.  
 Cinnamomum potum.  
 Pix liquida cyathi mensura in eclegmate ex  
 melle data.  
 Cedrides antidotis impositæ.  
 Nuces inglandes cum ruta, & fœcis præsumptæ.  
 Quinquefolij radicis succus bibitus.  
 Coagulum leporinum potum.  
 Epipactis hausta.  
 Calothereum bibitum.  
 Calamintha præputa.  
 Mustelæ salitæ, & in vmbra exiccata pulvis  
 cum vino.  
 Mustelæ ventriculus coriandro farctus, & inue-  
 teratus.  
 Caniculæ lac primi partus potum.  
 Eryngium cum vino potum.  
 Butyrum deficiente oleo, haustum.  
 Sanguis Anseris antidotis commissus.  
 Sanguis Anatis antidotis commissus.  
 Sanguis Hædi antidotis commissus.  
 Urina ipsiusmet infirmi pota.  
 Semen raparum haustum.  
 Rutæ semen acetabuli pondere cum vino po-  
 tum.  
 Napi semen potum.  
 Malux decoctum cum suis radicibus frequen-  
 ter potum, cerebroque euomitum.  
 Brassicæ semen antidotis impositum.  
 Iridionis semen haustum.  
 Laserprium potum.  
 Agaricum drachmæ pondere cum diluto vino  
 sumptum.  
 Chamæleonis albæ radix cum vino pota.  
 Spina alba in amuletum congesta, colloque su-  
 spensa.  
 Abrotani semen cum vino potum.  
 Ruta cum inglandibus nucibus, & caricis sum-  
 pta.  
 Apij decoctum potum.  
 Marrubij folia bibita.  
 Betonicæ folia drachmæ pondere in vino bi-  
 bita.  
 Polemonix radix in vino bibita.  
 Tribuli terrestris succus haustus cum vino.  
 Smilacis asperi acini prius postive sumpti.  
 Accetum tepidum bibitum.  
 Terra Lemnia ex aqua hausta.  
 Terra Samia ex aqua hausta.

## Ad leporem marinum ebibitum.

Cedria contrita cum vino hausta.

Canci fluuiales cum suo iure elixi, & co-  
 mesti.  
 Lac asininum continuè datum.  
 Passum continuè datum.  
 Malux radicem decoctum haustum.  
 Cyclamini radix cum vino bibita.  
 Veratrum nigrum drachmæ pondere datû cum  
 mulsâ, & mali punici acinis.  
 Scammonij succus drachmæ pondere datus cum  
 mulsâ, & mali punici acinis.  
 Anserinus sanguis tepidus haustus.  
 Alismatis drachma vna, vel altera bibita.

## Ad rubetam ranam ebibitam.

Testudinis marinæ sanguis cum leporis coagu-  
 lo, & cymino bibitus.  
 Alismatis radix vnius, vel duarum drachma-  
 rum pondere in vino pota.  
 Merum largius potum, & euomitum.  
 Harundinis radicis binæ drachmæ potæ.  
 Cyperi radicis binæ drachmæ potæ.

## Ad buprestes, & pinorum eru- cas ebibitas.

Oleum Iriam potum.  
 Oleum Melinum potum.  
 Caricæ comestæ, & earum decoctum ex vino.  
 Palmulæ thebaicæ in cibo sumptæ, vel trita ex  
 mulsâ, aut lacte potæ.  
 Pyra omne genus in cibum sumpta.  
 Humanum lac bibitum copiosè.  
 Simplicia omnia, quæ epotis cantharidibus  
 profunt.

## Ad epotas hirudines.

Muria in sorbitionibus data.  
 Cyrenæicus succus potus.  
 Laserpitij folia ex aceto hausta. Quin & succus  
 ex aceto gargarizatus.  
 Betæ folia cum aceto bibita.  
 Niuis glebula cum posca sumpta.  
 Cimices vino acetosè poti.  
 Acetum cum sale potum.  
 Nitrum ex aqua gargarizatum.  
 Atramentum sutorium aceto dilutum, & gar-  
 garizatum.

## Ad epotas cantharidas.

Halicæ decoctum climmate infusum.  
 Oryzæ decoctum climmate infusum.  
 Tragij decoctum climmate infusum.  
 Malux decoctum climmate infusum.  
 Semen lini decoctum climmate infusum.  
 Semen fœni græci decoctum climmate infu-  
 sum.  
 Althææ decoctum climmate infusum.  
 Nitrum ex hydronelice potum.  
 Nuclei pinei ex vino sumpti.  
 Cucumeris semen contritum, ex mulsâ aut lac-  
 tē haustum.  
 Anserinus adeps ex passo potus.

# Venenorum.

Lac potum.  
Vinum dulce liberalius bibitum.  
Thuris cortex ex passo sumptus.  
Sania terra, quæ Aſter appellatur ex defruto hausta.  
Pulegium tritum ex aqua potui datum.  
Rosaceum cum Irino ex ruta decocto sumptum.  
Vitis recentes ramuli detriti, & ex passo hausti.  
Ius esculentum omnium adipum.

## Ad haustam salamandram.

Resina pinea in delinctu.  
Galbanum ex melle deglutitum.  
Nuclei pinei contriti, ex aiugæ decocto poti.  
Vrtica cum liliis ex oleo decocta, & pota.  
Testudinis marinx, & terrestres oua cocta deuorata.  
Ranarum ius, in quo eryngij radix fuerit cocta, potum.

## Ad sanguinem & lac in ventriculo concretum.

Coagulum leporinum epotum.  
Acerum tepidum potum, & vomitu redditum.  
Grossi lacteo succo rurgentes ex posca sumpti.  
Nitrum per sese potum.  
Coagulum omne ex aceto, & laserpitij radice, aut lasere haustum.  
Brassicæ semen ex lixiuo ficulnei cineris potum.  
Conyzzæ semen cum pipere ex aceto haustum.  
Rubi succus ex aceto potui datus.  
Hordeacea farina ventriculo, & aluo ex aqua mulla inuncta.  
Thymum ex vino haustum.  
Calaminthæ folia arida pota.

## Ad colchicum.

Origanum cum passo, aut oxymelite potum.  
Bubulum lac haustum, quin & asinum largius potum.  
Quercus foliorum, aut glandium decoctum potum.  
Mallicorium haustum.  
Serpillum ex lacte decoctum bibitum.  
Sanguinalis herbæ succus potui datus.  
Vitis recentium viticularum succus bibitus.  
Rubi succus in potu sumptus.  
Ferulæ recentis medulla ex vino sumpta.  
Myrti bacce tuse, & aqua maceratæ, & in liquorem solutæ, potæ.  
Castanearum media tunica trita, & cum sanguinarie succo epota.  
Origanum cum lixiuo bibitum.  
Simplicia omnia, quæ fungis aduersantur.

## Ad solanum somniferum.

Aqua mulla copiose sumpta.  
Lac caprillum potum.  
Lac asinum potum.

Vinum dulce tepidum cum aniso bibitum.  
Amygdalæ amaræ deuorata.  
Conchylia omnia tam cruda quam tosta deuorata.  
Locustæ marinx, quin & Gammarii in cibum sumpti, & eorum iuscula pota.

## Ad hyoscyamum.

Mori cortex potus.  
Aqua mulla largius ebibita.  
Lac omne præsertim asinum potum.  
Ficum aridarum decoctum bibitum.  
Nuclei pinei deuorati.  
Cucumis semen ex passo potui datum.  
Vinum salsum cum suillo recenti adipe, & passo potum.  
Vrticæ semen ex aqua sumptum.  
Nitrum ex aqua haustum.  
Cichorium deuoratum.  
Sinapis quoquo modo sumpta.  
Nasturtium ex vino sumptum.  
Raphanus ex vino sumptus.  
Cæpa ex vino sumpta.  
Allium ex vino sumptum.

## Ad aconitum.

Leporinum coagulum ex vino potum.  
Hædium coagulum ex vino potum.  
Vitulinum coagulum ex vino potum.  
Chamæpityos decoctum haustum.  
Scoria ferri ex aceto mullo sumpta.  
Origanum decoctum cum vino absinthite potum.  
Ruta decoctum cum vino absinthite potum.  
Marrubij decoctum cum vino absinthite potum.  
Absinthij decoctum cum vino absinthite potum.  
Sedum maius ex vino absinthite potum.  
Abrotanum ex vino absinthite potum.  
Chameleæ ex vino absinthite pota.  
Aiuga ex vino absinthite pota.  
Opobalsamum drachmæ pondere ex melle, vel lacte cum castoreo, pipere, & ruta æquis ponderibus ex vino potum.  
Vinum in quo aurum, argentum, ferrumve candens restinctum fuerit, potum.  
Gallinæ ius ex lixiuo, & vino paratum potum.  
Bubulæ carniui præpinguia iura cum vino sumpta.

## Ad taxum.

Acerum calidum potum, & vomitu redditum.  
Simplicia omnia, quæ cicuræ resistunt.

## Ad toxicum.

Sanguis Hircinus frigus, & in cibis sumptus.  
Sanguis Caprillus frigus, & in cibis sumptus.  
Sanguis Leporinus frigus, & in cibis sumptus.  
Sanguis Ceruinus frigus, & in cibis sumptus.  
Sanguis Caninus frigus, & in cibis sumptus.  
Galbanum cum myrrha ex vino haustum.  
Quinquifolij radix pota.

# Venenorum.

Roboris cortex tritus ex lacte haustus.  
Fagi cortex tritus ex lacte haustus.  
Ilicis cortex tritus ex lacte haustus.  
Coronea mala deuorata, aut cum pulegio, & aqua bibita.  
Amomum ex vino haustum.  
Carpobalsamum ex vino haustum.

## Ad opium & corniculatum papauer.

Mel ex rosaceo calido bibitum.  
Origanum cum passo aut oxymelite haustum.  
Alismatis radix duarum drachmarum pondere ex vino pota.  
Acetum bibitum, & vomitu redditum.  
Sal cum oxymelite sumptum.  
Meracum vinum cum absinthio, & cinnamomo haustum.  
Nitrum ex aqua potui datum.  
Origanum cum lixiuio, aut passo potum.  
Rutæ syluestris semen cum pipere, & panace ex vino sumptum.  
Piper cum calidoreo ex aceto mulso, vel cum fatureia, aut organi decocto ex vino bibitum.  
Pinguia iura in potum sumpta cum vino aut passo.  
Ossium medulla ex oleo pota.

## Ad cicutam.

Absinthium ex vino bibitum.  
Origanum cum passo, aut oxymelite potum.  
Acetum bibitum, & vomitu redditum.  
Meracum vinum largius epotum, & per interualla repetitum.  
Lacrum bubulum, tum asinum potum.  
Castorium cum ruta, & menta ex vino sumptum.  
Amomi vncia epota.  
Cardamomi vncia epota.  
Styracis vncia epota.  
Piper cum vrticæ semine ex vino haustum.  
Lauri folia potui data.  
Laser ex oleo vel passo potum.  
Passum per se largius ebibitum.

## Ad ixiom.

Absinthium ex vino bibitum.  
Origanum ex vino sumptum.  
Acetum potum, vomitūque reiectum.  
Rutæ syluestris semen potum.  
Laserpitij radix pota.  
Tragorigani decoctum haustum.  
Resina terebinthina deuorata.  
Nardus Indica potui data.  
Castorium oboli pondere sumptum.  
Laserpitium oboli pondere sumptum.  
Nucces iuglandes cum resina castorio, & rutæ triæ ita vt singula drachmæ pondus æquent ex vino hausta.  
Camelæ succus scilicet pondere ex aqua mul-

sa haustus.  
Thapsiæ succus scilicet pondere ex aqua mulsa haustus.  
Absinthij succus scilicet pondere ex aqua mulsa haustus.

## Ad coriandrum.

Merum per sese, vel ex absinthio potum.  
Oleum potum.  
Oua in oleo exinanita, & ex muria liquefacta deuorata.  
Muria epota.  
Gallinarum, & anserum ius copiose salsum, haustum.  
Passum ex lixiuio assumptum.

## Ad psyllium.

Simplicia omnia quæ coriandro aduersantur

## Ad herbam fardoniam.

Aqua mulsa liberalius pota.  
Lac affatum bibitum.  
Aqua calida fotu adhibita. Quin etiam & oleum.

## Ad mandragoram.

Aqua mulsa copiose pota, & vomitu reiecta.  
Nitrum cum absinthio ex dulci vino, aut passo sumptum.  
Rosaceum cum aceto capiti persusum.  
Eupatorium ex aceto tritum, & ad olfaciendum datum.  
Piper ex aceto tritum, & ad olfaciendum datum.  
Sinapi ex aceto tritum, & ad olfaciendum datum.  
Castorium ex aceto tritum, & ad olfaciendum datum.  
Rutæ ex aceto trita, & ad olfaciendum data.  
Lucernarum extinctarum fumus olfactus.

## Ad fungos malos.

Fimus gallinæ cum aceto bibitus.  
Mel ex rosaceo calido potum.  
Raphanus deuoratus, vel potui datus.  
Absinthium cum aceto sumptum.  
Melissophylli folia cum nitro bibita.  
Lixiuum sarmentij cineris ex acida muria potum.  
Satireia feruefacta, haustaque.  
Organi iusculum potui datum.  
Acetum calidum potum, & vomitu reiectum.  
Atramentum fistorum ex aqua potum.  
Sal cum oxymelite bibitum.  
Pyrastrij folia pota, deuorataque.  
Oua gallinacea cum aristolochiæ drachma ex posca deuorata.  
Panacis radix, & semen ex vino pota.  
Fax vini cremata ex aqua pota.  
Sinapis bibita.  
Nasturtium comestum.

# Venenorum.

## Ad gypsum.

Origanum cum passo aut oxymelite potum.  
Maluz decoctum potum. Quin & toto corpo-  
ri inspersum.  
Oleum edibitum.  
Aqua multa bibita.  
Caricarum decoctum potum.  
Lixiuum è ficulneo, aut fermentitio cinere  
paratum, cum vino copioso haustum.  
Origanum cum lixiuio, aut aceto, aut passo  
sumptum.  
Quin etiam & thymum.  
Simplicia omnia quæ fungis resistunt.

## Ad cerussam.

Amaracinum oleum potum.  
Irinum oleum potum.  
Vini liquor potus.  
Persicorum nuclei ex ptisana poti.  
Caricarum decoctum haustum.  
Maluarum decoctum haustum.  
Lac calidum bibitum.  
Sesamum tritum ex vino sumptum.  
Lixiuum ex fermentitio cinere haustum.  
Columbina uia cum thure pota.

## Ad argenti spumam.

Hormini syluestris semen potum.  
Myrrha bibita ex vino pota.  
Absinthium ex vino potum.  
Hyssopum ex vino potum.  
Apij semen ex vino potum.  
Piper ex vino potum.  
Ligustri flores ex vino poti.  
Palumborum aridum simum cum Nardo ex  
vino potum.

## Ad argentum viuum.

Lac copiose potum, & vomitu reiectum.  
Simplicia omnia, quæ faciunt ad argenti Spu-  
mam.

## Ad calcem, sandaracham, & au- ripigmentum.

Lac ex aqua multa potum, & vomitum.  
Carnium iura pinguis hausta.  
Alchizz decoctum ad spissitudinem redactum  
potum.  
Maluz decoctum ad spissitudinem redactum  
potum.  
Tragi herba semen bibitum.  
Seminis lini decoctum potui datum.  
Oryzæ decoctum potum.

SIM



# S I M P L I C I V M M E D I C A M E N T O R V M F A C V L T A T E S,

que corpori decorem præstant, ex  
Dioscoride.

## DECORIS.

### Ad alopeciam.

**M**YRRA cum ladano, & vino  
myrteo illita firmat.  
Harundinum corticum cinis ex  
aceto inunctus.  
Ladanum cum vino, myrrha, &  
myrtheo oleo adnotum.  
Myrti baccarum succus illitus.  
Nucum iuglandium putamen combustum, tri-  
tūmq; & impositum.  
Nucum auellanarum crematarum cinis ex vrsi-  
no adipe perunctus.  
Erinacei terrestris corij cinis ex liquida pice  
illitus.  
Leporum caput crematum ex vrsino adipe.  
Ranarum crematarum cinis ex liquida pice.  
Murium sterqus combustum ex aceto.  
Vrsinus adeps illitus.  
Caprarum finus ex aceto.  
Raphanus tritus ex liliacea farina adnotus.  
Brassica cum sale confricata.  
Betæ recentia folia cruda illita.  
Asphodeli radicum cinis impositus.  
Cappæ confricata.  
Allij cinis ex melle.  
Sinapi illitum.  
Nasturtium confricatum.  
Cyclamini succus inunctus.  
Ranunculi folia, & radices illitæ paruo tem-  
poris spatio.  
Aloë ex vino.  
Abrotoni cinis ex raphani succo, aut cicino  
oleo.  
Laserpitij liquor cum pipere ex aceto.  
Nymphææ radix ex pice.  
Cynoglossæ folia ex veteri fuillo adipe.

Adiantum illitum cum fusino; aut myrtino  
oleo aut hyssopo, aut vino.  
Thapsiæ succus inunctus.  
Rubigo ferri illita.  
Sandaracha ex resina.  
Alcyonium tertium exustum inunctum.  
Cortex naxia illita.  
Hippocampi cremati cinis ex liquida pice, aut  
axungia, aut amaracino vnguento.  
Caprillarum vnguiatū cinis ex aceto inunctus.

### Ad pilos auellendos.

Oleum in quo decocta fuerit scolopendra in-  
unctum.  
Lepus marinus per se, & cum marina vrtica  
tritus, & appositus.  
Salamandræ cinis ex oleo  
Hederæ lachryma illita.  
Dryopteris radix trita, & post sudorem inun-  
cta.  
Aqua è viridibus viciū sarmentis igne in-  
censis emanans admota.  
Auripigmentum illitum.  
Cyperus Babylonicus illitus.

### Ad capitis furfures.

Salicis foliorum, & corticis decoctum in loric-  
nibus.  
Myrti baccarum succus illitus.  
Fel taurinum cum nitro, & cimolia inun-  
ctum.  
humana vrina inueterata admota.  
Adiantum in lixivio decoctum.  
Fœnum græcum in locionibus.  
Malua ex vrina humana.  
Betæ decoctum adnotum.



# Decoris.

*Allij cinis ex melle.*  
*Bulbi cum cremato nitro illiti.*  
*Lilij cremati radix ex melle.*  
*Alumen cum eruo ex pice.*

## Ad ruffandum capillum.

*Ligustri folia trita, & in radicula succo macerata illita.*  
*Lycium illitum.*  
*Loti ligni decoctum in lotionibus admotum.*  
*Vini fex cremata ex lentiscino oleo tota nocte illita.*

## Ad denigrandos capillos.

*Cupressi folia trita ex aceto,*  
*Rhois decoctum admotum.*  
*Mori folia trita ex aceto.*  
*Gallice aceto, aut aqua macerata illita.*  
*Palmarum corticis decoctum admotum, & subinde deterfum.*  
*Myrti foliorum decoctum in lotionibus.*  
*Acaciae succus illitus.*  
*Illignae radice cortex ex aqua coctus, donec mollitus intabescat, tota nocte illitus,*  
*Hederæ corymbi illiti.*  
*Salviae decoctum sepius inspersum.*  
*Rubi folia adnota,*  
*Sory illitum.*

## Ad pediculos & lendes necandos.

*Cedria illita.*  
*Myricæ decoctum persufum.*  
*Mel inunctum capiti.*  
*Betæ decoctum persufum.*  
*Allium cum origani decocto potum.*  
*Hederæ lachryma illita.*  
*Staphis agria adnota.*  
*Sandaracha ex oleo.*  
*Alumen ex aqua.*

## Ad prohibendum solis adustionem.

*Albumen oui inunctum.*  
*Cyclamini succus inunctus.*

## Ad faciei nitorem.

*Vini liquor in folliculis contentus illitus.*  
*Mastiche illita.*  
*Lupinorum farina illita,*  
*Raparum sylvestrium semen admotum.*  
*Peponis succus cum eius semine, & farina in sole sicatus, & inunctus.*  
*Polygonatum illitum.*  
*Glaas vnguentaria ex vrina.*  
*Ricini semen inpositum.*  
*Vitis sylvestris acini illiti*  
*Argentæ spuma elota inuncta.*  
*Aleyonium primum, & secundum admotum.*  
*Chia terra inposita.*

*Crocodili terrestres simum illitum.*

## Ad colorem conciliandum.

*Cicer in cibis sumptum.*  
*Agaricum drachmæ pondere potum.*  
*Hyslopum manducatum, bibitumve.*  
*Chia terra illita.*  
*Cerasi gummi illitum.*  
*Caricæ in cibis sumptæ.*

## Ad faciem derugandam.

*Calaciae grana post excusum florem prodeuntia trita, & cum cerato illita.*  
*Bryoniae radix cum eruo, creta chia, & forno græco illita.*  
*Chia terra adnota.*

## Ad cutis vitia in facie.

*Sabinæ decoctum persufum.*  
*Conchulae Indicæ cinis admotus.*  
*Glaas vnguentaria trita ex vrina.*  
*Cancerorum fluuicilium cinis illitus.*  
*Narcissi radix cum semine vrticæ ex aceto.*  
*Ricini semen admotum.*  
*Vitis sylvestris acini illiti.*  
*Cinnamomum ex melle.*  
*Costi radix cum aqua vel melle illita.*  
*Bryoniae radix per se, & cum eruo, creta chia, & forno græco adnota.*  
*Alcionium primum, & secundum inpositum.*

## Ad ionthos & varos.

*Myrrha illita cum melle, & casia.*  
*Porri folia cum Rhoe obsoniorum loco adnota.*  
*Cappæ succus cum sale appositus.*  
*Bulbi per se, & ex oui vitello.*  
*Pulegium ex cera.*  
*Sori ex aqua.*  
*Alcyonium primum, & secundum admotum.*

## Ad cutis faciei vitia à sole contracta.

*Iridis Illyricæ radix cum helleboro adnota.*  
*Cinnamomum ex melle.*  
*Costi radix cum aqua vel melle illita.*  
*Amygdalæ amaræ radicem tritarum decoctum admotum.*  
*Fici lac inunctum.*  
*Cochlearum tum caro, tum testa simul cremata ex melle.*  
*Leporinus sanguis inunctus.*  
*Sepiæ crematæ cinis admotus.*  
*Lini semen illitum.*  
*Orobi farina inposita.*  
*Sisymbrium inunctum.*  
*Bulbi cremati cum Aleyonio inpositi.*  
*Hederæ decocta folia ex vino.*  
*Chamaeleonis nigri radix.*  
*Alyssum concisum ex melle,*  
*Melia terra inuncta.*  
*Cyclamini succus illitus.*

# Decoris.

## Ad lentigines delendas.

Iridis Illyricæ radix cum albo veratro ad-  
motâ.  
Casta ex melle illita.  
Costus ex aqua, & melle.  
Sanguis leporinus calens inunctus.  
Triticæ farina ex aceto mulso.  
Raphanus cum loliacea farina admotus.  
Brassicæ semen inspersum.  
Sisymbrium tritum, & impositum.  
Allij cinis ex melle.  
Dracunculi maioris radix ex melle.  
Bulbi ex melle, & aceto.  
Nigella confricata.  
Galbanum cum nitro ex aceto.  
Alyssum concisum ex melle.  
Narcissi radix cum vrticæ semine ex aceto.  
Ricini semen illitum.  
Vitis sylvestris acini linitri.  
Bryoniæ radix cum eruo, sæno græco, & creta  
chia.  
Adarces imposita.

## Ad næuos.

Alcyonium illitum.

## Ad totius corporis nitorem.

Mastiche inspersa.  
Vlmi liquor in folliculis conclusus illitus.  
Butyrum inunctum.  
Crocodili terrestris finum illitum.  
Peponis succus cum eius semine, & farina in  
sole siccatus ex aqua.  
Bryoniæ radix inuncta.  
Cyclamini succus inunctus.

## Ad cicatrices delendas.

Asinus adeps inunctus.  
Fabarum farina cataplasmati indita.  
Ranunculi folia, & radices illita.  
Calamintha ex vino decocta admotâ.  
Cucumeris sylvestris radix trita, & inspersa.  
Glans vnguentaria cocta in aceto cum nitro  
adhibita.  
Bryoniæ radix cum Eruo, creta chia, & sæno  
græco-admotâ.  
Chrysocolla illita.  
Alcyonium primum, & secundum inunctum.

## Ad vitiligines.

Cochlearum terrestris testæ crematæ, &  
illitæ.  
Leporinus sanguis inunctus.  
Sepiæ crematæ cinis admotus.  
Fabarum farina inspersa.  
Lupinorum farina imposita.  
Betræ cruda folia illita.  
Chondrillæ radix, & folia ex melle, & nitro  
trita ex aqua.  
Dracunculi maioris radix ex melle.

Asphodeli radices succus inunctus, confricata  
prius sub sole cute.

Cappæ succus in sole inunctus.

Allij cinis ex melle.

Niper cum nitro impositum.

Capparis radix trita ex aceto.

Argemone siccata, tusique cum nitro, & vino  
sulphure admotâ.

Telephij folia cum hordeacea farina ex hydre-  
læo sex horis admotâ.

Gentianæ radices succus inunctus.

Chamæleonis nigri radix cum sulphure illita.

Ruta cum vino pipere, nitroque confricata.

Libanotis semen ex acerrimo aceto.

Lilij cremata radix ex melle.

Nymphææ radix ex aqua.

Rubiæ radix ex aceto.

Althææ semen tum recens, tum siccum tritum  
ex aceto, in sole inunctum.

Anchutæ radix ex aceto.

Narcissi radix cum vrticæ semine ex aceto.

Bryonia cum Eruo, creta chia, & sæno græco  
illita.

Glans vnguentaria in aceto decocta cum nitro  
imposita.

Cucumeris sylvestris radix trita, & insper-  
sa.

Ricini semen illitum.

Veratrum nigrum ex aceto.

Sulphur quoquo modo admotum.

Alcyonium primum, & secundum inun-  
ctum.

## Ad lychenas, & impetigines.

Pini, & picæ cortex illitus.

Lentisci foliorum decoctum foris adhibitum.

Cupressi folia cum polenta illita.

Rhamni folia admotâ.

Lignorum marcor inspersus.

Nasturtij semen admotum.

Rhaponticum ex aceto illitum.

Veratrum nigrum ex aceto illitum.

Glans vnguentaria cum lotio imposita.

Vitis viniferæ gummi cum nitro illitum, loco  
tamen prius perfricato.

Sulphur ex terebinthina resina.

Sal ex oleo, & aceto perfricatum.

Alcyonium primum, & secundum imposi-  
tum.

Adarces illita.

Pix liquida inuncta.

Thus inspersum.

Aethiopice oleæ lachryma inuncta.

Pruni arboris gammi illitum.

Ficulneum lac cum polenta illitum.

Mel cum alumine decoctum illitum.

Propolis inuncta.

Triticæ recens panis ex muria.

Loliacea farina cum sulphure ex vino.

Cicer cum hordeo ex melle.

Lapathi cuiusque radices in aceto decoctæ, lo-  
to prius

# Decoris.

co prius scarificato, & nitro confricato appositæ.  
 Nallurtium ex melle appositum.  
 Allij cinis ex melle illitus.  
 Sinapi ex aceto linitum.  
 Chamæleonis nigre radix ex aceto cocta, & inuncta.  
 Ruta cum alumine ex melle.  
 Læserpitij liquor ex aceto.  
 Glutinum in aceto solutum inunctum.  
 Cucumeris sylvestris radix trita, & inspersa.  
 Tichymali characie lac illitum.  
 Bryoniæ radix cum Eruo, creta chia, & fœno græco illita.  
 Aqua maris foru adhibita.

## Ad papulas.

Lac omne potum cum crudo melle, admixta aqua, & exiguo sale.  
 Serum lactis potum.  
 Acetum applicatum.  
 Butyrum illitum.  
 Urina humana inueterata.  
 Lupinorum farina admotæ.  
 Cyclamini succus adhibitus.  
 Pulegij decoctum corpori perfrictum.  
 Ruta cum cera, & myrteo oleo cataplasmati indita.  
 Staphis agria illita.  
 Glans vnguentaria cum lotio linita.  
 Rubigo ferri illita.  
 Alumen cum melle.  
 Cinnabaris, Id est sanguis draconis adhibitus.  
 Fornaceæ testæ tostæ admotæ.

## Ad alphas, & cutis maculas.

Thapsiæ succus cum melle illitus.  
 Glans vnguentaria cum lotio linita.  
 Narcissi radix cum semine vrticæ ex aceto.  
 Lotus sylvestris cum melle perunctus.  
 Cucumeris sylvestris pulverizata radix imposita.  
 Ricini semen illitum.  
 Vitis sylvestris acini liniti.  
 Bryonia cum eruo, creta chia, & fœno græco illita.

## Ad pforam.

Staphis agria trita ex oleo illita.  
 Bryoniæ semen inunctum.  
 Aqua marina foru adhibita.  
 Glans vnguentaria in aceto cocta.  
 Sal illitum.

## Ad scabiem.

Cardamomum ex aceto illitum.  
 Oleæ virentis, & accensæ sudor manans illitus.  
 Ficulneum lac inunctum.

Erinacei marini testa cruda, tostæ cum alia mista, & illita.  
 Hippocampi marini cremati cinis liquida pice, axungiane, aut amaracino vnguento confusus, & capiti inunctus.  
 Urina humana inueterata.  
 Serum lactis potum.  
 Cicer cum hordeo, & melle.  
 Lupinorum farina.  
 Argemone siccata, tusaque cum nitro in balneo conficata.  
 Hirundinaria minor conficata.  
 Chamæleonis nigri radix addito exiguo atramento futuro, cedrinisque liquore, & axungie paucò linita. Quin etiam sulphure, & alumine missa.  
 Glans vnguentaria cum lotio linita.  
 Origani decoctum corpori perfrictum.  
 Quinquefolij radix decocta, linitaque.  
 Potamogeton valet pruritus imposita.  
 Lotus sylvestris cum melle peruncta.  
 Veratrum nigrum linitum cum cera, pice, & cedrino oleo.  
 Stanni cum cera, & exigua cerussa.  
 Alumen cum aqua aspersum aduersus pruritum.

## Ad lepram græcorum.

Fel taurinum cum nitro, & cinolia.  
 Urina humana addito nitro foræ.  
 Iuniperi cortex crematus ex aqua.  
 Fraxini cortex crematus ex aqua.  
 Vini folia concisa ex aceto.  
 Aethiopice oleæ lachryma illita.  
 Resina Terebinthina cum æruginè, calchantio, & nitro illita.  
 Resina Larigna cum æruginè, calchantio, & nitro illita.  
 Resina abiegna cum æruginè, calchantio, & nitro illita.  
 Ficulneum lac cum polenta.  
 Tritici furfures ex acerrimo aceto elixi.  
 Hordei farina ex aceto acerrimo, & hydrelæ.  
 Lolij farina cum sulphure ex vino, & aceto.  
 Lapathi cuiusque radices, loco prius scarificato, & nitro confricato admotæ.  
 Brassica concisa cum polenta adhibita.  
 Veratrum nigrum ex aceto.  
 Allij cinis ex melle.  
 Sinapi ex aceto.  
 Bryoniæ semen illitum.  
 Nallurtium ex melle.  
 Anchusæ radix ex aceto.  
 Ranunculi folia, & radices apposita.  
 Melanthij semen admotum.  
 Cucumeris agrestis radix in pulcrem aspersa.  
 Glans vnguentaria cocta in aceto cum nitro.  
 Thapsiæ succus inunctus.  
 Scammonia in aceto decocta illita.  
 Vitis viniferae gummi admotum, loco tamen prius nitro perfricto.  
 Aerugo cum nitro ex terebinthina resina.

Alumen

# Decoris.

Alumen cum brassica, & melle coctum.  
Sulphur ex resina terebinthina, & aceto.  
Sal ex oleo, & aceto feruefactum.  
Alcyonium primum & secundum illitum.  
Adarces imposita.  
Melia terra illita.

## Ad pruritum.

Ficulneum lac admodum cum polenta.  
Sulphur ex nitro.  
Sal ex oleo, & aceto perfictum.  
Alumen cum aqua aspersum.

## Ad elephantiasim.

Erinacei terrestres exiccata corpus in cibis sumptum.  
Cedria inuncta.  
Cochlearum terrestrium cinis illitus.  
Salamandra aliis conferentibus medicamentis admixta.  
Serum lactis potum.  
Fel capræ sylvestris inunctum.  
Fel hircinum inunctum.  
Calamintha in cibis sero lactis superposito.

## Ad clauos, callos & verrucas.

Salicis corticis cinis admisto aceto maceratus illitus.  
Smaridis piscis saliti crematum caput.  
Lacertæ concisum caput.  
Ovillum sinum ex aceto.  
Mel cum alumine decoctum.  
Cicerum grana tot accipe, quot sunt porri, & singulis granis singulas tange verrucas, deinde liga grana cicerum in linteo, & post tergum proice, & hoc non fiat nisi noua luna.  
Heliotropij semen linitum.  
Scylla cremata peruncta.  
Ranunculi folia, & radices.  
Dipsaci radix in vino decocta, tusa, & imposita.  
Nigella ex vetere vrina imposita, loco prius scarificato.  
Laserpitij liquor cera præmolitus impositus, scarificatione prius facta.  
Clinopodium diebus aliquot potum.  
Chamaesyces rami triti, & impositi.  
Vitæ sarmentorum viridum incensurum emanans aqua.  
Aerugo imposita.

## Ad acrochordonas, & thymos & myrmecias.

Mali punici vinum adhibitum.  
Lac ficulneum cum adipe circa adiacentem carnem illitum.  
Thus ex aceto, & pice illitum.  
Ruta cum pipere, vino, & nitro affricata.  
Cicer cum hordeo, & melle.  
Ranunculi folia, & radices.  
Dipsaci radix trita in vino decocta.  
Tithymali characiæ succus, & lac illitum.  
Chamaesyces rami triti, & impositi.  
Heliotropij semen linitum. Quia & heliotropium minus.  
Vitium visiferarum sarmentorum viridum incensurum emanans aqua illita.  
Sal cum suo vitulino illitum.

## Ad alarum tædia.

Myrrha cum liquido alumine illita.  
Myrti foliorum arenarum farina inaspera.  
Cardui radix cataplasmaris more adhibita.  
Alumen linitum.

## Ad labiorum rimas.

Adeps Anserinus illitus.  
Adeps Gallinaceus illitus.  
Lycium admodum.

## Ad sudorem ciendum.

Ferulæ semen ex oleo inunctum.  
Onobrychis ex oleo inuncta.  
Mel Heradium quodam anni tempore denuratum.  
Fici maturæ comestæ.  
Sinapi in cibum sumptum.

## Ad sudorem compescendum.

Bulbi comestæ.  
Sulphur confricatum.  
Gypsum admodum.  
Morochrus lapis admodum.  
Samia terra admodum.

## Ad exterendam cutim.

Cyclamini radix inuncta.

## Ad extrahendum ex alto.

Mel appositum.  
Sinapi appositum.



# SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM VI-

RES, QVIBVS EXVBE-

rantes in corpore humores vomitu & alui

deiectione excernuntur, ex

Dioscoride.



EXPELLENTIVM

*medicamentorum.*

Ad bilem educendam.



**L** R i s Illyrica drachmarum septem pondere ex hydromelite pota.

Thlaspi semen potum.

Aloe hausta.

Abinthium potui datum.

Tragorigni decoctum bibitum.

Lychnidis sylvestris semen drachmarum duarum pondere potum.

Androsami semen duarum drachmarum pondere haustum.

Veratrum nigrum per se datum, aut ex Scammonia cum salis drachma.

Pycnocomi radix duarum drachmarum pondere ex aqua mulsâ.

Centaureum minus decoctum deuoratum.

Parthenium siccatum cum aceto mulsâ, aut sale.

Thapsie lacteus succus in aqua mulsâ potus.

Clematidis alterius semen tritum potum.

Sesamoides tritum datum.

Cucumeris sylvestris radice succus, & cortex sesquiboli pondere bibitus.

Hippophæ succus oboli pondere potus.

Ricini triginta grana purgata trita hausta.

Tithymalorum omnium succus binis obolis in posca potus.

Mercurialis ius potum.

Lathyrus grana sex aut septem cum ficis aut

palmulis in cataportio deuorata.

Peplus in hydromelitis cyatho potus.

Scammonij succus drachmæ vnus, aut quarternum obolorum pondere haustus ex aqua mulsâ, vel pura.

Chamelæ folia in cataportio deuorata cum duabus absinthij partibus adiecta chamelæ vna cum hydromelite.

Thymelæ viginti granorum pars interna bibita.

Folia sambuci olerum more cocta.

Folia ebuli olerum more cocta.

Apios scilicet inferior pars deuorata.

Empetrum in iure aliquo aut hydromelite potum.

Filiculæ aridæ farina aqua mulsâ inspersa bibita.

Cynocrambe decoctum haustum.

Helioeropij decoctum ex aqua potum.

Agarici drachma vna vel altera cum mulsâ bibita.

Pityusæ radix drachmarum duarum pondere cum mulsâ hausta, seminis verò drachma, & succi cum farina subacti cochlearium in cataportio.

Ad pituitam eiiciendam.

Iris Illyrica drachmarum septem pondere ex hydromelite.

Mandragoræ succus duorum obolorum pondere potus.

Veratrum

# Expellentium Medi.

Veratrum nigrum per se datum, vel cum scam-  
monia cum salis drachma.  
Lycij Indici semen cyathi dimidij mensura  
potum.  
Vini crassior cortex in vino, aut aqua frigida  
vnciatum potus.  
Gallinaceorum senescentium ius Dioscoridis  
modo paratum, haustum.  
Cyclamini radix ex hydromelite pota.  
Scilla cum melle cocta pota.  
Hyssopi decoctum ex aqua, melle, & ruta potum.  
Thymum cum sale & aceto haustum.  
Sphondilij semen potum.  
Ammoniacum drachmæ pondere bibitum.  
Daphnoides folium recens, vel aridum potum.  
Hippophaëstis succus trium obolorum ponde-  
re bibitus.  
Epithymum potum cum melle.  
Bryonia succus cum aqua multa.  
Cnici feminis succus cum mulso, vel iure gal-  
linaceo.  
Magnes trium obolorum pondere cum mulsa.  
Centaurij minoris decoctum deuoratum.  
Parthenium siccatum cum aceto mulso, aut  
sale potum.  
Clenaridis alterius semen tritum, potum.  
Sesamoides tritum datum.  
Cucumeris syluestris radice succus, & cortex  
sesquiboli pondere bibitus.  
Hippophaëstis succus oboli pondere potus.  
Ricini grana triginta trita epota.  
Tithymalorum omnium succus binis obolis in  
posca potus.  
Lathyrus grana sex, aut septem in catapocio  
cum fici, aut palmulis deuorata.  
Peplus in hydromelitis cyathio potus.  
Scammonij succus drachmæ vnius, aut quater-  
num obolorum pondere haustus ex aqua  
pura vel mulsa.  
Chamelæ folia in catapocio deuorata cum  
duobus absinthij partibus, adiecta chame-  
læ vna cum hydromelite.  
Thymelæ viginti granorum pars interior  
bibita.  
Folia sambuci olerum more cocta.  
Folia ebuli olerum more cocta.  
Apij inferior pars deuorata.  
Empetrum in iure aliquo, aut hydromelite.  
Filicula aridæ farina aqua multa inspersa  
hausta.  
Cynocrambæ decoctum bibitum.  
Heliotropij decoctum ex aqua potum.  
Agarici drachma vna, aut altera cum multa  
bibita.  
Pisusæ radix drachmarum duarum pondere  
cum mulsa, & feminis drachma, succi ve-  
ro cum farina subacti cochlearium in cata-  
pocio exhibita.

## Ad atram bilem pellendam.

Mandragoræ succus potus duorum obolorum  
pondere ex mulso.

Gallinaceorum senescentium ius Dioscoridis  
modo paratum haustum.  
Epithymum ex melle haustum.  
Serum lactis potum.  
Origanum siccum acetabuli mensura potum  
ex mulsa.  
Pulegium bibitum.  
Helleborum nigrum haustum.  
Spartium epotum.  
Alypum mensura epithymo pari cum sale, &  
aceto sumptum.

## Ad vomitum ciendum.

Thlaspi potum bilem rubeam educit.  
Mandragora pota atram bilem.  
Thapsiæ lacteus succus in mulsa bibitus.  
Tithymalorum succus cum aqua multa binis  
obolis potus.  
Apij superior pars deuorata.  
Spartij flores, & semina in mulsa pota.  
Anagris semen commanducatum.  
Betonice radices ex hydromelite potæ, pitui-  
tam eiciunt.  
Papaueris spumei semen in mulsa acetabuli  
mensura potum.  
Scaphidis agriæ grana quindecim in mulsa  
data.  
Silybi radice drachma pota.  
Glans vnguentaria cum hydromelite.  
Narcissi radix cocta, esta, seu bibita.  
Ricini grana triginta hausta.  
Raphani cortex ex aceto mulso potus.  
Tithymalorum omnium succus potus.  
Aes vsum cum hydromelite bibitum.

## Ad aquam intercutem pellendam.

Cyclamini radix ex hydromelite hausta  
Polij decoctum bibitum.  
Hippophaëstis succus trium obolorum pondere  
potus.  
Hippophaëstis succus oboli pondere potus.  
Ricini grana triginta pota.  
Lathyrus cicutis grana sex, aut septem in cata-  
pocio cum fici, aut palmulis deuorata.  
Sambuci folia olerum more cocta.  
Ebuli folia olerum more cocta.  
Empetrum in iure aliquo, aut hydromelite  
haustum.  
Cynocrambæ decoctum potum.  
Asarum bibitum.  
Lactuce syluestris succus in aceto mulso potus.  
Trifolij radix drachmarum duarum pondere  
in vino bibita.  
Tithymalorum succus bibitus.  
Thymelæ viginti granorum pondere pars in-  
terna bibita.  
Vitis syluestris radix seruesceta in aqua in cya-  
this duobus vini aqua marina diluti, pota.  
Squama æris ex aqua multa hausta.  
Mercurialis decoctum ius potum.

## Ad aluum emolliendam.

Cerafa recentia manducata.

# Expellentium medic.

Pruna in cibis sumpta.  
Siliquæ deuorata.  
Fici maturæ deglutitæ.  
Lac ficulneum potum.  
Chamarum piscium ius potum.  
Vnguis odoratus ebibitus.  
Raphanus comestus.  
Beta alba deuorata.  
Blitum comestum.  
Rumicis cuiusque decoctum potum. Quin &  
ipsa herba decocta deuorata.  
Malua in cibo sumpta.  
Atriplex manducatum.  
Brassica leuiter feruesfacta comesta.  
Lentis decorticatæ decoctum primum hau-  
sum.


Asparagorum cauliculi in cibum accepti.  
Cucurbitæ integræ feruesfactæ expressus suc-  
cus potus.  
Gingiber quoquo modo sumptum.  
Peucedanum potum.  
Scillæ siccæ cochlear vnum, aut alterum iei-  
nis datum.  
Androsæmi semen tritum potum.  
Helxines foliorum succus haustus.  
Papaueris erratici semina acetabuli pondere  
ex muisa aqua pota.  
Cynoglossi decoctum haustum.  
Chamaejasces rami decocti, & in cibum sum-  
pti.  
Bryoniæ cauliculi recentes cocti, & in cibum  
deuorati.

F I N I S.









# PETRI ANDREAE MATTHIOLI MEDICI

Senensis Commentarii,

IN LIB. PRIMVM PEDACII DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA.

Præfatio Dioscoridis.




**Q**UANTVM, amicis<sup>30</sup> sine Aree, complures non veterum modo, sed recentiorum quoque, de medicamentorum compositione, viribus, atque probatione scripserunt: nobis tamē nec vanum, nec à ratione abhorrentē impetum animi ad hoc opus<sup>40</sup> incessisse, tibi ostendere tentabimus. propterea quod eorū nonnulli absolutum nihil ediderunt, alii plurima, vt ex narratione acceperant, scriptis tradiderunt. Siquidem Bithynus Iolas, & Heraclides Tarētinus, omissa prorsus herbarum tractatione, rē ipsam paucis perstrinxerunt. neque verò omnes illi de metallicis quicquā rebus, aut odoramentis memoriæ prodiderūt. Cra<sup>50</sup>teuas autē herbarius, & Andreas medicus, qui cæteris diligētius hac in parte versati videntur, radices multas apprime vtilēs, herbāsque aliquas haudquaquam adnotatas reliquerunt. Veruntamen priscorū subscribere oportet sententiis: quos etsi pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen im-  
pendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum: è quibus est Iulius Bassius, & Niceratus, & Petronius Niger, & Diodotus, Asclepiadae omnes, qui medicinalem materiā vernaculam, cognitamq; vulgò, dignam censuerunt, quæ ab ipsis literis exactè mandaretur: & vt medicamentorū vires, probationesq; cursim complexi, sic nullo experimento eorum effectus colligentes, inani verò reddendarum causarum studio verba fundentes, alia interdum pro aliis scriptitando, ¶ rem in aceruum, congeriemque controuersiarum extulerunt. Siquidem qui inter eos egregius habetur Niger, euphorbium nascentis in Italia chamelææ succum esse contendit: androsamónque eandem herbā cum hyperico esse: quin etiam aloē in Iudæa fossilem nasci: & pleraque his similia falsò exponit, quæ prorsus veritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non oculata fide, sed narratione potius ab aliis accepisse. In ordine præterea iidem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepantes, nullaq; cognatione coniunctas vi-

res collidentes: partim per elementalite-  
 rarum scripta in ordinem digeretes, quò  
 facilius memoriz mandarentur, genera  
 & eorū effectus à sua cognatione disjun-  
 gentes. Nos verò ab ineunte, vt ita dicā,  
 iuuenta, iugi desiderio cognoscendæ ma-  
 teriz affecti, multis regionibus peragrat-  
 is (nec enim nescis nos militare vitam  
 exegisse) tuo hortatu commentationem  
 in sex libros cōtulimus. Quod opus tibi  
 dicamus, Aree, animi gratitudine obse-  
 quentes, ob eum quò nos prosequeris  
 affectum. Etenim natura cum in omnes  
 eruditione excultos, tū verò in eos, qui-  
 bus cum tibi eiusdem artis necessitudo  
 intercedit, pronus ad amicitia esse soles,  
 in nos etiā aliquatò peculiaris. Enim-  
 vero non paruum prebetur probitatis  
 argumentum, optimi viri Licinii Bassi  
 singularis erga te amicitia: quā vnā no-  
 bis cū degentes nouimus, cum mutuam  
 inter vōs beneuolentiam emulatione di-  
 gnā intueremur. Admonitum autem  
 te velim, cōsque qui in hosce commen-  
 tarios incident, ne in verbis facultatem  
 nostram assimetis, sed potius adhibitam  
 rebus cum peritia curā. Etenim plurima  
 visu ipsi exactissimè cognouimus: qua-  
 dam etiā ex ea, de qua inter omnes con-  
 uenit, historia, percussationeque rerum  
 apud singulos vernacularum, diligenter  
 accepimus. Dabimus igitur operam, vt  
 differenti ab aliis ordine tradito, genera  
 singularū medicinarum, viresque descri-  
 bantur. Quòd autē necessaria sit medica-  
 mētorum doctrina, nemo est ferme qui  
 ignoret: quòd ea & toti arti coniuncta  
 sit vniuersisque eius partibus efficax ad-  
 ministrēt auxilium. Quare per medica-  
 mētorum cōpositiones, atque misturas,  
 & facta in morbis pericula extrēdi, & in-  
 crementum capessere potest, plurimū  
 conferente singulorum medicaminum  
 cognitione. Quinetiam vernaculā, fa-  
 miliarēque materiam complectemur,  
 vt perfecta sit, quæ a nobis relinquetur,  
 doctrina. Verū in primis curā impen-  
 dere oportet, vt suis temporibus singula

& demetantur, & recondātur. certè pro  
 horum ratione, medicamēta aut valent  
 viribus, aut euarido nullòque munere  
 funguntur. Serena igitur celi cōstitutio-  
 ne demetenda sunt. magni siquidem re-  
 fert inter colligendum, si vel squalores,  
 vel imbres infecti sint: quemadmodum si  
 loca, in quibus prodeut, cliuosa, & ven-  
 tis exposita sint, & perflata, frigidāque,  
 & aquis carentia: in his enim locis vires  
 eorū longe validiores intelliguntur.  
 Contrā, quæ in campestribus, riguis, &  
 opacis, ceterisque locis à vento silenti-  
 bus enascuntur, plerumque degenerant,  
 & minus viribus valent: multoque ma-  
 gis, si non suo tempore, nec opportunè  
 colligantur, aut si per imbecillitatem in-  
 tabuerint. Neque ignorādum, hæc sæpe  
 pro peculiari loci natura, aut anni cle-  
 mentia, maturius, aut serius adolefcere.  
 nonnulla propria vi hyeme florent, &  
 folia pariunt: quādam bis anno florife-  
 ra. Quare cui in animo est horum peritia  
 assequi, necesse est eum primā germi-  
 natione solo emergentibus, adultis, & se-  
 nescentibus adesse. Nam qui pullulanti  
 herbæ duntaxat adsiterit, adultam co-  
 gnoscere non potest: neque qui adultam  
 tantum inspexerit, nuper erumpentem  
 noscet. Quo fit, vt propter mutatam so-  
 liorū faciem, caulium proceritates, flo-  
 rum feminilque magnitudinem, & id ge-  
 nus alias peculiare notas, nonnulli, qui  
 olim has rerum varietates non perspex-  
 runt, magno in errore versentur. Quæ  
 causa etiam nonnullis scriptoribus im-  
 posuit, qui herbas quasdam, verbi gra-  
 tia, gramen, quinq̄folium, & tulsilagi-  
 nem emittere florem, fructū, & caulem  
 negāt. Ergo qui sapius ad visendas her-  
 bas, & earum natales se contulerit, earū  
 cognitionem maxime consequatur. Scire  
 etiam conuenit, sola ex herbaceis  
 medicaminibus veratri genera, nigrum,  
 inquam, & candidū, multis edurare an-  
 nis: reliqua à trimato iuutilia. Quæ verò  
 fruticosa sunt, sicut stoechas, trisago, po-  
 lium, abrotonū, seriphum, absinthium,  
 hyssop

hyssopum, & alia id genus semine prægnantia demectantur. Flores quoque antea, quam sponte sua decidunt. Fructus autem, ut maturi decerpantur, necesse est: & semina, ubi siccatæ ceperint, priusquam defluant. Herbarum succus, & foliorum elici debet, germinantibus tum primum cauliculis. Lac, & lacryma excipiantur, inciso per summum adoklescentia vigore caule. Radices, & liquameta, corticeve ut recondantur, eximere conuenit, cum herbarum suis foliis exuuntur. siccantur etiam expurgata inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quæ luto, aut puluere sunt obsita, aqua elui debent. Flores, & omnia, quæ iucundum odorem efflant, arculis tiliaceis, nullo situ obductis, reponantur. Nonnunquam charta, aut foliis semina, ut perennent, apte inuoluuntur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, vitrea, aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si modò rara non sit, accommodatur: & lignea, præsertim è buxo: sed ænea vasa oculariis medicamentis, liquidisque, & omnibus iis, quæ aceto, pice liquida, aut cedria componuntur. Adipem autem, & medullas stanneis vasis recondi conuenit.

# COMMENTARIVS MATTHIOLI.

 VANTVM oporteat Medicos omnes, qui legitimè in arte nomē sibi comparare student, simplicium quorumcumque medicamentorum, quæ medicinæ vsui competunt, cognitionem, ac facultatem sensibus exactè cōsequi, non modò hac præstatione declarat. Dioscorides Anazarbeus in hac materia ceteris facillè princeps: sed id quoque post Dioscoridem admirabili doctrina pluribus in locis memorat: prædidit grauissimus auctor Galenus: qui hac in re præ ceteris Dioscoridum secutus (ut eius luculentissima monumenta passim attestantur) in simplicium medicamentorum viribus, ac facultatibus indagandis, relicta (hoc etiam ipse facitur) Dioscoridi historiarum palma, omnes, qui in hac materia scripserunt, longè admodum superauit. Quippe tanta animi præfessione oblectationeque cognoscendorum simplicium caput fuit (sciebat enim non posse rite se dici medicum sine eorum scientia) ut nullo magni laboris metu, nullo periculo deterretus, in Le-

num, Cyprum, Syriam nauigauerit, atque alias *Galenus* plurimas peragrauerit regiones, ea demum *manuatis* caussa, ut quæ legitima & sincera, quæque curia *nes, ut lo-* & adulterata essent medicamenta, certò digno *grina co-* scire posset. Quapropter lib. 1. 1. de medica. *gusseret* comp. pergenerata scripsum reliquit. Hinc *simplicia.* enim puto bonæ indolis iuuenes incitatum iri, ut medicamentorum materiâ cognoscant, ipsi met insipientes, non semel aut bis, sed frequenter: quoniam sensibilibus rerum cognitione sedula inspectione perficitur, cuius rei evidentiissimum est indicium, quod gemini per omnia similes esse nobis videantur, differentes autem iis, qui ipsos inspicere consueuerunt. Itaque herbarum, fructuum, & arborum materiam, priusquam è terra eximantur, contemplari pulcherrimum est, dum fructus videlicet futuri sunt, dum edantur, dum auferantur, & dum vigeant. Hæc siquidem continua eorum speculatio docebit te, quando potissimum ipsos commode decerpas, ac in siccis domunculis repositos custodias. Vos ergo admonéo, amici, ut in hoc quoque me sequamini: si artis opera pulchre obire volueritis. Nouistis enim, quomodo ex omni natione præstantissima quotannis mihi afferantur medicamenta, quo quod perditum illi omnigenarum rerum coemptores (Græci *pharmakas* vocant) variis modis ea contaminant. Præstiterat forsitan non hos solum, sed multo magis etiam mercatores, qui illa aduehant, incusare, atque his multo magis ipsos herbarios. Item nihil minus eos, qui radicum liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in vrbes cōferant: hi siquidem omnium primi in eis dolum exercent. Quisquis igitur auxilium vndique copiam habere volet, omnis maris stirpium, animalium, & metallorum, tum aliorum terrestrium corporum, quæ ad medicinæ vsu ducimus, expertus esto, ut ex eis & exacta, & notha cognoscat. Nisi enim hoc modo instructus ad præstis operis præsidia veniat, verbo tenus quidè medendi methodu sciet, opus verò nullu ipsa dignè perficiet. Et primo de antidotis: Medicus autem (inquit) omnium stirpium, si fieri potest, peritiam habeat, consulto: sin minus pluriu saltem, quibus frequenter vtitur. earum genera quisquis toto tractatu illarum decursu nouerit, multis in partibus orbis terrarum reperiet, ut ego in Italia multis in locis inueni: quæ nec quado pullulant, nec quado crescit, nouerunt isti, qui siccas stirpes tantummodo cognoscunt. Hæc Galenus. Ex quibus satis medicis omnibus perspicuu est, non posse quenquam sine certa simplicium medicamentorum cognitione, nec morbis ratione mederi, neque artem restamethodo exercere, nec nisi fortuna quadam, vel natura ipsius robore ægros sanare. Neque enim vilo pacto eis adhibendum casheo (ut medicorum plerique faciunt, & si sepe, qui primas sibi deserui exstintant) qui compositis tantu officinarum medicamentis, ipsius admodum vulgaribus contenti sunt. Nam cum satis sibi fore

*Adipem autem teratur etiam Gale- ni tempore.*

*Sine simplicium cognitione manca est medendi ratio.*

persuadeant. scire Diacatolicum omnes in vi  
uersum humores deicere, Deiectionum è suc-  
co rosarum flauam bilem, Diacnicum pitui-  
tam, Diasenam, & Catapotia ex ceruleo  
atram bilem, Coccia caput & cerebrum ex-  
purpare: sciti, quæ Lucida nuncupant, oculis,  
& quæ ex hermodactylis dicuntur, ac quæ  
Fœtidia vocantur, arthriticis esse peridonea,  
nihil vitæ requirunt: quin potius scire negi-  
gunt, è quibus ea simplicibus cõponantur me-  
dicamēta, & an iis ex infine vires, quæ suis no-  
minibus pollicentur, an simplicia, quibus con-  
stantur, legitima sint an spuria, sincera an adul-  
terata, recentia an exoleta, sicca an humore,  
vel situ corrupta, an suo tẽpore, & opportunè  
decerpta, sole siccata, an vmbra, an igne, vt fa-  
pius in tẽporis angustia officinis fieri solet.  
Neque vnquam animaduertunt, quod deiectionis  
medicamētis, quæ nostro auro parantur ad  
bilem deiciendam, semper Scammonium lacte  
tithymalorum, ac pityusa adulteratũ, magno  
ægrotum detrimento immiscet. Iis vero, quæ  
pituitam ducunt, sæpe legitimi Turpeti loco,  
modo pityusæ, modo thapsiæ, modo pœoniæ  
radicum cortices imponunt, quæ impostorum  
mangonio ita Turpetum referunt, vt non se-  
plasiariorum modo, sed etiam medicorũ quo-  
rumcunque oculos sæpenumero fallant, nisi  
fraus gustu, & legitimi Turpeti scrutinio, & col-  
lationeprehendatur. In Catapotis deinde,  
quæ ex hermodactylis vocant, ephemerũ Col-  
chicum legitimi hermodactyli vice, in Fœtidis  
verò cicuta semen pro agrestis rutæ semine,  
quorum vtutisq; mortiferum est medicamen-  
tum, omnes iniiciunt. Adde præter hæc, quod  
sæpenumero medicamenta ex iis simplicibus  
componunt, quæ ætate exoleta, nihil viribus  
præstant, quo sit, vt penitus euanida, ac inuali-  
da reperiuntur. Quod etsi quandoque malitia,  
ac propria artificum impostura fiat: id tamen  
plerũque accidit, ex ipsorum tum incuria, tum  
etiam imperitia. nam pauci, vel potius nulli  
habentur pharmacopolæ (eos semper excipio,  
qui simplicium historias amplexatur) qui sup-  
posititiis, ipsiq; innumeris non vtantur sim-  
plicibus. Nanque asaro vtuntur pro baccharẽ,  
cyris pro trifolio, syluestri loto pro fertula  
Campana, colutea pro sena, acoro odorati ca-  
lami vice, cypero pro galãga, hieracio pro lon-  
cho, sphodylio pro acatho, chondrilla pro ci-  
chorio, agresti lactuca pro intubo, ophiosco-  
rodo pro scordio, quibusdam arborum lacry-  
mis pro succino, thapsia pro turpeto, pice pro  
pitulaphato, resina tartena pro aplegna, & se-  
gitima terebinthina, phillitide pro aspleno,  
obscuris quibusdã radicibus pro meo, pœuce-  
dano, & costo. Ad hæc casia pro cinnamomo  
vsurpãt, fantala pro aspalatho, laccam ex bra-  
silio & coco infectorio cõfectã pro cancamo,  
Rhodium oleastrũ pro agallocho, ossã & car-  
nem humanã pro mumia, macim pro macere,  
chartam pro papyro, crespinũ (sic enim vulgò

Officina  
rũ lapsus.

Officina  
rũ ab-  
sque et igno-  
rantia.

vocat aculeatam quandam plantam) pro oxya-  
cantha, cõuoluulũ, siue læuem sinilacem pro  
ligustro, agrethium prunorum succum pro aca-  
cia, succum verò baccarum ligustri, & pericy-  
meni pro lycio, nuces, quas Arabes vomica  
appellant, pro niellis ita vocatis, cãcios pro  
gammaris, ranunculum pro coronopo, spon-  
nariã vulgò dictã pro struthio, carduum, quem  
benedictum nominant, pariterq; chamæle-  
nem album pro leucacantha, parthenium pro  
artemisia, cotulam fœtidam appellatã pro par-  
thenio, canis testiculos (sic enim radices quæ-  
dam nominantur) pro styrio, poliũ pro chamæ-  
pity, paronychiam, & trichomanem pro adi-  
anto. Cadmia præterea officinis ferè omnibus  
pompholygem refert, æruo aris florẽ, æris  
squama stomomaris quod chalybem dictũ pu-  
tamus) squamam, sandys minimum, terra quæ  
dam mangonizata sphragidem lemmiam, sal-  
nitrum nitrum, & aphronitrum. Alia denique  
plura, ac diuersa simplicia medicamenta sunt,  
quæ vbiq; locorũ apud varias nationes, huius,  
vel illius vice nulla penitus ratione indifferen-  
ter substitiuntur, vbi tum prauũ, tum spurium  
sibi sandiũ vendicat vsum. quæ, ne verbosius  
rem hanc prosequi videamur, silentio præter-  
mittenda censimus. Hæc autem pluribus in  
locis non euenirent, si medici omnes veram,  
& exquisitam simplicium rerum doctrinã con-  
sequerentur, quam maximè, & iure consequi  
deberent. Quippe materiæ huius periciã asse-  
cuti, & errorum cognitionem nacti, ne sepla-  
sarii in eiusmodi versarentur scandalis, ob-  
starent: neque eis vlla vnquam medicamenta  
conferi permitterent, nisi sibi prius perspectis,  
cognitis, ac probatis simplicibus, quæ in ipsis  
compendendis expectantur. Dene itaque iam  
operam imperiti, vt huiusce materiæ cogniti-  
onem exacte consequantur, quandoquidem arti-  
ficis nihil quidẽ execrabilius, ac turpius esse  
potest, quam suæ artis subiectum, & instrumẽ-  
ta ignorare. Quod sanè vnicuique medico vsu  
euenire cõperimus, qui non modò alienis vt  
tur mistis, sed nec simplicia quidẽ, nec eo-  
rum facultates nouit. Proinde sitit à Galeno  
dictum est lib. v. 111. & v. 111. de composi-  
tione. secundum locos, quod non poterit is,  
ex quo ordine eiusdem generis medicamentum  
rum compositum sit, cognoscere, num ex mol-  
lissimo, an vehemenissimo, aut medio, aut  
alio aliquo inter hunc, & alios intermedio,  
qui singulorum simplicium potestatem exactè  
antea nõ perceperit. Veruntamen nemo in hac  
materia ita peritũ euadere cõfidat, atquidã tan-  
tũ librorum lēctione, etsi eos quidẽ grauius-  
mi conscripserint auctores, nisi læpius ad vi-  
sendas stirpes se cõtulerit, & quod a præcepto  
re in herbarum agnitione diu exercitatus, digi-  
ti demonstratione prius fuerit doctus, ac ocu-  
lorum sensu, gustatũq; variis anni tẽporibus  
omnia hæc diligenter omni ex parte perpendant.  
Id enim, cum maximè perpēdisset Galenus (vt  
sexti

Simplicium  
peritiã  
nemo po-  
test adopi-  
sci ex libro  
rũ lēctio-  
ne.

*Herbarii  
forma de-  
scripta pa-  
ram con-  
ferunt.*

*Scripta  
quorū cō-  
metes Ga-  
lenus.*

*Simplicium  
peritia à  
præceptorū  
bene, non ex  
libris com-  
paratur.*

*Impossi-  
res quan-  
doq; etiā  
peritis de  
cipiunt.*

sexti libri de simplicium med. facul. præfatione legitur) inquit. Equidem non possem non accurrere & illos quoque, qui primi herbarum formas scriptis docere sunt conati, cum melius existimem ab ipso præceptore oculis discere, ac non admittam illis, qui ex libris prodeunt gubernatores, nam sic & verior, & manifestior esset doctrina, non herbarum modò, & fructuum, arborumq; , sed & aliorū omnium medicaminū. Verum enimvero si omnino libris est opus, quis adeò miser est, ut præteritis scriptis Dioscoridis, Nigri, Heraclidis, Crateuz, & aliorum innumerorum, qui in arte ipsa consenserunt, libros grammaticos scribentis incantationes, transformationes, & decanorū, & demoniorū que herbas sacras perferat? Et libro primo de alimentorum facultatibus: Optima (inquit) illa doctrina est, quæ viua voce traditur. neq; enim quæquam ex libro nauclerus, aut alterius artis artifex euadit. In hoc namq; comparati sunt libri, ut nobis sint eorum, quæ antè didicimus, monumenta, non ut rudes & ignari per illos doctriam perfectā assequamur. Quòd si qui sint, qui præceptoribus careant, velintq; iis, quæ luculentè, ac copiosè sunt scripta (qui nobis scribendi mos est) diligenter incumbere, magnum ii fructum capient, præsertim si eadem relegere identidem non grauentur. Et primo de antidotis: Quòd si nullo (ait) monstrante ex libri alicuius lectione, quales sunt commentarii Heraclidis, Crateuz, Dioscoridis, aliorumq; quorundam in simplicium medicaminū cognitionem peruenire aliquis velit, longè maiore ipsi opus est inspectione, ut exactè singularum medicinarum virtutes, ac vicia diiudicare sciat. Nam qui simplices medicinas diiudicat, tam callidè illarum quasdam concinnant adulterantq; , ut etiam exercitissimos in eis decipiant. Quare etiam Galenus lib. 1. x. de simpl. medic. facultatibus in diphrygis mentione ita scriptum reliquit. Adiciam huic, qui de illo habetur, sermo nū, rem nō modo de diphryge scitu vtilem, sed & de Lemnia sphragide, & pompholyge, & opo balsamo, & lycio Indico. Nam etiam nūm adolescens didici hæc ita preparare, ut à veris natiūsq; nihil differre videretur. Erat autem qui me docebat ingenti mercede, homo curiosissimus, non in his tantū, sed & aliis similibus. Itaque in Lemnum, in Ciprum, in Palestinam Syriam eo studio nauigauī, ut medicamentorum istorum cuiusque multam copiam, quæ in omnem vitam meā satis foret, reponerem. Sed & Lycium Indicum cum aloe Indica id temporis commodum accipere contigit, cum à Palestina iter recesserem: cum persuasum haberem, eo quòd à camelis cum tota sarcina adiectum esset, proculdubio id esse Indicū: quodq; adulteratum haud nosci ab iis, qui portassent, posset, propterea quòd materia, ex qua id præparatur, illis in locis haud nasceretur. Porro satis visum est mihi illegitimum compositiones haudquaquā adscribere, utpote cum homines

scelerati in lucro ponant talia posse discere. Nec enim necessarium est cum verorum ac germanorum notis ac indicis, adulterandorum nosse compositiones, cum nihil ad ea discernenda conserant: imò optem, si queam, quæ à maioribus me perperam conficiendorum atq; adulterandorum medicaminum prodita sunt compositiones, omnes prorsum delere atque extirpare. hæcenus Galenus. Ex cuius verbis manifestè percipi potest, ex libris duntaxat non posse in simplicium agnitione peritum fieri quenquam, etiam si in ipsis stirpium imagines virentibus persimiles omni exquisito artificio fuerint adiectæ. Siquidem (ut hac in præfatione scribit Dioscorides, & locis iā citatis asserit Galenus) qui in stirpium historia peritissimus euadere cupit, illum quidem viuas omnium platas non semel tantū, sed diuersis anni temporibus inspicere oportet. Quandoquidem plantæ ipsæ folia aliis exhibent, cum prima germinatione emergūt, alios cum adolefcunt, & caule edunt, alios vbi folia erumpunt, & alios vbi siccifcentes maturū gestant semen. Videmus enim apertè populū nigrā, sicuti riciniū, per initia folia explicare rotundā, quæ tamen post tempus huic platani, illi verò triangulari sectione laciniata visuntur. Sed contrā hederæ euenit, quippe huic prima statim inuenta triquetra folia insunt, quæ vetustiora iam facta quadanteus rotundantur. Sisymbrii aquatici foliū cum primū erumpit, rotundum est, cum verò adoleuit, in erucæ modum laciniatur. Lepidio, & nasturtio folia primo exortu circinata, ac circunquaque apertè ferè modo laciniata emergunt: at cum pubescūt, prælonga oleaceis similia euadunt. Quo etiam modo hortense nostrum vulgò petroselinum vocatum cum suis ludere cernimus. Lathyrus amygdalinis foliis caulem vestit, quæ in acuminè ita prioris formæ obliuiscuntur, ut in aristolochiæ, aut hederæ folia de genere. Nouellus acanthus folio lactuæ longiore virescit erucæ incisuris diuiso: at senior effectus quædam circa totum caulem folia promittit tam crebra, acuta, implicita, densa, ac minuta, ut nucamenti speciem quandam referant. Sunt & alia nonnulla, quæ has foliorum mutationes per tempora ostendunt, quarū nomina breuitati cōsulescentes nunc prætereunda censemus. At fieri quidem nequit, ut huicmodi stirpium variationes ex libris, in quibus figuræ expressæ, atq; etiam coloribus exornatæ habentur, omnes obseruari possint. quandoquidem plantæ ipse appietæ ex tot variisq; vnam nobis duntaxat imaginem repræsentant. Huc etiam illud accedit, quòd ea, quæ picturæ artificio sunt, etsi ex optimi artificis penicillo emergant, nunquam tamen naturalium rerum lineamenta ad vnguem referre, ac exprimere queunt, quantum etiam naturam exactissimè imitentur. Eadem ratione putauerim ex cuiuslibet grauissimi auctoris cōmentariis, qui stirpium historiam continent, neminem abso-

*Stirpes fō  
lia immu-  
tantes.*

*Stirpium  
imagines  
parū, vel  
nihil pro-  
fuerunt ad  
simplicia  
dignoscen-  
da.*

lutam earum notionem vnaquam adepturū esse, quæ maxime medicis requiritur. quippe quod in suis simplicibus monumentis, ac foliorum, caulium, & reliquarum partium historiis, non nisi vnam lineamentorum, ac similitudinū enarrationem tradiiderint. Quæ tamen vera sint, nulum tamen præbent mutationis exemplum, vt sæpe ac sæpius plantis cōpluribus variis totius anni curriculis tum in foliis, tum in caulibus, reliquisq; particulis euenire cōperimus. Quo fit, vt hæc variandi series nullo alio pacto addisci possit, quā longa oculorum exercitatione, dum ætate tota planta ipse folo educatæ vire-scant. Cæterum vbi scriptores in suis historiis stirpium notas explicant, illi quidem ferè semper similitudinibus vtuntur, acorum exempli gratia, xyridem, gladiolumq; iridi similem reddentes: Meon præterea anetho, cyperum porro, asarum hedera, phu smyrnio, & hoc illi, & illud huic sèpius comparantes. Vnde fieri nō potest, quin aliquis, non prius perspectis vni cū doctissimis ac exercitissimis præceptoribus plācis quibusslibet, cum quibus aliæ inisse tum similitudinem, tum etiam cognationem narrat auctores, & non habita hoc modo earum ratione, possit vnaquam ex solis libris cum stirpium imaginibus, vel sine eis editis, in summū & perfectum herbarium euadere. Quamobrem et si stirpium imagines, quæ magno tum pictorum, tum typographorum studio libris excuduntur, inspicientem oculos blandè admodum detineant, atq; illas prius à nobis cognitās in memoriā reuocant, magni tamen eas esse emolumentū iis non crediderim, qui visu & præceptoris auxilio numerosam earundem partē non acciperint prius: quamquam fortasse secus vulgus existimet. Adhibeant igitur curam ii, quibus in animo est rei herbariæ peritiā adipsi, vt in primis viros huius rei non imperitos vbi præceptores assestant: deinde vt assueſcat per diuersa temporis interstitia, mōtes adire, valles, sylvas, ac cætera terræ loca, vbi oculis, reliquisq; sensibus simplicia medicamenta inspicere, & cognoscere valeant. Quos nec pigeat se cōferre ad fodinas, vbi metallica & fossilia medicamēta tam diligenter cōtēptentur, vt legitima quæq; deinde ab adulterinis discernere fiant. Neq; solum in fodinis ipsi versari debent, sed etiam in fornacibus, vbi metalla funduntur. nam ibi & diphrygem, & pompholygem, & spodium, & cadmiā, & argenti spūmā, & alia nonnulla dignoscere poterunt: quæ hac nostra ætate falsitā, spuria, & adulterata in myropoliis ferè omnibus habētur. Quin & ad magna emporia, luculentissimasq; ciuitates se conferant, vbi peregrina vndiq; importata veniunt. At cerè ridiculi sunt, qui inter legendū tum herbas, tum etiam radices, vana ducti religione, quibuscumq; verborum, carminum, & summætorum superstitionibus vti præcipiunt, quasi vires, & facultates medicamētorum verba, & carminum incantationes insundere, augere, & diminuerē va-

leant, vt stulti, & superstitionis falsò credere, & affirmare non erubescunt. Quos tamen li. v. i. de simpl. med. facul. superius citato acerrimè damnauit Galenus, sic inueniens. Et Pampphilus cum in modum tractatū de herbis composuit, verūm is ad fabulas versus aniles est, simulq; præstigiaturas quisdā, tuncis nōnullis incantationibus, quas, cū herbas colligunt, admur murāt. Et sanè vtitur iis *επι επιφανία*, id est, ad quæ suspenduntur, & ad alias manganas non solum curiosas, & à medicina alienas, sed etiam falsas vniuersas. Ex hac Galeni sententia omnibus palam fit, quòd si modo commentarios aliquos admittamus, omittis omni ex parte superstitionis, eos tantū legere debeamus, atq; in iis nauare operam, in quibus vera, & exulta simplicium doctrina nitet. Quos præsertim posteritati donarūt ii, qui exactam eorum peritiā indefessis laboribus sunt consecuti: inter quos omnium primus est Dioscorides. Ideoq; iure quidem eodè loco ceteris à Galeno præfertur, cum inquit. At Pampphilus, is scilicet, qui libros de herbis composuit, planè ex iis, quæ vel ipse scribit, præ fert grammaticū, indicatq; se nec conspexisse herbas, quas exponit. nec vires earum expertū, sed iis, qui ante ipsum scribere, fidem habuisse citra vllam explorationem. Hic sanè libros exscripsit frustra annexo ad vnam-quāq; herbam nominū acervo: deinde etiam exponens, si qua ex homine ferebatur transformatio: tum incantamenta, & libationes, atque thymiamata, quæ in colligendis illis adhibebantur, adscribens: necnon & alias eiusmodi præstigiaturas nugaces. At Dioscorides Anazarben sis quinq; libris materiā omnem vtilem absoluit, non herbarum tantū, sed & arborum, & fructuum, & succorum, & liquorum: memorans insuper & metallica omnia, & partes animalium. Et mihi vtiq; videtur omnium perfectissimè tractatū de materia medicamentorū cōscripsisse. Nam licet à maioribus multa de illis benè scripta extant, tamen à nemine omnium æquè de omnibus. Cæterum quæ scripta reliquit Heracles Tarentinus, & Crateus, & Manteas, non in ordinem digesta, nec in vnum omnia collecta videntur, quemadmodum illa, quæ scripsit Dioscorides. Et primo de antidotis volumine: Ac de omni quidem (inquit) medica materia sufficiēter à Dioscoride quinq; libris traditū est, à quo tibi discere licet cum alias omnes notas, tū gustu, olfactuq; perceptas, quibus maxime probatoria medicamēta à deterioribus cognoscuntur & discernuntur. Hinc ergo auctoritate Galeni satis perspicuum esse potest omnibus medicis, itemq; phlegmaticis, ad quos potissimum spectat rei medicæ cognitio, in ea simp. medicamentorum facultate Dioscoridæ ceteros excellere, & facili primas tenere. Quapropter ab iis præclarissimè ageretur, si plerū medicis scripta tantisper legerent ac perlegerent, perpetuoq; in sinu gestarent, donec cum planè sibi familiarem redderent, & hoc quidem cō præsertim

*Dioscorides à Galeno maxime commendatur.*

*Dioscorides in simplici materia præsertim*

*Pamphilus superstitio sum incantationibus, dum planta effunditur.*

præsertim tempore facerēt, quo à periculis  
præceptoribus vera, ac legitima simplicita tum  
oculorū, tū gustus, tū olfactus sensibus offerun-  
tur. Quod cū citius ducet illos ad optatū finē,  
quod magis Dioscoridis præclara scripta castiga-  
tissima, & à mediis quam plurimis expurgata re-  
periet. Quinetiā nostris cōmentariis, qui præ-  
terea Galeno referunt acceptum ferē quicquid  
ipse scripsit de simpliciu medicamentorū mate-  
ria, ita dilucidata & illustrata, vt maximā (ni fal-  
lor) secum adferant claritatē. Huic igitur soli se  
dedant, hunc solū sequantur ob iam dētas ra-  
tiones omnes ii, qui nō modō stirpiū, sed & re-  
liquorū simpliciu medicamentorū doctrinā &  
facultatē cōsequi volūt. Ac cōtrā tū vulgo sem-  
per ignaro, tū iis etiā, qui coxantiū ranarū in-  
star, ē sordido palustri aquarū limo caput exere-  
re nequeunt, nugaces, ac penitus deprauatas  
Pandectas relinquant, vñ cū tenebrosis officina-  
rū Luminaribus, & reliquis mēdacibus volumi-  
nibus, vbi simpliciu, & compositorū materia  
ab iis tractatur, qui vix lætūcam nouissent, nisi  
eorum cōnis frequentissima extiteret: pariterq;  
verticā, nisi accerrimē tangētes pupugisset. Quo-  
rū infectiā animaduertus Galenus, cōtra eos lo-  
cutus esse videtur lib. v. 1. de simpl. med. facul.

præfatione breuiter & scīs, sic inquit. Verū  
abstinēdum est à multis mendacibus, multoq;  
etiā magis fugiendus est Pampphilus, qui ne per  
somnia quidē herbas vidit, quarum aggregatū  
figuras perferibere. nā id genus hominū (quo-  
modo assimilauit eos Heraclides Tarentinus)  
similimū est præconibus, qui formam ac notas  
fugitiui mancipii, licet ipsi nō viderint vnquā,  
præconio tamen publicat. notas enim ab aliis,  
qui norūt, accipiūt, & ceu canēlenā eas profe-  
rent, vt si fortē is, quē præconio indicant, adsi-  
stet, agnoscere tamē nō possent. Hucusq;  
Galeni verba. Quē longē satis sufficere possunt ad  
eorū monitionē, qui ad simpliciu materia: no-  
scendā per rectū ostiū introire cupiūt, & secu-  
ro totius itineris gressū progredi. Verū in pri-  
mis, vt opportune singula demeterit, nosse o-  
portet tempora, quibus maximē plāte viribus  
valeat. Quapropter à radicibus initiū sumētes,  
dicimus harū vires, sicut etiā aliarū stirpiū parti-  
tū, nō codē anni tēpore aequē in omnibus re-  
periri. quandoquidē alix hoc tēpore, alix verō  
iusto humore prægnantes deprehenduntur. Ta-  
metiā nō desint, qui haud quāquā infirmis ra-  
tionibus innixi, radices ē terra eruendā asserāt  
semper autumnō, cū scilicet folia decidūt, &  
caules cōtabescent. alii vērō incute vere, prius-  
quā folia cōcreuant: siquidē hisce tēporibus  
radicibus maior vis inest, quā cæteris parti-  
bus. Sed vt ingenuē in hæc res fatear, quid sen-  
tiā, crediderim ego omnino maiorē succi vber-  
tatē inueniri in his, quæ vere effodiūtur, quip-  
pe quod plantæ nūdā caules, folia, neq; flores  
emiserint, à quibus omnis radicū succus exhau-  
ritur. Sed & rationi consonū mihi videtur, au-  
tumnales radices omnes tum pauciores, tū im-

becillioris esse succi, quā vernales, quod sci-  
licet paucō antē tēpore & caules, & folia, & si n-  
dus ediderint. Non tamē inficari velim, quod  
quæ vere leguntur, copiosiore, quā par sit, hu-  
more redundantes, illoq; longē maius conco-  
cto eo, qui in autumnalibus habetur, putredini  
& corruptioni nō sint magis obnoxii, præ-  
sertimq; si longo asseruentur tempore. Quæ re  
à Dioscoride animaduersa, is finē iussit stirpiū  
radices effodiendas esse, cū stirpes ipse foliis  
exuuntur. Quod cū variis anni temporibus  
eueniat pro natura diuersarum plantarum, cu-  
ram impendere oportet, vt suo tempore vna-  
quæq; radix integrē, si fieri potest, cum omni-  
bus suis adnatis euellatur, & iis in locis, acque  
sub æceli constitutione, quā maximē fami-  
liarem habent. Porro radices abunde nutritæ  
sint oportet, ac omni putredine, & imbecillita-  
te vacantes: non ita tamen, vt præ nimio ali-  
mento ex pingui solo, vbi nascuntur, accepto,  
debitam & humoris copiā, & corpulentia me-  
ritum excedant, neq; vt eiusdem alimenti inopia  
inanes, & rugosæ reddantur. Quod cū maxi-  
mē perbexisset Galenus de iris radicibus dis-  
serens libro primo de antidotis: In vniuersam  
(inquit) ex omni medicinarum genere illæ ra-  
dices inutiles habentur, quæ inanes sunt, & ru-  
gosæ. Atq; illæ quidem deteriores sunt medio-  
criter nutritis, & mediocrem magnitudinē na-  
tæ, quæ crassitudinis modum excedit, & plus  
humoris in se continent, quā illis vfu veniat.

Hæc Galenus. Cæterū vbi radices ē terra fue-  
rint exēptæ, præterū quidem tandū quæ cla-  
ra elui debent, donec omni vndiq; terra, vel li-  
mo penitus abstergantur: mox deradi tum à vi-  
bris, tum capillamentis omnibus, quibus vni-  
uersim ferē omnes comantur: postremō siccati  
eas conuenit omni adhibita cura. Quod si fue-  
rint quales feniculi, apii, asparagi, rufi, polipo-  
dii, rubiæ, intubi, & cōsimilium, in vmbra, vbi  
orientales venti respirent, diligenter siccentur.  
At omnino cauendū est, ne sole feriantur: quip-  
pe quonā potior earū pars ab eis prorsus eua-  
nesceret, vtpote raris & tenuibus. Verū enī  
uero si ex eis fuerint, quæ natura crassæ sunt,  
veluti gētiāne, helenii, mandragoræ, bryoniæ,  
& id genus alix, & aer sit nubilus, & hyems, ne  
in vmbra situ tasecāt, ac proinde marcescāt, in  
sole ac vëto tuto siccati possunt. Quod cōmo-  
dus fieri potest, si frustratim dissectæ ita tenui  
funiculo traiciantur, vt partes nō se cōtangant,  
aut cratibus impositæ quotidie sapius manibus  
reuoluantur. Atqui curandū est, ante quā siccē-  
tur, vt lignea matrix, quæ omnibus ferē radici-  
bus includitur, ipsis in longi scissis, integra exi-  
matur: quippe omnino inutilis est, nullāq; vim  
obinet. cū gentiana, cyclaminus, aristolochia  
rotunda, iris, bryonia, cētaurii maius, nymphaea,  
alixq; complures absq; matrice suas præ se fe-  
rant radices. Siccatis radicibus, quod planē con-  
stet eas sine tæbe, & terefine per tempora adsi-  
seruari posse, iis reponantur in locis, ad quæ so-

*Radices  
optimarū  
nota.*

*Radices  
quomodo  
mundari  
de, siccan-  
da, ac con-  
seruanda  
sint.*

*Radices  
quibus in  
locis exi-  
cata sint  
ponenda.*

*Libri ex-  
plodendi.*

*Tempus,  
quo sim-  
plicium par-  
tes legen-  
da sunt.*

*Radices  
quando ef-  
fodienda.*



lares radii non penetrēt, neq; fumo pateat aditus, & quæ neque viliginosa sint, neq; puluerulenta. Sit igitur locus eminens, & siccus, ad septentrionē vergens, vel etiā ad meridionale plagam, quando scilicet radices ipsæ non profus exsiccatæ reconderentur: adhibita tamē cura, ne eo tēpore austri humidissimi status admittatur. Ita deniq; recondi, ac seruari possunt tot anni, quot ab inaniatæ, tere dine, & tæbe vindicari valeat. Nam etiā quæ tennes sunt, vt

*Veratrum  
virgū, tri  
gentu edū  
rat anni.*

asari, phu, asparagi, rufci, & id genus aliæ, anno duntaxat perennent: veratrum tamen vtrunq; quāvis radicibus confect tenuibus, ad trigessimū annum vsq; perdurat. Cæterum demetendi tempus, recondendi locus, perdurandi terminus nō modō in radicibus obseruandus, sed & in cæteris tum stirpib; tum etiā animalib; partib; ut in hirci sanguine, lupi inocinore, intestino, ac etiā stercore, vulpis pulmone, apri vesica, anguiū senectæ, alisq; cōsimilibus. Assumatur igitur hæc omnia eo demum anni tempore quo magis suis viribus sunt præditæ,

*Non est ab  
re certū  
tēporibus  
herbarū col  
ligere.*

nullo planē modo neglecta tēporū ratione, quibus singula decerpi possunt. Neque enim damnandi sunt, qui in quibuscūq; plantis colligendis quædā decreta tēpora, nonnullosq; errantium siderū aspectus obseruant: quippe quod apud graues auctores scriptū inuenerint, prænox radices cōtra miciales non esse euellendas, nisi decrefcente luna. Quæ quidē opinio nō profus reprobāda videtur, nec ad ineptias incantationū, aliarumq; vanitatū, quas stultē (vt Galenus inquit) prodidit Pamphilus, cōparanda. Nā cū inferiora terrestria à superioribus cœlestibus gubernentur, & regantur, heri maximē potest, vt luna, vt quæ cæteris errantibus sideribus est nobis magis proxima, motuq; velocissima, maximā cum plātis omnia, ac rebus quibuscūq; aliis habeat rationem, tum cū augetur, tum etiā cū minuitur singulis mensibus. Quamobrē non temerē à Galeno propositū est, alyssum herbā tantūm siccā ardente ac etiam rabioso morsus esse euellendā, sicuti enim fluuiales cancores ad idem peridoneos. Quo etiā tempore captamus scorpiones, atq; anetha radice cōstat sanguineo succo madente. Quemadmodum & stirpes, quibus facultas exsiccationis insit, perpetuū in locis calidis, ac siccis demerere cōuenit. Quocirca Hippocrates ad Crateum scribens: Adnitere (inquit) quantū potes, vt nobis montanas maximē, & in altis collibus nascentes herbas à radicibus resices: quandoquidē hæc firmiores, atq; aciores sunt iis, quæ aquosioribus nascuntur locis: idq; quod in montibus terra sit densior, & aer tenuior, nā quod attrahūt, frigidus est. Quinetiam dabis operam, vt flores ex his herbis etiamnū decerpas, quæ circa stagnantes aquas, paludes, fluuios, & fontes prodeunt, quas sanē debiles, & exolutas, ac dulcis succi esse scio. Hæc Hippocrates. Herbz similiter, atque radices, legendæ sunt, siccandæ, ac asseruandæ,

*Herba quo  
pacto legē  
da, siccandæ,  
q; sint.*

his tamen demptis, quæ tum in medicina vsu, tum in cibis, tum etiam in obsoniorū condimentis quotidie virentes vsurpantur, veluti lactuca, intubus tam domestica, quā agrestis (cichoriū appellat) portulaca, buglossi, betæ, atriplex, blitū, brassica, viola nigra, malua, helixine, linzofois, ocimū, apium, hyoscyamus, sedum, plantago, asparagus, acanthus, & aliæ cōpules. Atq; nō solum refrigerantibus herbis,

120 verūm etiā exsiccantibus recetibus vitum: plerunq; enim ex calida potestate prædictis, virides siccis præponimus, præsertim vbi minus calefacere sit opus: siquidē humor in virētibus exuberans earū caloris faciliatate haud parum demulcet. Cuius quidē classis habentur amaracus, eruca, nasturtiū, mentha, abinthiū, thymus, satureia, ruta, calamintha, silymbriū, pulegiū, abrotanū, & id genus permulta. Sunt præterea & aliæ, quæ demetri expentur, cū primū floribus ornantur, vt centauriū minus,

*Planta,  
quæ colligi  
ei possunt  
sunt floribus  
ornata.*

10 viola purpurea, origanū, symphytū petraeum, pulegium, serpyllum, amaracus, polium, thymus, chamædry, chamæpitys, anthemis, chrysanthemū, stoechas, hyssopū, fumaria, aliq; cōsimiles plantæ, quas ne longior, quā par sit, esse videar, ex industria prætereo. Hæc igitur omnia serena cœli cōstitutione, non nubibus, non imbris insectis in primis colligantur oportet. Deinde terra expurgata, atq; aliis aduentitiis excrementis amotis diligeret in vmbra siccetur. Nisi ex eo genere habetur, quæ caulis crassitudine, vt in acantho, vel foliorū lentore, crassitie, & humoris exuberantia, vt in portulaca, & crithamo, omnino insolari expectant, quādoquidē si eiusmodi herbe in vmbra siccandæ reponantur, dubio procul situ obducuntur, & putrescūt. Cæteri cū rectē siccata fuerint, decusso puluere, in sacculis ex corio, vel ligneis capsulis recodantur, ac diligeret claudantur, ne earū vires euanescant. Qua in re

40 errant seplafariorū pleriq; qui herbas iam siccatas in sacculis digerentes ad officinarū laquearia suspendūt, vbi non solū breui viribus destituūt, aeris ambientis exsiccatione, ac ventorū perflatu, sed etiā in mille fordii sentinā descēdūt: quandoquidē & puluere, & aranearū telis obducuntur, ac inde mustarū stercore, quæ illis die, noctuq; insidet, labefactatæ nigricant. Neq; verò planē laudib; esserūt sunt iis, qui in linteis sacculis, ipsiq; textura admodū raris eas trabibus appendere consueverunt: quippe æstius aer in ipsos penetrans, quicquid boni inest, absumit, & abolet. quinetiā puluere oblitæ corrumpuntur, & cōturbescunt. Idcirco vt tam herbæ, quæ radices suas integras asseruent facultates, nihil quidē præstantius, quā eas capsulis tiliaceis, vel piccis, vel fœtilibus diligenter clausis reponere, vt docet Hippocrates ad Crateū his verbis scribens. Omnia medicamenta, quæ succi, & liquores fluidi sunt, in vitreis vasis ferantur, quæ verò folia, aut flores, aut radices sunt in fœtilibus nouis probē obturatis

*Officina  
rū lapsus  
in herbis  
siccis reponēdū.*

*Floris quo  
tēpore sint  
decepti,  
siccati, ac  
reconden-  
di.*

tis, vt ne vctis perflata, medicamēti vigorē, ve-  
lut in animi deliquiū collapsa, amittat. Quod  
si Hippocrates in rectibus obseruādū præci-  
pit, id maxime in siccis fieri operæpretiū erit.  
Flores insuper non secus, atq; reliquæ planta-  
rum partes, eo tēpore colligēdi sunt, quo ma-  
gis suo in vigore cōsistunt, non autē cū iam  
flaccēscētes decidui euanescent. At capparū  
flores muria asseruandi, antea quā se explicēt,  
deceperūtur: rosarū verō cū non planē expli-  
cati videntur: ceteri deinde cū omnino expā-  
si foliis patent. Verū cū maior ex parte o-  
mnes ferē flores sint herbis fragiliores, mol-  
liores, & tenuiores, idcirco tantum abest, vt in  
sole siccati sint, vt ne quidē in vmbra, si cali-  
da, vel eminentia fuerint loca: quippe, vt folis  
feruore, sic & aeris calore nimio exoluantur.  
Siccētur igitur in locis tēperatis, quo tēpore  
fapius reuolūtur, ne sicū cōrahant, adhibita  
etiā cura, ne hec nātium colorē deperdant.  
quandoquidē certū est flores, qui inter siccā-  
dum à proprio colore degenerant, nullius esse  
in medicina vsus. Flores itaque in vniuersum  
sicci ad annū duntaxat, edurant, etsi anthemī-  
dis, ceneaurii, chrysanthemi, millefolii, spartii,  
& rosarū flores etiā longiori asseruētur tēpo-  
re, si ligneis arcibus optimē inclusi diligētē re-  
condantur. Non minori etiā studio sunt col-  
ligenda semina tam ea, quæ suis in stirpibus  
nata innascuntur, vt lithospermī, phalaridis,  
foeniculi, anethi, & cariue vasculis, aut capi-  
tulis inclusa, vt papaueris, nimpheæ, melāthii,  
hyoscyami, & ocimoidis: aut siliquis testā, vt  
fabæ, ciceris, phasoli, dolichi, & lupini: aut cor-  
niculis recōdita, vt fœni græci, fertulæ Cam-  
panæ, sinapis, & erucæ: aut variis inuolucris  
contenta, quā ea, quæ circa medullam quo-  
rundā fructuū intus conduntur, quale est mali  
medici semen, aurantii, limonis, pyrorū, cydo-  
niorū malorum, peponum, & melopeponum,  
eucurbitæ, & cucumeris. Veruntamen hæc as-  
sumere oportet, cū fructus, à quibus eximun-  
tur, suam maturitatē planē senserint: illa verō,  
vbi herba iam sicca, non amplius virent. Et  
quamvis multa reperiantur semina, quæ ad an-  
num vltra suas asseruēt vires, ea tamē quotan-  
nis renouare satius, ac tutius erit: siquidē pau-  
ca sunt, quæ inueterata rancorē non redolēt.  
quo fit, vt calorē nanciscantur extraneū, & sibi  
non congenitū. Vbi igitur sicca fuerint semi-  
na, arcibus ligneis reponantur in locis siccis: fa-  
cilē enim cōrahantur locorū humores. Ceterū  
fructus, quemadmodū pruna, serica, myrti  
baccæ, cydonia mala, ceralā (quæ vulgō mār-  
asas vocant) corna, sorba, ficus, pūnica mala, &  
alia id genus, quæ in medicinæ vsum reponū-  
tur, operæpretium est, vt maturi ex arboribus  
deceperantur: quanquā sorba, vt siccantur, im-  
matura decerpere cōueniat. At animaduertē-  
dum est, quōd vbi adstrictione, & repressio-  
ne sit opus, fructus adstringentes vt paululū po-  
tius immaturi, quā secus, demetantur opor-

*Floris quā-  
diu durēt.  
Semina  
quomodo  
demeten-  
da.*

*Fructus  
quādiu de-  
ceperēdi.  
Et quomodo  
deconser-  
mandi.*

ter. Porro iuglandes, amygdalæ, pistacia, nucleī  
pinei, & auellane non prius ex arboribus ex-  
cutiantur, quā planē vltimū maturitatis gra-  
dum senserint. Id autē rectē cognoscitur, cū  
ex ima inuolucra sponte sua dehiscunt, & ar-  
bore conculsa vnā cū fructibus decidunt, alio-  
quin insolatū cōtrahūt, & siderantur. Ex his  
igitur, qui siccati asseruantur, capsulis ligneis  
potius, quā ficcati recōdantur, ne extraneos  
humores concipiant. Qui verō per annum re-  
centes reponuntur, aut maiori ex anni parte  
perdurant, in locis siccis minimē aspergine  
redolentibus appendantur, vt asfolet de vuis,  
pyris, malis cydoniis, & punicis: aut super pa-  
leas expandantur, vt fit cum malis, sorbis, ac  
mispilis: aut hordeo, vel milio sepeliantur,  
quēadmodū medica, & aurātia mala. Cortices  
præterea, qui fructibus auferuntur, vt citrii,  
punicis, & cucurbitis: quique arboribus dece-  
perunt, veluti thuri, liguri, guaiaco, sambuco,  
ac fraxino: qui item herbarum radicibus de-  
trahuntur, vt capparum, mandragoræ, thapsiæ,  
alypsiæ, ptyusiæ, ac aliarum, non secus sunt sic-  
candi, atque radices: quæpotiam similitur reponē-  
di. Succī quoq; vt in medicina ad-  
modum necessarij, omni prorsus diligentia, ac  
ratione sunt consiciendi, atque ita asseruandi,  
vt toto anni curriculo putredinem non sen-  
tiant. Ii igitur non solum ab herbis eliciantur  
oportet, sed etiam à radicibus, ac fructibus.  
Qui ē radicibus exprimentur, vt Cyrenæicus,  
& glycyrrhizæ, vere quidem parandi sunt, cū  
primum folia emergunt. Ex foliis verō, ante  
quā stirpes flores edant, & earum caules li-  
gnosi fiant. Ex fructibus deniq; quidam cū  
ipsi vltimam maturitatem senserint, cuiusmo-  
di esse debet malorum punicorum, citriorum,  
limonum, & ex myrti baccis: quidam verō an-  
tequam ad plenum maturuerint, vt ex iuglan-  
dibus, moris, pyxacathæ, ligustri baccis, & aca-  
cia: quidam ex immaturis adhuc vuis, vt om-  
phacium. Horum omnium nonnulli diu insola-  
ti, aut lento igne siccati reponuntur, vt aloës,  
syluestris cucumeris, absinthii, eupatorii,  
hypocistidis, glycyrrhizæ, & huiusmodi generis:  
aliqui verō humidi, fluxibilesq; reconduntur.  
Atqui non omnibus eadem est cōseruandi ra-  
tio: quippe alij paululum primū ad ignē fer-  
uefacti, moxq; diligētē defaecati, vt fieri solet  
de succo rosarum, intubis, buglossi, oxalidis, lu-  
pulorū, apii, & freniculi. Alii verō ignem non  
expertī tantum subsidere permittuntur, ac de-  
inde vasis tandiū transferuntur, donec defæ-  
cati pelluceant. Quod fit de succo malorum  
punicorum, citriorum, limonū, cydoniorum,  
& mororum. Veruntamen diligenti admodum  
animaduersione opus est (vt Galenus inquit  
lib. v. r. de medicamentorū compositione se-  
cundū locos) in succis liquidis cōseruandis:  
quandoquidem faciliē corrumpuntur, nisi fer-  
uefacti prius, & mox à facibus omnibus per-  
colatis, olei parum superponatur, vt optimē  
norunt

*Cortices  
quomodo  
siccati, &  
reponēdi.*

*Succi quō  
exprimen-  
di, conser-  
uandique  
sunt.*

norūt solertissimi pharmacopolæ. Adhæc habentur varia liquorum genera, quæ quàm plurimis ex plantis distillant, ac defluunt, quorum alii gummi, alii resine, alii lacrymæ vocantur.

*Gummi, lacryma, & resina.*

In gummi genere sunt opopanax, laser, ammoniacum, sagapenum, euphorbium, galbanum, bdellium, myrrha, thus, opocalpam, sarcocolla, styrax, & id genus alia. In resinarum vero censu sunt terebinthina, lentiscina, strobilina, pinacea, larigna, & abiegna. In lacrymarum denique numero sunt lac, quod ex papaueri vasculis excipitur, propriè opii appellatur, scammonium, quodq; ex thapsia fuit, rithymalorum omnium lac, cancamum, tragacanthæ lacryma, quicq; defluit è vitibus liquor, ex pruno, amygdalo, & ceraso. Quin & illud, quod vulgus Arabicum vocat gummi, quanquàm non defunt, qui tam hoc, quam prunorum, cerasorum, & amygdalorum lacrymæ malint in gummi potius referre, quàm in lacrymas. Sed quoquo modo res habeat, eò tantum summa harum rerū spectat, ut exacta scilicet earum notitia habeatur. quippe non defunt manges, & impostores, qui eas adulterent, quemadmodum & medicameta metalla. Postremo si forsitan cupiam nascito videretur Dioscorides non parua erroris culpa suspectus esse, quod in hac præfatione absolute pronūciaverit, ex omni herbarū genere solum veratrum multis educare annis, reliqua verò à trimatu inutilia esse, cū tamē in pluribus locis eius sententiæ reclamet Theophrastus antiquissimus plantarū scriptor, dicens, ut hos ab huiusmodi opinione distrahamus, quod cū Dioscorides existerit in hac facultate peritissimus, cōsummarissimus, & omnium facile princeps, gravissimo quoq; Galeni testimonio, non modo non credendum videtur, sed ne cogitandum quidem, quod non calluerit es omnes stirpium proprietates, quodque haud studiosè legerit ea, quæ ante ipsum trecentis, aut pluribus annis posteritatis memoriz mandauerat Theophrastus, & aliorum veterū pleriq; præsertim cū nobis perspicuum sit, quantum in his rebus describendis fuerit ipse apprime fidelis, & diligens. Verum omnibus per suum esse debet, quod sicuti in quibusdā locis huius voluminis scriptura deficit, in aliis spuris additionibus redundat, in aliisq; quædam; scæter mendis, scriptorū culpa, atq; etiam corū, qui in scribendis, vel excudendis auctorū voluminibus plus, minusve curæ impēderūt, quā sua interesset, ita etiā in hac præfatione evenisse facile potuit. Quare pro certo crediderim, longe plura hic desiderari, quæ ea, quæ hac in re tradiderit Theophrastus, qui veratrum ait triginæ perdurare annis, aristolochiā quinq; vel sex, chamaeleontā nigrum quadraginta, centaurium maius decem, vel duodecim, præcedenti quinq; aut sex, vitem sylvestrē vnicō duntaxat anno, elaterium centenis annis, ita ut repertum esse attestetur elaterium ducentorum annorum, quod optimum erat, & pretiosum. Harū itaq;

*Dioscorides defenditur à calumnia.*

rerum historias omnes tancum abist, ut credamus non legisse, notasse, ac monumentis tradidisse Dioscoridem, ut ne imaginemur quidem, est scriptis suis non extent: quin potius locus iste nobis suspectus & depravatus habeatur. Idcirco non Dioscoridi, sed scriptorū, & libroriorū incuriæ id vitii adscribendum est quemadmodum additionum redundantia accusantur ii, qui, ut earū auctores essent, ab re hoc opus augere, atq; illustrare exstimarūt, quales sunt spurizæ additiones illæ, quæ plura & Græcorum, & Hebræorū, & Arabū, & Chaldæorum, & Aegyptiorum, & Magorum, & Latinorum, aliarumq; linguarū nomina coaceruant, atq; in omni ferè plantarum historia in pluribus voluminibus Græcis statim occurrunt singulis capitibus. Quæ facile ex Pampilio de prompta fuerunt: argumento quod (ut superius dictum est) ei rem hanc vitio vertat Galenus, atq; siñe illa ratione siñt in hoc Dioscoridis volumen importata. Cuius rei nobis postea præbuit testimoniū, quod in quibusdā antiquis bibliothecis legitima Dioscoridis volumina reperta sint Græcè pluribus centenis annis scripta, in quibus nulli profus ex his spuris nominibus legebatur. Quorū vetustā auctoritatē simul cum doctissimo Ruellio secutus, in meis versionibus Italica lingua cōscriptis omnia illa nomina adulterina ab opere abdicavi, quemadmodum facturus sum in hoc Latino Dioscoride: est Hermolaeus, & Marcellus vulgatis ex plaribus decepti, nomina illa suis interpretationibus reliquerint, tanquā Dioscoridi legitima. Sed quoniam non minus vile, quam necessariū duximus, ut omnes ii, quibus in animo est plantarū peritiā assequi, sciāt ut vngue, quo arbores à fruticibus distideāt, frutices ipi à suffruticibus, & suffrutices ab herbis, dixerim ego Theophrasti auctoritatē, omnes illas stirpes arbores appellari debere, quæ ab radice statim simplici caudice surculoso, dissolutuq; contumaci assurgunt, quo per intervalla tanquā brachia, exorti rami latius diffunduntur, uti olea, ficus, malus, pyrus, quercus, ilex, & id genus aliz. Frutices verò, quæ ab radice caudice multiplici, ramososq; sese attollūt, in quorū classe sunt rubus, tosa, palmarus. Suffrutices, qui iter herbarū genera annuerantur, ab radice caulē emittūt, lignosis adnascuntur ramulis, foliosisq; minutis, quæ non velut aliarū herbarū folia quotiāns arefcūt, & decidūt, sed perpetuis foliis toto anno virefcūt, ut stæchas, ladanū, ruta, hyssopū, salvia, & eiusdē generis aliz. Herbarū deniq; generi subscribunt reliquæ plantæ, quæ inter interia folia tantū sine caulē pandūt, ac deinde in caulē erectæ, flores, & semina ferūt, ut cerealiū omnia genera, olera, quæ in hortis ad cibos ferūtur, & sylvestrium ferè innumeræ, quæ sponte sua in pratis, campis, ac aliis cōspiculis locis proveniūt: ramentū ex eis nonnullæ habeatur, quæ neq; caulē, neq; flores, neq; semina gignūt, ut phylitis, asplenū,

*Simplicium nomina varia Dioscoridi adscripta.*

cyno

*Arbores.*

*Suffrutices.*

*Simpliciter.*

*Herba.*

plantarū  
degenera-  
tio.

Stirpium  
mutatio.

Planta me-  
diocrescunt  
calis clemē-  
tia. Et lo-  
ci amicitia.

Plantarū  
sine natu-  
rali, & so-  
lari natu-  
ra.

cynoglossum, hemionitis, onofina. His ita deter-  
minatis, sciēdū præterea est, herbas assiduo  
quodam cultu, ac diligētia nonnunquā arbore-  
scere, quod maximē malux accidit. Hanc enim  
pluries vidi senis, septenisve mensibus cultam,  
tanta caudicis longitudine, crassitudine, & du-  
ritie proliferare, ut haste instar grandesceret. Fru-  
tices quoque aut teporis dīuturnitate, aut cul-  
torū māgno in arbores nō pumilis exēit, ut  
virex, hederā, myrica, palustris. Cōtrā similiter  
fit, ut arbusculæ quædā, si desit alimentū, aut si  
nullo cultu adhibito dīmittantur sylvestrē, à  
sua natura ita recedant, ut in frutices degene-  
rēt. Quandoquidē hī tum per adultam ætatē,  
tū per cultus rationem, vendicatio sibi robore,  
crassos prædurosque fundit caudices, ac ramos.  
Illæ verō tanquā indomitæ surculis, stolonib⁹  
ac germinib⁹, qui circa caudicē & radices ad-  
nascuntur, luxuriantes, solidos ita ramos debili-  
tant, & infirmant, subrepto illis humore, ut in  
frutices sensim elanguescant, ut myrto, lētico,  
& corylo quandoque uenisse comperimus. Tancū  
enim in planis naturæ germanitas potest  
ut nō solū sepe prædictis præter effectus: sed  
etiā ut alteram in alteram stirpē facillē vertat,  
ut cassia in cinnamomum, silybriū in mēthā,  
criticum in solium, hordeum in auenam, & oc-  
cimum in serpyllā. Porro ex his omnibus her-  
barum generibus quædam fatiū sint, quæ-  
dam agrestes. Has voluit nōnulli priores fuisse  
fatius, cum earum permultas domita cultu  
feritate mansuere in hortis liquidō cōstet:  
etiā in permultis quoque & sylvestre, & fatium  
genus inueniatur. quarū aliæ fecundæ sunt, ali-  
æ steriles. aliæ florēt, aliæ floribus orbantur:  
aliæ perpetua fronde virent, aliæ folia amittūt.  
Quod non aliunde prouenire scribit Theo-  
phrastus, quā à loco ipso, ubi nascuntur, sicuti  
ab aere eas ambiēt: ita sicuti id accidat inter-  
dum particulari radicū vicio. Magni quippe re-  
fert, ut fecundæ, floridæ, & perpetuō virentes  
plantæ consequentur, si clemens cæli consti-  
tutio, situsque, germanitas adsit. Quare nū mirū,  
si circa Memphim, & in Elephantio agro sicu-  
bus, ac etiam vitibus folia nunquam decidunt,  
quodque in insulis, alisque regionibus nuper in  
Indiis occidentalibus à Lusitanis, & Hispanis  
reperis, nulla spectetur arbor, quæ sempiterna  
coma nō vireat. Neque item admirandum, quod  
reperiantur arbores proceriores, virentiores,  
aspectu pulchriores, & magis frondibus, & fru-  
ctibus exornatæ in hoc loco, quā in illo: nan-  
que aliæ hoc sit laxantur, aliæ illo pro suæ  
quæque naturæ ratione. Proinde videmus, quod  
quæ mōtes amant, ut cedrus, larix, abies, pinus  
picea, terebinthus, buxus, iuniperus, fagus, car-  
pinus, ibi proceræ admodum, formæque insigni-  
tissimæ. Quemadmodū in plantierū & collū  
memorib⁹ querc⁹, cerr⁹, suber, ilex, lor⁹, vlnus,  
acer, fraxinus, corylus maximē proficiūt. Iuxta  
flumina, & in aquis latiores proueniunt pla-  
tanus, alnus, populus utraque, myrica, salix, ba-

rundo: et si harum permultæ non æquē latē in  
montibus, vallibus, planis, & syluis exultent. Id  
quoque discriminis in herbis, & fruticibus visi-  
tur. quædam enim paludibus enascuntur: aliæ  
in lacubus, & stagnantibus aquis exiunt: aliæ  
litora, & fluuiorum ripas desiderant: quædam  
humidos, aquosos, vliginososque amant tractus:  
quædam aquas odere, & ob id aridā, & saxosā  
sequuntur. Nec etiā desunt quæ in humidis  
10 locis vitam incipiunt agant. Sunt de-  
inde quæ in campestribus degere cupiant, quæ  
vinetis lætētur, quæ pratis gaudeant: præterea  
quæ valles, quæ colles, quæ denique editos quæ-  
rant situs. Aliæ quoque vrbaniore locis allec-  
tæ, iuxta vrbium, & oppidorum mœnia in mace-  
rariis, & ruderibus prodeunt. In palustribus, &  
humetibus locis, ac secus magnarum scrobium  
aggeres feliciter enascuntur plantago, coronop-  
us, poterium, scordium, ranunculum, eleoseli-  
um, sphondylium, lysinachia, alisma, chelido-  
nium minus, epimed⁹ uni, pentaphyllū, cerinus,  
equisetum, limonium, heliotropium paruum,  
verbenaca, tu silago, hydropiper, onobrychis,  
conysa tertiū generis. Et magis palustribus ga-  
udent cyperus, typha, sparganium, iuncus. At tā  
lucunosus, quā admodum palustris innascunt  
nymphæa, potamogetum, lotus Aegyptia, colo-  
casia, foliis & in aquis conditis, & extra emi-  
nentibus. Malabathrum similiter in Indu palu-  
dibus nascitur. atque nobis an Italia oryza, hippo-  
laphon, ac millefolium stratiotes. Tribulus  
æquē in lacubus, paludibus, fluminibus nasci-  
tur, atque in mari: quorum litoribus, ac ripis fa-  
miliare spectatur nerium. Adianthū, itemque tri-  
chomanes vliginosos specubus gaudent, præter  
tim si secundum amnes existant: aut asperginio-  
sis sequuntur ripas, quæ præruptis locis in hæ-  
rēt. Virex deinde, elichrysum, buboniū, botrys,  
rha fluminum ripas accolunt. Cricium verō  
40 brassica marina, chamæleo niger, androsaces,  
corniculatum papauer, dorycnium, solanū so-  
mniferum, glaux, hippophaes, hypophæstium,  
tragium, tithymalus, paralius, pepis, alyp⁹, ab-  
sinthiū scripsi in maritimis tum litoribus, tum  
scopulis, tū etiam collibus emergunt. Tripoliū  
etiam in maritimis exurgit, ubi scilicet allidit  
vnda, iterumque recedit, modō in mari, modō  
in seco degens. Non nisi aquis proueniūt bryō  
thalassion, corallium, & alga. At in riguis fon-  
tium, præsertim quæ hyeme tepescunt, sed, atque  
aquaticū silybriū vna innascunt, ut quasi inui-  
cem fraternam videantur inuisse amicitia. Cæ-  
terū ex his, quæ incontinēti nascuntur, arida, &  
sterculosa loca petat eryngium, sacureia, lytho-  
sperm⁹, lyciū, saluia, stachys, onofina, lōchitis,  
cynoglossū, echinū, buglossū, chamæpitys, vera-  
tū nigri. Aridissimis, & saxosis exurgunt cap-  
paris, libanotis, symphytum petrū, saxifragū,  
clixine, hemionitis, sedi vtrunque genus, coryle-  
dum, cymbalion, polytrichon, paronychia, aspe-  
num, clinopodium, circæa, lichen, ita ut harum  
pleræque sæpius in ædificiorum ruinis, ac  
saxosis

faxosis admodum locis virefcit. In opacis aut  
 simul & aridis nascuntur helenium, chrysoco-  
 me, asarū, viola purpurea, astragalus, & cyclami-  
 nus. In humidis clematis prima, quæ & secus  
 aggeres inuenitur: item phyllitis. Collū amœ-  
 nitate capiuntur spartium, nepeta, syluestre cumi-  
 nū, chamædrys, cū non oderit etiā aspera, &  
 saxofaitem phalangium, thymum, quod etiam  
 petrosolo nasci videmus: quin & holostium.  
 Cula deinde virent lagopode, elatine, ornitho-  
 galo, coriandro, hyacintho, hypoco, apio alio  
 ab horrensi, chamæcisso, ægilope, osyride, apha-  
 ca, orobache, melanthio, bupthalamo, anthemide,  
 syluestri papauere, xypbio, leucopetalo, phe-  
 nice, hyperico, cyano. Inculca verò viret syl-  
 lio, hieracio. Pratis latentur trifoliū, lorus syl-  
 uestris, anonis, daucus, carum, tragopogon, oxy-  
 lapathum, centaarium minus, hemerocallis, col-  
 chicum, betonica, quamquam hac & colles, &  
 montes abunde fteant. In vineis alitur tele-  
 phiū, portulaca syluestris, peplus, helixine he-  
 deracea, ampelofysum, capnos. Tā intra, quā  
 extra oppida, & vrbes in plateis, monumentis,  
 parietinis, ruderibus, propter muros, & hortorū  
 sepimenta vifuntur verbaſcum, blattaria,  
 thlaſpi, iberis, malua, chelidonium maius, vrti-  
 ca, ebulus, ſambucus, eryſimū, arilotochia long-  
 ga, marrubiū, chryſanthemum, galiopſis, ſene-  
 cio, terreſtris tribulus, ſideritis, eupatoriū, hyo-  
 ſcyamus, cicuta, perſonata, xanthium, ſylueſtris  
 cucumis. Campeſtria cardui omni genere hor-  
 rent, atracyli, ſerulis, ſylueſtri ſeniculo, gram-  
 mine, thaliſtro, bunio. Agrorum, & pratorū  
 ſepibus hærent ruſcum, aſparagus, rubus, rha-  
 mnus, liguſtrum, rubia. Ephemero autem,  
 hippogloſſo, ſilice, planiclerum ſylux vireſcūt.  
 Montes adamant nardum tam Indicū, & Sy-  
 riacum, quā celſicum, & montanum, centau-  
 rium maius, mandragoras, haſtula regia, ſacy-  
 rium, gentiana, liguſticum, alyſſon, ſmyrnum,  
 veratrum album, ruta ſylueſtris, polemonia,  
 polygonatū, tichymalus characias, polium, ptar-  
 mica, thymelea, chamelæa, glycyrrhiza, aſcle-  
 pias, narcifſus, thapſia, pronia, æthiops, clyme-  
 num, onagra, cæcalia, aconitum, daphnoides,  
 hyſſopon agreſſe, peucedanum, chamædaphne.  
 In ſyluis montanis emicat leucacantha, & aque  
 inſibi in præruptis locis petroſelinum, & Rhod-  
 dia radix. Sunt præterea, quæ arboribus in-  
 naſci velint. in quibus reſident, atq; ab iſdem  
 ſuſcipiunt alimentum, vt agaricum, viſci, iſpha-  
 gnos, polypodiū, dryopteris, lichen. Aliæ qui-  
 dem in arboribus conſpiciuntur, aliæ verò prius  
 eſt terra exorte, per arbores repunt, quemad-  
 modum labruſca, vitis nigra, bryonia, hedera,  
 clematis altera, ſmilax tam leuis, quā aspera,  
 lupus ſilſtratis, conuoluulus, periclyme-  
 num. Non deſunt etiam herbx, quæ ſine radi-  
 cibus in aliis herbis poſſiant, neq; alibi, quā  
 in illis reperiantur, vt caſſutha, epithymū, epi-  
 thymbrium, & epiſthæbe. Veruntamen illud  
 ſcire conuenit, quod eſt harum omniū quæq;

ſua natura felicius proueniant in prædictis lo-  
 cis, ſuoſq; vnaquæq; ſequatur ſitus, nihil tamē  
 obſtat, quin eædem modō in montibus, modō  
 in planis, nunc in collibus, ſæpe in vallibus,  
 nonnunquā in agris, & pratis, ac etiā in aliis va-  
 riis locis nullo diſcrimine inueniri poſſint. Et  
 hæc ſatis ſint quæcūq; ad natalē plantarū ſtium.  
 Cæterū vt, quantum per me fieri poteſt, ha-  
 rum rerum non minus vtilis, quā necēſaria do-  
 ctina exciteetur, augeaturq; iam ad ſingulas  
 herbarum partes noſter ſe conuerſet ſermo, &  
 de radicibus, foliis, caulibus, floribus, ac ſemi-  
 nibus diſcretemus, primō à radicib⁹, veluti à ba-  
 ſi aliarum partium, rem ipſam exordientes.  
 Frumentacea igitur omnia multis nituntur radi-  
 cibus, iſſis: tenuibus. Legumina verò ſingulas  
 habent radices præter fabam, caſſi, ſurcuſoſas,  
 & duras. Sic & olera ſerē omnia ſingulari ra-  
 dice coherrent. vt laſtica, apium, beta, buglo-  
 ſum, intubus, cichorium. Quinetiam radice ſin-  
 gulari ſuſtinentur ſylueſtris ruta, quā harmalā  
 vocant, peplos, cretegonum, ephemerum, &  
 ſæpius verbenaca. Contra numeroſis radicibus  
 donatur aſarum, phu, baccaris, veratri genus  
 veruque, capparis, crithamum, haſtula regia,  
 chelidonium minus, aſclepias, cîrcæa, alcea, æ-  
 thiopis, gramen, ſilix femina, muris auri-  
 cula altera, plātago, chryſocome, aſparagus, ru-  
 ſcus, hippogloſſum, panaces Heracleum, he-  
 monitis, pronia femina, aliſſima. Ad nardi Indi-  
 ci, & Celſici radix in ſpicæ modū capillatur.  
 Prægradi, firmæ, radice exurgit heleniū, bryo-  
 nia, mandagoras, chammoniū, ſylueſtris cucu-  
 mis, vitis nigra, rapum, nîmphæa, colocafſa, ra-  
 dix Rhodia, & China naper ex Indiis occide-  
 talibus importata, dracunculus, aloë, centau-  
 rium maius, libanotis, ſphondylium, ænanthe,  
 ſymphitum ſecundum, papauer corniculatum,  
 raphanus, carduus, periclymenum, ſolanū ſo-  
 miſerum, ſmilax aspera, thapſia, hippophæas,  
 hippophæſtū, tichymal⁹ characias, ptyuſa. Cō-  
 tra exiguum, tenuemq; radicē eignunt hydro-  
 piper, caranaces genus ſecundum, ranunculus,  
 panaces Aſclepium, & Chironium, phalangium,  
 trifolium, anthyllis, bechium, onobrychis, ho-  
 leſtium, britanica, epimedium, onagra, tragium  
 ſecundū, leonopodium, verbenaca ſupina, phy-  
 teuma, pancreatiū, aconiti tertium genus, cha-  
 mæciſſos, aſtrum, vtrunq; veratrum, plantago  
 minor, coronopus, ſeſamoides, origanū ſylue-  
 ſtre, alypon, atracylis, heliotropium maius, o-  
 noſma, rubia, cepæa, al ſma, betonica, chamæ-  
 fyce, meō, gingidiū, centauriū minus. Radices in  
 lignum dureſcunt æthiopid⁹, ſmilac aspera,  
 poterio, leucacantha, aſtragalo, tichymalo cha-  
 raciaz, cypero, rhododēdro. At molli, lētaq; ra-  
 dice coſtant althæa, acanthus, alcea, malua. Ge-  
 niculæ veluti arundinib⁹, ſunt iridi, acoro, po-  
 lyonato, ruſco, nymphaæa, xyridi, hippogloſſo  
 gramine, lauro Alexandrino, colocafſe, galangæ,  
 gingiberi, radici Chinæ nup inuenæe, & Rhod-  
 dia. Radicē digiti craſſitudine ſūdūt orobache,

Plantarū  
 in radici-  
 bus varie  
 ſunt.

eryngium, polygonarū, pæonia mas, pyrethrū daucus, pāstinaea sylvestris, symphytum petraeum, dorycnium, ebulum, echium, crithamum, elaphoboscum. Bulbosæ autem insunt caparum modo, lilio, hemerocalli, capis, bulbis, hastulæ regis, allio, porro, croco, narcisso, xiphio, testiculorum omni generi, satyrio, ornithogalo, vtriusque epimeris, arisarō, hyacinto, dracunculo, ampeloproso, scorodaproso, moly. In globum extuberant radices aristolochiæ rotundæ, cyclamini, apii vomitorii, leontopetali, anenthæ, pæoniæ fœminæ, rapī, chryfogoni, periclymeni, cyperi, argemones, catanances secundæ, pycnocomi. Insuper radices inter se dissident, tum colore, tum odore, tum sapore: quæ discrimina si rectè cognoscantur ab his, qui breui hanc facultatem assueq̃ desiderant, non parum inde haurient utilitatis. Sicuti & maxime confert scire, quæ sint radices magnæ vel parvæ, quæ duræ vel molles, quæ numero sæ vel paucæ, quæ caparum vel tuberculum effigie, quæ deniq; geniculatæ, de quibus hucusq; abunde differuimus. Sed iā de coloribus agamus. Nigricat foris chryfogoni radix, etsi candicet intus: item papaveris cornuti, nardi montani, helenii secundi, cyclamini, chamæleonis, cardui, hastulæ regis, libanotidis, rhapsodici, quanquā huius interna rubescat, peucedani, leontopetali, epimedii, nymphaeæ, eryngii, symphitici secundi, smirniū, echii, veratri nigri, astragali, anemones, mandragoræ, aconiti tertiū generis, thapsiæ, perfonatæ, silicis maris, vitis nigrae, aristolochiæ vtriusque, quarū tamen interna buxo colore pallent, pæoniæ fœminæ: tamen si huic, sicut etiam thapsiæ, & mandragoræ deliberata evalbeat. Contrā è candida proveniunt radice plantago, polygonatum, dracunculus, arum, arisarum, ranunculū, veratrum album, anonis, ligusticum, asparagus, ruscus, hippoglossum, elaphoboscum, libanotis, sphondylium, rapum, radix, circea, alcea, hellestium, tragum, trifolium, narcissus, allium, porrum, gingidium, iberis, hippofelinū, tripolidiū, iris, panaces Heracleum, tragium, somniferū solanum, arction, onagra, chamæcissos, scammonium, althæa, pityusa. At non prorsus albae, sed subalbæ radices tributæ sunt aro, polemonis, helenio primo. Rubet rubic, cetaureo magno, rhapsodico, rhabarbaro, tamen si tria hæc exterius nonnihil nigricent: inter pæaphyllo, heptaphyllo, betæ tertiū generis, bito, carotæ, anchusæ, liocopi, onosmati, chryfogono, quanquam exterius nigricant. Non planè rubra, sed subrubra radice sunt acanthus, phu, satyrium, erythroniū, xyris, radix Rhodiæ, solanū somniferū, alypum, coltus. Ex aro rubescunt filicii fœminæ, cypero, pycnocomo, epimero Colchico. Rubro colore purpurascunt radices symphytici petraei, caparū, scillæ, pæcratii. Flava intus radice sunt aristolochia rotunda, glycyrrhiza, lapa-thum, hippolopathum, cyperus Babylonicus, argemone, chelidonium maius, gentiana. At

herbaceo colore insunt polypodio, phalangio, symnio, & imperatoria. Odorata radice fragrat iris, acon, meo, cyperus, galæga, zedoaria, nardum tam Gallicum, quā Indicū, asarū, phu, caryophyllata, baccharis, ligusticum, pāstinaea, angelica, feli Massiliensē, hippofelinū, symniū, libanotis, asclepias, circea, alifina, tripolidiū, quia & radix Rhodiæ odorē expirat non iniucundū. Dulcedine gustui præbent glycyrrhiza, tra-gopogonis radix, cetaurii maioris, chamæleonis albi, elaphobosci, geranii, arctii, polipodii. Amari-tudine verò gentianæ, ranunculi, helenii, dictami cādisi, leu caciathæ, panacis Heraclei, hip-pophais, pancrati, scillæ, cicchorii, asparagi, rus-celi, cetaurii minoris, chelidonii maioris, aspho-deli, cyclamini, Acri autem radice deprehēditur gingiber, acorus, galanga, zedoaria, impera-toria, crocodiliū, angelica, panaces Chironiū, symniū, pyrethrum, alifina, tripolium, rapha-nus tum sativus, tum sylvestris, vtraq; iberis, nasturtiū, thlaspi, argemone, hydropiper, arū, dracunculus, erysimum, ophioscorodon, ampe-loprosum, scorodaprasum, capra, allium, porrū, scandix. Quo fit, vt si exacta notitia differenti-um habeatur, quæ in radicibus forma, nume-ro, colore, odore, ac sapore notatū, maximum inde percipiant emolumentum ii, qui magna animi delectatione in hac simplicium medica-mentorum facultate operam impēderint. Ac præterea plurimū iisdē contulerit, si omnes stirpium delineationes, similitudinesq; (de iis intellige, quæ scriptis tradi possunt) tum ea-rum pariter & odores, & sapes assequantur, eo inquam modo, ac ratione, quo hic à nobis adnotata reperiuntur. In primis igitur à similitudine, quam inter se incunt plantæ, exor-tus, pro viribus enitit, vt quæ plurimā ignota sunt, iis, quæ omnibus sanè vulgares apparent, rectè comparentur. quapropter ab hedera pri-mum, vt quæ neminem lateat, rem ipsam au-spicabor. Hederam igitur foliis æmulantur, *Polarum in planis* etsi quædam maiora, quædam verò minora cernantur, scammonium, asarum, vtræque cy-coparatio, claminus, smilax aspera, lauis, & hortensis, vi-tis nigra, marina brassica, Aethiopium fœseli, periclymenon, aristolochia vtræque, asclepias, vi-epimedium, gramen parnassi, apocynum, fio-la purpurea, chamæcissos, helxine cognomen-to cissampelos, cynocrambæ, hortensis sola-num, halicacabum, circea, cucumis tam syl-vestris, quam sativus, vtræque clematis. Vi-tigineum folium representant platanus, acer, lupinus, ricinus, bryonia, veratrum nigrum, balsamina, colocynthis, cucumis, quem Ven-eti anguriam vocant. Alba spina, & acan-thium simili virent folio: sicuti abrotanum fœmina, & absinthium scriphum vocatum foliis se iniucem imitantur. Vitex, & anagy-ris & foliis, & ramis conueniunt. Apii folia referunt caulalis, secundum dauci genus, laferpitium, symnium, bunium: Amygda-læ fronde vestiuntur persicus, rhododendrum, ebulus,

Radicum  
differentia  
in colori-  
bus & sa-  
poribus.

*Polarum in planis  
est coparatio  
& similitudo inter*

ebulus, sambucus, staphylo dendron, lathyrus, quam officinæ cataputium nominant. Anisum deinde isopyro foliis adtipulatur, anagallis ancyrrhino, atriplex xanthio. Vtriusq; rubiæ folia imitatur aparine, ac galium: quanquā illis maiora, huic vero minora spectetur. Porri, bulbis; folia præ se ferunt hyacinthus, narcissus, allii, colchici, cyperus, hystula regia, ampelopræ, scarodoprason, canini testiculi, lóchitis. Buxus, & lycii cósimili comatur fronde. Vitis alba amomo foliis correspondet, pyrethrú sylvestri dauco, hemionitis dracunculo, coris ericæ. Fœniculi folia emittit aleilis asparagus, panaces Afepiû, fefeli, dauci Creticum, anthemis, libanoris, bupthalmos, anethum, thapsia. Anethi foliis assurgit meon. Plantagini nō dissimilia sunt folia eadidē veratri, gentianæ, alismæ, & clymeni. Phoenix foliis geraniū exprimit. Filicē folio æmulatur sideris secundum genus, polypodii, dryopteris. Ferula cicuta foliorū imagine refert, hæc verò myrrhidē. Buglossum, verbascū, & cirsium cónsimili modo foliantur. Graminis foliū proferunt moly, holostium, gramin arundinaceū, coronopus. Huius verò folia habent caranace, psyllium. Cichoriū, chondryllæ vtriusq; genus, & quod quibusdam dens caninus dicitur, cósimili sunt folio. Cnicō atracylis folio assimilatur, chamæleoni nigro crocodiliū, chamæleoni albo silybum. Glástro tripolium simile est. Coriádrī foliis comantur parthenium, adianthum, sideritis 3  
tertia, omnia ranunculi genera (quorū tamen quædā propius, quædam longius eius speciem sequuntur) vterq; daucus, thalictum, capnos. Helxineæ folia produnt anagallis, alfine, muris auriculæcannabis, aut quinquæfolii eupatoriū, sed quæ quadrupertito diuiduntur. Cotonei mali frondē exhibent capparīs, solanū somniferum. Smyrni foliū præstant phu, lauer. Cupressi effigiem promit fabina: iuniperi cedrus. Hypericum, androsēmū, ascyrum, folio nō disserepant. Cistus, & ladanus sicut in specie, ita & in foliis conueniunt. Cyclamini foliū pandit aconitum primū: ciceris teurcium, securidacæ: cumini sylvestris striatioris millefolii: cucurbitæ personatæ: foliū phoenix: iuglandis centaureum maius, peonia mas, gentiana: ceteri hæc magis cum plantagine conueniunt. Iridis folia reddunt acorum, medion, sylvestris iris: item gladiolus, nisi hic breuiora, angustioraq; folia ubi vendicasset. In iunci specie collocandum esset vtrumq; equisetū, sed inani caule assurgit. 5  
Lentiscæ foliū simulat aphaca, onobrychis, chamæsyce, helenium alterum, anonis, trichomanes, polygala, glaux. Laureæ frondē virent polygonatum, clematis præura, daphnoides, nerium, chamædaphne. Lili folia spargūt hemerocallis, pancratii, statyriū, martagon (sic enim appellant illum quoddā agreste) ephemerū, onagra. Lentiscum referunt glycyrrhiza, tragac. Nec lepidiū arabis dissimulat. Lactucæ effigie folia serant dipsacus, sylvestris lactuca, ly-

copsis, anchusa, sylvestre glastum, mandragoræ fœmina. Lingue bubulæ similia sunt symphyti alterius folia. Myrtil folia ruscus habet, tithymalus fœmina, & canribus. Mentha sativum folio expriment silybriū, hydropiper, pentaphyllon. Marrubii effigie assurgit apiastriū, balote, horminum, sideritis prima. Mercurialis folio virent helxine, elatine, cynocrambe. Nasturtii foliis iberis nō refragatur. Olea æmula foliorum facie repræsentat halimus, ptarmica, phillyrea, ligustrū, vitex, conyza, thelygonum, caninus testiculæ, lithospermum, dorycnium, hyppophaës. Platanū folio imitantur ricinus, nigrū veratum, sphondylium, aconitū cynodonū. Verbasci folia fundunt heleniū, æthiopis, arctium, buglossum, & rithymali genus latifolium. Pastinacæ, & gingidū foliis inter se non dissident. Portulacæ folio assimilantur telephium, cepæa, chrichamū, terrestris tribulus, tithymalus, helioscopius. Trifolio correspondet lotus sylvestris, medica, cyrtus, fertula Campana. Thymū, steochaedē, satureiam simile comat foliū. Acuta rosæ, & mespili primū genus simili virent folio. Nec dissimili pulegio, dictamū & calamintha comatur. Myricæ sibi-na, & cupressus: serpylli cinopodii: saluæ sideritis prima, horminū, verbascum, sylvestre, foliis vestiuntur. Piceæ foliū ferunt polygonū, & peryssa: quercus verò chamædryis, teucris, scordiū, betonica, sideritis prima. Neq; à rutæ foliis dissident acacia, centaurei minus, serpyllum sylvestre, ambrosia, polygonum primum, androsēmum, polemonia, peplus, paronychia, hypericū, apios. Aloæ, & scillæ similia tributa sunt folia. Sampſuchi folium ostendunt marū, & panaces chironium. Solani folio germinant ciceræa, halicacabus. Rumicis folia æmulantur arum, phyllitis, britanica, & quæ vulgò bistorta dicitur. Foliorū similitudine inter se certat ruscus, hippoglossū, laurus Alexandrina. Asplenii imaginem præbent muris auriculæ altera, & altera lonchitis: sicuti semperuius minoris tertia auge species, aristolochia clematidis. Salicis fronde prouenit lysimachia, ferule Campanæ ligusticū. Silybus, chamæleo albus, carduus, alba spina, sese foliis imitatur. Ex his igitur facile quib; herbarū germanitatē, cognationē, similitudinēq; perdiscere poterit, quæ omnia in dignoscendis stirpibus non paruum adferunt vtilitatē. Cæterum plantarū omnium folia non modicā in coloribus differentiā habent, tametsi folia ipsi coloribus adeo perspicuis, uti flores haudquaquā splendunt. Niger sine color in nullis reperitur herbis, neq; arboribus, quamuis nonnullæ raro quodā virore sint suffusæ, ita vt paululū nigrescēt, sicut phillyrea, buxus, ligustrū, hortensē solanum, nigra viola, osyris, hyoscyamus, vtræq; clematis. Cōtrā nec folia habentur, quæ niueū candorem exprimpant, verum pleraque, quæ incana sunt, subalbescant, vt crithemo, echio, ranunculo, abrotano, absinthio, siluicæ, calaminthæ, maro, periclym

Foliorum  
in colori-  
bus differē-  
tia.

periclymeno, corniculato papaueri, stachy, methastro, aithra, polio, verbasco, vtriq; lychnidi, & mandragora mari: quæ omnibus superne candicant, quemadmodum inferne rosmarino coronario, bechio, oleæ, populo, artemisia, & aliis multis. Rubent punice malo, amygdalo, lentisco, terebintho, rhoi, cyclamino, bostry, cori, androsamo, asfetro, lonchitri, ofyri, bliro, amaranto, phyco marino, sesame, irioni, atriplici, alypo, Celtico nardo, & cuiusdam heræ generi. Folia, quæ lanugine pubent, insunt distachno, verbasco, lychnidi, onaphalio, acanthio, althææ, menthastro. Aspera sunt symphito alteri, marrubio, fico, saluæ, ballois, & hormino. Aculeis horrent folia buelossi, echii, vtrique, eryngii, rusci, lycii, atracyli, fenchii, chimæonis vtriusq; diffusi: quæ nemini cardui omne genus. Humi iacent panacis folia, coronopi, anchusæ, mandragoræ, vtriusq; anagallidis, cynoglossi, glauci, catanancæ secundi generis. Reperant etiam humi lithospermum, graninæ, onosmatidis, canis testiculii, & albi; chamæleonis. In vniuersum plantæ omnes, quæ caule & floribus orbantur, folia per terram spargunt. Acuta folia, ut quæ olfactu nares feriant, dant sunt alio, capis, nasturtio vtrique tam aquatico, quam terrestri, sinapi, erucæ, lepidio, gingidio, hydro piperi, erysimo, & clematidi secundæ, thlaspi, serpyllo, thymo, thymbræ, fissymbrio, pulegio, calamintæ, dictamnio, dracunculo, aro, flammulæ, origano. quæ omnia non modo olfactu, sed magis etiam gustu acrimoniæ præbent. At amaritudinem possident chondrylla, cichorium, gentiana, ruta, absinthium, apitea, abrotonum, scandix, aloë, fantonicum, seriphium, chamædry, marrubium, scordium, glaucium, chamelæa, empetrum, & quæ vulgo gratia Dei defectoris scularis herba dicitur. Odorata folia sunt asaro, sio, fissymbrio, menthæ, menthastro, calamintæ, pulegio, saluæ, ladanio, hyssopo, sampsiuco, origano, thymo, serpyllo, satueia, symphito petraeo, rosinarino, ligustico, stachy, malibathro. Nec insuauem effiant odorem chamædry, baccaris, artemisia minor, & herba illa, quam aliqui flaream, nonnulli herbam sancti Ioannis, & plerique matrisaluum nuncupant. Nec desunt stirpium folia, quæ ab aliis tum plantis, tum liquoribus odorem emendicasse videntur, ut scordium ab alio, trifolium à ruta, & bitumine, cyrtus ab eruca, apastrum à citreo malo, chamæpitys à pino, xanthium à nasturtio: ita denique hydro piper à pipere mutatur odorem. Grauius olem absinthium, abrotonum, seriphium, ballois, polium, ebulus, botrys, aristolochia, cannabis, anagiris, galiopsis, cicuta, mandragoras, apocynum, glaucium.

Non parum quoque discriminis in plantarum tum caulibus, tum foliis reperitur, quandoquidem ex eis quædam singularem, simplicemq; caulem præferunt: aliæ numerosos cauliculos edunt: quibusdā crassi caules in-

stantialis tenues assurgunt: alii inanes, & vacui eriguntur, fistularum, & arundinum instar: alii pleni conspiciuntur, quibusdam item longus proflit caulis, quibusdam verò breuior: nonnulli caules geniculis scætet, alii enodes exerit, alii læuore, alii scabritia, alii duricia, alii lentore notantur. Nec desunt, qui languæne vestiantur, & qui spinis, & aculeis rigent. Quibusdā plantis teretes sunt, nonnullis quadranguli, & aliquibus striati. Alii denique su sum eriguntur, alii per terram serpunt, ac reputant. Dissident præterea inter se stirpium caules colore, rectitudine, & curuata, tanta sunt in plantis formandi varietas, atque solertia. Plures igitur caules ab vna tantum radice exiliunt glasto syluestri, perarnica, plantagini, muris auriculæ, telaphio, aristolochiæ vtrique, ruæ syluestri, hyperico, elatine, phoenice, vrage, solano somnifero, & manico, minori sedo, chamæcisso, glauci, ofyri, tithymalo paralis, & helioscopio, thymelææ, heliotropio magno. Ramoso, ac pariter furculoso caule fructuant saluia, satueia, thymum maius, origanum, hyssopum, absinthium, abrotonum, ruta, scandix, ocimum, amaracum, symphytum petraeum: & ut summariam rem complectar, omnes deniq; plantæ, quæ suffutices appellantur. Crassum caulem mittunt dracunculus, chamæleo niger, cænthe, helenium, symphytum alterum, hyoscyamus, perfonata, sedum maius. Contrà propter tenuis ornithogalo, thlaspi, polemonis, ranunculo, limonio, anemone, ligustico, panaci Asclepio, peucedano, artemisiæ, physio, cynocræbæ, euphthalmo, alismati, betonice, echio, eupatorio, plantagini, chelidonio minori, muris auriculæ, aristolochiæ vtrique, seripho, tragorigano, menthæ, fissymbrio, lysimachiæ, ruæ syluestri, delphinio, melathio, agrestis cumino, aparine, chamedry, scordio, teucro, trifolio, hyperico, sideriti secundæ, elatine, pentaphyllo, veneris vmbilico, chamædaphne, tichymalo helioscopio, thymelææ, alypo, Inanes in vniuersum, & fistulosos caules habet framæta, legumina, & olera. Particulariter verò caule emicat colliculis phu, apium montanum, sonches, veratrum albi, gentiana, equisetum, nureissus, ricinus, cicuta, lathyrus, hieracium maius, symphytum secundum, spina alba, cepe, porrum, hippofelsinum, thapsia, ferule omne genus, omnesq; plantæ ferulaceæ, qualis cicuta, panaces, laserpitium, fesseli Peloponensis, & quæ guttatum insunt thapsium, galbanum, & ammoniacum. Geniculatum culmum gerunt cerealia omnia: quin & ebulus, sambucus, phu, cyclaminus secundus, gentiana, panaces Asclepiu, polycnemum, cratogeomn, polygonum, equisetum, ferula, cicuta, meon, odoratus iuncus, ptyusa, arundinem omne genus, hydropiper, ligustici, xypthii, & omnes denique plantæ, quæ feniculaceo caule austerunt, ut elaphobosum, anethum, fesseli Massiliensis, pyrethrum, sphondylium, peucedanum. Læui constant caule dracunculus, halula regia,



typha, nymphaea, fideritis tertium genus, chrysanthemum, aconitum lycoctonum, gentiana, acanthus, aloë, iberis, hyacinthus, millefolium, chamædaphne. Doodratali caule exeunt chamæleo niger, tripolium, hyacinthus, arum, selsa moides, daucum Creticum, caucalis, caninus testiculus, epimedium, hypericum, fideritis tertium genus, centaureum minus, anonis, sylvestre cininum, tussilago, ænanthe, anchyllis, anthemis, coris, ocimoides, achillea, elatine, pentaphyllum, tragas, ageratum, papauer spumeum: psyllium, aconitum primum, colchicum, semperivium minus, umbilicus veneris, stratiotes millefolium, chamæcissos, glaux, polygala, laurus Alexandrina, tithymalus myrsinites, paralius, helioscopius, & cyparissias: item chamæla, & verbenaca. Duum verò palmori longitudine caules extollunt phalaris, thalassipis, melanthium, pronia, veratrum album, cynocrambe. Caulis cubiti altitudine adolescit petasites, plantagin minor, ranunculo, pharus, rosmarino, chelidonio maiori, baccari, panaci Asclepio, sphondylii, satyrio, asine, betonice, fabæ Aegyptiæ, cirrhato, arabidi, aphodelo, lepidio, xyridi, eupatorio, sylvestri papaueri, aconito tertio, semperivium maiori, senecioni, verbasco feminæ, cytilo, xanthio, rusco, daphnoidi, chamædaphnæ, lathyri, primo filicis generi, cnico, gladiolo, ascyro, lysimachia. Interdum cubiti longitudinem caule excedunt alisma, cyperus, tithymalus characias, pityusa. At hormonum femicubitali caule contentum est. Binum cubitorum longitudinem caule æquant dracunculus, gentiana, spina alba, acanthus, conyza maior, althæa, symphytum secundum, helenium, pladium, glycyrrhiza, centaureum maius, diplacum, carduus, selsi Aethiopicum, lycopsis, fideritis secundæ, manicum solanum, sylvestris lotus, cirsum. Quaternum cubitorum caulis exit molytriticubitalis verò Medio. Duris lignosissq; nituntur cauliculis hypericum, chamædrys, teucrium, symphytum petraeum, androsalemum, ascyrum, fatureia, thymum, origanum, millefolium, eupatorium, asfer Atticus, hyssopus, stœchas. Lentore & mollitia caules languescunt irioni, poterio, malua, smilacibus omnibus, cucurbitis, peponibus, & melopeponibus, cucumeribus, lupino, periclymeno, Bryonia, viti nigræ, vicia, helxinæ, quæ cissampelon cognominant, scammonium, iunco, typha, althæa, alceæ, solano somnifero, osyri, rusco, daphnoidi. Spinis horridum gerunt caulem dipscum, poterium, agriacantha, stolyrnios, palurus, rubus, canirubus, hieracium maius, stœbe, rosa. Spinosa prorsus lanugine obducuntur verticæ caules, echii, anchusæ, lycopsis, buglossi. Hirsutus caulis visitur mentha fistro, orobanchæ, helenio, ocimoidi, eupatorio, herbæ quam pilosellam vocant, secundum symphyti generi. Lanugineum caulem nutriunt acanthum, gnaphalium, verbascum, lychnis vera que, tussilago, althæa, anemone, panaces Hera-

clium. Scabritia & asperitate caulium sunt palinaca, rubia vtraque, lupus salictarius, aparine, baccaria, sylvestris cnicus, æthiopsis, equisetum, veratrum nigrum, papauer sylvestre, & corniculatum. Humi cauliculis repetunt polygonum, lithospermum, anagallis, clematis prima, holosium, tribulus terrestris, peplos. Caulis edunt quadrangulos fideritis prima, apiarum, marrubium, ballothe, cyperus, centaureum minus, mentha, calamintha, baccaris, horminum, aparine, rubia, chamædrys, stachys, scordium, teucrium, betonica, symphytum secundum, clymenum, verbenaca, vertica, galioptis, æthiopsis, lotus Aegyptia, bunium, xanthium, ebulus, pyncocomum. Triangulares insunt cirso, & quandoque etiam cypero. Ceterum caules albicant moly, vtrique iberidi, nasturtio, cnico, calceæ, cynocrambe. Rubescunt minori hieracio, soncho, artemisia, hyperico, ascyro, phu, virgæ aureæ, helxinæ, senecioni, myriophyllo, orobanchæ. Caule desistuntur chamæleo albus, phyllitis, filix, cynoglossum, dryopteris, polypodium, onosma, erichomanes, asplenium, hemionitis, lichen, paronychia, adiantum, hippophaësum, chamæfice. Ad hæc non parum quoque in stirpibus dignoscendis virilitatis præstat florum tum coloris, tum formæ cognitio. quippe cum nulla sit earum pars, quæ prius nostris sese offerat oculis vere, & æstate, quam flores, varia colorum pictura, quæ in eis resulget. Quapropter non ab re fuerit, horum differentias edocere, quæ in coloribus ita se habent. Plantæ igitur, quæ flore candido decorantur, sunt vir oxyacantha, ligustrum, ornoglossum, fraxinus, rosæ, quibus tum ruber, tum etiam purpureus erumpit. Item olea, myrtus, cerasus, malus, pyrus, mespilus, prunus, arbutus, iberis, raphanus, siler, cucurbita, caucalis, eruca, ocimum, ornithogalum, cyclamini secula species, hastula regia, capparis, poterium, thymus, moly, aparine, phalangium, trifolium, sed cui flos quandoq; rubescat, polium, ænanthe, alba viola, nymphaea prima, althæa, polygonatum, clematis altera, ocimastum, erinus, achillea, helxine cissampelos dicta, conuolvulus, dorycnium, ephemerum secundum, stratiotes millefolium, lotus Aegyptia, chamæfice sesamoides magnum, narcissus, scammonia, thymelæa, sambucus, ebulus, angelica, filipendula, viburnum, flammula, fragaria, imperatoria, lilium conuallium dictum, & vincetoxicum. Rubri flores emittant rosæ, in quibus tamen varient, nam alii candidi, alii purpurei, alii lutei reperiuntur: item malis punicis, fabæ Aegyptiæ, rumicis, oxylapatho, oxalidi, blito, aphæce, opiofcorodo, anemona primo generi, argemone, anagallidi masculæ, papaueri sylvestri, solano somnifero, onagræ, & caryophyllis vocatis, quem florem recentiores quidam, necessest qua auctoritate ducti, veronicum appellant. quanquam & hi purpurei emergant, & quandoque varia colorum mixtura insciantur. Flores

Florum  
in plantis  
variatis.

# In Lib. primum

res menthae, sisymbrii, & hydropiperi colore subrubro apparent. In purpura albicantes insunt phus, rosas, perisio, amygdalo, eru, bacchari, trifolio, akeae, periclymeno, rhododendro, pæoniae. Purpurei exeunt asiro, croco, vitici, vicie, cyclamini primo, latic, centauro minori, albae spinæ, origano, pulegio, saluæ, calamintæ, thymo satoreiæ simili, thymbræ, serpyllo, sed qui in album quandoque variant, pseudomelanchio, chamædrys, lichnidi, scordio, violæ purpureæ, canis testiculo, onobrychi, betonice, symphyto vtrique: ceteri secundum modum candido, modo luteo flore latet. Item medio, gladiolo, anchusæ, lycopsi, echio, fideriti tercia, verbenacæ, astragalo, hyacintho, cirso, capno, bubonio, sed cuius interna flauescant, antirrhino, acanthio, glauci, veratro nigro: tamet si quandoque huic puniceæ, herbacæ, candidi, & in purpuram albicantes flores reperiantur. Item sesamoidi maiori, ricino, amaranto, galega, personata, xantho, hormino, marrago (sic vocant recentiores liliū quoddam) scrofulariæ maiori, geranio. At in purpura purificantes insunt violis, leontopodio, delphinio, napello, pulsatilla. Aureis floribus coronantur helenium, cornus, rapū, napus, lampāna, brassea, crithamū, sonchus, aphaca cichorii genus, cragopogon, cucumis tam erraticus, quam fixus, pepo, lactuca, iris, ranunculus, anemone secunda, aconitum lycoctonon, chelidonium vtrunq; , fertula Campana, ruta, hieraciū, atracylis, tussilago, conyza, hemerocallis, viola aurea, nymphaea secunda, anagyris, alifina, hypericum, ascyrum, androsæmum, chamæpitys, spartium, lysimachia, eupatoriū, pentaphyllum, chrysocome, chrysozonon, chrysanthemū, ageratum, papauer corniculatum, hyoscyamus, galium, fenec o, verbasum, lotus vrbana, & sylvestris, buniū, osyris, colocynthi, cnicus, virga aurea, balsamina, blattaria, caltha, colutca, tanacetum, & quam fasū oxyacanthum recentiores nuncupant, abrotonū femina, pilosella, potentilla, sēna, sinapi. Anthemidi flores exoriuntur in medio lutei, & circinato orbe candidi, sicuti & parthenio, bupthalamo, bellidi, & cotulae fortidæ. Cæruleum florem edunt linū, intubus, cichorium, chondrilla, anagallis femina, muris auricula, clematis prima, buglossum, melanchium, eryngium, scabiosa, & quæ à vulgaribus morbus diaboli appellatur: ite cyanus, & quæ trinitas recentioribus dicitur. Hyacintho non colore placent flores centauro maioris, chamæleonis nigri, cinaræ: quin & varia cardui genera. Vario colore insciantur iridi, tr polio, mulæ, euphrasie. Spicati insciet bilio, plantaginis, hyssopo, mentha, menthastris, sisymbrio, hydropiperi, saluæ, sampuchio, statichy, betonice, amaranto, virgæ aureæ, ræchadladano, laudendula vtrique. Flores effigie liliū imitantur hemerocallis, marragon, ornithogalum, nymphaea alba, helixne cognomento cissampelos, lotus Aegyptia, narcissus,

crocus, conuoluulus, ephemerū primum. Flores, qui rosæ referant similitudinem, profiliunt maio cydonia, melsio, althææ, rhododendro, pæoniae, veratro nigro, colocalisæ, corniculato papaueri. Echinatis capitulis flores condunt vterq; chamæleo, centauro maius, crocodilium, spina alba, diphascus, spina Arabica, poterrum, acanthium, cinara, leucacantha, atracylis, cnicus, & reliqua carduorū genera. Mustosos gestant flores laurus, labrusca, myrica, erica, ligustrum, olea, quercus, castanea, cornus, galum. Flores in umbellæ radiantes, vel muscariis emicantes insunt Meo, sisaro, crithamo, caucalidi, origano, panaci, ligustico, pastinacæ, seseli omni, fisoni, aniso, caro, anetho, cumino, ammi, coriandro, apio, sinymio, elaphobosco, fœniculo, dauro, pyrethro, libanotidi, sphondyli, ferulari omni generi, peucedão, laserpitio, sagapeno, galbão, panaci, ammoniacio, achille, chrysocome, agerato, cicuta, stratiace millefolio, myrrhidi, thapsia, sambuco, ebulo, angelica, filipendula, viburno, imperatoria, eiq; pimpinellæ generi, quæ nonnullis hirciniæ fragum vocatur, quod hircum maximè oleat. Cythini imaginē repræsentant flores asari, hyoscyani, cisti, arbuti. Corymbis similes racematum coheret botry, ambrosiæ, anagyri, viticæ, lunariæ minoris, hippophai. Lanugine quadam obducuntur, atq; in pappos euascent flores omnium carduorū, sonchi, cragopogoni, ceuaurii maioris, vtriusq; chamæleonis, vtriusq; hieraci, senecionis, cirsi. Stellarū, folisq; flore imaginem referunt eryngium, asfer Atticus, anthemis, parthenium, bupthalamus, bellis, hypericum, pentaphyllum, intubus vtrique, cyanus. Præterea exquisitam prorsus plantarum cognitionē quæ affequi poterit, si feminis, fructusq; quos plantæ ferunt, delineationes habeat. quare non inutile fuerit earū tum figuras, tum discrimina, tum etiam similitudines prosequi. Fructus itaque racemosos proferunt terebinthus, lentiscus, populus vtrique, oxyacantha, vitis nigra, vitis alba, cyclaminus secunda. Corymbaceos verò hederæ, periclymenus, solanū horrense, & manici, simlax aspera, polycnemom, hippophasæ. Semina autē racematum coherant artemisiæ, ambrosiæ, botry, viticæ nostrati, mercuriali femina, hydropiperi, ricino. Acinosi sunt asiro, taxo, vesicariæ, asparago, rusco, lauro Alexandrinæ. Semen folliculari specie inest fraxino, rhomno, sed quod verticilli referat imaginē, nasturtium, thapsia, adosacæ. At in squamosis folliculis occluduntur gentianæ, cumino sylvestri, arriplici, sphondyli, ananthe, ferula, & thapsia. Pineam nucē imitantur, & veluti nucemeta sunt fructus piceæ, laticis, & cupressi. Baccas gerunt olea, laurus, zizyphus, cornus, rosa, cupparis. Oblongæ, & quæ magnitudinem cedant olis, videntur myrto, thymelææ, polygono. Rotundæ sunt ligustro, unipero, hederæ, periclymeno, lycio, cedro, oxyacanthæ, sabinz. Ceterum fructum

*Semina  
et fructus  
in plantis  
discrimina.*

semens; filiquis includunt acetia, anagyris, genista, filiquæ arbor. casta nigra, dorycnii, apocynum, flaphis agria, delphinium, cicer, faba, lens, phasiolus, lupinus, pisum, eru, sena, simlax horrentis, medica, aphaca, vicia, pæonia, leontopetalum, xyris, folium somniferi, & tertium aconiti genus. In folliculis verò abditur halicacabo, coluteæ, colchico, & staphylo-dendroisii; in corniculis modò aduncis, modò rectis seruant delphinium, fenum græci, lotus sylvestris, rapa, napus, raphanus, lampfana, brassica, eruca, sinapi, erysimum, circæa, leucoum, hedyfarum, papauer corniculatum. Capitibus semina condunt colocasia, auemone, argemone, melanthium, ocimoides, papauer tam satium, quàm erraticum, hyoscyamus, lotus Aegyptia. xyris. At capitulis parvis concipiuntur lino, ptarmice, cumino sylvestri, sparganio, psyllio, verbasco, serofularia, isopyro, ricino, tithymalo parasio, & heliotropio. Semina in flocci modum conclusa afferunt porrum, ampeloprasum, scorodoprasum, capæ, allium, & si prius folliculo quodam claudantur. Umbellis nuda resident semina omnibus panacis generibus: itemq; seseli, ligustico, apii omni generi, aniso, caro, anetho, cumino satiuo, ammi, caphosco, dauco, sphondylis, peucedano, elichryso, cicuta, mirrhidi, angelicæ, imperatorie, thapsiæ, coriandro, smyrnio, feniculo, pyrethro, ferulis omnibus, achilleæ, agerato, stratiocæ millefolio, sambuco, ebulo. Semen veluti spicis cõtinetur origano tam satiuo, quàm sylvestri: quin & sampsicho. Papaueris imaginem semine repræsentant psyllum, nymphæa alba, hyoscyamus, lotus Aegyptia, peplis, peplos, chamæscice. Piperis similitudinẽ exhibent semina tum lycii, tum etiã viticis. Compresso, atque rotando semine habetur malua, althæa, alcea, stulax laevis. Neque feminis effigie ab epithymo diffidet alypon: à lolio phœnix: à violæ alba chamæcis: à saluia hominum. Hirsuto semine, ac aspero, ad eũ vt id tactum vestibus adhæreat, sunt personata, eupatoriũ, aparine, helixine, xanthium, & vulgare cynoglossum. Capiti viperarum simile ferr echium, & vituli non dissimile antirrhinum. Mucronatum ostendunt tragos, spinachiũ sic vulgò vocatum, tribulus tam aquaticus, quàm terrestris. A fœni græci semine non deficiit semẽ myagri, itẽ & loti sylvestris. Semen fœniculi modo ferunt ligusticum, sison, cicuta, cuminum, carum. Anisi verò semina, apii, & ammi consimilem nacta sunt formam. Cnici semẽ suam impartitur imaginem minori centaury, vtriq; chamæleonti, spinæ albæ, & Arabicæ, aractyli, cinaræ, Medio, nigro veratro, & omnibus fere cardui generibus. Milli semine constant circæa, cratoegonum, panicum, sesamum, lithospermum, lotus Aegyptia, sesamoides. Erui semen possident caranace, tithymalus paralius, aphaca. Semine marrubium exulcrant balkote, clinopodium, sideritis prima, pycnocomũ.

Consimili nascuntur semine libanotis, & erithanum: vt etiam semine conuenient lino, satyrium erythronium, & quoddam vtriq; genus. Semine caudæ scorpiõis effigie cernitur scorpioides: & verrucarum modo pendet minori heliotropio. Semina, quod fructibus carnis tam arborum, quàm herbarum delitescent, gestant alio mala, cocones, pyra, citria, limones, aurantia, punica, melsila, cucurbita, pepones, melopepones, cucumeres, colocynthis: item balsaminæ vulgò vocatæ fructus, mandragoræ, aristolochiæ, halicacabi, quin & mala insana consimili modo suum recondunt semen. Minutum habent semen ruta, iberis, cupressus, circæa, psyllũ, mandragoras, apios, cynocræbe, papauer, hyoscyamus, ocimũ. Differunt etiãnum colore inter se semina: sicut albicant dauco, rosmarino, circæa, lactucæ, papaueri satiuo, & spumco, cucurbitæ, peponi, cucumeri, sesame, lithospermo. Vt fructu rubent oxyacantha, terebinthus, cedrus, cornus, zizyphus, rosa, punica, arbutus, taxus, cerasus. Ita similiter semine rubescunt asparagus, halicacabus, rufcus, hippoglossum, rumex, dracunculus, arum, acanthum, pæonia, rubia, tragus, iuncus, coccum insectoriũ, aspera similax, chamædaphne, sesamoides. Succo sanguineo manant ascyri, androsæmi, & hyperici grana. Nigrum inest ligustro, lycio, myrto, oleæ. Quin & semina nigricant ocimo, hirci barbaræ, porro, allio, capis, ampelopraso, phacelino, scorodopraso, ophioscorodo, saluiz, rutæ, homino, ligustico, seseli Aethiopico, sisoni, hipposelino, smyrnio, melanthio, phalangio, rubiæ, sideriti primæ, verbasco, laureolæ, narcisso, sylvestri cucumeri. In longum verò protensum proferunt semen seseli Massiliense, ligusticum, sison, hippodasium, cuminum, narcissus, fœniculum. Quadratum spectatur seseli Massiliensẽ, & libanotis: triquetrum verò statyridi agriæ, & lathyri. Geninatum semen ferunt tordylium, alyssum, archiopis, mercurialis altera. Dissident etiam sapore semina: nanque acre id proferunt porrum, capæ, allium, ampeloprasum, scorodoprasum, sinapis, nasturtium, erysimum, struthium, cyclaminus altera, dracunculus, origanum, panax Herculeum, seseli Massiliensẽ, eordyliũ, anisum hipposelinũ, fœniculum, pyrethrum, peucedano, cardamomũ, clematis secunda, similax aspera, thlaspi, hydro-piper, ptarmica, arum, lepidium, ligusticũ, & siliquastrum, quod Indicum appellant piper. Olorato semine pollent omnia cardamomi Arabici genera, panaces Herculeũ, meon, carum, panaces Asclepium, elaphoboscum, ligusticum, hippodasium, smyrnium, fœniculum, daucus, pastinaca sylvestris, melanthium, isopyrum, bunium, origanum, ammi, libanotis. Anarum semen inest Aethiopico seseli, omni absinthiorum generi, abrotano, chamæcisso, gentianæ, sesamoidi. In magnam deniq; duritiem semen coalescit aparago, perilychno.

*Symptoma, et an  
ripathia  
rerū qua-  
runda pro  
simplicium  
materia.*

meno, & rusco. Harum itaque rerum, qui exactam cognitionē fuerit adeptus, is in hac præstantissima facultate absque ullo impedimento poterit peritissimus euadere. Verū enim uero ne quid intrañtum relinquatur, quod in hac facultate tum utile, tum necessarium existimari possit, ob id scire conuenit, quod permulta creantur natura rerum omnium parens, quæ inter se vel maxime consentiunt, vel admodum dissentiunt. Quo fit, ut nihil hac re admirabilius sit in tota natura, nihilq; scitu exoptatius. Quapropter nec ab re quidem fuerit hæc etiā ceteris adnectere, paucisq; perstringere, & de his præsertim agere, quæ ad simplicium medicamentorū materiā spectant. Tam igitur pertinaci odio sese prosequitur quercus, & olea, ut nō solū nō uiuant, neq; germinet, si altera effossa, in eius scrobe altera implanteretur: sed etiam altera alteram interficit, si fortē propē oriantur. Nec minor inter brassicam, & uitem antipathia cernitur: quandoquidem obseruatum sit, uitem, & ad cuius radices assita fuerit brassica, non paruo intervallo sponte sua refugere. Ideo nil mirum, si tantum brassicam contra temulentiam pollere credant, quodque Germani quotidianis mēsis id olus semper apponant, ut vini noxā effugiant. Nec fecus brassicam oderunt origanum, ruta, & cyclaminus, atque illa uites: quippe perspectum est, quod si feratur brassica iuxta quamlibet explicata rum, confellum cadit, totaq; contabescit. Scilla adeo ueneficis, & ad murmurantium incantationibus aduersatur, ut in limine ianux domus integra suspensa ab omni eorū noxa eos, qui inhabitant, vindicet. Quocirca non temere à doctissimis rerum naturalium inuestigatoribus memoriæ proditum est, omnes in uniuersum stirpes, quibus scilla adscita proficiat, non modō asseruari ab omni aëris intemperie, animaliumq; noxa, sed etiam latiores, feracioresq; euadere. Ferula in pabulo asinis gratissima est, eosq; misceat alit: quæ tamen, si ab equis, vel bobus edatur, ueneni præsentanei modō eos interficit: tamen nulla prorsus noxa ea quoque ab hominibus edatur prima foliorum germinatione. Rhododendri flores, & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedum plurimis venena sunt: hominibus uero contra serpentium morsus præsidia. Cicuta est tuta homines enecat: item & quadrupedes, nihilominus flumi innocuē eius semine vescuntur. Cucumeres aquam ita diligunt, ut si vas aquæ plenum, dum plantis inhærent, illis subiciatur, admodum longiores effecti, mirē in illam descendunt. Contrā oleum suppositum sic refugiant, ut in hamos recuruantur, quandoquidem in uniuersum oleū omnibus, quæ feruntur plantis, inimicum est. Quo fit, ut planta quælibet, quæ fuerit eo peruncta, facile perarescat, & moriatur. Ob id enim admirandum non est, si arbores, quæ oleum secunt, ac resinam mittunt, cæterarum infisiones

aspernantur: quemadmodum eas non respuunt altarum nonnullarū, quæ nec oleum nec resinam fundunt. siquidem sæpe conspecta est quercus pyra ferre, platanus poma, myrtus puncta mala, oxyacantha melsila. At nunquā uife sunt pinus, larix, picea, abies, olea, insitionis adminiculo, alios ferre fructus, quam proprios. Grandinis impetū, item & fulminis ictum arcer pellis hyenæ, crocodili, hippopotami, & vituli marini: neq; fulmine ictuuntur ficus, & laurus. Caprificorum grossi domesticis ficis appensi, non solū eorū fructus decidere prohibent, sed etiam caducos ad maturitatem usque remorantur. Apium tantō celerius adolefcit in hortis, quantō magis ateritur, & calcatur: cum tamen fecus, & cōtra eueniat de reliquis plantis. Tenerescunt galli, esulq; apiores redduntur, qui iugulari prius in arbore fici pepēderint. Carnes putredine diutius illasce assuerunt, quibus æneus clauus fuerit infixus. Corpora ista fulmine, etsi exiccentur, nunquā tamen putrescunt. Quare non immeritō poeta ille damnatur, qui Phæthontē cecinit de celo tactum quibusdam in uallibus computruisse. Sed maiore miraculo nobis illud scilicet offert, quod scilicet fulminis ictu ē locus aurū adinatur illis illasce, ac ne confuso quidem cere signo: pariterq; ex dolio uinum euanescat, dolio nullibi fracto. Quid enim hoc mirabilius? Marcia princeps Romanarum grauida ista fulmine, partu exanimato, ipsa circa vllum aliud incommodū vixit. Mentha laçi impossita densi ipsam in caseum non finit. Marenæ pisces ferula tactæ statim moriuntur. Scorpiones item adnota delphinio herba, aut lychnide syluestri, aut acroniti radice, quod pardalanches vocant, adeo torpescunt, & stupidi redduntur, ut potius moriantur, quam uiuū existimentur: veruntamen albi uerati contactu mirifice excitantur, viresq; deperditas recuperant. Succo cotulæ manus illitæ apum, vesparumq; aculeo non infestantur. Quod item malua præfixa oleo contusa, corporisq; membris illita. Qui polemonie radicem gestaerit, a scorpionibus non icitur: etsi ictus sit, nulla neque molestia, neq; noxa afficitur. Porro tanta est arundinis, & filicis discordia, ut arundine vomeri annexa, filices in agro enatæ penitus deperdantur. At contrā magna inter se ineunt amicitia arundines, & asparagi: quippe in arundinetis sæpi longē latiores, quā alibi adolefcunt: quæ admodū & uites, quæ vlnos, populosq; scandūt. Magna insuper cōueniūt amicitia myrtus, & olea: item hæc, & ficus. Orobanche sola præsentia legumina strangulat. Metellarū nucum esu peculiaris enecat canes, quā cætera animalia. Cimices lecularii si uiui deueniant, non solū quartanis febribus remedio sunt, sed etiā percussis ab aspidē proficiunt. Martyres, felles, & mustellæ gallinas nō attingunt, quæ rursus succo fuerint perunctæ: neque vulpes eas inuadunt, quæ pulmonem vulpinum comedunt.

rint. Viperæ fagi ramulo obuam facta gressum  
sistit, & veluti artonita manet. quod item facit  
arundine etiam leuiter percussa. Furens ele-  
phas arietem tantum conspecto mansuescit: nec  
est taurus tam ferox, qui fico arbori adalligatus  
non mitefcit. Magnes lapis mirè ferrum ad se  
trahit: si alio confectur, id neutquam agit,  
nisi sanguine hircio lotus, vñ ab alio obfessum  
redimat. Succinum palem, & festucas ad se  
trahit: nihilominus oleo illuc eas respuit.  
Equi, quos lupus momorderit, & pernici cur-  
su, & prolifica probitate pollebunt: ac si luporū  
vestigia calcauerint, eruribus obstupefcunt, ac  
couelluntur. Carnes ouillæ à luporum mor-  
bus dilaniat, ceteris teneriores, & gustatu sua  
uiores existunt: earum lana vellibus contex-  
ta, pediculos creat. Leo animal ferocissimum  
præsentem gallum mirum in modum vete-  
rat, ac magis terrore concutitur auditu eius  
cantu. Gallinæ pulli elephantem, bouem, &  
equum minimè metuunt: atqui si vmbra tātū  
milui in aere volantis conspexerint, ad matrem  
maximè perterriti confugunt. Nec secus agūt  
oues, & agni lupo conspecto. Idem lupus scille  
bulbo contacto quā primum sideratur. Hyenæ  
vmbra contacti canes obmutescunt. item  
hyenæ ipsius lingua à latratu, ac morsu canum  
etiam mordacissimorum ferentem vindicat.  
Polypodium herba cancro animali admodū ef-  
ficat, vt si paruo temporis tractu tum integren-  
tes crustas, tum vngues à pedibus abiciat. Ci-  
conia platani foliis nidos implent, vt inde ves-  
pertilionis abigat, quibus cum ingens odium  
gerunt. Hirundines apium comportant, vt ti-  
neas, & blattas nidis inimicas arceant: item &  
chelidonium maius, quod obœcatis pullis visum  
restituat. Cæterum lauri folia nidulis importat  
palumbes, accipitres hieraciū, corui arum, vpu  
pæ adiantum, cornices supinam verbenacam,  
turdus myrtum, perdix arundinē, ardeola carū,  
aquila callitricū, gallerita gramē, cygni viticē, vt  
diuersis animalū iniuriis se vindicent, aut ab alio  
quocunq; qd noxā adferre possit: tā admi-  
rabilis in volatilibus, & quadrupedib⁹ habetur  
ipsius naturæ instinctus, circa rerū vires abscon-  
ditas. Carus quadā herba adeo gaudet, vt illi ca-  
tarig nomē recētores indiderint. Rang iuncti,  
ranicūlū, & strobē diligūt. Testudines, & cico-  
niæ origanū adamāt. Serpēs fœniculi affrica-  
tu visum recuperant. Leo deuorata simia febrē  
efficacissimè discutit. Ceruæ, & feræ capræ nō  
modo dictāmi pabulo illata vulnera in Creta  
insula sanāt, sed & infixa tela venatoribus reii-  
ciunt. Vrsi formicas deuorāt, vbi mandragorā  
degustauerint, quibus mirificè sanantur. Elephā-  
tes deuorato chamæleonte animalī oleastri frō-  
des depascuntur, quibus incolumes euadunt.  
Anferes, anates, ac reliquæ aquaticæ aues sice-  
rit tantū herba suis incommodis medetur:

sicuti gallinæ helxinem deuorant, grues iūcos,  
pantheræ humanū stercus, apri hederam, & ci-  
naram ceruæ. Præterea rhabarbaro flaua bilis ē  
corpore deicitur, itemq; manna, & scāmonio:  
pituira colocynthide, & turpeto: bilis verò atra  
helleboro, & Armenio lapide: acuti & venena  
theriaca superātur. Oculorum agritudines cu-  
rant solo contactu sapphiri & Anthracites.  
Ebricitas amethylo lapide arcetur. Sanguinis de  
fluxus iaspide sistitur. Topatio appenso venus  
infirma redditur: item & vitice lecto cubanti-  
bus strata. Formicæ alis vespertilionis, & vpu  
pæ corde fugantur. Quin & serpentes vete-  
ram calciamentorum fustitu abiguntur: vt  
blattæ, & papilionis hircino iocinore incenso.  
Torpedo piscis non modò manu, sed & lon-  
giori hasta contacta tangentes brachium stu-  
pidum reddit, quamuis validissimis muscu-  
lis constet. Caroblepa quemcunq; oculo  
consperxerit, enecat, & si per mille passus  
differ. Nec inter homines desunt, qui lau-  
dibus, & oculorum intuitu conspectos effra-  
scinent. Cæterum si cæterarum volatiliū  
pennæ aquilinis permisceantur, breui carie  
contabescunt: quemadmodum testudinū  
chorde contactæ disrumpuntur, si vna tan-  
tū ex lupi intestino parata inter eas reso-  
net. Eodem pariter modo tympana ouina  
pelle constructa franguntur, si tympanum  
lupina membrana contactum inter alia pulsa-  
tur. Tanta muscis, tibiis, cæterisque id ge-  
nus instrumentis facultas aduersus tarantulæ  
venenum ineit, vt languentes etiam inuitos  
non modò ad choreas, saltationesq; alliciat,  
sed etiam persanet. Quinetiam tanta vi pol-  
lent Marfi, ac Psylli contra serpentes, vt eos  
solo contactu enecent. Taurus peruncū rosa-  
ceo naribus statim vertigine corripitur. Lapis  
Thracius aqua madens igni admotus præter re-  
rum naturam flammam statim concipit, nec re-  
stinguitur, nisi affuso oleo. Sed his hæcenus:  
quandoquidem breuitati studentes plura ad-  
huc silentio prætereunda diximus.

† Hic locus (vt mihi reulic excellentiss. me-  
dicus Augustinus Galdalinus) in antiquo co-  
dice ita legebatur: *ἀντιπύριον ἀντιπύριον ἀντιπύριον ἀντιπύριον*. Id est: in tumorum differentiis  
vnumquodque ipsorum referentes. Quæ le-  
ctio non solum ob id magis probari posset,  
quā vulgata, quòd dogmatica sit, illudque  
dogma innuat, quod facultatum medicamen-  
torum causam in tumoribus, & meatibus refere-  
bat, sed quòd etiam eius dogmatis memine-  
rit Galenus lib. primo de simpl. medicamen-  
torum facultate cap. primo, his verbis: *ἵνα μὴ  
ἴδῃ ἅπαντες τὰ κατὰ τὴν φύσιν τὰ κατὰ τὴν φύσιν, ἀλλὰ καὶ τὰ κατὰ τὴν φύσιν*. Hoc est. Qui-  
dam enim in magnitudines, figuras, & situs tu-  
morū & meatuum referunt.

## IRIS DOMESTICA.

## IRIS SYLVESTRIS.



Iris. IRIS.

CAP. I.



**I**RIS à cœlestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert gladioli, sed maiora, latiora, & pinguiora. Flores in summitate cuiusque caulis, aequalibus inter se spatiis distant, incurui, varij: siquidem candidi, pallentes, lutei, purpurei, aut cœrulei conspiciuntur: qua diuersi coloris specie, quædam cœlestis arcus imago representari videtur. Radices subiacent geniculatæ, solidæ, odoratæ: quæ frustatim dissectæ, in umbra siccantur, & traictæ lino reconduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica: & inter has laudatissima, quæ pumila ferè, & densa constat radice, frangenti contumax, subrufo colore, gustu amaro, odore perquam grato, & sincero, ita ut nullum prorsus situm redolet: quæ dum tunditur, sternutamenta mouet. Secundum locum habet Africana, candicans, gustuque amara. Teredines in vetustate sentiunt, tunc tamen odoratiores reddi solent. Vis omnibus exsiccatoria, extenuans, contra tussim efficax: humorum, qui ægrè reiciuntur, crassitiem digerunt: bilem, crassamque pituitam ex hydromelite drachmis septem epotæ purgant: somnum conciliant, lacrymas ciunt, torminibus me-

dentur. Eadem potæ ex aceto auxiliatur serpentium ictibus, lienosis, conuulsis, perfrictionibus, horroribus, & quibus genitura effluit: menses ex vino potæ pellunt. Decoctum earum, scæminarum fortibus vtiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandæque in eis venarum spiracula: ischiadicis infunditur: fistulas, ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditæ, partus extrahunt: quinetiam coctæ & illitæ, strumas, veteresque duritias emolliunt. Siccæ quoque vlcera replent, & cum melle purgant: nudata ossa corpore operiunt: doloribus capitis cum aceto, & rosaceo magna vtilitate illinuntur. Admotæ cum albo veratro, & duabus mellis partibus, lentigines, & vitia cutis in facie à sole contracta emaculat. Pessis, malagmatis, & acopis inseruntur. In vniuersum magni ad omnia vsus.

**IRIS** in vniuersum satua est, & sylvestris. *Iridis* ge-  
Hæc duorum est generum: altera satia, & nera, cuius  
vulgaris similis, folijs tamen, flore, caule, radi-  
ceq; paulò minoribus. ALTERA folijs gla-  
dioli longioribus: radice tenui, lignosa, geni-  
culata, subrufo, inodoratæ: caule breui: flore  
cæteris longè minori, odore Armeniaci mali.  
Constat huc folijs nouem purpureis, quorum  
extima, superiore tantum parte, aureis pingun-  
tur lineis. Sunt qui hanc legitimam Illyricam  
putent, Illyricam ab Italica differre existiman-  
tes. In quorum sententiam est iam pridem de-  
uenerim, tamen longè aliter rem se habere

## IRIS SYLV. ALTERA.



postmodum comperi. Quandoquidem præferri Illyricam nouerim, nõ quòd genere, vel specie a nostrate differat, sed quòd cæli, soli, illius conuenientia, præstantioribus polleat facultatibus: vt absinthium, quod in Ponto nascitur: acorum, quod in Colchide, & Galatia: cyperus, qui in Syria, & Cycladibus insulis: costus, qui in Arabia: crocus, qui in Cyroco monte: myrrha, quæ apud Troglodytas, & Minæos legitur: & alia quàm plurima præferuntur à locis, quorum dote selectissima, præstantissimaq; proueniunt. Id enim aperte testatur grauissimus auctor Galenus lib. primo de antidotis, his verbis. Omnes itaque herbarii vnanimes scripserunt Irim in Illyrio natam optimam esse: petroselinum verò, quod in Macedonia prouenit: bitumen è Iudæa aduectum, item & opobalsamum. Idem & in reliquis fecerunt, quorum dotes à regionibus acceptas, cum priuatim de vnoquoque loquimur, ne omitemus. Hæc Galenus. Docuit id etiam ante Galenum Theophrastus lib. 1. x. cap. v. 11. de historia plantarum, sic inquires. In Europa nihil præter Irim inuenieris, quæ optima apud Illyrios exit, non tamen parte maritima, sed mediterranea, magisq; ad septentrionem sita. Verum loci à locis differunt, ita vt producere meliorem possint. Quibus palam est, Illyricam Irim non genere, & facie, sed viribus tantum à nostrate distinguigi. Satina (vt arbitror) ex agresti originem duxit, quemadmodum plantarum aliarum pleræque, cultu tamen vegetior grandiorque efficit. Scribitur iam & altera, quam floræ & foliis minore esse diximus, quæ etiam in hortis frequens est, tum ipsius floribus ameneatur, tum odoribus præstantia, tum etiam quòd nouis floribus delectentur homines. adeò vt iam tot satiat, quot syluestris habeantur genera. Sunt tamen, qui putent nullam Irim domesticam reperiri, quòd scripserit Theophrastus loco antè citato, nullum Iridi cultum accommodari. Sed ii, meo quidem iudicio, decipiuntur. quandoquidem Theophrastus eo in loco nõ de omni in vniuersum Iride differit, sed de Illyrica tantum: quæ cum loci ac cæli elementia in Illyrio tractu optima sponte proueniat, non est necesse, vt colatur. Præterea cum hodie Iris domesticæ passim in Italia hortis læta, vires, pulchræque spectetur: syluestris autem in

plurimis montibus sponte nascatur, floribus & foliis satiat longe minoribus, radice tenuiore, breuiore, & aridiore, nulli quidem absurdum videri debet, si nos vtranque depingi curauimus. Quintem compertum habeo, veteres quoque Iridis syluestris mentionem fecisse, non solum Marcelli medici auctoritate cap. x. 1. 1. 1. qui præterea Irim domesticam cultamque illis fuisse offendit, sed Galeni quidem testimonio. is enim Iridis syluestris meminit. libro x. de comp. medic. secundum locos, dum nephriticas compositiones ab Asclepiade conscriptas recenset. Syluestris vtriusque generis plurima oritur in Goritienfi agro Saluatino monte, & Iapidæ collibus inter saxa, odore non ingrato: quanuis etiam ambas viderim in campestribus non longe à Sontii ripis. Est præterea in satuarum genere, quæ flores niui candoris proferat (hanc in pluribus Hetruræ locis vidimus) cuius radix odoris fragrantia, & virium robore Illyricam ferè æquat. Iridis meminit Plinius libro x. 1. cap. v. 11. sic inquires. Iris radice tantum commendatur, vnguentis, & medicinæ nascens. Laudatissima in Illyrico: & ibi quoque non in maritimis, sed in syluestribus Drilonis, & Narona. Proxima in Macedonia: longissima hæc, & candicans, & exilis. Tertium locum habet Africana, amplissima inter omnes, gustuque amarissima. Illyrica quoque duorum generum est: raphanitis à similitudine, quæ & melior: rhizotomos subrusa. Et cap. x. eiusdem libri: Iris rufa (inquit) melior est, quàm candida. Quibus in locis sibi manifestè repugnare videtur Plinius: quòd superius raphanitem, quæ candida, rhizotomo, quæ rufescit, anteposuerit, hic verò contrà. Dioscoridi præstat, quæ subrufo constat colore, qualis Plinio rhizotomos. Ceterum (si Theophrasto, & Plinio credamus) non omnis Illyrica præstat, sed quæ tantum in syluestribus nascitur. siquidem quæ in maritimis foditur, humore prægnans improbat, quòd subinde flaccescens contrahatur in rugas. Succus hydropticus propinandus, quoniam recenti Illyrica destituitur, è nostrate elicitur, ducitque abunde aquas. Excalfacit Iris ordine secundo completo, vel tertio inchoante, & pariter siccatur. Atque præter vires, quas illi adscribit Dioscorides, aliis pluribus pollet, quandoquidem compertum est, manfam oris halitum commendare: dentium dolores mulcere, si radices decoctò iidem foueantur. coquit item, abstergit, digerit, resoluit, lenit, reserat, expurgat, & deicit: vulnerariis medicamentis immixta sarcotica est. Radicis expressus succus bilem flauam, pituitam, & aquas cutem subeuntes pellit: hæmorrhoidas fetu elicit. Radix ipsa contrita, & ex aceto bibita, omnibus aduersatur venenis. Succus naribus infusus cerebrum à pituita mirificè purgat: ventriculo tamen nocet, cum per se tantum bibitur. ideoque à peritis medicis exhiberi non solet, nisi admixta

Plinij con  
tradictio.

Iridis Si  
res præter  
traditæ à  
Dioscor.

Opinio re  
probata.

*Iris cognomen  
a-  
stragaliti-  
tu.*

multa, & Indica nardo. Reperio quoddam esse Iridis genus, quæ Astragalitis cognomine dicitur. Id enim offendit Galenus lib. 1. de compositione medicamentorum secundum locos cap. primo ex Sorano transcribens: item Aëtius libro x 111. cap. 111. qui quibusdam in emplastris Irim astragalitidem imponunt. Veruntamen cum antiquorum, vel recentiorum repererim neminem, qui in simplicium medicamentorum libris huiusce Iridis meminerit, quid certi de hac re proferam, si non habeo. Cæterum Cornarius, qui in prædictos Galeni libros commentarios edidit, Irim astragalitem, & astragalum idem esse existimat: hoc argumento ductus, quod Plinius Iridem duplicem esse tradiderit, alteram, quæ raphanitis à similitudine, alteram, quæ rhizotomos dicitur. At cum astragalus radicem raphani modo ferat, inde Iridem astragalitem Astragalum esse conficit. quin & Plinio per Iridem raphanitem, astragalum intelligi censet. Sed mea quidem sententia rectius fortasse rem hanc explicasset, si per eam Iridem, quæ à similitudine raphanitis vocatur, astragalitem ideo designari dixisset, quod ut astragalus, raphani modo radicem gerat: siquidem Plinio Iris raphanitis astragalus non est, sed altera Iridis Illyricæ species.

Quamobrem ita Iridem astragalitiam à Galeno cognominatam esse putaverim, quod radice re ferat astragalum: quemadmodum raphanitis à Plinio dicta est, quod radice raphanum repræsentet. Iridem memoræ proditam fuisse Galeno in libris si implicium medicamentorum si nē nusquam reperit: tamen libro primo de antidotis eius postmodum meminerit his verbis. Andromachus rosas Iridem Illyricam adiungit, quæ verba non frustra, negligentèrque excipienda sunt, veluti nec cum aliis medicinis patriæ nomen apponit, de quibus paulo post differentes, quid quoque in genere optimum sit, demonstrabimus. Polum ergo, & chamædrys Romam afferuntur, natis in Italia paulo meliora. in aliquot siquidem Italiæ locis haud multo deteriora proveniunt illis annis, quibus ver totum humidum non fuerit, sed sicuti sæpe contingit, æstivo tempore simile. Quod si veris constituto ficior obvenierit, multa, quæ in Italia nascuntur, pluribus Creta allatis paria erunt, aut non multo inferiora, veluti chamædrys, chamæpitys, hypericum, gentiana, thlaspi, veratrum nigrum, & id genus alia. At verò, quod ad Irim pertinet, secus se res habet: si enim Iris Lybica, quæ plurima ex Africa Romam affertur. Illyricæ comparatur, tantum ipsi cedet, quantum cadauer viuo corpori: non tamen aliis in gentibus orta tam multum ab Illyrica degenerare Iris videtur. Irim igitur, velut & reliquis medicinis, odoratiorem eligito: nam vnumquodque optimum est, quod proprium sui generis odore vehementissimum habet, qui quidem ex multo-

rum inspectione manifestus unicuique sit. Ac de gustu quidem perceptis qualitatibus eodem modo censendum est: id enim optimum medicamentum esse constat, in quo id, quod suo generi proprium est, exuperat: pessimum verò quod sui generis aliis & tenuius, & exilius est. Meliora namque sunt omni in specie, quæcunque nec rugosa, nec exilia fuerint: sicut quæ convenientem sibi magnitudinem excessere, peiora sunt iis, quæ bene nutritam, & adstrictam habent substantiam. Quamobrem, ut dixi, multa sæpius inflexisse operæ pretium est, & maxime optima, & quæ longo iam tempore sui experientiam ipsis nascendi initiis præbuere, quæq; vno ore à peritis medicæ, materiæ sunt commendata. Omnes igitur herbarii vnanimes scripserunt Irim in Illyrio natam optimam esse. hæc Galenus. Planta, quæ Græcis ἰρις. Latinis item Iris nominatur: Arabibus, Asineni tui, siue Aierfa: Italis, Iride, Giglio azzurro, aut Giglio celeste: Germanis, Blauu gilgen, Blauu schuuer-tel, Veiel vurtz, Himel schuuer-tel: Hispanis, Lirio cardeno: Gallis, Glaieul, aut Flambe.

*Nomina.*

## A C O R V M.



† Malui hoc in loco Marcelli interpretationem se qui, quemadmodum alibi quandoque facturus sum, quam Ruellii, cui non semper addictus ero: quod in aliquot Græcis codicibus legatur ἰρις, quæ vox in summitate cuiusque caulis significare videtur: quodq; natura in plâta ipsa illud manifeste demonstrat.

## Acorum A C O R V M.

C A P V T I.

Acorum folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum, sed

b 4 obliq



obliquum actas, & summo cespite spar-  
fas, geniculis interceptas, albicantes,  
gustu acres, odore non ingratas. Opti-  
mum est densum, candidum, plenum,  
carie non exesum, odoratum: cuius-  
modi Colchidicum, & Galaticum, quod  
apoplethion dicunt. Radici vis calfacto-  
ria. Decoctum potu vrinam cit: pro-  
dest lateris doloribus, & iocineris, at-  
que thoracis: item torminibus, vulsis,  
ruptis. lienem absimit: vrinæ stillici-  
dio, & serpentum icibus auxiliatur: in-  
sidentibus ad muliebres affectus, iridis  
modo, vtiliter imponitur. oculorum  
caligines succo discutit. Antidotis ra-  
dix magno vsu commiscetur.

## ACORVM FALSVM.

*Acori com-  
sideratio.*



FECIT diutur-  
na rei herbariæ  
ignorantia, vt hæ-  
cenus non in Ita-  
lia solum, sed in  
quocunque ter-  
rarum loco, vbi  
sepsalarii, & me-  
dici habeantur, in  
legitimi Acori lo-  
cum rufa quædã  
radix succederit,  
quæ passim in pa-  
lustribus, & vligi-  
nosis locis inuti-  
lis, & inodora plu-  
rima nascitur. eo  
sanè argumento,

quòd folia, & radices iridis proferat, quanuis  
hæ colore rufæ, illa verò iridis longiora spe-  
ctentur. Hæc itaque radix apud omnes, qui  
plantarum historias neglexerunt, in hoc vsque  
æuum legitimi Acori munere functa est: quæ  
quantum tum qualitatibus, tum facultatibus  
recedat, ex Dioscoride patet, quandoquidem  
palustris hæc nec candicans, nec gustu fit acris,  
nec vilo prorsus commendetur odore. At quan-  
uis hac tempestate à peritis rei herbariæ me-  
dicis non parum improbetur ii, qui non in  
hac tantum stirpe, sed etiam in aliis quàm plu-  
rimis defecerit, cum tamen ipsi potatissimos  
auctores nuskquam legerint, potius excusandi  
sunt, quàm quidam fortasse ætatis nostræ scri-  
ptores, tam Græcæ, quàm Latinæ linguæ pe-  
ritissimi, quibus res sole clariores proposita  
sunt, quique in simplicium medicamentorum  
cognitione cæteris præstantiores haberi vo-  
lunt, & ii longius nihilominus (vt arbitror)

aberrant, quàm cæteri. E quorum numero e-  
Brafuolus Ferrariensis, vir sanè doctrina, &  
fama clarissimus: qui dum innumera simplicia  
medicamenta declarare, explicare, & palam fa-  
cere in suo simplicium examine studium im-  
pendit, etsi id in plurimis assecutus fuerit, in  
hoc tamen, aliisque nonnullis (vt suis locis in  
his nostris commentariis ostendimus) in tan-  
to illustri auctorum lumine mihi magis cæ-  
cutire videtur, quàm qui ante ipsum in tene-  
bris errauerunt. Is enim constanter asserit,  
Acorum à Dioscoride descriptum aliud non  
esse, quàm eam acerrimam, & odoratam radi-  
cem, quàm officinæ Mauritanis secutæ Galan-  
gam vocant. adeò vt maluerit cum Leonicensio  
errare, tantum fuit præceptorio suo additus,  
quàm cum Manardo benè sentire. Sed quan-  
tum eius opinio à veritate, quantumque ab

Acori historia recesserit, per quàm facili pro-  
bati potest. Quippe galangam folia iridis pro-  
ferre apud Syrios nullo nobis testimonio con-  
stat: verum quia cum cypero adeò conuenit,  
vt is sylvestris Galanga nonnullis dicatur, ideo  
non ab re credendum fuerit, galangam potius  
cyperi, quàm iridis folio provenire. Præterea  
quòd galanga radices habeat iridis, nec mihi  
quidem videtur, nec vllum id affirmare existi-  
mo: neque illud etiam videre possum, quòd  
eædem aliqua ex parte subalbescant, vt de Aco-  
ri radicibus scribit Dioscorides: quin potius  
tam intus, quàm extra non obscure rufescent.  
Quòd autem gustu sint acri, atque mordaci,  
qui neget, nullus est. Sed non tamen ob id di-  
cendum erit, galangam esse Acorum, aliis non  
concurrentibus notis: præsertim cum Dio-  
scoridis testimonio Acorum esse debeat acre,  
non autem acerrimum, nec galangæ modo lin-  
guam adurens. Brafuolum secutus est Fuch-  
sius medicus clarissimus. is, cum sibi nimis pu-  
mille viderentur prioris galangæ radices, quàm  
vt Acori radices referret, atque propterea  
Brafuoli sententiam non probandam duce-  
ret, in suis de stirpibus commentariis, alte-  
ram crassiorẽ galangam, quæ iampridem in  
Italiam fertur, Acorum esse contendit. Verum  
si animaduertatur, quod ea non fit iridi  
similis, multòque magis rufescat, quàm quòd  
hæc dictio *ῥαδιόμοιος* designet, quæ albicantes,  
& non rubentes denotat, faciliè palam fiet,  
quòd vnà cum Brafuolo ipse quoque aberrau-  
erit. Sed præter hæc is etiam refragatur Ga-  
lenus libro v. 1. de simpl. med. facult. quòd as-  
serat Acori radicem, gustui non modò acrem  
esse, sed etiam subamaram: quæ tamen modi-  
ca amaritudo neque in hac, neque in illa re-  
peritur galanga: etsi inualidis quibusdam argu-  
mentis suo vltimo examine contendant Brafu-  
uolus, quòd galanga præter acerrimam facul-  
tatem etiam sit amara. sed vereor, ne is tunc bi-  
le perusus suam degustauerit galangam. Com-  
probat præterea aliud esse Acorum, & aliud

*Brafuoli  
error.*

*Fuchij er-  
ror.*

esse

esse galagām Serapionis testimonio: qui, cū  
 fecerit non parum discriminis inter has radices  
 esse, de his seorsum egit per propria capita, vt  
 pote de rebus genere & facultate diuersis. Hoc  
 idem probatur ex Actuarii etiam monumētis.  
 siquidē is in compositione auzet Alexandrinæ  
 & Acorum, & galangam imponit, quemadmo-  
 dum & Nicolaus Myrepticus, tanquam inter se  
 genere diuersa. His itaque tū rationibus, cum  
 auctoritatibus adductis, a Brauiolus, & Fuch-  
 sius diuersus esse cogor. Nec equidē intellex-  
 rim vnquam, quomodo factum sit, quòd ga-  
 langa maior, quā a minore non genere, & fa-  
 cultate, sed tātum specie differt, cū primum  
 huc ē Syria aduecta est, in Acorum se cōmu-  
 tauerit. sed qui hæc intelligunt, diiudicet. Cæ-  
 terū, vt dicam quid hac in re sentio, credi-  
 derim ego vñ cum Manardo Ferrariensi, aliis-  
 que; nonnullis huius ætatis in simplicium me-  
 dicamentorū facultate doctissimis viris, id om-  
 nino legitimum esse Acorū, quod non modò  
 eplasia, sed omnes in vniuersum falsò Cala-  
 num odoratum vocat. Siquidem radices pri-  
 mum iridi perimiles sunt, geniculis distinctæ,  
 reflexe, subalbide, acres, odore prestantes, &  
 (vt inquit Galenus) etiam subamare. insuper  
 & folia, quæ integra ad nos vñ cum radicibus  
 (vt hæc pictura demonstrat) ē Constantinopoli  
 allata sunt, id apertius affirmant: sunt enim ferè  
 me tridis. Ad hæc vt Aenipontici (Germani Iſ-  
 purni dicūt) reculit mihi clarissimus medicus  
 Ioannes Merula, quī pluribus annis degit apud  
 Lituanos, quod passim calamum aromaticum  
 vocant, frequentissimum in Lituanis, & circa  
 Tartarorum fines, nascitur: foliis iridi æmulis:  
 flore etiam simili, colore roseo purpurascente,  
 nulla ex parte vario: caule iridis longiore gra-  
 tioloreq; a quo tamē nulla exoritur calamus:  
 vocaturq; ab incellis suo idiomate Tartarschi  
 zelli, id est, herba Tartarica, quod fortasse à  
 vicinis Tartaris in Lituaniam primum fuerit alla-  
 ta. Ideoq; à Plinio memoriz rectè profutū est  
 lib. x. v. cap. x. i. i. optimum id est Eco-  
 rum, quod ex Ponto aduehitur. Pontus enim  
 his Tartaris ferè iungitur, qui vltra Lituaniam  
 inhabitant, vbi apud probatissimos auctores  
 nusquam legitur, odoratū calamū oriri. Quò-  
 obrem non potui non maxime Brauiolum  
 admirari, quòd sibi tam facile persuaserit, vul-  
 garem calamum legitimum, & odoratum cala-  
 mum esse, à Dioscoride, Theophrasto, Galeno,  
 & Plinio non in radicem, sed in arundinum  
 genere descriptū. nam (vt suo loco de calamo  
 odorato agentes latius explicabimus) his arun-  
 dineæ sūt fistula, non aures radix. Sed de his  
 haustus. Acori meminit Galenus lib. v. i. de  
 simpliciu medicamentorū facul. sic inquit.  
 Acori vtiur radice, quæ gustu acris est, &  
 modice amara, odoreq; non inuincenda. Vnde  
 constat, quòd facultatis calidæ est, & confis-  
 centie tenuis. Huic confectaneum est, vt vni-  
 uiam moueat, & lienes induratos iuuat, tri-

ceratoidis crassitiem detergeat, simiſq; extenuet. Sed ad hoc melior eſt ipſus ſuccus. Ominò verò ſpecificè eſſe clarum eſt. Eſt enī ordinis eſto treti in vtroque, in calfaciendo ſcilicet, & deſecando. Hæc Galenus. Sed quando hic aliquid dicere de Galanga occurrerit, cūm à Dioſcoride, aliſq; antiquioribus Græcis nihil de ea memoriæ proditum ſit, diſſeram ego de hac, quæ à Mauritanis, & aliſum confeſcus. Eſt itaque GALANGA duplex: maior altera, altera minor. Minor tenuis eſt radix, interius & exterius in purpura ruſcens, geniculari, internodiis quibuſdam reflexa, odorata, ſaporē admodum acri, adeò vir manſa piperis, & gingiberis modo linguam, & fauces exurit, odore formaq; cypero ſimilis. quapropter quibuſdam cyperus Babylonicus dicitur. In Italiam nanq; tam ex Mēphi, quàm ex ſiria traſfertur. Optima quæ fuerit grauiſ, denſa, ſaturatè ruſa, odorata, & guſtu acerrima: Non deſunt tamen impoſtores, qui cyperi radices conſortantes, aceto, & pipere macecent, & pro Galanga venditent. verūm fraus facilè deprehenditur: quippe abraſo exteriori cortice, nulla in radicis ſubſtantia acridinis nota, nulluſq; galanga ſapor percipitur. At maior, tameñ longe craſſior ſit radix, ignauior tamen eſt, & viribus infirmior, colore etiam diluſior, minusq; odorata. Galanga calſcit, & ſiccatur ordine tertio. Proinde ventriculi roborat, & cius dolores tollit: ſi tamen à frigore, vel flatu proueniant. Naribus admota frigefactio cerebro vtilis eſt: ore retenta anhelitum commendat. Facit & ad cordis palitationem ſi eſt plantaginis ſucco bibatur: colicæ ſinar, & coli dolores mulcet, qui à flatu oriuntur. Prodeſt flatuoſis veri affectibus: venerem roborat: renes refrigeratos caleſcit. in ſumma frigidis morbis omnibus ſuccurrit. Ceterū omnino explodenda eſt Monachorum in Meſue ſcribentium opinio, qui contra Braſauſū & Fuchſum quaſi velle videntur, Galāgam potius odoratum iuncum eſſe, quàm Acorum, quod tamen planè falſum omnibus iam compertum eſſe non dubitamus. Quod Græce *ἀκόρον*, Latine etiam Acorum appellatur: Arabicè, Vage, ſeu Vgi: Italicè, Acoro: Vulgo medicorum & ſepſariariorum Calamus aromaticus.

MĒŅ. MEON. CAP. III.

MEON, quod Athamanticum  
vocat, in Macedonia, & Hispania  
plurimum gignitur, anetho foliis &  
caule simile, sed eo crassius: binum  
ferme cubitorum altitudine attolli-  
tur: sparsis in obliquum, rectumque  
radicibus longis, tenuibus, odoratis,  
b s ling

Galange  
considera-  
tio.

Monacho-  
rū opinio  
falsa.  
Nomina.

*Account le  
gation.*

*Acori Vi-*  
*rex Ga-*  
*lena.*



linguam exal-  
facientibus.  
Quæ seruefa-  
cta ex aqua,  
vel trita citra  
coctionē, præ-  
cluserum re-  
num, vesicæq;  
farcta vitia po-  
tu leniunt: vri-  
næ difficultati  
medentur: sto-  
machi inflatio-  
nes discutit.

Torminibus, affecta vulva, articuloꝝ :  
doloribus, atque fluxionibus pectoris,  
trita cum melle in eclegmate auxilian-  
tur. Sanguinem per menstrua pellunt,  
defectionibus seruefacta: infantibus au-  
tem illita imo ventri, vrinas mouent,  
Quod si plus quam deceat, ex his biba-  
tur, caput dolore afficiunt.

*Meiomy-  
derat.*

CREDIDIMVS superioribus annis, le-  
gitimum Meon nō oriri in Italia, nec eō aliun-  
de aduehi: primū quod Mei vice vterentur  
sepalarij quibusdam albicantibus radicibus,  
sapore pastinacæ simili: deinde quod etiam Plin-  
ij tempore rarum esset in Italia. quippe qui  
scripserit non feri in Italia Meon, nisi à medicis  
isq; admodū paucis. Quod proculdubio indi-  
care videtur, vsque ad Plinii æuū peregrinū in  
Italia fuisse Meon. Sed cū herbarioꝝ quorundā  
diligētia, quædam nuper reperta sit planta quæ  
folijs constat anethi, caule bicubitali, radicibus  
nigricantibus, longis, & in obliquis, rectumq;  
sparsis, grauitur odoratis, acrisq; quæ legi-  
timum esse Meum, omnes ferē rei herbariæ pe-  
riti vnanimes affirmant, ne videar mordicus te-  
nere opinionem, facere equidem non possum,  
quin in eorum sententiam deueniam: tamen  
in contrarium aliqua sese offerat ratio, quod sci-  
licet huiusce plantæ radices odorem non vsque  
adeo gratum spirent, sed quadantenus grauitur  
oleant, nec tenues cernantur, vt Dioscorides  
inquit. Plinius Meo folia aniso similia reddidit,  
vociū fortasse similitudine deceptus, siquidem  
Dioscorides anethi folijs Meum oriri tradidit.  
Nobilis quod Athamanticum vocant, ita di-  
ctum, quod ab Athamante Aëoli filio inuentū  
sit, vel quod præstantissimum in Athemante.  
Phthoridis proveniat. Meminit Mei Galenus  
lib. v. i. i. simplicium medicamentorum, his  
verbis. Mei radices perutilles sint, calidæ tertio  
ordine, siccæ secundo: proinde vrina, menstruq;  
ciere volentes hoc vrantur pharmaco. Sed si

*Mei Oler-  
æ Galeni*

pluscū sumatur, capiti dolorem mouet, vt  
pote cū pluscū sit calidum, quā siccum.  
quippe quod eius caliditas humiditatem crudi-  
orem etiamnum & flatuosiore ad caput defe-  
rat, atque ita ipsum afficiat lædatq;. Mior ita  
Græcis vocatur, Latinis Meum dicitur: Arabi-  
bus, Mu: Italis, Meo: Germanis, Baer vurtz, seu  
Hertz vurtz: Hispanis, Pinillo.

*Nemina.*

### *Cyperus.* CYPERVS. CAP. IIII.



CYPERVS,  
quem aliqui  
erysilceptrum,  
vt aspalathum  
appellāt, folia  
fert porraceis  
proxima, sed  
longiora, & exi-  
liora: caulem  
odorati iunci,  
cubitalem, aut  
maiores, an-  
gulosum: in cu-  
ius cacumine

minuta folia cum semine exoriuntur:  
radices, quarum in medicina est vsus,  
coherentes inter se, oleis oblongis si-  
miles, aut rotundæ, nigro colore, suauis  
odore, amaro gustu. In lacunosis, pa-  
lustribus, & cultis enascitur. Optima  
est grauissima, densa, fractu contu-  
max, plena, & aspera, odoris cum  
quadam acrimonia iucundi: qualis est  
Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus  
insulis petitur. Huic calida vis inest. Ve-  
narum spiracula laxat: vrinam ciet: ad  
calculos, aquamque subter cutem vti-  
lissimè bibitur: adpersus scorpionum  
ictus remedio est: perfriktionibus vul-  
uæ, & præclusionibus totu prodest: pel-  
lit menses. Contra vlcera oris, etiam si  
depascant, vorentq;, farina eius efficax  
est. Malagmatis calfacientibus, & vn-  
guentorum spissamentis bene adiici so-  
let. Aliud Cyperi genus tradunt in In-  
dia nasci, gingiberis effigie: quod man-  
ducatum croci vim reddit, gustu ama-  
ro sentitur, & illitum præsentem psil-  
thri vim exhibet.

TAMEY

*Cyperige-  
nera. &  
confidera-  
tio.*

TAM ET SI VNUM tantum Cyperi genus memor-  
moriae prodiderit Dioscorides, cuius radices  
inter se coherentes oblongas referunt oleas,  
aut omnino rotundae sunt, visitur tamen Cy-  
perus in pluribus Italicis locis, qui radicibus  
confiat longis, geniculatis summo cespice van-  
gantibus, colore in purpuram nigricante. Na-  
scitur hoc Cyperi genus laudatissimum prope  
Timaui fontes circumstantibus palustribus  
locis in Iapidiz finibus, galangæ vocatæ (vt  
paulo ante diximus) persimile, non tantum fa-  
cie, sed etiam odore. Commendatur etiam  
num odore is, qui in Hetruria provenit, radi-  
cibus ferè filipendulæ æmulis. sed non ob id  
illi fuerit præferendus, quem Syria mittit:  
quandoquidè hic longè odoratior est, & suba-  
marus. Cyperi meminit Plini. lib. x x i. cap.  
x v i i i. vbi de iuncis egit, sic inquit. Quidam  
etiamnum vnum genus faciunt iunci tri-  
anguli, cyperon vocant. Et paulò inferius: Cy-  
perus, ait, iuncus est, vt diximus, angulosus, u-  
xra terrâ candidus, cacumine niger, pinguis-  
folia ima porraceis exiliora, in cacumine mi-  
nuta, inter quæ est semen: radix oliuæ nigræ  
similis, quam, cum oblonga est, cyperida vo-  
cant, inagni in medicina vsus. Reperitur Cy-  
perus quandoque etiam quadranguli caule.  
vade non mirum, si quadratum iuncum eum  
vocaerit Cornelius Celsus libro i i i. cap.  
x x i. At Dioscorides in hac facultate præ-  
clarissimus, vtrunque differentiam colligens,  
nec triangulum, nec quadrangulum Cyperum  
dixit, sed angulosum. Optimus deservit ad  
nos ex Syria, & Alexandria Aegypti, in cuius  
defectu Italicum supponunt officinæ. Non de-  
sunt, qui differentiam ponant inter Cyperum,  
& Cypirum, Plinium secuti, qui libro, & capi-  
te citatis, Cyprum gladiolum esse affirmat,  
Cyperum verò angulosum odoratum iuacum.  
Sunt tamen Dioscoridis interpretes, qui vtro-  
que vocabulo pro eodem indifferenter vnan-  
tur, eo quòd (vt rectè Hermolaus adnotavit)  
penultimum Cyperi quandoque diphthongo  
longam, quandoq; vocali breuem Græci scrib-  
bant. Est apud Plinium & cyprus arbor o-  
cyslime crescens, & pseudocyprus frutex, vt  
libro x v i i. cap. x i i i. ipse scriptum reli-  
quit. Cæterum id Cyperi genus, gingiberis  
effigie, quod India mittit, eam esse radicem  
peritiores medici putant, quam officinæ Mau-  
ritanas fecit Curcumam vocant. Nempe  
præ se ferè hæc notas sinit omnes, quas Indi-  
co Cypero reddidit Dioscorides, quandoquid-  
em gingiberi similis est, eius odorem ferè  
redolet, gustu subamarescit, & mansa croci  
modo inhiat: Quibus illud etiam accedit,  
quòd depilatoriis medicamentis quibusdam  
immiscetur. Veruntamen sciendum est, hanc  
non esse Curcumam à Serapionis interprete  
pro chelidonio descriptam: ipse enim nil aliud  
o curcuma intelligit, quàm Dioscoridis che-  
lidonium. quo fit, vt non desit suspicio erro-

*Curcuma  
cyperi ge-  
neris.*

*Estio &  
rapionis  
depraua-  
re.*

ris vel interpretis, vel scriptoris, cum curcuma  
neque Mauritanum, neque Græcum sit voca-  
bulum: Aphri enim chelidonium Kauroch  
appellant. vnde palam est, Curcuma pro Kau-  
roch in Serapione deprauatè legi. Quo fa-  
ctum est, vt priores tum medici, tum Iapla-  
sarii, qui nunquam hæc perpenderunt, fuerint  
hallucinati. quippe cum eos lateret, cuiusnam  
plantæ radicem Indica Cyperus referret, che-  
lidonii maioris radicem esse crediderunt ob  
croci succi similitudinem. Itaque Serapionis  
deprauatam sectionem secuti, Indicum Cype-  
ram curcumam vocauerunt. Indici cyperi me-  
minit Serapio Dioscoridem secutus, proprio  
capite de Cypero. Ex quo aperte constat, cur-  
cumam Serapionem deprauatè inscriptam, Iapla-  
sarum curcumam, quæ procul dubio Indicus  
est Cyperus, esse nequam. Cyperum re-  
censuit Gal. lib. v i i. simplicium med. vbi sic  
inquit, Cyperi radices maximè vsui sunt, ex-  
calfactientes pariter & exicantes absque mor-  
dacitate. Itaque vlceribus, quæ præ nimia hu-  
miditate cicatricem difficulter adnituunt, mi-  
rifice prosunt: habent enim quiddam etiam  
adstringens: quapropter vlceribus item oris  
conueniunt. Quin & incidendi vim quam-  
piam illis inesse testificandum, qua & calculo  
vexatis congruant, & vrinam, mensès, pro-  
uocant. Planta, quæ Græca voce κύπερος, Latine Cyperus nuncupatur: Arabica, Sahe-  
rade: Germanica, Vuilder galgan: Hispanica,  
Iuncia de olor, & Iuncia auellanda: Gallica,  
Souchet.

*Καρδάμυρ. CARDAMOMVM.*  
CAP V T V.

CARDAMOMVM optimè est, quod  
ex Comagene, Armenia, Bosphoròq;  
deuehitur. in India quoque, & Arabia  
prouenit. Eligi debet plenum, fran-  
genti contumax, oclusum, farsctum-  
que (quod enim huiusmodi non est,  
exoletum iudicatur) & gustu acre, sub-  
amarum, & odore caput tentans. Ex-  
calfactoriam vim habet: potumque ex  
aqua facit ad comitiales, ischiadicos,  
tusiles, neruorum resolutionem: item  
ad rupta, vulsa, tormina: latas ven-  
tris tineas excutit. Ex vino autem po-  
tum, renibus, difficultati vrinæ, à scor-  
pione ictis, neque non omnibus ve-  
nenum vibrantibus, auxilio est. Cum  
cortice radicis lauri epota drachma,  
calculos comminuit: partus sustitu  
enecat: scabiem ex aceto illitum adi-  
mit. Et ad vnguentorum spissamenta  
additur.

*Cyperis Vi-  
reris ex Ga-  
leno.*

*Nomina.*

*Cardamomo* LEGITIMUM Cardamomum nostra tem-  
*poris conside* pestate nec cognosci, nec minus à mercatori-  
*bus.* bus, qui ex Syria, vel Aegypto aromata ad nos  
 conuolunt, deserti compertum habeo. Quo

fit, ut medici, ac pharmacopœi in componen-  
 dis medicamentis aequè errènt in Cardamomo,  
 acque in aliis compluribus, quòd Cardamomi  
 loco variis quibusdam feminibus, odoratis ta-  
 men, indifferenter vntur. Quorum primum  
 Cardamomum maius: secundum Nigellā, quod  
 melanthii est genus: tertium verò Meleghettas,  
 vel grana paradisi nuncupant: cum tamen eo-  
 rum nullum nec Græcum, nec Mauritanum sit  
 Cardamomum. quandoquidem aliud Græci,  
 aliud verò Afri pro Cardamomo intelligunt,  
 ut apertissime testatur Serapio, qui quàm plu-  
 rima simplicia medicamentum ex Dioscoride, &  
 Galeno transcripsit. Is enim (ut sua declarant  
 monumenta) Dioscoridis Cardamomum Cor-  
 dumenum appellat. deinde auctore Isach Ara-  
 bo sui Cardamomi peculiare caput instituit,  
 idque Saccolam sua lingua nominat. quin &  
 dulcè esse generum tradit, alterū maius, alter-  
 um verò minus. quorum nullum non modò  
 Dioscoridis Cardamomo responderet, sed nec  
 etiam vlli eorum, quibus officinæ indifferen-  
 ter vntur. Probatur itaque primum, quòd  
 omne officinarum Cardamomum Dioscoridis  
 Cardamomum esse non possit, pluribus tum  
 notis, tum etiam qualitatibus. quippe quòd  
 hæc in vniuersum parum, vel serè tantillum  
 densa sint, fragranti non contumacia, & gustui  
 nihil amaroris relinquunt. Quòd præterea ab  
 Arabicis dissent, si cum illis comparentur, fa-  
 cile disparitasprehenditur. siquidem Sera-  
 pionius maius Cardamomum semen est plantæ,  
 quod oblongis quibusdam concluditur capitibus,  
 iis sanè similibus, quæ è rosis prodeunt,  
 granis obnigris, rotundis, pipere longè maio-  
 ribus, in quibus minuta semina concluduntur,  
 angulosa, farsita, & odorata: minus verò nullo  
 contegitur capitulo maioris modò, quan-  
 quam colore conueniant. Quod planè indicat,  
 omne officinarum Cardamomum nec Arabum  
 esse, nec pariter Græcorū, sed potius ab vtrif-  
 que maximè differre. Quare putauerim, illud  
 falsò sibi perussisse Monachos, qui in Meslem  
 scripserunt, quòd Arabum Cardamomum minus  
 illud semen sit, quod seplaxia Meleghettas vo-  
 cant. Andreæ Bullunensis, qui Auicennamē-  
 dis expurgauit, auctoritate freti. Sed cum Bel-  
 lunensis id asserat vulgari tantum opinione duc-  
 tus: cumq; notæ minimè eorum sententia ad-  
 stipulenter, errasse Monachi facile deprhen-  
 duntur. Semina enim, quæ Meleghettas appel-  
 lant (ut omnibus planè constat) capitulis ex-  
 cepta subsorbuunt, quod minori Serapionis  
 Cardamomo nò euenit. Crediderunt, Ruellius  
 in suis de natura stirpium libris, & Fuch-  
 sius in sua methodo, id omnino Mauritanorū  
 esse Cardamomum, quod nos PIPER IN-  
 DICVM, alii siliquastrū appellat. verum cum

## PIPER INDICVM.



planta hæc folijs  
 exeat hortensio  
 lano similibus, flo-  
 ribus luteolis, fru-  
 ctu longo corni-  
 culorū instar, qui  
 primo exortu vi-  
 rescat, maturus  
 verò adeò rufes-  
 cat, ac læuore  
 quodam ita pel-  
 luceat, ut coral-  
 lum referat, &  
 in quo concludat-  
 ur pumiliū semē,  
 lentius modo cō-  
 pressum, vsque-  
 adeo acre, vt ori-

tantum admotū maximè linguam, & palatum  
 exurat, exulceretq; ambo hac in re lapsi de-  
 prehendantur. Nā etsi Indicū piper in hisce  
 corniculis rosarum ferè modò suum includat  
 semen, reliqua tamē Serapionis Cardamomo  
 nullis notis correspondēt: hoc enim suis inual-  
 culis globulos quosdam concludit, non lenti-  
 culis similes, sed rotundos, & pipere crassiores,  
 qui intra se minutum quoddam semen conti-  
 nent. Huc etiam accedit, quòd cum hoc piper  
 corniculatum, tum semine, tum corniculis ip-  
 sis tanta sit acrimonia præditum, ut non modò  
 mansum, sed ori tantum admotum statim qua-  
 si ignis exurat, absurdum vtique fuerit credere  
 Serapionis Cardamomum esse, cum dixerit ip-  
 se magis adstrictoria facultate pollere, quàm  
 acri. Cæterum scribit Auicenna maius Carda-  
 momum grana ciceribus atris, minus verò len-  
 tibus minora proferre. Quod cū fortasse Ruellius  
 haud rectè perceperisset, ei errandi ansam  
 præbuit, quippe minori Cardamomo, non au-  
 tem maiori semina lentium modò nasci ait  
 Auicenna: quanquam Ruellius, ut suam tueat  
 sententiam, secus fortè legerit Auicennam.  
 Plinius lib. x. i. cap. x. i. i. quadruplex esse  
 Cardamomi genus scribit, sic inquit. Simile  
 est amomo Cardamomum & nomine, & fructu,  
 semine oblongo. Metitur eodem modo &  
 in Arabia. Quatuor eius genera. viridissimum  
 ac pingue, acutis angulis, contumax fricans,  
 quod maximè laudatur: proximum è raso can-  
 didans: tertium breuius, atque nigrius: peius ta-  
 men varium, & facile tritu, odorisque prauit,  
 quod verius costo vicinius esse debet. Hoc &  
 apud Medos nascitur. hæcenus Plinius. Sed  
 nescio quos auctores sit secutus. quandoqui-  
 dem tam Dioscoridi, quam cæteris Græcis, vñ  
 tantum exret Cardamomi genus. In cuius de-  
 fectū supponit Galenus aut myrtum, aut cy-  
 perū. Qui præterea Cardamomi meminit lib.  
 v. i. simplicium medic. his verbis. Cardamo-

*Cardamo-  
 migena  
 ex Plinio.*

*Monacho-  
 rum error.*

num est sanè facultatis admodum calidæ, nō i mi viret  
 tamen

tanien vsque adeo, vt nasciturum, sed quanto suauius, magisque fragrans est nascitur, tanto & imbecillior ei calida facultas inest: nec enim puerare idoneum est vel ipsum per se illitum. Porro adiunctum habet quiddam etiam amaritudinis, qua lumbicos interficit, & cum aceto valenter ploras detergit. Cardamomum, *καρδάμωμον*, quod non secus Latine atque Grece vocatur: Arabibus Cardamēni: seu Cordumēni: Germanis, Cardamomelin.

NARDVS INDICA. *Νάρδος*.  
NARDVM. CAP. VI.



Duo Nardi genera: vnum Indicum alterum Syria cum appellatur, non quod in Syria proueneriat, sed quod motis, in quo oritur, pars vna ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Sy

riaci genere, præcipuum est recens, & leue, largam gerens comam, flauum colore, perquam odoratum, ac cyperum redolens, breui spica, amaro sapore, linguam siccante, quod diu in sua odoris gratia permaneat. Ex Indico autem Nardo quoddā Gāgitis vocatur, à fluuio Gāge, apud quē enascitur, montē præterfluēte, quod genus ob multā loci, in quo prodit, vlginitē, viribus infirmis est, atque procerius adolescit, plures ferens spicas, ab vnica radice comoas, vnāque cōuolutas, ac grauiter olentes. Montanū autem odoratiū, spica breui ac mutila, odore cypero vicino, cæteras habens Syriaci dotes. Est & genus quoddam, cui Sampharitico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, candidiore interim medio caule, hircorum virus su pra modum redolente: quod improbat. Madefactum vendi solet. quod vitium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica, & squalida, suāque careat

lanugine. Adulteratur stibio cum aqua aut palmeo vino, inspissationis ponderisque causa inspirato. Intueri autem oportet, si lutum radicibus infideat, & in cerniculo puluerem excutere, eluendis manibus vtilem. Vim habent exalfactoriam, & exicantem. Vrinam mouent: alium potu sistunt: vuluæ profluuiā, sanieque opposita supprimunt. Nausea ex qua frigida auxiliantur, & stomachi rofionibus, inflationi, iecinori, regio morbo, renum vitij. Aquæ autem incocta fotu ad infessum, vuluæ inflammationibus medentur. ad glabras oculorum genas valent: siquidem eas ad densiorem pilum reducant. perfusus humore corporibus inspanguntur. Miscentur antidotis, & in fistili nouo non picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum vino in pastillos coacta.

NARDVM officinæ Nardi spicam appellant. Sed non desunt, qui credant Indicam nardum in Italiam non aduehi ob regionis distantiam, Syriacam opinantes esse, quæ nostro uero seplastarii videntur: tamen si (vt inquit Dioscorides) in Syria non oritur, verum ideo Syriacam dici, quod ea montis parte proueniat, quæ flectitur ad Syrios. At cum inter Indos, & Syrios amplissima interponantur regiones, nempe deserta Arabia, Persis, Carmania, Gedrosia, Darangia, aliæque nonnullæ, quæ vltra quatuor millia milliariorum continent, nesciuerim profectò, quoniam pacto fieri possit, vt mons ille ad Gangem positus, altera parte Syriam tã facillè respiciat, vt Nardus ea parte proueniens Syriaci dici mereatur. Qgo fit, vt quodque mecum disquirere liceat, eam potius à Syraſtēne regione, quæ ad Indicum fluiuium est, Syrii nomen sibi adsciuisse, quàm à Syria. quandoquidem, si Ptolemæus vera refert, mos in India vifitur, qui à Gange fluuiio ad Syaste nem extenditur. Absurdum enim esset credere, Nardon ad nos non deferri ex India, cum in Syria nullus proueniat, cumque multa Indie aromata, nulla distantie habita ratione, per carouanas (vt vocant) in Alexandriam Aegypti conferantur: cum quibus nec temerè credendum est, quin Nardū etiam conuehant mercatores, præsertim cum ceret sciam, Nardum Venetias ex Alexandria afferri: nec cã alibi, quàm in India nasci, Dioscoridis testimonio, satis aperte monstretur, etsi Plinius contrà scribat nasci in Syria, Nardum, præter eam quam India mittit Syriacam Dioscoridi appellatam. Ceterum

*Nardi Indica & Syriaca cōfistat.*

*Manardus  
opinio re-  
probata.*

re in Manardus Ferrariensis, officinarum nardum  
nec Indicam, nec Syriacam esse censet. In eu-  
sius sententiam non equidem pedibus eo, et si  
medicæ materiz est clarissimum fuerit indaga-  
tor. quippe quoniam Venetiis pluribus in locis  
Nardi ingentem copiam vidi, levis, comosa,  
perquam odorata, cyperum redolentis, flauæ,  
subamaræ, & mansæ non modo linguam culi-  
cantis, sed odorem etiam non inuicendum per  
os aspergentis, nullisq; deficiētiis notis, qui-  
bus optima nardus ex Dioscoridis sententia ex-  
plorari potest. Sed plerumq; accidit, dum per In-  
dicum, & Arabicum mare in Alexandriam de-  
fertur, & inde Venetias, ut ascito sibi maris hu-  
more (id namq; facile fit, quod Nardus sit sic-  
cissima) vel situm contrahat, vel subputrefcat:  
vnde postea amissa sua uolentia, grauiter oleat.  
Quo fit, ut hac in re Manardus longè hallucina-  
tum crediderim, qui si rectè perpenderit, quæ  
Nardi pars sit spica, atq; in emporiis, ubi num-  
merosa, præstantissimaque visitur, accuratius  
ipsam expendisset, non equidem vereor, quin  
aliter de ea scripsisset. Verum cōtinuero cū pla-  
nè ignorasset, quæ nardi pars spica esset, sele-  
ctamq; & incorruptam Nardū minime nouis-  
set, lib. v. 1. epist. 1. 1. scribit, Galenum de nar-  
di spica, quæ antidotis admiscetur, loquentē,  
radicem quidem, non spicam intelligere. Et uti-  
nam, inquit, quæ nobis affertur, legitima esset:  
sed quod ea ipsa non sit, cognoscitur, quod nul-  
la odoris suauitate commēdetur. Et lib. v. 1. 1.  
epist. 1. inquit, Galenus lib. 1. de antidotis in  
theriacæ compositione Nardi radicem tantū-  
modo admiscet, eo quod uiribus ipsa præstan-  
tior sit: spicam uero parumpendit, & pro nihilo  
habet. Quod sanè declarat, Manardum hanc  
Galeni sententiam perperam accepisse, atque  
etiam Nardi historiam ignorasse. quandoquid-  
em nardi radix nil aliud est, quàm spica, ut  
ipsemet testatur Galenus eodem de antidotis  
libro, sic inquit. Iubet Andromachus adieci-  
re nardum Indicam: ea uero est, quàm spicam  
uocat, non quod spica sit, radix etenim est, sed  
quod spicæ formam referat. Quibus palam est,  
idē esse nardi spicam, & nardi radicem, ut e-  
tiam planè declarat idem Galenus lib. 1. x. de  
compositione medicamentorum secundū locos  
in Philonis antidotum scribens, dum inquit.  
Quin & nardi ipsius drachmam unā coniicien-  
dam censet, quam falsi nominis radicem dixit,  
quandoquidem spica nardi nominatur. Qua-  
propter idē lib. v. 1. 1. simp. medic. de Nardo  
caput facturus, illud inscripsit Nardi spica, ut  
potē quæ pars sit in tota stirpe præstantior, mi-  
nimè quidem ignorans, se radicem nardi de-  
scribere. Nam si sensisset, spicam à radice differ-  
re, eam planè silentio præterisset tanquam in-  
utilem, & capiti nomen indidisset aut genera-  
liter ab ipsa Nardo, aut à radice tantum, ut uir-  
ibus præstantiore. In hoc, ac logè maiori ver-  
satur errore Brasauolus. siquidem suo de sim-  
plicium examine Nardi spicam non modò non

esse radicem censet, sed nullius usus eam exis-  
timat, sic inquit. Venetiis spicam, cau-  
lem, & radicem emes, quanuis & ipsi adules-  
cent. Iubeo autem radicem, & caulē emere,  
quoniam hæc apud antiquos auctores, ut Diosco-  
ridem, & Galenum magis in usu medico sunt,  
quàm spica: quippe folia abiicit Dioscorides,  
ad nos tamen spica nō defertur, sed radix. Hæc  
ille. Sed mehercule quantum ex Dioscoridis  
scriptis percipere potui, nunquā hactenus sum  
consecutus, quod ipse ex omnibus nardi parti-  
bus aliam præferat, quàm spicam. Quod autem  
crediderit ipse spicā in Nardo uiribus magis  
præstare, quàm cæteræ eius partes, quodq; cū  
de Nardo scribit, tantū de spica intelligat, aper-  
tè ostendit, quoniam inquit. Ex nardo Syriaca dicta  
melior est recens, & leuis, largam gerēs comā,  
&c. Quippe leuitas, ac comæ magnitudo, nul-  
lis nardi partibus, præter quàm spicæ compe-  
tunt, præsertimque cū ipsa non uacet cæte-  
ris notis, quas illi tribuit Dioscorides. Ad hæc  
nulli sinè incomptum existimo, Dioscori-  
dem huius libri initio in probandis tantum  
radicibus, quæ odore commendantur, operam  
impendere, nempe iridis, acori, mei, nardi,  
phu, asari, & huiusmodi stirpium generum,  
non autem in essendis caulibus, floribus, foliis,  
ac spicis, quæ caulium summmitatibus ian-  
scentur. Quo fit, ut etiam fateri liceat, Bra-  
sauolum ignorasse spicam ipsam esse nardi  
radicem: quin potius pro certo credidisse in plan-  
te ipsius nardi cacumine, non in radice oriri  
spicam, quæ tamen Galeno teste radix est, & eg-  
teris nardi partibus præstantior. quandoquid-  
em si aliter res se haberet, commodò longè  
plura radicib; ex more redderet Dioscorides,  
quàm spica. Quod præterea Galenus plus lau-  
dauit Nardi caules, quàm spicam (ut asserit  
Brasauolus) nusquam compertum habeo. Cæ-  
terū quanta sententia inconstantia Nardi  
historiam idem descripserit, ex suo posteriori  
simplicium examine, in quo vltimam manum  
imposuisse fateor, facillè conicitur, dum se-  
nem secum colloquentem instruit, his uerbis.  
Ne igitur in his montibus nardum quæras, sed  
Venetiis spicam, caulē, & radicem emes. At  
sui ipsius statim oblitus uidetur non multis  
post lineis, cum inquit. Aliud uero sunt spi-  
ca, & flos, quæ ad nos non afferuntur. Ex quo  
facillè crediderim, ipsum non modò Nardi hi-  
storiam confudisse, atque etiam, quod peius  
est, corrupisse, sed etiam sibi ipsi, vel potius  
seni uerba dedisse, primum namque ait Vene-  
tiis spicam, caulē, & radicem reperiri: mox  
spicam ad nos aduehi negat. Sed ante hos  
hac in re Plinium quoque grauiter hallucina-  
tum inuenio: quippe qui libro & capite x. 1. 1.  
in Nardi ipsius historia longè distat à Dio-  
scoride & Galeno, quin & à cæteris materiz  
medicæ auctoribus, dum ita scribit. Nardum  
frutex est graui, & crassa radice, sed breui, ac  
nigra, fragilique, quanuis pingui, stemm  
recto

*Brasauo-  
li error.*

*Pliny bo-  
nus.*

redolente, cyperti odore, aspero sapore: folio paruo, densoque. Cacumina in Aristas se spargunt: ideo gemina dote Nardi spicas, ac folia celebrant. hæc Plinius. Cuius doctrinam secuti, non modò Ferrarienses illi, sed Hermolaus, & Ruellius, ipsi quoque pariter aberrarunt. liquidem Ruellius (vt puto) nulla alia de causa asserit, se in officinis Nardum vidisse, cui inerant dotes omnes illi à Plinio redditæ, quàm vt Plinianam tueretur lectionem. Quod tamem falsum esse arbitramur. Ego enim tametsi Nardi quàm plurimum in Venetis officinis diligenter examinauerim, ac selegierim, aliud tamen, quàm spicam videre mihi non licuit. Quapropter nullum inueneri Nardum existimo, quod in caulium cacumine spicas proferat, quemadmodum tradidit Plinius, asserit Ruellius, & contemdit Brasauolus, contra Galeni, & Dioscoridis sententiam. Qui Nardum describit plures ferre spicas, non quidem à caulibus, sed ab vna tantum radice provenientes: non tamen quòd alia radix viribus præstans spicis ipsis subbit, sed quoniam, cum plures in radice sint spicæ, necesse est, vt basi, vel firmamento aliquo consistant, à quo originem trahant, vt in alio & lilii radicibus conspiciunt. Quod pro explorato cõfiteri possum, cum septennumero Venetis Nardi spicæ cespites viderim, tum figura, tum etiam spicarum connexu alium referentes, vt vnusquisque pro arbitrio experiri poterit. Verum enimvero vt probè responsum sit omnibus ferè objectionibus, dicimus, quòd si forstè reperirentur, qui assererent, illas esse proprias Nardi radices, quæ capillacæ fibris à spicarum basi oriuntur, vt in alio, capis, ac bulbaceis omnibus visitur, & ea propter spicas iis adnexas non esse Nardi radices, sed per se partes ab his admodum differentes, potest eorum abiectio facile dilui Theophrasti testimonio. Siquidem in lib. primo. cap. x. de plantarum historia apertè declarat in alio, capis, bulbis, lilis, ac aliis eius generis, & per consequens in spica non solum dici radices ea capillamenta, quæ bulbaceis illarum plantarum capitibus subiunguntur, sed etiam id bulbaceum totum, quod terra reconditur. Et vt res ipsa clarior omaibus sit, generali regula expressum voluit, quòd totum id in quavis planta, quod sub terra obruitur, radix, commodissimè dicatur. Proinde videtur Nardum ipsam inter radices idem memorasse Theophrastus libr. i. x. cap. v. i. de plantarum historia, his verbis. Quibus ad vnguentum vruntur, hæc ferè sunt, casia, cinnamomum, cardamomum, nardus, nærum, balsamum, aspalathus, styrax, iris, narta, cõstus, panaces, crocum, myrrha, cyperus, iuncus, calamus, sampsichum, lotus, anethum. Horum alia radices, alia cortices, alia rami, alia ligna, alia semina, alia lacryma, alia flores. Quibus palàm est, non posse Nardum nisi inter radices recenseri, cum nec corticis, nec ligni, nec rami,

nec floris, nec seminis, nec tantum lacrymæ speciem præ se ferat. Quod cum rectè scituisset Galenus tum lib. 1. de antidotis, tum i. x. de compositis. medic. secundum locos, Nardi spicam radicem esse declarauit. Verum lógè ab omni Nardo distat NARDVS ITALICA, quæ nostris vulgò vocatur Spigo. NARDVS ITALICA.



LAVENDULA.



Cuius etiam ge Nardi tra neris ea est plan- lica gene- ta, quam aliqui ra, & vi- vulgò appellant- res. Lauanda, alii vero Lauendula, adeò vt hæc foemina, illa vero mas in eo genere à quàm plurimis vocentur. Mas folio constat latiore, longiore, crassiore, robustiore albidiorèque, quam foemina. Sed vtræ-

que planta fruticosa, & rosinari modo, innumeris repleta est foliis: quorum medio iuncea exeat cauliculi, quadranguli tenues, dodrantalem longitudinem excedentes: in quorum cacumine flores exeunt spicati, colore purpureo, quauis in femina dilutiores, patientioresq; odore fragrantès, verum vsquæ acuto, vt nares feriat. Excalfaciunt, & exicant ambo ordine secundo completo, vel tertio inchoante, viribus à Nardis omnib; non longè recedentibus. Conferunt omnibus cerebri ægreditinibus à frigido proueniètib; conuulsis, resolutisq; auxiliantur: ventericuli roborant, & iecur ab infarctu liberant: quin & obstruos hienes iuuant: veterum calfaciunt, & mentes, & secundas educunt. Fit è floribus stillatium oleum vitreis organis, quod propriè vnguen-

Ruell. & Hermolaus error.

Dilutis cu iustia obse alienu.



*Nardi In  
dica Viris  
ex Gal.*

guentarii vulgò vocant olio di Spigo, odoris adeo acerrimi, vt exæra odoramenta superet. quo fit, vt extra officinas illud asseruēt, ne moſchi, ambari, zibetti, aliorumq; vnguentorū, & aromatum ſuauiſſimam interceptat. Nardi Indicæ vires ſcripſit Galenus lib. v. 111. de ſimplicium medicamentorū facultate, ſic inquit. Nardi ſpica exaltatè exceſſu primo, & deſiccatur ſecundo iam completo. Compoſita eſt ex adſtringente ſufficienter ſubſtantia, & acri calida non multa, & quadam leuiter amara. Ex his conſtans facultatibus radix & ad ſecur, & ad ſtomachum rationabiliter conuenit tum pota, tum extrinſecus impoſita. Vrinam ciet, morſus ſtomachi ſanati in ventre, ac in teſtibus conſiſtentes fluxiones deſiccatur, ad hæc & eas, quæ in capite, & thorace. Valentiſſor eſt vocata Indica, n griorq; quàm Syriaca vocata *Nardos*, & *Nardus* quæ ſic Græcis dicitur, vt Latinis Nardū, & Nardus, ſeu nardi ſpica: Mauritanis, Stumbel, aut Senbel: Germanis, Edelſtrembd, Vuolricheent, Spicken nardi: Hiſpanis, Azumbar, aut Eſpiga ſili: Gallis. Aſpic d'otre mer.

*Nomina.*

*Nardos* *Kardos*. NARDVM CELTICVM. .CAP. VII.



**CELTICVM**  
Nardum naſci-  
tur in Liguria  
alpiſus, aliun-  
gia patrio no-  
mine appella-  
tum, prone-  
nitque in Iſtria  
Exiguè fruti-  
cat, & cum ra-  
dicibus in ma-  
nuales faſcicu-  
los componi-  
tur. Folia ha-

bet oblonga, colore in ſiauum languido: ſtorem luteum. Caulium, & radicem duntaxat vſus eſt, & odoris ſuaui-  
tas. vnde epriede faſciculos aqua ablue-  
re expedit, & exempta terra, pauſo ſolo atque humenti, ſubieſta charta reponere: poſtſtidie repurgare. ſiquidem vtile, cum acroſo alienoq; propter humoris vim, non excutitur. Adulteratur impoſita herba ſimili, quæ hirculus vocatur, ab odoris grauitate. Sed facilis cognitio: nanque herba candidior eſt, ſine caule, minus

oblongis foliis, radice neque amara, neque odorata, vt verum Nardum eſt. Itaque radices, atque cauliculi, abieſtis folijs, triti ſecernuntur, vino excipiuntur, digerunturque in paſtillos, & ita ſcili nouo diligenter operato, aſſeruari debent. Laudatur maximè, recens, iucundi odoris, radice numeroſa cohærens, plenum, nec fragile. Ad eadem, quæ Syriacum, pollet: ſed vehementius urinam cit. & ſtomacho vtilius eſt. Inflammationibus iecinoris, & ſelle ſuſſis auxiliatur. Contra ſtomachicæ inflammationes, cum abſinthij decocto bibitur: item aduerſus lienem, renum & veſicæ vitia, & venenatos icſus, ex vino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia vnguenta.

TANTA fuit veterum, qui nos præceſſerunt, negligentia, ne dicam ignorantia, vt non modo in veram ſimplicium medicamentorum cognitionem, quæ peregrina ex longinquis terrarum partibus aduehuntur, probatiſſimorum auctiorum ope, venire non elaborauerint, ſed ne minimam quidem curam adhibuerint, communi reipublicæ beneficio, vt de his ſcitem, quæ in quàm plurimis Italiæ locis, ac alijs non longè diſtantibus inueniuntur, quicquid lucis aſſequerentur, ac poſteris relinquerent. quin potius in ſuis multo videntur negligentiores, quàm in alienis. Naſcitur Celtica nardus in Liguria alpiſus, naſcitur & in Iſtria, pariterq; in montibus non longè à Villaco Carinthiæ oppido, & Iudemburgio Stirie: attamen non ob id legitima in multis viſitæ officiis: nec fortaſſe in iſis videretur, niſi his noſtris lucubrationibus annis ſuperioribus Italico ſermone editis, pharmacopolæ plures diligentiores rediti, medicam materiam accuratius expendere coepiſſent. Sed id magis deſtandum videtur, quod iſis in regionibus, vbi Celtica nardus naſcitur, magis hallucinentur homines, quàm alibi. ſiquidem Genus, quæ Læuræ eſt ciuitas (nūc iam admoniti reſiſtant) aliſque ſinitimis locis, vbi Celtica nardus facile haberi poteſt, tam niedi, quàm ſeplaſarii aliorum ignorantiam ſecuti, illius loco, Lauanda ſic vocata, vel noſtrate Nardo paſſim vtiuntur. Quæ quantum in hiſtoria omnibus notis, non diſam viribus, à Celtica nardo diſcrepent, quicunque primum rem optime perpendit, ac deinde notas, & qualitates illi à Dioſcoride redditæ, cum Lauandæ, noſtratiſque Nardi notis comparauerit, manifeſtum eorum lapſum facile incuſare poterit. quippe Celtica nar-

*Nardi Cel-  
tica corſi-  
derati.*

dus in breuem, exiguamq; plantam confurgit:  
 Lauandaverò, & focia nardus magno exoritur  
 cespite, ramufculis proceris, denfiffimisq;  
 comantibus foliis. Illa folia fert fubrubea, &  
 flores flauo colore: hæc autem foliis confurgunt  
 incanis, floribus fpicatis, & colore purpura-  
 ſcentibus. Illius caule, & radicibus vtitur,  
 quod hifce partibus maximè polleat: harum verò  
 tantum flores commendantur. Quod fatiſ cla-  
 re demonſtrat, quoniam ficile decipitur, qui tam  
 leuibus & falſis feruntur opinionibus. Verùm  
 quanquam (vt in ſuperioribus Nardi mentione  
 diximus) communi omnium ſententia com-  
 pertum fit, Lauandæ, ſpicæq; noſtratis ſacul-  
 tas ad omnia Nardi genera propius accedere,  
 hoc tamen eos ab errore non vindicat, qui Lau-  
 andam Celticam nardum eſſe contendunt.  
 Præterea non defunt pharmacopolæ rei herba-  
 riæ penitus ignari, qui pro Celticâ mardo  
 plantam quandam incognitam emant arbores  
 ſcandentem, caule longo reflexoq; cuius folia,  
 quæ colore ſubflauo cõſtant, adeò denſa ac mi-  
 nuta ſunt, vt potius muſcoſum arboris, & lapi-  
 dum materiam, quàm aliud repreſentent. At  
 quòd in veſtiendis caulibus ipſius ramuſculis, eos  
 tam denſe circundat, vt ſerè ſpicæ effigie præ-  
 fe ferant, pro Celticâ nardo ab impoſitoribus  
 venditur: ſed hæc haud amareſcit, nec vlla  
 odoris præſtantia commendatur. Cæterum in-  
 gens legitimæ nardi Celticæ proventus habetur  
 in ſtiria Auſtritz, & Carinthia contermina,  
 vbi Iudemburgienſia rura ſuis è montibus  
 quottannis innumeros compoſant faſticulos,  
 quibus magnos admodum replent ſecos, & mer-  
 catoribus vendunt, qui in ſyriam, & Aegyptum  
 mercimonia conuehant. Siquidem (vt ferunt)  
 ſyriis, & Aegyptiis Celtica nardus maximè  
 expetit, vt balneis eâ imponant, quibus fre-  
 quenter vtuntur. Celticam nardum ad me pri-  
 mum miſit Petrus Salicetus clariffimus medi-  
 cus ex Grazio ſtiriz oppido: in cuius plantis  
 & ſpicæ in radicibus, & folia, & flores in caule  
 (vt ap̃p̃icta figura demonſtrat) nullo impedi-  
 mento cernebantur, adeò vt à Dioſcoridis hi-  
 ſtoria nulla ex parte recederent: nec vlla ta-  
 men ſpica in eius cacumine videbatur, vt Ru-  
 ellius & Braſauolus in India naſci ſcripſerūt.  
 Quamobrem nobis quoque iam liceat literis  
 memoriæq; mandare, Celticam nardum non  
 modò in Liguria, & Iſtria prouenire, ſed etiam  
 in ſtiria, Carinthia, ac etiam aliis fortaſſe lo-  
 cis, quippe ſuperiore anno ego huius nardi  
 nonnullas inueni plantas in quodam Vipaci  
 monte, qui tantum viginti miſſa paſſuum à  
 Gorizia diſtat. Verùm ſi eo deſtituantur me-  
 dici, commodè Indicam ſupponere poterunt.  
 An verò Celtica nardus ſit Saliunca, aut non,  
 de qua Virgilius, & Plinius ſcripſere, eſſi hæc  
 inter ſe nullam habere cognationem pluribus  
 comprobare poſſem, cum tamen ea parum,  
 vel nihil rei medicæ conferant, ſilencio inuol-  
 uenda duximus: quanquā eruditiffimus Leo-

nenus non animaduertens Dioſcoridē Ali-  
 ungiam, non Saliuncam Celticam nardum ap-  
 pellafſe, Plinium accuſat, qua in re ipſe potius  
 deceptus fuiſſe videtur: quemadmodum & Fuch-  
 ſius, vir alioqui noſtræ ætatis clariffimus. Is  
 quidem in ſuo libro de componendis medica-  
 mentis, quem vltimo loco auctum edidit. vbi  
 Diathamaron expendit, Celticam nardum à  
 Saliunca nihil diſſerre exiſtimat. Plinius tamē  
 locis ſeparatis de vtraq; tanquam herbis inter  
 ſe differentibus tractauit. Neque ex notis tan-  
 tum diſſident apud antiquos auctores, ſed etiam  
 natali ſolo. Dioſcoridi enim Celtica nardus in  
 Liguria alpibus, acque in Iſtria prouenit. Plinio  
 verò Saliunca in Pannonia, & Noricis na-  
 ſcitur. Itaq; Fuchſius vt Ruellii ſententiam ſe-  
 cutus, qui Celticam nardum Dioſcoridi Saliuncam  
 appellari affirmat, ita mihi & à veritate  
 deſeſſiſſe, & vni cum illo erraſſe creditur. quò-  
 doquidem Celtica nardus Dioſcoridi *καρυύνη*,  
 non *καρυύνη* vocatur. Meminit Celticæ nar-  
 di Galenus lib. v. r. r. de ſimp. med. ſacule. his  
 verbis. Nardus Celtica iam dictis nardis ſimi-  
 lis quadatenus in genere ſaculatis eſt. Cæte-  
 rum ad omnia imbecillior, præter quā ad pro-  
 uocandam vrinam. ſiquidem calidior illis eſt,  
 ſed minus adſtringit. Quæ planta Græcis *καρυύνη*  
 & *καρυύνη*, Latinis item Nardus Celtica: ſeu  
 Nardum Celticum appellatur: Italis verò Nar-  
 do Celtico: Gallis autem. Nardus Gaulois,  
 & Celticæ.

*Leonice-  
mies in b  
ſis opinio.*

*Nardi Cel-  
tica vires  
ex Galeno.*

*Nomina.*

#### Νάρδος ἰσπικ, NARDVM MONTANVM. CAPVT. VIII.

MONTANVM Nardum, quod ab  
 aliquibus thylacitis, & niris appella-  
 tur, in Cilicia, & Syria naſcitur: caule  
 & foliis eryngio ſimilibus, minoribus,  
 minimè tamen ſpinofis, aſperiffique.  
 Radicibus binis nritur, aut pluribus,  
 nigris, odoratis, ceu haſtula regiz, ſed  
 longè gracilioribus, & longè mino-  
 ribus. Neque caulem, neque fructum  
 neque ſorem proferat. Ad eadem, ad  
 quæ Celticum efficax.

VIDEYVR in hoc capite Dioſcorides  
 non parum à ſe ipſo diſſentire, quòd ſcripſerit  
 primùm montanam Nardum caule, & foliis eſ-  
 ſe eryngio ſimilibus: mox prope capitis calcem  
 eam ſcribat neq; caulem, neq; fructum, neque  
 ſorem proferre. Quæpropter exiſtimant tum  
 Ruellius, tum etiam Marcellus id facile accidiſſe  
 ſcriptorum incuria, qui vocū vicinatie decepti  
 nardus pro *καρυύνη*, vel *καρυύνη* ſcripſerunt. Verū  
 cū hæc dictiones ramos, vel ſurculos deſi-  
 gnent, quæ nomina potius arboribus conue-  
 niunt, quàm herbis, ſintq; idem rami in arbo-  
 ribus, quod caules in herbis, idcirco non vi-  
 detur

*Nardi mō-  
tana con-  
ſideratio.*

*Septaſſa-  
ſia quor-  
runda cr-  
ror.*

detur hic locus, ut illi fortasse putant, à mendis vindictus. Cæterum non crediderim ego, Diofcoridem, qui est hac in facultate facile princeps, & quem antiqua, & secuta ætas tantopere commendat, in tam paucis sui oblitum, adeoque turpiter lapsum fuisse. quinimo nobis relinquitur suspicio, quòd omnino in alteri capitis parte vitium aliquod accesserit, non huius vocum vicinitate, sed potius scriptorum dormitantium negligentia, vel vigilantium temeritate. Quo factum est, ut hæcenus incertus dubiusq; fuerim, an hæc planta in Italia proveniat, vel aliunde adefferatur. Quidam tamen ex his, qui rei herbarie dant operam, adhuc nos hoc anno stipem misit, cui binæ inhaerentes radices aphodeli figura, sed longè minores, plu, vel nardum redolentes: adeò ut hæc parte montanum Nardum pulchrè præ se ferre viderentur. Sed quoniam folia, & caulis plu potius referebant, quàm eryngiū, quem admodum & vmbella, cur eam montanæ Nardum fuisse comprem, sanè non habeo cum plane sciri non possit, an in priori, an in posteriori, an in alia huius capitis parte lateant mendæ. Itaque si fortè aliquid ad manus esset medicamentum, quod Montanum nardū exciperet, supponant auctores pharmacopoeie Indicam, vel Celticam. Tamen si suo de simplicium examine affuerit Brasavolus Ferrariensis Indicæ nardi vice montanæ plurimū ad nos afferret Ciliæ, eamq; propriè montanam affirmat, cuius passim in officinis est vñs. Sed qua ratione ductus novam hæc protulerit opinionem, ipse certè nescio: Nardus enim montana radices habet aphodelo similes, non vique spicatas, leues, comosas, quemadmodum ea, qua vitmur ex India adnecta. Nisi fortasse Brasavolus voluerit Indicam nardum ideo montanum appellare, quòd in montibus oritur. Ita quidem eius senten-

*Erast. opi-*  
*nio non a-*  
*ccidit.*

Nardi  
mont. Vi  
relex Gz

*Normina.*

Nardus ὀσπρὴ Græcis, Nardus montana. siue  
Nardum montanum Latinis, Nardo montano  
Italis nominatur.

† In Ortiſſo, qui ſimplicium deſcriptiones Dioſcoridi acceptas refert, legitur *λάνεισος*, hoc eſt, candidiores, quòd Nardus montana conſiſt radicalibus aſphodelo non ſolùm minoribus, & gracilioribus, ſed etiã candidioribus.

† Nulla quidem dissimulanda est ratio, qua probatissimi quique scriptores veteres à mendis, quæ eorum scripta temporum iniuria, & multorum imperitia contraxerunt, vindicari possint. In hoc capite Dioscoridem deprauatum esse, ita vt etiam à seipso dissideat, manifestum est: in qua autem parte vitium lateat, quodq; illud sit, dubie seruantur opiniones.

Verum et si nos quoque eius rei incertos esse antea scripsimus, nunc tamen inclinamus animus, ut in hoc loco mendum subesse, illudque ex malo vius vocis Græcæ intellectu ortum esse arbitremur. Siquidem verbum *grisa*, non profert, sed pro *συρία*, id est confert, accipiendum fuit. Itaque non *στῆς καυλῆς*, *στῆς καυλῆς*, *στῆς αὐτῆς grisa*, ut vulgari codices habent, & legitur interpretes, sed *στῆς καυλῆς*, *στῆς καυλῆς*, *στῆς αὐτῆς grisa*, hoc est, Neque caulis, neque fructus, neque flos confert, proficit, legendum esse iudicamus. Etenim radices, vtpote odoratæ, vilius præcipue commendatur, non aliarum partium, quæ ut odore carent, ita etiam inutiles habendæ sunt. Et certe facilius potuit esse error librarii Græci imperiti, vel potius temerarii, casus nominum mutantis ad ineptam ac incongruam huius loci verbi illius significationem. Subscribunt huic nostræ castigationi cum aliis rei herbariæ studiosi, tum Gabriel Falloppius Mucicenis vir & ingenio & doctrina celebris, tum etiam Ioannes Odoricus Melchioris Tridentinus, medicus non vulgaris eruditiois.

ASARVM. CAP. IX.



ASARVM,  
quod& ipsū  
aliqui sylue-  
stre nardū ap-  
pellant, hede-  
ræ foliis, mi-  
noribus mul-  
tò, rotundio-  
ribusque : flo-  
ribus cytho-  
hyoscyami si-  
milibus, pur-  
pureis, inter  
folia proximè

NVL

*Asari con-* NULLAM nostris temporibus officina ponunt differentiam inter Asarum, & baccharē: quinimo vno ore ferē omnes Asarum Baccharum appellant, adeo vt & nomina hæc corruptant, & res ipsas confundant. At quantum notis, & viribus inter se differant, his rectē indicet, qui harum stirpium historias accuratius perpendit: differunt enim inter se admodum Asarum, & baccharis, vt diffusus libro tertio differemus. Asarum itaque procul dubio illa fuerit planta, quæ vulgò Bacchara falsò appellatur, cum nullis ab historia diffideat notis. Cæterum Brasauolus immeritò in Plinium spiculum conforis, cum dicat ipsum eo etiam in errore versari, vt Asarum baccharē esse existimauerit. Sed profectò nesciuerim ego, qua ratione illud Brasauolus in Plinium scripserit. quipē qui lib. x x i. cap. v. eos accerrimè arguat, qui baccharē, & syluestrem nardum idem esse contendunt, his verbis. Sed eorum quoque error corrigendus est, qui bacchar rusticum nardum appellauerunt: est enim alia herba sic cognominata, quā Græci Asaron vocant, cuius speciem, figuramq; diximus in nardi generibus hæc Plinius. Quibus palam est, Plinium seipsum à Brasauolo defendisse. Porro si etiam Flitini ætate non deerant, qui Asarum baccharē vocitarent, non mirum fuerit, si in hunc vsque diem prædicta hæc sit appellatio. In qua fortasse perseverantes veterum nonnulli Dioscoridis Asaro eas ferē omnes facultates reddidere præter auctoris mentem, qui ipse libro tertio bacchari adscripsit, quod facilius ad credendum vulgus allexit, Asarum, & baccharē nomine tantum differre. Verum cum recentiorum quorundam diligentia ac doctrina id totum Dioscoridi additum deprehensum sit, eo quod d'ueris tum libris, tum capitibus ipse de his differuerit, cumq; Serapionem viderint de Asaro ex Dioscoride scribentem, adulterinam hanc lectionem non admittere, id totum, quod eò accesserat præter auctoris sententiam, tanquam Elegritimum abdicarunt. Asari vires scripsit Mesues inter deiectoria medicamenta, ubi sic habet. Excalcific Asarum ordine secundo, & siccac tertio. Attenuat, refert, resoluat, & promocat, adstrictione tamen non vacat. Bibitum

*Plinij tutelander  
sua Brasauolus  
maiorum.*

*Asari vires ex Mesue.*

nō modò vomitiones ciēt, sed & p aluū ducit, & per vrinā. Vituitā, & bilē deiecit. Roboratur tamen admisso caprino sēro, aut nardo, aut hydromelie. At manifestius pituitam, quam bilem educit, quo fit, vt coxendici cæterarumq; compaginum do' ore vexaris non obsecrē opuletur: præsertim si sero maceretur, vel decoquatur. Facit mirum in modum ad iocinoris & lienis infarctus, scirrhusosque tumores. Quamobrem subeuntibus cutem aquis, fellisq; suffusionibus datur maximo iuuamento vino maceratum. Confert item diuturnis febribus, iisq; præsertim, quæ ex contumaci infarctū proueniunt. Oleum macerationis ipsius admisso ladanō, dorisi spondyliis inunctum sudorem commo uet: leuiter tamen coqui debet, nam si diu ferueat, vim ferē omnem deperdit. neque etiam diuturna indiget contritione: uetus enim contritum facilius vomitiones, quam alium ciēt.

Asari meminit Galenus lib. v. i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Asari radices viles sunt, faciliatē similes radicibus acori, intensiores tamen. Itaque ex iis, quæ de illis prodita sunt hic faciendā coniectura, Hactenus Galenus. A cuius sententia (sic tamen cum venia dicam) maximè dissentio. siquidem cum nulla in acoro deiectoria sit facultas, & Asarum, vt Dioscorides inquit, Mesues fatetur, & nobis experimento compertum est, veratrī modò expurget, & bilem, pituitamq; & supernè, & infernè propellat, non video sanè, cur acoro in omnibus suis facultatibus tam facili comparari possit. Planta Græcis *Asarum* ac etiam *Asarum* vocata, Latinis Asarum, & Nardum syluestre appellatur: Arabibus, Asaron: Italis Asaro, & Bacchara: Germanis, Hasel vurtz: Hispanis, Asara bacchara: Gallis, Cabaret.

† Hæc verba vt in Ruellio inuenimus, ita reliquimus. Sed admonendum esse lectorem diximus, ea non legi in Græcis nostris codicibus, neque à Serapione referri, quod argumentum est illa Dioscoridi accreuisse. Suspicionem augere, vel potius ita esse confirmare potest Orbasius, qui Dioscoridem transcripsit, & hæc verba non habet. Sunt tamen Græce sic scripta *Asarum* in *Asarum*, & *Asarum*. Id est. Habes cauliculos angulosos, subasperos, raros.

*Asari G.  
ræci Ga  
leno.*

*Nominā.*

PHV MAGNVM.

PHV PARVVM.



10



10

## PHV. CAP. X.

PHV, quod & aliqui sylvestrem nardum appellant, nascitur in Ponto: folio olusatii, aut elaphobosci: caule cubitali, aut altiore, læui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto: floribus narcisso proximis, maioribus, tenerioribus, & ex albicante purpureis: radice superius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo villosa in nigri veratri, aut iunci odorati modum: capillamentis inuicem contextis, flavescens, odoratis, cum quadam odoris grauitate nardū æmulantibus. Excalfacit: urinam mouet, si secca potui detur. Decoctum eadem præstare potest, ad lateris etiā dolorem efficax: menses cit. antidoris inferitur. Adulteratur radice rusci admista. Sed maleficium deprehenditur: quoniam hæc dura est, & frangenti contumax, sine vlla odoris gratia.

Non possum non fateri, eos omnes bene sentire, qui maiorem Valerianam sic vocant, quæ passim in Italia nascitur, legitimum esse Phu asserunt. Quippe radices primum forma,

Phu confider. atio.

odore, colore, ac cæteris in vniuersum notis ab iis, quæ sibi Phu ipsum adscribit, haudquaquam recedunt. Indicant idem & folia, & caules: illa enim olusatro non sunt dissimilia: hi verò adulescent cubitali mensura proceriores, leues, inanes, molles, geniculati, & in purpuram vergentes. Flores tamen obflare videntur, qui in Phu lilii, vel narcissi effigiem præ se ferunt, non au-

tem umbellæ, vel muscarii speciem, vt in maiori Valeriana videntur: quanquam foscui per se omnes, qui umbellā faciunt, forma narcissinos referat, in purpuram albicantes. Quo fit, vt cum Ruellio existimandum putauerim, hæc de floribus verba esse à scriptoribus in Dioscoride deprauata. Nanque videtur nostras Valeriana, omnibus tum notis, tum qualitatibus adeo cum Phu conuenire, vt re vera dici possit, non aliud, quam ipsum Phu ad vnguem referre. Etsi non desint (vt audio) qui profiteantur Phu alterum a Valeriana se inuenisse, quod floribus narcissi proueniat. At quia id pro certo compertum non habeo, & quia non desunt, qui talia fabulentur, non est, quid hac in re certi affirmare possim. Est & Valeriana alterum genus, quod minus appellatur, cuius caulibus iuxta folia, quæ quadamtenus maioris similitudinem referunt, molli lanugine pubet, reliqua verò parte maiori non ab simile asurgit, floribus subpurpureis, n. umbellam simul coeuntibus. Radices mittit hæc tennes, quæ in multifidas conglomerantur fibras, odore misto interiri dem, & nardū. Vtraque odore commendatur: proinde eas vestibus quidam interponunt. Phu (vt scriptum reliquit Galenus lib. v. 111. simplicium med.) odoratum quodammodo est. Huius herbæ radix nardo viribus similis, sed tamen ad pleraque infirmior. Urinam plus mouet, & aut Indica, aut Syriaca nardus: similiter autē vt Celtica. Simile Phu asserit ipse Galenus esse Carpesiū, cuius cum nullibi meminerit Dioscorides, vt recte sciri possit quidna sen oibus Græcis fuerit Carpesiū, in primis Galeni testimonio eius vires & formā describāris enim lib. v. 11. simpl. med. sic habet. CARPESIVM si

mile est vocat Phu, non gustu tantum, sed & sagacitate. Sed plus habet tenuitatis: proinde magis eo etiam viscerū obstructions extergit, & urinam mouet, renesque calculis degrauatōs expurgat. Non tamen catenus tenuiū est partium, vt liceat

Valeriana minima.

Phu Siner ex Galeno

Carpesi confidera tie.

vt liceat loco cinnamomi, si non ad manū sit, viſurpare, ſicuti faciebat Quintus. Præſtantius eſt Carpeſium ponticum lætius: non tamen vel ipſum cinnamomi viribus vicinum eſt, imò non paruo deterius optima caſſia. Nuncupatur vtrunq; à montibus quibullda Pamphiliz, in quibus naſcitur. Ingensq; eius prouentus eſt in Syria. Et primo libro de antidotis inquit. Quintus (vt aiunt) quoties cinnamomū deerat, Carpeſium, vt quod viribus nihil ab optima caſſia diſſerret, in theriace compoſitione imponebat. Ego idcirco eius pluſimū mecum attuli ex ea peregrinatione, quæ orientis prouincias adii, diligenterque reſpoſitum nunc vſque multum ſeruo: quod odorem etiamnum & ſaporem, ſi non qualem prius habebat, certè nondum exolecum retinet. Eſt autem Carpeſium herba phu appellato genere ſimilis, valentior tamen, atque odoratum quiddam ſpirans. Plurimū hoc in S<sup>da</sup> Pamphiliz naſcitur, emittitque propterea illic viliſſimo præſo. Quotiesca ſi quis eſtrum illuc acceſſerit, Carpeſii plurimum emat, cum id ſibi longo tempore duraturum nouerit. Tenuia autem ſunt ſimenta, cinnamomi virgultis ſimilia. Eius duo reperiuntur genera, vnum quod lætium, alterum, quod ponticū cognominatur, à monte, in quo naſcuntur, vtrius; nomen adepta, ſed ponticum melius eſt. Quèd cum eius non parum haberem, per multis medicamentis admiſui, in quibus phu vocari imponi debuerat. Eſt enim Carpeſium phu ſimile, valentius tamen, & in quo (vt dixi) nonnihil odoratz qualitatiz guſto odoratuq; ſentitur. hætenus Galenus. Verū quid hac tempeſtate ſit Carpeſium, aduū ſine fuerit explicare & mihi, & cæteris materie medicæ ſcriptoꝝ. Tameſi Hermolaus Ruelius, Fuchſius, ac etiā Monachi Meſſæ exponentes pro certo exploratum habeant, Auicennæ, Serapionis, & Aduariorū auctoritatibus innixi, fructus pipēri ſimiles, qui vulgò Cubebæ vocantur, legitimum eſſe carpeſium. Si quidem Serapio quod Galeno carpeſiū vocatur, ſub cubebæ nomine ipſius Galeni teſtimonio ſe deſcribit. Cubebe eſt medicina facultate, & ſapore Phu non abſimilis, quanuis longè tenuior, quare obſtructiones totius corporis aperit, vrinam ciet, & calculos remū pellit. In hac ſerè ſententia verſatur & Auicenna cubebas carpeſium appellans: quemadmodum & Aduarius, qui Mauritanorum nomina ſeruat, in quibuſdam medicamentis Carpeſium imponit, quod à barbaris *naſſibus* vocari ait. Quibus auctoritatibus luce clarius patet, quòd Galeni carpeſium, & Arabum cubebæ nulla ex parte diſſerunt. Veruntamē illud animaduertendum eſt, quòd eos in errore verſari exiſtimem, qui credunt (vt Hermolaus, Ruelius, & Fuchſius) vulgares obſtruſariorum cubebas illas referre, de quibus ſcribere Serapio, Auicenna, & Aduarius, quandoquidē qui dixerit cubebas plantæ fructum, vel ſemen eſſe, eoſū

reperio neminē: nec minus probari poſſe putem, id vſquam diſſiſſe Galenum, qui carpeſium deſcribit his verbis. *κατὰ δὲ τὴν ταύτην, παρανομία τὴν ἀπὸ τοῦ καυτοῦ καὶ τοῦ καυτοῦ*. Sunt autem tenuia ſimenta, cinnamomi virgultis ſimilia. Ipſumq; Phu & odore, & ſciculatibus adſimilat. Quapropter cum tantum Phu radices in vſum medicum veniant, facile dici poſſeſt, carpeſium Galeno potius radicū eſſe ſimenta, quā cauſum, & præcipuè cum aſſerat diū aſſeruari poſſe, quandoquidem ſolidiores ſunt radices, quā cauſes, qui facile in omni herbarū genere ſacceſcunt, & pereunt. Præterea cum Galenus alias cinnamomi virgulta ellebori radicibus comparauerit, hic mirū videri non debet, quòd idē contra ſarmentofas carpeſii radices cinnamomi virgultis ſimiles fecerit. Adde etiam, quòd in plantis non ſolum cauſes ſarmentofæ, verū etiā radices plures ſarmentofæ Dioſcoridi appellantur. Quo ſit, vt crediderim Fuchſium in ſuis Paradoxiſ immemito impugnare Leonicēnū. Ad hæc gullantibus nobis vulgares officinarū cubebas, nullum proſus Phu ſaporem deprehendimus. Quod manifeſte indi- cat vulgares cubebas, nec Arabū cubebas eſſe, nec Galeni carpeſium. Ob id igitur, vbi apud Græcos carpeſium medicamentis admiſtum reperitur, & cubebæ apud Mauritianos, phu eoꝝ vice, cum ſit carpeſio in omnibus perſimile, vel caſſia, pot uiſ quam cubebæ vulgaris vſus, erunt ſubiiciendi. Iacobus Syluius inter recentiores apprime doctus, quanquam nouit cubebas noſtras carpeſium non eſſe, non tamē animaduertit, nec etiam Serapionis, aliorumq; Arabum eſſe cubebas. Aberrant in eubebarum hiſtoria etiam Serapio, quippe quicquid Dioſcorides de ruſco ſcriptū reliquit, ſis cubebis perperā reddit. Cuius autem ſtirpis fructus vulgares *CUBEBAE* ſint, quid aſſi- mare poſſim non habeo, cum ex orientali plaga nobis peregrinæ afferantur. Etſi eas dixerim odoratas eſſe baccas, racematim coherentes, corymborum hederæ modo: qui guſtui præter odoris gratiā, acrimoniā & amaroris tantillū relinquant. Quibus coſtat, quòd excaſſare valeant tertii ordinis initio, & ſic- cū in fine eius. Quamobrem languentem ex pituita ventriculū, vel etiam ex ſtatu robora- tū peſius à lentis craſſiſq; humoribus expurgat. Lienē iuuat, flatūs diſcutiunt, & frigidi vteri affectibus auxiliatur. Diu cum maſtiche manſe, pituitam à capite trahunt, & cerebrum roborant. Quod qd Græcis omnibus, à quibus etiam *ἀπὸ τοῦ καυτοῦ* dicitur: Latinis, Phu, & ſylueſtris Nardus: Arabibus, Fu: Italis, Valeriana: Germanis, Buldrian: Hiſpanis, herua benedi- cta: Gallis, Valeriane.

*Maḍaḥaṭṭay.* MALABATHRYM.  
CAPVT. XI.

MALABATHRYM arbitrantur aliquiesſe Indici nardi ſolium, falſi quā-  
dam

*Quoniam  
dum opi-  
nio.*

*Hermo-  
Ruelij &  
Fuchſij er-  
ror.*

*Serapio-  
nis ap-  
us. Cube-  
arū  
vulgariū  
conſidera-  
tio.*

*Nomina.*

dā odoris cognatione: permulta enim nardum olent, quemadmodum phu, asarum, niris. Secus autem res se habet: nanq; Malabathrū solum sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, lentis palustris modo innatas aquis, sine radice. Id collectum statim liuo transiuitur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis æstiuo ferveore aquis, humum aridis fruticibus vri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidē renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, integrū, nec fragile, odore caput feriens, quod diu in sua vi odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmum verò, & nutritum contusum, præsertim si cariosum virus olet, vitiosum est. Eisdem nardo sortitur vires: sed efficacius omnia præstat. Vrinā vehementius ciet, ac stomacho magis prodest Malabathri vis. Lippitudinibus, inflāmationibusque tritum, & in vino seruefactum commodè illinitur. Subditum linguæ, oris halitum, & suauitatem commendat. Vestium quoque odorem interpositum seruat, & ab erosionē tuetur.

*Atalaba-  
tiori confi-  
deratio.*

MALABATHRYM, quod plerique folium Indicum vocant, qui has arates videri, habeo neminem. Nascitur (vt Diofcorides inquit) in India palustribus tantis locis, aquis absq; radice innatis, lenticule aquaticæ modo Sed nec inde amplius ad nos aduehitur, quòd fortasse indigenarum culpa perierit in India, quemadmodum & balsamum in Syria. Etenim Diofcorides refert, Malabathrum non renasci, nisi siccatis glistuo feruore aquis, humus aridis fruticibus percuratur. Quod cum indium forte non sit à natura factum, vel potius sit ab indigenis omissum ob eorù negligentiam, facile postea euenire potuit, vt Malabathi genus omnino deperditum sit. Plinius lib. x. i. cap. x x v i. duorum meminit generum, quorum alterum arboris cuiusdam Syriacæ folium esse ait, his verbis. Dat & Malbathrum Syria, arborem folio conuolato, arido colore, ex quo exprimitur oleum ad vnguenta. Fertilius est eiusdem Aegyptus: laudatius tamen ex India venit. In paludibus ibi gigni tradunt lenticis modo, odoratis croco, nigricans, scaberrimis, quodam salis gustu. Minus probatur candidum. Celerrime sicum in vetustate sentit. Sapor eius nardo similis esse debet sub lingua. Odor verò in vino subseruetur.

facti antecedit alios. hæcenus Plinius. Qui tamen præter Dioscoridis sententiam præstanti Malabathrum duxit, quod falsum est, non quod insulsum. Cæterum non desunt, qui Indici folii loco, cassiæ odoratæ, vel cinnamomi folia suppeditent, quæ esse caryophylli existimat Brauolus. Nonnulli præcerea, quædam arborum folia, ex Alexandriæ aduecta, quæ lauri, vel arbuti frondes referunt, in Malabathri vsum vendicant. Hæc Hermolaus, Ruellius, pariterque Brauolus esse secutus, nulla (quod equidem sciam) auctoritate, Nigritarum Tembulum esse arbitrantur. Verum cum adhuc eorū, qui Tembuli-historiæ, & notas scribant, inuenierim profectō neminē, quanuis de eo Auicenna breuiter scripserit, idcirco illa potius afferam arborū folia esse nobis penitus incognita, quā horū sequar opinionē. Nullo itaque modo hæc ad vsum veniunt admittenda. siquidē cum eorū facultates nos lateant, nō est cur ea cōprobare valeamus. Sed vbi Malabathro opus sit, cassiām odoratā, vel Indicā nardum supponendā putam. Galenū secuti, qui ita decreuit tum in succidaneis, tum etiam lib. vii. & viii. simpliciiū medicamentorum. Quancūq̃ Fuchsius in libro, quē de compositione medicamentorū nouissimē edidit, dum ea perpendit, quæ Aurēæ Alexandrinæ conficiunt, Malabathri loco Attractylim statuit substituentis, Galenū (vt inquit) in libello de substitutis medicamentis secutus. Sed certē non satis possum mirari Fuchsū, virum alioqui doctrinā & iudicio clarū, in hac re (vt mihi quidē videtur) manifesta, minus rectē sensisse. Nā vt omittam, in libro illo de medicamentis, quæ inter se cōmutari possūt, qui tamē liber Galēno adscriptus cēsetur, me nūquā legisse, quōd attractylis Malabathri vicē suppleat. sed cassia odoratā. & nardi spica, est Dioscorides hoc loco, est Galenus locis antē citatis in simpliciiū celsū: qui vno quasi ore fatentur, eandē vim habere malabathrum, quam nardū. Quorū equidē auctoritati grauissimæ longē satis adherendū existimo, quā vt temere fortasse sit attractylis in malabathri locū substituentē. præsertim cum nobis nō desit copia nardi. & cassiæ odoratæ: attractylis autē vera hæcenus, mea opinione, desideretur, vt lib. i. i. suo loco latius ostendemus. Quōd est cōcedamus, hæc aliquibus cōpērtā esse, tamen quibus audebit ea oīd ia malabathro? etenim nullus, quod scīā, attractylim odore commendauit: at malabathrū Dioscorides nō solum odoratū facit, sed etiā idipsum *ἡ ὀσμή αὐτῆς* hoc est, in odoris bonæ tace permanere affirmat. Excalsciat Malabathrum (vt auctor est Auicenna) siccatq̃, ordine secundo. *Μαλαβάρθρον ἡνὶ φύμῃ* sic Græcè, Latine autē Malabathrū, & Folium appellat: Italicè, Malabathro. & Folio Indiano.

Kærlig

ΚΑΘΙΣΤΑΙ CASSIA. CAP. XII.

CASSIA, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam gignitur,

gignitur, crassi corticis sarméto: foliis piperis. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, corallij amula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens, & cum aliquanto feruore ad stringens, aromatica; vinoso odore: cuiusmodi est, quæ ab incolis achij appellatur, ab Alexandriæ negotiatoribus daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, zigir cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundum locum tener antedicta. Tertia, cui Mosylitico blasto, id est, germini cognomen est. Reliquæ viles, ut quæ asyphemû dicitur: nigra, insuavis, cortice tenui, acrimoso: & quæ darca, & cito vocitur barbaro nomine. Similior huic est pseudocassia, quæ ut explicari possit. quæ gustu coarctatur, cum nec acris, nec odorata sit, hærentemque; medullæ corticē habeat. inuenitur etiā lata quædā fistula, mollis, leuis, furculosa, quæ ante dicta præfertur. Dānatur cādicās, scabra, hircinû vir<sup>o</sup> redolēs, & quæ tenui fistula, & scabra cute sit. Vim obtinet calcifedi, vrinā ciēdi, siccādi & leniter adstringēdi. Conuenit ad medicamēta oculorū, quæ præstāda claritatis gratia cōcinnātur: & ad malignata: lentigines tollit cum melle illita: mēses trahit: cōtra viperarū ictus pota auxiliatur aduersus intestinas inflamationes omnes, & renū vitia, pota proficit: fœminis in folio desidētibus, aut suffimentis prodest ad dilatationē vuluæ. Et duplo pōdere medicamētis mista, cinnamomi vicem supplet, si ipsum desit: nameosdem effectus præbet. Ad plurima perquam utilis est.

*Κιννάμωμον, CINNAMOMVM. CA. XIII.*

CINNAMOMI genera plura, patriā sibi nomē vendicātia. Præfertur tamen Mosyliticum, quod cassiæ, cui mosyliti nomē est, aliquā referat effigiem: sed in eo genere recens, nigrû, ex vinoso in cinerēti vergēs, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctû, perquam iacundè olens. Optimi ferè indicî, iu-

cundi odoris proprietate cōstat: inuenitur enim cum optimo, eoque quod peculiare est, odor rutæ, aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordēs, & cum calfactione quadātenus falsum, quod nō citò cōfricanti asperum, aut frianti lanuginosum, læuibus tamen internodiis appareat. Si certior fieri voles, velito ab radice surculum. facilis est huiusmodi probatio: nanque fragmēta miscellanea quædā esse videntur. Quæ autē melius spirāt, suo halitu, cum nares primū consulūtur, olfactû expleant, de terioris dignotionē impediunt. Est etiā montanû, crassum, pumilû, fuluescens admodum. Tertium à Mosylitico, perquam suauiter olet, nigrû, fruticosum, paucis intercedētibus geniculis. Quartum fungosum, candicans, aspectu tuberosum, vile, ac friabile, magnam habens radicē, quæ cassiam planè representat. Quintum genus odore nares ferrens, subrufum, & cortice fuluæ cassiæ simile, tangenti firmum, minus nervosum, densa radice firmatû. Iis, quæ thuris, cassiæ, myrti, aut amomi odorē spirāt, minus suauiter inest. Deligito scabrum, albû, rugosum: at læue, & lignosum circa radicē, ut inutile, reiicito. Est etiānum simile aliud, cui pseudocinnamomo cognomen est, vile, inualidi odoris, solutarumque virium. Vocatur etiā zingiber, cum tamē sit xylocinnamomû, præbēs quandā cinnamomi faciem. Est autē lignosum cinnamomû, sarmēta lōga robustaque ferēs, odore longē cinnamomo inferiore. Sunt qui xylocinnamomû à cinnamomo genere differre dicant, quod à natura eius abhorreat. Cinnamomû omne excalcificat, emollit, & concoquit: vrinam ciēt: tā mēses, quā partus potū, aut ex myrrha impositū pellit: contra bestias, quæ virus ei aculātur, venenæque conuenit: caliginē pupillis oculorū obuersantem discutit, crassitiē extenuat: lētigines, & vitia cutis in facie ex melle illitū detegit: cōtra tussēs, defluxiōēs, aquā subter



cutem fufam, renum vitia, & vrinæ difficultatem efficax eft. Vnguentis pretiofis inferi folet. Et in fuma, magni ad omnia vfus. Tritum vino excipitur, vmbraque ficcatur, quò diutius eduret, reconditur.

*Caffia con- sideratio.* NATURA omnium rerum parens in hoc 19

terrarum orbe quædam fimplicium genera adeò inexorabilia procreauit, vt ne quam plurimis quidem deliciis, blanditiis, officiis, obfequiisq; ea apud nos quifpiam retinere potuerit. Siquidem fterpes ipfe viuere coactæ in hortis, viridariis, mitioribusq; Italix locis, ceu Tempe, omni amœnitæ referret, quemadmodum alpini homines delicias vrbium, & maiestatem afpernantes, politici moribus omnino neglectis, non alibi, quam in fuis mapaliis hilariter, ac iucundè viuere poffunt: ita & ipfe relicta celi clementia, hortorumq; amœnitæ, fpecto item fontium oblectamento, omniumq; vrbium ac familiarium fimplicium confortio in de fecta, folitudinesq; fuas, à quibus primam duxerunt originem, fe tandem recipere. tantum patriæ, natalisq; foliamor in rerum natura poffet. In quarum genere Caffia connumeranda venit: quæ tametfi in maiore illa Romanæ gentis fortuna multis ac variis hortorum locis confita habebatur, nullibi tamen hæc ætate (quod nouerim) in Italia, ne in tota dicam Europa inuenitur. Sed hæc de Caffia dixiffe volumus fimplicium medicamentorum peritiffimos fecuti, qui (vt eorum teftantur volumina) nihil inuicem differe fentent, Caffiam, quæ in arborum genere Diofcoridi, & Galeno recenferetur, & eam, quæ antiquis inter coronarias numerabatur herbas, quæq; olim paffim circa apum aluearia ferebatur in Italia, quæ maxime apes delectentur, & in hortis, & viridariis coronis maxime expetita. Verum enimvero longè aliter hæc res intelligi poffulat, quòd aliâ repererim fuiffe Caffiam (vt Diofcorides inquit) & felici Arabia allatam ex arbore (auctore Thophrasto) vitæ magnitudinis, ab hæc longe diuerfam, quâ apibus, & coronis ferebat antiquitas. quâdoquidem fuerit hæc herba, illa verò arbor: præfertim cum nullus (quod fciam) extet auctor, qui pofteritatis memoriæ mandauerit, Caffiam adeò copiofam in Romanorum triumphis ex Arabia conuechi folitam, vt inde vulgaris facta, vbique paffim & reperiretur, & fereceretur ab omnibus. Quod fi fortè eueniffet, nunquam tamen mihi perfuaderim, quòd Galenus hac in fcientia, & facultate omnium diligentiffimus, & qui Romæ diu vitam duxit, Italicæ Caffiæ hiftoriâ fcientio inuoluiffet. Plinius lib. x. cap. 1. nonnullas memorans herbas, quorum folia odoris gratia in vsum coronarum venerant, inquit. Ergo in coronamenta folio venère mallochin, fpecieon, trigonon, cneoron, quod ca-

fiam Higinus vocat. Id quod ante ipfum palam fecerat Virgilius, Caffiam inter coronarias herbas recolens in Bucolicis ecloga ii. his veribus.

Tum caffa, atque alius intexens fuauibus herbis,  
Mollia luteola pingit vacinia calcha.

Et in Georgicis lib. 1. 1.

Vix humilis apibus caffa, rorèmq; ministrat.  
Nec circum caffa virides, & olentia latè.

Item Georgicorum lib. 1. 1. 1.

Serpylla, & grauitè fpirantis copia thymbræ  
Floreat, irriguumq; bibat violaria fontem.

Hæc Maro. Quibus palam eft, Caffiam coronariam, & qua tantopere delectantur apes, herbam, non arborem fuiffe. Quod etiam teftatur Plinius libro fuperius citato cap. x. 1. his verbis. Verum hortis conuoluentisq; maxime aluearia, & apes conueniunt, res præcipui quæ flus, compendique, cum fauit. Harum ergo caufa oportet ferere thymum, apiastrum, rofum, violas, lilium, cyrtum, fabam, eunilum, cunilâ, papauer, conyzam, caffa, melilotum, meliffophyllum (lego myrtophyllum) cerinthem. Hæcenus Plinius. His itaque rationibus, auctorumque veterum teftimoniis innexus Theodorus cneoron Theophrasto caffam appellat. Quamobrem potius fuerit credendum, cneoron Græcis vocatum antiquis coronariam fuiffe Caffiam apibus gratiffimam, quæ eam, quæ in India & felici Arabia prouenit, cinnamomo perfimilis, odoramentis & antidotis expetita, & qua per longas ætates cinnamomi vice vfi funt medici. Neque tamen propterea opinionis noftræ refragari putamus Columellam lib. 1. 1. cap. v. 1. 1. de re ruflica, vbi ita fcriptum reliquit. Iudæam & Arabiam pretiofis odoribus illuiffe haberi, fed nec noftram ciuitatem prædictis egere fimplicibus: quippe cum pluribus locis vrbis iam caffam frondentem confpicimus, iam thurcam plantam, florentesque hortos myrtha & croco. Nam quamvis concedi poffit Columellæ, caffam ex Arabia allatam vrbis illuftrandæ gratia Romæ fuo tempore confpicuam fuiffe in hortis procerum & imperatorum, hoc tamen non prohibet, quin caffa, quam prope apum aluearia paffim feuit antiquitas, alia fuerit planta: præfertim cum hæc inter herbas coronarias, illa verò inter arbores odoratas recenfeatur. Cneoron autem deferibit Theophrastus lib. v. 1. fcripto. cap. 1. 1. de plantarum hiftoria, fiverbis. Cneori duo genera, aliud enim candidum, aliud nigrum. Candido folium cutaneum, oblongum, figura quafi oleaginum: nigrò quale tamatici,

*Caffia odorata. & coronaria diftinguitur.*

50

*Cneori de  
fcriptio.*

tamarisci carnosum. Candidum magis se humi spargit, odoratumq; est nigrum odore caret. Radix ambobus, quæ arte desendit, grandis: ramiq; petmulti, crassi, furculosiq; ab ipsa protinus tellure, aut paulo superius sparsi, lenti ad modum constant. Quamobrem hisce ad colligandum iuncti modo videntur. Germinant, florentq; post æquinoctium autumnii, & multum denique temporis florent. Hæc Theophrastus. Sed quænam plantæ oriuntur in Italiâ, vel aliunde eo afferantur, quæ Cneorum referant, quod veri referant finem non habeo. Sed iam ad Cassiam odoratam redeamus, ob cuius cognitionem postmodum factum est, ut recentioribus medicis, in ea recuperanda, inuestigandisq; multum negotii accesserit. Nanque hæc ætius tum medicis, tum seplafarii (et si plures iam respiciant) odoratæ cassiæ loco quædam incognitæ arboris segmenta, nec odore, nec viribus prædita semper capesserunt. Verum tamen postquam nonnulli ætatis nostræ doctissimi viri, stirpium historiam diligenter examinarunt, detecta fraude, mercatores ex Alexandria mercimoniam Venetiæ comportantes, cum suam imposturam deprehensam cererent, à negotio desciscientes in aliud nouum Cassiæ genus segmenta illa commutarunt. Quæ finè præter odorem, pariterq; saporem, quibus ferè penitus exoleta sentiuntur, cassiæ à Dioscoride descriptæ admodum habetur consimilis. Quapropter nec eos errasse crediderim, qui dicerent, hanc Dioscoridis pseudocassiam esse, quippe & crasso cortice constet, & in eius cavitate lignosa etiam visitur materies, paululumque est odorata, minimèq; acris. Nonnulli hac non contenti, quædam vocati cinnamomi fragmina Cassiæ vice usurpant; quæ cum nullo odore saporeq; commendentur, potius quercum vel figum, quam Cassiam referunt. Cæterum, ut dicam quid ego sentio, si quis fistulam, quam Cinnamomum perperâ appellamus, & vulgò Cannella, Cassiæ generibus rectè comparauerit, facile nouerit vulgaris vsus cinnamomum legitimam Cassiam procul dubio referre. quinimo diligenter inquisitis, iudicijssq; truciâ examinatoris huiusmodi cinnamomi ingentem copiam, quæ magnis facis Venetiis in mercatorum repositoriis afferuatur, nimirum omnia illa Cassiæ genera, quæ à Dioscoride describuntur, facile sese offerent, quandoquidem mercatores (ut semper solent) ad expediendas deteriores merces bonarum lenocinio, quas illis admiscunt, pro virili videntur. Galenus itaque libro primo de antidotis multa Cassiæ genera recensuit, ubi finè Dioscoridem secutus, eam cæteris præstare facetur, quæ ziggi cognomine dicitur, hancq; asserit cinnamomum vsque adeo æmulari, ut essent, quibus suo eam cinnamomi loco venderent. Quo fit, ut admirari non liceat, si hodie quodæ tot annis hæc deducta, protractaq; confecturadine, ubique cassiæ pro cinnamomo veniundetur. Nec quidem

lôgè aberraret, si modò optimâ seligeret: quandoquidem Galenus eodem loco palam prodit, Cassiam sæpenuero in cinnamomum transmutari, fateturque se iam vidisse eximiaz Cassiæ ramulos omni ex parte cinnamomum referentes. Contrâ pariter inspersisse cinnamomi furculos Cassiæ proflus per similes: adeo ut asserat pro qualibet cinnamomi parte in componendis medicamentis duas electæ cassiæ adhiberi posse. Describit itè Galenus quoddam aliud deterioris Cassiæ genus, quod tradit iuniorè Andromachû Cassiâ fistulâ nominasse, cum si itularû modo, inanis cauæque sit, & crassu cortice scuiusmodi in vulgari cinnamomo frequentissima conspicitur. Huius finè ea videtur esse generis, quam in suo conficiendorû pharmacorum libello præfert Cordus, quod velite cassiam, præter Dioscoridis & Galeni sententiam, Iubrici esse gustus. Porro Cassiæ odoratæ frustulum cû cortice & ligno suo interiore nuper dono mihi dedit Serenissimus Princeps Ferdinandus, Archidux Austriæ, dominus mihi clementissimus, ab integro ramulo abscissum, quem ille inter plures alias res non minus pretiosas quam raras, reconditum habet. Huius cortex colore quidem cinereo à nostro vulgari cinnamomo diffidet, non tamen odore ac gustu: quandoquidem mansus idipsium, quod vulgus Cannellam vocat, ori planè præsentat. At lignum, quod cortice contegitur, fragili constat materie, neque vilo proflus odore, saporeq; commendatur. Quare hinc facile colligi potest, corticis tantum eius vsu esse: acque etiam Theophrastum non ab ea memorie prodidisse, huius virgæ in frusta secari, recentique bovis corio hac confusi, ut vermiculis, qui ex eo nascuntur, lignum illud inuile erodatur. Cæterum odoratæ cassiæ meminit etiam Virgilius præter coronariam libro 11. Geor. ubi cecinit hoc carmine. Nec casta liquidi corrumpierat vsus oliui. Quin & Plinius Cassiæ meminit libro x. capite x. his verbis. Frutex & Cassia est, iuxtaque cinnamomi campos nascitur, sed in montibus, crassiore sarmento, tenui cutes, verius quam cortice: quem contra atque in cinnamomo leuari, & exinaniri, pretium est. Amplitudo fruticis trium cubitorum. Colos triplex: eûni primum emicat, candidos pedali mensura: deinde rubescit addito semipede: vltra nigricans. Hæc pars maximè laudatur, ac dein de proxima: damnatur verò candida. Consecant furculos longitudine binum cubitorum: mox præstant recentibus coriis quadrupedum ob id interemptarum, ut iis putrescentibus, vermiculi lignum erodant, & excauent corticem tutum acrimonia, & amaritudine. Probatur recens maximè, & quæ sit odoris mollissimi, gustuque quam maxime feruens, potius quam lento repore leuiter mordens, colore purpureo, quæque plurima minimum ponderis faciat, breui tunica: um fistula, & non

Medicorū  
et seplafariorum  
error.

Cassia le  
gittima.

fragili. Hæc Plinius, quorum plura à Theophrasto transcribit. Qui cassie historiam tradidit libro 1 x. cap. v. de historia plantarum, eamq; fruticem esse amerinx magnitudine scribit: quæ cum nullo pacto decoritari possit à ligno, cortexq; tantum vellis sit, ob id hominum industria inuentum esse ait, vt coriis quadrupedum consuta, interius lignum vermiculis deuoretur. Cæterum plane hallucinantur ii, qui Cassiæ fistulæ loco, siliquæ Aegyptiæ, siue Cassiam solutiuam vulgo dictam, atra medulla, semine duro, lignosisq; membranis confectam, medicamentis admiscet Mauritanos fecuti, siquidem Serapio, Auicenna, pariterq; Mesues, siue sit ipsorum, siue interpretum lapsus, pari consensu Cassiam nigram Cassiam fistulam vocauere: legitimum verò Cassiam, de qua hic disserit Dioscorides, Cassiam ligneam. Quamobrem certò crediderim, quòd circa omnem censuram dici possit, in omnibus iis medicamentis à Mauritanis inuentis, quæ Cassiam fistulam expetunt, solutiuam illam esse inferendam. Si verò in Græcorum monumentis (excipio Actuarius, & Nicolaum Myrpesium, qui à Mauritanis multa acceperunt) Cassia fistula inuenta fuerit, vel in Mauritianorum compositionibus à Græcis transcriptis, Cassiam odoratam, à Dioscoride & Galeno descriptam, semper adhibendam existimo. Nisi medici secus intelligentes in eum errorem labi volint, in quem Leoniceus quosdam ætatis nostræ medicos (quæ profecto imperitia multorum est) temere incurrisse testatur, qui ad commouendos menses, difficiles partus, remorantesque secundas, Cassiæ deiectione corticibus, odoratæ loco vsquequaque utebantur. CINNAMOMVM verò, quod legitimum sit, quanquam diu multumque tum Venetijs, tum Neapoli, & apud mercatores, qui sæpe quotannis in Alexandriam nauigant, diligenter conquisierim, nusquam id tamen mihi videre licuit, neque etiam percipere potui, num hoc tempore apud magnos negotiatores, qui à Lusitania Indiam, & felicem Arabiam classe paratissima petunt, vel apud quempiam principem, regem, vel imperatorem legitimum reperiri possit. Quæ de re minimè demit, cum & Galeni tempore huius magna in Italia fuerit penuria, adeò vt Cinnamomum nullibi reperiretur, nisi apud Imperatores, qui admirabili custodia inter alia pretiosa illud atteruari curabant. Cuius rei historiam in medium afferit Galenus libro primo de antidotis, sic inquires. De Cinnamomo contraria iis, quæ de opobalsamo narrauimus, compertum habeo. cognatum namque mihi est, ipsum omnino per se facillimum esse illis, qui sæpe optimum cinnamomum viderint. Optimum verò consequi nemo potest, nisi repositum ab imperatoribus inueniatur, sex generi-

bus quodammodo distribuitur, liquidem & in hoc ipso, velut & in cassia, optimi ad decerrimum tam magna diffinitio est, vt optima cassia à pessimo cinnamomum suum differat. Neque verò Cinnamomi vitæ ætatem apta longo tempore durat: ad trigesimum annos, quam à principio vim habuit, integram non conseruat. nugatur autem, qui Cinnamomum ex hisce medicinis esse dicunt, quæ fenestrem non sentiant. Atqui ego non centum, neque ducentum annorum interuentu, sed pauciorum, si quis ad tantum numerum conseruat, iam aliquam mutationem verultiori cinnamomo factam obseruauit. Quo tempore siquidem Antonino imperatori theriacam parauit, vasa lignea, in quibus eiusdem generis Cinnamomum inerat, multa conspexi, alia Traiani, quædam Adriani, nonnulla Antonini, qui post Adrianum imperator fuit, ætate reposita: omnia hæc sese & saporis, & odoris imbecillitate, vehementiaque tantum planè superabant, quantum & tempore differabant. Olim è barbarorum terris arca cubitos quatuor & medium longa, Romam perlata cum fuisset, in qua Cinnamomi primi generis integra arbor erat, ex eoque Marco Antonino imperatori antidotum quædam composuissim, ipsam cæteris multis præstare, deprehedi, adeò vt Imperator quoq; ea degustata medicinx coctionem, velut in alijs fieri solet, expectare noluerit, sed statim ea vsus sit nondum integrè duobus mensibus elapsis. Antonino subsecutus est Commodus, qui nec theriacæ, nec cinnamomum curam vllam habuit, sub quo non solum arboris illius, quod superfuerat, omne dissipatum est, verum etiam quod deinceps post Adriani tempora comportatum fuerat. Quo factum est, vt nunc imperator noster Seuerus, cum sibi antidotum eo modo conficere iussisset, quo Antonino coquebam, ex Cinnamomo Traiani, & Adriani tempore reposito fumere coactus sim, imbecillioraque planè mihi vixit, & tamen nõdum anni triginta intercesserant. Hic nos optimi Cinnamomi notas quasdam necessarias subicere volumus, ipsum scilicet sumnoperare bene olere, inexplicabilemque præ cæteris bonum quemdam odorem spirare, ac calidum gustantibus se multum exhibere, non ita tamen vt mordicando tristitiam palato inferat: colorem deniq; talè habere, qualem si quis lacti nigrum colorem admiscet, atq; exaralei, quem vocat, aliquatulum addat. Ex hoc igitur quantum volebam, vt mos mihi fuit, cum accipissem, ramusculos paucos apud me repositi in ea apotheca, in qua res meas omnes pretiosas seruabam, verum ipsi combusta, qua tempestat & delubrum pacis incensum est, & hæc, & alia quæque Cinnamomi species, quas mihi conquisieram, perierat. Nunc itaque cum imperatori nostro Seuero theriacam compone-

Cinnamomi optimi nota.

Error quo rursus.

Si autem mihi confide ratio.

Si autem mihi confide ratio.

rem, ex Cinnamomo Adriani tempore reposi-  
to, quod optimum visum est elegi, de quo etiā  
vile quiddam lecturis subdere, cum possim,  
id facere non grauabor. Superfunt adhuc ibi  
multa vasa ligneā, quā omnia habent plurium  
radicum, vel plurium ramorum, vel vt quis-  
piam dicere velit, Cinnamomorum differen-  
tias: nullum tamen videri truncus, in ramos plu-  
res diuisus attollitur, sed veratū vniūque fi-  
guram prae se fert, atque etiam magis dama-  
sonii vocari, quod ē Cretae nos adfertur. Quae-  
ritis autem Cinnamomi species ab vna radice,  
ceu frutice quidam paruis confurgit, emittit-  
que hae sex, illa septem virgulta, vel paulo plu-  
ra, pauciorāve, non equali tamen omnia lon-  
gitudine sunt: vnde quod maximum est, pe-  
dis Romani dimidium non excedit. Vniuersi  
autem Cinnamomi, quos nūcū est quodam-  
modo optimae causae, et quosdam de Cinnamo-  
mo Galenus. Cuius vniūque recensere libuit,  
vt omnibus palam sit, quod cum sub iis tan-  
tā magnis Imperatoribus, qui toti ferē orbi im-  
perabant, tanta esset Cinnamomi penuria, ad-  
mirari non debeamus, si se nobis penitus in-  
gnitum, rarissimūque reddiderit. Sed potius  
id mirum fuerit, quod cum hac aetate cassiae  
plurimum afferatur, quae, vt Theophrastus, &  
Plinius inquit, nascitur iuxta cinnamomi  
campos, sed in montibus, Cinnamomi tamen  
nihil importetur. Quare non deest suspicio,  
quin omne ferē Cinnamomi genus deperierit  
in Arabia, quemadmodum & balsamum in Iu-  
dæa. Quandoquidem scripsit Plinius libro  
x i i. cap. x i x. combustas iam esse plurimas  
Cinnamomi sylvas, his verbis. Cinnamomi pre-  
tia fuere quondam in libris denariorum mille.  
Sed postea auctum id parte dimidia est, incen-  
sis (vt ferunt) syluis ira barbarorum. Id accide-  
rit ne ob iniquitatem praeportentium, an forte,  
non satis constat. Austros ibi tam ardentem fla-  
re, vt aëstibus sylvas accendant, inuenimus  
apud auctores. Quo fit, vt facile credi possit à  
Plinio quo id, quod Cinnamomi reliquum erat,  
pariter vel barbarorum bello, vel igneis flati-  
bus deperuisse. Nam si aliter res se haberet, qui  
cassiam ad nos deferunt, cum multo plus lucri  
ex cinnamomo, quā ex cassia se consecutu-  
ros sciant, Cinnamomum etiam vnā cum cas-  
sia veherent. Hæc autem dixisse volui, non vt  
hac in re certi aliquid, exploratque habeam,  
cū tantum coniecturis agam, sed vt aliis vi-  
terius explorandi latius pateat iter. Cæterum  
Strabo non modò cum Theophrasto, Diosco-  
ride, Galeno, Plinioque cinnamomum in Ara-  
bia nasci scribit, sed etiam in India, ea scilicet  
parte, quæ ad austrum vergit. quippe cum hæc  
Arabia, & Aethiopia sole persimilis sit, ea om-  
nia (vt ipse ait) gignit aromata, nempe cin-  
namomum, cassiam, & alia, perinde ac illæ. Ve-  
runamen cur nec inde ad nos afferantur, an  
quod etiam ibi perierit, an aliam ob causam, ii  
manifestius referant, qui hoc tempore libur-

nices ad aromata cōquirenda quoridie nau-  
gant. Sed videtur Galenus satis perplexē de  
Cinnamomo scriptitasse. quippe primū ar-  
cam Romam delatam prodidit ē barbarorum  
regione longitudine cubitorum quatuor cum  
dimidio, in qua integra cinnamomi arbor erat.  
quibus omnino denotat Cinnamomum esse  
arborem. Deinde verò vnāquāque Cinnamo-  
mi speciem scribit, ab vna radice, ceu frut-  
tex quidam paruis confurgere, adeo vt maio-  
ra eius virgulta dimidium Romanum pedem  
non excedant. quibus pœcul dubio fatetur,  
Cinnamomum esse in parubrum fruticum ge-  
nere. Vnde certe nesciuerim ego explicare,  
quid sibi hac in historia voluerit Galenus: præ-  
sertimque cum tam tenui ipsū fumento esse  
tradiderit, vt veratū, vel damasonii radicibus  
emulgauerit. Sed illud etiam mirum mihi vi-  
detur, quod ex cassia (vt ipse ait) Cinnamo-  
mi oriatur, speciemque nonnunquam cas-  
siæ arbores integræ, in quibus aliqua cinnamo-  
mi virgulta ē cassiæ ramis prodeant, cum ta-  
men cinnamomum, & cassia diuersæ inter se  
sint plantæ. Nisi fortasse inter vtrāque tanta  
sit generis cognatio, vt aliquando inuenta sint  
cassiae virgulta tanta odoris saporisque fragran-  
tia, vt omni ex parte cinnamomum referrent,  
et si legitima fuerit cassia. Præterea non desunt,  
qui putauerint hac Galeni auctoritate freti, cas-  
siam & cinnamomum ex vna, & eadem arbore  
provenire, quæ dum pumila sit, cinnamomum  
edat, dum verò adoleuerit, cassiam. Sed cum  
dicat Galenus, cassiam mutari in cinnamomū,  
non autem cinnamomum in cassiam, cadit eorū  
sententia. Quibus etiam refragat Theophrastus  
libro i x. de plantarum historia cap.  
v. vbi cassiam, & cinnamomum ostendit diuer-  
sas esse plantas: licet de earum forma, & proce-  
ritate nihil certi exploratque affirmet. Quan-  
doquidem initio capituli non ex sua, sed alio-  
rum sententia scribit, cinnamomum & cassiam  
frutices esse magnitudine amerinae: deinde ve-  
rò alios etiam securus auctores, cinnamomum  
fruticosum facit. Cæterum cum scribat Strabo  
Arabas cinnamomo, & cassia vti ad ignem pa-  
randum, cæterorum lignorum loco, videntur  
hæ plantæ non esse adeo pumilæ, vt quidam  
scribunt. Quod de cassia facile dici potest, si-  
quidem Venetis cassiæ Cannellæ vocatæ fi-  
stulæ visuntur tantæ crassitudinis, longitudi-  
nisque, vt facili quisque iudicare possit eas ē  
ramis, seu virgultis non sine breuibz fuisse  
deceptas. Cinnamomi deniq; sex genera esse  
produntur à Dioscoride, & Galeno: sed in nul-  
libi (quod sciuim) præterquam in libro de  
theriaca ad Pisonem, quem tamen librum spu-  
ritum putamus, ea per genera de scripti, fortas-  
se (vt loquitur) Dioscorides se remittens, qui etiam  
tantum à locis, vbi nascuntur, plus minūse  
præstantia hinc, quā illi reddidit. At Theo-  
phrastus citato nuper loco longè aliter cinna-  
momi differentias haberi ait, his verbis. Cin-  
namomum

Cinnamo-  
mi pen-  
uria vnde  
fit.

Opinio  
quorundā  
falsa.

Cinnamo-  
mi diffe-  
rentia ex  
Theophr.

namomum decerptū in quinas partes discerni narrant, & esse præcipue bonitatis, quod germinibus proximum fuerit, idque ad palmi longitudinem exd<sup>i</sup>, aut paulo maius. Secundum, quod sequitur, quod etiam minus casura est. Tertium deinde, & quartum notatur. Vltimum verò, quod deterrimum, proximūque radicis: hoc enim nimium corticis habet, in quo summa gratia est, non in ligno, qua de causa præferri cacumina solent, quod corticis plurimum habeant. Quidam sic aiunt. Alii verò Cinnamomum fruticosum enarrant, eiusque genera duo, alterum nigrum, alterum candidum. Hæc Theophrastus. Veruntamen cum nec is hac in historia aliquid constanter, affirmantēque scribat, Imperatorem, Regēve quempiam desideraret, qui humanam rempublicam miseratus, explorandi Cinnamomi gratia in Arabiam, & Indiam mitteret, magnimōque illos imitaretur Imperatores, qui ipsius Galeni ævo ex iisdem regionibus sibi Cinnamomum comparabant. Id enim Cæsar noster Carolus quintus, si illi Deus opt. max. Christianam remp. pacatam redderet, commodē consequi posset, vel fortasse commodius Rex Lusitanus, qui in orientale Indiam sæpe ad aromata conquirenda suas liburnicas mittit, quo in itinere vniuersas felicitis Arabiæ oras explorare posset: quemadmodum & vniuersam Indiæ partem, quæ ad austrum spectat, vbi inquit Strabo Cinnamomum pariter nasci. Sed o clarissimi Lusitanæ medici, si res medica vobis cordi est, si nostram cupitis ditare facultatem, medicūque nomen extollere, si charitas vos tenet, si naturalis humani generis iuuandi amor vobis instat est, iamiam provinciam hanc suscipite. Quippe si princeps vester hinc sibi immortalē nomen, vniuersæ verò reipublice commodum perquam maximum comparare possit à vobis intellexerit, cum omni pietate ac magnanimitate (vt audio) præditus sit, nulli dubium est, quin omne studium, auxiliūque impendat, vt non modò Cinnamomum ipsum reuocetur in lucem, sed & alia fortasse p'raque medicamenta, quibus antiqua medicorum familia suas illustravit antedotos. Porro tamen hæcenus illud mihi abunde prolatum esse videatur, quod cassiam veram habeamus, desideremus autē optimum & legitimū cinnamomum, sunt tamen hæc ætate scriptores, qui non cassiæ solum, sed etiā cinnamomi genera inueniri tradunt, inter quos extat Fuchsius vir clarissimus, qui libro illo de compositione medicamentoꝝ, quem locupletatum postremò edidit, de cinnamomo differens, ita scribit. Sed haud dubie in capis cinnella refertis & cassiæ, & cinnamomi genera reperiuntur, quare delectu opus erit, qui illa distinguere velit: distinguet autem notis vtriusque diligenter expensis. His nimirum verbis Fuchsius cinnamomum nobis verum non de-

esse asseuerat. Sed quibus id rationibus, aut auctoritatibus comprober, non video: nisi hoc acceptum referat Amato Lusitano, qui eū amen te deuenisse videtur in suis enarrationibus, quas in Dioscoridem scripsit, vt apud nos cinnamomi genera inueniri, atque etiam illud aroma notissimum esse contendat. Verum huius ineptias ac vanitates plurimas alibi persequimur, vbi nos ab eius calumniis defendimus. hic enim quod de materia medica sentimus, & ingenuè profiteri possumus, libenter scribimus. Quare ea sit nostra de cinnamomo sententia, quæ à nobis antea fufius probata est, quam modò oporteat pluribus Fuchsiū refellere. quem tamen doleo maiorem fidem prestitisse Lusitani illius ineptiis & mendaciis, quam virum pericūm deceat. Ceterū illud tantū addam, quod nobis, qui cinnamomum lignum non corticem esse ostendimus, mirari quidem subit Fuchsiū, qui libro suprā citato eodem loco paulo post contrarium scripsit, vt eius verba, quæ subiiciam, aperit testantur. Cinnamomum, inquit, quod nobis Zeilam insula mittit, cortex est arboris quatuor ferè cubitorum altæ, crassitudinis brachialis, sex vel septeni è trunco mittentis ramulos, qui singulis annis amputantur, atque iterum pullulant: quorum cortex, qui cinnamomum est, sit tenuis, odoratissimus, gustatu acris, & valde mordax, non tamen adeo vt molestè rodât, mansum ruram o'eat, &c. In hanc, meo quidem iudicio, vanam opinionem Fuchsius non secus atque in superiore venisseprehenditur secutus Amatum Lusitanum: qui eandem fere prius, quam ille post cinnamomo effigiem reddidit, quanquam eam à quodam accepisse fateatur. Cinnamomi vires scribit Galenus lib. v. 11. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cinnamomum summe tenuiū est partium, non summe tamen calidum, sed ex tercio ordine. Nihil autem rōdē desecat eorum, quæ pari sunt exalfaciendi facultate propter tenuitatem scilicet essentia. At Cinnamomi est velut imbecilium cinnamomum: nonnulli ipsam pseudo cinnamomum nuncupant. Meminit & Cassiæ eodem libro citato, vbi sic habet. Cassia excicat, & exalfacit tercio quodammodo ordine, sed & tenuium admodum est partium, gustu verò plurimum in se acris deprehenditur, leuiter quoque nonnihil adstringens. Quamobrem ob hæc omnia incidit, simulq; digerit, que in corpore sunt recrementa, & ad hæc robur etiam insistentis addit. Idoneum verò etiam suppressis mensibus, cum videlicet à copia simul & crassitudine excrementorum, quod sufficiat, euacuari nequit, hæcenus Galenus. Ceterum ex vulgari cinnamomo fit aqua stillatitia, quæ & odore & sapore idipsum pulchrè representat. ea autē extrahendi ratio hæc est. Sumito dicti cinnamomi quantum licet optimi libram, idque leuiter contu-

*Cinnamomi vires ex Galeno.*

*Cassia digerens ex eodem.*

*Cinnamomi aqua stillatitia.*

*Fuchsius et Amato opiniones repræsentat.*

sum in vas vitreum vel æneum, quod matula  
formam referat, conficito: dein aquæ rosarum  
stillatiæ libras quatuor, & vini albi odorati  
sebihram infundito. vas illud in balneum aquæ  
tepentis & non feruentis imposito, atq; inibi  
ore vasis prius obturato, viginti quatuor ho-  
ris macerari finito. post id tempus vitreo orga-  
no rostrato, quod ab effectu galeri vocat, vas  
antedictum cooperito, & igne fornaci succen-  
so, per balneum aquæ feruentis aquam stillati-  
am elicito. Verum canna stagnæ, vel vitrea,  
quæ duorum circiter cubicorum longitudi-  
nem expleat, organi vitrei rostro adinouenda  
inferenda est. Illi postremo vas vitreum subin-  
cito, quod manentem aquam excipiat, insuper  
providendū est, vt omnia vasorum officia dili-  
genter obscurantur, ne quid exvireare possit.  
Hæc aqua contra omnes ægritudines, quas frig-  
us excitauerit, effrax effrui pote quæ pituitam  
humorumq; lenitiam digerat, incidat, & ab-  
sumat, flatuq; discutiat. Priuatim verò ventri-  
culum, iecur, lienem, cerebrum, nervosq; inuat  
& roborat: animi deliquio, cardiacisq; affe-  
ctibus præsentaneo remedio succurrit: vene-  
ni venenosorumq; animalium moribus adue-  
satum mens pellit, & vinum ciceræ, celiaci au-  
xilii, naufragum sedat, & fastidium abigit. vte-  
rim moribus perquam viliis effrui prodest suspiriosis,  
resolutis, conuulsis, & comitali morbo labo-  
rantibus: vultui gratissima est, atque oris  
halitum commendat. In summa vbi exalface-  
re, aperire, incidere, digerere & roborare sit o-  
pus, huius aquæ usus maximam præstat vti-  
litatem. Veruntamen quoniam nec Diosco-  
rides, nec vterum Græcorum quisquam memi-  
nit CASSIÆ SOLVTIVÆ dictæ, quæ  
hoc tempore ad citandam alium frequentissi-  
mè vtuntur medici, quàm; Aegyptiam sili-  
quam recentiorum quidam appellant, ne hæ  
nostræ lucubrationes tam nobili, tam præstati,  
tamq; humanæ salutis necessario medicamento  
diffusantur, disseram hæc de eo, quicquid ex  
Mauritiani compertum habeo. Aegyptiæ itaq;  
siliquæ arbor inter valde proceras annuerari  
potesit. Huius materies solida, compacta: vi-  
situr, cortice tenui buxo colore, medullitus  
verò nigra, non secus ac ebenum, siue guaia-  
cum. Recens grauior olet, secca tamen mini-  
mè. Folio confert siliquæ sed magis in acutum  
tendens, cortice cineritio, radicibus magnis  
iuglandis modo. A ramis siliquæ pendent præ-  
longæ, teretes, densæ, & cum maturitatem sen-  
serint, colore in rubrum nigricante. Hæ nigra,  
dulciq; replentur medulla, leni ac lento cre-  
mori simili, non tamen vt in ossibus conti-  
nua, sed cæbris lignosisq; membranæ distincta.  
Inhaeret vnicuique membranz semini durum,  
siliquarum semini adfectu simile, vt alterum ab al-  
tero discerni non possit, ex quo cum non cre-

rasse putauimus, qui crediderit, has plantas esse  
congeneres: Eligenda est, quæ ex Memphis, &  
Alexandria Aegypti conuehitur, non admodum  
CASSIA SOLVTIVA.  
crassa, pellucens,  
recens, grauis, far-  
cta, & quæ conuul-  
sa, inclusis semini-  
bus minime consti-  
pescit. Pulpa exal-  
facit, & humectat  
ordine primo. Ea-  
demlenit, resolu-  
it, sanguinem munda-  
t, bilisq; feruo-  
rem extinguit: alu-  
um item cômô-  
ditimè citat, eius-  
que vitæ ventricu-  
lum non pertran-  
sit, quod propter se-  
curissimè datur à  
medicis inchoati-  
bus febribus, aliis-



que calidis morbis ante venæ sectionem, quod  
tantum ventriculum repurget, & aluum emol-  
liat. Nocet tamen intestinorum imbecillitate  
affectis, & his, qui admodum lubrici sunt: alias  
omnino habetur innoxia. Tollitur id noxæ ad-  
missis myrobalanis, rhabarbaro, nardo, & mas-  
tiche. Consipatis si detur, augenda est eius fa-  
cultas iis, quæ magis eadem vi pollent: proin-  
de sunt, qui addant amygdalinum oleum, &  
psylli spissamentum. Vrinæ difficultatibus mi-  
rifice auxiliatur, si cum vrinam citantibus me-  
dicamentis hauriatur, vel deuoretur. Aegre al-  
uum excernit: itaq; propter nonnulli robo-  
rant eius vires, addito hyssopo, vel caprino sero. Bi-  
lem, & pituitam excernit, nullo sane incommo-  
do: peccus, & fauces mulcet, & eorum inflam-  
mationes resoluit: renes a calculis, & sabulo ex-  
pedit, præsertim si cum glycyrrhizæ decocto,  
aliove medicamentis vrinam citantibus bibatur.  
quinetiam frequenter deuorata calculos rena-  
sci prohibet. Admodum præter hæc calidis con-  
fert febribus. Carterum exterius illita erysip-  
elas extinguit, cæterisq; inflammationes, quæ cu-  
tetenus emergunt. Sunt & recentioribus medi-  
cis, qui eam nunquam suis ægrotantibus ex-  
hibeant, nisi picæ puluerem admisceant, quod  
consule fauillum existimo: præsertim vbi ven-  
triculi, & intestinorum imbecillitas adsit. Quæ  
Græcis κακία. Latinis item Cassia nominatur:  
Arabibus, Selicha, Selche, aut Selibacha: Italis,  
Cassia, atque etiam Italarum vulgo Cannella:  
Germanis, Zimmet seu Zimmet roerlin: Hi-  
spanis, Canela: Gallis, Canelle. Quod verò  
Græci κιννάμωμον, Latini quoque Cinnamo-  
mum dicunt: Arabes, Darfeni: Itali, Cinnamo-

Nomencl.

Anomomum, AMOMUM.

CAP. XIII.

AMOMUM exigue fruticat, ex ligno  
 fe conuoluens in racemi modum, flore,  
 ceu candida violæ, paruo, foliis bryo-  
 niæ similibus. Laudatur quàm maximè  
 Armeniacum, colore ad aurum ver-  
 gens, ligno subrufo, abunde odorato.  
 Medicum, quoniam in campestribus,  
 & aquis enascitur, infirmus esse con-  
 stat, est autem magnum, subviride, ta-  
 ctu tenerum, frutice venoso, odore ori-  
 gani. Ponticum verò subrufum, paruum,  
 fragile, racemosum, fructu turgens, &  
 odore nares feriens. Deligito recens,  
 candidum, vel subrubrum, quod nec ad-  
 strictum cohareat, nec conuoluatur, sed  
 solum diffundatur, semine plenum,  
 vuis parvis simile, graue, valde odora-  
 tum, modò cariem non contraxe-  
 rit, acre, gustu mordens, simpli-  
 ci colore non euariante. Vim ha-  
 bet calfaciendi, adstringendi, exiccandi.  
 Somnū allicit: illitum fronti, doloris  
 sensum aufert: inflammationes, & mel-  
 liceridas concoquit, discutitque, iuuat  
 quos scorpis percussit, ex ocimo illi-  
 tum, & podagricis confert, inflamma-  
 tiones oculorum, viscerumque lenit ex  
 vua passa, ad vularum vitia in pelsis,  
 aut in fessionibus vtile est. Decoctū io-  
 cineri, renibus, podagræ, potu conue-  
 nit. Antidotis immiscetur, & pretiosis-  
 simis vnguentis. Adulteratur Amomū  
 herba simili, quæ Amomū vocatur, sed  
 sine odore sine fructu. Nascitur in Ar-  
 menia, flore, origani. Quare in huiusce-  
 modi rerum probationibus fragmēta  
 fugienda sunt, eligenda autem, quæ ab  
 vna radice suos integros furculos e-  
 mittunt.

*Anomomum*  
*confiteretur*  
*100.* TANTA medicorum, qui nos præceperunt,  
 in simplicium medicamentorum historia, & fa-  
 cultatibus ignorantia, segniterque extitit, ut nisi  
 Deus opt. max. acerrimi, & ferè diuini ingenii  
 viros, hac ætate nobis prodixisset in lucē, qui  
 præter id, quod vniuersam medicam facultate  
 ab erroribus sine innumeris expurgauē-  
 rim, eademque illustrauerint, vera quidem sim-  
 plicia medicamenta inuelligarunt, minimè pro-  
 teſſo verendum fuerat, quin paruo temporis  
 traciū ars medica penitus subuerſa, extinctaq;

remanſſet. Et certè ſi longiori tempore res ige-  
 ſe habuiſſet, nulli dubium eſt, quin huiusce  
 facultatis cognitio in auram euolaſſet. quando-  
 quidem hæc peſſis radices tam in altum fixe-  
 rat, ac tam late ſe diſſuderat, ut timere non  
 nulli ingenio, & doctrina præſtantes plurimum  
 inſudauerint, omnēque ſtudium, & operam  
 quàm diligentiſſimè impenderint, quo errores,  
 qui ignavia & negligētia emerſerant, à re me-  
 dica excluderentur, eos tamen hæcenus ra-  
 dicibus euellere nequiverunt. Siqui dem nō de-  
 ſunt, qui (quantiſ hæc percipiant rationes)  
 malint ſuos proſequi abuſus, cūni ex parte  
 deſeſtandos, quàm cādidiffimæ inhærere veri-  
 tati. Quo ſit, ut vni cum aliis innumeris ſim-  
 plicibus medicamentis etiam legitimum Amomom  
 careamus. Cuius vice quidam ſilpium  
 impoſtores ex Gargano Apuleiæ monte pro-  
 ſeſti, pumilum quoddam ſemen ſupponunt,  
 colore nigro, odore melanthii. Quod cū tan-  
 tillum aromatis reſpiat, & guſtu acri deprehen-  
 datur, excogitarunt, ut facilius ipſum corrade-  
 rent, in hominum animis inducere, id procul  
 dubio legitimum eſſe Amomum. Quod ta-  
 men (ſi Dioſcoridi fides eſt adhibenda) ſe-  
 men edit vuarum racemis ſimile, non autem  
 minutum, quale illud viſitur. Inſuper mihi fa-  
 nè non conſtat, Dioſcoridē ſemē in Amomo  
 approbaſſe, ſed potius ligneam arbuſculæ ma-  
 teriē, ut in cinnamomo & caſſia videre eſt. quo  
 ſit, ut legitimum amomū lignū potius, quā ſemen  
 exiſtimauerim. Sed & turpius aberrat, q Sera-  
 pionis interprete decepti, herbam Pedem co-  
 lumbinū quibuſdam vocatam, quæ gerani-  
 præ ſe fert ſpeciem, Amomum eſſe conten-  
 dunt, & in Amomi locum ſubſtituunt, nullam  
 de his herbis inquirentes. Cæterum Amomom  
 quod iure probari poſſit, nullibi (quod ſciuerim)  
 in Italia prouenit, nec cō aliunde  
 tranſlatum hæcenus videre potui. Neque pro-  
 pterea vulgare pro eo ſupponendum eſſe cen-  
 ſeo: quippe de incognitis periculum facere nec  
 decens eſt, nec tutum. Sed potius Galeno nos  
 gerendus fuerit, qui acoro, & Amomo vires  
 conſimiles tribuit. Acorum irque locum Amomi  
 ſupplere poterit. Porro & hi omnino ex-  
 plodendi ſunt, qui pro certo aſſerere non ve-  
 rentur, tam ſilpium eſſe Amomum, quam Hieri-  
 cantam à Hierico Palæſtina oppido appel-  
 lant. Plantam hanc plerumque ad nos è Hierico  
 deſerunt ii, qui ad ſanctiſſimum EDEMONTORIS  
 noſtri ſepulchrum peregre proficiſcuntur. Ea enim eſt,  
 quàm noſtræ mulieres roſant diuæ Mariæ vocant. Conſtat hanc  
 Amomum non eſſe, quodd ſolia albæ viris non profe-  
 rat, nec vliſo ſpiret odore. Legitimum enim val-  
 de odoratum eſt, adeo ut nares feriat prima  
 ſtatim occuſu, originumque reſpiat. Cordus li-  
 bello de conſiderandis phar-macis ſitis incon-  
 ſtanter de Amomo diſſeruit. quippe in cōpoſi-  
 tione aureæ Alexandrinæ pro certo aſſerit Amomom  
 verum eſſe roſam Hiericantis: in cōpoſita

Amomum  
ſilpium.Scorpi-  
nis inter-  
pretis la-  
pſum.Error quo  
vniuerſam.

positione verò theriacæ, sui ipsius oblitus habere nos Amomum negat. Vtuncur Hiericun-  
ta nostras mulieres tempore partus ad inue-  
stigandam pariendi horam. quandoquidem (vt  
ipse fatetur) in aquam demissa non prius fa-  
tiscit, quam foetus nasci incipiat: tanta inter  
christificolas irrepit superstitio. Fuchsius medicus  
hæc nostra ætate celebris in libro de compo-  
nendis medicamentis, quem nuper locupletatum  
edidit, dum ea simplicia examinat, quæ  
Theriacam ingrediuntur, eò productus, vbi  
Amomi racemosi carmine meminit Andromachus  
senior, omnes Galeni interpretes insinuat  
his verbis. Βοτρυος) Græcè est *botrys*. In  
hæc voce interpretanda omnes Galeni, qui  
hanc compositionem tradidit, interpretes hallu-  
cinati sunt. Siquidem Andernachus libro primo  
de antidotis, vix conuertit illas omnes, & cum  
illis Cordus, racemosi, *botrys* vocem cum  
Amomi dictione, quæ præcedit, coniungentes,  
quasi vero Andromachus de Amomo racemo-  
so locus sit: quod certe Dioscorides non  
*botrys*, sed *botryoides* appellat. Separandæ igitur hæ  
duæ dictiones per interitum coma erunt,  
hoc nimirum modo, *botryoides botrys*, vt nos con-  
uertimus: vt intelligamus Andromachum de  
duabus inter se differentibus herbis esse locu-  
tum, nempe Amomo, & botry. hæc ille. Ex qui-  
bus vtrique abunde liquet Fuchsiu sensisse,  
botryn quoque herbam, de qua Dioscorides  
agit libro tertio, in theriacam addendum esse.  
Veruntamen in hoc nos à Fuchsiu, viro alio-  
qui doctissimo, plane dissentimus: quandoquid-  
em Andromachum non botryn, sed amomum  
racemosum intellexisse putamus, idque non sine  
rationibus, & coniecturis. Et ne longe pro-  
grediamur, in primis Andromachus ipse senior  
Fuchsiu aperte refragatur: illum enim non in-  
uenio in suis carminibus, & quæ libro primo  
de antidotis in Galeno leguntur, aliter de amomo  
cecinnisse, quam *botrys* *botryoides* *botrys*. quæ  
quidem duæ dictiones non ita separari possunt, vt  
Fuchsius opinatur: neque prius illud vnquam  
significabit, quod idem perperam accipit. Ad  
hæc non minus, quam senior, nostræ sententiæ  
adspicari deprehenditur iunior Andromachus:  
vixit enim in tradenda theriacæ compo-  
sitione, quam soluta oratione descripsit, nisi  
quam (quod equidem legerim) botryn com-  
memorare, sed amomum tantum. Quod etsi Da-  
mocrates in eadem antidoto describenda car-  
minibus, quæ loco citato à Galeno referuntur,  
cecinnit *botrys* *botryoides*, hæc tamen duæ dictio-  
nes non sunt temere, meo iudicio, separandæ:  
nam eas autor consilio coniunxisse videtur.  
Quid præterea de Galeno dicemus? etenim is  
quantum libro antè dicto sigillatim enume-  
rat, ac diligenter expendit simplicia medica-  
menta, quæ in theriacam adduntur, tamen nus-  
quam (quantum inuenierim) botryos men-  
tionem facit: neque etiam eius meminit de the-  
riacæ ad Pamphilianum scribens. quid, si ean-

dem plantam apud Galenum in simplicium  
medicamentorum censu desiderari omnibus  
notum est. Addam illud postremò quod inter  
recentiores Græcos Paulus, & inter Arabas  
Auienna botryn herbam theriacis non in-  
ferunt suis. Quæ sanè omnia nostram augent, &  
confirmant opinionem. Cui si illud obiciat Fuch-  
sius quòd Nicolaus Myrepsus in sua theria-  
ca botryn Gallicam habeat, respondebo ego,  
quòd Nicolai codex Græcus deprauatus est, &  
innumeris scate mendis: id quod ipse Fuchsius  
non negabit, quòd idem de Nicolai codice se-  
penumero polliceatur. Ex his itaque satis ma-  
nifestum fieri arbitror, quòd vt Fuchsi senten-  
tia, quæ theriacæ botryn adiciere contendit,  
refellenda est, ita Galeni interpretes, qui Amo-  
mum racemosum vertunt, probandi sunt, vt  
qui sint cum Andromacho Dioscoridem secu-  
tis: is enim Amomi Pontici notas perscringens,  
ipsum racemosum fecit, vt supra in eius men-  
tione legimus. Amomi meminit Galenus libro  
v. i. simpl. med. sic inquit. Amomum acoro  
similem facultatem obtinet: nisi quòd acorum  
siccius sit, maiore autem concoquendi faculta-  
te Amomum. Hoc Græco nomine *amomum* di-  
citur: Latino item Amomum: Arabico, Hame-  
mis, aut Hamama: Italico, Amomo.

Kiv. COSTVS. CAP. XV.

PRÆCELLIT Arabicus, candi-  
dus, levis, eximia odoris suauitate. Sec-  
undum locum sibi vendicat Idicus,  
levis, vber, vt ferula niger. Tertius est  
Syriacus, grauis, colore buxeus, & odo-  
re feriens. Optimus est recens, albus,  
abunde plenus, densus, aridus, & te-  
redinibus non erosus, sine graucolen-  
tia, gustu calidus ac mordens. Vix ei  
excalcatoria: vrinam ciet: menses pel-  
lit: vitiis, quæ vuluam malè habent,  
tam impositum, quam fotu, & fuffitu au-  
xiliatur: Còtra viperarum morsus sex-  
tantem bibere prodest: item aduerfus  
pectoris dolores, conuulsa, inflationes  
que ex vino & absinthio: venerem ex  
mulso stimulat: latus ventris tineas ex  
aqua pellit: horribus ex oleo ante fe-  
brium accessiones, & neruorum reso-  
lutionibus oblinitur: vitia cutis in fa-  
cie, cum aqua, vel melle illitus, emen-  
dat. Additur in antidota, & malagma-  
ta. Sunt qui, admixtis helenij Comage-  
nij præuris radicibus, adulteret. Quod  
deprehenso facile est, siquidem neque  
gustu seruet helenium, neque validum  
odorem vibrat, vt caput tètare possit.

COST

Amomi  
Gires ex  
Galeno.

Nomina.



*Costi com-  
sideratio.*

**COSTVS**, quo vsæ sunt officinæ per longas ætates, in amarum, & dulcem diuidi solet: tametsi tum Dioscorides, tum etiam Plinius nec dulcis, nec amari meminerint, sed nigri duntaxat, & albi. Galenus quidem scribit leuiculam Costo inesse amaritudinem: sed qui inter Græcos scripserit Costum inueniri dulcem, hæcenus compertum non habeo: quamuis Mauritanii, & eos secuti, dulcis, & amari

**PSEUDOCOSTVS**.

quandoque mentionem fecerint. Qui in myropoliis passim habetur, adulterinus est, quippe nec vlla odoris suauitate commendatur, nec gustu adeo acris deprehenditur, vt admodum exulceret, vt Galenus inquit. Proinde medicamentis, quæ Costum excipiunt, non erit, meo iudicio, imponendus, cum præterea nos plantæ læret, cuius nam plantæ sit radix. Porro non desunt hodie impostores, qui ex Gargano Apuliæ montem quotannis ad nos conuehant Pseudocostum, cuiusdam radices, amari saporis, quæ facie quadamtenus Rhodiam radicem representat. Eas autem pro legitimo costo vendunt nostratibus pharmacopoliis, iis præsertim, qui in rei herbariæ cognitionem negligentius incumbunt. Plantam nos habere, & arque etiam depingi curauimus (ea enim alioqui non est vulgaris indicanda) vt ex eius imagine, quam hic damus, discant imperiti cuius plantæ sint radices illæ. Hinc fortasse fiet, vt si illi imposturam hanc omnibus cognitam esse intelligent, eam desinant posthac facere. Inuenitur Costus (vt audio) apud quosdam Venetis, sed admodum rarus, quem legitimi notas habere aiunt. Verum cum hæcenus talem non viderim, non est, cur eum probem, vel improbem. Ceterum seplafarii, si legitimum consequi nequeunt, à pseudocostis abstinere, & Galenum, vel auctorem illum sequantur: qui, si Costus defecerit, ammoniacum, vel helenium supponi iubet, erit enim eis hoc situs, quam vt adulterino. Sed quidam adeo fas pandentis, & luminaribus addicti sunt (quæ est eorum tum inscitia, tum pertinacia) vt nullis vnquam auctoritatibus, atque rationibus suaderi possint, vt veterem semitam penitus detestandam linquere velint, quæ plerumque est ægris detrimentum, & sibi, & medicis decori. Sunt insuper, qui Costi loco Angelicam recentioribus vocatam supponendum existiment, quorum sententiam magis probandam censerem, quam eorum, qui pseudocostis vtun-



*C. As qua  
Sicem sup  
pleant.*

tur. Costum enim hæc radix non obscure refert: quandoquidem eximia illa odoris suauitate tam iucunde spirat, vt angelicæ nomen sibi merito vendicasse videatur. Acris præterea est, nec amaroris omnino expers. Quapropter eos haudquaquam damnandos putauerim, qui Angelicam Costi genus esse crediderint. Costi vires scribit Galenus libro v. 11. de simplicium medicamentorum facultatibus, sic inquit.

*Costi Si-  
res ex Ga-  
lene.*

Costus leuiculam plantæ amarā, plurimam autem acrem, & calidam in se qualitatem simul & facultatem continet, adeo vt etiam exulceret. Vnde ipso cum oleo perfricant corpus ante accessionem in rigoribus per circuitus redeuntibus. Sic verò etiam in resolutis, & ischia diuis, atque in summa in quibus exalfacere partem quamuis, aut ex alto in superficie extrahere aliquem humorem est opus, ad costum confugitur. Eadem de causa vrinæ, mensis que prouocat: & ad rupta, conuulsis, ac laterum dolores conuenit. Porro ob amaritatem, quæ illi inest, lumbricos latos enecat. Ob eandem & ad contractas velut ex sole maculas, ipsas Græci vocant, cum aqua, aut melle vsurpant. Inest item flatuosa quædam illi temperiei humiditas, per quam & venter excitat cum vino mulso. *K&g* ita Græcè nominatur, quemadmodum Latine Costus, Arabicè Kostos, siue Cast, & Italicè Costo.

*Nomina.*

*Σκινθὶς ἀρμακίνη.*

**IVNCVS**

**ODORATVS**

**CAPVT XVI.**

**ODORATVS Iuncus** in Africa, & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa: proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitum: pessimum ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguā. Floris, culmorum, radicisque est vsus. Vim vrinæ ciunda habet: menses pellit, discentit inflatione, caput aggrauat, modicè adstringit, comminuit, excoquit, ac venarum spiracula laxat. Flos eius in potu vtilis sanguinem reicientibus: doloribus stomachi, pulmonis, iecinoris, & renum, miscetur antidotis. Radix adstringentior est: ideo fastidiis stomachi, hydropicis, conuulsis, drachma vna cum pari pondere pipæris, per dies aliquot datur. Decoctum vuluæ inflammationibus, ad desiderantium fatus, vtile est.

**IVNC**

IUNCUS ODORATUS.

Iunci odorati confectio.



IUNCUS odoratus officinis Squinanthum vocatur. Quæ vox, quantum deprauare, ex plantæ, & floris nomine componitur, in vnam vtriusque iunctis dictionibus. Namque squinanthum si ad rectam etymologiam referatur, non aliud inferet, quam duas hæc Græcæ dictiones *σκήν* & *άνθος*, quæ Latine florē iunci

significant: *σκήν* enim iuncum, *άνθος* verò florem Græcis designat. Veruntamen flos ad nos non importatur. quod tamen mirum non est, cum etiam Galeni tempore non haberetur. Proinde inquit libro primo de antidotis. His præterea Iuncum odoratum ex Arabia aliatum immitti præcipit, quæ nescio quomodo schœni anthos, id est, iunci odorati florē multi vocent, cum nobis floris copia non adeo suppeditetur. Nam etsi tota aduehatur herba, sunt tamen eius superiores partes à camelis sepe depastæ: vescuntur enim ea, & delectantur maxime. hæc Galenus. Quæ (si licet nobis dicere quod sentimus) porius ridenda, quam probanda videntur. Arduum quippe fuerit credere, tam ingentem esse camelorum numerum, qui locustæ modo in vniuersum schœni flores depascantur, ut nulla penitus supersit planta, cui flos non deuoretur. Referunt quidam nasci odoratum Iuncum etiam in Apulia, quin & in Campania provenit, ut Brasauolus inquit Plinius auctoritate. Sed vereor, ne hallucinentur, quod nec inde flores afferatur, nec palæ: neque etiam id Plinius afferant afferat. Is, quo Sepalsarii passim vtuntur, non afferit aliunde, quam ex Alexandria. Cæterum non parua quidem diligentia, dum emittit, est adhibenda, quandoquidem non desunt impostores, qui ad merces augendas, schœnum palearum, & herbarum quibusdam festucis adulterent. Præterea videndum est, ne vetustate exoleuerit: facile enim (vt in libro de antidotis docuit Galenus) ab hoc vis omnis euane-

Monachorum opinio explorata.

nulloque; rosarum odore fragrare, si manibus conficuntur: nec postremo iuncum aliquem proferre, sed calamos geniculis interceptos tritici, vel hordei modo. Quia in re (pace eorum dixerim) dupli error: notantur, primū quod Dioscoridē oscitantur legerint: deinde quod illud affirmant, quod experimento procul dubio falsum esse deprehenditur. Quod autem Dioscoridē oscitantur legerint, cū dicunt schœnum, iuncum proferre, non calamum, facile patet, quandoquidem contrarium scribit Dioscorides, ubi schœni vsum reddit his verbis. *χρίαν* & *άνθος*, *νέσος* *μαλίσκου*, *νέσος* *πίπης*. id est. Vfus est flos, calamorum, & radicis. Præterea quod communis vsus schœnos acrimoniam non habeat, pariter falsum est. quippe, vt experimento quotidie comprobari potest, qui non longo tempore consenuerit, linguam manu vellicat. Quibus palam est, Monachos vel nunquam schœnum degustasse, vel si degustauerint, illum adeo vetustate exoleuissse, vt (quemadmodum Galenus inquit) omnem acrimoniam, odoremque amiserit. Quod autem nostri schœni radices tenues sint, nihil ad historiam refert: siue enim tenues sint, siue crassæ, eas non descriptit Dioscorides. Schœni flores ex Alexandria vnā cum integra planta allatos ego in manibus habui, qui digitis attriti rosarum odorem emittebant. Quamobrem non temere contra Monachorum sententiam affirmandum putauerim, communis vsus schœnum legitimum, & probatissimum esse. Sed iiquidem adhuc magis reprehendendi videntur (non tamen vt eorum dignitatis aliquid derogetur) quod in Diagalangæ compositione scripserint, radicem galangam vocatam legitimum esse schœnum, ipsamque galangam ad nos non afferri. quod prorsus à vetustate alienum deprehenditur. Cæterum & in hoc pariter Fuchsium errasse crediderim. quippe qui scripserit sua in methodo, schœni anthi stipites nullam acrimoniam mansu relinquere, Schœni vires rati vires prodidit Galenus libro v. i. i. simp. med. ubi sic habet. Schœni anthos modicè calcitræ, modicèque etiam adstringit, nec planè à tenuitatis natura alienus est. Quocirca his de causis vnam mouet, mensisue diet adhibitum siue in fomentationem, siue in potionem. prodest & iccoris, & stomachi, & venteris inflammationibus. Magis eo astringit radicem. Quod verò florem vocant, calidius est. Porro in omnibus sui partibus, in aliis magis, aliis minus, gustantibus apparet adstrictio, proinde medicinis, quæ hæmoptoicis, siue sanguinem reicientibus exhibentur, commiscetur.

Fuchs. la-  
p. sus.

Iunci odorati vires ex Gal.

*χρίαν* & *άνθος*, Græcis: Iuncus odoratus, Nomina. Latinis: Adcher, Arabibus: Giunco odorato, & Squinantho, Italis: Rumelstro, Germanis: Paya de la Mequa, siue Paya de chamello, Hispanis: Pasture de chameaux, Gallicis nominatur.

CALAMVS ODORATVS.  
CAPVT. XVII.



CALAMVS  
odoratus in In-  
dia nascitur.

Melior est ful-  
uus, densè ge-  
niculatus, &  
qui assulosè frā-  
gatur, plena a-  
raneorū fistu-  
la, albicans, len-  
tus in mandē-  
do, & adstring-  
gens, cum ali-  
quāta acrimo-

nia. Vrinam potu ciet: quare cum gra-  
minis, aut apij semine coctus, in aquæ  
subter cutem fusæ morbo, renū vitiis,  
stillicidio vrinæ, ruptisq; cōmodè bi-  
bitur: menses & potu, & appositu pel-  
lit: tussi suffitu medetur per se, aut ex  
resina terebinthina, hausto per arun-  
dinem fumo: ad muliebres infestus deco-  
quitur, & clysteribus imponitur. Ma-  
lagmatis, & suffitionibus odoris  
gratia commiscetur.

*Calami o-  
dorati hi-  
storia ex  
Theo.*

CALAMVS, & Iuncus odoratus (vt Theo-  
phrastus est auctor lib. 1. x. cap. v. i. de histo-  
ria plantarum) trans Libanum montem, inter  
ipsum Libanum, & alium quandam montem  
paruum valle minima exeunt: non, vt quidam  
dixere, inter Libanum atq; Antilibanum. In-  
ter quos campus amplissimus, & pulcherrimus  
est, quem Aulonem appellant. Quā verò ca-  
lamus, & iuncus proveniunt, lacus in amplum  
spatiatur, iuxtaq; eum palustris siccatis isti  
assurgunt. Occupant locum plus quam triginta-  
stadiis. Virides nequaquam esse videntur,  
sed siccæ: forma verò nihil ab aliis differunt.  
Locum ingredientī protinus odor aspirat, non  
tamen longius spirat, vt quidam referunt. Hic  
enim locus à mari plus est, quam stadia cen-  
tum quinquaginta. Sed in Arabia aspirationē  
agri odoratissimæ esse inter omnes constat.  
hæc de Calamo Theophrastus. Cui etiā sub-  
scribit Plini. lib. x. i. cap. x. x. i. vbi sic ha-  
bet. Calamus quoque odoratus in Arabia na-  
scens communis Indis, atque Syriæ est: in qua  
vincit omnis à nostro mari centū quinquaginta  
stadiis. Inter Libanū montem aliumq; igno-  
bilem, non (vt quidā existimauere) Antiliba-  
num in cōualle modica iuxta lacū, cuius palu-  
stria æstate siccantur, tricenis ab eo stadiis ca-  
lamus & iuncus odorati gignūtur. Nihil ergo

à cæteris sui generis differūt aspectū. Sed Ca-  
lamus præstantior odore statim è longinquo  
inuitat, mollior tactu, meliorq; qui minus fra-  
gilis, & qui assulosè frangitur. Inest fistula ara-  
neum, quod vocant florē. Præstantior est, cui  
numerofius: reliqua probatio, vt integer sit.  
Damnatur alibi. Melior quo breuior, & cras-  
sior, lentusq; in frangendo. hætenus Plinius.  
Sed certè satis palam esse arbitror (vt in acori  
commentariis diximus) quā magno ducatur  
errore Brasauolus Ferrariensis, quod tam fa-  
cile sibi persuaserit, legitimum odoratum Ca-  
lamum illam esse radicem, quæ temerè omni-  
bus in pharmacopolis illius vicem explet,  
quamq; verum esse eorum superius pluribus  
rationibus comprobauimus. Quandoquidem  
primum ex ipsa Calami appellatione, deinde  
ex eo, quod dixerint Theophrastus, & Plinius  
non differre hunc formā à reliquis sui generis,  
id est, ab omni arundinum genere, vtiq; con-  
stat odoratum Calamū genere, & forma arun-  
dinem præ se ferre, odoratam tamen, non au-  
tem esse radicem. Quocirca Plinius Dioscori-  
dem fortasse secutus, dixit. Fistulæ (hoc est ca-  
uitati) inest araneū, quod vocant florē: non  
autē rad'ci, vt falsò contendit Brasauolus, ara-  
neum illud inueniri in vulgari illo officinarū.  
Ad hæc Plinius lib. x. x. i. i. i. cap. x. i. dum  
plura arundinum genera, & vires recenset, idē  
apertissimè ostendit, his verbis. Arundinis  
genera x. x. i. x. demonstrauimus, & non aliter  
euidentiore illa natura, quā cōtinuis iis vo-  
luminibus tractauimus. Et quoniam plura ge-  
nera fecimus, illa, quæ in India Syriæq; nasci-  
tur, odorum vnguentorumq; causā, vrinā mou-  
et cum gramine, aut apij semine decocta: cit  
& menstrua admotu: medetur conuulsis duo-  
bus obolis pota, iocinori, renibus, hydropi,  
tussi etiam suffitu, magisque cum resina. hæc  
Plinius. Sed præterea vulgares calami radi-  
ces, quas acori esse censemus, assulosè nequa-  
quam frangi possunt, sed transuersim, quem-  
admodum & iridis. Quo fit, vt eorum inno-  
tescat lapsus, qui Calamum odoratum radi-  
cem esse contendunt, qui tamen (vt apertè  
ostendimus) nil aliud est, quā arundo. Cæ-  
terum si quispiam dixerit, has radices, qua-  
rum est visus, esse calami odorati proprias, non  
acori, illud sanè argumentum destruit, quod  
inuentibus euidenter apparet. quandoqui-  
dem etsi cōplures illius acori radices habeant-  
ur, quæ sicca gerunt in cacumine folia, iridi  
omni ex parte similia, nulla tamen vsquam  
inuenta est, quæ secum arundinis trunculum  
cacumini annexum deferat. nempe acori pro-  
prium, non odorati calami est, iridis folia  
ferre. His itaque rationibus Fuchsi quoque  
sententia improbanda mihi videtur. quippe  
qui putauerit in sua methodo, vulgarem officina-  
rum calamum verū odorati calami esse radi-  
cem. Porro minimè quidem compertum ha-  
beo, Dioscoridem, nedum Galenum, qui ex  
odor

*Brasauoli  
error.*

*Fuch. opi-  
nio impro-  
bata.*

odoribus, ac saporibus vires aequè, ac qualitates omnium simplicium medicamentorum accuratissimè inuestigauit, dixisse aliquid odorato Calamo inesse amaritudinis, quam tamen in acoro haberi Galenus prodidit. Qui Calami odorati vires pluribus descripsit libr. v. 111. simpl. medicamentorum, sic inquit. Calamus odoratus leuciculum quandam adstrictionem, ac minimà acrimonià possidet: magna ex parte essetia eius terrena est, & aërea, in calidi-  
 10 tatis frigiditatisque coniugatione reperiata. Quà- obrem moderatè urinà mouet, & facultatibus, quæ iecori, & stomacho imponuntur, misceri potest. tum in fomenta quoque vteri, quæ phlegmonis gratia, aut irritandis mensibus assumuntur, vtiliter admiscetur. Ponatur itaque, habeaturque secundi ordinis eorum, quæ exalfaciunt, & de-  
 20 ficiant valentius tamen deficiant, quam exalfaciant. Inest quoque ei quædam partium tenuitas, velut aliis omnibus odoratis. Ceterum illorum compluribus tenuium partium plurimum, calamo verò non multum adest. hæc Galenus. Quibus faciliè patet, Calamum officinis vocatum, legitimum esse nequaquam: maior enim illi inest acrimonia, quam suo referat Galenus. Eaque propter legitimum calamo odorato nos  
 30 esse hoc æuo destitutos fateri nò dubitauerim: id quod etiam aliquibus satis persusum esse puto. Nam propterea sunt qui libellum secuti de substitutis medicamentis falsò (vt mea quidem fert opinio) Galeno adscriptū, sphagnum, id est, mnsium arborem, calami odorati loco supponendum esse velint. Quam equè dem sententiam vt hæcenus probaueram, ita etiam hie ris mandaueram. Nunc autem quoniam illud mihi absurdum videtur, quòd ea medicamenta inter se commutari debeant, quæ contrariam fa-  
 40 eultatem sortita sunt, cuiusmodi esse deprehenduntur calamus odoratus & sphagnos, ideo non temerè cogor mutare sententiam, atque ab illis desciscere. Sed quid pro calamo odorato rectè substitui posse credamus, alibi, Deo còcedente, explicabimus. Eius nomen Græcum est κάλαμος ὀδωρῶν. Latinum, Calamus odoratus: Arabicum, Hafabel, aut Casib aldatira: Italicum, Calamo odorato.

## BALSAMVM. CAP. XVIII.

BALSAMVM arbor albæ violæ, lycij, siue pyracanthæ magnitudine conspicitur. Foliū rutæ proximum, longè candidius, perpetuò virens. In Iudæa solum quadam valle, & Aegypto nascitur: his differens modis, scabritia, proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui, & capillacea coma est, theristū vocant, quasi demessile: fortassis quoniam ob  
 50 gracilitatem facile demeratur. Aestiuus sub ortu canis ardoribus, arbor vn-

guibus ferreis inciditur, manátque è plaga succus, quem Opobalsamum vocant: sed tam exiguo stillatu, vt annis singulis, ne plures quidè, quàm seni septénive congij cogantur: inibique pondus duplo rependitur argento. Succiprobatore est, vt sit recens, validi odoris, syncerus, non ad acorem vergens, dilui facilis, læuis, adstringens, ac modicè mordens gustu. Sed variè viuitur, misto ab aliquibus terebinthi, cypri-  
 10 tifici, balani vnguento: item fusino, metopio, melle, aut Cypria cera liquida. Quod maleficium faciliè deprehenditur: nanque merus in lancam vestem fusus, neque maculam facit, neque si eluatur, notam relinquit: vitiatum autem inheret, & lac instillatus coagulat, quod adulteratus non efficit. Quinetià syncerus in aqua, aut lacte celerrimè liquatur, colorèque lactescit: vitiatum verò oleimodo innatat, se còuoluens, aut in stellæ modū diffundēs. Syncerus senescēs crassescit, deteriorque redditur. Hallucinantur, qui aqua concretū pessum ire, & ad ima fidere arbitrantur: postea dissipatū supernatare. E ligni genere, quod Xylobalsamū vocat, probatur recēs, sarniæto tenui, fuluū, odoratum, quadatenus opobalsamū spirās. Necessarius etiā seminis erumpit vsus: quare eligatur flauū, plenū, grāde, ponderosū mordens gustu, feruens in ore, modicè opobalsamū olēs. Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, viriū ignauia, sapore piperis. Efficacissima vis inest succo, & quā maximè calfaciēs: abstergit quæ tenebras oculorū pupillis offūdūt: medetur per frictionibus vuluæ cū rosaceo cerato ap-  
 20 positus: mēses quoque, secūdas, & par- tus extrahit: horrores illitu discutit: vl- cera sordida expurgat: & cruda concoquit: urinam potu ciēt: agrē spirātibus prodest: datur in lacte contra aconitu haustum, aut serpentium ictus. Miscetur acopis, malagmaris, & antidotis. In sūma præcipua authoritas succo, se-  
 30 cunda

Calami odorati vires ex Galeno.

Nomina.

cunda semini, minima ligno. Semen cō  
modē potui datur doloribus lateris,  
pulmonum vitiis, tussi, ischiadicis, co-  
mitialibus, vertiginosis, orthopnoicis,  
vrinæ difficultati, torminibus, ac ser-  
pentium moribus: ad muliebres suffi-  
tus perquam vtile est: vluam aperit  
in defensionibus balnearum decoctum,  
& humorem euocat. Lignum eadem  
habet vires, aliquātō minores. Ex aqua  
potum cruditatibus, torminosis, vulsis  
venenatorum ictibus opitulatur: vrinā  
cit: ad capitis vulnera cum sicca Iri con-  
uenit: squamas ossium extrahit. & ad  
vnguentorum spissamenta additur.

*Balsami  
considera-  
tio.*

ANTIQUITAS Balsamum (vt Plinius li-  
bro xii. cap. x x v. est auctor) in duobus tan-  
tū hortis, vtroque regio, altero iugerum vi-  
ginti non amplius, altero pauciorum vni terra  
rum Iudææ concessum erat. Sed postea propa-  
gata admodum fuit species, cū Iudæa ipsa si-  
mul cum balsamo. Romani potiti sunt. Qui ye-  
luti politicarum pretiosarumq; rerum propa-  
gatores, tam dignam, & clarāq; stirpem raram  
esse non tulerunt. Itaque eam malleolis serēdo,  
atq; iterando non secus ac vites in collibus  
propagant, latius accreuerunt. Quocirca Iu-  
stinus quoq; hæc de Balsamo memoriæ prodi-  
dit. Opes genti Iudaicæ ex vesticulis opo-  
balsami creuere, quod in his tantum regionib;  
gignitur. Est naque vallis, quæ continuis  
montibus, velut muro quodam cincta ad instar  
castorum clauditur. Spatium loci ducenta mil-  
lia iugera, nomine Hierico dicitur. In ea valle  
sylua est & vbertate, & amoenitate arborum in-  
signis: siquidem palmeto, & opobalsamo distin-  
guitur. quanquam species huius insignis, ac pre-  
tiosæ arboris plurimum adaucta sit. hæc Iusti-  
nus. Scripsit Balsami historiam etiam Strabo  
lib. x v. i. suæ geographiæ, vbi sic habet. Hie-  
ricus est campus à montana quadā circūdatus,  
quæ in theatri speciem ad ipsum declinat. Hoc  
in loco est palmetum palmis abundans spatio  
stadiorum centum, & totum irriguum, & habi-  
tationibus plenum, vbi & regia est, & Balsami  
viridarium. Quæ arbor odorata est, & frutico-  
sa, cyris, & terebintho persimilis. Eius corticē  
vulnerantes, succum in vasis suscipiunt tenaci-  
lacti persimilem. Sed alibi etiam, quā in Iudæa  
nasci Balsamum eodem libro idem testat-  
ur, præter Plinii, & Solini sententiam, cū in-  
quit. Et apud Sabæos sunt, & myrrha, & cinna-  
momum nascitur: ora etiam Balsamum, &  
quædam alia planta valde odorata. hæc ille.  
Oriri etiam Balsamum in Arabia testis est Pau-  
sanias in Beoticis magnitudine fructus myrti,  
foliis maraci, sub cuius vmbra innumeræ apri-

cātur viperæ, & suauissimo eius liquore alun-  
tur. Sed quoniam modo sit factum (vt in Syriā  
peregrinantes vno ore fateantur) quod hoc tem-  
pore omnibus sanē Balsami plantis Iudæa sit  
penitus destituta, cū olim sola Balsami ferax  
à compluribus crederetur, quid certi dicam, &  
quibus auctoritatibus id comprobem, sanē non  
habeo. Verū cū certō sciam probatissimo-  
rum virorum testimonio, qui ex Italia soluētes  
pluries in Aegyptum nauigauerunt, Memphis  
Balsami viridarium extare, illud fortasse eue-  
nisse putandum est, quod ē Iudæa ab Aegypti  
regibus, quibus vniuersa subiiciebatur Syria,  
omne in vniuersum Balsamum eō fuerit trans-  
latum, quod decoris inde plurimum regiæ acce-  
deret. Quanquam Balsamum in Aegypto quo-  
que prouenire antiquorum monumentis man-  
datum est, vt ex ipso Dioscoride constat, atque  
etiam ex Galeno libro primo de antidotis, cap.  
1111. vbi de melle agit componendis antidoti-  
bus idoneo. Verū tamen diu est, quod in Italia,  
ne in totam dicam Europam, neq; lacryma, ne-  
que semen, neque lignum, neque cortex im-  
portantur, nisi adulteris, & imposturis vitiata.  
Cæterum non modō fuit id ætatis nostræ adul-  
terium, sed & antiquorum, vt auctor est Theo-  
phrastus: qui hæc de Balsamo lib. i x. cap. v i.  
de historia plantarum posteritatis memoriæ  
mandauit. Balsamum in valle Syriæ prouenit.  
Eius hortos duos tantū affirmant, alterum vi-  
ginti iugerum, alterum multō minore. Arbo-  
ris magnitudo, quæ malo punice magnæ: rami  
multifolium rutæ simile, candidum tamē, per-  
petuū virens: fructus similis terebintho tam ma-  
gnitudine, & figura, quā colore. Is quoque  
admodum odoratus est, & magis quā lacry-  
ma. Colligi lacrymam in caudicē, & parte su-  
perna tradunt, facta incisura vnguibus ferreis  
sub sydere, cū æstus maximē angit. Collectū  
verō æstare fieri tota. Sed quod manat, multū  
non est: vix enim toto die concham posse im-  
pleri odorem tamen inferri eximium, & copio-  
sum, adeo vt ex paruo spatium per longū odo-  
r valeat permeare. Verū syncerum ad nos nul-  
lum aduehi, sed quod mistum colligitur: pluri-  
mis enī mistionibus vitiari, quodq; Græciæ  
venditur. Ideoq; Galenus lib. primo de antido-  
tis narrabat, cū non ignoraret, opobalsamum  
diuersis modis adulterari posse, ita vt difficul-  
ter ementi discerni queat, se proprio oculorum  
intuitu cernere voluisse & quomodo crederet  
Balsamum, & quomodo lacrymam mitteret:  
voluitq; synceræ eius lacrymæ partem habere,  
veluti regulam ad dignoscendum alios Balsa-  
mi liquores, qui per orbem ab impostoribus vi-  
tati circumferebantur. Modus autem incidendi  
corticis, vt inde liquor effluat, apud auctores si-  
nē varius est. quandoquidem Theophrastus, &  
Dioscorides arborem dixerunt vnguibus fer-  
reis scalpi, vt inde vulnerato cortice fluat lacry-  
ma. Plinius verō contrā, si ferro incidatur,  
statim sicari, atque emori scribit: ob idque qui  
opobal

opobalsamum colligunt, inquit, vitro, lapide, officisque culiculis ad corticem vulnerandum vtuntur, deinde succum lana excipientis in corniculis colligunt. Ceterum cum mecum saepius cogitauerim a tot imposturis, quae indies sunt, nos cauere non posse, non alienum fore duximus illud in hominum memoriam reuocare, quod si vnquam opobalsamum venale inueniatur (tanetsi in Italia per longas aetates non amplius ipsum venturum putem) non ematur, nisi prius de eo omne fiat periculum, quo clare cognoscatur omnibus his praestare tum notis, tum facultatibus, quae illi ab auctoribus tribuuntur. Ad haec Balsami fructus, siue semes,

*Carpobalsami non legitimi.*

quod Carpobalsamum vocant, ab eo quidem longe differt, quod his temporibus ex Alexandria comportatur. Siquidem optimum legitimumque flauum fit oportet, sacrum, ponderosum, gustu mordens, & feruens in ore: non autem nigrum, leue, inane, non acre, & nullum spirans odorem, quale, quod circumfertur,prehenditur. Quo fit, vt non aliud suspicandum sit, quam quod hoc idem sit semen hyperico simile, quod etiam Dioscoridis aro a Petra Palaestina oppido deferrebat. Hoc idem ligno euenit, quod Xylobalsamum vocant officinae Graecos secutae. quippe quod passim in iis habetur, potius myrtum, quam Balsamum refert. Corticis non meminit Dioscorides, quamuis dixerit Plinius libro & cap. superius citatis, ipsum quoque in vsu medentium esse.

*Balsami vires ex Galeno.*

Balsamum memorizae prodidit Galenus libro v. i. de simplicium medicamentorum facultatibus sic inquit. Balsamum defecit, & exal facit secundo excessu. Est autem tenuium partium, adeo vt odoratum sit. Sed liquor eius subtiliori etiam partium est, quim ipsa planta, non tamen adeo calidus, vt quidam exillimant tenuitate partium falsi. Porro fructus eius perissimis genere facultatis est, ceterum longe in subtilitate partium inferior. Placet eidem Galeno (vt in libello de supposititiis medicamentis illi adscripto legitur) vt Balsami vice facit myrrhae, aut oleum irinum, in compositis medicamentis commodè inseri possit: xylobalsami verò loco leucoli radix. Porro quid carpobalsami vice supponendum sit, nullibi apud eundem reperi. tanetsi in quodam incerti auctoris libello, quem sepiasari Quid pro quo nuncupant, pro opobalsamo oleum terebinthinum, vel laurinum, vel gummi hederæ, subiciatur, pro carpobalsamo hederæ corymbus, & pro xylobalsamo hederæ ipsius lignum: tantum ille hederæ tribuit auctoritatem. Sed alia est opinio nostra: nam ipse libentius pro opobalsamo oleum myrriticæ nucis, vel styracinum supposuerim, quam terebinthinum, vel laurinum, pro xylobalsamo agallochum, & pro carpobalsamo vulgares cubebas. Quod autem Carpobalsami locum cubebæ rectè supplere possint, plerique rei medicæ studiosi id mecum sentiunt. Sed addam præterea, quod si ex man-

dantur, dentibusue conficiantur, mordent gustum, feruentes in ore percipiuntur, & aromatatis non modicum respuunt, quas nimirum qualitates Balsami fructui inesse Dioscorides testatur. Hinc igitur fit, vt in hoc à Fuchio, viro alioqui doctissimo, planè dissentiamus. namque is in libro, quem de compositione medicamentorum nuper auctum edidit, Carpobalsami loco leucoli radicem supponendam censet: eo quidem argumento (vt inquit) quod ita scriptum reperit in eo Galeni libro, cui titulus est de subtilioribus medicamentis. Verum cum ipse nusquam (quod equidem legerim) in legitimis Galeni libris inuenerim, hunc auctorem, si desit Carpobalsamum, substituere, vel viribus proximam facere leucoli radicem, cui nulla prorsus inest qualitas, neque facultas, quæ Carpobalsamo respondeat, non est, cur in hoc Fuchii probem sententiam. Ceterum asseritur iam (vt audio) ex occidentalibus Indiis liquor odoratissimus liquido styraci admodum similis, quem qui deferunt, appellant Balsamum, quod notas nonnullas Balsami præ se ferat. Veruntamen cum teste Strabone Balsami lacryma lacteo colore sit, crediderim potius nouum liquorem hunc, veram esse faciem, vel styracis liquorem, quam Balsami: ob idque non esse penitus ab re, si quisquam eo Balsami loco vteretur. Quidam recentiores cum se Opobalsamo destitutos conficerent, illud artificio quodam non sine damno componunt. Faciendi modum sic habeto: ego enim hac ratione pluries ipsum mihi confeci. Sumito resinae terebinthinæ, abiegnæ, cuiusvis libræ: thuris albi, ladani, cuiusque vnc. sex: nardi Indiciæ drac. duas: radicem phuridis, acori, asari, cyperi, singul. drachmam: mastiches, galangæ, caryophyllorum, cassiæ odoratæ, zedoariæ, cuiusque drach. sex: nucum myrriticarum vnc. quatuor: macis vnc. vnam: agallochi vnc. duas: gummi elemi vnc. sex: aloës hepaticæ, myrrhæ, cuiusque vnc. vnam & semis: castorei drach. decem: ossum cariotarum, styracis calamiti pinguis, laserti odorati, sing. vnciam: lacrymæ sanguinis draconis sexunciam: florum laeundulæ vnc. quatuor: olei vnguetariæ glandis vnc. sex. Quæ ex his arcerenda sunt, in puluerem conuerto, liquoribusque admisceto, & vitreo organo (si nescis, Chymistas consulo) diligentissimè vi commensurati ignis oleum elicio. Primum enim clarissima tenuissimisque emanat aqua, tenuissimarum vtrique partium, quæ igni admota modo quodam admirabiliter fragrat: hæc aqua Balsami dicitur. Deinde destitit oleum colore aureo, & subtiliata inter tenuem, & crassam, quod oleum Balsami vocant. Postremò verò id manat, quod Balsamum vocant, rufo colore. Aqua, quæ prius fluxit, ventriculi imbecillitate affectos hausta mirum in modum iuuat: siquidem cum pituita, cum flatu valenter consumitur. sed quod acerrima sit, dari sine per se nequit, nisi vino, aut iure ali-

*Fuchii opinio improbat.*

*Balsami facit ratione.*

quo admista. Liqueor deinde, qui secundo stillicidio fluxit, quem quidam cæteris præferunt, mirificè nervorum vulneribus, compaginum eructatibus, cõtulsis, resolutis, cum tialibusq; succurrit. Vltimum verò oleum hæc omnia similiter præstat, verum debilius. Pollent hi liquores & ad alia innumera corporis incòmoda, quæ breuitati consulentes silentio inuoluenda duximus. *Balsamum* sic Græcè dicitur, vt Latine etiam Balsamum: Arabicè, Balesem, Bolefina, aut Belsan: Italicè, Balsamo.

Nomen.

ASPALATHYS.  
CAPVT XIX.

ASPALATHYS. alius erysiceptron, frutex est furculosus, multis spinis horrens. Nasctur in Ilro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula: quo ad vnguentorum spissamenta pigmentarij vtuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubescens, aut in purpuram vergens, densus, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum eius genus candidum, lignosum, sine odore: quod deterius habetur. Vim calfaciendi cum adstrictione obtinet. Vnde decoctum cum vino ad tetra oris vlcera colluenda conuenit: ad nomas genitalium, & fordida vlcera infunditur: subiectum in pessa, partum extrahit. Aluum sistit eius decoctum: & sanguinis reiectionem potu cohibet: vrinae difficultatè, inflationesq; discutit.

Aspalathi  
confidera-  
tio.

ASPALATHYS. quidè ex Creta, Rhodo, vel Syria ad nos (quod ego sciam) nõ aduehitur: cetsi existimauerint nonnulli santalum rubrum vocatum esse Aspalathum. Quorum errorem Serapio manifestè prodidit: quandoquidem de santalo agens, nullum (vt asfolet) asserit Dioscoridis testimonium, sed tantu suæ gentis nictur auctoritatibus. Quod maximo argumento est, santalum rubrum nihil cum Aspalatho habere cognationis. Meminit tamen Serapio Aspalathi sub Arabico nomine Darisahan, vbi leguntur omnia, quæ de ipso tradidit Dioscorides. Huic alia validior accedit ratio, siquidem Aloisius Cadamustus, Columbus, & Pinzonus in suis nauigationibus ad orientales Indias, aliisque ignoras terras, contrarias santalorum recta proceritate sylvas vnanimiter vidisse narrant. Quod longè abest ab Aspalatho, qui frutex humilis est suauiter odoratus, amarulento gustu, quæ in rubro santalo non deprehenduntur, rubrum enim santalum odoratum non est. Quod si quandoque

odoratum sentitur, id (vt optime norunt *pe-  
riri myropole*) non euenit, quòd ex se tale sit, sed quòd, dum vna cum albo, & flauo importatur, quæ odorata sunt, ex illis sibi odorem affuerit, qui tamen tractu temporis facillè euanescit. Porro Ruellius mediocri censura non vacat, quòd pro certo asserat, id legitimu esse Aspalathum, quòd Rhodium oleastrum nonnulli vocant: quo item quondam agallochi vice vebantur myropolia. Cuius materiem cum & in seplasis, & apud artifices, qui precatórias (vt ita dicam) coronas ad Deiparæ virginis salutationes torno conficiunt, diligentissimè sum perferutatus, ea sine nigra partim, partim verò ex nigro, flauoq; venosa mihi sese obtulit. Rubram autem, & subrubram (vt Ruellius inquit) nunquam me vidisse inueni fateri possum. Adde etiãnum, quòd sit (quemadmodu Rhodii narrant) hæc planta ex olearem genere Rhodio tractu abunde proueniens, quæ oliuas etiam proferat, sed nec multis spinis horrens, nec detracto cortice rubescens. Quamobrem (vt mea fert opinio) Aspalathus non erit Rhodium oleastrum, neque santalum rubrum. Itaque cum nobis Aspalathus desit, qui tamè facile ex Rhodiorum insula asferri posset, suppleat eius locum viticis semen: sic enim in Galeni succidaneis scriptum reperio. Meminit Aspalathi Galenus libro v. 1. simpl. med. sic inquit.

Ruellius  
errorè na-  
tatur.

otus  
si leu  
vpro

Aspalathi  
vires ex  
Gal.

Aspalathus gustu quidem acris simul & adstringens est: facultate verò ex dissimilibus constat, nempe partibus suis acerbis exalfaciens, partibus verò aliis, austeris scilicet, refrigerans. Itaque vtriusque ratione desiccatur, & prouide ad putredines, & fluxiones est vitilis. hætenus Galenus. Cæterum quòd etiam hi nostri commentarij Santala redolent, posteaquàm antiquiores Græci eorum non meminerunt, de his hic differere non alienum duximus. SANTALVM itaque in vtraq; India syluis densissimis, ingentissimisque nascitur, cuius tria numerantur genera: quorum præsertim pallidum, secundum locum habet album, postremum rubrum, quòd nullo commendetur odore, priora duo suauiter spirant. Quapropter Mauritano:um sententiam minime probandam putauet, qui Santalum tertio ordine frigidificare, siccare verò secundo memorie prodiderunt. Rubrum (vt ipsi asserunt) priuatim defluxiones prohibet: incandescentibus inflammationibus, podagrisq; ex succo solani, aut fedi, vel portulacæ vtiliter illinitur. Candidu, ac pallidum, ex rosarum aqua fronti imposita, capitis dolores mulcent. Aduersantur omnia calidis febribus: epora æstuat ventriculo mirificè auxiliantur. Fiant ex iis, & aqua rosarum epithemata, quæ ventriculo illita eius seruorem in ardentissimis febribus extinguunt. Ad hæc (vt auctor est Auicenna libro de viribus cordis) Santalum non modò cordi efficacissimè lætitiã asserit, sed & robur

non

non paruum addit. Quare his immiscetur medicamentis, quæ cordi, & cordis palpitacioni maximam opem præstant. Quod *arabianus* Græcis, Latinis item Aspalathus vocatur: Arabibus Darisahan: Italis, Aspalatho.

MYSCVS. CAP. XX.



**BRYON**, id est, Muscus, à quibusdā splachnō appellatur. In cedro arbore, populo alba, & quercu inuenitur. Optimum est cedrinum, proximum populneum: in quo genere candidum, & odora

tius præstat: nigricans improbat. Ad stringendi vim habet. Decoctum insidentium vulnus vile. Vnguento balanino, oleisq; in spissandi gratia inseritur thymiamatum, acoporūque compositionibus conueniens.

*Musci arborum historia.*

**GALENVS** lib. VI. de simplicium med. facultate, & post ipsum Paulus, non modò Muscum, qui cedris innascitur, intactum non reliquere, sed præterquàm q̃ populnei, & querni meminerint, de eo etiānum, qui in picea arbore abieti cognata oritur, tradiderunt. A qua ipse quidem in valis Ananiz montibus supra Tridentum muscum admodum villosū propriis manibus quāmp̃lures decerp̃i, multo sanè odoratiorem, pulchriorēque, quē qui in populo, & quercu prouenit. Nec minus piceo suauiter olet abiegnus, quo in eorundem montium syluis, abietes innumeras adeò villosas, incanasq; mihi videre sæpius contigit, vt prima statim facie crediderim villos frondium loco is in arboribus genitos esse. Sortitur arboreus Muscus varia, ac diuersa nomina: quippe & muscus, & bryon, & sphagnos, & splachnō, & hypnon appellatur. Meminit huius Plinius li. x. i. cap. x. x. i. sic inquit. Sphagnos in Cyrenica provincia maximè probatur: alii bryon vocant. Secundum locum obtinet Cyprius, tertium Phœnicus. Fertur & in Aegypto nasci quin & in Gallia non dubitauerim. Sunt enim hoc nomine cæni arborum villi, quales in quercu

maximè videmus, sed odore præstantes. Laus prima candidissimis, atque altissimis: secunda rutilis: nulla nigris. Et in insulis, petrificæ natæ improbantur, omnēque, quibus palmarum, atque non suus odor inest. hæcenus Plinius. Cæterum in eo genere, quod in Italia prouenit, is & nobilior, & odorator apparet, qui in larice nascitur: quapropter & viribus fortasse præstantior erit. Nimirum recordor me non parum eo quandoque fuisse oblectatum, dum nocturno tempore quibusdam in montibus super fœno recumberem, ex conquisitis plantis defatigatus, ubi larices innumere erant omni ex parte villosō musco incane. Quandoquidem pastores, vt nos veluti re noua, & voluptuosa reficerent, quodam paruo ignis lumine hos villos incendebant, qui tanto flegrabant impetu, & crepitu, vt nobis quidem viderentur tormentorum puluerem faciliè superare. Quippe flammæ vnâ cum ingenti fauillarum copia, in obscurâ noctis silentio ad astra tolli videbantur, relicto sui odoris oblectamento. Vnde illud existimauerim, quòd Galenus, cum bryon in quercubus, & piceis inueniri tradiderit, non solum de picea intellexerit, sed etiâ de congeneribus plantis, nempe abiete, larice, & pinu. Isaetum libro VI. simpl. med. citato, ita de eo scriptum reliquit. Bryon, *barbiceps* quidam verò splachnon. Inuenitur autem in quercubus, & piceis, & populis albis. Vim habet adstringentem, inualidam. Nec enim multum est frigidum, sed propinquum ferme mediis, quia videlicet & digerendi, & emolliendi facultatis est particeps, maximè quod in cedrinis lignis reperitur. Muscum officinæ Arabes secutæ Vihcam vocant. Inter quos Serapio eorum vinum retulit, in quo diebus aliquot vinea maduerit, aliorum somnum inducere, ventriculum roburare, vomitiones compescere, & aluum sistere. Ad hæc Muscus (vt Aucenna inquit) vtiliter inter cordis medicamenta inseritur, quòd odoris fragrantia animi defectus iuuat. Sed quoniam arboreus muscus odoratissimus Moschoni mihi in memoriam redegit, qui ab oriente, & occidente, quibusdam pilosis viriculis concludi desertur, essi Dioscoridis Galenique æuū hunc silentio purgerit, nos tamen hæcduquam dissimulanda putauimus, quæ ad hanc rem pertinere arbitramur. Siquidem hi nostri commentarii merito de me cõqueri potuissent, si eos tanta odoris suavitate destitutos reliquissē, præsertim cum omnibus palam sit ubiq; terrarum Moschū inter pretiosā odorametā primam sibi comparasse sedē. Quippe non modo collo, auribusq; suspensus, vestimentis interpositus, chirothecis illitus, crumentis concludus, ore retentus, & barbæ & superciliis inunctus desertur Moschus, quò alarum, nariumq; radia, sudoris graueolentia,


*Musci arborum historia. Bryon, barbiceps quidam verò splachnon. Inuenitur autem in quercubus, & piceis, & populis albis. Vim habet adstringentem, inualidam. Nec enim multum est frigidum, sed propinquum ferme mediis, quia videlicet & digerendi, & emolliendi facultatis est particeps, maximè quod in cedrinis lignis reperitur. Muscum officinæ Arabes secutæ Vihcam vocant. Inter quos Serapio eorum vinum retulit, in quo diebus aliquot vinea maduerit, aliorum somnum inducere, ventriculum roburare, vomitiones compescere, & aluum sistere. Ad hæc Muscus (vt Aucenna inquit) vtiliter inter cordis medicamenta inseritur, quòd odoris fragrantia animi defectus iuuat. Sed quoniam arboreus muscus odoratissimus Moschoni mihi in memoriam redegit, qui ab oriente, & occidente, quibusdam pilosis viriculis concludi desertur, essi Dioscoridis Galenique æuū hunc silentio purgerit, nos tamen hæcduquam dissimulanda putauimus, quæ ad hanc rem pertinere arbitramur.*



& insuaves corporis halitus occulantur, lasciu-  
 uis oblectamenta augcantur, molliorq; poli-  
 tia fiat, sed etiam vt odoris suauitate Desipiam  
 virginem concilient, ne dicā, vt hac fucata hy-  
 pocriti lasciuia dissimulent (eō enim vanita-  
 tis peruenit est) Moschum ipsum in orbicu-  
 los componunt, quibus funiculo traiectis an-  
 gelas salutationes in cælu eructant. Omnia de-  
 nique, quibus miscetur Moschus, sua odoris iu-  
 cunditate cōmendat. Quod si he lucubrationes  
 eo forē caruissent, verendum quidē erat, ne cū  
 illis gratiam inissent, qui mira vndique odora-  
 mentorum fragrantia redolent. Quamobrem  
 vt & si sibi vnguentis omnium præstantissima,  
 odoratissimaq; comparare valeant, Moschi pri-  
 mum, deinde verò liquoris Zibetti vocati, &  
 Ambari denique historiam, & facultates descri-  
 bam. Moschi odoratus est itaque (vt Ruellius ex Aë-  
 tio transferibit, si tamen ea Aëtii legitima sunt,  
 cū potius Symeonis Sethi esse videantur) plu-  
 ra habet genera. Præferitur qui in municipio  
 quodam nascitur, quod magis, quā Chorasā  
 ciuitas ad orientem vergit: hoc barbaro nomine  
 Pat dicitur, colore subflauo. Secundam sibi se-  
 dem arrogat, qui ab India deservit, priori boni  
 tate cedens, colore subnigro. Eo infirmior cen-  
 setur, qui à Sinarum agro mittitur. At Mos-  
 chus omnis in vmbilico cuiusdam animalis gi-  
 gnitur, quod capreæ simile est, vnicō armatum  
 cornu, prægrandi corpore. Huic cū in vene-  
 rem agitur, furoris vehementia vmbilicus intu  
 mescit, sitq; vomica prægnans congesto inibi  
 crassiore sanguine: quo tempore & pabulo, &  
 potu ferā animal abstinēt, humiq; crebrò volu-  
 nitur: quā versatione vmbilicum lutofo, facu-  
 lentioq; sanguine turgentem exprimit. Caterū  
 emissa sanies post aliquod tempus sibi magnam  
 odoris suauitatem adsciscit. De Moscho inter  
 Arabas scripsit diligenter accuratēq; Serapio,  
 his verbis. Animalia capreis non absumilia, quæ  
 moschum gignunt, in Tunbascorum, & Sinarū  
 agro potissimum habentur, loca inuicem con-  
 terminā. Tumbasini Sinico longē præstan-  
 tior est, quod capreæ moschum gignētes & nar-  
 dum, & alias odoratissimas plantas depascitur.  
 Quod Sinis non euenit, nam etsi hæ quoq; odo-  
 ratis vescantur herbis, ex tamen odoris, & fa-  
 cultatis præstantia, nardum, & cætera Tumba-  
 sci plantas non æquant. Quinetiam in causa est  
 demetendi ratio, quippe Tumbasini ē vomica  
 folliculo sanie nūquam eruant, quō adulteria  
 permisceant, & non nisi sereno cælo syncerum  
 legunt. Sinici verò vomica vtriculo expri-  
 munt, & exclusa sanie inoposturas quasdam ad-  
 mifcent, núbilo parumq; arridente cælo, & alā  
 balistris recondunt. Is ceteris præstat, qui maiore  
 odoris fragrantia redoleat, & qui ē vomica ma-  
 ximē matura eruitur. Sunt & inter hæc anima-  
 lia, quæ ab aliis moschum ferentibus nullo di-  
 scrimine differunt, præterquā caninis vocatis  
 dentibus, quippe hæc verrium modo exertos  
 palmi lōgitudine dentes habent, & pariter mo-

schum præstantissimum gignunt. Moschus præ-  
 cox tetro, & insuauis odore displicet, verū ve-  
 nariores immaturi folliculos excutientes, tan-  
 tisper eum libero aëre suspendunt, dum ab alto  
 prorsus sætore maturuerint. Is enim aëris cōctio  
 ne perfecta, miram sibi conciliat odoris suauita-  
 tem. Veruntamen præcipuus habetur, qui suap-  
 te natura in animalis vtriculo sibi maturitate  
 comparauerit. Hunc incolæ per saxa metunt, &  
 arborum truncos, nanque animal cū vomica  
 naturam esse præsentit, faxis & truncis sese ma-  
 gno oblectamento affricat, donec fæcio vomice  
 emissario tota saniei vis effundatur. Hic cæte-  
 ros sanē antecellit, tiquā solis cōctione, & cæ-  
 li benignitate maturitatem vltimam consecru-  
 rit. Hunc itaque moschum indevenatores col-  
 ligentes eorum animalium vtriculo asseruant,  
 quæ alias venatione captauerāt. Isque ille mo-  
 schus est, quo reges & donantur, & vtuntur. Mo-  
 schus excalcitrat ordine secundo, siccatur verò ter-  
 tio. Cor frigidum, ac tremulum roborat, & om-  
 nibus ipsius affectibus opem præstat potus, at-  
 que illitus. Detergit tenues oculorum albugi-  
 nes, & humidas defluxiones excecatur cerebrum  
 roborat, & dicitur capitis dolore mulcet,  
 si tamen pituitæ redundantia proveniat. Coles  
 ex eo cicino oleo macerato perunctus, prom-  
 ptius in venerem excitatur. Probat nonnulli  
 an Moschus legitimus sit, hoc modo. Pōdus li-  
 bra examinatum in labellum humore persusum  
 immittunt, tum paulō post iterum æquo lance  
 ponderant. Quod si superferat, syncerum &  
 legitimum existimant: sin cedat, spurium, &  
 adulteratum putant. Huic simile aliud quod-  
 dam habemus, sed præterquam quod mirum  
 in modum oleat, primo statim occurſu odoris  
 vehementer nares admodum ferit.

## ANIMAL ZIBETTI.



Hoc vulgari sermone vocamus ZIBETTO,  
 vnguentariis maximē expetitum ad ea odora-  
 menta componenda, quæ propriè misturas ap-  
 pellant. Gignitur id in exteriori testiculo  
 vtriculo cuiusdam animalis, feli, qui veteribus  
 ædificiorum rainis oberrat, non absumilis. Ca-  
 tos hæc animalia vocant, quos sæpius Venetiis  
 vidi ex Syria delatos. Est autem Zibettum tan-  
 quam sudor inter huiusce animalis testiculo  
 concre-

Zibetti bi  
 Porcia, 13  
 facul.

ad Moschi odo-  
 ratum histo-  
 ria.

concrefcens, calidæ, humidæq; facultatis. Id ca-  
uernulæ vmbilici impositum vulus strangu-  
lationibus mirificè prodeft: proinde nec mirum  
eft, fi co viri peni circumlito magnum mulieri-  
bus in coitu afferant folatium. Porro ex quo

*Ambari  
hifloria  
Garia.*

AMBARVM aliud odoramenti genus gigna-  
tur, quod nos vulgo vocamus Ambracane, va-  
rii variè opinantur. Alii nanque tradunt ipfum  
in maris aluco non fecus, atque in terra fun-  
gos oriri, ac deinde fœuētibus procellis, è pro-  
fundo elici, & in litus expui. Nonnulli verò  
referunt pifcem Azelum nomine Ambarū hoc  
audiffimè profequi, cuius eſu necem ſibi ſta-  
tim coſciſcere. Quod cū ſciāt pifcatores huius  
rei periti pifcem hunc mortuum, vndisq; flu-  
tuantem coniectis vncis & ſunibus extrahunt:  
& Ambarum ſciſſo animalis ventre erunt.  
Quod verò (vt perhibent) proximè doſi ſpi-  
nam inuenitur, id maxime præfertur alio. Qui-  
dam præterea in fontibus quibuſdam Ambarū

*Ambari  
genera, et  
ſpecies.*

natate ſcribunt, qui bituminis modo illud eru-  
ſcant. Huius ſententiæ è recentioribus Græcis  
inuenio Symeonem Sethi, qui Ambarum de-  
ſcribit his verbis. Ampar, quod & Ambar ap-  
pellatur, in diuerſis locis ſcaturit. Sunt enim  
eius fontes vt bituminis, & ſulphuris, & rerum  
ſimilium. Tria Ambari faciunt genera. Præfer-  
tur colore ſuluum è Selachito Indiæ petitum.  
Aliud ſubalbidum, quod è Sinchrio feliciſ Arabiæ  
oppido aduehitur. Tertium arum, & cæ-  
teris viribus imbecillius. Excalfact Ambarum,  
& ſiccæ: cerebrum, & cor olfactu roborat. Sen-  
tibus, & natura frigidis opem mirificè præſtat.  
Quare iſſdem potius, quam iuuenibus chiro-  
thecæ Ambaro imbutæ concedi deberent. Vi-  
no inſuſum temulentos efficit. Cæterum ex  
antediſtis que ſit Ambari hifloria vt verior ac-  
cipienda, non equidem auſim decernere, quòd  
nihil adhuc certi atque explorati habeam. Ne-  
que etiam liber ſubſcribere ſententiæ Fuchſii,  
quann ſi viri eruditiffimi, qui in libro de com-  
ponendis medicamentis, quem vltimo loco au-  
ctum edidit, Ambarum noſtri vſus factitium  
eſſe cenſet, atque legitimum Ambarum, de quo  
ſcripſerunt Mauritanii, quòdque ipſe ſuccini ge-  
neri adſcribit, deſiderari. Siquidem non video,  
quibus rationibus, vel auctorum testimoniis  
hanc ſuam comprobet ſententiam. Muſcus ar-  
boreus *lyſius*, & *αμάρυμ* Græcis appellatur:

*Fuchſii  
opinio.*

*Nomina*

Muſcus, Latinis: Achne, aut Vſnee, Arabibus:  
Moſco. Italis: Moſſe, Germanis. At Moſchus  
odoratus *μύσχος* Græcis recentioribus nomina-  
tur: Moſchus, Latinis: Miſch, Arabibus: Muſ-  
chio, Italis.

AGALLOCHVM. *græc*

CAP. XXI.

*Catipè lignum albes*

AGALLOCHVM lignum eſt, quod  
ex India, atque Arabia deportatur,  
thuiæ ligno ſimile, maculatum, odora-

tum, guſtu adſtringens cum quadam  
amaritudine: cute verius quàm corti-  
ce veſtitur, aliquantulum verſicolore.  
Manditur, aut decocto os colluitur,  
commendandi halitus gratia: ſudores  
arceat toto corpori inſparſum: pro thure  
ad ſuffimenta ſubſtituitur. Radix e-  
pota drachmæ vnus pondere, humida  
ſtomachi vitia, & imbecillitatem, ſeru-  
oremq; mulcet: ſi lateris, iocine-  
riſve dolor excruciat, ſi dyſſenteria,  
aut tormina infeſtant, ex aqua bibere  
prodeſt.

AGALLOCHVM à Græcis, & Latinis re-  
centioribus, ſicuti ab Aphris Lignum albes ap-  
pellatur. Optimum à Luſitanis è Calecut Indi-  
æ emporio ad nos conuehitur. Eſt etiam  
Venetiæ hac ætate ex Alexandria Aegypti præ-  
ſtantiffimum afferatur: ſiquidem igni accenſum  
ſuauiſſimum, ac pericundum ſpirat odorem.  
Nec ob id putandum hoc illegitimum eſſe,  
quòd *lſyſius*, id eſt punctis maculatum non  
ſit: quoniam Oribafius non legit *lſyſius*, ſed  
*lſyſius coriſia*, id eſt. Eſt igitur odoratum &c.  
Quemadmodum nec id etiam legit Serapio,

*Agallochi  
conſidera-  
tio.*

qui nec punctorum, nec macularum meminit:  
ſicuti nec Paulus. Cæterum noui diu eſt, quòd  
legitimum importari cœpit: nam licet antea,  
quibuſdam nò deſſet Agallochum verum, ni-  
hilominus, quòd rariffimum eſſet, officinæ  
ferè omnes eius loco, vt ſuperius diximus, olea-  
ſtrum Rhodium ſuppeditaſ: quem falſo exi-  
ſtimauit Ruellius alpalathum eſſe. Naſcitur  
Agallochum (vt Luſitani per meridiem in ori-  
entem nauigantes teſtantur) in inſula Taprobana,  
aliſq;que confinibus locis, cuius integros trun-  
cos in Luſitaniam, & Hiſpaniam iſdem ſecum  
attulere, qui non modò incenſi, ſed manuum  
tantum attritu ſuauiſ (vt aiunt) redolent.  
Porro vbique pretioſum Agallochum eſt: nam  
& in locis, vbi naſcitur, plurimi penditur. Ve-  
rùm Agallochum, quod tantopere præſtat, ha-  
ctenus mihi videre nò licuit. Sunt, qui ſomnia-  
tes dixerint, Agallochi arborem vidiffe nemi-  
nè, cū à terreſtri tantum paradifo proneniat:

illudq; ſerri fabulantur fluminibus, quæ (vt  
ſacra teſtantur monumenta) ex eo manant. At-  
qui pro comperto habetur (vt paucis innuit Se-  
rapio) Gangem Indiæ ampliffimum fluium  
quàm plurima ſecum Agallochi fragmina ve-  
here, quæ tamen in ipſum decuntur aliorum  
fluminum curſu, qui in eum confluunt. Qui-  
ppe cū fluiui tranſluant loca, vbi Agallochum  
pronenit, aquarum inundationibus turgentes,  
huius truncoſ, fragmina, ac ramenta rapiunt  
vnà cum aliis variis generis lignis, & in Gangē  
tranſferunt: quemadmodum in noſtris etiam  
fluminibus ſæpe ac ſæpius viſitur. Cuius rei  
indiciū aſſert illud, quod Venetiis venditur,

*Agallos.  
fabula ops  
nia.*

*Agallochi  
historia ex  
Serap. &  
Sym.*

vt pote quod longo aquarum discursu omni ex parte laceratum, excisum, comminutumque spectetur. Quamobrem mirum non est, si dum manibus tractatur, id odoris non præstet, quo illud fragrare prædicant ex natali solo in Lusitaniam aduectum. Eius plura numerantur genera, si Serapioni fides est adhibenda, qui ex Abohanisa Arabo ita transferibit. Dicunt Agallochum in Arabia nunquam oriri, tametsi quædam ibi crescat planta neuig vocata, quæ quædamenus Agallochum refert. Verum præstantissimum India mittit: & quanvis hoc genere differat (plura enim Indis Agallochi sunt genera) id tamen quod viribus cetera præcellit per excellentiam Indum peculiariter vocant, quemadmodum nigra myrobalan, quod ceteris præstent, Inda pariter appellant. Indum in quadam India insula inuenitur, quæ Fimua nominatur. Selectissimum est nigrum, quod varium ostendat colorem, succi plenum, ponderosum, duritie compactum, crassum, non albicans, & quod accensum ægerimine flagret. Secundum bonitatis est Mondunum à Mondel Indiz vrbe denominatum. Tertium est Sciscum, quod non obsecra bonitatis præsumitur, quod sua præstanti vi, ac grauedine in aqua coniectum non innatet, sed statim subsidat. porro ex hoc genere id magis præstat, quod crassum est, & plurimo humore prægnans. Postremam sedem habet Alcumerium Scisico bonitate cedens: tametsi Alcumeri non longius à Scisi distet, quam itinere triduoano. Præstat in Alcumerici genere nigrum nulla albedine varium, graue, ignium flammis diuersis, verumtamen viribus Scisico infirmius est. Item ex auctoritate Chealserebeni idem ita scribit. Ferunt præterea, quod incolæ Agallochum statim ab arbore dissectum integro anno sepeliunt, vt ita terra obrutum marcescat cortex, lignumq; tantum purum remaneat, adeo vt è ligno nihil erodatur. Ferunt insuper illis in regionibus collabentes ex Agallochi arboribus ramos, raptos à fluminum inundationibus per circumstantes regiones deferri. hæc Serapio. Cui subscribit è recentioribus Græcis Symeon Serhi, causam etiam reddens, cur annua sepultura dissectum Agallochum recondatur, cum inquit. Non alias odoratus futurum existimant, nisi prius marcorem aliquem & teredinem senserit: proinde harum regionum incolæ dissectum sub terra condunt, suoque tempore eximunt, & ne-  
50  
scentioribus vendunt. Nicolaus Myrepsicus scriptus in suis componendis medicamentis Agallochi crudi meminit, vbi Fuchsius prima de  
Tuc/sy  
sententia  
improbata.

quantum scilicet sufficere videtur, ligni partes educunt, & mercatoribus vendunt. crudum itaque erit, quod terra non obruitur, sed statim ab arbore excisum ad usum rapitur. hæc Fuchsi sententia. A quo tamen nos pace sua dissentimus. nam si in componendis medicamentis præstantiora simplicia semper exposcimus, sitq; Agallochum illud præstantius, odoratusq; (vt etiam Symeon ille refert) quod terra, vel potius fuerit sepultum, non video, cur potius in sepulchrum, & statim ab ipsa arbore excisum (id enim ob locorum distantiam recens habere ne quis) crudum vocauerit Nicolaus, præstantiusque existimauerit. Puluerem enim vel terra conditum coqui non potest, quod nullus ibi sit ignis, neque calor, sed potius recrementum humiditate exui, quæ fortasse odorem eius obtundit. Verum crediderim potius, per crudum Agallochum Nicolaus illud designari, quod non fuerit antea elixum: quod inde fortassis odoratissima lauacra ex Agallochi decocto sibi conficiant Indi, aliaque odoramenta in regales præparent usus, vt etiam cum hababaro heri narrant. Vel forte per crudum illud intelligit Nicolaus, quod impetu fluminum, longoque eorum ductu per regiones non deferunt. In his namq; calidioribus regionibus aquæ à solibus non obsecra calefactæ non modò illud omni ex parte dissunt, sed etiam elixant. Illud præterea addiderim, quod cum non modò crudum, sed etiam bonum addiderit Nicolaus, nullum aliud expectere videtur, quin quod sepultum præstantissimum eueniat. Cæterum Agallochi omne genus excalfacit, & exiccat ordine secus facit. Facit, vt Auicenna scribit, ad cordis affectus: ob idque inter ea medicamenta, quæ cordi præsidio sunt, Agallochum recensuit. Huius non reperio meminisse Galenum alibi, quin in succidaneis, vbi centaurium supplet pro Agallocho. Lignum, quod Græci *ἀγἀλλοχον* Latini similiter Agallochum dicunt. Verum recentioribus Græcis *συμειον* nominatur, vt officinis Lignum aloës: Mauritaniis, Hoad, Agabian, Agalugut, aut Agalugen: Italis, Agallocho, & Legno aloë Germanis, Aloës holtz, seu Kreuz holtz: Hispanis, Lin aloë.

*Agallochi  
familia.*

*No minima.*

# NARCAPHYTHVM. CAP. XXII.

NARCAPHYTHVM ex India deferretur, corticosum, simile fycomorì libro: quod incundi odoris gratia sufficit. Miscetur thymiamatis compositis. Cōstructionibus vltus suffitu prodest.

TAM breuiter, tamque parè de Narcaph-Narcaphtho scripsit Dioscorides, ac nimirum mihi perspicue difficile sit explicare, quidnam hac ætate ad nos ex India afferatur, quod legitimum Narcaphthum referat. Eoque magis quod nihil de hoc

hoc (quod equidem sciam) Theophrastus, & Plinius suis monumentis posteritatis memoriae prodiderunt. Atamen non desunt indicia, quæ præ se ferant (si modo ad nos deferatur) id omnino esse Nacpaphthum, quod vulgo officing

*Tigname.* vocant Tigname. nam tigname non aliud integrat, quam thymiam a apud Græcos, quod apud Latinos suffimentum significat. Proinde cum huius in suffimentis frequentissimus sit usus, nil mirum si nouum ex vsu sibi vendicauerit nomen, quod est thymiana. Id quod corruptum posteri tigname pro thymianate dixerunt. Ad hæc (vt Dioscorides inquit) uicundi odoris gratia per se sufficit, ac etiam aliis suffimentis infertur. Quod in Tigname facile probatur, quippe id tantum vsu venit in compositis odoramentis, quæ ad suffiendum parantur, ita vt præterquam quod per se id muneris præstet, rare quoque sint suffimentorum compositiones, quæ ipsum non recipiant. Quare admirari sinimus, si relicto proprio suæ arboris nomine, sibi adscriptum nomenclaturam ex suffimentis vsu pauperit. Serapio Nacpaphthum Lashaten vocat: & illud odorati calami vice supponi posse autumat. *Nacpaphy* Græcè, sicut Nacpaphthum Larine appellatur: Arabice, Nabach, siue Lashaten: Italicè, Agallocho, acque etiam Tigname, veluti seplasiarum vulgo.

## C A N C A M V M.

## CAPVT XXIII.

CANCAVM Arabici ligni lacryma est, myrrhæ quodammodo similis, virosi gustus, quam ad suffimenta vsurpant. Vestes eo, additis styrace, & myrrhæ, suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obololum pondere ex aqua, aut mulsio acetopulsculos dies ebibatur: lienosis datur, comitialibus, & suspiriosis: menses cum aqua mulla pellit: oculorum cicatrices confestim emendat: vino madefactum medetur eorundem hebetudinibus. aduersus gingiuas humore prægnantes, doloreq; dentiū, non aliud efficacius.

*Cancaui consideratio.* CANCAVM, quod notis omnibus Dioscoridis historiam referat (vt recentiorum serè omnium medicæ materij studiosorum fert opinio) nec ex Arabia, nec aliunde ad nos aduehitur. Quidam tamen pro Cancamo gummi quoddam rulum, ac pellucens ostendunt, quod furculos incognitæ arboris vndique circumuestit, myrrhæ quadantenus simile. Veruntamen quoddam nulla (vt Dioscorides inquit) in eo mansio saporis virositas deprehendatur, alii id potius mentiri, quam esse legitimum Cancamum volunt. Expeditur hoc gummi genus hoc tempore ma-

ximè insectis foribus ad inficienda serica flamina, idq; vulgari sermone quidam in Italia appellant Lacca, quidam diminutè Laccheta. Cuius duo habentur genera, quæ tantum (vt opinor) bonitate differunt. Præstantius vulgo appellant Lacca sumetri: quod verò deterius est, Lacca comberit, cognomētis forasæ a locis Arabum, à quibus deferuntur, acceptis. Primum furculis perpetuo obuolutum visitur: alterum absq; furculis in glebas concretum nyrrhæ modo, quod etiam viliori pretio venditur. Hinc itaque factum est, vt crediderint illi Serapionis auctoritate freti, hoc legitimum esse Cancamum: quod quod is Cancamū Laccam appellet, & quod arboris sit gummi, vel lacryma myrrham quadantenus referens: quodq; etiam eius meminerit Serapio, postquam de Dioscoridis & Pauli Cancamo egit, his verbis. L A C C A (vt inquit Iliacraman) res quædam est rubea, quæ tenuibus lignorum furculis inhæret, sapore non ingrato. Coquitur hæc, & inficiuntur inde panni rubeo colore, quam insecturam chermes appellant. Quod verò post infecturam subsidet, & in sectoribus remanet, pariter Laccam vocant. Cæterum Lacca ex Armenia deferitur exicans, & excafaciens ordine secundo. Ventriculum, & iecur roborat, eorumq; infarctus expedit, ietericos iuuat, & aquas pellit. Eluitur ad medicamēta hæc ratione. Ramuli, qui hoc sciant gummi, diligenter franguntur, ac subinde aqua persunduntur, in qua odoratus iuncus aristolochia quæ infibuerint, deinde pistillo agitantur, cum autem ab agitatione, resederint, aqua leuiter abicitur: quod si vna tantum lorione non pellatur, secundo item repurgetur, denum siccat in vmbra, & recondatur in vase vitreo. hæc Serapio. Quibus palam est, gummi, quod insectis vulgo Lacca dicitur, Laccam esse Arabum, & à Græcorum Cancamo differre: quod Dioscoridi Cancamum lacryma sit Arabica arboris, virosi gustus: Serapioni verò res quædam rubea, ex Armenia, non ex Arabia allata, tenuibus lignorum furculis inherens, sapore non ingrato. Item Dioscoridi Cancamum obesos extenuat, lienosos iuuat, suspiriosis, & comitialibus prodest, menses pellit, oculorum cicatrices delet, & hebetudinem curat, tumentes gingiuas cohibet, & dentium dolores tollit. Serapio ni autem tantum obstructions aperit, viscera imbecilla roborat, iecoris dolores muleat, & regium morbum, & hydropem sanat, quæ omnia medicamentorum diuersitatem præ se ferunt. Quo fit, vt non ab re existimauerint peritiores medici, non omnino Dioscoridis Cancamo esse destitutos. Veruntamen non desunt rationes, nec probatissimorum auctorum testimonii, quibus etiam probari possit, Græcorum Cancamū, & Arabum Laccam idem esse. Nam etiam hæc, quæ allata sunt, omni ex parte veræ videantur: si quis tamen Dioscoridis codicem hoc capite scaterere mendis animaduertit, & rem omnem accuratius, diligentiusq; pertende-

Lacca  
Arabum  
opinate  
Sic  
714.

Cancaui  
Lacca  
quod est  
Sic, proba  
tur.

derit, certior fortasse fiet, nos Cancamo non omnino destitui. Ego enim cum Paulum, qui in omni simplicium censu omnia ex Dioscoride transcripsit, accuratius perlegerem, inuenissemque illi Cancamum lacrymam esse Arabicæ arboris, myrrhae similem, odore grato, & quod nullius virosi gustus meminerit, illico orta est suspicio, quod ea particula Dioscoridi illegitimè accesserit. Auxit deinde suspicionem hanc Serapio: quippe qui capite de Lacca de Cancamo agens, dum (vt alioet) ex Dioscoride transcribit, nusquam huius particule mentionem fecerit. quod fortasse Dioscoridis codex, à quo transcripsit, hac menda facile vacarit. Sed illud adhuc magis rem ita se habere mihi persuasit, quod primum legatur in Dioscoride, Cancamum virosi esse gustus, quod fortioris, non suaueolentis indicium est: mox cum styrace, & myrrha ad suffindas vestes expecti, vt grato commendetur odore. quæ vt inter se maximè repugnant, ita etiam deprauatè lectiois præbent suspicionem. His itaque rationibus, & auctoritatibus non ab re adductis esse videor, vt quasi crediderim Dioscoridis codicem hoc in loco vitiatum fuisse. Vnde postea factum sit, vt eius Cancamum ab Arabico diuersum sese ostenderit. Neque sanè huic opinioni illud obstat videtur, quod plura in morbis curandis Cancamo assignauerit Dioscorides, quam Serapio, siquidem nulli dubium est, quin ea medicamenta, quæ obesos extenuant, lienosos luuant, & menses cient, possint pariter ventriculum & iecur roborare, eorumque infarctus expedire, & cutem subeuntes aquas & selle suffusos sanare. Hæc autem silentio inuoluenda non duximus, non vt nostra hæc probetur, vel improbetur opinio, sed vt aliis veritatis inuestigandæ pateat aditus. Sunt etiam factitiz Lac-  
*Lacca factitia generata.*  
 cæ plura genera: quæ ex diuersarum infectionum sedimento pictoribus tantum parantur. Alia nanque conficitur ex pimpinellæ bacca, quam vulgò vocant Cremesæ, & Cremesino: ex infectorio cocco alia: alia ex natua Serapionis laccalia denique ex ligno, quod brasiliu vocant, omnium deterrima. quarum nulla ad medicamenta admittitur. Non tamen desunt, qui credant, chermesinum infectioribus vocatum esse arboris gummi: idem illud idem, quod Serapio, auctore Isaac, rem rubeam (vt paulò antè diximus) esse ait, quæ tenuibus lignorum succulis inhaereat, & quod ea inficiantur panni rubeo colore, quem chermes appellant. quandoquidem huius sententiæ reperio fuisse Fuchium. Sed meo iudicio non exactè rem explorasse videtur. quippe chermesinum, quo puniceo, & purpureo colore serica stantia inficiuntur, est (vt Itali optimè norunt) pilula, vel bacca exigua pimpinellæ radicibus in orientibus regionibus adnascens, non autem gummi, vel roscidum, vel aliud per se manans, ab eo perquam longè diuersum. Siquidem hoc nū aliud est, quam natua Serapionis lacca,

quam propriè Itali vocant vulgò lacca & lachetta, infectioribus tantum expectata iis inficiendis sericis, quæ viliori veniunt pretio. Nec obstat, quod dixerit Serapio, quem hic secutus est Fuchius, huiusce lacce infecturam vocari chermes: quippe proprio capite de chermes, nil sanè aliud per chermes intelligit, quam coccum infectorium Dioscoridis. quo fit, vt existimauerim in eo capite de lacca omnino subesse mendam, vel auctoris, vel interpretis: & fortè melior hæc esset lectio. Coquitur hæc, & inficiuntur inde panni rubeo colore, adeò vt coccinei videantur: vel adeò vt iis similes sint, quorum infecturis iniiciuntur chermes. Aberrant præterea pharmacopolarum quam plurimi Dialaccam antidotum componentes, quod legitimam Armeniacæ lacce loco, quam Arabes prodidere, factitias, & pictoribus tantum dicatas immisceant. Sed caueant, quæso, ne hunc errorem corrigentes in alterum non minus detestandum incidentur: namque iis facile contingit, si Monachis, qui in Mesum scripserunt, morem gerent. Hi enim iam rei medicæ professores asserere non dubitant, immiscendum esse loco cuncami, seu lacce in magnam dialaccam antidotum eam Aphricæ arboris lacrymam, quam seplasia sanguinem draconis appellant, quæque Dioscoridis cinnabaris ab omnibus esse censetur. Sed certè si magis hallucinantur, quam vt refelli debeant, quod ea lacryma in compluribus facultatibus cuncamo aduersetur. Quippe Arabicum Cancamum, quod potissimè antidotus illa exposcit, tanquam à Mauritani inuentum, præterquam quod ventriculum, & iecur roborat, adeò eorum infarctus, & obstructions expedit, vt istericos quidem, & aqua intercutè laborantes iuuet. Contrà verò draconis lacryma propria vi efficaciter suffringit, ita vt scriptum reliquerit Dioscorides, eam lacrymam iisdem pollere viribus, quibus hæmatites lapis: cuius tamen vis est, vt mensum profusua sistat, non autem vi eliciat, Cancami modo, præsertim vbi vasorum infarctu remouentur. ob idque maximè expectat ad sanguinis emanationes, ad vulnera cohibenda, & ossium fracturas ferrum mandas. Sed monachos missos faciamus: & seplasarios admoneamus, vt si nostro consilio vci velint, non aliud pro lacca in eam antidotum imponent, quam laccam ipsam Serapionis. quæ natua ex Armenia ad ferocorum vellerum insectum copiosissima ad nos deferretur. siquidem de hac intellexerunt Mauritan: quos secutus Nicolaus Myrsicus in sua Dialaccæ confessione laccam infectorium immiscuit. Quod ἀλκυμνῶν Græci, Latini item Cancamum vocant: Arabes, Sach, siue Lach: Itali, Cancamo: vulgus officinarum, Lacca.

CYPRI. CAP. XXIII.

CYPRI odorati suffimenti compositio est, dicata diis: qua abunde Aegyptii

*Fachy o-  
pino im-  
probata.*

*Pharma-  
copolarum  
error.*

*Monacho-  
rum lapsus.*

ptij sacerdotes vtuntur. In antidota misceri solet: suspensiois datur in potu. Permulta componendi rationes, quarum vna hæc est. Sumito cyperi dimidium sextarium, cum pari baccarum iuniperi adultæ modo: vna passæ pinguis, exemptis vinaceis, minas duodecim: refinæ purgatæ minas quinque: calami, & iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum minam: myrrhæ duo decim: vini veteris sextarios nouem, cū duabus mellis minis. Vuam passam, detractis vinaceis, tufam cum vino, & myrrha subigito: cætera tufa, & cribrata adiiçito: die vno humorem combibere finito. dein mel coquito, dum sibi glutinis adfiscat crassitudinē: eliquatam refinam accuratē permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictile vas recondito.

*Cyphi Caput adfectitium.*

*Nomina.*

No n omnes sanè Dioscoridis codices, præsertimque vetustiores hoc Cyphi caput recipiunt. Quo fit, vt crediderim cum plerisque rei medicæ peritis, id illegitimè huc accessisse. siquidem non rationi consentaneum esse videtur, Dioscoridem hic de simplici materia scribentem, composita modicameta tam inconsultè ac præter rem simplicibus inseruisse: præsertim cum id nulli superiorum cōmodè adnecti possit, quemadmodum est de multis aliis compositionibus. Vt æst Græcis, ita etiam Latinis, & Italis, Cyphi appellatur.

CROCVM. CAP. XXV.



madefactum manus inficit, nec situm redoler, aut cariē sentit, subacre: fin huius generis non est, aut vetus, aut humore persusum creditur. Secundus

locus datur Coryceo, è tractu Lyciz contermino. Tertius Lycio, è monte Olympo. Dein ex Aegibus Aetoliæ. Cyrenaicum & Centuripinū inter Sicilia omnia viribus infirmius est. Omniū natura oleracca. Itali ramen ob succi copiam, & coloris venustatem, tingendis mortariis dicauerunt: quibus de causis magno venditur. Vtilissimum in medicina quod antè descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuso, atque etiam sapæ subtili: contrita, quò pondus adiciatur, simul argenti spuma, aut plumbagine. Sed maleficiū declarat insidens puluis, præsertim si defrutum in odorando subolet. Thesalus ipsum tantum odoratum esse voluit. Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis. Procul dubio vim coquendi, emolliendi, atque substringendi habet: vrinam cit: elegantem colorem præstat: qui ex passo biberint, crapulam non sentient: oculorum fluxiones illitum cum humano lacte cohibet: additur in potiones, quæ interaneorum causa temperantur: ad vulus etiam, sedisque cataplasmata, vtiliter inditur: venerem stimulat: vergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet: auricularis collectionibus vtile. Quò facilius conteratur, in calido fictili sole sic cari oportet, celeriterque versari. Vrinam mouet radix ex passo pota.

*Κροκίνθημα. CROCOMAGMA. CAP VI XXVI.*

CROCOMAGMA fit expressis vnguenti crocini odoramentis, & in formas digestis. Optimum est odoratum, modicè myrrhæ olens, graue, nigrum, ligni expert, læue, subamarum, quod madefactum croci colorem reddit, gustatumque vehementer dentes ac linguam inficit, multis durans annis: quale est quod à Syria defertur. Haber suas vires ad delenda, quæ caliginem oculis obuersant: vrinam cit, calfacit, concoquit, & emollit: Vires croci proportionē quadantenus representat: quandoquidem

quidem plurimam croci partem sibi Crocomagma vendicat.

*Croci cultus  
et ratio.*

CROCVM quidem vbique terrarum cognoscitur. In Italia, & præsertim in Hetruria, Mauritanorū modo vulgò vocatur Zaffarano: quanquam non desunt rura in agro nostro Senensi, quæ corrupto à Croco vocabulo ipsum appellant Gruogo. Cæterum crocum Coryceum, & Lycium in Olympo monte decerptū (quod sciam) ad nos non aduehitur. Quapropter quod ab Aquila Vestinorum vrbe assertur, primum sibi locum vendicat in Italia. Constat optimum esse, & Aquilano longè præstantius, quod in Germania oritur, è Vienna Austriæ metropoli deuectum. Sed huiusmodi sanè perexiguum est, idgè difficulter trāsire ad Italos, ob eius frequentissimū in cibis vsum apud Pannonios, & Germanos. Floret Crocum (vt

*Croci Sim-  
plex ex Gal-  
ieno.*

Theophrastus auctor est) vergiliarum occasu, paucisq; diebus contectum verò cum tolto florem quoque expellit. Gaudet calcari, & melius ita euadit. Croci meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquires. Crocum paululum etiam adstringens quid obinet, quod terreum, frigidūque ostendimus. Sed superat in eo calfaciens & qualitas, & facultas, vt tota eius essentia secundi sit ordinis exalfaciētum, & primi exicantium, proinde concoquendi quoque vim quandam habet, adiuuante scilicet in hoc & pauca adstrictione. Quippe quibus medicamentis, cum non admodum exalfaciant, pauca adest adstrictio, ea parē facultatem habent essentiis emplasticis vocatis, quas cum iunctas esse caliditati non vehementi contigerit, concoquentes esse ostendimus. Et lib. I. de comp. med. secundum locos: Crocum, ait, suo odore caput ferit, &

*Nomina.*

mentem tentat, pencedani, & fructuum lenticis modo. *κρίαν*, Græcè: Crocus, Latine nominatur: Zahafaran, aut Zafaran, Arabicè: Zaffarano, Italicè: Saffran, Germanicè: Azafran, Hispanicè, Saffran, Gallicè. *κροκοῦμα* idem nomē retinet apud Græcos, Latinos, & Italos.

#### HELENIVM. CAP. XXVII.

HELENIVM folia habet verbaſci angustioris folij, asperiora, oblōga: caulem quibudam in locis nō emit tit: radicem subalbidam, interdum subrufam odoratam, subacrem, vegetam, magnā: ex qua agnatæ propagines liliorū, aut ari modo feruntur. Montanis, vmbrosis, & siccis locis prouenit. Foditur æſtate radix, particulatimque dissecta siccatur. Potum radicis decoctum menses, & vrinas ciet. Ipsaque in eclegmate ex melle prodest



tulis est in passo condita: siquidem falgamarii paululum siccata eam, mox decoctam, & frigida aqua madefactam, in sapam coniciunt, & ad vsus recondunt. Trita, potaque ad cruentas excreationes efficax est. Alterum Helenii genus in Aegypto gigni Crateuas tradit. Herba est cubitalibus ramulis, serpylli modo per humum repētibus folijs lenticulæ circa ramos, sed longioribus crebrisque: radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, supernè crassiore, cortice nigro. Nasctur in maritimis, collibusque. Radix vna in vino epota, contra serpentium ictus auxiliatur.

*Helenij et  
sideratio.*

HELENIVM, quod Latinis etiam Inula dicitur, planta est vulgaris notitiæ. Quod autem in Italia prouenit, folio est longe maiore, quam tradiderit Dioscorides. Quippe non solum verbaſco angustifolio Inulæ Italicæ maiora insunt folia, verum etiam ea magnitudine longè superant, quæ latifolio exoriuntur. Quod tamen pro locorum varietate euenire faciliè possit: crediderim tamen hoc in loco Dioscoridis codicem pluribus seateere mendis. Siquidem testatur Marcellus Florentinus vir quidem apprinnè doctus, se habuisse Dioscoridis vetustissimum, ac probatissimum codicem, in quo longe plura legebantur, quam in cæteris ferè cunctis Græcis exemplaribus. Sed præsertim in hoc capite hæc de caule, floribus, & semine habebantur. Caulem ex se mittit Helenium crassum, hirsutum, cubitalem, & aliquando maiorem, angulosūque: flores luteos & in his semen verbaſco simile, tactu pruriturum faciens. Quare mirum non est, si etiam alia hic desiderari possint,

possint, cum nō faciliē adducar, vt credam, Dioscoridem Helenii radicis, cuius tantum est in medicamentis vsus, tum amaritudinem, tum formam subscisse. Meminit Inula Plinius libro x i x. cap. v. vbi sic habet. Sifer his feritur mensibus, februario, martio, aprili, augusto, septembri, octobri. Breuior his est, sed torosior amariorque Inula, per se stomacho inimicissima. Eadem dulcibus mistis saluberrima. Illustrata maximē Iulie Augustæ quotidiano cibata. Superuacuum eius semen, quoniam oculis ex radice excisis, vt arundo feritur. Item libro x x. cap. v. Inula quoque inquit, à ieiunis commanducata dentes confirmat, si vt eruta est, terram non attingat. Conditæ tussim emendat. Radicis verò decoctæ succus tinea pellit. Siccata autem in vmbra farina, tussis, & conuulsis, & inflationibus, & arteriis medetur. Venenatorum morsus abigit. Folia ex vino lumborum dolori illinuntur. haftenus Plinius. Cæterum Aegyptium helenium, quod Crateæ auctoritate memorie prodidit Dioscorides, ad nos (quod ego sciam) non defertur, nec in Italia prouenit. Hoc à nostrate non distinxit Auicenna, sed vtrunque simul confudit. Meminit huius etiam Plinius lib. x x i. cap. x. his verbis. Helenium ē lacrymis Helenæ dicitur natum: & ideo in Helena insula laudatissimum. Est autem frutex humi se spargens, dodrantalibus ramulis, folio simili serpyllo. Item libro eodem cap. x x i. Helenium, inquit, ab Helenæ lacrymis (vt diximus) natum, fauere creditur formæ: cutem mulierum in facie, reliquæque corpore nutrire incorruptam. Præterea putant vsus eius quandam gratiam iis, veneremque cencilari. Attribuunt & hilaritatis effectum eidem potæ in vino, eumque quem habuerit nepenthes illud prædicatum ab Homero. quod trāctia omnis aboleatur. Est autem succi prædulcis. Prodest & orthopnoicis radix eius in aqua ieiunis pota. Est autem candida intus, & dulcis. Bibitur & contra serpentinum ictus ex vino. Mures quoque contrita dicitur necare. hæc Plinius. Quibus satis constat, non modo in Aegypto hoc Helenii genus prouenire, sed etiam in Helena Aegæi insula præstantissimum haberi. Helenii vires scripsit Galenus libro v i. simpl. medic. sic inquires. Helenii herbe radix maximē vilis est, non primo statim occurssu exalciaciens: ac proinde non dicenda est calida, & sicca exacte, ceu piper tum atrum, tum candidum, sed cum recrementis humoris. Quapropter eclimatis, quæ faciunt ad educendos ex thorace, & pulmone crassos, lentosque humores idonee commiscetur. Rubrificant quoque ea partes frigidis, ac diuturnis vexatas affectibus, cuiusmodi sunt nonnullæ coxarum passionēs, ischiadas vocant, & exigux assidue, articulorum quorundam præ humiditate prouidentia, ac luxationes. hæc ille. Cæterum sunt, qui dicunt (vt etiā testatur Galenus libro de theriaca ad Pisonem, si tamē liber ille

Galenii legitimus est) quod si Helenii succo res venatoria inficiantur, venenata efficiuntur, idque in Dalmatia fieri narrant, vt feras omnino perdant. Quod tamen potius fabulosum, quam historicum crediderim. Planta, quæ Græco nomine *ἰνύλη*, Latino Helenium & Inula dicitur: Arabico, Iasim, siue Rassen: Italico, Lella, Enoa, aut Enola: Germanico, Alant: Hispanico, Raiz de alla: Gallico, Auinæe.

Nemine.

OMPHACINVM, ET OMNE  
OLEVM.

CAPVT XXVIII.

OLEVM, quod ex immaturis oliuis exprimitur, ad multos vsus recte valentibus accomodatissimum est. omphacinum id appellatur. Præstat recēs, odoratum, quod non mordeat. Tale vnguentorum compositionibus idoneum intelligitur. Stomacho vtile est, quod alstringat: gingiua contrahit, dentes firmat, si contineatur in ore: sudores cohibet. quod autem vetustius, ac pinguius, eod ad medicamenta aptius est. Et (vt reliqua in commune dicantur) omne oleum calfacit, emollit ventrem, à perfrictionibus corpus tuetur, ipsumque promptius ad obeunda munera reddit. alium emollit, vlcera tum medicamentorum vires permittunt herbet: contra venena datur, assidue potum, redditumque vomitionibus soluit alium hemina mensura cum pari ptisanæ succo, aut aqua potum: ad torminalium calidum simul decocta ruta tribus sextariis in potu datur: ventris animalia pellit: idem maximē ilei intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit, & vehementius disscutit: oculorum claritati subtiliter confert. Si vetusti non sit occasio, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, vt vetustatem repræsentet.

OLEVM STILVESSRIS  
OLIVÆ.

CAPVT XXIX.

OLEVM, quod sylvestres oliuæ fundunt, vehementer alstringit, & ad san-

Helenij  
Aegyptio  
fid.

Helenij  
res ex Ga  
leno.

Fabulo  
sum.



rum vsus secundum sibi locum vendicat. In doloribus capitis vtiliter pro rosaceo substituitur: sudores arceat, defluentes capillos inhibet: furfures, vlcera capitis manantia, scabiem, lepraque abstergit: tardius canitiem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Candidum oleum fit hoc modum. Album colore, nec anniculo vetustius, in nouum fictile oris patuli funditur, centum heminarum mensura, & sub solem media quaque die concha refunditur, ex altoque demittitur, vt afsidua deuolutione, ictuque agitatum respumet: octa ua die scenum græcum mundum quinquaginta denariorum pondere, calida aqua madefactum, donec emollescat, in supradictum oleum deiicitur, ita ne extillet aqua: postea tedæ præpinguis piceæ, assulatim cæsæ æquale pondus adiicitur, & transactis octo diebus, oleum concha mouetur. Vbi candorem contraxerit, in vas nouum vetere vino affusum recondi debet, substratis fertulæ Campanæ corollis drachmas vndecim pendentibus, cum pari iridis pondere. sin minus, rursus soli mandandum, & idem munus obeundum, vsque dum inalbescat.

## SICYONIUM OLEVM.

## CAPVT XXX.

SICYONII componendi ratio hæc est. In lebetem oris lati, stanno indutum, funditur noui olei albi, quod crude oliuæ reddiderunt, congius vnus: aquæ semicongius. Leui id igne coquitur, leniter mouendo: at vbi bis effebuit, & subtracta igne refrigit, innans oleum concha decapulatur, & adiecta noua aqua conferuescit, & reliquis, vt diximus, peractis reponitur. In Sicyonia maximè fieri consuevit. Sicyonij inde accepto cognomine. Calfactoriam ad quandam vsque modum vim habet. Febri, ac neruorum vitiis prodest. feminæ ad commendandum faciei nitorem eo vtuntur.

## STRIGMENTVM.

## CAPVT XXXI.

STRIGMENTA à balneis calfaciunt, molliunt, discutunt: ad sedis rimas, & condylomata illinuntur. Illa verò, quæ ex palæstris puluerem sibi adsciuerant, in fordis speciem redacta, articularum nodos imposita adiuuant: ischiadicis in fotus, aut malagmatis locum, calida commodè sufficiuntur. Dersa gymnasiolorum parietibus, simulacrisque sordes, calfaciunt: tubercula, quæ ægrè ad coctionem producuntur, dissipant: desquamatis, & vlceribus antiquis profunt.

MVLTO quidem artificio veteres vtebantur ad componendum multifariam oleum, vt ex Dioscoride satis superque constat. Quod tamen hac tempestate à nobis fieri non solet: quanuis fortasse apud Græcos eiusmodi parandi olei consuetudo minimè exoleuerit. Quippe id tantum in communi omnium vsu apud nos habetur, quod è maturis oliuis exprimitur: tametsi quidam, quòd & gustatu iucundius, & sanitati conducibilius sibi oleum comparare velint, id ab immaturis oliuis exprimant, quas eo tempore legunt, cum ipse iam plene fluxu tantillum subrubescere cœperint. Cæterum non mirum est, si veteres & illud candidum reddere, & multas parare modis curabant: si quidem non modò in ciborum condimentis oleo frequenter vtebantur, sed etiam vt agiliores, promptiores, ac expeditiores euaderent ad obeunda corporis munera, frequentius sibi totum corpus oleo perungebant. Qua de causa & balneas frequentabant, & thermas. namque olei contracta sordes, vt corpora sæpius perluerent, maximè exercebat. Obibat autem id muneris serui in balneis, qui non modò corpus totum intrantibus ablucebant, sed & ipsum quibusdam strigilibus abradebant ad hoc opus aptissimis, quas alii ex auro, nonnulli ex argento, quidam ex ferro, aliqui ex ebano, & etiam ex præclaris lapidibus sibi comparabant, denique pro nobilitate, & facultate eorum, qui ad balneas consuebant. Quapropter dum se in ipsis balneis abraderent, sudoremque emanantem detergere curabant, olei strigimèta, quo se prius perunxerant, in balnei aquam decidebant: quorum hic meminit Dioscorides. Fuit præterea in magno, ac præcipuo vsu apud veteres oleum ad perungendos athletas, qui in theatris palæstræ nudi luctabantur, non solum vt eorum corpora agilia, expeditioraque in certamine redderent, sed vt etiam si difficilius sese manibus comprehenderent. Cum autem ibi pulvis ob pedum

*Olei confideratio.*

*Olei usus apud veteres.*

ob pedum frequentiore morum concitaretur, athleta ipsi oleo affatim peruncti, illi in se facile contrahebant, ac multo magis cum in terram alter alterum conferebant. Quare balneum ingressi, strigilibusq; abradi cernosa strigimenta relinquebant, quibus artuum affectibus Dioscorides mederi tradidit. Sed cum plurimi athleta oleo copiose peruncti, inter luctandum palæstræ parietibus, ac statuis lapideis sese sæpius affricarent, contacta loca olei pinguedinem contrahebant, quo facile fiebat, ut adueniente pulvere cernosum quoddam vnguentum parietibus inhæresceret: id quo etiam Dioscorides differtur. Olei facultates sicut

*Olei facultates ex Gal.*

Proscorides est Galenus lib. v. 1. de simplicium medicam. facult. sic inquit. Oleum, quod ex oliuis conficitur, quod sanè propriissimo nomine oleum appellamus, cuiusmodi sit temperatura, superioribus libris definitum est. quippe humidatorem esse, & moderate calidum offendimus. Eiusmodi est, quod est dulcissimum, sitq; potissimum ex oliuis, quas Græci *Απρωτὰς* vocant, nos drupas. Cæterum quod omotribes, & omphacinum nuncupant, id quantum in se habet adstrictionis, tantum etiam illi inest frigiditatis. Porro oleum vetus, quod quidem ex dulci inueterato efficitur, & calidius est, & magis discolorium. Quod verò ex immaturo, id dum reliquum quippiam seruauerit adstrictionis, mista permanet facultas: ubi verò illa prosum abiecit, reliquo sit simile. Quæ etiam quicunque in præparando germina nitiunt, ii & ipsi omphacinum simile oleum efficiunt. Cæterum rogandum non est, quo pacto sit præparatum, sed gustandum est potius: ac si præferat adstrictionem quippiam, cætenus etiam frigidum esse existimandum, cum illud, quod ab Iberia portatur, quod Spanum, id est Hispanicum nominat. Quod si nequaquam gustantibus adstringere appareat, sed ad amissum videatur dulce, id modice esse calidum putandum. Porro si tenue quoddam cernatur (tale est, quod purum est, quodq; inuenti translucenti videtur) ac modicum eius latissimè per cutem extensum sibi maneat continuum, celeriterq; à cute combibatur, id utiq; pro optimo ducendum, ac olei virtute quâ maxime polleat, quale est Sabinum. Porro quod oleum lotum maxime expers sit mordacitatis, supra posuit est. Cæterum quo potissimum modo id probissime laues, in sequenti tradâ opere, quod inscribetur de medicaminum compositione, ubi & de Scyonio, & si quod eius generis præterea oleum est, agetur. nunc simplicia prosequor, adiciamq; & de aliis olei speciebus sermonem.

*Oleum huius nescit.*

Itam quod ex agrestibus oliuis exprimitur, non simpliciter temperatâ obtinet, sed exterius, simulq; adstringit. Squalidissimum id est ex omni olei genere, & post Iliricum quoq; deinceps illis est Hispanicum. Pinguissimum est Libicum, & Cilicium: simul autem pingue, & tenue Sabinum. In medio comprehensum

omnium sunt tum id, quod per Cyclades insulas nascitur, tum quod per Græciâ, Asiamq;. Porro oleum pingue æstiuatur, indicaturq; viscositate: tenue verò si perlucet, si purum sit, si plurimâ à minimâ eius portione inungatur, si facile à cute combibatur. Ex dictis cognoscere iam liceat & de aliis olei generibus, quæ æquiuocè ipsis dicuntur vnguentis, pura rosaceo, melino liliaceo, & quæcunq; id genus floribus, fructibus, germinibus, foliis in oleo maceratis conficiuntur. Horum quodq; ubi vnâ cum aromaticis præparantur, vnguentum efficitur. Proculq; insectorum natura oleum variari contingit. Ex his ergo, quæ in toto hoc opere de quoque iniciendorum generatim disces, sigillatim quoque confectum extisdem oleum cognoscere dabitur. Quod Græci *ἔλαιον*, Latini oleum dicunt, id Arabibus *Caft*, seu *Zait* nominatur: Italis, *Olio*: Germanis, *Oel*: Hispanis, *Azêyte*: Gallis, *Huyle*.

ELÆOMELI. CAP. XXII.

IN PALMYRIS Syriæ, quod elæomeli vocant, ex quodam caudice manat, oleum melle crassius, sapore dulci. Bilem, cruditatēque detrahit, sextario cum vna aqua hemina dato. Sed qui sumpserit, torpescunt, & viribus deficiuntur. quod minimè vereri oportet: verum crebro excitare, ne verno pressi somnos caprent. Fit & oleum è pinguitudine fursulorum. Optimum vetus, crassum, pingue, non turbidum. Calfacit: priuatim caliginibus oculorum illinitur: lepras, neruorumq; dolores illitum emendat.

QUANTUM VAM quotidie plura, variq; mercuriorum genera nobis ex Syria conuehantur, Elæomeli tamen (quod sciam) non modò non conuehitur, sed ne vllum quidem vnquam audiui, qui ipsam videret, vel nouerit. Cæterum Hermolus vir quidem præstantissimus dubitat, vtrum elæomeli sit manna, elæomelieis, & æromelieis, quod mel aeris significat, viciniate deceptus. Quapropter non possum non admirari, doctissimum virum hac in re dubitasse, cum tum Dioscorides, tum etiam Plinius, quibus cum longam contraxerat consuetudinem, communi sententiâ scribant, elæomeli oleum esse è quodam arboris caudice manans in Syriæ Palmyris, non mel æreum, neque rorem, qui ab æthere cadat. Eoq; magis, cum addiderit Dioscorides, non modò elæomeli per se ex arbore manare, sed & factitium haberi tuis, expressisq; arboris fursulis.

*Hermolus Lapsus.*

CICINVM OLEV. CAP. XXXIII.

CICINVM oleum hoc modo temperatur. Maturi ricini, qua voles quantitate, torrido sole flaccescunt, & aliorum more cratibus instrati tantisper insolantur, dum velsim cortex fractus decidat. Caro colligitur, & coiecta in pilam diligenter tunditur: postea in leberem stanno illitum, qui aquam habeat, demittitur, subiectoque igni feruescunt: & vbi insitum prorsus humorem reddiderit, sublato ab igni vase, innatans oleum concha tollitur, & reconditur. Sed in Aegypto, vbi largior increbuit vsus, longè secus fieri solet. Nam repurgatos ricinos molè mandât, & accuratè mollitos per sportulam torculo exprimunt. Tum quidè ematurerit ricini, cum còtinentibus orbiculis exnùtur. Cicinum oleum ad psoras, & vlcera capitis manantia valet: prodest sedis inflammationibus, vulnis conuersis, atque præclusis: item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus: emplastra efficaciora reddit additum: potu aquam aluo extrahit: ventris animalia pellit.

*Ricini olei  
considera-  
tio.*

RICINVM, siue Cicinum oleum, Cheruæ oleum officinis dicitur, quanvis rarioris sit vsus. Nanque semen plantæ, quam Dioscorides ricinum appellat, Arabum esse cheruam nemo est, qui ignoret: quod etiam Serapio pentadactylum vocat, vt diffusius suo loco libro quarto explicabitur. Cæterum ricinus animalculum est sedum, liuidû, & sanguine plenum, quod Italici zecca vocant, subibus, canibus, capellis, & id genus animalibus infestissimum. Cui cum hoc semen forma, & colore sit quàm simillimum, idcirco Ricini nomen sibi comparauit. Meminit huius oleiciam Mesues, qui præter vires ei à Dioscoride redditas, addidit, id validè crassas coercere inflationes. Proinde ventriculi, laterum, colicq; doloribus prodest illitum, portû, & insitum.

*Ricinus  
unde di-  
ctus.*

AMYGDALINVM OLEV. CAPVT XXXIII.

AMYGDALINVM oleû, quod aliqui metopium vocant, hoc fit modo. Semodius ex amaris nucibus repurgatis, siccatisq; in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas aquæ, quæ ferbuerit, sextarius adijcitur, & vbi dimidiâ hora humorem hauserit, vehemè-

tius quàm antea tunditur: mox tabellis excipitur. Pressis nucibus rursû hemina aquæ inspergitur, & postquàm ebibuerint, idè opus prosequendû, singulas heminas reddât singuli modij. Còtra vluarû dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundè locorû inflammationes efficacè est: vitii renû, calculosis, difficilivrinæ, suspiriosis, lienosisq; proficit: dolores capitis, grauitatè auditus, sonos incertos, tinnitusq; discutit: maculas, & vitia cutis tollit è facie: & eam erugat cû melle, radice lilij, & Cypria cera, aut rosaceo cerato: & oculorû hebetudines emédât, vlcera capitis manantia, & furfures cum vino abstergit.

CVM amarum omnino dulci sit temperandum, delinquere sanè existimare, si oleum ex dulcibus amygdalis expresum (cui illud Dioscorides silencio inuoluerit) ex amaris còfecto non adicere, rectumq; consiciendi modum non explicarem: præsertim cum nostræ ætatis medicis maximo sit vsui, & pauci sint myropole, qui ipsum rectè probeq; consiciat. Parandû igitur rationem (vt Mesues tradidit) sic habeto. Præstantiores, dulcioresq; amygdalæ, qua lubet quantitatè, ab vtriusq; corticibus repurgatæ, optimè in lapideo mortario tunduntur, & in loco calido reponuntur, quiaque horarum spatio, dein parum iterum contunduntur: mox prælo tandû premuntur, quouique omne, quod continent, effluit oleum. Elicitur etiam hoc modo. Collocantur delibratæ, contusq; amygdalæ in vitro, vel itaneco vase, infunditurq; vas in balneo calentis aquæ. Excititur deinde tribus peractis horis, extrahunturq; amygdalæ, & statim prælo calentes subiiciuntur: itaque oleum copiosius excipitur. Tritæ rursû amygdalæ, & repurgatæ in sacculis panno duplicato inuolutis sub arena, cinerè calido reconduntur, & postquam effuberint, prælo oleum elicitur. Sed nostrates seplasarî plurimum negligentie, larvæ ignominie, & lapsum.

*Amygda-  
lini par-  
di ratio.*

*Myropo-  
larvæ igno-  
mia, & la-  
psum.*

50 raras, & rancidas commiscunt, & omnes simul conterentes, in æreum cacabum iniiciunt, ignique admovent affuso aquæ tantillo, ne penitus torrearant: deinde in sacculum coniciunt, & prælo summittunt, & quod inde fuit oleum excipiunt. quod plerumque exustionis nidorem tantum obolet, vt haurientibus illico euomendi parat nausam. Quia tamen sic parant oleum amygdalinum, eius lenientem facultatem peruertunt, ac destruant: siquidem contusis amygdalis non delibratis, oleum

*Sesamini  
Genui  
rei.**Oleum è  
nucibus  
inglandis-  
bna.**Hyoscy-  
mini  
vires.*

oleum inde confectum corticum vires asseruat. Proinde & consipat, & exasperat, & scabritiem inducit. id quod etiam adauget ignis violentia, dum in lebetibus amygdale torrentur. Hoc itaque diligenter animaduertens optimus Mesues Amygdalini faciendi rationem prodidit, ut videlicet, cum purgatæ, consusq; essent amygdalæ, colore quodam suauis, ac læto leniter caleherent, sicut diximus, non autem carbonibus ardentibus, quemadmodum hodie ii faciunt myropolæ, qui etiam alia plerq; consiunt. Amygdalinum igitur, si rectè, probeq; cõficiatur, mirificè lenit. quare potum ad libræ dimidium alium leniter deicit: asperæ arteriæ, pulmonis, ac pectoris scabrities tollitur: durities omnes emollit: & compaginum, & membrorum omnium scicitates humectat. quocirca hæcicis plurimū cõducit. Cõtra vuluaria dolores illitic & potū faciliè præstat: sicuti vesicæ cruciatibus est efficax, si argentea fistula coniectū impulsorio instumētō iniiciatur. Quod autem ex amaris amygdalis exprimitur, dulci in omnibus efficacius habetur. Idcirco in prouocandis lapillis, conciliandisq; viscerum cruciatibus à statu crasso re generis, dulci longè præstantius reperitur. Nimirum & obstructions aperit, & interaneorum tincas cõcut.

**BALANINUM OLEVM. CA. XXXV.**

**SIMILI** modo fit Balaninum oleū. Quod repurgat maculas, lentigines, varos, & cicatrices nigras: alium soluit, stomacho aduersatur: contra aurium dolorem, sonos, & tinnitus auxilio est, cū anserino adipe instillatum. Similis sesaminum ex sesamo consiciendi ratio. Fit etiam è nuce iuglandæ oleum, quod caryinum vocant. Eandem vim habet, quam balaninum.

**OLEVM** vnguentariæ glandis, quod Balaninum vocat, à pharmacopolis, & vnguentariis oleum de Ben appellatur: quoniam myobalanum, quod Læni vnguentariā nucem dicunt, ex qua hoc conficitur oleum, Mauritanii Ben appellant, ut latius libro quarto differemus. Consimili modo id Mesues fieri tradit. Et (ut idem etiam auctor abstergit, mundat, & obstructions aperit. Illud strumas dissoluit, durosq; tumores. Frigidis tum iocineris, tum penis affectibus opem mirificè præstat: facit & ad frigidæ neruorū conuulsiones, & cõpaginum cruciatibus. Sed illud sibi peculiariter adscituit, q. etiam si diu veterescat, haud quaquam rancidum euadit. Ideoq; vnguentariis expetitur ad suauissimam odoramentam excipiendam, præsertim cum mofcho, & ambra: chirothecas illiunt. quo fit, ut nullo temporis tractu rancorem vquam respiciant, ut faciliè eueniret, si alio quouis oleo in opere vteretur. Quamobrem mirari non licet,

si veteres fructum, à quo elicitur hoc oleum, glandem vnguentariam nominauerint. Sesaminum verò (ut Mesues inquit) amygdalini modo exprimitur. Quippe sesami repurgatum semen primò contunditur, deinde eodem artificio calefactum prælo supponitur, tandūq; premittitur, quousque oleum reddat. Id (ut idem testatur) pingue ministrat alimentum: semen adauget, asperitates quasq; lenit, sed præcipuè gulæ: vocem expedit, & dura apostematata molliat. Adicitur Sesaminum plerisque vnguentorum compositionibus, quorum in officinis est vsus. Verum quod è iuglandibus nucibus elicitur, nullius in medicina vsus esse reperio, etsi lucernis, & lampadibus, qui parsimonie student, id maxime expetant. quippe ignis funiculo non tam citò consumitur, quam id, quod ex oliis paratur. Præfertur etiam pictoribus eo, quod è lini semine exprimitur: siquidem hoc cerussæ admixtum tractu temporis colorem immutat, illud verò incorruptum perpetuò asseruat.

**HYOSCYAMINVM OLEVM. CAP. XXXVI.**

**HYOSCYAMINVM** sic fit. Semen candidum, recens, ac siccum tunditur, & calida aspergitur aqua, ut in amygdalino diximus: dūmq; insolatur, siccatur, quæ sub manu sunt partes, cum reliqua massa permisceantur: hoc autem fieri oportet, dum nigrescat & grauior oleat: mox perigram, atque excolatum reconditur. Ad aurium dolores efficax est: pelsis miscetur, ad emolliendum vtile. Fit & è grano gnidio purgato, & tuso. Vis ei alium soluere potu. Non secus cnicinum oleum temperatur, cui facultas eadem est, quæ factò è gnidio grano, verum inualidior. Rhaphaninum è rhaphani semine fieri solet, cæterorum more. Phthiriales mala valetudine contractas tollit: scabritias cutis in facie emendat. Ad obsonia vtuntur Aegyptij. Melanthinum idem, quod rhaphaninum potest, eodēmq; modo paratur. Tritum sinapis semen, & calida aqua madefactū, adiecto post ea oleo exprimitur. Id ad diuturnos dolores efficax est: transfert humores, qui in aliqua parte concreuerunt.

**TAMETS**i pauci reperiantur medici, qui Hyoscyaminum oleum nouerint, ne dum in vsum receperint vnguentum, ego tamen id ipsum pluries confeci. Siquidem ad tollendos omnes genus dolores, ubi cætera præstidia non iuu-

*Amygdala  
læni vires.**Balanini  
consideratio.  
Balanini  
facultates.*

rint, efficacissimum est medicamentum, præsertimq; inflammationibus pudendum vtriusq; sexus. Item acutissimis aurium doloribus medetur cum castoreo, vel croco instillatam. Prohibet præterea gonorrhœam, renibus & testibus illitum. Mensum exuberantiam cohibet, & albacenia vteri profluvia, tum pubi & lumbis perunctum, tum pellis infusum. Mammis à partu inflammatis vtiliter illinitur. Dentium dolores mirifice mulcet, si tepidum in ore contineatur. Piorum exortum admodum retardat, albis quibusdam additis, ita vt euulsi pili integro anno non renascantur, si eodem depilata loca sæpius perungantur. At ipse in eo faciundo Dioscoridem minimè secutus sum, sed aliam parandi rationem adinueni, quæ hæc est. Sumito nouum, siccumq; hyoscyam: semen, tundito deinde, ponitq; in stanneo, vel vitreo vase, ardenti aqua, quæ è vino sit, parumper prius affusum. His factis ponito vas in calentis aquæ balneo die, ac nocte, demum adhuc feruens faculis imposito & prælo subiecto, sicq; oleum habeto. Quod autem è grano Cnidio, quod rustici Ananiensem montanum piper appellant, paratur, recessit hoc æuo à medicorum usu, eo quod in detegenda alio violentissimum sit medicamentum, rusticis tamen apertissimum, cum sæpius, ne medicos consulat, coctum Cnidium deuoret: quo etiam sæpius morte occumbunt. Porro Cnicinum (vt Mesues inquit) potum aqua intercutelaborantibus, viscerum obstructionibus, ventriculi & coli cruciatibus à flatuofitate genitis, efficac est. Suspensiois mirifice prodest, & vocem clarificat. Epotum pituitam tum vomitionibus elicit, tum per inferna ducit. Rhaphanin præterea, & Melanthinum aboleantur, sicuti etiam Sinapin: etsi vbi ad summum exaltacere opus fuerit, maxima opem præstare valeant.

*Hyoscyam.  
parandi  
ratio.*

*Cnidium.*

*Cnicinũ.*

*Rhaphaninum.  
Melanthinum.  
Sinapinũ.*

Sinapinum verò non nisi collactarymanibus oculis exprimi potest: tanta enim est vaporis acrimonia, vt concepto vapore, illico prodeant lacrymæ. Miscetur quandoq; cum eo, quod è pistaceis nucibus elicitur: perungunturq; eo genitalia in frigidis, vt felicius coeant, addito lasere, & moscho.

# MYRTEVM OLEVM.

CAP. XXXVII.

MYRTEI faciendi ratio hæc est. E myrto nigra syluestri, aut satina, foliorum mollissima quæque tusa premuntur: succo pares omphacini olei portiones adiiciuntur, subiectisque carbonibus inferuescunt, donec concoquantur: innatans oleum dearditur. Sed longè facilius hæc compositio. Tenera folia cõ tusa coquuntur in oleo & aqua, & quod innarat, eximitur. Priuatim alij deiecta in olei folia in sole macerant: alij prius

oleum inspissant malicorio, cupresso, cypero, & iunco odorato. Efficacius est amarum gustu, & oleosum, viride, tráf lucens, & olès myrtum. Astringit, & indurat: ideo medicamentis miscetur, quæ cicatricem obducit: prode! viceribus in capite manantibus, ambustis igni, & papularum eruptionibus. Facit ad attrita, & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos: corporis sudores compescit: & ad omnia valet, quæ astrictionem, inspissationemque desiderant.

MYRTEVM myropole ferè omnes nò quidem ex tenellis myrti frondibus, Dioscoridis more, conficiunt, sed è fructibus tantum, nulla seruata parandi ratione. Quandoquidem myrti baccas contundentes, oleo, nigroq; vino immisceant, & in æneum cacabum transferunt, subduntq; (vt citius opus expediant) ignitos carbones, ibiq; tandiu inferuescere sinunt, donec vinum totum assumatur: mox ab igne tollit, percolant, & asservant. Neque animaduertunt conficiendi regulam à Mesue explicatam. Siquidem is in calentis aquæ balneo, non quidem violento carbonum igne Myrteum parari iubet: ex oleoq; omphacino fieri, non (vt ipsi parant) ex maturis oliuis expresse. Nanq; vt balnei humet, ac leni calore olei compositio mirifice digeritur, ac eius omnes conseruantur partes: sic cõtra violento igne subdito perueritur, & destruitur tota rei compositio. Sed quoniam rei publicæ beneficio (vt etiam ab ipso exordio pollicitus sum) decreui non prætermittre quicquam, quò errores, qui in dices contingunt, è medio tollantur, dico, oleum omne, quod officinæ ad medicamenta vsurpant (illud excipio, quod ab arborum resinis, stirpiumq; aliarum gummi, vitreis organis per sublimationem. vt chymistæ vocant, elicitur) vase vitreo, vel saltem stanneo in balneo calentis aquæ fieri debere: & inibi primum impositis imponendis tribus diebus macerari: post tertium verò diem expressis cunctis prius impositis, & recentibus infusus pari temporis spatio, eodem in balneo, eadem macerari. Itaq; tandiu opus prosequendum, donec sibi oleum amplissimas exceptorum medicaminum comparauerit vires. Verùm ingens hominum lucri auditas, auriq; ingluuias, vt admodum superluerentur, arcamq; auro ad summum vsque impleant, non parit myropolas necessarium tempus impedere ad medicamenta exactè paranda: eos, inquam, qui continuè magis crumenis intendunt, & inhiant, quàm vt vitæ ægrorantium satagent. Probi tamen, & diligentes hæc mea verba boni consulant, his verò mali errores emendent suos. Idcirco Myrteum oleum, quod myrti præstantiam ad plenum refert, hoc

*In myrtæo  
efficiendũ  
supra.*

*Olei omnis generis parandi ratio.*

*Myrti parandi ratio.*

modo

modo temperatur. Sumito fructum myrti libram, foliorum eius recentium uncias decem, vini nigri adstringētis libras duas, olei omphacini libras quinque: deinde confusis baccis, ac foliis omnia oleo & vino excipito, & vase vitreo, vel stanneo reponito, tectoque vasis ore in balneo calentis aquæ immergit, & post tres dies extrahito, ac percolato. Rursum assumptis recenter baccis, foliis, & vino, ut antea oleo exceptis, in eodē balneo omnia recondito ad tertium usque diem. At postremō vasis ore detecto, tandiu id apertum sinito, donec balnei feruore vinum totum exiliat, & oleum tantum remaneat. Nec audiendi sunt ii, qui Dioscoridis testimonio, æneo cacabo (vt supra dictum est) substratis carbonibus Myrtinū conficiunt. Quippe Dioscoridis tempore ars medica non adeo exulta erat, quin nec seplafaria, vt nostri hac ætate esse visunt. Quamobrem putandum, quod si huius balnei artificium Dioscoridi innotuisset, ipsum haudquaquam silentio præterisset, veluti nec illud Mesues, nec alii complures præterierunt, qui summo studio, & diligentia medicam facultatem excoluerunt, & in ordinem redegerunt.

## L A V R I N U M O L E U M.

CAP. XXXVIII.

L A V R I N U M fit hoc modo. Lauri bacca cum maturæ sunt, in aqua coquantur: siquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinē reddunt, quæ manibus subacta, concha excipitur. Alij omphacinum prius oleū cypero, iunco odorato, & calamo inspissant, deinde tenera lauri folia concoquant. Alij etiam baccas, donec oleum odore contraxerit. Alij styracem, & myrtum addunt. Optima laurus ad id latifolia, & montana. Oleum laurinum vtilius, quod recentius, quoque viridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei exalfactoria, emolliēs: venarū spiracula aperit, lassitudines discutit: omnibus nervorū vitiiis, algoribus, destillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum non aliud iuuentius: attamen porum nauseam parit.

*Laurinico  
sideratio.*

L A V R I N I conficiendi rationem aliter à Mesue institutum legimus, sed tamen ab hac parum recedētem. Ideoque quod id parum, vel nihil referat, rem ipsam silentio prætereundam duximus: præsertimque quod non me latet, Laurinum, cuius est vsus in officinis, à seplafariis nequaquam fieri, sed ab aliis confectum emi, qui lecta magna lauri baccarum quantitate ipsum eliciendi artem exercēt. Mesues præ-

*Laurini  
vires ex  
Mesue.*

ter facultates à Dioscoride traditas, id summè laudauit & ad iocineris dolores, & ad hemieriam, quæ frigidis contrahitur succis. Quin & ad ventriculi dolores, coli, vuluæ, & lienis efficacem esse tradidit.

L E N T I S C I N U M O L E U M.  
CAP. XXXIX.

S I M I L I S Lentiscini ratio. Nam est maturo fructu temperatur, factis prius spissamētis, vt in laurino diximus. Hoc scabiem iumentorum, canumque sanat: vtilissimum pepsis, acopis, & leprarum medicamentis: sudores cohibet. Nec secus Terebinthinum fieri solet: quod refrigerat, & astringit.

L E N T I S C I N U M pluribus in locis *Lentiscini  
paradi  
ra  
tio, & vi  
res.* Heturæ conficitur, sed præsertim in agro nostro Senensis, Iluæ, & Gilio Tyrreni insulis, non longe à continentis nostra distantibus. Fit autē ab incolis hoc modo. Racemosas lentisci baccas assunt, & à putaminibus cunctis expurgant, permittuntque aliquot diebus simul baccæscere: deinde magnum in ahenum collocat, affusa aqua: & igni tandiu feruent, donec baccæ dehiscant: demum eas extrahunt, & succis includunt, præloque subiciunt, expressumque asservant oleum. Quod & quibusdam Adriatici insulis hac similiter ratione cōfici audio, absque alterius cuiusvis olei adminiculo: siquidem fructus is per se olei satis emittit. Incolæ (vt experimento comprobatum affirmant) ad acuendā oculorum aciem, caliginēque, delendas, illud cibus cōmiserunt. At ego eo sæpius vsus sum magno sanè iuuamento in dysentericiis, non quidem pota exhibito, sed clysteribus infuso. Lentiscinū summis laudibus extulit Galenus li. v. de compos. medic. secundum locos, ad gingiuarum, & linguæ inflammationes, si eo colluatur. Quod autem sit è fructibus terebinthi, quos Mauritanii grana virida nuncupant, non sit in Italia, neque ad nos (quod equidem sciam) aliunde conuehitur: proinde non venit in vsu. Hoc tamen (vt Mesues inquit) vulnera consolida. Medetur item conuulsis, opisthotonicis, nervorumque duritiis, & creberrimè cataplasmatibus admiscetur.

*Terebinthini  
confici  
deratio, et  
vires.*

† In his verbis mendum subesse putamus, vt etiam doctissime adnotauit Manardus Ferrariensis lib. v. 111. epist. prima. Aliis siquidem sibi ipsi repugnasset Dioscorides, cum scripserit in Terebinthi mentione eius fructus exalfacere: hic verò dicitur, oleo ex eisdem parato inesse refrigerandi facultatem. Huic deprauatæ lectioni illud quoque refragatur, quod sint nobis Græci Dioscoridis codices, in quibus verba illa de Terebinthini olei facultatibus non leguntur, sed de eius tantum conficiendi ratione mentio habetur.

MASTICHINVM OLEVM.  
CAPVT. XII.

MASTICHINVM è trita fit masti-  
che. Quod contra omnia vuluæ mala  
efficax est: mediocriter calfacit, altrin-  
git, & emollit. Aduersus prominentes  
stomachi duritias, coeliacorum, dysen-  
tericorumque cruciatus vtile: faciem  
emaculat, & colorem nitidum facit.  
optimum in Chio insula componitur.

*Seplasia-  
riorum le-  
gionis.*

MASTICHINI parandi rationem,  
sanè quā paucis Dioscorides perstrinxit. quip-  
pe è trita tantum Mastiche fieri tradidit, nulla  
alia explicata conficiendi ratione. Seplassarii  
autem nonnulli prorsus oblii, scripsisse Mes-  
uem in balneo calentis aquæ Mastichiniū con-  
fisci debere, communi oleo, albo vino permi-  
sto: mastichen admiscunt, & æreo vase carbo-  
num igni admovent, ibiq; tanto tempore ef-  
feruescere sinunt, quoad vinū prorsus exiliat,  
ac inde vsui asservant. At ipse vitreis organis è  
purissimo tantū mastiche illud sæpius confeci.

VNGVENTORVM COMPOSITIO.  
CAPVT XII.

DE RATIONE vnguentorū con-  
sequēter tractandum existimauimus:  
quandoquidem ea in nōnullis corpo-  
rum vitiis, aut medicamētis mista, aut  
corporis persusa, aut naribus obiecta,  
plurimū profunt. in quorū probatio-  
nibus consulere nares oportet, an ea  
oleant, ex quibus tēperatur. Optimū  
huiusmodi iudicium, quod tamen in  
quibuscū planè obseruari non potest,  
propter ea, q̄ admiscetur, odore cæte-  
ris præualētia: vt in amaracino, & cro-  
cino, telino, & plerisq; aliis, q̄ crebra cir-  
ca hæc meditatione experiri cōueniet.

## ROSACEVM. CAP. XLII.

ROSACEVM sic fit, Iunci odorati  
quinque libras & bessiem tundito, &  
subactas aqua in viginti olei libris, &  
quincunce subinde mouēdo, coquito:  
dumq; percolaueris, in olei libras vi-  
ginti, & quincuncē, adiecto rosas non  
madefactas numero mille, & manibus  
melle perunctis identidem moueto,  
interdiū premēs, finito nocte tota ma-  
cerari, postea exprimito: & vbi recre-  
mentum pessum ierit, mutato vase, in  
craterē melle illitū recondito. Caterū  
rosas, quæ antea pressæ fuerūt, in label

## ROSACEVM



lū demittito,  
& affusis octo  
libris & qua-  
drante spissati  
olei, iterū pre-  
mito, eritq; se-  
cundarium o-  
leū. Quod si ter-  
tias vsq; quar-  
tæ sue perfusio-  
nes infundens  
exprimere vo-  
les, secundariū  
fiet, tertiariū,  
& quartarium

vnguentum. Sed quoties id feceris va-  
sa melle oblini debent. Si verò secun-  
dam infusionem instituere libet, in ex-  
pressum oleum, numero pari recentes  
rosas, nullo humore imbutas iniicito:  
manibus melle præmadefactis agitans  
premito: & iterū tertio, aut quarto si-  
mili modo exprimēs facito, totiesq; re-  
cetes rosas detractis vnguibus immi-  
tito: fiet enim ita oleū multò validius.  
nā septies oleū rosarū infusionē admit-  
tit, nec amplius prælū melle perungat-  
ur, oleū à succo diligēter secerni opor-  
tet: nā si minimū quid relinquatur, vn-  
guētū corrūpet. Alij autē detractis vn-  
guibus, rosas tantū oleo macerāt in sole  
hoc modo. Rosæ, quæ selibrā pondere  
æquāt, in sextario olei diebus octo ma-  
descūt, & vsq; tertiā pfusionē quadra-  
ginta diebus insolātur, & sic oleū reco-  
ditur. Alij calamo, aut aspalatho prius  
olei spissamētā faciūt. Alij coloris cau-  
sa auchusā admiscēt, & salē, quò minus  
oleat. Vim astringēdi, & refrigerādi ob-  
tinet: fomētis, & cataplasmatibus vti-  
le. Potū solui aluū: stomachi ardorem  
restringit: vlcera caua replet, & mul-  
cet, quæ cacoëthē vocātur: vlceribus in  
capite manātib; atq; feruidis eruptio-  
nibus illinitur: caput dolēs eo perfun-  
ditur: dētes inter initia doloris collui  
prodest: ad genarū duritias illitū effi-  
cax est. ad lacescita interanea, & con-  
citas vuluæ vtilissimè subiicitur.

*Vnguentum confectum de rosae.*

Hoc sub olei nomine comprehendit Dioscorides oleum omne, quod per se tantum, nulli alterius olei admisione, aut ex arborum fructibus, aut herbarum diversorum generum seminibus, aut stirpium resinis elicetur. Sed vnguenti appellatione intelligit oleum omne genus, cui & odoramenta, & alia simplicia medicamenta admiscuntur, ut in praesentia de Rosae agens, & deinde in sequentibus manifestè ostendit. Quo fit, ut apud Dioscoridem oleum vocetur, quod simpliciter expressum sit vnguentum verò oleum quodlibet, cuius componendi ratio pluribus constat medicamentis. Quapropter Galenus lib. v. i. simpl. medicamentorum de oleo agens, sic inquit. Ex dictis cognoscere iam liceat, & de aliis olei generibus, quae aequinoce ipsi dicuntur vnguentis, puta rosaceo, melino, lilaceo, & quaecunque id genus floribus, fructibus, germinibus, foliis in oleo maceratis cōficiuntur. Horum quodque ubi una cum aromatis preparantur, vnguentum efficitur. Ceterum oleum rosaceum, quod hoc tempore officinae completum appellant, à Dioscoridis rosaceo longè dissidet, quod etiam eo praesantius existimandum est, summum ob artificium, quod in ipsa parandi ratione diligentiores adhibent myropolae. Quod eorum tamen perpauci (ita ut ingenium est multorum à labore proclive ad ignaviam) illud secundum Mesuem temperant, tamen plures ab eo optimi rosacei conficiendi modum sint cōsecuti. Fit etiamnum rosaceum rosae non affatim dehiscentibus in omphacinum demissis, modò calentis balnei viribus (ut in quibusdam aliis superius adnotauimus) modò insolatu perquam longo. Sunt & qui, ut magis viribus praestet, oleum prius ex aqua rosacea lauent, deinde plusculo temporis spatio ter, aut quater rosas infundant, quae haud penitus faciscant. demum expressione peracta, immutatam rosarum succum adiiciunt, ac inde diu insolant.

*Rosaei cōsideratio.*

*Rosaceum omphacinum.*

*Rosaei omphacini vires.*

Postremo oleum à succo fecerunt, & diligenter afferuant. Hoc inflammationes discutit, roborat, astringit, fluxionesq; cohibet, ne ad aegres defluant partes. Potum torminibus dysentericis medetur. Capitis vulneribus aptissimum est, quòd roborat, siccet, resoluat, inflammationesque non modò prohibeat, sed etiam extinguat. Quocirca hac in re maximè probatur à Galeno lib. i. de comp. medic. secundum locos, ubi de dolore capitis scribit, qui vel ex vulnere, vel casu excitatur. Cuius etiam meminit li. x. simp. medic. de sanguine agens.

ELATINVM. CAP. XLIII.

FRACTA elate, tusa, & scarificata, in labellum deicitur: omphacinum oleum triduo infunditur, mox per sportulam exprimitur: verum pares esse debent vtriusque portiones. dein mundo vase ad vsus reconditur. Viribus rosaceo proportionè respondet: alium ta-

men non mollit.

ELATINVM, quod ex Dactylorum inuolucris antiquitus parabatur, hac nostra temperare absoleuit.

MELINVM. CAP. XLIIII.

MELINVM hoc modo temperatur. Olei cògius decè aquae sextarii admiscetur. Adicitur elatae palmarum fractae quadrans, & iunci odorati vncia: quae die vno macerata coquuntur, mox in vas oris patuli oleum excolatur, & indita arundinacea crate, aut rara tegete cotonea mala superponuntur, & vestimentis operta tantisper inibi resident, dum malorum vires ad se oleum alliciat. Aliqui cotonea decem dierum spatio operimentis inuoluunt, ut contineatur odoris suauitas, nec euanescat: postea biduo macerata oleo exprimuntur, oleumque reconditur. Id vim refrigeratorium, & astringentem habet. Contra scabiosa vlcera, & quae serpunt, ac furfures, perniunculosque effectum praebet: exulceratis vuluis infunditur: citatam vrinam sistit infusum: sudores cohibet: contra cantharidas, buprestim, pinorum erucas, bibitur. Laudatur maximè quod cotonea mala olet.

MELINVM oleum ad hodiernum officinarum vsum hoc modo conficitur. Cotonea nondum planè matura in taleolis dissecta omphacinum oleo macerantur, & vino ex eis expresso superaddito insolantur. Deinde in calentis aquae balneo iterum, atque iterum perfunduntur, & extrahuntur, ut in aliis superius ostendimus.

*Melini cōsideratio.*

OENANTHINVM. CAP. XLV.

OENANTHE è labrusca, optimè olens postquam emarcuit, deiecta in omphacinum oleum mouetur, voluiturque: & cum biduo manserit, exprimitur, & reconditur. Astringit, proximum rosaceo effectum praebens: sed alium non resoluit aut mollit. Probatissimum est, quod odore oenanthen refert.

OENANTHINVM nullam à nobis requirit explanationem: quoniam à Dioscoride tam aperte proditur eius parandi ratio, ut non sit opus, illud pluribus explicare.



## TELINVM. CAP. XLVI.

FOENI græci libræ quinque calami  
libra vna, cyperi libræ duæ, olei libris  
nouem septenis diebus macerantur,  
quotidier mouetur, postea premun-  
tur, & reponuntur. Aliqui pro calamo  
cardamomū substituunt, & cyperi lo-  
co xylobalsamum macerant. Alij oleo  
antea his odoribus spīfato sœnum græ-  
cum macerantes expriment. Hoc telin-  
um abscessus emollit, & concoquit:  
omnibus vuluarum duritiis magnope-  
re conuenit, sœminis difficilē parienti-  
bus subiicitur, vbi præ excretis humori-  
bus loci siccitatem contraxerunt: sedis  
inflammationes lenit, tenefimo subditū  
prodest: vlcera capitis manantia, surfu-  
rēque expurgat: ambustis, & pernioni-  
bus addita cera proficit: vitia cutis in fa-  
cie emendat: pigmentis ad concilian-  
dum faciei nitore inferitur. Eligi oportet  
recens, quod non vehementer fœni  
græci odorem præ se ferat, & manus ab-  
stergat, sapore ex dulci in amarum in-  
clinat: tale enim optimum iudicatur.

OFFICINARIVM Luminaria ex Rafis au-  
thoritate aliam, quamuis exoletam, Telini com-  
ponendi rationem tradunt, in quo calamo odo-  
rato, & cypero elaterij besse adiungunt.

## SAMPsYCHINVM. CAP. XLVII.

SERPYLLI, calsiaz, abrotoni, florū  
sisymbrij, frondium myrti, sampsuchi  
singulæ portiones, quadam pro viri-  
bus ipsorum coniectatione, vnā tun-  
duntur, atque is omphacini olei mo-  
dus adicitur, qui madentium vires  
non euincat: hæc post quadriduum ex-  
primuntur: denuo noua alia simili men-  
sura, & æquali tempore macerata pre-  
muntur: ita enim validius reddi solet.  
Eligi oportet sampsuchum colore ex  
atro viridi, plurimum redolens: medio  
riter acre. Vim habet acrem, calfacto-  
riam, extenuatē: aduersus vuluæ præ-  
clusiones, conuersionēque efficacē est:  
mensēs, & secundas, & partus extrahit:  
vuluæ strāgulatus recreat: lumborum,  
inguinumque dolores lenit: sed cū mel-  
le vti eo præstat, quandoquidem vehe-  
menti astrictione locos induratur. Lassi-

tudines illitum discutit: in opisthotō-  
cinorum, vulsorūque cataplasmata  
vtilissimē additur.

QUANQVAM ex Theophrasti, Dioscori-  
dis, & Plinii sententia idem esse constat sampsu-  
chum & amaracinum: eū tamen Galenus, & Pau-  
lus de his diuersis capitibus scorsum scripserint,  
eorumque temperamenta per gradus diffidere  
tradiderint, non ab re credere nonnulli aliud  
esse sampsuchum, aliud verò amaracum. Quorū  
opinionem auxit etiam Dioscorides, quod in  
his vnguentorum compositionibus Sampsuchi  
num. & Amaracinum diuersis capitibus digesse-  
rit. Quod faciliē plerisque ad credendum indu-  
xit, has stirpes tum facie, tum viribus differre,  
hac ratione freti, quod si alterum ab altero non  
differet, omnino præter rationem de his variis  
in locis scripserit Dioscorides, alterum vngue-  
tum Amaracinum, alterum verò Sampsuchinū  
appellans. Porro vt huiusmodi controuersia  
tollatur, sciendum est, stirpem eam, quæ Gale-  
no, & Paulo amaracum appellatur, id finē ama-  
racum non esse, quod Theophrastus Diosco-  
& Plinius sampsuchum vocauerunt, sed potius (vt  
ego existimo) marum, id quod etiam sentiant  
clariore nostri seculi simplicium indagatores.  
Nanque mari nec Galenus, nec item Paulus  
quicquam prorsus in simplicium medicamentorum  
libris meminert. Quare non deest suspi-  
cio, quin librariorum culpa, in Galeno Mari ti-  
tulus in amaracum abiierit: quandoquidem in  
eius tum gradibus, tum facultatibus assignan-  
dis Galenus à Dioscoridis maro non longē re-  
cesserit. Sunt & qui velint apud Paulum, & Ga-  
lenum id amaracum dici, quod Dioscorides  
parthenium vocat: quippe & hoc quibusdam  
amaracum vocatur. Cuius rei indicium esse exi-  
stimant, quod tam Galenus, quam Paulus nulli-  
bi in simp. medic. libris aliquid de parthenio po-  
steritatis memoriæ prodiderunt: quorum opi-  
nio non omnino reprobanda videtur. Ceterū  
licet Dioscorides Sampsuchini, & Amaracini  
diuersis per se capitibus meminert, non obstat  
propterea, quod minus idem esse possint sampsu-  
chum, & Amaracum. Si quidem duabus de cau-  
sis vt alterum ab altero distingueret, Diosco-  
rides faciliē impulsus fuit: quarum altera est, quod  
si diligenter adinuerantur vtrorūque cō-  
positiones, vtique Amaracinū tum multo odo-  
ratius, tum Sampsuchino pretiosius iudicabi-  
tur. Ideoque auctor, eo quod nolebat vnguen-  
tum hoc apprimē nobile inactum relinquere,  
quodque ob eius claritatē id particulari deseri-  
ptione dignum censebat, vt præstantia dis-  
crimen faceret, vtique etiam minus probatum  
à probatissimo dignoscereetur, homonymiam  
immutauit, ipsamque non quidem Sampsuchi-  
num, sed Amaracinum appellare voluit: nam si  
id non fecisset, quodnam altero præstatius esset  
discerni non posuisset. Huc accedit alia ratio,  
qua

*Sampsu-  
chini con-  
sile.*

*Solutio cō-  
trouersia.*

*Opinio  
quorundā*

qua alterum Sampsuchinum, alterū verò Amara-  
cinum Dioscorides appellauit: quod (vt li-  
bro tertio proprio capite legitur) in Cyzico  
sampsucum amaracum appellabatur, vnde hoc  
vnguentum insigne petitur. Et quoniam à Cy-  
zicenis claris illius compositoribus ex eorum  
more Amaricinum vocabatur, talem nomen-  
claturam Dioscorides haud quaquā permutā-  
dam censuit. Quare ipsum in eadem reliquit  
appellationē, quā secum ex Cyzico tulerat.

OCIMINVM. CAP. XLVIII.

OCIMINVM oleum fit vt cypri-  
num. Ocimi folia decerpta librarum  
vndecim, & besis pondo, die noctūq;  
viginti olei libris macerato, premito,  
colato: cumq; exhausteris quallum,  
rursus parem olei modum fundito, &  
exprimito. Vocatur autem id secunda-  
rium: nam tertiæ persusionis non est  
capax. Deinde recens ocimum æquali  
pondere, vt in rosaceo diximus, rursus  
maceratur, & cum tanto temporis spa-  
tio maduerit, exprimitur, & oleum  
reconditur. quòd si in animo fuerit ter,  
aut quater madefacere, semper ocimū  
recens addes. Potest ex omphacino  
confici: sed illo modo melius. Idē quod  
sampsuchinum potest, sed inefficacius.

ABROTONINVM. CAP. XLIX.

OLEI cyprini odoribus imbuti  
libris nouem & quicunce, foliorum a-  
brotoni libras octo die noctūque ma-  
defactas, premito. Quòd si in longum  
tempus oleum velis asseruari, eiectis  
prioribus foliis, noua appones, & ma-  
cerata exprimes. Calfacit: ad vuluæ  
duritias, præclusionēsque efficax est:  
menstrua, & secundas pellit.

ANETHINVM. CAP. L.

OLEI libris octo & dodrante, flo-  
rum anethi libras vndecim & bessē,  
maceratas in oleo dievna, manibus pre-  
mito, & recodito. Quòd si iterum per-  
fundere velis, recentes anethi flores  
confimiliter madefacito. Vuluarum  
duritias emollit, venarum spiracula sa-  
xat, contra horrores febrium circuitu  
redeuntē auxiliatur: calfacit enim, &  
lassitudines discutit: prodest articulo-  
rum doloribus.

SVSINVM. CAP. LI.

SVSINVM, quod alij lilinum appel-

lant, sic temperatur. Olei libras nouem  
cum quicunce, calami libras quinque  
& quadrans, myrrhæ vnciæ quinque,  
permisto odorifero vino decoquun-  
tur, & colato oleo, cardamomi tusi &  
cœlesti aqua madefacti libras tres & se-  
mis macerantur, premunturq; tres  
libras cum femisse spissati olei assumun-  
tur, mille lilia decerptis foliis, in latū,  
non tamen profundum, labellum de-  
mittuntur: iniectum oleum manibus  
melle perundis agitur: die noctūque  
conquiescunt, & in pyxidē matutinis  
exprimuntur. quod defluet oleum, pro-  
tinus ab aqua, quæ simul expressa fue-  
rat, colo incerni oportet: non enim, vt  
rosaceum moram tolerat, nam concal-  
factum feruet, & computrescit: quare  
sapius decapulandum. Vasa melle illi-  
nenda, tenuis sal inspargendus, & si qua  
sordes vasis faucibus hæsit, eximenda.  
Odoramentis iam expressis ex quasili-  
lo in labellum transfusus, rursus olei  
prius odoribus imbuendi, quod primū  
pōdus æquet, & cardamomi tusi drach-  
mæ decem coniiciuntur. Hæc manibus  
scitè pressa, interiecta breui mora ex-  
primuntur: quod profluit, repurgatur.  
Tertiō eadem infunduntur, adiecto car-  
damomo, & sale, & manibus melle ma-  
defactis. Longè optimum erit, quod  
prius exprimitur: secundum, quod se-  
quitur: tertium locum sibi vendicat,  
quod nouissimum prodit. Denuo in  
mille lilia euulsis foliis expressum pri-  
mò oleum infunditur: tum eadem ra-  
tione prosequendum, idemq; facien-  
dū, vt prius: addito cardamomo, dein  
expresso, fac eadem in secūdo, & tertio,  
vt dictum est: & quò frequentius recen-  
tia lilia maceraueris, eò validius vngue-  
tum efficies. Denique cū factum abun-  
de videbitur, singulis compositionibus  
miscere conuenit myrrhæ quā opti-  
mæ duas, & septuaginta drachmas, &  
croci decem, cardamomi quinque & se-  
ptuaginta. Croci verò, & cinnamomi  
pares portiones tunduntur, & cribratæ  
in lutram cum aqua demittuntur, ex-  
e s pressum

pressumque primò vnguentum infunditur, & paulò post excipiuntur vasculis ficis, myrrha, aut gummi antea perfusis, & croco, & melle, & aqua madesactis. Eadem fiunt in altera, aut tertia expressione. Aliqui simplex ex balanino, aliòve oleo, & liliis componunt. Optimum esse constat in Phœnice, mox Aegyptio factū. sed cum primis laudatur, quod lilia redolet. Excalfacit, emollit: vuluæ præclusiones, & collectiones aperit: vtilissimum ad muliebria mala. vlcera in capite manantia, feruidas eruptiones, varos, furfurésque emendat: vibices, cicatricésque celerrimè ad colorem reducit, ita vt sæpe fallant. In summa extenuat: potum bilem per alium extrahit, vrinam ciet: sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Hoc, quod ex liliis temperatur: illud item, quod ex ocimo, abrotono, anethoq; conficitur oleum, cum vnuscuusque parandi ratio per se clara sit, ideo nostris explanationibus non indigent. Cæterum Sufini compositio mihi quidem pluribus in locis librariorum potius, quam auctoris incuria deprauata videtur.

NARCISSINVM. CAP. LII.

NARCISSINI spissamenta ita fiunt. Sex libræ aspalathi cum sextante tunduntur: olei elothi libræ septuaginta cum vnciis quinque assumentur. Aspalathus aqua madesactus in tercia olei parte coquitur: quo exempto, calamus quinq; libris & besse adiecitur, cum myrrhæ gleba contunditur, cribratâque ac vino veteri odorato immista, decoquitur: simulac autem cum iis efferbuerit, eximitur. refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labelum mittitur, flores narcissi quàm plurimi coniiciuntur, qui bidui spatio (vt in susino dictū est) permoti exprimuntur. Oleum subinde decapulandum: siquidem celerrime putredinem sentit. Valet hoc ad emolliendas vuluæ duritiâs, præclusionesque: sed capitis dolores facit.

NARCISSINVM, quod ego sciam, non paratur nostratibus myropolis. quod mirum non est, cum id etiâ Plinii ætate parari desisset, vt ipse lib. x l i i . ca. primo memoriæ prodidit.

CROCINVM. CAP. LIII.

CVM Crocinum componere voles,

prius olei, vt in susino diximus, spissamenta facies. eisdè ponderibus, & menfuris: cuius olei libras tres & semissem, croci vnciam vnâ assumes: identidem quotidie moueto, & sexta die, quàm hoc assiduò peregeris, oleum à croco colis incernito, eidem croco parè olei modum adicito: moue triduo, dein contusâ myrrhæ, atq; cribratâ drachmas quadraginta permisceto: & in pila agitatum recondito. Aliqui oleo aromatibus ad cyprinum imbuto in crocini compositione vtuntur. Optimum est, quod abunde crocum spirat, in mendendi vsu expetitur. Proximum quod myrrham refert. Calfacit, somnum allicit: quare persæpe phreniticis subuenit perfusum, aut naribus admotū, aut illitum: pus mouet, vlcera purgat: contra vuluæ duritiâs, atque præclusiones, & vlcera, quæ cacoëthe vocantur, prodest cum croco, cera, medulla, duplicato olei pondere: concoquit enim, emollit, humectat, & permulcet. ad oculorum glaucitates ex aqua illinitur. huic autem proportionem respondent butyrium, onychinum, & styracinum: quæ etsi nominibus distant, viribus, & compositione cognata sunt.

CYPRINVM. CAP. LIIII.

OLEI omphacini cloti pars vna, aquæ cœlestis tantundem cum semisse, cuius vna parte oleū diluitur, altera ad iiciendis odoramentis admiscetur. Dein assumptis aspalathi libris quinque & semisse, calami libris sex & semisse, myrrhæ libra vna, cardamomi libris tribus & dodrante, olei libris nouem & vnciis quinque, aspalathus tusus, & aqua affusus decoquitur in oleo, donec cōseruescat: myrrha autē vino veteri odorifero subacta, cōtusûsque simul calamus, digeruntur in offulas, quæ exempto aspalatho immittuntur, & vbi efferbuerint, sublato aheno oleum percolatur. Cardamomū tusum reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agitur, nulla dū refrixerit, interpellatione. Post hæc colato oleo in viginti octo libras olei, floris lugistri, quod cyprū vocat, sex, &

quadraginta libræ cū beſſe inſtillantur, quæ ſufficienter maſſæ factæ per ſportulam exprimuntur. Quòd ſi copioſius deſideretur, idem recentium ſlorum pondus iniectum ſimili modo prematur : & iterum aut tertio, ſi quis velit, maſſæ facere poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris ſuauitate nares feriat. Aliqui cinnamomum addunt. Calſcit, emollit: ora venarum adaperit: vuluæ, neruorumque vitiis conuenit, pleuriticis, fractiſque, per ſe, vel cerato immiſtum. malagmatis imponi ſolet, quæ opiſthotonicis, angina laborantibus, in inflammatione inguinum opitulantur: item in acopa adiciuntur.

IRINVM. CAP. LV.

SPATHAE quàm minutiffimè conſuſæ ſex libræ cum beſſe, in tribus, & ſeptuaginta libris & quincunce olei, æreo vaſe, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit: poſtea in capulam melle oblitam colato: ex eo aromatibus imbuto oleo, irinum primò temperatur, iride ex oleo inſpiſſato, macerata, vt ſcripſimus. Sed alia eſt componendi ratio. In olei ſeptuaginta libris & quincunce, xylobaſami (vt dictum eſt) conuſi libras quinque & ſextantem excoquito: poſtea detracto xylobaſamo, tuſi odorati calami nouem libras & dextantem adiicito, & myrrhæ glebam vetere vino odorato perſuſam, & in olei ita odoribus imbuti quatuordecim libris, totidem tuſæ iridis, binis diebus ac noctibus maſſæ facito, ſtrenuè, & vehementer diſtingito. Quòd ſi vis validius fieri, par pondus iterum ac tertio ſimiliter maceratum exprimito. Longè optimum eſt, quod ſolam irin olet, quale illud eſt, quod in Perga Pamphiliæ, & Elide Achaïæ componitur. Vim habet calſactoriam, atque emollientem: cruſtas adimit, ſordida vlcera & putrida purgat. confert fœminis vuluæ cauſariis: item inflammationibus eiufdem, atque præcluſionibus: partus eiecit, hæmorrhoidas recludit: contra aurium

ſonitus ex aceto, ruta, & amaris amygdalis, prodeſt. diuturnis deſtillationibus, naribus illitum, & contra graueolentia earum vlcera, quas ozanas vocant, auxiliatur: alium purgat cyathus epotus: facit ad ilei cruciatus, vrinam mouet: difficiles vomitiones adiuuat, peruncſtis eo digitis & immiſſis, vel iis, quæ ad vomitum ciendum induntur: angina etià illinitur, aut ex aqua mulſa gargarizatur: itè contra arteriæ ſcabritià. datur etià iis, qui cicutam, coriandrū, aut venena fungorum hauſerunt.

QUANQVAM Irini præparatio (eſt enim Irini conſideratio. per ſe clara ſatis) non magis, quàm Crocini, & Ligultrini explanari expoſtulat: illud tamen ſilentio minimè prætereundum videtur, quòd non Iridis flores, ſed radices, cū hæ odore fragrant, illi verò malè oleant, in hoc olei ſpiſſamento imponi debet. Quod etſi Dioſcorides nō explicauerit, cū tamè vngueta odorū iucūditate comēdētur, de Iridis radice, nō de ſloribus intellexiſſe Dioſcoridē exiſtimādū. Quippe quæ & ſuauiter oleant, & ad vnguentorum ſpiſſamenta floribus præſtantes habentur.

GLEVCINVM. CAP. LVI.

GLEVCINVM abſolutè conſtat omphacino oleo, iuncto odorato, calamo, Celtica nardo, ſpatha, aſpalatho, ſertula Campana, coſto, & muſto: circumdatiſ interim vinaceis vaſi, quod aromata, vinum, & oleum conceperat. Tricenſ diebus, bis in die mouetur, poſtea expreſſum oleum reconditur. Calſcit, emollit, remittit: horribus, & neruorum, vuluæque vitiis auxiliatur. omni acopo iuuantius, quippe quòd emolliat.

MINIME quidem mirari licet, quòd Gleucini parandi rationem ſimplicem appellauerit Dioſcorides. Siquidem aliæ habentur vnguentorum compoſitiones, quæ multò pluribus ſimplicibus conſtant odoramentis, ſicuti Columella libro xiii. capite i. aperte indicat. Ceterum non poteſt Gleucinum (ſi rectè admiſta ſimplicia conſiderentur) non vehementer ex-calfacere: tametſi Plinius libro xxi. cap. i. id cum adſtringere, tum refrigerare ſcripſerit. Quod euidentè argumento eſt, aut Plinii gleucinum, ſive muſteum, ab hoc Dioſcoridis, & Columellæ diuerſum eſſe, aut Plinium non exactè illius temperamentum perpendiſſe. Verum cū ſi lib. xv. cap. vii. ſcribat, gleucino muſtum incoqui in vapore lento, non vt alia admoto igne, ſed circumdatiſ vinaceis per ſe calentibus, videtur non parum cum Dioſco

*Plinij la-  
psum.* ride conuenire. Quamobrem crediderim po-  
tius Plinium, cum dixit gleucinum refrigerare,  
Japsum fuisse, quam secus. Nam etsi oleum om-  
phacinum, cum quo mustum conficitur, tan-  
tum (vt Galenus inquit) frigiditatis, quantum  
adstrictionis habeat: cum tamen sit aliarum qua-  
litarum susceptum, fieri quidem non potest,  
quin admixtis calidis odoramentis, puta cy-  
pero, calamo odorato, Celsica nardo, dactylorum  
operimento, aspalatho, meliloto, & cosso, val-  
de calidum euadat. Quippe eadem ratione a-  
qua, cum frigida admodum sit, temperamen-  
tum permutat (vt Galenus asseruit, & experi-  
mento comprobatur) cum calida in ea mace-  
rantur medicamenta: quandoquidem & ipsa  
facile alias recipit qualitates.

AMARACINVM. CAP. LVII.

AMARACINVM longè optimum in  
Cyzico fieri solet ex omphacino oleo, 20  
& balanino: spissamentis è xylobalsa-  
mo, iunco odorato, & calamo factis:  
conditisq; amarici, costi, amomi, nardi,  
cassia, carpobalsami, & myrrha odo-  
ribus, aliqui, quò pretiosius fiat, cinna-  
momum addunt. Vel autem, & vinum  
assumitur: hoc in maseorum illitionem,  
illud ad cogendas tusorum aromatum  
offas. Amaracinum calfacit, soporem  
mouet, venarum spiracula aperit, emol-  
lit, feruorem excitat, vrinam cit: putri-  
laginibus, ac fistulis perquam vtile: nec  
non humentibus herniis, postquam  
medica manus operam suam impen-  
derit: crustas, & terra vlcera, quæ the-  
riomata vocant, rumpit: difficili vrinæ  
illita sede, & eius inflammationibus au-  
xiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit:  
vulvæ subditu menstruos cursus euo-  
cat: duritias, ac vulvæ tumores discutit:  
vulneratis neruis, & musculis con-  
fect, laneo centunculo modicè mada-  
factum, & impositum.

*Amaraci-  
cini con-  
deratio.* SUPERIVS in sampfuchini commenta-  
rio abunde de Amaracino a nobis dictum est,  
Quo hæc, vt hic de eo plura scribere nō sit opus.  
Huius meminit Galenus libro primo de anti-  
dosis, dum hedychrom explicat, quod theria-  
ce admiscetur, vbi diffusius de eo agens scri-  
bit, quod sui temporis vnguentarii amaraci lo-  
co, ex quo in Cyzico antiquitus parabatur, ma-  
rum imponebant, vt maiorem expiraret odo-  
rem. Cæterum se iussisse ait, vt legitimum ex-  
periretur amaracinum, id sibi ex solo amaraco  
preparari, quod etsi odoris fragrantia videretur  
inferius, non tamen viribus imbecillius  
fuisse testatur.

MEGALINVM. CAP. LVIII.

FACTITABATUR olim Megali-  
num, sed nunc compositio exoleuit,  
& prorsus oblitterata est. Cuius ad hi-  
storiæ complementum meminisse non  
fuit alienum. Mistura cum amaracino  
eadem erat, sed resina exuperabat, hac  
tantum ratione differens. Quare leui-  
ter emollit. Resina vnguentis, neque  
tutelæ, neque voluptatis gratia adici-  
tur, sed coloris, crassamentique causa.  
ea tantisper coquitur, dum desinat ole-  
re: cuius coquendæ ratio declarabitur,  
cum de resina differemus.

HEDYCHROVM. CAP. LIX.

QVOD Hedychroon vocant, in Co  
fieri solet: eisdem præditum viribus, &  
mistris, quibus amaracinum, sed sua-  
uius spirat.

HEDYCHROI compositionis meminit Ga-  
lenus libro primo de antidosis, cum omnia,  
quæ continent, odoramentavino subacta Andro-  
machi theriaca recipiat. Cæterum etsi hedy-  
chroi parandi rationes plures dicat reperiri,  
vnam tamen elegit, quam hoc modo descripsit.  
Hedychroon habet mari drachmas duas: asari,  
amaraci, aspalathi, scæoeni, calami odorati, phu-  
pontici totidem: xylobalsami verò, & opobalsa-  
mi, cinnamomi, costi, singulorum drachmas tres:  
myrrhæ drachmas sex, totidem folii malaba-  
thrini, nardi Indici, croci, cassiæ: duplo autem  
plus amomi, aduicæ verò ex Chio abundante  
plurimis fontibus insula mastiches drachmam  
vnam: vino falerno omnia excipe. Cum igitur  
hæc misceueris, fac trochiscos similes theriacis,  
& scillinis, quos excicabis eo modo, quo dixi-  
mus. Productus fuit Galenus, vt hunc parandi  
modum describeret, tum quòd Andromachus  
hedychroon (vt inquit) nullibi literis manda-  
uerit: tum etiam vt rei medicæ imperitos do-  
ceret, quidnam esset hedychroon in theriace  
preparatione, ne in eum errorem caderent, in  
quem sua ætate medicum quandam Romæ la-  
psum fuisse commemorat: qui composituras an-  
tidotis, quærebat apud myropolas Hedy-  
chroon, existimans esse herbam, aut radicem,  
aut quodpiam simplex medicamentum: id quod  
etiam hac nostra tempestate quam plurimis  
euenisse compertimus. Auicenna, & ceteri Ara-  
bicæ familiæ scriptores in sua theriace compo-  
sitione, hedychroon trochiscos Alindaracaron  
appellauere: tradentes varias eorum compo-  
sitiones, in simplicibus medicamentis, pondere,  
& mensuris a Galeni doctrina plurimum diffe-  
rentes. Quare mirari non licet, si iamdu legiti-  
ma Theriace compositio infelicitur successerit,  
cum & ab Arabibus, & à myropolis, adul-  
terinis medicamentis fuerit deprauata.

*Hedy-  
chroon com-  
positio ex  
Galen.*

*Theriaca  
depraua-  
tio.*

## METOPION. CAP. LX.

**FIT** in Aegypto vnguentum, quod Metopion patrio nomine appellatur, propter galbani missionem: nam lignū, in quo galbanum enascitur, metopion vocant. Constat amygdalis amaris, omphacino oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, vino, myrrha, balsamifemine, galbano, & resina. Probat pingue, graui odore, quod magis cardamomum, & myrrham, quam galbanum respiciat. Calfacit vehementer, & adurit, atque extrahit: ora venarum aperit: vlcera purgat; extrahitque: ad præciosos nervos, & musculos, ad hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est. ceratis, & malagmatis inferitur: horroribus, conuulsisque, præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & retrorsum contracta est: vtile habetur: sudores ciet, vuluæ spiraculo recludit, & eiusdem duritias laxat. In summa molliendi naturam habet.

## MENDESIVM. CAP. LXI.

**MENDESIVM** constat balani oleo, myrrha, cassia, & resina. Aliqui tamen post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addunt, nullo compendio: nam quæ simul excocta non fuere, vim nullam exhibent. Simile metopio vim obtinet, sed inferiorē multo.

## STACTE. CAP. LXII.

**STACTE** vocatur pinguitudo recentis myrrhæ cum exigua aqua tusa, & organo expressæ. Ea perquam odorata, ac pretiosa est, atque vnguentum per se facit, quod Stacte nominatur. Maxime probatur, quæ nullam olei missionem admittit, cuius minima portio copiosus est virium plurimarum. Vim calfactoriam, myrrhæ, & calidis vnguentis respondentem habet.

**STACTE** Serapioni, quemadmodum & reliquis Mauritanis, pariterque officinis Styra liquidus appellatur, cuius copia non solum Venetiis ubique venalis habetur, sed & in omnibus ferè officinis reperitur, quæ medicamentorum componendorum artem exercent. Quod autem Stacte myrrhæ sit liquidus vocatus Styra, facile probat Serapio. quippe qui capite de Syrace calamita, liquidum styracem

ex myrrha primum aqua conspersa, ac deinde expressa, fieri tradidit: qua in re Dioscoridus peregrina ad vnguem imitatur. Cui quidem sententiæ illud ad stipulatur, quod liquidus styra (de legitimo sanè liquor) sit perquam odoratus, & gustui non obscure amarus. Porro animaduertendum est, quod hoc quo syncerum haud facile inuenias, ut ferè euenit cum cæteris medicamentis, quæ ex Alexandria Aegypti, vel Syria ad nos conuehūtur. Si quidem cum omnia hæc per Mauritaniū, Turcū, Iudæorūq; manus transeant, qui nobis Christianis semper dolos, fraudesque moluntur, Diis sacrificium facere sibi perfudent, cum nos aliqua in re fallere possunt. Cæterum, ut redeam, vnde diuerteram, mea quidem fert opinio, si synceram stactem nancisci possemus, non alienum fore, ipsam in myrrhæ locum substituere. Sed certè perquam difficile erit legitimam inueniri, nisi forè vera stacte sit liquor ille, de quo superius in balsami commentatione diximus.

## CINNAMOMINUM. CAP. LXIII.

**CINNAMOMINUM** confitè balsamino oleo: & xylobalsami, calami, iunci odorati spissamentis: atque cinnamomi, & feminis balsamini suauitate conditur, quadruplæque myrrhæ ad cinnamomum portione: mel ad cogenda omnia adiecitur. Laudatur non acre, molli odore, planè myrrham redolens, crassum, odoratum, gustu perquam amaro. Id non à resina, sed myrrhæ crassitudinem obtinuit: resina enim neque amaritudinem præbet, neque ullam odoris gratiam adiecit. Vim habet admodum acrem, amaram, & calfacientem. Itaque ora venarum aperit, calfacit, discutit, diffundit: humores & spiritus attrahit, caput aggrauat: contra vuluæ vitia cum duplo oleo, cera, & medulla efficax est. Ira enim ferè multum acrimoniæ exolefcit, & quædam emolliendi vis contrahitur: alioqui adurit, & præ omnibus crassis vnguentis indurat. Facit mirum in modum ad fistulas, & vlcera, quæ putredinis vitium senserūt: item ad hernias humidiores, carbunculos, gangrenasque cum cardamomo: quin & ad febrium horrores, & tremores: aduersus serpentium morsus illinitur: scorpionum, & phalangiorum ictibus, cum tritis grossis imponitur.

Stactes consideratio.

Styracis liquidum.

NARDINVM. CAP. LXIII.

**RATIO** Nardini faciendi euariat. Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit: plerumq; autem balanino oleo, aut omphacino. Iuncus odoratus spissamenti gratia adicitur: sicuti propter odoris suauitatem, costus, amomum, nardum, myrrha, balsamum. Laudatur tenue, non acre, nardi arida, aut amomi odorem referens. Vis ei extenuans, ægris: expurgat: calfacit, absterget humores, rarefacit. Hoc liquidum est, nec habet strigenti crassitudinem, nisi refinam recipiat. Fit etiam simplex ex omphacino oleo, iunco, calamo, costo, & nardo.

MALABATHRINVM. CAPVT LXV.

**MALABATHRINVM** spissamenta nardini habet: insuper myrrhæ plusculum additur. Qua de causa calfacit, crocino, aut amaracino viribus respódens.

IASMINVM. CAP. LXVI.

**IASMINVM** fit quod Iasminum cognominatur, ex albis floribus violæ: quorum sextans in Italicum sextarium sesamini olei demittitur, violis, ut in lilino diximus, vicissim permutatis. Apud Persas inter epulandum vsurpatur odoris causa. Quinetiam toti corpori conuenit, præsertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactionem laxationemque desiderant. grauius tamen spirat, quam ut libenter à plerisque recipiatur.

*Iasmini  
con. ider. a.  
116.*

**IASMINVM** vnguentum non eo quidem silentio prætereundum duximus, quo aliqua in præcedentibus è nobis omissa sunt: in illis enim nihil sanè, in hoc verò aliquid nobis se se offert declarandum. Itaque primum scire conuenit, quod Iasmi vocabulum apud Græcos, alioquin etiam testimonio, nil aliud significat, quam violaceum. Et certè cum scribat Dioscorides, vnguentum hoc fieri *ἐκ τῆς ἀνθῆς τοῦ ἰασμίνου καὶ ὀλέου*, hoc est verbum verbo reddendo, ex floribus albis violæ, id Violaceum merito appellari debet. Sunt tamen è recentioribus, qui pro certo sibi persequant, vocabulorum fortasse vicinitate decepti, illud ex floribus iis perquam odoratis fieri, quos in Italia Gelsomini vulgò appellamus. Quorum opinio non parum suffragantur tum Hermolus Barbarus, tum Marcellus Florentinus. Qui præcipuè, ut suam comprobet sententiam, veteres asserit,

*Hermolus,  
& Mar-  
cellus opinio  
non proba-  
ta.*

præsertimque Dioscoridem, inter leucoii genera nostratem gelsimum comprehendisse, illudque speciatim gelsimum intellexisse, quod floribus cruleis provenire nonnulli pro certo asserunt. Cuius sententiam non modo non probandam censeo, sed omnino refellendam existimo. siquidem nullo pacto cogitandum est, nedum credendum, quod Dioscorides, qui in simplicium historia, & in eorum declaratione separandisque generibus, omnium diligentissimus fuit, adeo imprudenter nullo discrimine existimauerit caruleum leucoium gelsimum esse, cum id foliis, viticuloso caule, radicibus, ramis, floribus, cæterisque notis ab omni leucoio dissideat. Sed hoc verum esse Marcello concedamus, etsi minus concedendum sit, quam ratione dicit vnguentum, Iasminum vnguentum fieri ex floribus gelsimini, quod caruleum Dioscoridis leucoium esse asserit, si Dioscorides ipse palam prodit, Iasminum ex albis violis temperari? Ad hæc differre gelsimum à leucoio abunde ostendit Serapio, qui non modo fuit Dioscoridis imitator, sed etiam interpres, cum alterum ab altero diversis capitibus distinxerit, & de utrisque tanquam de rebus diversis differuerit. Quinimo de gelsimino agens capite centesimo septuagesimo sexto nullam Dioscoridis, nec Galei auctoritatem asserit, sed tantum suæ gentis monumentis inhæret, asseritque gelsimum floribus tum albis, tum luteis, tum cruleis reperiri, quale etiam ætate nostra visitur. Quod nobis maximo argumento esse potest, ut credamus, gelsimum Dioscoridi cæterisque veteribus incognitum fuisse. Cæterum cur Arabes stirpem hanc *ἰεσμήνη* appellauerint, causa facile assignari potest: quod cum gelsimi niflores odoratos, albicantesque; albe violæ modo conpiterent, Græcos barbaricè imitari volentes, ipsi violæ nomen indidire, quod est Iesmin: tametsi vernacula eorum lingua Zambach, siue Sambach vocetur. Id autem sicut odore fragrat,



ita & viribus pollens: siquidè Serapionis testimonio, exalfacit ordine secundo humores discutit, pituitæ lentitiâ senibus frigidis digerit cruciatibusque ex pituitæ lëcore provenientibus miscet prodest. Flores tamen recetè, quam sicci, lenigines, & impetigines in facie abstergunt. Paratur ex iis etiam oleum Zambachinum appellatum, quod frigidis affectibus non obsecum affert auxilium. Hoc vnguentarii cum amygdalino oleo

*Iesmin  
unde dicitur  
Iesmin.*

*Iesmin  
Gires ex  
Serap.*

oleo parant, hominum barbis odoris gratia perfundendum: quod tamen temperie calidis caput adeo exalfacit, vt quandoque è naribus sanguinem eliciat. Hallucinatur, qui falsi vocabuli similitudine Sambacinum, & Sambucinum idem esse existant. Inter quos errore implicatur Ioannes de Vigo chirurgicus nostri temporis non obscurus capite de Sambuco in suo paruo de simplicium libello. Non diu est, quod Iesefimum, sue (vt nos) Gelsifimum in Italiam allatum: est: quanuis nunc vbique horti opere topiario cum albis, tum luteis, tum etiam cæreuleis gelsifiminis oriuntur.

MYRRHA. CAP. LXVII.

MYRRHA lacryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Egyptiæ spinæ nõ dissimilis: è cuius vulnere defluit lacryma in subiectas tegetes: alia circum caudicem concreuit. Dicitur ex his aliqua pediasimos præpinguis, qua expressa, stacte emittitur. Alia gabi, ea pinguisima, lato & pingui solo nascens: ea copiosam sudat stactem. Omnium prima est, quæ Troglodytica appellatur, accepto cognomine à loco, in quo provenit, splendens, subuiridis, ac mordens. Quinetiam legitur tenuis quædam, quæ à Troglodytica secunda est, bdellij modo mollis, verum odore grauiuscula, apricis nascens. Alia caucalis cognominatur præter modum exoleta, nigra, & retorrída. Omnium deterrima, quæ ergasima dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi imaginem vergens, & viribus eius proxima. Improbatur aminnea cognomine. Ex iis pastilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odoratè siccioribus haud quamquam pingues, & inodorati. Minus odore pollet, quæ oleu non admittit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, fragilis, leuis, vndiq; concolor, quæ contracta venas vnguim modo candidas & læues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens, superuacua, & inutilis est ponderosa, coloris picei. Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccit, astringit, vuluam emollit, & præclusam aperit: menses & partus celeriter extrahit

cum absinthio, lupinorum cremore, vel succo rutæ admotæ: tuberculo fabæ deuoratur in vetere tursi, orthopnæa, in alui profluuio, & dysenteria: horrores discutit duabus horis ante febrium accessiones fabæ magnitudine pota cum pipere, & aqua: subdita linguæ liquataque, scabritiem arteriæ expolit: obustam vocem expedit, ventris tinea enecat, contra grauem oris halitum manditur, & aduersus alarum tædia cum liquido alumine illinitur: gingiuas, & dentes stabilis colluto cum vino, & oleo ore: vulnera capitis illitu glutinat: medetur fractis auribus, ac ofibus nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus: item purulentis auribus, inflammationisque cum meconio, castorio, & glaucio: ad varos autem cum casia, & melle illinitur: impetigines ex aceto purgat: defluentes capillos cum ladanio, & vino myrteo illita, firmat: diuturnas destillationes lenit, † illitis penaribus: oculorum vlcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiem læuigat. Fit è myrrha, perinde atque thure, fuligo: & vt postea ostendemus, & ad eadem conueniens. Bœotica myrrha dissecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia nascentis. Melior est, quæ myrrham odoris suauitate representat. Vis ei calfactoria inest, emollit, discutitque: suffimentis commodissimè inscribitur.

MYRRHA, quæ ex Alexandria Egypti hac ætate ad nos affertur, admodum sanè ab ea differt, quam inter præstantissimas Myrrhæ species recensuit Dioscorides. Quippe vniuersa ferè myrrha, quæ in officinarum vñ habetur, iis omnibus qualitatibus, ac notis destituitur, quibus optima commendatur. Nanque ea (vt videre est) minimè virescit, pinguis non est, non odorata, non vndique concolor, nec contracta venas vnguim figura leues intus ostendit, nec sapore acri deprehenditur, tametsi gustui amaritudinem relinquit. Verum si fortasse cuiuspiam videretur & hæc inter Myrrhæ species esse recipienda (quod tamen non satis compertum habeo) aut caucalim, aut ergasimam, esse crediderim, aut potius quam Plinius ex India deferri ait, cum hæc cæteris deteriores habeantur, certoq; sciamus ex India in Alexan-

Myrrha  
considera-  
tio.



driam myrrham importari. Nam ea, quæ plurima ad nos affertur, non modò sicca, nigricque est, sed etiam retorrida, macilenta, & cano quodam situ obducta: & quanquam inter huiusmodi globulos aliquod quandoque reperitur fragmentum, quod & clarum sit, & pellucens, contractum tamen diuerſicolor apparet. Ecquid magis? nec gustui insigniter amarum, nec myrrhæ odore prædium sentitur. Quo fit, vt credere liceat, eiusmodi Myrrham aut è deterioribus esse, aut gummi alciuius, aliarumque multiflorum adulterio minimè vacare: hæc enim im polluta (vt Dioscorides inquit) myrrha adulterari solet. Sed hæc ita de illa coniciamus, quæ passim vulgaris habetur. Cæterum electam Myrrham iam ad nos aduehi fecimus, quæ & legitima, & probatissima esse censetur. Verùm ea hætenus tam rara est, vt non nisi ad ostentationem afferretur, & ad aliarum dignoscendam regulam. Adulterabatur myrrha Galeni tempore opocalpaso, quæ calpasi lethalis, venenossque est lacryma. Idcirco libro primo de antidotis. Opocalpasum (inquit) extitale est, multosque nos sorte quodam vidimus nostræ ætatis decursu mori, quod inscii myrrham, cui opo calpasus admixtus erat, assupsissent. De industria nanq; nonnulli eorū, qui ipsam præparant, vt laudatissimam imponebant, eo quod viderent collyris inditam opodium esse medicamentum. Quippe quæ pus circa mordicationem discutiat, & interdum incipientem oculorum suffusionem substantia tenuem: siue autem in emplatrum, siue in ceratum, siue in aliquod digens medicamentum, quod extrinsecus imponitur, huiusmodi myrrham incicias, vim ipsius augebis: ac intra corpus assumptum lethale est medicamentum. Hæc igitur fusius dicta sunt, tum quod orationis series ita exposularet, tum etiam quia hæc speculati non est inutile. hætenus Galenus. Adhibenda itaque diligentia est, ne & nos Myrrham quandoque opocalpaso adulteratam emamus. Ad hæc Brasuoli Ferrariensis animus inclinare videtur, vt existimet Myrrham officinis vulgarem bellum esse. Cuiusmodi quæquam assentidum putauerim: siquidem myrrha hæc pellucens adeò non est, nec rursus glutino similis, vt bellum esse tradidit Dioscorides. Et licet quædam nostravis myrrhæ frustra quandoque transilucida: sperantur, sunt tamen potius hæc (vt dictum est) gummi adulterata, cum myrrhæ, vt bellum: nempe gustu maleficum detegitur. Preterea bellum incensum (Dioscoridis testimonio) odorem in quibus odoratis fumiis spirat, quod in nostræ myrrhæ nunquam, facto periculo, sum consecutus. Huic etiam alia accedit ratio, quæ magis ac magis Brasuoli animum immutue poterit: quod scilicet bellum d u digitis ductum, tractatumque facillè lentescat, & contractum pingue spectetur: myrrhæ verò, quæ officinis venditur, digitorum attritu contritur, & si frangatur perquam arida sese offert. Cæterum

improbat Diſcorides, omniũque Myrrha ſpecierum deterimam iudicat, quæ aliquibus minæ, aliis aminæa vocatur, quam cùm Galenus probauerit libro primo de antidotis, omniũque Troglodytis præterit, factum eſt, vt exſtimatorum quidam, in hoc loco Dioſcoridis codici mendam ſubeſſe. Sed cùm in Dioſcoride Græco legatur aminæa, & in Galeno minæa, ego potius crediderim, eos non idem myrrhæ genus intellexiſſe. Plinius libro x. i. cap. x. v. myrrhæ arboris faciem diligenter expreſſit, his verbis. Myrrham in iſſdem ſyl-  
u-  
vis, vbi & thus, permiſſam arborem naſci tra-  
didere aliqui plures ſeparatim. Quippe multis  
in locis Arabiæ gignitur. Conuectitur & ex ſyl-  
uiſus laudata, petuntq; eam etiam à Troglodytis  
Sabæi tranſitu maris. Satiua quoque prouenit  
multum ſylueſtri præſata. Gaudet raſtris, & ab-  
laqueationibus: melior radice refrigerata. Ar-  
bori altitudo ad quinque cubita, nec fine ſpi-  
na: caudice duro, & intorto, craſſiore quam thu-  
ris, & ab radice etiam, quam aliqua ſui parte:  
corticem læuem, ſimilemq; vnedomi: ſcabrum  
alii ſpinofumque dixerunt: ſolium oliuæ, verum  
criſpium, & aculeatum: miba oluſtri. Aliqui ſi-  
mlem iunipero, ſcabriorem tantum, ſpinisq;  
horridam, folio rotundiore, ſed ſapore iunipe-  
ri. Necnon ſuere qui è thuris arbore, vt runque  
naſci mentirentur. Inciduntur bis & ipſe thu-  
ris modo, iſſdemque temporibus, ſed à radice  
vſque ad ramos, qui valent. Sudant autem ſpon-  
te priuſquam inciduntur, ſtæten dictam, cui  
nulla præfertur. Ab hac ſatiua, & in ſylueſtri  
quoque melior æſtiua. Non dant ex myrrha  
portiones Deo, quoniam & apud alios naſci-  
tur. Et ſequenti capite inquit. Adulteratur myr-  
rha lentis ſei glebis, & gummi, item cucumeris  
ſucco amaritudinis cauſa, ſicut ponderis argen-  
ti ſpuma. Reliqua vitia deprehenduntur ſapo-  
re gummi dente leni ſcentis. Facillimè autem  
adulteratur Indica myrrha, quæ ibi de quadam  
ſpina colligitur. Hoc ſolum prius India aſſert,  
facili diſtinctione, tantò deterior eſt. hæc Plinius.  
Quo ſit, vt facile crediderim noſtri viſus  
myrrham Indicam eſſe. namque per mare ru-  
brum & inde per carouinas (vt dicunt) Alexan-  
driam importatur. Myrrhæ quoque hiſtoriam  
non inconuincendè ſcripſit Theophrastus lib. i. x.  
cap. i. i. l. de plantarum hiſtoria, ſic inquit.  
Gignitur thus & myrrha regione Arabum me-  
dia circa Saba, & Adramytta, & Citibæa, &  
Mamaſi: & excutit thuris, myrrhæq; arbores  
aliæ ſuper montem, aliæ in pedemontis cultu-  
ris propriis: quamobrem aliæ coluntur, aliæ vi-  
tam agunt incultæ. Montem iſtum præſtatum  
aſſimant, & ningi ſolitum: amnes quoq; de eo  
in plana fluere. Myrrhæ arborem thure altitu-  
dine minorem, fructuſioremq; narrat: cau-  
dice duro, contortoq; iuxta terram, craſſio-  
riq; ſura hominis, cortice læui drachnæ ſi-  
mili. Alii verò, qui ſe viſiſſe aſſimant, de ma-  
gitudine ferè conſentiunt. Neutram earum  
arborum

*Myrrha  
adultera-  
ta opocal-  
pase.*

note

Вѣдомо.  
и оріент  
пробѣ

Myrtba  
Pavien  
am.

Myrrh  
Histor. et  
Theophrast.  
p. 10.

a-borum magnam referunt, & minorem myrrhæ humiliorēq; Sed thuris folium laurinum, læuēq; myrrhæ aculeatum, non læuē, vltimo simile: crispum tamen, extremō spina horridulum, illicni modo. Idem ea nauigatione, qua ex sinu heroum vehementer egressos sese aquam in monte quæssisse dicere, atque ita vidisse has arbores, & sectionem notasse hoc modo ambarum: & caudices, & ramos incisos quidem, sed alios veluti securi percussos videri, alios tenuiores incisuras habere: & lacrymam aliam decidere, aliam arbori inhærare: nonnullas quæ etiam subiectas tegetes ex palmis contextas, albi solum tantummodo circūpaumēratum. Montem autem vniuersum Sabæis diuisū dixere: hos enim loci illius dominos esse, insitiq; mutua degere, quānobrem nullum suas arbores custodire: vnde & thus, myrrhæq; sese largē ad naues solitudine deportasse narrant. Illud quoq; se audiuisse dicere, myrrhā, thusq; collectum vndiq; ad folis delubrū conuehi: quod Sabæorum esse sanctissimū inter omnia regionis illius, custodisque Arabes armatos habere, quibus singulos suum thus aceruatū, & myrrhā eodem modo relinquere, posita super acernum tabella, literis significante numerum mensurati, & pretium, quod pro singulis mensuris ponendū sit: mercatores verō, qui venerint, tabellas aduertere, eiusq; quod placuerit, acta mensura pretium in eodē ponere loco, vnde merces acceptæ sint: sacerdotē deinde venire, parteq; tertii pretii Deo accepta, reliquum ibidem relinquere: idq; seruari tutissimē dominis, donec acceptum venerint. Alii myrrhæ arborem terebinthi similē reddidere, sed scabriorem, spinosoremq;: folium paulō rotundius, gustatu proximū terebinthi: earum quoq; veteres præstantiores haberi. Nasci verō hanc, & thus in eodē loco terra subargilia, & sabulosa: & aquas fonte fluentes raras admodum comperiri. Hæc ergo illis repugnant, videlicet ningi, & imbribus perlui, & amnibus locum illum exhilarari. Sed hi quidem altera quoq; longē maiore ignorantia laborarunt: thus enim, & myrrham nasci ex eadem arbore putauerunt. Quāmobrē verissimilius ipsi narrarunt, quos ex herōi oppido profectos naui retulimus. Myrrhæ aliud stillatiū, aliud fictitiū constat. Probatur melior gustu, eiusq; norma concolorem accipiant, hæctenus Theophrastus. Myrrhæ meminit Galenus lib. v. i. i. simplicium medic. vbi ita scriptū reliquit. Myrrhæ secundi ordinis est tum excafcientium, tum desiccantiū. Itaq; capicum vulneribus illita glutinare ea potest. Inest & amaritas non pauca, per quam scetum, & lumbricos tum enecat, tum elicit: adest hinc ei & abstergendī potentia. Sæpe igitur ocularibus misceatur facultatibus, vtiq; quæ ad vlcera, & crassas cicatrices præparantur. Eadem de causa inditur & medicamentis, quæ ad tussim veterē, & asthma, siue anhelationē exhibetur: non ta-

mea arteriam exasperat, sicut abslergentium nonnulla. Verūm adeō moderatā obtinet absterfionē, vt nonnulli eam arteriacis quæ vocant medicamentis commisceant, tanquā sufficiens excafcians, & desiccans medicamē: scilicet absterfionem proficiscētē ab amaritudine nihil verentes. hæc Galenus. Porō vbi myrrha desit, Galenus in succidaneis (si tamen liber is Galeni est, nobis enim spurius cæstur) odoratum calām supplet: Constantinus verō amaras amygdalas eodem pondere. Sed equidem hic myropolas admonitos velim, vt nullo pacto eorum sequantur doctrinam, qui iubēt, Auicennæ auctoritate malē intellectā, myrrhæ loco piper nigrū supponere. Nanq; Auicenna hanc sententiam omnino refellit, cū vtatur his verbis. Pro myrrha substituendum piperis nigri dimidium aliqui perhibent: sed hoc falsum est. Postremo illud etiam notandum est, quod (vt Galenus inquit libro i. de comp. medic. per genera) myrrha semper medicamentis est commiscenda, cū ab igne tolluntur: quippe quæ coqui minimē pariat, veluti etiam thus, & aloē. De Boeotica autē myrrha, quid dicam non habeo, quod ætate nostra sit (vt arbitror) omnibus incognita. *Συρία* sic Græcis dicta, Myrrha Latinis appellatur: Ler, Mur, seu Mor, Arabibus: Myrrha, Italis: Mirrhē, Germanis: Mira, Hispanis: Myrrhe, Gallis.

† Exemplaria Græca typis expressa habent. *Διαγινώσκου τὸ σπῆν τῆς μύρρας*, id est, illita alexnarium. Quæ verba inunctionem ad partem nasi referre videntur, non autem ad instrumentum, quo debeat fieri inunctio. Si quidem, teste etiam Galeno lib. x. i. de vsu partium, *σπῆν* seu *σπῆνυον* pars quædam nasi vocatur.

## STYRAX. CAP. LXVIII.

STYRAX est lacryma est arboris malo cotoneæ similis. Præfertur pin guis, flauus, re sinosus, albicantibus grummis, quā plurimum in sua odoris gratia pmanens, qui dū mollitur, melleū liquo-

rē reddit: qualis ē Catabalīs, Pifsidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, fursufosus, friabilis, canoq; situ obductus. Ceterū lacryma inuenitur gummiū similitudine, perlucida; & myrrhæ



Myrrha  
Vires ex  
Gal.

Myrrha  
succida-  
mea

Boeotica  
myrrha.  
Nomen.

emula: verum per pauca manat. Adulteratur ligni scobe, quā vermiculi erodentes excusserūt, melle, & iridis sedimento, & quibusdā aliis. Alij cerā, aut adipem odoribus imbutū, flagrantissimis solibus cū styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua veluti vermiculos exprimunt, vānū dantq; Syracē hunc, † quoniam in vermiculorū specie contrahatur, scoleciten cognominant, quē tanquā syncerū imperiti approbant, nō animaduertentes ad præcipuā odoris fragrantia: liquidē acer admodū est, qui adulterationis vitio caret. Styrax calfacit, emolli- & cōcoquit: medetur tussi, destillationibus, raucedini, grauedini, & interceptæ voci: vuluæ præcursæ, duritiæ laboranti conuenit: cit mensēs potu, appositūque: aluum leuiter mollit, si exiguum cum resina terebinthina catapotij modo deuoretur. Miscetur vtiliter discutientibus malagmatis, acopi- & que. Adoletur autem, & igni torretur, vt fiat ex eo, veluti ex thure, fuligo: ad eadem cōueniens, ad quā thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria styracinum oleum componitur, quod calfacit vehementer, & emolli: verum caput dolore afficit, aggrauatque, & soporem adfert.

calamites. Neque probat lectionē mutandam esse in Gabaliten, quādamodum fecit Marcellus. Sed profectō hac in re (cū Manardus fuerit vir summa doctrina præditus) mihi magis Marcelli sententia probanda videtur. Quippe quæ Plinii testimonio comprobatur lib. x. 11. cap. x. v. vbi sic inquit. Styracem Syria Iudææ proxima supra Phœnicem gignit circa Gabala, & Marathunta, & Cassium Seleucia montem. Atque etiam ei adscriptulatur Orisabasi codex manu scriptus, in quo lib. x. 11. legitur γαβαλινος, & non καβαλινος. Porro Fuchsius medicus nostræ ætatis clarissimus, in libro, quē de compositione medicamentorum secundū condidit, styracem calamiten liquidum fuisse censet, non alia (quantum equidem video) ratione fretus, quam quod in calamis adueretur. Verum in hoc Fuchsius (pace eius dixerim) à veritate desecit. quandoquidem Dioscoridi styrax lacryma est arboris malo cotoneæ similis: cuius ille præstat ceteris, qui flauus est, resinosus, grumos habet albicantes, & dum molliuit, melleum liquorem reddit. Ex quibus facile constare arbitror, styracem non fuisse liquidum, sed in grumos concretum. Neque certē mihi rationi consonum videtur, ex eo quoddā Galeni tempore styrax in calamis vehabatur, inferre ipsum fuisse liquidum. Nam (vt mea fert opinio) non alia de causa qui styracis lacrymam colligebant, eam statim in calamis includebant, quam vt suauis eius odor conseruaretur. Id quod etiam cum dictamno faciebant ei (vt memorie prodidit Theophrastus li. 1. x. cap. x. v. 1. de historia plantarum) qui ipsum in Creta legebant, siquidē ii dictamni manipulos in ferula, aut arundine includebant, ne vis eius expiraret. Præterea cū apud veteres Græcos nulla (quod legerim) extet liquidī styracis mentio, haudquam possum huic Fuchsi sententiæ adherere: quinimo cogor eam prorsus resellere, quod rectius sentire videar cum Arabibus, & recentioribus, qui per liquidum styracem non aliud intelligunt, quam lachrim myrrhæ. Ceterum Plinio loco citato laudatur styrax post supradicta ex Pisidia, Sidone, Cypro: & Creta verō minime. Reddidit Plinius causam, quare est, quod Styrax plerūque puluerulentus existat, dicens, quod in eum circa canis ortum aduolant pennati vermiculi erodentes, ob idq; ipsum in scobe fordesceat. Adulteratur etiam styrax (vt idem scribit) cedri lachryma, vel gummi, melle, aut amarissimis amygdalis, quocirca retinendæ sunt notæ, quibus Dioscoridis auctoritate præstantissimus cognosci potest. Styracis arbor vixit Venetiis pluribus in locis, præsertimque in viridario clarissimi medici Maffei à Maffeo. Huius meminit Galenus lib. v. 11. simplicij medicamentorum, sic inquit. Styrax exalfacit, emolli, concoquit: quāobrem tussibus, catarrhis, pituitæ destillationibus, raucedin-

Fuchsi-  
pino re-  
probata.

Styracis  
considera-  
tio.

STYRAX, passim in Italia Storar calamita officinis appellatur, quod cognomen ex Galeno libro primo de antidotis acceptum crediderim. Namq; ipse simplicibus medicamentis agens, quæ ad theriacæ compositionem faciunt optimum iudicauit styracem, qui in calamis ē Phamphylia ferebatur: vnde calamitæ cognomen sibi facillē vendidit. Itaq; cū non aliud habeatur styrax, qui sit hoc genere præstior, in vsu medicamentū est, vt dum pharmacopolis imperant fieri medicamenta, quæ styracem excipiant, calamitæ cognomen adiciant, quo in dicent, se primum dorisbus intelligere. Nec illud quidem ab re: quandoquidē Galenus eodē loco memoriz prodiderit, hoc styracis genus tantū præstare ceteris, quam vīnū salernum illud bonitate exceilit, quod à cauponibus veditur. Quo argumēto fretus Manardus Ferrariensis existimauit, vbi in Dioscoridis codice legitur καβαλινος, hoc est, talis est Camabilites, potius legendum esse, talis est

Manardi  
lacio non  
probata.

Styracis  
Gires ex  
Galeno.

cedinibusque, quas *napias*, & *βήρυλλον* vocant, prodest. Tum mentes feru potum, seu admodum prolicite. Combusti eius fuligo, thuris fuligini quodammodo est similis. *Στρίλας* ut Græce, ita etiam Latine *Styrax* nuncupatur: Arabice verò *Miba*, *Meha*, *Mehaha*, seu *Astarach*: Italice, *Stirace*: officinis, *Storax* calamita: Hispanice, *Estoraque*.

¶ quoniam in vermiculorum speciem contrahitur. Hæc verba non leguntur in Græcis codicibus. Sed ea (ut arbitror) à Ruellio interprete adiecta sunt ob maiorem rei declarationem. Quæ hanc ob causam, lectione tamen admonito, nobis quoque relinquere placuit.

## B D E L L I V M.

## CAP. LXIX.

BDELLIVM alij bolchon appellât, alij madelcon: lacryma est Saracenice arboris. Probatu gustu amarû, translucentum, taurini glutinis in morem, intrus pingue, liquefcens facillè, ligni ac fordis experts. Suffitu odoratum, vngui simile. Est etiâ mnum bdellij genus fœdum, nigrum, vberioribus glebulis in offas conuolutum, aspalathi odore, ex India aduectum. Defertur etiam à Petra oppido siccum, resinofum, liuefcens, sed facultate secundû. Adulteratur gûmi, sed ita vitiatû non perinde gustui amaritudinè repræsenta, nec vsque adeò suffitionibus odoratum. Calfacit, & emollit: duricias, & turgentia guttura, humidâsque hernias discutit cum ieiuna salina dilutum: vulus spiracula laxat appositu, & suffitu: & partus, humiditateque omnes extrahit: calculos poru comminuit, vrinam mouet: tussientibus, & à serpente percussis vtilissimè datur: valet ad rupta, vulsa, laterum dolores, & discursantes spiritus. Malagmatis inferitur, quæ contra duricias, & neruorum nodos profant. Côtusum resoluitur affuso vino, aut aqua calida.

importatur, adeò rarem est, ut (quemadmodum de myrrha diximus) ad ostentationem tantum afferretur, vel ad adulterini, & reprobati dignoscendi normam. Credidere quidâ, hoc vulgare Edellium, cuius passim in officinis est vsus, constare partim ex nigro, quod India mittit, partim verò ex eo Arabici generis, quod siccum, resinofum, liuenfcem ex Petra defertur, vtriusque à mercatoribus simul mixtis. Quòd si ita res se haberet, non esset planè moleste ferendum, quòd scitem mediocriter impetiretur, postquam nobis optimo interdictum est. Verum etsi hoc fieri possit, cum tamen in eo parum, vel nihil amaroris sentiatu, cûmque cæteris fere omnia bus notis, tum qualitatibus sit expert, quas ei Dioscorides tribuit, est potius opinandum factitium id, & adulterinum esse, quàm legitimum. Hinc factum est, ut quidam recentiores simplicium indagatores, cum nobis persuadere vellent, Bdellium in officinis reperiri, licet non aduectum ex Saraca felicit Arabiæ ciuitate, vnde aduehi consueuerat, somniauerint, communem myrrham legitimam esse bdellium, ut eorum sententiam resellentes, in præcedenti commentario scripsimus. Huius, quo passim vitimur, plura quidem habentur genera. Si quidem aliquod quandoque vidi nigrum, resinofum, odore foetilo laseri quadatenus proximo: aliud translucentum, & vtpote taurinum glutinum, sed siccum, amaroris, experts, nulloque odore præditum: quoddâ verò adeò vulgari myrrhæ persimile, ut ab ea vix digroscoi posset. Quæ omnia genera tamen illegitima censentur, officinis tamen tanquam legitimis, & præstantissimis in medicamentis passim temere vsurpantur. Bdellium scriptis tradidit Plinius libro x i i. capite. i x. his verbis. Vicina est Bactriana, in qua bdellium nominatissimum. Arbor nigra est, magnitudine oleæ, folio roboris, fructu caprifici natura. Gummi alii bronchon appellant, alii malachran, alii maldacon. Nigrum verò & in offas conuolutum hadrobolon. Esse autem debet translucentum, simile cæxæ, odoratum, & cûm fricatu pingue, gustu amarum citracorem. In sacris vino perusum odoratus. Nasctur & in Arabia, Indiâque, & Media, & Babylone. Aliqui peraticum vocant ex Media aduectum: facilius hoc, & crustosius, amariusque. At Indicum humidius, & gummosius.

Adulteratur amygdala nuce. hæc Plinius. Edellii facultates prodidit Galenus libro v i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Bdellium quod Scythicum nominant, quod res ex Galen. sanè & artius est, & resinofum magis, emollientis admodum, & efficacis virtutis est. At alterum, nempe Arabicum, quod diuicius est, magis desiccatur, quàm emollit. Igitur recens, & humidum est, & contritum facillè mollescit, ad omnia, ad quæ Scythicum, idoneum. At quod antiquius est, & admodum gustu amarum, & acre, & siccum, ad eorum

*Bdellij vni  
genera  
ra.*

*Bdellij hi  
sunt ex Pla  
nio.*

*Bdellij vi  
res ex Ga  
leno.*

*Bdellij con  
sideratio.* PRAESTANTISSIMUM Bdellium Dioscoridi translucentum est, taurini glutinis in morem, amarum, tactu liquefcens facillè, & quod incensum odorem emittat vngui odorato similem. Quod si modò nostra tempore in Italiâ

rum, quæ indurata molliunt, mediocritate excidit. Videntur autem quidam illis, & potissimum Arabico, & ad gutturis ramices, & hernias aquo fas, filia marutina, ieiunag, subigentes, vt emplastri consistentiam accipiat. Porro Arabicum & calculos renum in poru sumptum frangere apparet, tum vrisas ciere, & crudorum flatuum discursus, præterea laterum dolores, & rupturas persanare. hætenus Galenus. Cæterum

*Bdellium  
alterum  
Serapioni  
palme ge-  
nere.*

inuenio Serapionem duobus capitibus Bdelli memisse: quorum alterum appellauit Iudaicum, quod nimirum est ipsum Dioscoridis bdellium: alterum verò cuiusdam plantæ palmæ similis fructum esse tradidit. Hoc Neapoli frequentissimum vidimus, iisq; in officinis accepimus, vbi sacchari arundines è Sicilia petitas veniuntur. Nam cum illic essem cum Bernardo Clesio Cardinali, & Principe Tridentino, qui apud Cæsarem Carolum v. inuicissimum Imperatorem agebat, multarum videndarum rerum, quæ ad medicâ materiam spectant, fuit mihi facultas. Hoc igitur palmæ genus (vt ab incolis accipi) ex Sicilia cum foliis palmæis, ac radice deferret cubitali, vel paulo ampliori longitudine. Vocatur hæc plantæ Neapoli vulgo *CE FAGLIONI*, quarum quoddam duntaxat germiculum comedunt, tenerimum, sapidum, & orti gratissimum. Includitur hoc mille quibusdam inuolucris, tanquam totius plantæ corculum. Hoc quidem tuberibus, & carduis, carduorumq; echinatis capitibus (caciocossi, & archichiochi Itali vulgo vocant) præfertur. quan-

*Cessilioni  
confidit a  
sic.*

doquidem id secundis mensis pro bellariis cum pipere, & sale foenniter assumunt, tum quod gustui is cibis admodum ardeat, tum etiam quod venter conciliet. Porro illa vulgaris Cessilioni appellatio (quantum conficere possumus) à Mauritanis accepta est: siquidem Serapio sic inquit. Cessilio est cor istius palmæ, & natura eius essysit natura palmearii. Galenus in super lib. v. i. l. simplicium medic. de palma differens, eius medullam encephalos appellari tradidit. Ex quo adducor, vt suspicer, inde Arabes Græca voce corrupta suum Cessilioni nomen accepisse. Quod *Βδελιον* Græci, Bdellium similiter Latini vocant: Mauritanii, Molochil, Molochal, Mochol, aut Mochel: Itali, Bdellio: Hispani, Bedellio.

*Nomina.*

† Licet Saracennicæ arboris lectio admitti possit, quod Sartacca, vnde Saraceni dicti sunt, vrbis sit in Arabia, non tamen improbanda videtur lectio Arabicæ arboris. Quod non solum Plinius scribat bdellium in Arabia nasci, & Galenus alterum bdelli genus Arabicum faciat, sed etiam quod Orisbasius libro x. i. legat *Βδελιον* ἐν τῇ Αἰθιοπῇ αὐτῷ, hoc est lacryma est arboris Arabicæ.

† Hoc loco in vulgaris Græci codicibus sic legitur: *Βδελιον ἐν τῇ Αἰθιοπῇ, καὶ ἐν τῇ Αἰθιοπῇ*. hoc est, si verbum verbo reddamus: odoratum in situ, simile vngui. Eadem verba ex Dioscoride referunt inter Græcos Aëtius & Ori-

basius. Cæterum in iis verbis illud dubiam sententiam facit, quod non facile colligi possit, quid per *ἄνθος* intelligat Dioscorides. nam cum hæc vox homonyma sit, & plura significet, cui potissimum rei conueniat, auctor non explicauit, vt hinc vel aliquid deesse suspicandum sit, vel hæc voce diuinandum de nota illa bdelli optimi magis sit, quam aliquid certi statuumdum. Auger difficultatem, quod interpretes omnes, viri doctissimi, verba illa in diuersum sensum trahant. Alii enim probatum bdellium volunt bene odoratum esse semper, sed incensum fieri vngui simile, vt Manardus libro suarum epistol. octauo: alii dum incenditur, odore maluit vngui assimilari, vt Hermolaus: quorum tamen utrunque constet de odorato vngue intellexisse. His adimplari videtur Serapio inrer Arabas, qui bdelli descriptionem Dioscoridi acceptam ferens, verba illa interpretatur in hunc sensum: cum incenditur, bonum spirat odorem, odori vnguis odorati similem. Sunt porro qui bdellium sufficu odoratum faciunt, vngui simile, vt Ruellius. qui certè ea simplici verborum illorum versione non minus ambiguum reliquit illius notæ sensum, quam in Græco reperitur. Marcellus autem diuersam ab antedictis sententiam protulit, nam ita verit illa verba: cum incenditur, odoratum, & humanum vngui colore simile. Hæc vtique Marcelli interpretatione plura habet, quam in Græcis codicibus legantur, ea fortasse ratione ab eo addita, vt nulla reliqua esset ambiguitas: quanquam in hoc à Manardo redarguitur. Mihi quidem hæc auctoris placuit Serapionis interpretationi subscribere, vt patet in principio huius commentationis. Nunc verò quid mihi sentiendum sit, ferè incertum sum. Videtur enim verba illa Dioscoridis ita distincta esse, vt deas bdelli optimi notas faciant: quarum altera est, vt odoratum sit, cum infusetur: altera, vt sit vngui simile. Sed reliquuntur dubitatio, an vnguis odoratus, aut humanus sit intelligendus. Eo tamen inclinamus, vt putem humanum vnguem intelligi, quod Plinius libro x. i. cap. i. x. de bdello differens, Bactrianos vngues reddat candidos, cum inquit, Bactrianos vidor sicus, multique candidi vngues. Ex his nimirum verbis liquet, bdellium illud albis maculis vngui humano similibus reiectum esse. Id quod etiam videtur bdello assignasse Damocrates in suis tarminibus, quibus cypheos compositionem cecinit, & quæ à Galeno referuntur libro i. de antidotis, dum ita scribit: *Σχινον ἢ ὕδαρ δὲ ἰνδονικαν, βελιον δὲ ὀνυχας*. ὕδαρ, ἀρωματισθὲν S. Hæc duo carmina soluta oratione ad verbum sic vertemus. Iunci odorati duodecim, & croci vnam, Bdelli vngues drachmas tres, apalathi duas semis. Sanè quod Damocrates bdelli vngues in cypheos compositionem addat, ne magis

mouet, vt credā bdelliū notā peculiārē habere, quā vnguiū effigiem repræsentat: aut quod illud bdelliū sit præstantius, cui sine maculæ humanis vnguib⁹ similes. Sed hæc fortasse fufius, quam deceat, vt quid aliū, & quid ego sentiā in illis Dioscoridis verbis, exponerem, ita tamen, vt malim eruditorum quoq; iudiciū esse.

THVS. CAP. LXX.

THVS in eagineitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatū tenet in eo genere masculū, stagonias appellatū. Sæp̃te natura rotūdū: tale autē † indiuiduū est, candidū, cūm frāgitur, intus pingue, in fissitu statim ardens. Indicū verō fuluescit, & colore liuet, sed rotūdū industria facit aut: nā in quadrāgulares formas dissectū fissilibus versant, donec rotunditatem contrahat: verū huiusmodi thus tēore flaesceat, quod atomū, aut syagrum appellant. Secundū locū habet † Arabicū, & in Smilo nascens, quod aliqui copiscum vocant, minus multō, & fuluius. Est & genus aliud, cui amomite cognomen est, alioqui candidū: quod dum mollitur, mastiche more digitis cedit. Adulteratur omne thus † in itinere pini resina, & gummi, quod facile deprehendi potest: siquidem fissitum gummi flammā non eiacularur, & resina in fumū evanescit, thus verō statim ardet: idē maleficiū odor prodit. Ad calfaciendū, & astringendum pollet: oculorū caliginē discutit, caua vlcera cōplet, & ad cicatricē perducit: cruenta vulnera glutinat, infranatq; cunctas sanguinis eruptiones, etiā si cerebri membranīs effluat: vlcera, quæ caecoethe vocantur, & sedis, & reliquarū partiū permulcet tritū cum eo & lacte linamentū: formicætes verrucas interitiā, impetiginesq; ex aceto, & pice illitū tollit: ambausta igni, perniōnesq; cum suillo adipe, aut asferino, & vlcera in capite manantia cum nitro, si infricetur, sanat: paronychiis cum melle, auribus fractis cum pice, medetur: ad reliquos auris dolores cum dulci vino infunditur: inflammata à partu mammarū cū cimolia, & rosacco magna vtili-

tate perunguntur: additur ad arteriā, viscerūq; medicamēta: prodest sanguinis excretioni potū. Sed in secunda valetudine hauritū insaniam mouet, & largius cū vino potū interficit. In fictili mūdo thus crematur, flagrate glebula succensum à lacerna, donec exuratur: post perfectā visionem operire oportet, vsquēdū restingatur: sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam aneo vase cauo circa medium perforatā cingunt ad excipiendā fuliginem, vt in eius mentione mox ostēdemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in fornacē indito, cremant. Fictili etiā nouo viuacibus pranis torretur, dum non amplius bullit, aut pinguitudinem, vaporēve emittat: facile enim comminuitur, quod perustū non est.

CORTEX THYRS.  
CAPVT LXXI.

PREAFERTVR thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recēs, læuis, minimē scaber, sine membranīs. Adulteratur admissio pini, aut nucis eius cortice, sed horum index ignis est: siquidē reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumū eructant: thuris verō cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem eiacularur. Thuris modovritur: & vis eadem, quæ thuri, sed validior, adstringentiōrque. Quare potu cruentis excreationibus, vuluis fluxione laborantibus in pēso confert: ad cicatrices oculorum, & caua, sordēsque efficax est. tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

MANNA THYRS.  
CAPVT LXXII.

MANNA thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem, quam & thus, sed inualidiusculā. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris confusi adulterant. Sed hæc igne deprehenduntur: neque enim æquē fissitu aërium vaporem, sed fuliginosum,

& impurum expuit, & permistum sua-  
ueolentia halitus virus habet.

FVLIGINEM THURIS.  
CAPVT LXXIII.

FVLIGINEM thuris sic facito. Forci-  
pula lucernis accensas singulatim  
thuris glebas in nouam fistilem ollam  
concauam imposito: & aëreo vase in  
medio perforato, deterfa diligēter sor-  
de, obtegito: alteram admoueto, ex  
altera eius parte, aut vtraque subiectis  
quaternū digitorū altitudine lapil-  
lis, quō facilius perspici queat, si vran-  
tur: & quā locus capax fuerit, glebular  
alias supponito, & anteaquā prorsus  
prior gleba restinguatur, aliam impo-  
nito, donec sufficientem fuliginem vi-  
dearis coēgisse. Continuō tamē exter-  
næ aramenti partes spongia, aqua fri-  
gida madefacta, abstergantur: ita enim  
temperato aris feruore, fuligo omnis  
inhærebit, quæ alioqui per leuitatem  
decidua thuris cineribus admiscetur.  
Dersa itaque fuligine, cinis cremati  
thuris seorsum subtrahendus est. Idē  
opus, quoad satisfactū tibi videbitur,  
obundum. Oculorum inflammatio-  
nes mitigat, fluxiones suspendit, vlcera  
purgat, caua explet, carcinomata sistit.  
Simili modo ē myrrha, resina, styrace,  
reliquisque lacrymis fuligo excipitur,  
ad eadem conueniens.

CYM THVS, Thuris cortex, manna, &  
fuligo ab vna tantū arbore proueniant, non  
alienam duxi de his omnibus vnico commen-  
tario differere. Sed primū a thure exordiens  
cū Dioscorides in eius scribenda historia, nō  
latē se diffundat, vt eos voti compotes faciam,  
qui eam audire desiderāt, hic referam, quæ ex  
Theophrasto lib. i. r. cap. i. i. i. i. quæq; ex Plinio  
libro x. i. i. cap. x. i. i. i. diligenter  
excepisti. Gignitur itaque thus (vt illi prodi-  
derunt) præter Arabiam nullis, ac ne Arabiæ  
quidem vniuersæ, sed priuatiū cui-dam loco  
in medio ferē regionis post Atramiatas pago  
Sabæorum, qui caput regni est. Tractus is spē-  
ciat ad orientem vndique rupibus inuatus, &  
a dextra maris scopulis inaccesibus. Syluarum,  
quæ thus profertur, longitudo est centum  
millia passuum, latitudo autē dimidium eius:  
quas & Mianā attingunt alium pagum colen-

tes, per quos thus euehitur vno tramite angus-  
to, à quibus etiam thus Minæum olim di-  
ctum est. Siquidem hi primi fuisse thuris reper-  
tores, eiusq; commercium primi fecere, ma-  
ximeque exercent. Cæteris interdīctum est,  
his exceptis, videre thuris arbores: ac ne  
Minæorum quidem omnes (vt perhibent)  
ipsis arbores videre possunt. Ius enim in thus,  
ipsūq; legendi potestas, tridentum tantum-  
modū esse familiarum dicunt, quæ per suc-  
cessionem id sibi vendicant: quæ etiamnum ob  
id à propinquis populis sacra vocantur, quōd  
cūm vulnerant arborē, quō liquor defluat, aut  
cūm metit, nec foeminarū, nec funerū cōgressu  
polluuntur: atq; ita religione merces augētur.  
Quidam promiscuum ius Minæis omnibus esse  
tradunt, & vnoquoque anno inter ipsos di-  
uidi. Cæterū quāquam prisca Romini in  
Arabia bella gessere, thuris tamen arboris fa-  
cies à nullo (quod equidem legerim) Latino-  
rum tradita est: neque Græcis etiamnum au-  
ctoribus (etsi plures de ea conscripserint) de  
eius effigie satis inter se conuenit, licet dixe-  
rit Theophrastus, quōd arbor thuris, quæ  
super Sa-des apud delubrum quoddam surre-  
xit, fronde lauri constet. Thus duntaxat mæti  
solebat incisio arboris cortice, canis ortu, fla-  
grantissimis æstibus, quōd tunc esset humo-  
ribus maximē prægnans, quōd postea legebat-  
ur sequenti autumnū. Verūm dulcedo quæ-  
stus aliam viam attulit, qua etiam primo vere  
ipsūm legeretur, incisis per hyemem arbori-  
bus. Excipitur quod ex arbore profluit, atque  
distillas palmea tegete, vbi loci natura poscit,  
aliubi aræ circumspauit. Purius, & perluci-  
dus illo modo, sed hoc ponderosius, minus  
pellucet, minusque viribus pollet. Vindemia  
verna thus rufum emittit, nec comparandum  
priori: vires enim imbecilliores sibi forti-  
tur. Creditur nouellæ arboris candidius esse,  
quā veteris. Quod hæsit in arbore, ferro  
depeccitur, ideoq; corticosum. Tradidit Dio-  
scorides præter Arabicum inueniri & Indicū,  
id tamen flauescere. quod indicat, thus & in  
aliis regionibus nasci præter illud, quod ex  
Arabia deuehitur. Quod cū Theophrastus,  
& Plinius satis compertum haberent, quanuis  
prius scripsissent, thus præter Arabiam nul-  
lis gigni, dixere tamen postea, quōd ex rela-  
to acceptarent, id etiam nasci in quibusdam  
insulis. Thus (vt scribit Galenus libro v. r. i.  
simul. medicamentorum) exaltatū ordine se-  
cundo, desiccatur verò primo, paulūlmq; ad-  
stringit. Sed candido minimū adstrictio ma-  
nifesta. Cortex eius euidenter adstringit: pro-  
inde sanē strenuē quoque desiccatur, adeo vt ex  
secundo sit ordine completo desiccantium.  
Est autem crassiorum partium, quā ipsūm  
Thus, & minimē particeps acrimonie. Ob  
has igitur tum facultates, tum qualitates mul-  
tas est eius vsus apud medicos in hæmoptoi-  
cis, stomachicis, cæliacis, & dysentericis, non

Thuris fa-  
cultates  
ex Gal.

tantum

Thuris  
histo. ex  
Theophr.  
& Plin.

50

*Galenus locum reseruit.*

tantū iis, quæ extrinsecus applicantur, ipsum admissentes, sed & iis, quæ intrō in corpus sumuntur. Ramus eius (lego fuligo eius, & infra rationem reddam) tum siccioris tum calidioris est facultatis, quoniam ipsum thus, adeo ut ad tertium usque excessum perueniat. Habet verò etiam absterforium quiddam: itaque eo nomine expurgare, & implere, quæ in oculis consistunt vlcera, videtur, velut & myrrhæ, & styracis. hæc Galenus. Verū ne quissimam fortasse me perperam Galeni lectionem immutasse existimet, illud sciendum est, quod in Galeni loco citato non solum Gerardii Gaudani versio reprehendenda (quod tamen interpreti vitio minime dandum est) sed etiam in Græcis tum ipsius Galeni, tum Pauli Aeginetæ codicibus communis lectio deprauata videtur. quippe ubi in thuris capite legitur apud Galenum. *ἡ δὲ θάμνην ἀδρὲς ἡ θάμνην ἀδρὲς*, hoc est, ut verit Gerardus, Ramus eius tum siccioris, tum calidioris est facultatis, quoniam ipsum thus, rectius legendum putauerim *ἡ δὲ θάμνην ἀδρὲς*, hoc est, Fuligo eius &c. Quæ quidem lectio primò Dioscoridis testimonio comprobatur: qui præterquam quod ramorum non meminit, ipsi thuris fuligini, non ramis, tum expurgandi, tum implendi, quæ in oculis consistunt vlcera, facultatem inesse testatur. Deinde id manifestè innuisse videtur Galenus in prædicti capitis calce illa comparatione, cum inquit, veluti ex myrrhæ, & styracis. Nam libro VII. sim. pl. medicæ de styrace agens: styracis combustus fuligo, inquit, thuris fuligini quodammodo est similis. Et libro VII. de fuligine scribens: Primum enim, ait, thuris fuligine vntur, in oculariis medicinis missa, eas videlicet, quæ ad oculos etiam tum phlegmone tentatas accommodantur, atque etiam fluxione tentatur, & vlcera habent: nam & illa expurgat, & carne replet. Ad hæc vsurpant quoque eam ad facultates, quas vocant cilliblepharas. Præterea terebinthinæ, myrrhæque fuligo molestia caret, non aliter, quam thuris: sed styracis hæc quodammodo valentior est. His igitur rationibus asserere non dubitauerim, hoc in loco vulgatos Græcos codices fortasse librariorum incuria vocum similitudine deceptorum deprauatos esse: quodque loco huius vocis *θάμνην*, quæ Latine fuliginem reddit, successerit *θάμνην*, quæ rami germēne significat. Quod etiam aperitissime confirmat Serapio: qui cum hanc Galeni locum suo tempore legitimum, & incorruptum haberet, quæ hoc Galeni loco nostra ætate de thuris ramo legatur, ea ipse Galeno accepta referens, de thuris fumo, seu fuligine legit. Quod item apud Aëtium videtur licet tamen Paulus hæc menda non vacet, vel sui ipsius fortasse, vel potius librariorum culpa. Nam: aliis non possem non admirari, quod in

Galeno lectionem hanc deprauatam esse non animaduertisset, quem idmodum hæc in re nostræ ætatis interpretes mihi quidem admirari o-ne digni videntur. Cæterum thus (ut Galenus scribit libro III. de comp. medicament. per genera) concoquit, & pus mouet in temperatis corporibus, nam in humidis sarcoticum est. Præterea cum dixerit Dioscorides, thus in secunda valeatidie haustum, infaniam facere, & largius cum vino sumptum interficere, hinc Aueniennam errasse crediderim, qui & deprauatis sensibus, & abolitæ memoriæ thus opem præstare tradit. Porro credere nonnulli thuris Mannam apud Græcos esse, quam nostra ætate de cælo collapsam super arborum frondes colligimus, quamque tanquam omnino ex parte innocuum medicamentum, & vterque gerentibus mulieribus, & pueris & delicatis ducenda alui gratia propinamus. Verum res quidem aliter se habet: namque Plinius, & alii complures præstant, Mannam thuris esse micæ eius concussu elisas, quod dum conuehitur, euenit. Quod etiam testatur est Galenus libro III. de compositione medicæ secundum locos. Sed quoniam thuris Manna mihi redegit in mentem Mannam hanc purgatoriam calitis demissam, ut plenius legentibus satis fiat, cum huius nūquam meminere Dioscorides, de ea tradam, quæ ex Arabum monumentis deproptis, quæque ipse etiam in Calabria vidi, ubi laudatissima colligitur. Est igitur MANNA quidam ros, siue liquor suauis, qui ex aëre veniens subluccanis temporibus, arborum ramis, & frondibus, herbis, lapidibus, & solo interdum inuenitur hæret: qui breui temporis curriculo coalescens, grumosus in gummi morem efficitur. Huius duo tantū genera ipse in Italia vidi, quorum alterum ab orientali plaga, alterum verò a Calabria defertur. Eius, quod ex oriente petitur, duplex habetur species, præstantissima altera, quam Mastichinam appellant, nomine à granorū mastiches similitudine sumpto: infirma verò, & vilis altera, quæ Bombycina nūcupatur. quippe quæ nil aliud est, quā aut euani-da, & fenio exhausta Mastichina, aut siccat, aliusq; impo-fluris adulterata. Calabriensis plurimi penditur, quæ stirpium frondibus insidens colligitur, proinde foliorum Mânæ cognominata, minutis granulis constans, translucida, grauis, mastiches granulis similis, candida, pulsu dulcis atque sua uis. Secundas partes sibi adhaerens, quæ ramis, insidet, tertias verò, quæ lapidibus, & solo inheret: nimirum hæc granulis constat crassioribus, & colore longè minus sincero. Ex ea, quæ nocte peracta è cælo ceciderat, Consistentia, quæ est Calabria ciuitas, mihi facta fuit copia super fraxineis frōdibus, quæ iulapij perfectæ cocti guttas prorsus referebat. Accepi inibi ab incolis, quæ hæc mane legitur, priusquam sol exortus admodum exalfaciatur: namq; postea sole liquefacta, absortique faciliè euascebat. Qua-

*Manna, lapsa.*

*Manna thuris.*

*Manna cal-lestis histo-ria. & ge-nera.*



propter plerique, ubi in magna deciderit copia summo mane arborum ramos præscindunt, & in opacis collocant, ubi concretam maiori commodo legunt. Hinc verò fit, vt nesciuerim ego, quâ ratione ductus Fuchsius vir eruditissimus scripserit libro de cõponendis medicamentis, quem nuper auctum edidit, Mannam (vt suis verbis utar) Calabrinam grano constare grandiori, floccorum lanæ & bombycis referente effigiem, candidiori, & ob id alio nomine Bombycinum vocari quoniam & hanc viiori pretio vendi. Atqui cum is à nobis planè dissentiat in Mannæ, quæ ex Calabria aduehitur, historia, ratus gnarufque hanc, quam paulò antè reddidi, veram esse, non plura adiciam: sed relinquam in hoc fore iudicium eorum (sint vel medici, vel pharmacopœi, vel mercatores) qui Mannæ illius naturam rectius norunt, atque eam satis exploratam habent. Duo Mannæ genera etiãnum à Mauritanis diuersis capitibus prodita reperio: quorum alterum Mannam, alterum verò Terenabin appellant. Tamen non aliam inter ea specierum differentiam esse constat, quàm quod alia liquefrens, mellis similis, alia in grumos concreta videatur quæ profectò illa est, quæ ad nos aduehitur: Quam verò ii Terenabin vocant, Serapionis testimonio & ipsam esse Mannam manifestè ostenditur. Nanque Abicis auctoritate, Terenabin, inquit, febrium ardentium inflammationes mulcet, sitim exinguit, aluum mediocriter emolliit, pectori, & tussi opem præstat, nec aliud est, quàm Manna. Testatur Brasauolus Ferrariensis, Nicolaum quandam Ferrariæ (vt arbitror) pharmacopolam emisit à quodâ Mauritano vas plenum cuiusdam Mannæ mellis similis, quæ in medicamentis non satis laudari potuit. Hanc equidem ex eo genere fuisse existimaui, quod Mauritanii Terenabin nominant: etsi Brasauolus ipse contrarium senserit, cum vellet, Terenabin Mauritanorum eam esse Mannâ, quâ communiter veterum eorundem verò Mannam esse huiusce vitæ speciem. Quæ tamen sententia Arabum scriptis prioris refragatur, quandoquidem ipse inueniatur apud Serapionem, quod Terenabin quidam ros est è cælo cadens mellis grumoso similis, & quod aliter mel rosicidum appellatur. Auicenna verò de Manna agens, inquit, eam gummi modo con crescere, à quo Mesuem nihil dissentire compertio. Creditit Aueroes, & post eum alii quàm plurimi, Mannam veteribus, præsertim Galeno, incoñitam fuisse. Quibus illud reclamât, quod ipse Galenus scriptis tradidit libro 111. de alimentorum facultatibus, capite de melle, sic dicens. Memini aliquando cum esset super arborum, ac fructuum, herbarumque folia mel quàm plurimum fuisset repertum, agricolas velut ludentes cecinit, Iupiter melle pluit. Præcesserat autem nox, vt per æstatem, satis frigida (nam tum tempus anni æstiuum erat) pridieque calida, & sicca fuerat aeris temperies. At-

qui peritis naturæ interpretibus, haliens è terra, & aquis prodeuntes, folis calore exactè attenuati ac cocti, à frigore secutæ nobis in vnum coacti, ac densati fuisse videbantur: sed apud nos rarò id accidit: in monte autem Libano quotannis perfæpe. Itaque coria super terram extendentes, & arbores excutientes, quod ab eis defluit, excipiunt, & ollas, ac fistillas melle implent, vocantq; id rosicidum mel, & aerû. Hæc Galenus de Manna memorie prodidit. Ex quibus eorum error deprehenditur, qui putant hanc ei fuisse incognitam. Existimandum igitur est, quod hinc Arabes suum deduxerint Terenabin, præsertimque cû scribat Serapio, hoc ab eis melaerû appellari. Huius etiã meminit Plinius libro vndecimo, capite duodecimo his verbis. Venit mel hoc ex acra, & maxime siderum exortu, præcipue ipso siccio ex-  
 10  
 20  
 30  
 40  
 50  
 plendente sit, nec omnino prius vergiliarum exortu subluccanis temporibus. Itaque cum prima aurora, folia arborum melle rosida inueniuntur. At si qui maturino sub dio fuere, vndas liquoze vestes, capillumque concretum sentiunt. Siue ille est cæli sudor, siue quædam siderum salua, siue purgantis se aeris succus, vti nam esset & purus, ac liquidus, & suæ naturæ, qualis defluit primò. hæcenus Plinius. Sed tam antiqua Manna res est, vt ante Galenum, & Plinium, eius etiam meminerit Theophrastus Hæfodi auctoritate, libro 111. capite nono de plantarum historia, his verbis. Sin autem auctore Hæfodo, mella, apesque quercus ferat, magis quæque illud confirmatur. Ergo nascitur vel hic melleus humor è cælo cadens, in hac maxime insidens. Mannam vtriusque consistentiæ è cælo demissam vidimus in Comitatu Gori-tiensi, vniuersosq; Foroluiensis agro, ac circumiacinis locis, Anno à CHRISTO nato M. D. x. l. v. maio, & iunio mensibus: fuitq; mihi ambarû colligendarû amplissima facultas. Siqui dem ea, quæ hici, fraxini, & orneoglossi frondibus inhaerant, gummi modo concreuerat, colore candida. At quæ super amygdalæ, persicæ, ac quercus folia deciderat, mellis modo liquefrens ab arbore defluebat, flavo colore. Quo factum est, vt facillè crediderim, quod non sui ipsius facultate gummi modo Manna concre-scat, sed foliorum, in quibus delapsa recumbit. Quare ab Arabibus diligentiissimè perspecta, vtriusq; Mannæ historiam diuersis per se capiti-bus suis monumentis prodiderit. Sed professò non admittentis, quin potius explodenda sit videtur sententia Monachorum, qui in Mesuem commentarios scripsere, cum pro certo asserant, siccio ardente Mannam non solum rosis modo super arborum, & herbarum folia reperi-ri aeris, & cæli clementia: sed etiam ab arbori-bus, fraxino scilicet, & orneoglossio absque aliquo cæli rore, gummi modo incisio earum cortice in lacrymas concrekere. Quod tamen vt à rei natura, ita etiam à ratione, & à veritate abhorrere putauimus. Siquid ea Manna,

Mannam  
comitatu  
Goritiensi  
est. Forolui-  
ensis.

Monachorum opi-  
nio explen-  
da.

hæc, q; pi-  
nia.

Manna  
Arabia.

Brasauolus  
Ferrariensis.

Terenabin  
storia ex  
Gale. Plin.  
& Theophr.

quæ inciso harum arborum cortice in Apulia, & Calabrienſi agro hæc ætate canicularibus diebus collaccimare cepit, nullus quidem planta liquor eſt, ſed ipſa eadem Manna, quæ diebus ſuperioribus eaſdem in arbores ab ære deciderat. Nam cum illis regionibus uſu veniat, quod præ cæteris prædictæ arbores eo mellifluo rore affatim, abundeque madefcant, ſitque cortex ſolis ardore nimio ſitens, ac riſoſus, magnam liquoris quantitatē intra ſe abſorbet. Quo fit, ut poſtmodum exuriente canicula incifo eodem cortice idem liquor exiſtat, & in grumos concreſcat: qui tamen cum leues, fungoſique ſint ob arboris ſucci miſſionem, inſeliceſter operantur, nec alterius Mannæ viribus corſpondent. Quod autem id tantum fraxino, orneogloſſo; eueniat, cum mellis ille ros in vniuerſum omnes occupet plantas, in cauſa eſt harum arborum nobis occulta poteſtas, vt magnetis ad ferrum, & ſucci ad paleas, quippe omnibus ſarum eſt, apud Calabros, & Apulos ſolam fraxinam, eiꝰ congenerem orneogloſſum Mannam in ſe contrahere, retinere, denſare, ac cohibere: ex aliis vero arboribus eandem ſtatim deſiccare, & in ſubſectas herbas, petras, ſolūque diſſundi. Quare ab his duntaxat arboribus incifo cortice non ſanè primò, & ſecundum naturam, ſed ex accidenti deſiuit Manna. Verum optimi illi patres contenti (ni fallor) cortice, internas illarum arborum partes penetrare neglexerunt. At incolæ, qui ex maiori huius liquoris proventu, plus auri referunt, rei naturam diligentius inueſtigarunt. Cæterum ex his, qui thuris Mannam caeleſtem hæc eſſe crediderunt, 2num Crinitum Florentinum fuiſſe comperio. In cuius cenſuram Manardus Ferrarienſis libro primo ſuarum epistolarum peculiarem epistolam conſcripſit. Veruntamen venia illi danda eſt, cum & Serapio, qui Mauritanis omnibus in ſimplicium medicamentorum hiſtoria præſtitus eſt, thuris Mannum cum caeleſti inepre confundat. Meminit Mannæ inter alios Græcos etiam Actuarius libro de medicamentorum compoſitione, ibique de eius viribus ac facultatibus diſſeruit. Manna tam Auenicene, quam Meſuſi teſtimonio, æquali ſerè temperamento conſiſtit, licet ad calidum paululum inclinet: at Auerroï calida, humidæque habetur. Aluum deuorata, aut hauſta ciet, per ſe tamen imbecilliter. Ideoque tum ſæminis vtero gerentibus, tum pueris ipſis tutò ſemper exhiberi poteſt. Aliis medicamentis addita vires eorum auget. Bilem faciliè educitiſſim extinguit, aperit, emollit, læuigatque gulæ, peſtorisque partes. Quæ ex Alexandria Aegypti adſertur Maſſichina vocata, vno duntaxat anno in ſuis viribus perſiſtit: ſed quæ in Italia prouenit, præſertimque Calabrienſi agro, pluribus annis incorrupta perdurat. Enimvero Fuchſius medicum noſtra ætate & doctrina, & rerū cognito-

ne clarus, in libro de compoſitione medicamentorum, quem ſecundò auctum excudit, Mannam à medicorum uſu explodere conatur his verbis. Manna leuem certè, aut ſerè nullà ſoluendi, aluūque ſubducendi vim habet. Quod iis compertum eſt, qui iuxta Libanum fuerunt. Nam referunt, indigenas ſui montis, cum abunde ea ſatietur, nihil tamen lædi, aut alui ſibi quoquo pacto ſubduci ſentire, ſed ea tanquā obſonio nutrirī. Quapropter cum meli quodammodo ſimilè facultatem habere conſlet, facile ea carere liceret, modò peregrinorum admiratione non ita duceremur: neque ſtulti, contemptis noſtratibus, è longinquis regionibus allatis vti potius, quàm iis, quæ noſtris in hortis proueniunt, malleum. ſed ſtulticia noſtræ, tenere ſumptus immoſcos facientes, condignas damus penas. hæc Fuchſius. Quibus nimirum verbis liquet eum velle uſum Mannæ proſus adimi, atque ipſum ad medicamenta deſerri, quæ noſtris in regionibus proueniunt. vitam æque commodè & tutò fieri poſſet iſta commutatio, vt ſaltem quod ipſe vehementer cupit, immoſcos ſumptibus parceremus. Sed quoniam rationes, quas aſſert, non ſunt ex, quibus id perſuaderi poſſimus, idcirco cogor in hoc eius ſententiæ refragari. Nam quòd Manna aluum ſubducit, & eam quidem innocuè, non ſolum conuenit inter auctores, qui hætenus de illa ſcripſerant, ſed id etiam quotidiana experiètia docet. ſiquidem duarum & ſemis vnciarū pondere data aluum perbellè deicit, & priuatim bilem educit. Quòd autem Libani montis indigenæ Manna non vt medicamento quod purget, ſed vt obſonio, quod nutriat, vtantur, quis tam facile vt Fuchſius, referentibus crederet, cum nos quotidie contrarium experiamur: aut ſi credat, non aliqui facti illius rationem adinueniet, quæ, ut decet, experimentum tueatur. certè nullus, ſi rectè iudico. Vt autem medicamentā peregrina aſoleſcant, quæ miſſiſſimam ſoluendi vim habent, inter quæ iandudum Manna principem ſerè locum obinet, vtcur noſtratibus, & fortaiſe lathyrī, piriſſy, tithymalis, bryonia, & aliis huiusmodi, quæ paſſim naſcuntur in hortis & campeſtribus, atque vim lethiferā ac pernicioſam ſortita ſunt, abſit, meo quidem iudicio. Malim ergo in hoc ſequi exemplū Dioſcoridis, Galeni, & aliorum tum Græcorum, tum Arabum probatiſſimorū auctorum, quàm alterius quicunque ſit. Illi enim non contenti ſimplicibus medicamentis, quæ ſuis in locis naſcebantur, peregrinis etiam vti voluerūt. quos tamen tantū abeſt, vt ſtultos dicamus, vt etiam ſipientes iudicemus. Quare non potui ſic miſeri Fuchſium ita malè de Manna ſenſiſſe, quum omnibus, eo excepto, perſpicuum eſt ſine moleſtia ventrem purgare. Equidem optarem, vt iis, qui alui medicamento uſum abrogare ſolent, vel id æquius & modeſtius agerēt, aut

*Manna ſc  
ita arborū  
cortice ma  
nanti.*

*Petri Cri  
niti error.*

*Serap. la  
p. no.*

*Manna ſc  
it, thuris Mannum cum caeleſti inepre confundat.*

*peramentum, &*

*Actuarius libro de medicamentorum compoſitione, ibique de eius viribus ac facultatibus diſſeruit.*

*Manna tam Auenicene, quam Meſuſi teſtimonio, æquali ſerè temperamento conſiſtit, licet ad calidum paululum inclinet: at Auerroï calida, humidæque habetur.*

*Aluum deuorata, aut hauſta ciet, per ſe tamen imbecilliter.*

*Ideoque tum ſæminis vtero gerentibus, tum pueris ipſis tutò ſemper exhiberi poteſt.*

*Aliis medicamentis addita vires eorum auget.*

*Bilem faciliè educitiſſim extinguit, aperit, emollit, læuigatque gulæ, peſtorisque partes.*

*Quæ ex Alexandria Aegypti adſertur Maſſichina vocata, vno duntaxat anno in ſuis viribus perſiſtit: ſed quæ in Italia prouenit, præſertimque Calabrienſi agro, pluribus annis incorrupta perdurat.*

*Enimvero Fuchſius medicum noſtra ætate & doctrina, & rerū cognito-*

*Fuchſy o-  
pino re-  
probata.*



secta, si in aceto coquatur, & decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiam fit spatha acoporum, pessorumque compositionibus idonea. Quinetiam earum crematarum fuligo ad librarij atramenti confectionem excipitur: ea circumlitionibus efficacissimè imponitur, quibus palpebras ornant, colorémque mentiuntur, calliblephara Græci vocant: arrosio oculorum angulis, callosis, glabrisque genis, & colacrymationibus opitulatur. Pityrides appellantur pinorum, piceæq; fructus, qui in conis inueniuntur: Vim astrictoriam habent, & aliquantulum excafcicentem: tussi, & pectoris vitii auxiliantur, persæ, aut ex melle sumpti. Noces pineæ cum repurgatæ manduntur, aut cum passo, aut cucumeris semine bibuntur, vrinam cient: acrimonas in renibus, & vesica hebetant: Romachirosones leniunt, datæ cum portulacæ succo, virium infirmitatem roborant, corruptorum quoque humorum labem obtundunt. Pineæ noces integræ recenter arboribus decerpæ in passo franguntur, & decoctæ, vetustæ tussi, ac tabitudiniconferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

*Pini histio  
vitiæ cinnamomi  
genera.*

NOSTRÆ nimirum negligentia adscribendum foret, cum nos assidue habeant pinorum, abietum, picearum, & laricum sylvarum, nisi harum omnium amplissimam, veramque historiam traderemus: eoque magis ad hoc teneri videor, cum animaduertim Plinium, recentiorumque nonnullos cum secutos, in huiusmodi plantarum historia, qui resinas fundunt, lögè ab eo dissentire, quod in Tridænis montibus nostris oculis perspectum, apud alios etiam testatum relinquere possumus. Rem itaque à Pini exordiente, inuenio Theophrastum libro 111. cap. x. de plantarum historia, duas Pini species adnotasse, domesticam alteram, alteram verò sylvestrem: huiusque in maritimam, & montanam distinctionem fecisse, hisce verbis. Pinorum aliam vrbanam, aliam sylvestrem assignant. Sylvestris binum statuit genus, quorum alterum Idæam, alterum maritimam vocant. Harum rectior, celsior, materique crassior Idæa folio imbecilliori, tenuiorique maritima: & cortice læuiori, viliusque ac coria, quod alteri minus. Nux maritimæ rotunda, breuiusque dehiscens: Idææ oblongior, virdis, minusque

hiscens, tanquam sylvestrior. hæc tamen Theophrastus. Verum non desunt, qui contendunt Theophrastum hæc de picea scripsisse, Petri Rel non autem de pinu: eam nimirum ratione freti, quod *πίναξ*, de qua hic dicitur Theophrastus, Græcis piceam, non pinum significet. Quam obrem Petrus Bellonius Cenomannus communem Græcorum sententiam secutus libro, quem arboribus coniferis dicauit, id totum piceæ arbori reddidit: contra Theodori interpretationem, quod Theophrast. *επι πίναξ* Græcè scriptum reliquit. Sed equidem hac in re Bellonius (pace viri boni dixerim) hallucinatum arbitror, non quod propterea cum Græci sermonis imperitum iudicem, sed quod mihi videatur non diu versatus in Theophrasti & Galeni lectione, aut de plantis his scripsisse, quorum non certam habuit cognitionem. nam plura sunt, quæ eius opinioni refragantur. In primis mihi quidem non dubium est, quin veteres Græci *πίναξ* pro pinu, & *πίναξ* pro picea vsurpauerint. Neque certè verisimile est, Theodorum Theophrasti interpretè natione Græci, & linguæ tum Græcæ, tum Latine peritissimum, ignorasse quid per illa tam vscata & trita vocabula intelligerent Græci scriptores. Deinde Theophrastus ipse *επι πίναξ* nucem *επι πίναξ* vocat, ex quo palam fit, eum nomine *πίναξ* de pinu, non autem de picea scripsisse. Quandoquidem *επι πίναξ* non aliud designat, quam nucem piceam, vt aperte declarat Galenus libro 11 de alimentorum facultatibus his verbis. Nux pineæ boni ac crassi est succi, multumque nutrit, non tamen facillè coquitur. Appellatur autem nunc Græci ipsam non *πίναξ*, sed *επι πίναξ*. Idem libro de cibis boni & mali succi, ita scribit. His ipsis plus crassi, non autem mali, succi habet nucleus pineus, qui *πίναξ* vocatur. ipsum verò etiam *επι πίναξ* veteres appellant. Item libro VII. de simplicium medicam. facultatibus, sic inquit. Coni fructus, quem quidem & cœcalon nominant, & strobilum &c. Adhæc commentario quarto de viciis ratione in morbis acutis apud eundem hæc scripta leguntur. Nempe *πίναξ* ab Hippocrate dictus, non ita, sed *πίναξ* magis ab antiquis Græcis appellatur, veluti à recentioribus medicis propemodum omnibus *επι πίναξ*. Galeno denique adimplatur Symeon Scythi, vt pote qui nucleos pineos *επι πίναξ* etiam nominet. Ex quibus vtique constare puto contra Bellonii opinionem, Theophrastum sub *πίναξ* vocabulo pinum descripsisse, non piceam. Nam si Theophrasto piceæ strobilum profert, quem Galenus inter cibos connumerat, non video, quo modo is piceæ fructus esse possit, cuius nuclei non sunt edendo, Bellonii etiam testimonio. Quod insuper hoc loco per *πίναξ* pinum intelligat Theophrastus, illud maximo esse potest argumētum, quod nusquam picea visa fit vrbana, nisi fortè & sylvestrum semine ad spectaculum in hortis facta. Cuius tamen contrarium deprehenditur in


PINVS SYLVESTRIS.



PINVS MARITIMA.



PINVS MARITIMA ALTERA.



PINVS SYLV. MVGO



PINVS SYLV. FEMBR. pinu, quæ domestica atque urbana frequentissima conspicitur. Hinc porro factum est, ut Bellonius sua ductus opinione, ex hoc in alium quoque errorem incidit. Quippe illud falsum est, quod ex teda piceæ fiat pix, ut Bellonius asserit, perperam, meo iudicio, Theophrastus hoc loco interpretatus. Siquidem rara ad modum est picea, quæ tedam habeat: atque pix omnis, cu-



ius est usus, ex pinea tantum teda conficitur in Italia, quemadmodum & in Bohemia, ubi ingentissimæ ac frequentissimæ sunt pinorum sylvæ. Cæterum his, quæ de sylvestrium pinorum generibus scribit Theophrastus, in nostro climate refragatur, quæ sensibus clarissimè patet experientia. siquidem agrestes, quæ plurimæ in maritimis nostris Senensibus proveniunt, fructum ferunt spithama oblongum, pyramidalem, firmum, ac solidum, nec per se facile dehiscientem. Quæ verò numerosæ virent in Ananitis, reliquique Tridentinis montibus, fructu constant parvo, breui, qui quum primum aruerit, assatim dehiscit, & ex ea ore decidit. Sed id evenire existimamus, climas, & regionum varietate, vel etiam quod maritimæ plura sint genera. quandoquidem in maritimis Misarum oris sylvestres proveniunt pinus, qui breves nuces edunt, cupressi modo, non tamen rotundas, sed acuminatas, ut pictum, a-

*Pinorum  
Sylvestrium  
species.*

quam

quam hinc exhibemus, ostendit. Quæntiam in eodem Tridentino agro iidem Ananias, & valles Flemarum montibus alia dux sylvestrium visuntur species à prædictis longè figura diffidentes: quarum vnam vulgo Mughì incolæ vocant, quæ sine flitipe medio, ramos circumquaque à radice fundentes, humi repunt spatio cubitorum decem, quindecimque: quales etiam apud Ananios Rouena monte, & in aliis plerisque harum vallium locis apertè conspicì possunt. Profrutur hæc fructus paulò minores cæteris sylvestribus, sed qui magis refinam fundant. Harum ramis vtuntur incolæ ad vasa vinaria cingenda: sunt enim tenaces admodum, & flexiles. Alterius vero speciei sunt, quas Cembri, & Cirinoli vulgò vocant, quarum numerosissimas plantas ipse sæpe ac sæpius vidi, tum in Gauiæ Phœbeæ vallibus, tum in Flémensibus, Vulturenæ, & Rhetinorum moribus. Hæc quidem speciosa proueniunt proceritate, ita vt ad tabulas parandas materiem non modò pulcherrimam præbent, sed etiam suauiter odoratam: attamen non tanta affurgunt altitudine, quanta cæteræ sylvestres. Ramos è caudice promunt, cæcè & picea, qui pini frondibus virent. Caudicis cortex non vt pino lubruber, sed abietis modò subalber. Fructus tam longitudine, quam crassitudine piceo æquè similis est, breuior tamen, resinofus, colore in nigrum purpurascens: inter cuius nucleamenta nuces recluduntur domesticis similes, minores tamen, triangulares, breues, fractu faciles, vt quæ dentibus facillè cedant: sapore quadamtenus domesticas referunt, nisi quòd gustui quadam penè insensibilem reliquant asperitatem: quòd omnium sylvestrium proprium est. Ex quo facillè adducitur, vt tredam hoc nucum pinearum genus illud esse, quod Plinius lib. x. v. cap. x. Tarentinum vocat, digitis fragili puramine, auiumque expositum furto in arbore. Etenim illæ ita fragiles sunt, vt non difficulter ab auiibus rostro fragrantur. Ab iidem pini refina tum alba, tum odorata, veluti ab aliis fusi generis manat. Tabulæ ex his paratæ ad extruenda ædificia Germanis plurimi sunt, non modò quòd pulchra venarum ferie placeant, sed quòd etiam odoris fragrantia præstent: id enim ad eorum hypocausta paranda, quibus maximè ob frigidissimam regionis temperiem & indigèt, & vtuntur, plurimum affert ornamenti. Bellonius, cuius paulò ante meminimus, libro de arboribus resiniferis hoc pini genus (quæcum ex eius verbis colligere potui) pinastrum esse censet. Sed non rectè, mea quidem sententia. nunc quæ pinaster, Plinio libro x. v. i. cap. x. auctore, nihil aliud est, quàm pinus sylvestris, mira altitudine: gigniturque non modò in montibus, sed etiam in planis, Bellonio verò contrà, pinaster pino humilior est: & plana, & montium supercilia prosus respuit, nec alibi prouenit, præterquam in excessivissimis montium iugis. Huc profectò vt quis additularè

tur , fortasse ex eo adduci posset , quòd peregrinationis , quam ille in Asiâ , Græciam , Syriam , Aegyptum , aliasq; regiones se fecisse fatetur , plura tribuere vellet , quam probatissimorum authorum scriptis , quibus sæpe Bellonius perperam refragatur , ita vt suam puter auctoritatem illis præferendam esse . Sed ego miror , quòd mihi relatum sit vitum hunc esse vulgaris pericla , neq; tot loca peragrassè , quot eius scripta perhibent . Quòd autem ad rem nostram attinet , Bellonius vbi pinastrî historiam exorditur , hanc pinastrî vocem ex versione Latina frequenter legisse ait apud Theophrastum , sed non propterea Theophrastum eam agnouisse plantam , quòd non nascatur in Græciâ , aut Asiâ montibus : arque ideo nullum esse ex Græcis authoribus , qui de pinastro , aut pinu sylvestri meminerit . Sed quanta sit huius boni viri arrogantia , & in Græcorum authorum lectione negligentia , antea explicauimus , vbi ex Theophrasto scripsimus duo esse pini genera , vnum vrbicum , alterum sylvestre . Veruntamen si hic mordicus suam tenuerit opinionem , quòd scilicet Theophrasto *nûvov* piceâ significet , non pinum , & quòd ex consequenti idem hic de piceâ sylvestri sit locutus , demus illi ita esse , quid respondebit ad illa Theophrasti loca , in quibus *nûvov* *ἀγρία* . legitur ? hercule nihil , quantum reor . Subiciamus ergo quæ Theophrastus lib. 11 t. cap. 11 t. de plantarum historia in censu arborum quæ in montibus nascuntur , contra Bellonii sententiam posteritati memorie prodidit , iis verbis Ἡμετέριαι τὰ περὶ τοῦ πινύου , ἀπὸ τῆς αἰτίας καὶ φύσεως αὐτῆς Μακεδονίας , ἐκείνη νύκτωρ *nûvov* *ἀγρία* . hoc est . Montibus autem propria sunt illa , quæ in planis non proveniunt . Macedoniæ , abies , picea , pinastra . Addamus præterea quæ eodem capite , vbi plantarum meminit , quæ perpetuo virent , idem sic habet . ἀειφύωνται μὲν οὖν τὸν χειμῶνα καὶ κατὰ ἀπρίτιον ἐκείνη , νύκτωρ *nûvov* *ἀγρία* . id est . Ergo inter sylvestria perpetuo virent , quæ primo volumine retulimus , abies , picea , pinastra . Ex his itaque manifestum fieri arbitror , Bellonium multa in Theophrasto falsitanter legisse , plura etiam temere & falsò scriptis tradidisse : vt hinc ipsum inanisi gloriæ , vel alienius dignitatis cupidum potius , quam veritatis studiosum fuisse faciliè iudicem . Ceterum non potui non admirari dixisse Plinium , scandalus è Pino ad contendas domos , ex omnibus , quæ resina fundunt , arboribus aptissima esse , cum laricem non ignoraret materiel præstantia , duritie , & firmitate , nulli æquiparandam esse . Præterea scribit Theophrastus ( nos id quotidie videmus ) quòd pini ineritus est , vt teda fiat . Cuius verba sunt hæc loco supra citato . Morbum pini accidere talem Idæi incolæ narrant , cùm non solum cor , sed etiam pars externa caudicis in teda transierit , tunc strangulari quoddammodo . quod sponte accidit vberitate arbo-

Plinii lapsus.  
  
Teda offideratur.

*Bellonij  
als copioso  
explosa.*

- Plinij la-  
- pſae.

Toda cōsi-  
deração.

ris largissima, quoad quis coniectare possit: teda enim totum efficitur. Ergo hæc pini propria affectio est. Quare autem pinus teda fiat, scribit idem Theophrastus libro v. i. cap. x. v. de causis plantarum, sic inquit. Pinus enim radicem agit teda totam referant, vt ante dictum est. Ratio eadem, quæ in animalibus est, quod pars alimentis, quæ feruerit, excoctaq; sit, quoniam purgatifima est, assidet: & collecta, densataq; pinguedinem reddit. Reliquum verò sursum transmissum, partes, quæ supra terram eminent, nutrit: non per illam pinguedinem subiens, sed per alios quosdam meatus. Nam quæ in teda omni ex parte mutata sine, obestante moriuntur, vt dictum est: cum enim nullum transitum habeant, spiritus strangulantur, sicut animalibus accidit, quæ vitæ modum pingerint. hæc ille. Cæterum quod teda opus sit ad picem conficiendam, non desuit fidem ratio, quæ etiam arte fieri possit, ita vt pinus non sua vitæ sponte, sed arte teda fiat. Id enim idem docuit Theophrastus libro i. x. cap. 11. de historia plantarum, his verbis. Idæi vbi arboris caudicē cortice dissipauint, quod parte solari, binis, aut ternis à terra cubitis facere consueuerunt, confluxum istuc fieri non sine teda vno cum purissimum anno affirmant. Idq; cum securi detraxerint, secundo iterum anno teda locum expleri: & tertio pari modo. Posthac ob eam pluriam incisionem arborem extenuant, purifissimamque humi facile à flatu proferri, tum eius cor: extrahi (hoc enim teda maxime præfert) necnon & radicem effodi. hæc etiam ille. Quibus palam est contabescere pino, tam sponte, quam arte fieri ceterique teda. Quamobrem putauerim hac in re non parum cæcuisse Plinium: quippe qui libr. x. v. i. cap. x. vbi resiniferas enumerat arbores, teda propriam, & per se esse arborem censet, cum inquit. Sextum genus est teda propriè dicta, abundantior succo, quam reliqua: pareior, liquidiorque, quam picea: flammis, ac luminis sacro um etiam grata. Et libro eodem cap. x. v. 11. Nunc, ait, celeberrimis arborum dictis quædam in vniuersum de cunctis indicanda sunt. Montes amant cedrus, larix, teda, & cætera, è quibus resina gignitur. hæc Plinius. Verum si quis Plinii defensor diceret, per teda ipsum hoc in loco non aliud intelligere, quam pinum, itaque cum tueri vellet, hanc tutelam illud (vt puto) vanam esse ostendit, quod eum eo capite Plinius resiniferas arbores omnes per genera describat, & primum omnium genus pinum faciat, nullo pacto pinum pro teda accepisse videtur, cum sexto resinarum generi teda postea adscripterit. Hinc fortasse & Marcelli error defluxit, qui in hoc Dioscoridis capite, pinum teda interpretatur. In hoc etiam versatur error Adamus Lonicerus Ruellium secutus in suo de plantarum historia vo-

lumine, vbi scitam potius, quam veram arborem pro teda pinxisse videtur. Sed animaduertendum est, non è pinu tantum fieri teda, sed ex aliis etiam plantis resinam fundentibus, nempe larice, & picea: à quibus nos in Ananienfibus syluis pinguisissimum excisimus. Quapropter dicebat Theophrastus lib. 1. 1. 1. 1. cap. v. 1. de historia plantarum, quod in Ponto ex syluestribus desunt pinaster, abies, atque picea, & omnino quæ teda in sese gerunt. Quibus clarè patet, alias præter pinum arbores esse, quæ in teda contabescunt. Sed quod id morbi magis pino eueniat, quam cæteris, propria pini affectio esse creditur. Quo sit, vt & in hoc Plinium errasse crediderim, qui non pini, sed laricis morbum esse ait, vt teda fiat: ac eadem omnes attribuit tum vires, tum notas, tum qualitates, quas Theophrastus pino reddidit. Quare cum Ruellius eum sibi familiarissimum ab huiusmodi lapsu vindicare vellet, non mirum, inquit, quod in hoc Plinius acquisitione sit vsus, quando & perpetua fronde perinde ac pinus, sit larix, & situs idem in montibus, eademque facies, minimè animaduertens, quam magno ipse quoque fuerit errore implicatus: quemadmodum & recentiorum alii. Quandoquidem pro certo attestari possum, laricem me vidisse nunquam (est centenas laricum syluas videri) cui per hyemem folia non deciderent, & quæ tantam contraheret cum pino cognationem, quantum Ruellius tradidit. Itaque vt vera eius quoque promulgetur historia, hic ea de larice differemus, quæ & vidimus, & experientia comprobauimus. Laricem ita

## L A R I X.

comprobauimus. Laricem ita L A R I X igitur florit.



do: foliis circum ramulos prodeuntibus, densis, oblongis, mollibus, comosis, pinctis angustioribus, minimè aculeatis, quæ aduentante hyeme pallida effecta ad candidas radices decidunt, ibiq; marcescunt: ita vt sola larix inter cæteras resinæ fundentes arbores, spreta omni algoris immanitate, nuda per hyemem vitam

Plinij & Ruellij error.

Plinij error, et quod vult.

transfigat. Nouella cupressum prorsum æmulatur, non autem piceam, vt Ruellio placet. Eius coni ( quanquam credidit Plinius laricem fuisse, necque ingratum essant odorem. Veruntamen flores longè odoratiores sunt, qui vere emergentes è ramusculorum cacaminibus arborem vniuersam mirum in modum condecorant. quippe cum in purpura ardentem rubescant, comantibusq; foliis, miro quodam naturæ artificio annectantur, non parum victorum oculos remorantur. Ligni materies durissima, præsertimq; rubescens, & in caudicis medullis sita: eaq; propter in ædificiis omnibus extruendis, caudicis longè præcellit. Vanū prospectū est credere (vt Plinius, Virtruius, & recentiorum plerique perhibent) quod nec flagret Larix, nec in carbonem verratur, sed veluti calcarium saxum in fornace exuratur. Quandoquidem haud recte cum fornacibus ageretur, in quibus sit ferum in Tridentinis montibus, & in ea præsertim valle Ananitis continetur, quam Solis nuncupant, ac alijs multis Camonica, & Eliotropiz vallis fornacibus, in Brixiensi agro, si larigno carbone carerent, cuius laui maxima copia flagrat. Nanque (vt referunt in hac arte periti) nullo alio carbone in fornacem indito, rude ferri metallum tam celeriter colliquefit, quam lariceo. quā & lignum eius sicum, cum abunde sit resinofum, impetu flagrat perquam vehementi. Quamobrem in Tridentinis montibus laricinis tantum lignis furnos incendunt, tam eos, quibus panis coquitur, quam quibus hypocaula calcantur. Cæterum selectissimum Agaricum in larice provenit. nanque

Pliny. &  
Virtruius  
error.

Agaricū ipse quidem sæpius in Ananienfibus montibus laricis in præstantissimum agaricum parua quadam securi à laricibus compluribus deiecti, emiq; sæpius ab his, qui resinas colligunt. Nascentur etiam agaricum (vt prodit Plinius) in Gallia, non in larice dentatæ, sed in alijs arboribus, præsertim glandiferis. Dioscorides, sicuti & Galeus, non satis compertum habet, an Agaricum fungus sit, aut radix, licet asserat in cedro gigni. Brasavolus agaricum Comachii in ilicibus inuenisse fatetur, necnon per Galliam equitans, id vidisse ait quercum caudicibus inhærere. Enimvero ipse in tota Hæturia, in aliisque quam plurimis Italæ locis, denique in multis Germaniæ, Carniolæ, Dalmatiæq; prouincijs, vbi sylue quercubus, cerris, ilicibus, suberibulque resectæ conspiciuntur, non solum nunquam vidi, sed ne quidem audiui in his agaricum provenire: tamen illis inhærere viderim fungos alios plurimos lignea materie concretos, duos, ac nigros: quibus vbiq; passim formites sunt ad suscipiendum ignem, cum è silice calyce excutitur: quinetiam iis ignitis ad machinulas exonerandas venatores frequentissime vtuntur. Ad hæc quauis in Tridentinis montibus, præsertimq; Ananienfibus præ-

ter abietes, pinos, larices, & piceas, innumera- biles adsint quercus, in nulla tamen agaricum, præterquam in larice, nascitur. Porro ex larice etiamnū præstantissima illa resina manat, quæ falso officinis terebinthina vocatur, cū terebinthina ex terebintho proveniat. Verū cū mercatores præterito iam suo terebinthinā ad nos nimè afferret, ob idq; larigna eius loco vteretur tū medicis, tum myropolæ, facile factū est, vt larigna ex vtu sibi terebinthinæ nomen vendicauerit. Et quod larigna terebinthinæ nomen & locum anea passim occupauerit, vt etiam hodie in officinis eiusdem, si desit, vicem suppleat, omnibus notissimum arbitror. Atramen Fuchsius vir aliqui doctissimus, in libro, quem secundo edidit de compositione medicamentorum, scribit pharmacopœos legitima terebinthinæ vice abietinam supponere. Qua in re aperte fallitur, quod omnes (vt dixi) pro terebinthina larignam vsurpent. Atqui Galeni tempore liquida picea terebinthinæ loco vendebatur, vt ipse libro tertio de comp. medic. per genera memoria prodidit, sic inquit. Ex harum genere est & larigna vocata, prædictis planè humidior: substantia verò similis liquida picea, quam loco terebinthinæ infusiores vendunt: ignorantibus eas discernere. est autem talis resina odore gustu, & facultate, quam terebinthina acrior. Cum hac igitur, & terebinthina, larigna vocata persimilem potentiam obtinet, sed tenuiori substantia, maioreq; discentiendi virtute prædita est. Hanc Tridentini, ac etiam qui iis concernunt sunt, vernaculo sermone Larga appellant, deflexa à larice, à qua emanat, appellatione. Hæc tamen sponte sua non defluit: sed qui ipsam colligunt,

ABIES.



magno, & longo, terebro laricis caudicem ad medullam vsq; per afflatum perforant, & inde manantem resina vasculis qui bulbū è piceo corio resectis excipiunt. Splendidiorum autem iuuentula arbores, sicuti de thure diximus: turbidiore verò annofo. Reperitur præterea pannum in annosis laricum in larice caudicibus propè medullam ipsam

pannum quoddam albicans quandoque, cubiti amplius: ne, corio, ex quo chirothece conspiciuntur, adeo persimile, vt vix alterum ab altero discerni possit. Vtuntur hoc incolæ ad vulnèra glutinanda, & ad sanguinis fluores compescendos. Cæterum admodum inter se similes

les



*Picea, &  
Abietis his  
stor.*

les ex his, quæ resinam fundunt, arbores sunt  
PICEA, & ABIES, ita ut sepe etiam ligna-  
rios fabros fallant. Siquidem eadem utriusque  
proceritas: ambæ iisdem sunt foliis oblongis,  
duris, ac densis: utriusque ramusculi produ-  
nuntur crucis in morem, à duorum duntaxat ra-  
morum lateribus exeuntes, quod & foliis eue-  
nit. Veruntamen hoc tantum discrimen inter  
se habent, quòd piceæ folia colore sint abiegnis  
longè nigriora, quin & paululum latiora, mol-  
liora, laxiora, minùsque pungentia. Præterea  
piceæ cortex nigrescit, tenax est, lentus, & lori  
modo flexilis: abieti verò albicat, et si flectatur,  
facile perfringitur. Piceæ rami perunque ad  
terram flectuntur: quod in abiegnis non vis-  
tur. Ligni denique materies piceæ multò spe-  
ciosior, ac etiam utilior: habet enim venas re-  
ctiores, minùsque nodosas. In picearum gene-  
re sola fœmina fructus adfert, sed in Ananien-  
sibus, cæterisque Tridentinis montibus abies  
omnis infructifera est, et si Plinius abietem fru-  
ctiferam fecerit. Picea fert resinam inter corti-  
cem, & lignum gummi modo concretam, licet  
nonnunquam ex ea destillat liquida, larigna si-  
milis. Abies verò inter corticem & corticem  
præstantissimum liquorem illum concludit,  
quem vulgò LAGRIMO, quasi abietis lacry-  
mam, appellante quo veteres nihil (quod  
equidem sciam) posteritatis memorie prodie-  
re. Nisi quispiam dixerit, per abietis lacry-  
mam intellexisse Galenum libro 111. de com-  
positione medicamentorum per genera paulò  
antè citato, piceam illam liquidam resinam,  
quam pro terebinthina institores vendebant.  
Cuius rei illud indicium esse videtur, quòd  
scribat ipse, hanc & gustu, & odore terebinthi-  
næ esse persimilem, quod in abiegna lacryma  
maximè notatur: & quod insuper sit quadante-  
nus terebinthina acrior, namque huiusmodi qua-  
litates in liquida piceæ resina minimè reperiri  
tur. Quo fit, ut suspicandum putarem, in his  
Galenì verbis librariorum fortasse culpa men-  
dum aliquod subesse, licet constet antiquos scri-  
ptores in arborum resinas ferentium historia in  
quam plurimè inter se differre, & alteram sepe  
pro altera (ut supra diximus) substituere.  
Auxit mihi suspitionem hanc Galenus: quippe  
qui scripserit deinde eodem libro in Euphor-  
bii medicamento, inter resinas cæteris odora-  
tiores haberi terebinthinam, & abiegnam, hanc  
que illa calidior em esse. Falluntur autem, qui  
putant abiegnum lacrymam, clarissimam esse  
larignam: quandoquidem illa inter abietis corti-  
ces vomice modo coaceratur, & secto corio  
(ut in abscessibus sine vexacis fieri solet) eli-  
citur: hæc verò manat è laticis caudice ad me-  
dullam usque perforato, ut ego experientia do-  
ctus facile attestari possum. Nam, ut rem omnè  
hac in historia exactius exploratam haberem,  
& à larice larignam, & ab abiete abiegnam per-  
movere elicerè libuit. Sunt qui hanc illam ad-  
misteant, ut hac impostura magis lucrentur, eo

*Abietis la-  
cryma.*

*Error quo  
rundam.*

quòd omnes abiegnà pluri faciunt, quàm la-  
rignam. Nec desunt qui percolatà larignam, & ad  
vltimam claritatè redactam pro abiegna vendi-  
tè, cum rarissimè reperiatùr myrpolia, qui re-  
ctius alteram ab altera dignoscant. Sed fraus  
cognosci potest, quòd abietis lacryma substan-  
tia minus consistat, odore præstantissimo fra-  
get, & gustui larigna sit amarior, ad annumq;  
asseruata quadàntenus flavescat. Ea vulneribus  
recentibus maximum affert præfidium, quòd  
non solum glutinum, sed & mundet, & sarcoti-  
ca habeatur. Pota renum calculos elicit, arthri-  
ticos dolores mulcet, coxendicūque crucia-  
tus lenit. Capitis vulnera misericè sanat, ad eò  
ut hac sola nonnulli vaneant. Additur & in an-  
tidotis balsami vice. Affirmat Ruellius abieti  
croceum florem innasci: verum in Tridentinis  
montibus, ubi vndique ea montes syluestunt,  
Abies omnis est & floribus, & fructibus infec-  
cunda. Sed ut ad piceam nostram redeat oratio,  
non facis compertum habeo, quam arborem  
pro Picea intelligat Petrus Bellonius: quan-  
quam ex imagine, quam exhibuit, atque etiam  
ex notis, quas suæ piceæ assignavit, aliquid pi-  
nastri genus intelligere videtur. Cæterum ar-  
bor, quam idem sua tantum auctoritate, ne di-  
cam temeritate, ductus perperam Sapinum vo-  
cat, ac abieti similem facit, non est (quantum  
ego conicere potui) nisi legitima picea. Quippe  
hæc abieti ad eò similis est, ut sepe sylvanos  
homines, & lignarios fabros fallat, ut supra di-  
ctum est. Idcirco Plinius libro x v i. cap. x x  
1111. eadem folia reddidit piceæ & abietis, sic  
inquiens. Insecta pectinum modo (intellige, folia  
sunt) piceæ, abietis. Iis etiam idem Taxum  
similem fecit eodem libro cap. x. quemadmo-  
dum & Dioscorides libro 1111. Taxum au-  
tem (ut observauimus) maximè foliis emula-  
tur picea, quam magno & pudendo errore Bel-  
lonius Sapinum appellat. nam Sapinus, teste  
Plinio, pars tantum est in abiete, ut eius verba  
declarat libro x v i. cap. x x x i x. ubi ita  
scribit. Abietis quæ pars a terra fuit, enodis est.  
Hæc, quæ diximus, ratione fluuiata decorticat-  
ur, atque ita Sapinus vocatur, superior pars  
nodosa duriorque substerna. Quibus utiq; Plin-  
ii verbis palam est Sapinum non esse per se  
arborum, sed tantum abietis partem, sicuti etià  
Virginius testatur. Verum Bellonius, quòd au-  
dierit tam piceam, quàm abietem indifferen-  
ter du Sapin fuisse Galis nominari, hanc forè  
vulgarem & confusam nomenclationem secutus,  
ut eam veram putavit, ita etiam Piceam  
Sapinum appellavit. Sed is mihi quidem non  
videtur in Plinio rectè considerasse resinifera-  
rum plantarum historiam, neque in Theophras-  
to cognovisse quòd *πύκνιον* & *πύκνιον* significare,  
neque etiam animaduertisse, quòd hæc duæ vo-  
ces sepe à Græcis una pro altera usurpantur.  
Sed hic suspus, quam deceat, aliquot Bellonii  
errata persequi sumus. alius enim locus erit, ni-  
si quid mihi humanicus accidat, ubi alia plura  
in hoc

*Abiegna  
lacryma  
Grecis.*

*Belloni  
opinio fal-  
sa.*

Nemina.



in hoc genere cō  
sultō tractabimus.  
Arbor, quæ ple-  
risq; Grecis *αίρος*,  
Latinis *Pinus* ap-  
pellatur: Arabi-  
bus, Sonobar: Ita-  
lis, Pino: Germa-  
nis, Hartzbaum,  
& Kynholtz: Hi-  
spanis, Pino: Gal-  
lis, Pin. Quæ au-  
tem Græcè *αίρος*,  
Latine *Picea* no-  
minatur: Arabicè,  
Arz: Italicè, Pez-  
zo: Germanicè,  
Ror dannenbau.  
Hispanicè. Pino

negro: Gallicè, Vng abrè du genre du pin. Quæ  
deinde Græco nomine *αίρος*, Latino item La-  
rix, Italico Larice, & Germanico Lerchen-  
baum vocatur. Quæ deniq; Grecis *αίρος*, La-  
tinis *Abies* dicitur: Italis, Abete: Germanis, Thä-  
nen, siue Thannenbaum.

## LENTISCVS. CAP. IXXV.

LENTISCVS nota arbor est.  
Cui toti vis inest astringendi: semini  
enim, folio, ramo, cortici, radicibusque  
cognatæ insunt vires. Liquamentum  
autem ita fieri solet. Folia, cortex, &  
radix in aqua coquuntur, & ubi abun-  
de cocta, refrigeratq; sunt, folia abii-  
ciuntur: aqua denno coquitur, donec  
mellis habeat crassitudinem. Léntiscus  
sua astringēdi dote, valet aduersus san-  
guinis reiectiones, alui profluuiā, & dy-  
senterias in potu: item contra erupcio-  
nem sanguinis è vulua, & eiusdem, aut  
sedis procidentia. In totum acaciæ, &  
hypocistidis vicem representat. Idem  
facit succus è tritis foliis. Decoctū totu  
caua explet, & fracta ossa ferruminat,  
vulvæ fluxiones sistit, nomas arcer, vri-  
nam pellit, morus dentiū collutione  
stabilis. Virentes sarculi calamulorum  
vice dentibus repurgandis affricantur.  
Fit è semine olerum astringentiorum vim  
habens: quod prodest, cū quid astrin-  
gi opus est. Lentiscus resinam gignit,  
quæ lentiscina cognominatur, & ab  
aliqubus mastiche. Pota utilis est san-

guinem reijcientibus, & tussi veteri: isto  
macho auxiliatur, sed ructum mouet.  
additur in dentificia, & illitiones faci-  
ei, ad nitorem cuti conciliandum: pal-  
pebras oculis incommodas replicat:  
manducata halitum oris commendat,  
gingiuas contrahit. Optima, & copio-  
sissima in insula Chio provenit. Præfer-  
tur, nitedulæ modo, resplendescens, &  
candore Tyrrhenicæ ceræ similis, adul-  
ta, retorrída, friabilis, odorata, strido-  
rem edens. Viridis autem inferior est.  
Adulteratur thuris, resinæq; pinæ nu-  
cis mistura.

Léntiscō-  
sideratio.

LENTISCVS in Italia frequentissima na-  
scitur, præsertimq; in Hetruria maritimis no-  
stris Senensibus. Gignitur in collapsis Roma-  
norum ædificiis, ac ruderibus. Quinetiam in  
tractu Tyrrheni ubique copiosa oritur, in Cæ-  
pania maxime. Cæterum Léntiscæ nonnullæ  
sunt plantæ, quæ in arborem mediæ proceri-  
tatis assurgunt: nonnullæ verò humiles, quæ  
nullo grandiore caudice à radicibus sublato,  
sed virgulis, stolonibusq; innumeris corylorū  
syluestrium modo dissiliunt. veruntamen Len-  
tiscus tum ramis, tum foliis densior constat,  
magisq; virgultorum cacuminibus ad terrā de-  
flectitur. Foliis utraq; est pistacii graueolenti-  
bus, pinguis, friabilibus, & in obscuro vi-  
rentibus, in ambitu tamen rubent, sicuti &  
quibusdam venulis. Perpetua fronde viret.  
Cortice est subrufo, lento, tenaci, flexibilique.  
Profert terebinthi modo, præter racemosos  
fructus, folliculos corniculi modo intortos, in  
quibus includitur liquor limpidus: qui tandē  
veterascens vertitur in bestiosus iis persimiles,  
quæ ex ulmi, & terebinthi folliculis euolant.  
Tota planta grauiter olet: quapropter non-  
nulli, quod offuscet caput aggrauet, ipsam de-  
vitant. Sed Léntiscum, quæ roboris magni-  
tudine proveniat, folio sorbi, ac nō syluestris pun-  
ticæ rubentibus, vt Ruellius scribit, hæcenus  
non vidi, nec id vniquē me legisse memini apud  
probatos auctores. Ideirco Ruellium hæc in re  
hallucinatum crediderim, quemadmodum &  
Hermolai, qui ea esse léntiscæ folia existimat,  
quibus coriarii Venetiæ pelles cōficiunt, vul-  
gō propriè appellata foglia. Siquidem plantæ,  
à qua hæc folia decerpuntur, maxime à lén-  
tiscō differt, est cum terebintho aliquam ha-  
beat similitudinem. Fert etiam Léntiscum Ita-  
lica mastichen, vt ipse attestari possum: quan-  
quam non ea copia, quā in Chio, & Creta  
Aegæi insulis. Itaque immerito à nonnullis  
notatur Auicenna, quod mastichen Italicam  
memorix prodiderit. Quippe quod ii, qui ma-

Ruell. C.  
Hermolai  
lappæ.Mastichen  
considera-  
tio.

iore in errore versantur, existimauerint non alibi forasse, quam in Chio nasci. Indicā mastichen ē spinosa quadam planta manare, non solum Theophrastus, sed etiam alii tradidere, quemadmodum & Plinius, qui lib. x. l. i. cap. x. v. i. i. non modo Chiz mastiches meminit,

*Lentisci*

*Vires ex*

*Galen.*

sed aliarum quoque, quæ in Arabia, Asia, Græcia, Pontoque proueniunt. Lentiscis meminit Galenus libro v. l. i. de simp. medicam. facultatibus, sic inquit. Lentiscus facultate ex aqua essentia leuiter calida, & terrena frigida non pauca compositus est, ob quam & moderate adstringit. Desiccatur igitur secundo ordine completo, aut tertio incipientes in caliditatis, & frigiditatis differentia quodammodo est medius, & symmetrus. Similem omnibus sui partibus adstrictionem obtinet in radicibus, ramis, extremis turionibus, germinibus, ac foliis, præterea fructu, & cortice: ac si succum ex foliis eius viridibus exprimas, similis hic ordinis est, moderate adstringens. Itaque bibitur & per se, & cum aliis medicamentis, quæ dysenterias, & alui affectus sanant, quin & ad sanguinis expulsionem, sanguinisque ex

*Mastiches*

*Vires ex*

*Galen.*

utero eruptiones, tum sedis, vuluæque proci-  
dientias idoneus est, utpote ad hypocistida non  
nihil propè accedens. Meminit idem & masti-  
ches libro v. l. i. simpl. medic. his verbis. Mastiche candida quidem, & Chia consueto  
more cognominata. quodammodo ex contrariis  
composita facultatibus est, adstringente videlicet,  
& emolliente. Proinde stomachi, ventris,  
intestinelorum, iecorisque inflammationibus  
competit, utputa secundo ordine exalfaciens,  
& desiccans. Nigra verò, quæ Aegyptia cognominatur,  
tum magis delicata, tum minus adstrictoriae  
facultatis est percipiens: quamobrem aptior est ad ea,  
quæ validiorem digestionem per halitum exposcunt.  
hac igitur ratione & turunculis bonum est remediū.  
Porro oleum, vnguentumque mastichinum ex Chia  
conficitur, non admodum sanè ex Aegyptia.  
cæterum similis est & ipsū mastichæ facultatis.  
Hæc de lentisco, & mastiche Galenus posteritatis  
memoriae prodidit. Sed cum mastiche mihi  
Caphuram in meioriam redegerit, quod certò sciam,  
eam mastiche, ardentis aqua, zedoariaque ab impostoribus adulterari, cumque  
Dioscorides, Galenus, & cæteri illius seculi scriptores  
ipsam non solum non adnotauerint, sed ne nouerint quidem,  
silentiò minime dissimulandum fore putauimus, quò magis  
legentibus satisfiat, quantum tum à Serapione,  
tum etiam ab his, qui meridionalem plagam, & Indiarum  
ora hoc uo nauigationibus perlustrarunt, memorie proditum est. CAP. H. V. R. A. igitur est gummi arboris cuiusdam  
in India nascentis tanta magnitudine, ac proceritate,  
ut sub eius umbra hominum centuriæ recondi possint.  
Nascitur hæc arbor in montibus mari propinquis,  
materie leui, feru-

lacea, qua prodit Caphura. Huius largioris  
prouentus augurium est, cum frequentibus  
cælum fulgetris corruscet, aut crebro tonitru  
conspicitur, vel cum terra motu concutitur.  
Huius multa traduntur genera. Vna in interueni-  
entis ligni, lamellarum modo impacta figitur.  
Alia foras emergit cortice abrupto, veluti  
resina, illisq; gummi modo inhæret, maculis  
inter initia rubentibus, postmodum vel calore  
solis extosta, vel ignium vi candescit. hanc  
sumpto à rege quodam Riach illius loci nomine,  
indigenæ Riachinam appellant: quandoquidem  
is primus dealbandæ Caphuræ rationem adinuenit.  
Hæc cæteris & bonitate, & tenuitate præstat,  
longiorique perdurat tempore. Alia crassior,  
nec pellucens, atro colore: proinde bonitate cedens.  
Tertia vilior reperitur, fusco colore. Succedit huic impuri-  
or alia, quæ arboris scobe, ramentis, & affusis im-  
plicita, gummi non agglutinata lentescit, tuberculo  
amaræ nucis, aut fabæ, aut ciceris. Hanc ponticum,  
& sacerdotum suffimentis, sicut thus, & myrrham,  
costumque, in templis dicunt. Sed hæc omnes in duo tantum  
fastigia rediguntur, in rudem, & elaboratam.  
siquidem rudis est Caphura omnis ignem non experta:  
elaborata verò, quæ solis, vel ignis ardore excocta,  
atque purgata album contrahit colorem,  
utpote & cera Fuchsius libro primo de componendis  
medicamentis, putat Caphuram esse bituminis  
Indici genus, quòd scripserit Serapio auctoritate  
Almazodi, largioris Caphuræ prouentus augurium est,  
cum cælum crebris fulgetris corruscet, aut plurimis  
strepit tonitruis, vel cum regio, in qua prouenit,  
terræmotu concutitur: argumento, quòd similiter  
ex terræ cœcussu magna tū sulphuris, tum bituminis  
copia profundi solet. Sed dissentit ab eo opinio  
nostra: quandoquidem nec Serapionis, nec aliorum  
quoruncumque hanc fuisse sententiam existimem:  
cùm tum ipse, quàm cæteri, qui de Caphura scripserunt,  
arboris cuiusdam vastissimæ proceritatis gummi,  
vel resinam Caphuram esse scribant. Nimirum  
ostentant de hac scripsisse videtur Platearius  
Salernitanus: quippe qui Caphuram gummi  
arboris esse inficiatur, Dioscorides, & complurium  
testimonio, ex succo cuiusdam herbæ fieri tradens.  
Quod profectò falsum est, cum nullibi Caphuræ  
meminerit Dioscorides. Eam autem esse gummi non  
solum Auicenna, & Serapionis testimonio probatur,  
sed & Lusitanorum, qui nostro æuo per meridiem  
ad Calicut orientalis Indiarum emporium nauigant.  
Credidere Serapio, & Auicenna, Caphuram terro  
abscesse & ficcare, & refrigerare: quæ tamen  
cùm vehementer etiam in aquam proiecta conflagret,  
sit perquam odorata, & adeò tenuium partium, ut sepe  
per se in auram euanescat, illis reclamare videtur.  
Quo fit, ut quis suspicari possit, aut legit

*Fuch. opi-  
nio impro-  
batur.*

*Platearij  
error.*

*Caphura  
tempera-  
mentum  
& Vires.*

*Caphura  
historia, et  
genera.*

legitimam Caphuram ad nos non aduehi, aut hoc loco Arabum monumēta (vt in aliisquā plurimis) esse vitata. Capitis dolores (si tamen in hac parte credendum est Mauritanis) ex calore prouenientes Caphura illita mulcet, incandescentes inflammationes resinguit præsertimq; iocineris. Renes, & seminata vasa refrigerat, sanguinemque cogit. Circumli-  
tionibus imponitur ad cutis nitorem concilian-  
dum, & ad arcendas tam vulnerum, quam vl-  
cerum inflammationes. Erysipelas extinguit, & ad  
uersus gonorrhœā, & albas vuluæ fluxiones ef-  
ficax est cū succino, & aqua nymphaeæ hausta.  
Idem præstat pubi, seu imo ventri, testibus, re-  
nibusq; illita: quæ tamen antea psyllii seminis  
spissamēto, aut omphacio, aut solani succo pro-  
be sit macerata. Sanguinem est naribus profluen-  
tem sistit, aut cum viticæ semine immixta, aut ex  
maioris fedi, & plantaginis succo fronti circūli-  
ta. Collyriis ad calidas oculorum lippitudines  
vtiliter imponitur. Renibus, ac testibus illita ve-  
nerem extinguit. Corpora à putredine præser-  
uatur: proinde cōmodè aridiotis admiscetur, quæ  
contra venena, venenosorum animalium ictum  
& pestilentes effectus conficiuntur. In vniuer-  
sum viribus innumeris pollet, quia breuitat cō-  
sulescentes prætermittimus. Legitimæ proba-  
tio talis est. In calido pane è furno recentissi-  
mè sublato, bipartitoq; manibus scisso, Caphu-  
ra ponatur, quod si humore mædeat, sinceræ  
est argumentum: si contra perareseat, spurie  
ac fictitiæ signum. Cæterum nisi diligenter as-  
seruetur, ex operculatis etiam capsulis nonnun-  
quam euanesceat: itaq; sepe deluduntur seplasia-  
rii. Afferuatur tamen securè vase marmoreo,  
aut alabastrino, lini & psyllii semine sepulta.  
Nec defunt, qui eam pipere felicitas afferuari  
putent, quod nec pianè comprobandum vide-  
tur. Venetias Caphuram omnem rudem im-  
portant, ibiq; igne, & arte vitreis organis elabo-  
rantur, sic vt candescat, atque pelluceat. *340*  
Græcis, Lentiscus Larinis appellatur: Daru, Ara-  
bibus: Lentisco, Italis: Mata, aut Argeira, Hispa-  
nis: Lentisque, Gallis. Huius resina *μυστή*  
Græcè vocatur: Latine, Mastiche, aut Resina len-  
tiscina: Arabicè, Mastiche, Mastèche, siue Mas-  
foche: Italicè, Mastice: Germanicè ac Galli-  
cè, Mastic: Hispanicè, Almastiga.

Quod Arabibus Kaphor, seu Chasur, recen-  
tioribus Græcis *καρυφά*, vt etiam Larinis  
Caphura nominatur: Italis, Camphora: Germanis,  
Campher: Gallis, Camphre.

TEREBINTHVS.  
CAP. LXXVI.

TEREBINTHVS cognita arbor  
est. Cuius folia, & semē, & cortex astrin-  
gunt, & ad eadem, ad quæ lentiscus,  
cōueniunt, simili parata modo, sumptā.

TEREBINTHVS.



que. Fructus  
esui aptus est,  
sed stomacho  
aduersatur: ex  
caltacit, urinā  
mouet, venerē  
excitat: contra  
phalangiorum  
morsus conue-  
nienter in vi-  
no bibitur. Re-  
sina eius ex Ara-  
bia petræa de-  
fertur. Proue-  
nit etiam in Iu-  
dæa, Syria, Cy-  
pro, Aphrica, & Cycladibus insulis. Sed

præualeat cādida, plucida vitreo colore,  
& in cæruleū vergente, terebinthū olēs.  
Terebinthina resinas omnes antecedit  
proxima lentiscina, & è pinu, & abiete:  
has sequitur è picea, & pineis nucibus  
resina. Natura omnibus calfacere, mol-  
lire, discutere, expurgare. Tussi, ac tabi  
conueniunt per se, aut in eclegmate ex  
melle: vitia pectoris expurgant, urinam  
ciunt, cruda concoquunt, ventrē emol-  
liunt, palpebras cōmodissimè replicāt  
lepras tollunt, cum æruginē, ac sutorio  
atramento, nitroque: auribus saniem  
emanātibus cum melle & oleo, item in  
pruritu genitalium viles, malagmatis,  
acopisq; admiscuntur. Laterum dolori-  
bus per se, ilitu & appositu auxilio sunt.

RESINÆ ALIÆ. CAP. LXXVII.

LIQYIDA resina è pinu, & picea, à  
Gallia, & Hetruria conuehi solet, at-  
que olim à Colophone petebatur: hinc  
Colophonix sibi cognomen tū vëdica-  
uit. A Gallia quoque subalpina: quæ ver-  
naculo nomine larica, hoc est, lariginā,  
appellant incolæ. Ea in linctū, & per se  
magnopere prodest tussi veteri. Colo-  
phre inter se distāt: siquidē alia cādida est,  
alia oleosa, alia mellei liquoris similitu-  
dine, vt larigna. Cupressus etiam liqui-  
dam fundit resinā, quæ ad eadē pollet.  
Quæ verò aridarum generi ascribun-  
tur, quædam ex pineis nucibus, aliæ

g 2 abiete,

Caphura  
probat. o.  
& confer-  
matio.

Nomina.

abiete, alia picea, & pinu exierūt Eligi debet longè omnium odoratissima, trās-lucens, non retorrída, neque diluta, quandam cerā faciē prābens, & friabilis. E picea, & abiete resinā cāteras antecēdunt: odoratā enim sūnt, atque thus odore imitātūr. Prāstātiores à Pityusa insula deferūtūr, quā secundum Hispaniam sita est. Sed quā ē picea, nucibus pineis, & cupressō manarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur. veruntamen eorundē grātia, quorū & illā, sumi solent. Lenticina terebinthinā respondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadruplā capacitatis ad humorem, qui infunditur. itaque resinā congius in duobus aquā pluuiā coquitur, subiectis leuibus prunis, resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis, & retorrída reddatur, ac digitis cedat. Cāterū ubi refrigit, in fictile nō picatum, quod aconitum vocant, id est, non illitum, reconditur. Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis eliquata praeoletur, quō facilius fordes excernatur. Vritur quoque sine aqua, primū lento igne, & ubi coire cōeperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissione discquoquantur, vsque dum antedictas naturae suae notas exuerint: mox, ut dictum est, reponuntur. Aridas vnus diei spatio decoxisse satis est. Vistā odoratis malagmatibus, & acopis, & vnguentoris colorationibus magnopere vitiles sūnt. E resina prinde atq; thure, fuligo excipitur, ad circūlitiones idonea: quibus palpebras fucēt, & colorē mentiuntur, pdest glabris genis, collacrymatibus, erosissq; oculorū angulū. Ex ea fit atramentū scriptorū.

*Terebinthi  
histor.  
ex Theo-  
phrasia.*

TEREBINTHORVM (vt Theophrastus memorie prodidit lib. III. capite x v. de historia plantarum) alia mascula, alia foemina. Mascula sterilis est, ob idq; sexui maris adoptatur. Foeminarum alia fructum protinus rufum promit, magnitudine lentis, qui concoqui nequit: alia viridem editum, rufum postmodum tingit, & cum via maturefcentem, nigrum nouissime facit, magnitudine fabae, resinofum, & sulphurosum. Circa Idam, & Macedoniam

brevi, fruticosa, contortaque nascitur: at apud Damasum Syria magna, copiosa, decoctaque: monte enim inibi terebinthis refertum, ut nil aliud habeat, refrunt. Materies ei lenta, radices valde in profundo, atque in totum incorrupta hęc arbores habetur. Flos oler, verum colore rufo. Folia circa vnum pediculum, pleraque specie laurorum, coniugata, quemadmodum sorbo, quodq; parte postrema acuminet, impar exit: verum minus angulata, quam sorbo, ambiturque laurino similiora, & pinguius cum vniverso fructu. Fert & ad nucis similitudinem quædam concata, ut vltius: quibus bestiolæ tanquam culices innascuntur. Fit in his resinofum quid, lentumque: sed resina ramen non hinc legitur, sed à ligno. Fructus resinæ copiam non mittit, sed manibus tantum ad hæret: etsi non lauetur, postquam collectus est, inter se cohærescit: cum verò lauetur, candidus, probèque non maturus supernat, niger subsidit. Idem refert deinde libro III. capite v. historię plantarum, Indicam etiam Terebinthum haberi: cui folia, & rami, & reliqua omnia terebintho similia: fructus autem diuersus, similis enim amygdalis. Nam & in Pætris terebinthum hanc esse, ferreque nuces amygdalarum magnitudine: quoniam non magnas, sed visu similes, & suauitate amygdalis præstantiores: & ideo loci illius incolæ his potius uti. hæc Theophrastus. Terebinthū vidi ego primū in colle vltro cognominē Castel Trento, non procul à ciuitate Tridenti prope Athesim, à Theophrasti historia haud quaquam dissimilem, facta huius videndi mihi copia à clarissimo medico Iulio Alexandrino Tridentino: reperi que ipsam deinde in aliis compluribus Hetruriz locis, videlicet in collapsis Romanorum ædificiis, ac ruderibus: sed frequentem admodum in Iapidiaz collibus prope Pucinum castrum, Adriatico sinu non longè à Tergeſto. Ab hac sæpe, dum illac iter haberem, & fructus, & folliculos caprarum cornibus non abſimiles, quibusdam intus bestiolis culicis figuram præ se ferentibus, & resinam de cerpi: quæ etsi omnium præstantissima sit, non tamen diu est, quòd Venetias deferretur ex Cypro. Antea coctam afferebant, vel quòd esset aduectu aptior, vel quòd impostoribus ad adulterationem aditus hoc modo facilior heret. Verum liquida ut per se ex arbore manat, iam frequens facta est. Cāterū quia terebinthina tantū in Italia non aduehebatur (ut supra in Iaricis mentione diximus) lorigna non modò terebinthinæ locum sibi vendicauerat, sed etiam cognouimentum. At cum eodem loco à nobis de picea, picea, lorigna, abiegnaque resina, & earum à quibus colliguntur arboribus, abunde scriptum sit, operæpretium quidem non est, ut hic iterum ea repetamus. Scire tamen conuenit, rarissimas esse abietes in montibus Tridentinis, quæ præter fluentem lacrymam, aridam fundant resinam: sed si quædam

*Bras. o.  
nio repro-  
batus.*

inueniuntur, hæc est (vt Plinius inquit) arboris morbus. Cuius rei manifestum argumentum est, quod omnis abies, quæ resinam fundit, tabida sit, putris, & cariæsa. Brasia uolus de resinis differens, Plinium in earum historia à Dioscoride diffinitur autumat, quod scilicet Plinius libro x x 111. capite v. tradiderit summas resinæ species duas, siccam & liquidam: siccam in pinu, & picea feris liquidam terebintho, larice, lentisco, cupressu. Dioscorides uero ex pinu, & picea, & liquidam præter siccam haberi scriptum reliquerit. Quos tamen melius erat sic conciliasse, quod quantum asserat Plinius, siccas resinas ex pinu, & picea colligi, non propterea obstat, quominus ferant pariter huiusmodi arbores & liquidas, & siccas resinas. Quandoquidem in Tridentino tractu pluribus variisq; locis, ex pinu, piceaq; antea longo tempore cæsis, folijsq; ardore æstantibus liquidas resinas exudare comperimus largiæ non abissiles. Quod etiam sepe cernit in asseribus ex hisce arboribus paratis, & in tignis, vel trabibus, quæ ædificiis coaptantur. Verum enim uero malim dicere Plinium crasse, quod liquidarum generi lentiscinâ adscribat, quæ est nostra mastiche, cæteris profectio durior. Ad hæc scire etiam conuenit, quod quæ in officinis Colophonia, Hispanica, Græcæq; dicitur, illius species est, quam coquere Dioscorides edocuit. Constat hæc coloribus diuersis, utpote crysallina, hyacinthina, saturatior colore, pro resinarum ex quibus conficitur, varietate, quippe (vt Dioscorides ait) alia candida est, alia olei, alia mellis colore, qualis est larigna. Quæ uero à Colophonia Ioniz urbe sibi cognomentum comparauit, est (vt refert Plinius libro x 111. cap. x.) præter cæteras fuluæ: neque alia de causa uocatur & Hispanica, & Græca, nisi quod ex iisdem etiam regionibus aduehatur. Attamen animaduertendum est aliam ab hac, quæ neque fricta, neque excocta est, haberi Colophoniam: siquidem scribit Dioscorides quod pinea, piceaque liquida, ac pinguis resina ex Colophonia asferbatur: ob idque Colophonia per excellentiam vocabatur. Quod item testatur Galenus libro v 11. de compos. med. per genera, cum inquit. Quoniam uero piceam resinam & frictam, & colophoniam appellare consueuerunt, sciendum venit, aliam quandam esse colophoniam Chiz mastiche perfinilem, molliens aliquid habens, quemadmodum illa, & thus. Et libro 11. eiusdem. Est, inquit, inter liquidas etiam colophonia thuris redolens, quæ nonnullis sola uocatur colophonia, odoratu suauitatem quandam referens, vt abietina, & calore sicut illa inedocri prædita. nascitur admodum modica, atque ob id pretiosa est. Porro si quispiam diceret, non cognouisse Plinium, neque Dioscoridem, liquidam abiægna, quam aliqui lacrymam, nonnulli uero abietis oleum nuncupant, eum ne tantillum quidem à veri-

tate deficiscere putauerim: siquidem hi de liquida abiægna (quod legerim) nihil memoriæ prodiderunt. Terebinthi, & resinarum meminit Galenus libro v 11. de simplic. medicam. facultate, ubi ita scriptum reliquit. Terebinthi tum cortex, tum folia, tum fructus adstrictorium quiddam obtinent: sed & secundo ordine excalciant. Itaque quod etiam deficient, manifestum est: recentes quidem etiamnum, humidique modicè, siccè uero, ordine secundo. Cæterum fructus aridus propinquus est etiam tertio ordini deficiantium: est enim adeo calidus, ut mandentibus procinus eius caliditas percipiatur. Itaque etiam urinam prouocat, & lienibus prodest. Paulò superius de resinis differens, sic inquit. Resinæ omnes deficiant, & excalciant. Cæterum inter se discrepant, quod plus, ac minus habeant in gustu quidem acrimoniz, in facultate uero caliditatis: tum quod alia plus, alia minus fortiter sunt partium tenuitatis: præterea quod nonnullæ adstrictionis sunt participes, alia nequaquam. Primas meruit omnium non iniuria lentiscina: eam uocant mastichen. Nam præterquam quod pauca ei adeo adstrictio, adeo ut stomachi ventrisq; & icoris imbecillitatibus, & phlegmonis conueniat, insuper illi inest mordacitate vacans defecatio: minimum enim acris est, & maxime tenuium partium. Inter alias præfertur terebinthina, manifestam quidem, non tamen similiter atque mastiche, adstrictionem possidens. Cæterum adiunctam habet amaritudinem quandam, per quam magis etiam, quam mastiche digerit. Ob eandem qualitatem inest & absterio, tanta quidem, ut & sfors sanet, quinetiam quæ in profundo residet, cæteris resinis magis attrahit, nimirum cum illis maiore habeat partium tenuitatem. Attamen picea, & hac etiã magis strobilina acriores quidè ea sunt, sed non magis tamen digerit, neq; attrahunt. Mediæ inter has quæ sunt pinea, & abietina, acriores quidem terebinthina, minus tamen, quam aut picea, aut strobilina. Habet porro etiam emolliens quiddam terebinthina: secundum locum habet in emolliendo lentiscina, sicut & cyparissina acrimoniz. Et libro 11. de compositione medicamentorum per genera inquit. Etenim cera ad liquiditatem multo pingui indiget: at resinæ, quæ quidem aridæ prorsus sunt, modico: liquida & siccam quandam substantiam ad emplastri crassitudinem assumere possunt. In ceris igitur non magna humiditatis, ac siccitatis differentia est: in resinis, sicut etiam in picis genere contra, aridæ ab humidis permultum differunt. Omnium ergo resinarum siccissima est, quam nonnulli frictam, alii colophoniam appellant. Hæc succedit, quæ ex scissilibus impura, nec fricta sumitur, quam si purges, in frictam mutabitur. His ambabus siccior est, quæ dicitur piteyion physema, ac si dicas pinea germinatio. Hanc sanè,

*Terebinthi  
Gires ex  
Gal.*

*Resinarii  
Gires ex  
Gal.*

*Colophonia  
offid.*

ceū squalidam in præsentis emplastri compositionem non esse idoneam ratum, abiecti, vsus autē sum fricta, & liquidis. Iam verò ex his quocumque nonnullæ diutius liquidæ permanent, quæ admodum terebinthina, aliæ citò inarescunt, sicut strobilina: media vniūsq; est abietina. Quinetiam facultate calidior est quidem strobilina, mox verò abietina, deinde terebinthina: cupressi resinam miscere non ausus sum, ut quæ nonnihil adstringeret. Putabit forsitan aliquis nobiscum dissentire Dioscoridem Anazarbeum in sermone de resinis hæc verba scribentem, primo de medica materia commentario. Ex omnibus resinis principatim terebinthinæ datur, post eam lentiscinæ, tum ei, quæ de pinu raditur, & abiete, post quas picea, strobilinaque numeratur. In his enim Dioscorides tanquam de infima strobilina, optima verò terebinthina sententia videtur. Verum ego ex his tribus resinis strobilina, abietina, terebinthina, principem certè strobilina calore, secundam abietinam, postremam terebinthinam esse dixi. hæcenus de resinis Galenus. Sed hac in re animaduertendum est, quòd hoc in loco cæteris strobilina non aliter præfert Galenus, nisi quòd omnes caliditate tantum antecellat: siquidem in vniuersum in medicamentis componendis à Dioscoride nequaquàm dissentit, videlicet quòd inter omnes terebinthina primas occupet sedes, ut paulò post declarauit, dicens. Inter resinas optimam, tanquam medicamentum in multiplices vsus accommodatum, meritò terebinthinam affirmaueris, non tamen caliditate primas obtinere. Arbor, quæ Græcè *ῥιπιδιόν*, Latine Terebinthus appellatur: Arabicè Baton, Boton, Botin, siue Albotin: Italicè, Terebintho. Resina verò ita Latinis vocata, Græcis *ῥηίν* nuncupatur: Arabibus, Ratin, siue Natig: Italis, Ragia: Germanis, Hartz.

PIX LIQVIDA. CAP. LXXVIII.

Pix liquida, quam alij conum vocant, è pinguisimis pini, piceæque lignis congregatur. Optima est splendens, sincera, læuis. Contra venena, phthisim, purulentam excreationem, tussis, suspiria, & pectoris humores, qui difficilè extusuntur, efficax est, eclegmare cyathi mensura cum melle dato: tonsillarum & vuar inflammationes, angina: vtiliter perunguntur: purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur cum trito sale serpentium moribus: adiecta verò pari cera, scabros vngues extricat, impitiginosq; emendat: vuluar duritias, ac sedis tubercula discutit: cum farinâq; hordeacea, & pueri

impubis vrina decocta, strumas rum-pit: cohibet vlcera, quæ serpunt, cū pinneo cortice, aut sulphure, aut fursuribus illita. Cæterum cum thuris manna & cerato profundos vicerum sinus conglutinat: rimis sedis, & pedum magno auxilio illinitur: vlcera replet, & cum melle purgat: quin & cum vua passa, & melle carbunculos, & putrida vlcera emarginat, disrumpitq;. Erodentibus medicamentis, quas septas vocant, probè immiscetur.

PICINVMOLEVM.  
CAP. LXXIX.

E PICE fit quod pisselæon appellat separatō liquore aquoso, qui supernat pici, sicut serum lactis. Nam expansa, quandiu pix coquitur, supra cortinā vellera pura madescunt, acceptoq; halitu eius exprimuntur in vas, idq; tandiu fiat, donec pix coquatur. Quas pix liquida, præbet vtilitates: alopecias capillo replet cum farina hordeacea illitum: quibus & liquida pix medetur: iumentorum vlcera, scabiemq; emendat.

FVLIGO LIQVIDAE PICIS.  
CAP. LXXX.

FIT HOC MODO è liquida pice fuligo. In lucerna noua, quæ ellychnium habeat, nonnihil picis incendio, lucernamq; fictili vase in clibani speciem conformato, superius in angustum fornica-to, inferius perforato, ut clibanus esse solent, operito, & adoleri finito: cōsum proq; liquore nouū infundito, quoad sufficientē vsui fuliginem collegeris. Vis ei astringens, acrisq;. Vsui est ad pigmenta, quibus palpebras linunt, & venustant, & ad circumalitionen. Item vbi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles, lacrymososq; oculos, insuper ad eorundem vlcera non inutilis est.

PIX ARIDA. CAP. LXXXI.

LIQVIDA pix decocta in spissam coit, quā vocat aliqui palimpissam. quo in genere quædam visci modo lētescit, boscas cognominata: altera sicca est. Probat purior, pinguis, & odorata, sub-rufa.

rufa, resinosa. Talis Brutia, & Lycia picis, resinâq; simul naturam habentes. Calfactoriam vim habet: dura emollit, pus mouet, tubercula panôsq; discutit, vlcera replet: vulnerariis medicaminibus commodè permiscetur.

ZOPISSA. CAP. LXXXII.

ZOPISSAM aliqui aiunt deraſam  
naubus refinam cum cera, quam alij  
apochyma appellant. Ea diſſipandi  
naturam habet: quoniam marino fale ma  
cerata ſit. Alij pineam refinam hoc no  
mine vocauerunt.

TAME SI de pluribus Picis generibus, de oleo, earumque fuligine diuersis, ac propriis capitibus differat Dioscorides, cum tamen horum omnium historia notior sit, quam vt à nobis explicari debeat, operæ pretium non est, vt de his pluribus agamus. Sed quoniam fortasse nonnullos delectabit audire, quoniam modo pix ipsa conficitur, vt illis & mihi sit satisfactio hic rem paucis aperiam, omniaque de ea referam, quæ Tridentino tractu in Flesmarum montibus coram clare perperi. Sic ergo picem, quæ passim naualis dicitur, eo quod picandis nauibus sit aptissima, artifices conficiunt. Veteres pinos quæ profusæ dactæ confectæ sint, in particulas securibus concidunt, vt ex aliarum arborum truncis ad carbonis opus fieri solet. Deinde vt eò area ex creta pauidur in medio paululum elata, extremitatibus æqualiter dependentibus, vt liquor è tecta refundans in canalem totam ætanti ambientem facilius defluere possit. Itaque confectam itedam in axea struis congerie locant, velut in carbonis artificio: mox hæc præmum abietum, picæ æque frondosis ramis vndeque tecta circumdantque, tum demum terra septa, Iurque obstruunt, ne quodis fumo flammæ pateat exitus, per foramen in cacumine paratum ignem succedunt eadem quoque ratione, qua & carbones coquuntur. Quare cū defuit locus, per quem flamma erumpere possit, sentiatque ob id congesta moles maximè ignis ardorem, pix liquitur, & per areæ paumentum confluent in canalem circumposuam defluit, qui per alios canales inibi artificiosè paratos picem fluentem corruat in strobis ligneis asseribus circumdatis, ne terra defluxam picem comibat: vnde postea & dolia, & cadi, & vtres implentur. Operæ perfectæ signum, si rogus decumbat, subditque, & liquor defluere desinat. Sic enim picem fieri vidimus à syluiculis eam parantibus, qui quodammodo secuti videntur Theophrastum libro 11. capite 111. de historia plantarum, vbi eadem ferè ratione Macedonæ picem vire clarius tradidit. Picis facultates memorat prædictus Galenus lib. v 111.

simplicium medicamentorum, sic inquit. Pix  
seca quidem defeciat, & excalcifit secundo à me-  
diocribus, siue symmetris excessu: ac plus de-  
ficere potest, quam excalcifere. Humida verò  
conerà, plus videlicet calcifit, quam deficiat:  
habetque nonnullam partium tenuitatem, qua  
& althimaticis, & purulentis adiunat. sitis  
est autem cyathi linixisse mensuram meli  
mixta. Sed & abstergendi quondam vim habent  
atque concoquendi, digerendi: veluti &  
in gustu subamarum quid obineant, & acre.  
Sic leprofos vngues eximunt mista cum cera  
lichenasque detergunt: concoquunt item du-  
ros, & crudos tumores omnes cataplasmatibus in-  
ditæ. Ad ea omnia humida valentior est: a-  
rida verò pix tamesit ad hæc quidem deterior. Est  
glutinatior tamen vulneribus magis congruit.  
Ex his itaque clarum est, humidæ picis calidam  
humiditatem affatim esse admissam. Mem-  
nitis enim Galenus picis fuliginis libro v i t.  
eorundem simpl. ybi ita de omni fuligine scri-  
ptum reliquit. Fuligo omnis exiccatoria est, ac  
proinde terrestris est essentia, habens quid-  
dam etiam ignis, qui materiam combustit, re-  
liquias: fed id pusillum est. Porro tota eius  
natura terrena est, tenuium partium. Sed  
quæ speciatim in ea differentie sunt, ex pro-  
pria materia eueniunt ex acreiore, & calidore,  
tali etiam proveniente fuligine: ex dulciore si-  
mili quoque & hinc fuligine proveniente. Pri-  
mum enim thuris fuligine vntur, in ocula-  
riis medicinis mista, esse videlicet, quæ ad o-  
culos etiam cum phlegmone tentatos accommoda-  
ntur, atque etiam cum fluxione vexantur, &  
ulcera habent: nam & illa expurgat, & carne  
implet. Ad hæc vsurpant quoque eam ad fa-  
cultates, quas vocant callibiepharas. Præter  
terebinthinæ, myrræ: fuligo molestia ca-  
ret, non aliter quam thuris: sed styracis his  
quodammodo valentior est: magis etiam picis  
liquida, qua etiam magis cedat. Porro acro-  
ribus vntur ad vitia palpebrarum vocata pita-  
cia, & erosos oculorum angulos, humidisque  
circa phlegmone. At mollioribus, mitiori-  
busque tum ad hæc, tum ad ea, id quæ com-  
petere paulo superius diximus thuris fuliginē.  
naxa γα Græcis dicitur: Latinis, Pix liquida:  
Arabibus, Eerf. Cest. Zest, aut Kir: Italis, Pece  
liquida: Germanis pix omnis, Bechtisch etiam  
Hispanis, Pex negra: Gallis, Poix fondue, li-  
quida tantum. *πικρα πυρρὴ καὶ μακρὴ πικρα* Græcè  
vocat: Latine, Pix secca: Italicè, Pece secca:  
Gallis, Poix sèche. Quod Græci *πικρὴ καὶ μακρὴ*,  
Latini Picinum oleum dicunt: Arabes, Kepfen,  
ten Kapst: Hispani, Azci de pec.

† Hoc loco non *in* *istis*, id est, odorata, ut communis lectio habet, sed *in* *istis*, hoc est, viscosa legitur in Oribasii codice manu scripto, libro x i. simplicium. Harum lectionumque sit melior in probatione pictis sicca, aliorum sit iudicium.

*Picis can-*  
*ficiendarum*  
919.

*Fuliginis*  
*Vires ex*  
*Galeuco. B.*

*Nemoralis*

*Picus fa-  
sciatipes  
ex Gab.*



BITUMEN. CAP. LXXXIII.

**BITUMEN** Iudaicum ceteris antepōnitur. Cuius probatio est, ut purpuræ modo splēdeat, sitque ponderosum ac validum odorem vibret. nigrum autem & sordidum, viciosum est. Adulte ratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylonē, Zacyntho, & Sydōne. Liquidum inuenitur in Agragantino Siciliæ, fontibus innatans: quo vtuntur ad lucernarum lumina, olei vice. Hallucinantur, qui id Sicilicum oleum nominant: nanque liquidi bituminis genus esse cōstat.

PISSASPHALTUM. CA. LXXXIII.

**NASCITUR** in Apolloniatarum agro circa Epidaurum, quæ pissasphaltos appellatur. Ea Cerauniis montibus deuoluta impetu fluminis rapitur, æstique in litus expuitur, illic coacta in glebas, mistā bitumini picem redolet.

NAPHTHA. CAP. LXXXV.

**NAPHTHA** vocant Babylonij bituminis colamen, colore candidum: inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita ut ex spatio protinus in eā transiliat. Ad suffusiones oculorum, & albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur: vuluarum procidentia, strangulationesque olfactu, suffitu, impoſitu, emendat: comitiales morbos suffitum apprehendit, gagaræ lapidis more: purgationes mulierum cum vino, & castorio potum elicit: tuſſim veterem, & anhelitum adiuvat: serpētium morſibus, coxendicum, laterūque doloribus auxiliatur: datur cœliacis in catapotio de uorandum: cum aceto potum discutit sanguinem concretum: dysentericis cū ptisana liquatum infunditur: deſillationibus suffitioe medetur: mitigat dērium dolores oblitum. Ceterū pilos incommodos sicum replicat, specillo impositum: concalfactum autem, & cū farina hordeacea, nitro, & cera illitum, podagris, articulorū doloribus, lethargicisque prodest. Pissasphaltos eadem, quæ pix, & bitumen, si misceantur, potest.

**LEGITIMUM** quidem Iudaicum Bitumen hoc æuo (quod sciam) in Italiam non aduehitur: id nanque, quo officinæ vtuntur, imposta quedam est, pice, petroleo, & aliis nonnullis parata. Igitur mirari non licet, si id Dioscoridis historiæ minimè respondere videatur. Optimum in Iudæa provenit in quodam lacu, quæ Iordanis amnis influit, qui ab vrbe Hierico quindecim tantum millia passuum distat, si Brocardo fides habenda est, qui Palæstinæ topographiam edidit. Nil verò aliud bitumen est, quàm pingue quoddam lacus illius aquis super natans, quod vndis ventōque agitatū in litore concreſcit, densatur, coit, tenacissimūque redditur. Nullum in hoc lacu (vt Galenus testatur lib. i. i. i. cap. x. x. simpl. medicamentorum) animal, nullaque stirpis inſarſitur, neque viſitur ob aquæ ingentem falsedinem. Inò cū duo ingentia flumina in eum confluant, in quibus pisces innumeri, præsertim in eo, quod prope Ierichontem fluit, quod Iordanem appellant, nullus omnino piscium fluminis ostia excedit. Quinimo, eodem auctore, de his, quæ in eum proiciuntur, nihil mergitur, sed insitit naus, super aquam fertur. Quippe hoc esse verum probari facile potest experimento, quod sensibus patet: nam vnaqueque naus leuius admodum marinis, quàm dulcibus fertur aquis. Proinde loco citato hæc scitè prodidit Galenus. At aqua, quæ ex lacu Syriæ Palæstinæ, quem alii quidem mare vocant mortuum, alii stagnum bituminosum, gustantibus non falsa modò, sed & amara est. Salè verò etiā habet ex sese narum, perinde subamarum, primoque statim aspectu vñ cum vniuerso mari tūni candidior, tum crassior apparer, salsugini meræ similis: in quam si saltem iniicias, ne liquati quidè etiam possit: plurimum enim eius in se habet: ac si quis in eam se mergat, continuò salè tenuissimò velut conspersus, vndiq; emergere conspicitur. Quapropter etiam aqua illa, quàm cetera marina grauior est, idque tanto pondere, quanto fluuiiis marina. Itaque si volueris te ipsum deicere in profundum, ne sic quidem poteris deorsum ferri: ita attollit, eleuatque; aqua, non sanè quia natura leuis sit, quod quidam veterū sophistarum prodidit, sed vt cē fuit Aristoteles, propter grauitatem insitit luti, quæ leuiora sunt gestans. Proinde si hominem ligaris manibus, pedibusque, in stagni illius aquā conieceris, deorsum hand feretur. quin verò sicut naues in mari onera plura, quàm in fluuiis citra submersionem portare valent, eundem in modum in stagno mortuo multò plura, quàm in mari. Tantò enim est, quæ in illo est aqua, marina grauior, quantò marina lacustri, aut fluuiali. inest enim ei salis substantia, quæ terrea, grauisque est. Ipsiq; tibi marinam, si lubet, efficerelicer, sale in aqua fluuiali colligato, cognosceretque quantò grauior reddatur aqua eusmodi, quàm sit dulcis. Quin & modū iam inueniunt, moderatam ad saliendo concifiendi

salsu

falsuginem, si ouum in ea videatur natum: nam  
vbi etiamnum fudit, ac nondum super falsu-  
ginis superficiem innata, aquosa magis est, & dul-  
cis: *præter* verò falsa est, vbi tanta est salis co-  
pula, ut amplius liquari, qui postea ad-  
ditur, nequeat. quam aquam si pendere non  
grauaberis, omnium aquarum comperies gra-  
uissimam. Itaque ego quandoque inanem esse  
diuitis cuiusdam ambitionem ostendi, qui tan-  
tam in Italia maris mortui aquam deuexit, qua  
cisternam implere posset. Nam id ipsum ego  
expeditè præstiteri, sale plurimo in aquam pota-  
bilem coniecto. hæc Galenus. Lacus iste, quem  
aliqui mare mortuum vocant, ille quidem est,  
quem sacra testantur monumenta exortum esse,  
vbi Sodoma, Gomorra, aliarque finitimæ  
ciuitates cælesti igne absorptæ, subuersæque fue-  
re. Quod etiam Galeni auctoritate comprobatur,  
qui eodem loco citato lacum hunc Sodo-  
mæum appellari scribit. Eructat continuè is (vt  
quidam Patriarcha Hierosolymitanus suis scri-  
ptis perhibet) nebulosus quosdam vapores fre-  
tentem intolerabilem vibrantes, qui postea ven-  
torum flamine per conuales olim fertilissimas  
exagitati, perpetuam sterilitatem relinquunt,  
ita vt longo terrarum spatio nec herba, nec ar-  
bos, nec vllum denique germen proueniat, neque  
virescat, nisi iuxta Hiericum, vbi ab Elisei fon-  
te irrigantur horti. Tradit Plinius hunc lacum  
longitudine centum millia passuum excedere,  
latitudine maxima viginti, quinque millia pas-  
sum implere. Idem Pissaphalati inter picis ge-  
nera meminit libro x v i i i . capite v i i . sic  
inquit. Est & Pissaphalatos mista bitumini pi-  
ce naturaliter ex Apolloniatarum agro: qui-  
dam autem ipsi miscet. Affertur ex eodem  
agro etiamnum hoc ruo: siquidem ex Apo-  
lonia Epiri, eam vulgò Valoniam nuncupant,  
Venetias pissaphalatum pro picandis nauigijs  
copiosum importatur: quippe quod pineæ pi-  
ci commistum, valentissimè id muneri præ-  
stet. Nuper ex Dalmatia afferri cepit, vbi prope  
Lesinam non longè à Narenta foditur: cuius  
amicus quidam mihi copiam fecit. Foditur &  
in Pannonia, vbi id incolæ fossitiam ceram  
esse existimant. Scribit Fuchsius libro primo  
de componendis medicamentis, pissaphalatum  
nunc etiam tribus ferè milliaribus ab Ispruth  
reperiri, vocarique Germanico sermone Tri-  
schenblut, cuius portionem aliquam adhuc  
se habere fateatur, sibi à Georgio Collimitio  
transmissam, quæ succensa bitumen ac picem  
versissimè redoler. Sed equidem vereor, ne  
ipse quoque decipiatur, vñ cum Georgio illo.  
Is enim lapidem gagatem, qui ferè tri-  
bus ab ea ciuitate Germanicis milliaribus (vt  
Fuchsius inquit) in litore cuiusdam torrentis  
frequentissimus reperitur, pro pissaphalato o-  
stendebat. Sed illius error, dum ego in Ispruth  
essem, è clarissimo Ioanne Petro Merendino  
medico Regio, & à me pariter deprehensus  
est: quòd lapis Germanica lingua Trischem-

blut vocatus, etsi lapidis gagatæ modo confa-  
gret, & bitumen redoleat accensus, nunquam  
tamen vt pix, & asphaltus igne liquefit, sed  
ligni, vel tædæ modo comburitur. Præterea  
vltimum bituminis genus, quod Naphtham  
vocat, Plinius libro i i . capite c v i i i . in  
Austagenis Parchia inueniri prodidit, tantam-  
que esse huic ignium cognationem, vt transi-  
liant protinus in ipsum vndeunque visum.  
Quod etsi in Italiam aliunde (quod sciam) non  
iuserat, inibi tamen pluribus in locis id ge-  
neris erumpit, quod eisdem cum igne præstat  
effectus: quale est, quod in agro Mutinensi  
scaturit, petroleum, siue saxeum appellatur.  
Sed vt redeamus, vnde digressi sumus, bitu-  
men Sodomæum non nisi fictitium, vel impo-  
storum malitia adulteratum aduehitur. Proinde  
Brasauolus in synceri defectu Mumiam à  
Mauritanis vocatam substituit, quod certò cre-  
diderit, mumiam esse legitimum Palæstinum  
asphaltum. Quandoquidem existimauit, sicca-  
tum Arabum, tum aliarum gentium corpora,  
quæ pro mumia ex Syria, & Aegypto Venetias  
deferuntur, cum sint ex infima illius regionis  
plebecula, vice aloës, myrrhæ, croci, & bal-  
sami ex more Iudaico, duntaxat asphaltò im-  
pleri: quòd eorum pauperes aromatum sum-  
ptus non toleret. Hoc fundamentum hinc ie-  
cisse videtur, quòd Strabo literis mandauerit  
bitumen Sodomæi lacus in vsu esse ad tutanda  
hominum cadauera. Sed quantum ipse ex Ara-  
bijs scriptis deprompsit, apud eos m u m i a  
potius est pissaphalatum, quam asphaltum: si-  
quidem scribit Auicenna, mumiam eadem præ-  
stare, quæ asphaltus pice commistus. Ex quo  
facile conicere possumus, cadauera illa pissaphal-  
to tantum impleri. Cui etiam subscribit  
Serapio, qui de Mumia differens, ex Dio-  
scoridis auctoritate, eadem, quæ Dioscori-  
des de pissaphalato tradidit, ipse verbótenus  
ad mumiam retulit, sic inquit. Mumia est  
in terris Apolloniæ: descendit nanque ex mō-  
tibus, qui ducunt flumina cum aqua, & eiecit  
eam aqua fluminis in ripis, & est coagulata, &  
fit sicut cera, & habet odore picis mistæ cū as-  
phalto cū aliquo fetore: & virtus eius est, si-  
cut picis, & asphalti mistorum. Vnde potius as-  
ferendum putauerim, nostrā Mumia esse pissaphal-  
atum, quam asphaltum. Et quanuis dicat  
Serabo bituminis Iudaici vsum fuisse ad con-  
seruanda cadauera, non tamen negat, quin  
bitumini picem admisceant, sicutque pissaphal-  
atum factitium. Verum Serapio, & Auicenna  
has mixturas optime nouerant, vt pote quibus  
non modò Syri, sed & fuz gentis Mauritanii  
vterentur. Quo fit, vt Brasauoli sententiam  
non probandam existimem, quòd scilicet vul-  
garis Mumia bituminis loco in componendis  
medicamentis substituat. Nanque Mumia  
præterquam quòd est (vt puto) syncerum pissaphalatum, vel asphaltum pice mistum, con-  
cepit defluentem humorem, qui continuo è

Naphtha  
mento.Brasauoli  
nō impro-  
bata.Mumia cō-  
siderata.Fuch. &  
quorundā  
lapides.

MUMIA.



cadaveribus in sepulchris liquatur. Ex quo credendum est, eam non parum suam immutasse naturam. Porro satis ducerem Galenum, & Paulum consilere, qui in succidaneis, si desit asphaltus, picem liquidam subdunt. Ceterum notare conuenit, Serapionem Mumiam Dioscoridis pissasphalto adieciisse, ut quæ aliquā inter se cognationem haberent, abinuicem non disungeret: non enim erat nescius, huiusmodi cadauera pissasphalto impleri, quemadmodum myrrha, croco, aloë, ac etiam balsamo simul admixtis implebantur. quæ veram tractu temporis consciebant mumiam, cuius meminit etisdem capituli initio, his verbis. Mumia sepulchrorum sit ē myrrha, aloë, aliisq; rebus his additis, & humiditate, quam exudant humana corpora. Veruntamen hac nostra tempestate in Italiam haudquaquam aduehitur: quippe quod hac missione nulla earum regionum cadauera præter nobilium, ac diuitum condiantur: & hi quidem sepulera habent sibi constituta diligenterque occlusa. Idcirco non ita facile istorum corpora furripi possunt à mercatoribus illuc profectis, ut minori tum difficultate, tum suspitione asferri possunt pauperum, & ignobilium, asphaltu pice misto, vel ipso pissasphalto confarctis. Ideoque apertissime falluatur, qui pro legitima Mumia arefaciam istiusmodi cadauerum carnem assumunt, non autem eorum insarctum, veluti seplasiariorum, quam plurimi, qui carnes & ossa contundunt, eaque medicamentis admiscunt, quæ mumiam exposcunt. Necesse igitur esset legitimam mumiam expetentibus, ut in hospitalibus nostris cadauera obeuntium aloë, myrrha, & croco repleri curarent, eamque deinde suo tempore eximi. Hanc tamen nostram sententiam plurius reicellere contendit Petrus Bellonius Cenomanus, vir ex eo fortasse peritus iudicandus, quod profiteatur se Asiam, Græciam, Syriam, Aegyptum, & Arabiam peragrasse. Quippe qui putet, non aliam esse Mumiam apud Græcos, & Arabas, quam pissasphaltum. Sed quod eius argumenta non sint tanti momenti, ut oppositum nobis persuadere possint, & quod potius idem hallucinetur, in epistolis, quas conscribere instituit, adiuvante Deo, latius essendam. Vbi etiam plurima eius errata

Et hanc o  
penis ex-  
ploia.

atteximus. quæ in libellis, quos tum de medicamentis cadauera seruauimus, tum de resiniferis arboribus, tum etiam de piscibus condidit, legendo adnotauimus. Quandoquidem nostrum in primis institutum non est in his commentariis nostras ad vnguem tueri sententias, atque ab erroribus, quibus notati erimus, nos vindicare, sed quantum possumus materiam medicam a mendis expurgare, eamq; illustriorem reddere, & in pristinum candorem restituere conarum. Porro Mumia, de cuius viribus iam nobis differendum est, (ut Arabes tradunt) quam plurimis pollet facultatibus: siquidem secundo ordine cum siccatur, tum exsiccatur: capitis dolores frigiditate obortos absque humorum præsentia mulcet. Medetur hemiplegiæ, paralyti, oris distractionibus, comitialibus, vertiginosisque, si ex amaraci aqua naribus immitatur. Leucoii oleo, sive hyoscyamino grani pondere subacta, ad aurium dolores frigidos vtiliter in eam concuratorem infunditur. Prodest quatuor granorum pondere ex thymbræ decocto resoluta, gulæ cruciatibus. Epota ex zizypharum, hordei, & myxori decocto tribus diebus continuis, ruffentibus opem non modicam præstat. Granorum item quatuor pondere sumpta ex aqua menthæ cordis affectus remouet: cum decocto verò cumini, ammi, & cari, tum ventriculi, tum intestinorum status discutit. Bibitur vtiliter ab alto deuolutis ex siliquæ Aegyptiæ medulla, additis Lemnia sphragide, & rubiæ radice. Haustia trium, vel quatuor granorum pondere singultum inhibet, si tamen ex cumini, & apii decocto assumatur. Erinis inposita, additis moscho, calore, caphura, & oleo balainino, naribus commodè induitur ad diuturnos capitis dolores, præsertimq; cum, adhibitis aliis, contumax morbus non soluitur. Ga-garizatur cum oxymelite aduersus anginam: & ad lienis affectus ex cari decocto vtiliter bibitur: & contra lethalia venena ex decocto tribuli marini, & scordi laserpitii gummi iuuamento non modico sumitur, item ex mero contra scorpionum ictus bibitur, ictusque locis cum recentibus bubulo butyro vtilissime imponitur. Adstringit mumia illita exte-na sanguinis profluuiis, pora verò interna proinde percutulis ad cruciatis creationes. Ex caprillo hæc pota opitulatur exulceratæ vesicæ, internis penis desquamationibus, & vrinam agræ conticientibus. Noxæ sunt qui credant, humano-rum cadauerum ossa in puluerem redacta, & in poru exhibita variis corporis languoribus prodicisse, os suum vnicuique membro tribuentes. Quod penitus refellendum non est: si quidem ipse pluries vidi in comitiali morbo cranium humanum in puluerem redactum maxime proficisse, sicuti etiam calcu-ossis renibus, & eorum doloribus. Sed ad Bitumen redeamus, à quo nos penè disiunxerat mumia, ne a nostro instituto recedamus. Huius meminit Galenus libro x. i. no. simp.

Mumia  
Erres.

Bitumi-  
ni hyslar.

et vres

ex Gale-

simpl. medic. sic inquit. Bitumen, vnum & ipsum est ex iis, quæ in aqua marina proueniunt, & in alia quapiam, quæ non est marinæ diffimilis, vt in Apollonio Epiri, & per alia id genus loca, multis aquis sponte nascentibus, cœu spuma quædam innatans hoc medicamen reperitur, & molle quidem est, dum innatat, postea verò resiccaturum pice sicca durius efficitur. Optimum verò bitumen in mari, quod mortuum vocant, prouenit. Est autem id stagnum 10  
salsum in cœle, hoc est caua, Syria. Cæterum medicaminis ipsius vis est tum resicatoria, tum excofactoria in secundo ordine. Merito itaque eo vtuntur & ad glutinationes vulnerum cruentorum, & ad alia omnia, quæ excidari debent cum modica excofectione. Nomen eius Græcum est *βίτην*, Latinum, Bitumen: Arabicum, *Hafal iendi*, siue *Chefer Aliheud*: Italicum, *Bitume*, & *Aspalto*: Germanicum, *Iuden leim*. *πύρεξ* verò sic Græcis dicitur, vt Latinis *Pissaspalum*: Arabibus, *Mumie*, *Mumiy*, seu *Mumia*: Italis, *Pissaspalto*: Hispanis, *Cera de minera*.

Nomen.

CYPRESSVS.

CAPVT LXXXVI.



CYPRESSVS 30  
refrigerat, & astringit. Cuius folia ex passo, & exiguo myrrhæ pota, vesicæ rheumatismis, & vrinæ difficultati auxiliantur. Pilulæ autem ex vino tussæ in dysenteria, alui fluxione, tussi, & ortho-

pncea, aut si reiiciatur sanguis, conuenientissimè bibuntur: earum decoctum eisdem præbet effectus: tussæ cum fico durities emolliunt, nariumque polypo medentur: in aceto coctæ, & cum lupinis detritæ scabros vngues eiiciunt: hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant. Pilulæ cum arboris coma suffitæ, culices abigere existimantur. Folia trita, & imposita vulne-

ra conglutinant, sanguinem supprimunt: trita ex aceto capillum tingunt: illinuntur per se, aut cum polenta ignibus sacris, vlceribus quæ serpunt, carbunculis, & oculorum inflammationibus, admoda cum cerato stomachum corroborant.

TAM ET SI Cupressus arbor notissima sit in Italia: quin etsi vulgaris sine notitia eius fructus, quos tam Græci, quàm Latini conos appellant, attamen cum nihil de eius historia memorie prodiderit Dioscorides, vt lectoribus vndequeque sit satisfactum, hic nobis differendum est, quantum hac in historia à Plinio, aliiisque nonnullis edocti, cognoscere quimus. Aduena igitur quondam fuit Italix Cupressus, & difficillime nascentium, natæque morosa, vt quæ in educatione plurimum diligentia expectat, & præsertim in locis, vbi suapte natura non prouenit. Tradiderunt veteres cupressum Diti sacram: & ideo funebri signo eius ramos ante domos ponere solebant, vbi aliquis desunctus iaceret. Ex quo more credetur eius ymbra inausa, nec quidem gratiosa. Duo habentur Cupressi genera, mas scilicet, & foemina: hæc meta in fastigium conuoluta: ille verò ramos in latus spargens. Harum patria, ac proprium natale solum Creta insula est. nanque mihi quocumque loco terra moueatur, subsædique sit, nisi serantur alia, hæc sua sponte gignitur, atque protinus emigrat. In Idæis etiam montibus, qui ad Troadem spectant, non appellato solo, Cupressus numerosa sponte profilit. Quod admiratione non vacat, alibi non nisi tempore, & perquam diligenti cultura proueniens, & cultorem magnopere fastidiens.

Odere Cupressi flumina, lacus, omnesque aquosos tractus, quo fit, vt in eiusmodi locis satæ confestim inarescant. Quod si rectè sciuisset Adamus Lonicærus, non tam facillè (vt puto) scripsisset, cupressum humidis gaudere locis. Aspernantur & sinum, quo etiam, si circumfossura impleatur, non multo post tempore pereunt. Mira est Cupressi fecunditas: etenim trifera est. colliguntur eius conis mensibus Ianuario, Maio, & Septembri. Semen iis innascitur, granis adeo pusillis, ac minimis, vt atomis comparari possit: ob id enim agere perspicitur. non omittendum naturæ miraculum, ex tam paruo semine gigni tam proceras arbores. Semen mirè formicis expetitur, ampliato etiam miraculo, tantuli animalis cibo absumi natalem tantarum arborum. quo fit, vt fructifera Cupressi nunquam formicis sine deficiat. Cupressus perpetua coma viret, eiusque materies nec cariem, nec vetustatem sentit, vt etiam cedri, ebeni, loti, taxi, buxi, & oleæ. Proinde veteres non aliam ob causam ex cupressina materie simulacra sculpebant, nisi quòd ad æternu-

Cupressi historia.

Adamus Lonicæri lapsus.

nam.

nam diuturnitatem permanfura putarent, veluti Romæ illud Ionis in arce. Fert & Cupreffus liquidam refinam larigæa fimilem, fapore verò acerrimam. Reliqua femina tradunt, foliis cupreffis tufis fi mifeantur, à vermiculis quibufeunque non tangi, neque erodi. Lignum autem (vt aiunt) nulla temporis diuturnitate fuauolentiam exuit. Sunt qui pufillam cupreffum, nonnullis etiam Cupreffo vulgò dictam, abrotonum feminum vocent, à fimilitudine, quam hæc cum arbore in multis habet. Idcirco nec fortaffe aberraret, qui certò crederet, Plinium libro x x i i i . capite x v . de chamæcypariffa herba differentem, de hac intellexiffe: præfertim cum tradat, ipfam ex vino potam contra ferpentium omnium venena, fcorpionumque iclus pollere: fiquidem & noftra hac ætate plerique abrotonum feminum ad idem vfurpant. Quod item ad alui tinea necandas bellariis immifeent, vt arte pueros ad comedendum alliciant. Herufti hanc Santolina vulgò nominant, de qua cum libro tertio in abrotoni mentione nobis latius fit differendum, hic plura dicere fuperuacaneum efferet. Cupreffus meminit Galenus libro v i i . fimplicium medicamentorum, fic inquit. Cupreffus folia, germina, pilulæ recentes, & molles magna vulnera conglutinant in duris corporibus: ex quo clarum eft, quòd reficandi vim habeat absque infigni acrimonia, aut caliditate, ficut certè & gultus reficatur. Apparet enim in ea leuis quidem acrimonia, fed plurima amaritudo, multoque etiam plus acerbicatis in tota planta. Tanta ei inest acrimonia caliditasque, quanta facis fit deducendæ in altum acerbitati, ac nullam tamen mordicationem, aut caliditatem in corporibus efficiat. Proinde in alto latentes in flaccidis, putrefcentibusque affectibus humiditates innoxie, tutòque depafciunt, atque abfumit: cum quæ exalfaciunt fimul, deficcantque, eas quidem quæ continentur, abfumant: cæterùm acrimonia, & caliditate alias attrahant. Sic enteroclicos iuuat: fiquidem exiccat, robisque addit corporis partibus præ humiditate laxis, vt pote cum adftrictio in altum fubeat, deducente ipfa caliditate, quæ admiffa eft, cum feruente modum, vt deducere quidem valeat, non tamen mordicare queat. Quidam ea vtuntur ad carbunculos, & herpes polenta mifcentes, tanquam abfumat citra exalfactionem eos morbos facientem humiditatem. Sunt qui ad eryfipelata ventur, admiffa nimirum polenta cum aqua, aut oxyrato aquofo. *Κυπάρις* Græcè vocatur: Latine, Cupreffus: Arabicè, Sarò, aut Seru: Italicè, Cipreffo: Germanicè, Cypreffien: Hispanicè, Cipres: Gallicè, Cypres.

## I V N I P E R V S.

CAPVT I XXXVII.

I V N I P E R I genera duo: altera maior, altera minor. vtraque acris eft. Ex-



calfacit, & vrinā mouet: accensa ferpentem fugat. Baccarum nonnullæ nucis iuglādis magnitudine nonnunquam grandeſcere, aliæ nucem Ponticam æquare inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandendo

dulces, ſubamaræ, quæ arceuthides etiam, id eſt, baccæ Iuniperi, nominantur. Modicè calfaciunt, & aſtringunt, ſtomacho vtilis: contra peſtoris vitia, tuſſim, inſtillationes, tormina, & ſerpentium iclus efficaciffimè bibuntur: vrinam cient, vnde ruptis, conuiſſis, & vuluæ ſtrangulatui ſubueniunt. Folia acrimoniā habent: ideo tam ipſa, quàm eorum fuccum ex vino contra viperarum morſus illini, aut bibi prodeſt. Corticis cinis cum aqua illitus, lepras eximit.

REPERIUNTUR Græci Dioſcoridis codices (vt etiam adnotatum reliquit Marcellus) in quibus Iuniperi caput proruſ depauiatum legitur, quibuſdam additis, quæ Dioſcoridis doctrinā minimè ſapiunt. Siquidem nec Galenum, nec item Paulum Aeginetam, miniſque Serapionem, qui tamen verbò tenus Dioſcoridis ſcripta per capita ſingula refert, illud vſquam poſterioritas memorie prodidiſſe conſtat, quòd ſcilicet ramenta ligni Iuniperi epota homines perdant, præfertim cum eius baccæ contra ſerpentium iclus efficaciffimè deuoerentur: bibaturque, ac illinatur foliorum expreſſus fuccus ad viperarum morſus. Adde etiam quòd factò periculo id omnino falſum eſt deprehendatur. Quare non modò non credendum, ſed ne cogitandum quidem, eiufmodi ineptias à Dioſcoride ſcriptas: quin potius illi adſcriptas eſſe exiſtimandū. His ergo rationibus adductis, non temerè partem illam, vt pote additiuā, ex hoc capite reſecandam duxi. Maior, & minor Iuniperi ſpecies in pluribus Italice locis reperitur. Tuſcia vrbanaſalut, quæ in proceram arborem aſſurgunt, viſunturque hæ frequētes in agro noſtro Senenſi: quarum

Iuniperi  
confidera-  
tio.

Cupreffus  
puſilla.

Cupreffus  
vires ex  
Gal.

Nomina.

rum fructus sylvestribus & crassior, & dulcior habetur. Iuniperi materies ad centenarios annos incorrupta perdurat: proinde iussit Hannibal (vt Plinius tradidit libro x v l. cap. x l.) templum Dianæ Ephesæ Iuniperinis trabibus extrui, quod per multas ætates esset duraturum. Igitur mirari non licet, si chymistæ assueverant, carbonem Iuniperinum accensum, & suo cinere obrutum ignem integro anno fouere. Profert ex se Iuniperus gummi mastichæ simile, quod & Sandaracham, & Vernicem appellant. Hoc primum cum metitur, candido spersedescit colore: senescescens vero in rufum abit. Porro haud ignorandum est hanc Arabum sandaracham à Dioscoridis sandaracha perquam longe diffidere. Nanque Græcis sandaracha est fossilis ad arsenici, siue auripigmenti genera referenda, erodens, & exitiale medicamentum, vt amplius in quæto libro, Deo duce, dicemus. Verùm hæc sandarachæ nomenclatio in gummi Iuniperi inuestita fuit à medicis, qui Mauritianos secuti sandarach Arabicum nomen (sic enim Arabes Iuniperi gummi vocant) in sandaracham conuerterunt. Quamobrem illud adnotandum esse videtur, quod vbi Arabes, sandaracham medicamenti inserendi esse precipiunt, gummi Iuniperi immiscendum intelligant: vbi verò à Græcis de sandaracha fit mentio, fossilis illa rufa, & auripigmento similis, est intelligenda. Non desunt tamen qui velint Mauritanorum Sandaracham non esse gummi Iuniperi, sed Oxycedri. Quorum equidem iudicio ausim facile subseribere. etenim pauci admodum sunt, qui non putent oxycedrum esse Iuniperum maiorem: adeo vt plerique vulgarij illam ab hac nesciant distinguere. Tradit Plinius libro x l l l. cap. x l. plura gummi genera, vbi gummi Iuniperinum ad nihil esse utile scribit. Cuius tamen frequens vsus in medicamentis contrarium indicat. Quippe hoc syncero, & oleo ex lini semine presso, sit vernix liquidus: cuius est vsus ad illustrandas picturas, & ad nitorem ferri conciliandum: vitilis etiamnum ad ambusta, & præcipuus ad dolores, & tumores hæmorrhoidum. Sicus vernix, hoc est gummi Iuniperi (vt author est Serapio) destillationes suspendit, mensium profusa sistit, sinus exsiccat immixtus, haustus verò pituitam, quæ ventriculo, & intestinis hæserit: tineas & cætera ventris animalia necat. Nervorum resolutionibus, quas humores frigidi contraxerint, opitulatur. Capitis destillationes suffusi discutit. Idem exceptus sanguinis excretaiones suppressit, & hæmorrhoidas fluentes illitus. Addito tum rosaceo, tum myrtino sedis rimas coëctet, & hiantibus frigore manuum, pedumque scissuris illitus succurrit. In summa callicit, & siccit primo recessu. Est & Sandaracha ceruginosi mellis genus apud Plinium, qui de ea libro x l. cap. v l l. ita scribit. Præter hæc conuehitur Erithace, quam alij sandaracham, alij cærinthum vocant. Hic

erit apum, dum operantur, eibus, qui sæpe inuenitur in fauorum inanitatibus sepositus, & ipse amari saporis: gignitur rore verno. hæcenus Plinius. Cæterum oleum, quod ex Iuniperi materie (vt chymistæ dicunt) per destillationem duobus aduersis scissilibus, tum pariter vitreis instrumentis elicetur, calidum ore contentum dentium dolores mirifice mulcet, si tamen frigida defluxione afficiatur. Fit ex bacis hoc longè præstantius, odore perquam iucundo. Iuniperi meminit Gal. libro v l. simplicium medicamentorum, sic inquit. Iuniperus, calida, & sicca vtinque tertii ordinis. At fructus similiter quidem calidus est, sed non similiter: sicus, verum in hoc primi fuerit ordinis. Arbor Græca voce *ἰουνύς* dicta, Latina Iuniperus appellatur: Mauritanici, Acconas, aut Archentas: Italica, Ginepro: Germanica, Vuckholter, & Krametbaum: Hispanica, Enebro: Gallica, Geneure. Eius autem gummi Græci vocant *κίπυρ ἰουνύς*: Latini, Gummi iuniperi: Mauritanici, Sandarach: Itali, Gomma di ginepro: Germani, Verns: Hispanici, Verniz: Galli, Vernix.

## SABINA CAP. LXXXVIII.



SABINA duorum generum est. Vna folijs cupressi similis, spinis horridior, grauior olens, acris, & feruens. arbor est coacta breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit. huius folijs nonnulli pro suffi

tuuntur. Altera tamarici folio similis est. Vtriusque folia nomas sistunt, collectiones illitu mitigant: quin & cum melle illita nigritias, sordisque repurgant, & carbunculos rumpunt: cum vino pota sanguinem per vrinam eliciunt: partus apposita extrahunt, & suffusi idem præstant. Vnguentis calfacientibus immiscetur, & priuatum glucino.

SABINA planta est in Italia vulgaris nominata, illa scilicet, quæ à Dioscoride primo generatim assignatur, folijs cupressi similis, spinosior:

Gummi  
iuniperi.

Iuniperi  
Græci ex  
Galeno.

Nomina.

Gummi  
iuniperi  
Sicæ.

Sandaracha  
alia  
Plinii.

Selago  
Plinij.

exprimere  
quasi uocata  
reprobata

fior. verum eius folia non adeo plenè virent,  
vt cupressi, & in cacumine aculeata conspi-  
ciuntur. Quod tamen saepe imperitis nego-  
tium exhibet: siquidem aliquando vidi pro  
fabina assumi quandam herbam dodrantelem,  
quæ quibusdam in montibus plurima nascitur,  
folio tamaricis, licet nec odore nec sapore Sa-  
binam referat. Hanc sepius existimaui esse Se-  
laginem à Plinio lib. x. x. 111. cap. x. 1. com-  
memoratam. Nanque inibi selaginem esse af-  
firmavit, fabinae similem. Olim selaginem con-  
tenta omnem perniciem habendam prodidere  
Druidæ Gallorum, & contra omnia oculorum  
vitia fuisse potestesse. At tanta extitit tunc  
temporis superstitionum maiorumque vani-  
tas, veluti & hoc xuo apud plerasque gentium  
turbas visitur, vt in nunquam ad selaginem le-  
gendam accederent, nisi prius Diis sacra fecis-  
sent. Quin & eam inuolidam omnino censebant,  
nisi dextra manu, & nudis pedibus legeretur.  
Cæterum non desunt, qui plantam hanc, cu-  
sus hic imaginem damus, negent legitimam Sa-  
binam esse, hoc, ni fallor, argumento, quòd  
hæc bacca proferat, quarum in sua Diosco-  
rides non meminit. Vnde factum est, vt quidam  
putauerint, eam maiorem iuniperum esse, alii  
verò thuiam, quam Theophrastus memorie  
prodidit libro & cap. v. de historia plantarum.  
Verum utriusque, meo iudicio, in errore ver-  
santur: illi quidem, quòd hæc planta nec so-  
lio, nec flore, neque fructu, non materiz, non  
odore, neque sapore, non cæteris denique no-  
tis iuniperum referat: hi verò, quòd thuiam, vt  
est auctor Theophrastus, nascitur apud Am-  
monis delubrum, atque in Cyrenensi agro, for-  
ma cupressi similis cum ramis, tum foliis, cau-  
dice, fructuque, vel potius ceu cupressi syl-  
vestris, præterea quòd, vt idem scribit, thuiæ  
materies omnino incorrupta perduret, nihil  
eius radice crispius sit, atque simulacra ex ea  
antiqui sculpere sint soliti, quemadmodum ex  
cedro, cupressi, loto, & buxo. Hæc autem ar-  
bor conos seu galbulos non fert cupressi mo-  
do, sed baccas: caudice non attollitur longo,  
sed ea breui contenta est: materie non con-  
stat incorrupta solidaque, sed caduca & fungo-  
sa non vt thuiam peculiaribus locis gaudet, sed  
vbique ferè locorum nascitur. vt hinc maius  
atque euidentius discrimen in iis plantis appa-  
reat, quam vt illorum error, qui eas vnâ fac-  
iunt thuiam, cliribus explodi mereatur. Sed  
certè relinquitur, vt miremur eos, qui stirpem  
hanc, quam depictam exhibemus, veram Sa-  
binam esse inficiuntur, cum nullis careat notis  
ex iis, quas illi Dioscorides reddidit. Ea enim  
arbor conspicitur coactè breuitatis, quæ in la-  
titudinem magis effunditur, foliis cupressi si-  
milis, spinosior tamen: quin & grauius olet,  
& acris feruensque sentitur. Atqui illud nobis  
obiciunt, quòd Dioscorides in describenda  
Sabina nullam baccarum mentionem fecerit.

id mehercule, quòd legatur, non fecit. Sed  
quid dicent ii, si in quâ plurimis plantis ex  
iis etiam, quæ ab omnibus legitime habentur,  
plures nata, & ex quidem præcipue, non-  
nunquam desiderantur? quas nimirum Diosco-  
ridem omisisse credendum est, vel quòd plan-  
tæ essent aliqui vulgo cognite, vel quòd  
omnes earum partes non satis exploratas ha-  
beret, vel alias ob causas, quas prosequi non  
est hic locus: quarum omnium aliqui facillè  
potuit esse, cur Sabinæ baccas non adnotatis  
reliquerit. Addam & id fortasse ex eo euenis-  
se, quòd Sabina frequentior sterilis occurrat,  
quam fructifera. Nam (vt equidem fateri pos-  
sum) inter innumeras Sabinæ plantas, quas  
variis in locis mihi videre contigit, tres dun-  
taxat memini me obseruasse, quæ bacca fer-  
rent, & eas quidem rubentes ac iuniperis  
maiores. Id quòd me quandoque adduxit, vt  
putaui in hoc Sabinæ genere marem & fœ-  
minam reperiri: atque alteram raram esse in  
Italia, quemadmodum eam quoque rarò vidi-  
mus, quam Dioscorides secundo loco repræ-  
sentauit, tamarici foliis similem, non autem  
aculeatam. Ex iis igitur merito colligendum  
esse arbitror, hanc nostram Sabinam esse legiti-  
mam, vt quæ non solum notis Dioscoridis  
de lineationi pulchre respondeat, sed etiam fa-  
cultatibus. Forè petrus Bellonius de arbori-  
bus conscribis differens, iis ineptè satis, meo  
quidem iudicio, Sabinam admiscet: atque in  
ea describenda, quam secundo loco ponit Dio-  
scorides, mihi non parum hallucinatus depre-  
henditur, quòd constanter affirmauerit se vi-  
disse frequentissimum hoc Sabinæ genus in A-  
mano & Olympo Phrigie montibus, tota facie  
iuniperum maiorem referens, magnitudine  
amygdalæ arboris maioris, foliis cupressi per  
omnia similibus, bacca per maturitatem in  
cæruleo nigricantibus, & caudice resinam fe-  
rente. Etenim Dioscorides non tradit quæ sit  
huius plantæ facies, & quæ magnitudo, sed  
eam in foliis tantum à priori variare scripsum  
reliquit. Quòd non alia de causa auctorem  
hunc fecisse reor, quam quòd sciret nullum  
vtriusque, esse in reliquis notis discrimen. Qua-  
re quòd alterum Sabinæ genus tota facie iu-  
niperum maiorem referat, magnitudine amy-  
gdalum arborem æquet, cupressum foliis pro-  
fus æmuletur, & ex caudice resinam fundat, vt  
Bellonius tuum depingit, mihi quidem planè  
absurdum videtur. Sed quòd rem hanc turpi-  
ter confuderit Bellonius, vel ex eomanifestum  
esse puto, quòd quam plantam nunc Diosco-  
ridis alteram Sabinam asserit, eandem paulò  
post arborem illam constituit, quam Plinius  
lib. x. 11. cap. x. 11. Brutam appellat, quasi  
Plinius non meminerit vtriusque fabinae libro.  
x. 111. cap. x. 1. Tantè quidam sœs peragra-  
tionibus tribuendū esse putant, vt non pue-  
deat sepe absurda, & fabulosa, & quæ cu sum-  
mis &

Bellonij  
opinio ab-  
surdum.

mis & probatissimis authoribus pugnent, narrare ac scriptis tradere. Neque certe id propterea dico, quod peregrinationes damnum, quas semper, Galeni exemplo, vtilissimas auxi ad legitimam simplicia medicamenta cognoscenda. Sed optarem, vt it, qui multas regiones peragrarunt, illa tantum in mediū proferrent, quæ essent rationi & veritati consona, & veterum scriptorum auctoritate comprobata. Quod si à Belonto, qui tot terras fe peragrasse profitetur, factum esset, nimirum eas laudes iure sibi comparasset, quæ rei medicæ inquisitoribus maximæ debentur. Atque hæc obiter dicta sint. Quod autem idem Bellonius primum Sabinæ genus eam arborem suspicetur, quam Theophrastus thuiam nominat, non miror: nam & alii idem sentiunt. Verum quandoquidem hanc opinionem superius abunde (ni fallor) improbauimus, ideo hic non est vt plura addamus,

*Sabina  
res ex  
Galen.*

arque idem repetere superuacuum esset. Reliquum igitur est, vt Sabinæ suas vires reddamus: de quibus Galenus libro v. simplicium medicamentorum differuit iis verbis. Sabina ex numero est fortiter excitantium, idque secundum tres qualitates, quas in gulta præ se fert, similiter cupressæ, nisi quod ea & acrior est, & vt sic dixerim, magis aromatica, seu odoratior. Igitur huius, quam modo dixi qualitatis est particeps, nempe acrimoniam consistentis in temperamento calido, præterea amaritudinis, & adstrictionis obscurioris, quam in cupressæ. Siquidem quantum magis acrimonia superat, tanto etiam potentius digerit. Itaque glucinare nequit ob siccitatis, & caliditatis robur. nam vtriusque illi tantum inest, vt etiam tendat, & inflammationem afferat. Ac putredinibus similiter cupressæ accommodari potest, maxime vbi rebelliores fuerint, & diuturniores. nam hæc citra noxam vim medicamenti perferunt. Quin & quæ atra sunt reddita, & admodum sordida, ea cum melle expurgat: carbunculos item soluit. Porro essentia tenuitate menses quoque prouocat, vt si quid aliud, & sanguinem per vrinas mouet. Foetum etiam viuentem interficit, & mortuum eiecit. Eflo autem hoc medicamen terri ordinis, tum exaltescentium, tum deficcantium ex numero eorum, quæ vel maxime tenuium sunt partium. Et hoc vique nomine vnguentis inditur, & maxime glaucino, & in multas antidotas iniicitur. Quidam verò etiam cinnamomi vice duplum eius subiciunt. Est enim extenuandi, & digerendi facultatis, si epotum fuerit. ἡ δὲ ὄντιν, Sabina Latine vocatur: Arabice, Abel, Abhel, seu Alharar: Italicè, Sabina: Germanicè, Seuenaum: Hispanicè, Sabina: Galicè, Sawiniera, aut Sauinier.

*Nomina.*

• CEDRVS. CAP. IXXXIX.

• CEDRVS arbor magna est, ex qua picem colligunt, quæ cedria vocatur. In-

niperi modo baccas parit, baccarum myrti magnitudine, rotundas. Cedria optima est crassa, perlucida, grauis odoris: quæ dum effunditur, guttatim non dissipata coit. Cui ea vis inest, vt defuncta corpora conferuet, & viuentia corrumpat: quæ ex causa mortuorum vitam aliqui eam appellauerunt. Vestimenta quoque, & pelles eximia calfaciendi, & siccandi dote, corrumpit. magni ad ocularia medicamenta vsus: quippe illita oculis claritatem affert, albugines cicatricèsq; de tergit: instillata autem cum aceto, vermes aurium necat: cum hyssopi decocto infusa sonitus, sibilosq; sedat: canis dentium indita eos frangit, & dolores lenat: idem facit cum ex aceto colluitur, peruncto ante coitum genitali, concipiendi vim adimit: anginæ ea perunguntur, tonsillarum inflammationibus auxilio est: lentes, pediculosq; illitu enecat: cerastæ moribus cum sale imposita subuenit: contra hausta leporis marini venena, in passo sumpta, auxiliatur: in elephantia aut linctu, aut perunctione proficit: pulmonum vlcera purgat, & sicyathus eius absorbeatur, persanat: vermes, & tineas subter indita necat, & partus extrahit. Fit & oleum à cedria separatim dum coquitur, velleribus supra halitum eius expansis, vt in pice. Eiusdem ad omnia vsus: priuatim vehementer perunctum, scabiem quadrupedum, canum, bouumque persanat: iisque inhaerentes ricinos enecat, & vlcera, quæ ex tonsura acceperunt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus vocantur. Calfactoriam vim habent: stomacho aduersantur: auxilium sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguriæ: menses ciunt ex polline piperis poti: contra haustum leporem marinum in vino sumuntur: serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino, aut medulla, corpore. In antidota additur. Fuliginem, quo modo ex pice, congeri oportet: quæ eandem, quam picea fuligo, vim præbet.

• CEDRVS





*Cedri arboris consuetudo.*

CEDRI arboris Theophrasto, Plinio, & Galeno duplex est genus, nempe maius & minus. Maius omnibus arbor est eximie magnitudinis, & proceritatis, atque à minori planè differens materie, cortice, foliis, & fructu. Plinius maioris cedri duo genera facit lib. x 111. cap. v. ubi ita scribit. Et maioris cedri duo genera, quæ flores, fructum non fert: fructifera non flores, & in ea antecedentem fructum occupat nouus. semen eius cupressi simile. Quidam cedrelaten vocant. Ex hac resina laudatissima materia verò ipsi aternitis. itaque & simulacra deorum ex ea factitauerunt. Et libro x 1111. cap. v. idem inquit. Cedrus magna, quam cedrelaten vocant, dat picem, quæ cedria vocatur. hætenus Plinius. Qui fortasse non ineptè magnam cedrum cedrelaten appellauit, quoniam cedri arbores, quæ in monte Libano proueniunt (vt mihi retulerunt amici, qui vniuersam ferè Syriam peragrarunt) tota facie abietem referunt. Abies autem Græcis *βαρυ* dicitur, vnde cedrelate poterit cedrabies Latine reddi. Arbor hæc (vt iidem mihi narrarunt) ad eam magna & proceræ est, vt nusquam arborem se vidisse affirmant, quæ cedrelaten magnitudine excellat. Cortice vestitur læui & glabro, ea parte excepta, quæ à terra ad primos vsque ramos attollitur: hæc enim aspera cernitur. cor 30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
260  
270  
280  
290  
300  
310  
320  
330  
340  
350  
360  
370  
380  
390  
400  
410  
420  
430  
440  
450  
460  
470  
480  
490  
500  
510  
520  
530  
540  
550  
560  
570  
580  
590  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
660  
670  
680  
690  
700  
710  
720  
730  
740  
750  
760  
770  
780  
790  
800  
810  
820  
830  
840  
850  
860  
870  
880  
890  
900  
910  
920  
930  
940  
950  
960  
970  
980  
990  
1000

fundit albam, & liquidam: sed tractu temporis, solis feruore in grumos concresecit. Sunt qui asserant, hanc cedrum duplicem resinam ferret: atque alteram intra corticem vomica modo coaceruari, vt abiegnam lacrymam in abiete oriri superius diximus: alteram verò extra corticem emanare. vtranc; ab arbore cedriam nominant. Hæc sunt, quæ de magna cedro à peregrinis accepi. In quibus vtiq; admirari subit, quod Theophrastus, & hunc fortè secutus Dioscorides scripserunt indifferenter cedri genus omne fructu edere iuniperi baccis similem, crassiorē. nā reuera Cedrus magna, de qua hic tantum scribit Dioscorides, conos parit piceis similes. Porro Cedrus cor habet durissimum, ac odoratum, colore perinde rubens atque larignum. Tota cedri materies durissima. quam ob causam credidere maiores, eam neque cariem, neque vetustatem sentire, sed æternam esse. Quæ etiamnum ratione ductus Salomon Hebræorum rex Dei optimi maximi templum Hierosolymis ex cedri materie extruendum curauit. Ex ea quoque præci simulacra factitarunt, exsistimantes tantam illis inesse diurnitatem, quantum marmoreis, aut metallicis. Cedri materies optima nauigis non modò extruendis, sed & palatiorum, & arcium fabricis conueniens: quippe quoniam incorrupta quasi in perpetuum perdurat. Cedrus saxosus & trigidis locis gaudet, & montes amat præ cæteris tractibus. Perpetua coma viret, quæ si castritur, decacuminata demoritur, nec inquam inde rege minat, vt pote & cupressus, pinus, larix, & aliarum plures. In Aegypto ac Syria (vt Theophrastus & Plinius narrant) reges inopia abietis cedro ad classes feruntur vti. Maxima ea in Cypro traditur ad venedicem Demetrii sue cisternam triginta pedum longitudinis, crassitudinis verò ad trium hominum complexum. Cedri minoris cedri binæ tem species sunt (vt prædicti auctores testantur) Lycia, & Libani

nia, iuniperi similitudine. differunt folio : nam  
 Phœnicia folium habet iuniperi, durum, spi-  
 nosum, acutum, & ob id oxycedros appellatur.  
 Lycia verò folio constat minore, frequentiore,  
 longè minus aculeato, vt ita iuniperum parua  
 quadantenus referat: cortice obducitur subru-  
 bro, & ramos emittit lentos, vitillum instar.  
 Vtraque omni tempore fructum gerit : verum in  
 oxycedro maior & pulchrior spectatur.  
 Phœnicia cedrus frequentissima nascitur in  
 Istria, atque etiam in nonnullis Iapidia locis,  
 iunipero admodum similis, nec nisi fructu dif-  
 ferens, maiore, rubente, ac dulci: quo tamè eam  
 incolæ à iunipero nesciunt scernere. At cum  
 ipse oxycedri ramusculum efflem donatus à Ge-  
 orgio Reffingero primario provincia Carnio-  
 lia medico, qui illum ex Pefino Istriæ oppido  
 secum attulerat, rubentibus bacis vndiq; re-  
 fertum, eadè in memoria haberem, quæ apud  
 Theophrastum, Galenum, ac veteres alios le-  
 geram, mihi quidem fructum inuenti statim  
 inclinauit animus, hanc plantam minorem esse  
 cedrum. Etenim (vt memorant stirpium scri-  
 ptores tum veteres, tum recentiores) difficile  
 admodum esset discernere oxycedrum à iuni-  
 pero, nisi huic caruleus, pumilusq; illi verò  
 flauus rubensve, ac grandior fructus inesset.  
 Eam igitur plantam, quam in Istria nasci dixi-  
 mus, & cuius hic effigiem damus, non maioris  
 cedri genus vllum, sed minoris speciem esse  
 censuimus, nimirum Phœniciam, quæ & oxy-  
 cedros vocatur. De Lycia autem cedro quid  
 sentirem, vel quam plantam pro ea in medium  
 proferrem, hæcenus non habui, vt quæ mihi  
 planè incomperta esset. Sed hoc anno, dum  
 Pragæ Bohemorum ago, plantam mihi ostendit  
 Adamus Leonorus spectatæ doctrinæ, & magne  
 spei iuuenis, ex quibusdam Morauia  
 montibus à quodam vulgari herbario pro Sa-  
 bina allatam. Vt autem ille hanc veram cē-  
 drum Lyciam adinuenit, & pro ea mihi de-  
 monstrauit, ita mihi eius cognitionem illi ac-  
 ceptam referre iucundum est : atque ideo ipsam  
 picturam, quam hic damus, exprimere curauim.  
 Huius plantæ folia si digitis atterantur, suauis-  
 simum spirant odorem, illi quadantenus simi-  
 les, qui in pinorum strobilis percipitur. Ea  
 baccas profert, longè tamen minores quam al-  
 tera, quæ in ramusculorum tantum cacumini-  
 bus prodeunt. Hæ non secus ac illæ primò  
 exortu virent, mox flauescunt, denique ru-  
 bent ubi plenè maturuerint. Saporem habent  
 subamarum, atque non obscure odorata sen-  
 tiuntur. Minat ab arbore cedri (vt supra dictū  
 est) etiam resina, quæ propriè Cedria dicitur,  
 vtilis ad multos in medicina vsus. Sed hanc  
 ad nos non adferunt Cyprii, neque mercato-  
 res, qui ex Syria mercimonia conuehunt: ta-  
 menti regiones illæ plurimè (vt aiunt) cedris  
 maioribus scæant. Petrus Bellonius lib. 1. 1.  
 de medicato fœnore, item libro de coniferis  
 arboribus putat, non item cedrum Cedriam

fundere, sed & piceam, tedam, laricè, cupressum,  
 iuniperum & betulam. Quinciam idem  
 suis malè excogitatis cedris eas omnes facul-  
 tates assignauit, quas Dioscorides, Galenus,  
 & alii quam plurimi auctores cedria duntaxat  
 reddiderunt : adeò vt magno ac ridendo erro-  
 re dixerit suas hæc cedrias defuncta corpora  
 conseruare, quænamadmodum ea conseruat le-  
 gitima cedria, quasi idem quoque velit, quòd  
 picea, pinus, larix, cupressus, iuniperus, & be-  
 tula nullis prorsus inter se facultatibus differ-  
 rant. Neque certè alia videtur mihi auctori-  
 tate vel ratione ductus, vt in hanc iuerit sen-  
 tentiam, quàm hæc, quòd scripserit Plinius li-  
 bro x v 1. cap. x 1. piceam in Syria cedrium  
 vocari. Sed quòd Bellonius maximè hallucin-  
 etur, vt piceam qui Plinium non rectè intellex-  
 erit, ex verbis Plinii, quæ modò subiiciam,  
 satis, vt puto, manifestum fiet. Pice, inquit,  
 liquida in Europa è teda coquitur naualibus  
 muniendis, multòsque ad alios vsus. Lignum  
 eius concisum furnis vndique igni extra cir-  
 cundato seruet. Primus sudor aque modò fluit  
 in canali. Hoc in Syria cedrium vocatur, cui  
 tanta vis inest, vt in Aegypto corpora homi-  
 num defunctorum ea perlusa seruentur. Ex iis  
 Plinii verbis non aliud (meo quidem iudicio)  
 intelligi potest, quàm quòd Syri liquorem il-  
 lum cedrium vocauerint, quoniam olim in ce-  
 dro tantum piceam suam conficiebant, vt ea  
 in Europa è teda fit. Quòd autem picea ex ce-  
 dro paretur, auctores esse possunt Dioscori-  
 des, Galenus, & Plinius : non tamen contrà,  
 quòd cedria ab aliis resiniferis plantis defuat.  
 Adde quòd à veteribus, nempe Theophrasto,  
 Dioscoride, & Galeno, nusquam (quod equi-  
 dem sciam) memorie proditum est, resinæ  
 aut piceis genus vllum defuncta corpora con-  
 seruare, & viuientia corrumpere, præter ce-  
 driam, quæ quæ omnes illi id scriptis tradide-  
 runt. Ex quo abunde constare arbitror, Plini-  
 um quidem loco citato de pice tantum ce-  
 dri scripsisse, Bellonium verò in hoc similiter  
 hallucinatum fuisse, atque in aliis pluribus re-  
 bus, vt aliquando, Deo iuvante, latius osten-  
 demus. Cæterum variat in Dioscoridis codi-  
 cibus de cedria lectio. Quippe vulgata hæc  
 ὡς ἴσμεν habet, id est grauius odore, cum tamen  
 antiquissimus codex manu scriptus habeat ὡς  
 ὡς ἴσμεν, id est vehementer odore. quod indi-  
 cat cedriam esse vehementer odoratam, non  
 autem grauius olere. Quod etiam maximè tes-  
 tatur Virgilius libro v 1. Aeneidos his ver-  
 sibus de Circe canens.

Proxima Citeræ raduntur litora terræ,  
 Dives inaccessos ubi solis litora lucos  
 Assiduo resonat cantu, testisq; superbis  
 Virid odoratum nocturna in lumina cedrum,  
 Arguto tenues percurrens pectine telas.  
 Gummi cedri meminit Eufhisius vir eruditissimus  
 libro illo de componendis medicamentis, in  
 tis, quos postremò locupletatum excudit, in

compositione antidoti Michridatis: proq; eo, quando non possit inueniri, lacrymam abietis substituendam præcepit, ratus utique eandem vtrique facultatem inesse. At ego quidem Galenum secutus malum sadanum substitui, donec ab aliis aptiora proferantur, quorum meliori iudicio subscribendum sit. Neque inest fortasse iuniperinum gummi illius vicem supplere poterit: quandoquidem constat omnibus rei herbarie studiosis tantam inter cedrum & iuniperum esse similitudinem, ut altera ab altera vix discerni possit, nisi ea esset differentia, quæ in bacis vtriusque manifeste apprehenditur. De Citris autem, quibus aurea totius fere Italix viridaria exornantur, tam in Tyrreni, quam Benaci litoribus in frequentibus, capite de malis, ubi ipsorum mentionem facit Dioscorides, adiuvante Deo, plura dabuntur. siquidem arbor illa ab hac, de qua nunc agitur, plurimum differt. Cedri meminit Galenus libro v. i. simplicium medicamentorum his verbis. Cedrus specie duplex est, altera fruticosa iuniperis adsimilis, altera arbor non exigua. Vtraque est calidæ, siccæq; temperaturæ tertii quodammodo ordinis secundum vtrunque. Cæterum Cedrea (vocatur ita cedri oleum) quantum etiam ordinem videtur attingere, abunde calida simul, & tenuium partium. Molles itaque carnes promptè citràque dolorem putrefacit, sicut alia omnia, quæ cum eiusdem sint in calfaciendo ordinis, adiunctam etiam habent substantiæ tenuitatem. At in duris plussculo tempore, & vix operatur. Porro talia omnia medicamenta septica vocantur, & septa: sed inter sese maioris, minorisq; ratione dissident. Est autem in hoc genere medicamentorum ex primo, & infimissimo ordine cedrea: pleraque enim eorum admodum sunt efficacia. Talia itaque & mortuorum corporum carnes corumpunt: ac cedrea excicat, simulq; à corruptione tuetur corpora demortua, vtpote humiditates eorum superfluas depascens, cæterum solida corpora haud attingens. At in viventibus calor ipse, qui in corporibus est, cedrea vires adspiciens, causa efficitur, ut teneat ab ea carnes deurgatur. Nec mirum videri debet, si cum tanta polleat potentia lendes, pediculos, & tineas, & in auribus natos vermes interficere valeat, tum forum apposita viventem quidem interminat, mortuum autem etiam, sicut sine etiam in coitu semen, pudendo circumlit. proinde conceptum impediens est medicamentum, si sic vris, nulli secundum aliaq; multa eiusmodi particulatim efficit. Itaque argumentum est, ipsum valenter excalescere, sicut ubi dentium foraminibus instillatur, siquidem dolores eorū mitigat, sed & ipsos confringit. Extenuat quoq; oculorum cicatrices, & visus hebetudini ab humorum crassitudine ortæ medetur. Porro quod eius est pinguisimum, & ad inguem oleosum, quod su-

spensis supra eam dum coquitur, lanis excipitur, ac colligitur, tota cedrea tenuius quidem est, sed minus acris, quamquam non minus excalescens. Eandem quippe rationem habet ad id quod reliquum est cedrea, crassius illud videlicet, quam oleum ad amurcam. Proinde illud vtpote crassius, mordax est, & maiore aperienti facultate præditum. Itaque vlcera irritat, phlegmonemq; illis excitat. Porro oleo-  
10 si illa cedrea aded clementibus est viribus, ut etiam plebei experientia docti vulnera oibus occasione tundendi à forfice facta, illa illita sanent, sicut etià pice humida. Vtuntur autem ea & ad ouium scabiem, & ricinos, Græci *αγρίους* vocant. Porro cedrides (nam ita fructum cedri nuncupant) moderatores vires obtinent, aded vt comedi quoque possint. Attamen si liberalius iis vtare, capiti dolorem inferent, ardoremq;, ac morsum in ventre percipies. Quæ arbor Græcis *αδύρα*, Latinis item  
20 Cedrus nominatur: Arabibus, Serbin: Italis, Cedro. Eius autem liquor vt Græcè *αδύρα*, ita etiam Latine Cedria dicitur: Arabicè, Kitran, siue Alkitran: Italicè, Cedria.

† Hic lectorem admonitum volumus, illa de fuligine Cedri verba nō legi in Græcis tum vulgatis, tum etiam antiquis quibuscumq; codicibus. Quare cum neque à Marcello vertantur, qui plura exemplaria Græca habuisse fateatur, ea potius addidit, quam legitima censenda videntur.

## L A V R V S C A P. IX.



L A V R V S  
quædam tenui folio constat, altera latiore. Vtraq; excalescentiâ naturam habet, & enoallientem. Vnde decoctum earum in muliebres infusus additum, vuluæ, & vesicæ vitii conuenit.

Virentia folia sensim substringunt: illita quoque, ac trita vesparum apumque icibus opitulantes: eadem cum polenta, & pane illita inflammatio-  
nem omnem mitigant: sed pota stomachum effundunt, & vomitiones mouent. Lauri bacca magis, quam  
folia

Cedri  
cedrea  
vires  
Ga-  
leno.

Nomina

folia calfaciunt. ergo in eclegmate tri-  
ta cum melle, vel passo profunt tabi,  
orthopneæ, & omnibus thoracis rheu-  
matismis: contra scorpionum ictus ex  
vino bibuntur: vitiligines emaculant.  
Succus baccarum vtilissimè aurium do-  
lori, & grauitati infillatur cum vino  
veterè, & rosaceo. In medicamenta au-  
tem adiiiciuntur, quæ neruorum lasitu-  
dines resciant, acopa vocant: & ad yn-  
guenta, quæ calfaciunt, & discutiunt.  
Cortex radicis calculos rumpit, partus  
necat, hepaticis prodest, tribus obolis  
in vino odorato potus.

laureus, tumq; se propagauit (tame si radicibus  
deflitutus) vt breui tempore ibi mirè sylua pro-  
uenerit. Ex qua triumphans postea Cæsar lau-  
rum in manu tenuit, coronamq; in capite ges-  
sit. Ac deinde imperatores Cæsares cuncti tri-  
phantes lauro coronabantur, tenebantq; in ma-  
nu eiusdem ramos. Quos post triumphos tradi-  
tus est mos ferendi in eminationibus locis in  
celebratis Romæ collibus. Quo factum est, vt  
plures lauro rum syluæ Romæ vireferent, quæ  
ob id laureæ vocabantur: qualis erat, quæ in  
monte Auentino multo ante alios tempore vi-  
guit. Nimirum indicat laurum diis gratissimum  
esse arborem, quæ sui haberet ab impetu fulmi-  
num ratio: siquidem nulla habita, cum è celo  
ruunt, nec diuinitatis, nec principum amplitu-  
dinis ratione, pierunq; temporum turres  
iciunt, superba mundi palatia dilacerant, ac  
sæpius homines immaniter interimunt. hæc  
tamen sola arbor fulmine non percutitur, ni-  
si in futuræ calamitatis prodigium: ac ne qui-  
dem domus, in quibus adsint eius rami, de  
celo tangantur, pro certo creditur. Proinde  
Tyberius Cæsar fulminibus perterritus, co-  
nante celo lauro coronabatur. Laurus ex  
sepe vim habet ignem producenti: quippe si  
exiccate ramus ramo frequentius confrice-  
tur, super asperso sulphuris puluere, ignis sta-  
tim exilit. Eadem perpetua fronde viret, tan-  
taq; pollet vi, vt eius ramis in aruo defixis, ru-  
bigio, maxima segetum pestis, abigatur, tran-  
seatque in earum folia ex aruis. Poetæ perfec-  
tionis signo lauro coronantur, idque præ-  
mium est Apollineorū musas colentium. Cor-  
uus occiso chamæleonte, fronde lauri deuora-  
ta insectum virus extinguit. Quia etiam palum-  
bes, graculi, merula, & alie perplures aves an-  
nuum fastidium purgat. Cæterum lapideus lau-  
ros oriri in mari rubro scribit Theophrastus  
libro 1111. capite 1111. de plantarum hi-  
storia, sic inquit. In sinu autem Heroo co-  
gnominato, ad quem descendunt Aegyptii,  
laurus est, & olea, & thymum: verum non  
viridia, sed lapidis specie parte à mari emi-  
nente, similia tamen viridibus tam foliis, quam  
germinibus. Colos quoque floris in thymo, tan-  
quam nodum perfectè floruerit, liquidò depre-  
henditur. Longitudo arbuscularum cubitorum  
tèrriorum est. hæc ille. Laurum scriptis com-  
mendauit Galenus lib. 1. simplicium medicamen-  
torum, sic inquit. Lauri arboris & folia, & fru-  
ctus deficcant, & calfaciunt vehementer, plusque  
etiam fructus, quam folia. Ad radicis cortex  
minus quidem acris est, & calidus, plus tamen  
amarus, habetque etiam adstrictionis nonnihil.  
Quamobrem & calculos confringit, & ic-  
cori prodest. Bibitur ex vino fragran-  
te trium obolorum pondere. Arbor hæc sic

Lauri  
tura.Lauri  
pidea.Lauri  
res ex  
Ga-  
leno.

Nomina.

Lauri his-  
toria. LAURUS tam tenui folia, quam lac folia ar-  
bor odoratissimi, & si antiquis credimus, Apol-  
lini lucidissimo sacra: quæ inquit à Ioue colitur.  
Vni quoque laurus Romæ antiquitus impera-  
torum potestaticumque domos exornare solebat.  
Quod similiter, atque alii complures gentiliū  
mores, in hunc vsque diem apud nos perdurat.  
Nanque vbi dies festus aduenerit, laurus non  
modo templorum valus decorat, sed & vbi  
dies gentiales adfuerint, ingentium palatiorum  
est ianituix. Quo fit, vt magnis aduentanti-  
bus principibus, lauri frondibus & columnæ,  
& arcus in pacis signum extruantur: siqui-  
dem pacifera laurus est, non secus ac olea.  
Ideo antiquitus etiam, si eius rami præten-  
debatur inter armatos hostes, firmum quietis erat  
indiciū. Qua obseruatione ductus Bernardus  
Clesius Cardinalis amplissimus Tridentinus,  
tum pacis, tum quietis sectator maximus, lauri  
& palmæ floridæ ramum adnectebat, vt nitida  
marmora, præclara metalla, speciosæ picturæ,  
aurea, & argentea vasa, ac reliqua admirâda de-  
monstrant, quibus magna eius palatia fulgēt. Ro-  
manis laurus ferebatur lætitiæ victoriarūque  
signo. Idcirco lauri in tēplis in Iouis gremio  
reponebant, quoties Romæ lætitiæ victoria no-  
ua attulerat. Quinetiā grata Apollini dona vno  
quoq; anno mittere solebant in Parnaso mōte  
quod ibi laurus spectatissima crederet. Cæte-  
rum quod laurus Romæ à Ioue è celo missa  
fuerit, vt ea imperatores coronarentur, facile  
perhiberi potest: namq; Liuix Drusillæ, quæ po-  
stea Augusta matrimonii nomen accepit, cum  
pacta esset illa Cæsari, gallinam conspicui can-  
doris sedenti in hortis aquila ex alto adiecit in  
gremium illæsam, increpidæq; miranti accessit  
miraculum, quod teneret rostro laureum ram-  
um suis baccis onustum. Quod audientes cō-  
seruari alitem, et sobolem insere aruspices, ra-  
mūq; eum seri, ac ritè custodi. Quod factū  
est in villa Cæsariis flumio Tyberis imposita, in-  
tra nonum lapidem flammia aia, quæ ob id  
vocatur ad gallinas. Porro tam creuit ramus

10

30

40

50

vocatur: Latine, Lauri bacca: Italicè, Bacche di Luoro: Germanicè, Lorbeer.

PLATANVS. CAP. XCI.



TENERRI-  
MA Platani fo-  
lia invino deco-  
cta, mox illita,  
oculorum flux-  
iones sistunt:  
tumores, & in-  
flammationes  
leuant. Deco-  
ctus cortex in  
aceto, dentes  
in dolore col-  
luit. Virides pi-  
lula in vino po-

ta, serpentium moribus auxiliantur:  
excepta autem adipe, igni ambusta sa-  
nant. Insidens foliorum, pilularumque  
lanugo, oculos, & aures offendit.

PLATANVS Italiae advena, peregrinæque  
est, quanquam regionem diluvit (vt Theophra-  
stus est auctor) multi, magnique fluvii. Verum  
enimvero si sibi nonnulla virescunt Platani  
plantæ, vt quas ipse Neapoli, & Patavii vidi,  
sunt quidem ex löginquis regionibus allatae, vt  
etiam antiquitus à Romanis per mare Ionium  
inuectæ fuere, eorum duntaxat vmbra gratia  
Romæ expetita, vbi platanis tantum honoris  
increbuit, vt diu nutritæ sint mero radicibus  
infuso. Nanque hæc arbor plurimum vini uti-  
gatione gaudet: tamen si maiorem in modum fon-  
tes, & fluvios amet. Platanus ad amplissimam  
ramorum amplitudinem adfurgit, adeo vt Lici-  
nius Mutianus civis Romanus, Plinio teste, hoc  
prodendum etiam posteros putarit: qui provin-  
ciæ Licie legatus affirmat, in ea fuisse platan-  
um sociam gelidi fontis amenitate itineri ap-  
positam, octoginta atque vnius pedum specu,  
numerofo vertice, se vastis protegentem ramis  
arborum instar, & agros longis obtinentem  
vmbis: ac ne quid dehis speluncæ imagini, fa-  
xæ intus crepidinis corona, muscosos comple-  
xa pumices: intra quam se epulatum cum duo-

Platani  
considera-  
tio.

deugefimo comite, largè ipsa toros præbente  
fronde, ab omni afflatu securum, optantem im-  
bium per folia crepitus, lætorem, quàm mar-  
morum nitore, picturæ varietate, laquearum  
auro, cubuisse in eadem. In Creta insula ad Cor-  
tyniam platanus stetit: fertur apud fontem  
quendam, quæ folia hyeme non amitteret, sub  
qua Ioui compressam Europam indigenæ fabu-  
lantur. Quæ in Italiam inuectæ fuerunt, clima-  
tis inclementia in magnam proceritatem non  
adolefcent: attamen sunt cortice crasso, fronde  
viriginea, lata, longo rubroque pediculo, roscu-  
lo paruo ac pallido, baccis rotundis, scabris, &  
lanuginosis: ex quibus oleum fieri prodidit Plin-  
ius libro x v. capite v 11. Platani vmbra vs-  
que cò delectatum Xerxen in terra Lydia scri-  
bit Aelianus, vt diem integrum sub ea cum ma-  
ximo exercitu consumperit, floccipendens tam  
breui voluptate tot copias remorari. Platani  
aduersantur vesperilionibus. Earum pilulæ ad-  
didito melle, & illitæ, lentigines, veteresque ni-  
grities emendant. De platano disseruit Gal-  
enus lib. v 11. simplicium medicamentorum,  
sic inquit. Platanus humidiorisque essentia  
est, non ita multo quàm symmetra. Proinde fo-  
lia viridia trita, & illita, non obscure phlegma  
na nascentes adiuuant. Cortex autem, & pilu-  
læ magis desiccantem vim obtinent, vt ille qui-  
dem in aceto coactus ad dentium adhibetur  
dolores: pilulæ verò cum adipe ad vlcera ambu-  
sta. Sunt autem omni cortice combusto medica-  
men desiccatorium, & absterforium efficiunt,  
vt cum aqua lepras sanet, per sese autem illitum  
ob humore nimium, vlcera vetera, & fordidæ. Vi-  
tandus est pulvis folii arboris insidens: alioqui  
spiritu attrahatur, arteriam offendit, valenter  
desiccans, & exasperans, vocemque lædit, sicut  
sanè etiam visum, & auditum, si in oculos, aut  
aures inciderit. *Radix* vt Græcis, ita pariter  
Latinis Platanus appellatur: Arabibus, Dulb: Ita-  
lis, Platano.

Platani  
Gires ex  
Galieno.

Nemina.

FRAXINVS.

CAP. XCII.

FRAXINVS arbor nota est. Cu-  
ius foliorum succus, & ipsa ex vino  
potata, & illita viperarum ictibus auxi-  
liantur. Corticis cinis ex aqua illitus  
lepras eximit. Ligni ramenta, scobem-  
que potu perniciem asferre tradunt.

50

FRAXINVS.

DICTAMVM ALBVM.



*Fraxini* **FRAXINVS** arbor est notissima. Eius (vt *historia ex* Theophrastus memoriz prodidit li. 111. cap. x 1.) duo reperiuntur genera: quorum alterū

*Theophr.*

excelsum, procerumque est, lignū habens candidū, crassiuentiū, neruatū mollius, enodius ac crispus: alterum humilius, minus auctile, scabrius durius, & flautius. Folia laurinis, lauri latifoliae similia, in acutius tamē coacta, & ambitu leuiter serrata. Ramulus totus, quem folium vnum putaueris, quod simul cuncta folia ferat, singula ri pediculo, & singulis foliis coniugata, veluti per genicula, pendentibus constat: amplo in teruallo coniugationibus distinctis, perinde atque in sorbo. Fert fructum in siliquis minutum, nucosum, qualem amygdalæ, gustu subamarum. Tradidit Plinius fraxini folia iumentis mortifera, cæteris ruminantium innocua.

*Plinij lapsus.*

Quæ de taxo, nō de fraxino Theophrastus prodidit, iniquens. Si iumenta (vt ferunt) taxi folia comederint, emoriuntur: si ruminantia, nihil incommodi patiuntur. Sed nōminum vicinitate Plinium deceptum esse crediderim: nam Græcis fraxinus *μυρία*, taxus verō *πύλαξ*, & *μύρα* appellatur. Vnde vnū pro altero sumens Plinius, facile (vt diximus) in errorem incidit. Rei fides fuerit in hoc Plinium lapsum fuisse, clara in Italia experientia: siquidem taxi foliis, non fraxini iumenta non ruminantia necantur. Quinimō hæc salutare præstant remedium lethaliſſibus serpentum venenis: quibus adeo inimica est fraxinus, vt ne maturinas quidem occidentisue umbras quālibet spatiosas serpens arboris huius attingat. Quapropter expertum proditur, si fronde ea gyro claudatur ignis & serpens, in ignem potius, quā in fraxinum fugere serpentem. Mira naturæ benignitas,

priusquā hæc prodeant, florere fraxinum, nec ante conditas folia dimittere. Fraxini species sunt Ornus, itemque Orneoglossum dictum, quod ferat semen illud, quod auis linguam appellant, vt ipsum quoque fraxinus fert. De quo differens Plinius lib. x 1111. cap. v 111. meredi id iocineris, & lateris doloribus in vino tradidit: aquam, quæ subdit eum, extrahere: corpus obesum leuare onere, & ipsum sensim ad maciem reducere.

Id quoque in recentiorum medicorum vsu est ad stimulam venerem. Folia fraxineis similia fert stirps illa apprimere celebris, quam vulgò **DICTAMVM ALBVM** nuncupant, ob idque à recentiorū nonnullis pumila fraxinus cognominatur. Hæc nullis tam Græcorum, quā Arabū auctoribus (quod equidem legerim) vsquam descripta est. Quare non possum non admirari, quōnam pacto sibi dictami nomen vendicauerit. Ea est ysa pulcherrima, speciosaque: floribus formosis impensè redolētibus, in purpurea albicanibus, citrei arboris modo. Radix ei candida, odore hirci, amaro sapore: proinde mirum non est, si ventris tinea perimat. Tradunt etiam suapte vi pollere aduersus lethaliā venena, ac omnium venenosorum animalium morsum, istumque, nec minus aduersus pestilentiam. Prodest stomachicis, & suspiciosis. Eliciter è floribus aqua, quæ naribus insula capitis morbos frigidityte obortos mirifice propellit. Quæ arbo Græcè *μύρα*. Latine Fraxinus appellatur: Italicè, Frassino: Germanicè, Eschern, Eschebaum, Steyneschem: Hispanicè, Fresno, & Frexo: Gallicè, Freshe.

*Fraxini species ornus.*

*Dictamni albi compositio.*

*Nomina.*

POPVLVS ALBA.



POPVLVS NIGRA.



POPVLVS ALBA, ET NIGRA.

CAP. XCIII.

POPVLVS ALBÆ populi cortex vnciæ  
vnius pōdere, ischiadicis, ac vrinæ stil-  
licidio prodest. sterilitatem inducere  
tradunt, si cum mulino rene bibatur.  
Folia quoque cum vino post purgatio-  
nes pota idem præstare produntur. Te-  
pens foliorum succus vtiliter aurium  
dolori instillatur. Pilulæ, quæ primo fo-  
liorū partu exiliūt, trita, & cū melle il-  
lita oculorū habetudini medētur. Me-  
morizæ prodiderūt, corticē albæ popu-  
li, & nigrae particulatim casum, & sul-  
cis stercoreatis mandatū, omni tēpore  
anni edules fungos proferre. Populi ni-  
gra folia cum aceto illita, magna vtili-  
tate podagricis doloribus illinuntur.  
Resinam populus fundit, quæ in ma-  
lagmata additur. Semen potum ex ace-  
to comitialibus vtile est. Lacrymam  
populorum commemorant, quæ in  
Padum amnē defluat, durari, ac coire  
in succinum, quod electrum vocāt, alijs  
chrysophorum. Id attritu iucundū odo-  
rem spirat, & aurum colore imitatur:  
tritum, potumque stomachi, ventris-  
que fluctiones sistit.

plantarum, vbi sic habet. Populus alba, ni-  
graque vniformes habentur: ambæ natura ere-  
ctæ, sed excellior, læuiorque nigra: figura fo-  
liorum adsimilis, & ligni materies albedine si-  
milis visitur: vtrunque ne florem quidem ha-  
bere existimant. *Kypis* (quam quidam Alpinam  
quidam Lybicam vertunt) populo albæ non ab-  
similis, cū magnitudine, tū verò quòd ramis  
albicatibus spargitur: folio hederis: sed parte al-  
tera sine angulo, altera verò oblongo, inq̃ angu-  
lū exeūte acutū: colore parte resupina, pronaq̃  
ferme simili: pediculo proluxo, tenuique an-  
nexo. quamobrem non erecto, sed inflexo.  
Cortice asperiori, quàm populus alba, scabriori-  
que vt pyrus syluestris. hæc Theophrastus.  
Priora omnibus passim nota sunt. Sed quæ-  
nam arbos nobis sit *aspule*, non satis comper-  
tum habeo. quanquam in sylua, quàm Gori-  
tientes vulgò appellant il Panauizzo, arbor  
hæc, cuius hic imaginem damus, crescit be-  
tulæ æmula: quæ mihi quidem Lybicam popu-  
lum repræsentare videtur. Plinio hæc libro  
xvi. capite xxi. minima folio est, ac  
nigerrima, fungisque enascentibus laudatissi-  
ma. Alba folio bicolor, supernè candicans,  
inferiore parte viridi. Sed hic Plinius aperte  
errore notatur, quòd hæc contrā supernè vi-  
reat, infernè vero albicet, candida efflores-  
cente lanugine, quæ tamen in nigra non visi-  
tur, vt Plinius existimat, cū indifferenter in-  
quit. Populorum foliis grandissima lanugo.  
Sed & tertio idem errasse deprehenditur: quip-  
pe qui scripserit eodem libro capite xxi.  
populum nec fructum, nec semen ferre, cū  
tamen vtraque fructum ferat, vnarum speciem  
præ se ferentem, intus alba lanugine reſertum:  
atq; etiā scribat Dioscorides, semen ex aceto  
potū comitialibus prodesse. Sed quid opus est  
pluribus,

Plinij pto  
reslap/ato

populorū POPVLVS Theophrasto triplici recenſe-  
tur genere lib. iiii. cap. xlii. de historia  
consilera-  
tio.



Ruellij er  
ratum.

gumenta odorata vteretur antiquitas. Quando-  
quidem Nicolaus Myrepticus non uas, sed ger-  
mina, vere primo prodeuntia admiscet: odora-  
ta enim sunt, & ceraginosi, cum tamen nullus  
proflus uis sit odor. Verum enimvero in anti-  
quitate populi uas odoratis vnguentis admi-  
scuerit, dubitandum sane est. Nam Plinio libr.  
viii. cap. vltimo, ubi de vnguentorum mate-  
ria egit, nil aliud est populi uas, quam bryon,  
Latinis muscus vocatus. Quem etiam præter  
cedrinum, & quoniam præulere ad vnguenta  
Dioscorides, & Galenus, & inter alia odorata  
recensuerunt. Quo fit, ut facile credi possit,  
Plinium errore ductum existimasse, muscum in  
populo nascentem nihil ab eiusdem uis differ-  
re, cum inquit. Eodem & bryon pertinet uas  
populi albæ. Optima circa Gnidum, & Cariam,  
in sitientibus, aut siccis, asperisque locis. Secun-  
da in Lycia cedro. hæc ille. Sed cum cedrus  
nullas ferat uas, sed muscum perquam odora-  
tum, hinc Plinii error manifestè apprehendi-  
tur. Populus utraque frequentissima nasci-  
tur in agro Mantuano, ac Ferrariensi, non modò  
in Padi amplissimi fluminis litoribus, sed &  
per agros, & prata in fossatum aggeribus. Ideo-  
que fabulantur poëta, isti Phærontis fulmine  
forores Ictu mutatas in populos arbores iuxta  
Eridanum amnem, quem Padum vocant, ex corti-  
cis mæribus insilar auratæ lacrymæ, electrum,  
sive succinum fundere, ut adhuc viuētes lacrymas  
effundebant: quæ nostro tempore in orbiculos,  
quibus Deipara virginis formæ salutationes  
enumerant, effinguntur, & vulgaribus & infi-  
mis mulierculis monilium vice, collo gestan-  
tur decoris gratia. Quare Dioscorides, qui  
poëtarum fabellis adhibere fidem haud qua-  
quam censebat, noluit pro comperto fabulo-

Poëtarū  
fabula.

sam succini historiam asserere, sed dubiam,  
& suspensam tenere. Ideoque inquit. Lacry-  
mam populorum commemorant, quæ in Pa-  
dum amnem defluat, durari, ac coire in suc-  
cinum, quod electrum vocant, alii chryso-  
phorum. Ex quo faciliè percipi potest, quod  
cum Dioscorides aliquid de succino suis mo-  
numentis mandare decreuisset, nullam eius  
certam, tenens historiam, ipsum populi ge-  
neri utrique adiunxit: ea tamen ratione id  
diuidicans, quod non alio in huiusce ope-  
ris loco aptius succinum accommodari posset  
Quandoquidem in fabulis nactus esset poëtas  
cecinisse carminibus, succinum populos funde-  
rent: tametsi non ignoraret, succinum populorum  
gummi esse neququam. siquidem huic fabulæ  
datus est locus ob succini innumeros globulos,  
qui olim hinc traieci ab Eridani accolis collo  
suspendebantur. Quippe cum plerique ipsorum,  
præsertim verò fœminæ, ob nimis humidum re-  
gionis aërem in gulæ morbos, ac frustas incur-  
rerent, his existimabant succinum aduersari.  
Quod fortasse non erat ab omni ratione alienū  
namque cum facultatem habeat succinum sistendi  
fluxiones, collo etiam gestatum, facile inhibere  
poterat, ne capitis destillationes in guttur de-  
fluere. Quo fit, ut non demirer, si etiam nū Ger-  
mani in oculorū defluxionibus magno successu  
succineos globulos occipitio adnectant. Repe-  
rio in enarrata Succini historia, auctores copul-  
res, sed re vera admodum varios qui et gra-  
uius (ut historicos decet) hæc de re loquan-  
tur, tamen cum ipsi succini originem nusquam  
viderint, & quicquid de eo scripserunt, aliis ac-  
ceptū referant, hinc nulla, aut sane pauca adhi-  
betur fides. Philemon succinum fossile esse di-  
xit, & in Scythia erui duobus in locis, vno can-  
didum, altero vero croceum. Sudines, & Me-  
trodorus succinum prodiderunt in Liguria ar-  
boribus effluere. quod Sotacus credidit in Bri-  
tannia euenire. Pythias tradidit esse locum in  
Britannia prope Gutones, ubi à fluctibus maris  
non procul ab Abalo insula succinum aduehi-  
tur: quo incolæ ad ignem proligno vruntur,  
ipsūque Tauronis vendunt. Nicias historicus  
succinum solis ardori succi esse voluit: hic enim  
credit radios vehementius aëris in terram pin-  
guem sudorē in ea parte relinquere, deinde gla-  
te sicari, & à fluctibus maris in Germanorum  
litora eici. Idem & Aegypto nasci simili modo  
dixit. Item in India, granatūque thore esse Indis  
Non desuerunt etiam nū, qui succinum na-  
sci tradiderint iuxta mare Atlanticum in lacu  
Cephisside dicto, qui sole excalcatus è limo tun-  
dat electrum. Non desunt præter hos plures,  
qui de succino differentes in diuersis luere

Succini Va-  
ria his-  
toria.



sententias, quas nunc, utpote non probandas, silentio inuoluam. Vnde iure dici potest, succinum apud eos vel cereum, vel figulino luto simile haberi, cum ipsum in tot varias formas, ac imagines transmutauerint. Sed ut tandem referam, quod pro comperto habetur, gignitur succinum in insulis septentrionalis oceanus. Id olim à Germanis Glesum appellabatur: vnde à nonnullis, qui erant cum Germanico Cæsare, ibi classibus rem gerente, una insularum ob succini copiam, Glesaria fuit appellata, quæ prius Austraria à barbaris dicebatur. Hic nimirum (ut Plinius inquit) nascitur succinum arboribus pinei generis defluis in terram, ubi postea densatur. Cum verò intumescens æstus fertur in proximas sylvas, ex iis in se rapiunt fluctus maris, & in Germanorum litora expuunt. Itaque Cornelius Tacitus rectè scripsum reliquit. Germanos huius maris accolæ solos omnium succinum habere, & legere. Quod succinum sit arboris ex pinorum genere lacryma, olim Romanis testimonium perhibuit quidam eorum eques illuc missus ad id comparandum à Iuliano curante gladiatorum munus Neronis principis, qui ea litora peragravit, ipsum vidit, veram eius originem didicit, & secum ingentem copiam Romam inuexit. Præterea succinum esse pineæ arboris gummi indicio est pineus in attritu odor, & quod accensum tedæ & resina modo deflagret. Liquorem esse copiosè stillantem, tenacem, ac lentum, argumeto sunt quedam intus implicita, ut formicæ, culices, ac etiam lacertæ, festuæ, ac paleæ, quæ transparentia inspicuntur. Cum enim hæc animalia, & alia stramenta humoris lentore facillè implentur, durecente deinde materia, veluti carcere includuntur. Hæc partim ex Plinio, partim verò ex aliorum scriptis decerpimus. Tamest rationibus non spernendis probare nitatur Georgius Agricola, succinum non aliud esse, quam bituminis genus, quod à quibusdam scopulorum crepidinibus erupens in mare defluit, ubi aquarum falsedine durefcit. Nam succinum, quod nigerrimum est, ex quo etiamnum globuli ad angelicas numerandas salutationes cõficiuntur, aliquid cognationis cum pissasphaltis habere videtur. Adde etiam quod à pinu, neque ab arboribus aliis refinam per se fundentibus tam pullo colore nulla defluit lacryma. Succinum incoctum adipe lactentis suis expolitur, & red dicitur translucentum, quemadmodum tradit Archelaus, qui rubecum corticibus arboris, ex qua defluit, inherens, se vidisse affirmat contra Agricolæ sententiam. Quo fit, ut de succini historia adhuc lis sub iudice pendeat. Cæterum compertum est, quod sicuti magnes ferrum respuit, si adit adamas, vel si alio affricetur, ita nec succinum ad se paleas allicit, quæ sint oleo persusæ. Verum eorum opinio vana est, qui succinum tradiderunt peculiari dote ocimum respuere: nam ipse siepe ac sæpius hu-

ius rei periculum feci, & semper succinum ad se ocimum trahere comperi. Officinæ comuni nomine succinum vocant Karabe Mauritanos secuta. Licet Brasavolus Ferrariensis in suo de simplicium examine deceptus existinauerit, Arabum Karabe succinum esse nequaquam, sed verum populi albæ gummi, Serapionis, & Auicennæ testimonio: est eorum neuter, sicut nec Dioscorides, quem illi sequuntur, id quidem pro comperto asseuerauerit. Nanque Serapio (ut in omnibus adsolet) quicquid de Karabe adnotauit, verbòtenus ex Dioscoride deprompsit, sic inquit. Et dicitur, quod gummi Haur romi, quod nascitur iuxta fluvium, qui dicitur Eridanus, quando distilat in flumine illo, coagulat ibi, & est illud, quod dicitur Alipton, id est electrum, & sunt, qui nominant ipsum Arspodum, & est Karabe. Eadem sententia elicitur ex Auicenna: quippe qui capite de Haur, itémque capite de Karabe, non asserat eam esse populorum gummi, sed quod ita perhibetur. Nec alia ratione duobus capitibus de Karabe differunt, nisi ut ostenderet, Karabe per se à populorum gummi differre. Præterea comprobat id esse Karabe apud Mauritanos, quod electrum apud Græcos, nominis significatum: quandoquidem Karabe lingua Persica, Auicenna auctore, non aliud designat, quàm rapiens paleas. Quod sensu comprehenditur proprium esse succini, aut electri, non autem populorum gummi. Insuper astringentes pastillos, quos Galenus libro v. de compositione medicamentorum secundum locos, Paulus sui voluminis etià septimo, & Aetius in suo de compositione medicamentorum, electri trochiscos vocant, Arabes de Karabe appellant, eosdem à Galeno, & Paulo assumentes. Quo fit, ut hac in re manifestè aberrasse Brasavolus deprehendatur. Itaque dicendum esse putauerim electrum idem esse apud Græcos, quod succinum apud Latinos, & Karabe apud Arabes. Neque etiam illud ideo populorum gummi esse crediderim, ut Brasavolus asseuerat, quod Paulus quoque dixerit: Electrum populi albæ lacryma dicunt, quæ iuxta Eridanum amnem distillat, & in spissitudinem coit, aureo colore. Nam his verbis non probat electrum esse albæ populi gummi, sed id tantum refert ex aliorum opinione, quemadmodum fecit Dioscorides, quæ secutus est Paulus. Ex his igitur satis patere arbitror, falsum esse, quod idem sint electrum, gummi populi, & Karabe: quin potius clarum, succinum, & gummi populneum esse inter se diuersa. Credidit Demonstratus fieri succinum ex lyncis vrina (quemadmodum credidere pharimacopolæ, & vulgus medicorum ex eadem fieri lapillos, quos lyncis appellant) succinum asserens, quod hauscit, fieri ex vrina maris, alium verò ex vrina foeminae. Quibus refraga-

rum Plinius: quandoquidem ipse manifestè dicat, hoc esse falsum. Quod cum & Dioeles, & Theophrastus credidissent (non autem Dioscorides, vt ei falso Brasauolus imponit de lapidibus lyncis agens) eos eiusdem criminis Plinius accusat. Quòd autem Dioeles, & non Dioscorides (vt Brasauolus putat) huius erroris accusator, ostendit ipse Dioscorides libro secundo, capite de vrina, vbi in eandem Plinii sententiam veniens, hæc verba protulit: Lyncis vrinam, quam lyncurium appellant, simul ac excernitur, glaciari, coiré in calculi duritiam, vulgo creditum est. quare quod de ea proditum est, vanum esse cõuincitur. Est enim quod à nonnullis vocatur succinum pterygophoron, ideo dictum, quòd pennas ad se alliciat. At cum Brasauolus minus fortasse accurate Dioscoridis verba legendo percurrisset, dixit de Karabe agens, sensisse Dioscoridem electrum esse lapillum, in quem lyncis vrina concreuit. Quòd tamen falsum esse facillè constat

*Brasauoli  
lapsum.*

*Alni histò-  
ria, & vti-  
tas.*

ex prædictis Dioscoridis verbis. Cæterum cum non desint etiam poëtæ, qui Phaëthontidas non in populos, sed in alnos mutatas fabulantur, Alni quoque historiam, & vires, præcedentibus adnecere non ab re fore existimauimus. Est itaque Alnus (vt Theophrastus est auctor libro 111. cap. x 111. de plantarum historia) sterilis & vigena, natura caudice recto: ligno, medullaque molli, adeò vt graciliores virgæ totæ concauantur: folio pyri, sed ampliore, neruosiorèq;: cortice scabro, rufoque intus, qua de causa coria tingit radice summa, nec maiore, quàm laurus. nascitur in aquosis, alio nullo pacto. hæcenus Theophrastus. Qui tamen eodem libro cap. x v. non vtiq; pyri folio alnum virefcere tradidit, sed ponticæ nuci. Nec eandem prodidit esse sterilem libro eodem cap. v 1. cum inquit. Terebinthus circa tritici messem, aut paulò serius semen reddit: fraxinus, atque acer æstate: alnus, nux iuglans, pyrorumque syluestrium genus quoddam autumnò. Quo fit, vt alterum omnino suspicandum videatur, aut sibi ipsi Theophrastum repugnare, aut eius codicem his locis mendis scædere. Alnus in Italia nascens, folio, est coryli crassiore, neruosiorèq;: materie molli, rubente, in aquosis ferè semper proveniens. Hetrusci vulgò appellant onio: alii verò in Italia auno. Italica fructum fert viridem, oblongum, moris forma similem, tquanis quàm plutimis in se compactis. Maturèscit autumnò, minuto intus semine, colore in nigrum fuluo. Præfertur lignum ad ædificiorum fundamenta, quæ in fluminibus, lacubus, paludibusq; sunt, quòd in aqua nunquam putrefcat. Ob id enim expetitur maximè Venetis ad iacienda palatiorum, ædiumq; fundamenta, quòd crebrò fixa non modò ad æternitatem permaneat immortalis, sed quòd ingentes admodum ferat moles. Recentia folia tumores imposita dissolunt, & inflammationes restinguunt. Eadem nudis pe-

dum plantis supposita vioribus itinere defatigatis leuamentum præstatur. Quin & rore matutino madentia cubiculì ad necandos pulices per æstatem viliter sparguntur. Præstat cortex tingendis coriis atro colore. Sed nec BETULA omittenda videtur: quæ cum cortice albo sit albæ populo adsimilis, nunc nobis

*Betula cõ-  
sideratù*



sefe offert describenda. Hæc Theophrasto folio est caryæ sic Græcis vocatæ (quid autem sit carya comperit hæcenus non habeo) præterquam quòd paulò angustiori, cortice autem versicolore, & materie læui, nõ nisi ad baculos vtili. Plinio li. x v 1. cap. x v 111. Betula arbor est Gallica mirabili candore, atque tenuitate: terribilis magistratum virgis: eadem circulis flexilis: item corbium portus. Bitumen ex ea Gallie excoquant. hæcenus Plinius. Betula in Tridentino agro frequentissima provenit, materie adeò tenaci, lentique, vt ad vasa vinaria cingenda circuli ex ea parati omnium præstantissimi habeantur. Ananii è suis Betulis non modò optimos conficiunt carbones, ad coquenda liquandaque metalla, sed è delibrato, contortoque cortice, faces ad nocturna lumina parant, quæ quòd bituminosa pinguitudine redundent, teadè modo confligant, & resinofum quoddam picis colore reddunt. Nec fortasse alia de causa Betula dicitur, nisi quòd bitumine scæat. Hanc Tridentini corrupta voce vulgò appellant Bedoilo. Gaudet frigido tractu ac niuoso: folio est nigre populi, sed parte prona asperiori, viridioriq;: per ambitum ferrato, & minutissimis quibsdam punctis, ipsisq; albicantibus in vniuersum repperfo. Sterilis hæc, nec fructum ferens. Huius caudex terebro perforatus ingentem aquæ copiam reddit, cui vim maximam inesse quidam asserunt ad comminuendos tam renem, quam vesicæ calculos, si diutius bibatur. Eadem maculis in cute delet, nitorèmq; conciliat: oris vlcera sanat collatione ex ea facta. Foliorum succus coagulo admistus, caecos à carie, & vermicibus vindicat. Sed iam ad Populos, & ad Succinum nostra reueratur oratio, in quibus medicinz nobis reddenda ratio est, vt in omnibus ferè facere consueuimus. Primum igitur de viribus Populi nigre differuit Galenus libro v 1. simplicium medicamentorum, vbi sic inquit. Populi nigre flores calidi facultate quidem sunt in primo recessu à temperatis: sed in differentia,

*Betula vi-  
res.*

*Populorum  
vires ex  
Gal.*

quæ habetur in siccando & humectando, paulum à temperatis & mediis ad siccius deflexurum: verum & subtiliorum potius, quam crassiorum sunt partium. Et solâ quidem ipsius quodammodo floribus similia sunt, nisi quod ad omnia imbecilliora, minusque efficacia. Sed & resina eius floribus similem facultatem obtinet, atque etiam calidiorum. Porro semen tum resina, tum floribus & subtiliorum est partium, & exiccantius: non tamen est admodum calidum. Deinde libro v. 11. eorundem simplicium idem Galenus Populi albe vires de scripsit his verbis. Populus alba arbor mista quodammodo temperaturæ est, ex aqua repida, & terrena extenuata essentia, quam obrem & abslergens facultatis est particeps. hæc enim Galenus de vtriusque Populi facultatibus. Cæterum non inuenio Galenum Succini meminisse in simplicium medicamento-um censu, qui tamen libro v. 11. cap. 111. de compositione medicamentorum secundum locos partium ex succino confectum ad Aëleptade transcripsit, quem quidem his hæmoptoicis, longo tempore rursus, & recenter phthisicis, purulentis à pectore difficulter efficientibus, suppuratis, cœliacis, dysentericis, & inflatis conferre tradidit. Atqui referunt Prutheni, in quorum litora fluctus maris succini plurimum expuunt, eius genus quoddam reperiri, quod planè crystalli repræsentat. Huic vim mirabilem inesse testantur, quod scilicet femina deprehendatur an virgo sit & incorrupta, necne. Nam si ex vino seorsum exhibeatur, efficere aiunt, ut corrupta & vitata protinus urinam reddere cogatur. id quod virginis euenire negant. Arbo- *arbor* Græcis dicta, Latinis Populus alba vocatur: Arabibus: Haur: Italis, Popolo bianco: Germanis, Bellen, Popelbaum, & Sarbaum: Hispanis, Alamo blanco: Gallis, Peuplier. Quæ verò *Alamo* Græco nomine, Latino Populus nigra vocatur Mauritano, Haur romi: Italico, Popolo nero: Germanico, Aspen, aut Poppel vuciden: Hispanico, Alamo nigrillo: Gallico, Tremble, & Peuplier. Quod Græcè *ἡ ἀσπὴν ἢ χερσὶν ἴσται*, Latine Electrum seu Succinum dicitur: Arabicè, Kûrah seu Kakabre: Italicè, Succino, & Ambra gialla: Germanicè, Agstein: aut Boernstein: Hispanicè, Esclarimento, aut Ambar Gallicè, Ambre.

MACER CAP. XCIII.

M A C E R ex Barbaria aduehitur, cortex stauescens, crassus, gustu perquam astringens, Qui contra cruentas

excretaiones, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.

N V N Q V I D officinarum Macis, quo myristicæ nuces prætextus insitæ conuegiuntur, Dioscoridis sit Macer, non modò dubitandum est, sed etiam credendum (vt ego arbitror) magnam inter vtrunque esse differentiam. Cum enim Dioscorides dicat: Macer, qui ex barbaria aduehitur, est cortex crassus, stauescens, & gustu perquam astringens, manifestè declarat, Macerem non esse officinarum macim quod hoc tenue sit, gustu feruens, acre, perquam odoratum, amarissimum. Adde quod dixerit Plinius libro x. 11. capite v. 11. Macir ex India aduehitur, cortex rubens, radicis magnæ, nomine arboris suæ: qualis sit ea, incomperum habeo. Hanc etiammodum differentiam non ignorauit Serapio: nam postquam tradidisset ex auctoritate Isach, Macir esse nucis odoratæ operimentum, dixit iteum esse, de quo loquebatur Dioscorides: quippe quod scriptum reliquerit, Macerem esse ligni corticem, siue corium. Quod cum compertum haberet Auicenna, de vtroque seorsum tractauit, & Macin odoratæ nucis inuolucrum ad caput 456. relegauit: Macerem verò radicis corticem capite 694. sub titulo Thalissar descripsit. Præterea maximo est argumento, quod Macis & Macer vtrique inter se differant, quod Dioscorides, Galenus, & Paulus de odoratis nucibus quorum Macis est tegumentum, nihil scripsit memoriam reliquerint. Quippe si Macer, qui eis conuehebatur, Macis nobis vulgare extitisset, credendum sinè est, quod cum illo quoque ad vestræ essent myristicæ nuces: quarum illi hisforiam, & facultatem, cum sine & in viribus, & in odore admirabiles, nequaquam describere prætermisissent. De macere Galenus libro v. 11. simplicium medicamentorum, hæc scripsit tradidit. Macer cortex est, qui ex India conuehitur, gustu multum acerbo, cum leuicula quadam acrimonia odorata, iucundum sanè redolens, vt plerumque aromata, siue odorata, quæ ex India conuehantur. Videtur itaque & ipse ex mista constare essentia, plerumque terrena frigida, paucula verò calida, & tenuium partium. Quamobrem valenter desiccata, astringitque: proinde cœliacis, & dysentericis miscetur facultatibus: in tertio exiccantium consistens ordine, in caloribus, frigorisque differentia neutrum insigniter efficiens. hæc Galenus. Ex quibus haud obscure colligi potest quod Macer iogè differat à Macin: namque ipse gustu non reperio hoc esse adeo acerbum, nec tam leuissimæ acrimoniæ: quin potius si degustetur, linguam, & fauces admodum vellicat: odorem

*Maceris, & Macis discrimine.*

*Succini & 761.*

*Nomina.*

*Maceris, & Macis discrimine.*

odorem iucundum perfundit, & leuiusculum amarorem quadam cum siccitate relinquit. Quod facile offendit, quod Macis tantum calidi, quantum sicci conceperit, vel fortasse plus calidi: & quod pleraque ipsius essentia sit tenuium partium. Ideo errare non crediderim, qui dixerint Macin odoratum exalface-re, & pariter siccare in fine secundi, vel in principio tertii. Quamobrem id Macer esse non potest, cum dicat Galenus constare macerem essentia pleraque frigida terrestri, paucula vero calida. Quibus facile concludi potest, quod macer à Dioscoride, & Galeno descriptus hoc rursus ad nos non aduchatur: siquid nullus in officinis reperit cortex, qui possit maceris historiam explere. Et quanuis Monachi illi, qui in Mesuem commentarios scripsere, nullam inter macim, & macerem ponendam esse differentiam pro certo assument, nulla tamen auctoritate (quod equidem sciam) aut ratione nituntur. Ceterum haud ignorandum est nec Galeno, nec Pli-nio, quod dixerint ex India aduchi macerem, Dioscoridem repugnare, cum ex Barbaria ipse afferri dixerit: quoniam (vt Ptolemeus est au-<sup>10</sup>tor) quædam in Indo fluuii insula, vel vrbs sita est, quæ Barbaria dicitur, ex qua facile cum portabatur macer. Vel quod afferretur ex Arabia eo maris sinu, qui à Barbaria insula Barbaricus appellatur. Quandoquidem (vt inquit Strabo) omnia, quæ in India proueniunt, ea scilicet parte, quæ ad austrum vergit, similes in Arabia nascuntur. *Māy* vt Græcis, ita Latinis Macer, atque etiam Macir appellatur: Arabibus, Thalifar: Italis, Macero. Quod Ara-bibus Bisbese, recentioribus Græcis *Mānt* quemadmodum & Latinis, & Italis Macis nominatur: Germanis, Muscaten blumen: His-<sup>15</sup>panis, Macias, & Macias.

VLMYS.

CAP. XCV.



VLMIS & fo-  
lia, & cortex,  
& rami vim ha-  
bent spissandi.  
Folia trita ex  
aceto ad le-<sup>20</sup>  
pes efficaciter  
illinuntur:  
vulnera glutin-  
ant, sed multo  
magis corticis  
tilia, si fasciæ

loco intorqueatur: nam in lori morem flecti potest. Crafior cortex in vino, aut aqua frigida vinctatim potus, pitui-<sup>25</sup>tas trahit. fracta ossa celerius solide-  
scunt, si decocto foliorum, corticis, aut  
radicis foucantur. Humor in folliculis  
enascens prima germinis eruptione,  
cuti illitus nitorem inducit, faciemque  
splendidiorem præstat: qui dum sicca-  
tur, in animalia abit, quæ culicum for-  
mam gerunt. Folia cum tenerescunt  
cocta, olerum more ad obsonia vsur-  
pantur.

**VARETYS** Vlmus nocissima omnibus fe-  
rè sit arbor, non tamen ob hoc silentio inuo-  
lenda putauimus, quæ de æ posteritatis me-  
moræ prodidit antiquitas. Vlmus itaque (vt  
Theophrastus est auctor li. i. i. cap. x. i. i. i.  
de plantarum historia) duobus distinguitur  
generibus: cuius altera montana, quam Græci  
*Ἰνδοῦ* vocant: altera campestris, vlmus  
proprie vocari: fruticosior hæc, illa verò au-  
tor: folium induridum, leuiter circumserra-  
tum, oblongius quam pyro, scabrum, non læ-  
ue. Præstat hæc arbor & amplitudine, & cel-  
situdine, non crebra circa Idam, sed rara, ir-  
riguis amica: materies flaua, robusta, neruo-  
sa, deformis, vt quæ tota cor sit. Vtuntur ea ad  
fores lautiores: viridis facile cæditur, sicca dif-  
ficile. Sterilis denique putatur: sed gummi in  
petiolis gignit, & animalia quædam cuiusæ: ca-  
chryes peculiare gerit, aurum quo multas, mi-  
nutas, nigras: cæteris verò temporibus quid  
ferat, minus animaduersum est, hæc tamen Theo-  
phrastus. Plinius verò quatuor vlmis genera tho-  
luit libro x. v. i. capite x. v. i. i. his verbis. In-  
ter has, atque frugiferas, materie vitiumque  
auicicia accipitur vlmus. Græci duo eius ge-  
nera nouerunt: montosam, quæ fit amplior: cam-  
pestram, quæ fruticosa. Italia atrox vocat,  
excellissimas: & ex iis siccas illis præfert,  
quæ non sunt riguæ, alterum genus Gallicas.  
tertium nostrates, densiore folio, & ab eo-  
dem pediculo numerosiore. quantum sylue-  
stre. Atrox non ferunt samaram, ita vocatur  
vlmi semen: omnesque radicem plantis pro-  
ueniunt, reliquæ verò semine. hæc Plinius. Qui  
tamen vnâ cum Theophrasto errasse deprehen-  
ditur, quod hic vlmum cuiusvis generis steri-  
lem esse scripserit: ille autem, quod atroxem sic  
Italiam appellatam, semen nullâ ferre prodiderit.  
Quando

Vlmis hi-  
storia.Theophr.  
& Plinij  
error.

Quandoquidem Theophrasto præter id, quod experientia nobis compertum est, expugnat Plinii auctoritas: quippe qui vltimos omnes præter atineam semine provenire scribit. Plinio deinde, qui atineam semen ferre negat, refragatur Columella libro v. capite v. i. cum inquit. Vltimorum duo esse genera convenit, Gallicum, & vernaculum: illud atinia, hoc nostras dicitur. Atiniam vltimum Tremellius Serofo non ferre samaram (quod est semen eius arboris) falsò est opinari. Nam ratiorem sine dubio creat, & ideo plerisque & sterilis videtur, seminibus inter frondem, quam prima germinatione edit, latentibus. Itaque nemo iam ferit ex samara, sed ex sobolibus. Est autem vltimus longè laxior, & procerior, quam nostras, frondemque iucundiorum bubus præbet. Sed vltimi facultates hæc sunt. Folia, & cortex, & rami vim habent spissandi, & vulnera contrahendi. Corticis utique interior tilia, lepras sedat, & folia ex aceto illita. Cortex denarii pondus potum in hemina aquæ frigidae alium purgat: pituitasque, & aquas priuatim trahit. Imponitur & collectionibus lacryma: & vulneribus, ambustisque decocto fovere prodest. Humor in folliculis arboris huius nascens cuti nitorem inducit, faciemque gratiorem præstat. Cauliculi foliorum primi vino decocti tumores sanant, extrahuntque per fistulas. Idem præstant & tilia cortices. Multi corticem commanducatum vulneribus vtilissimum putant. Folia trita, aqua aspersa, pedum tumori. Humor quoque & medulla castratæ arboris afflusa capillum reddit capiti illius, defluentesque continet. Hæc Plinii verba de vltimi facultatibus lib. x. x. i. i. i. capite v. i. i. i. Cæterum humor in folliculis vltimi contentus (ut ego experientia compertum habeo) medetur puerorum enterocolis, si splenia siue linteola in eo madefacta sæpe inguini partis ruptæ super imponentur, & aque inibi subfemorali, quod Italici vulgò brachiere appellatur, subligentur, & constringantur. Quin & corticis radicem decoctum articulo duritias emollit, & nervorum convulsiones resoluat, si in fotus, vel balnei modum adhibeatur: tumores dissecit, quos iugi attritus in collo boum excruciat. Vltimi meminit Galenus libro v. i. i. i. simpl. medic. sic inquit. Vltimi foliis quandoque recens vulnus glutinauimus, confidentes adstringentem pariter & abstergentem inesse illis facultatem. Cortex amplius etiam sabamaram est, & adstrictiorius: itaque cum aceto & lepram sanat. Porro viridis etiamnum ac recens, si vulneribus vincum vice circumligetur, ea glutinare potest. Radices eandem vim obtinent: nam & decocto earum quidam persundunt fracturas, quæ topico, siue collo inducto opus habent. Huius arboris nomen Græcum est *αἰνία*: Latine, Vltimus: Arabicum, Didar, Didar, seu Luzach: Italicum, Olmo: Germanicè, Ylmé, Ristholtz: Lindbalt, Yffenholtz: Hispanicè, Vltimo: Gallicè, Orme.

Vltimi facultates Plin.

Vltimi res ex Galeno.

Nomina.

LIGNORVM MARCOR.

CAPVT XCVI.

Ex caudicibus, lignisque veteribus caries congeritur quæ farina modo illita vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: serpentina cohibet, si cum pari aniso & vino subacta, linteisque imposta illinatur.

No n sanè pro-fus negligenda est lignorum Caries li-  
veterum, & contabescitorum caries, cum tan-  
ta facultate possit, ut vlcera expurget, soli-  
tudoque: & eodem serpentina fistat. Quod eo præ-  
stat efficacius, si ex lignis arborum colligatur,  
quæ tum adstringendi, tum etiam adstergendi  
vim possident. Quo fit, ut ligni Guaiaci caries  
ceteris hac in re facile præstet: quippe quæ  
non modò vlcera, quæ contumacia non sunt,  
sanat, sed & quæ cariothe dicuntur, quæq; Gal-  
lica peste contracta sunt. Quare pudendorum  
exedentibus vlceribus inaspera mirifice medetur.  
Cæterum non modò lignorum marcor, siue  
caries in medicum vsum venit, sed & v. e. r.  
m. x. s. in cariosis lignorum caudicibus nascentes,  
si Plinio credimus, qui libro x. x. x. capite  
x. i. i. i. de his sic scriptum reliquit. Cossi, qui  
in ligno nascuntur, sanant vlcera omnia: nomas  
vero combusti, cum pari pondere anisi, & ex  
oleo illiti. Delicatoris fuisse hos olim & in ci-  
bis idem posteritatis memoris tradidit libro  
x. v. i. i. capite x. x. i. i. i. cum inquit. Vermicu-  
lantur magis, minùsve quædam, omnes ta-  
men ferè, idque aues caui corticis sono experi-  
untur. Iam quidem & in hoc luxuria esse  
cepit, prægrandesque roborum delicatore  
sunt in cibo, cossi vocant: atque etiam farina  
saginati, hi quoque aliis sunt. Quapropter  
mirum non fuerit, si etiam antiquitas cicadas,  
quæ nondum alas deprompserint, in cibis de-  
uorauerit, Aristotelis testimonio, qui etiam  
addidit gustantibus esse suauissimas. Sed cur  
illud admirandum fuerit, si nostris etiam tem-  
poribus vermes, qui cariosis caeseis innascentur,  
magna admodum cum voluptate à com-  
pluribus deorentur? Galenus cum & ipse ad  
arborum, ex qua caries decidit, particularem  
scopum habuisset, libro v. i. i. i. simpl. medic.  
sic de illa scripsit. Caries lignorum, & maximè,  
quæ pariceps est adstrictionis simul, & abster-  
sionis, velut vltimus, expurgat, impletque vlce-  
ra humida. *Exarpiat sicut* ita Græcè dicitur,  
quod Latine Lignorum marcor, siue caries:  
Arabicè, Nucharer vassab: Italicè, Tarlatura  
del legno: Germanicè, Vuurm meel: Hispani-  
cè, Carcoma: Gallis pourriture & vermo-  
lissure de bois.

Caries li-  
gnorum  
sicut.

Vermium  
lignorum  
sicut.

Caries li-  
res ex Ga-  
leno.

Nomina.

ARUNDO.

CAP. XCVII.



IN Arundi  
nū genere quæ  
dam nastos, id  
est farctior vo-  
catur, ex qua  
sagitta factita-  
ri solent. Alia  
fœmina, qua  
tibiurum ligu-  
las efficiūt. A-  
lia, quod fistu-  
lis addicta sit,  
syringias: cui  
multum inest

carnis, crebris cincta geniculis, ad li-  
brorum conscriptionem accommoda-  
ta. Alia crassa, concava, apud amnes  
nascens: quæ à quibusdam cypria, ab  
aliis donax appellatur. Alia phragmi-  
tes, seu vallatoria, gracilis, candicans,  
vulgò cognita: cuius trita radix per se,  
aut cum bulbis suis illita, spicula acu-  
leòsque corpore extrahit: luxata, lum-  
borumque dolores cum aceto mulcet.  
Virentia folia tusa, & impoſita ignibus  
sacris medentur, & cæteris inflamma-  
tionibus. Corticis cinere peruncta cum  
aceto alopecie sanantur. Panicula lan-  
nugo, si aures intrauerit, exurdat. Eun-  
dem effectum implet arundo, quæ cy-  
pria dicitur.

Bononiensiamne Illa etiam, quæ thelys, hoc  
est, fœmina appellatur, cuius tantum est usus  
ad tibiurum ligulas, hæcenus mihi incognita  
est. Nanque nostra tempeſtate sunt eiusmodi  
ligulæ ex communibus arundinibus, ex ea sci-  
licet specie, quam Dioscorides vallatoriam  
nuncupat, quæ nostri in viridariis, ac hortis in  
topiariis extruendis vtuntur, ac palos vitibus  
apertissimos efficiunt. Quod autem vallatoria sit  
hæc nostra communis, mihi aliquando dubi-  
tandi præbuit anſam Dioscorides: quippe qui  
dicat, eam esse gracilem, & candidam, cum ta-  
men communis nostra sit crassior. Verum cum  
postea inuenerim Theophrastum scribentem  
libro 1111. capite x11. de plantarum histo-  
ria, crassiorē, firmiorēque illam arundi-  
nem esse, quæ vallatoria nominatur, facile  
sum ad credendum inductus, hunc Dioscori-  
dis locum esse deprauatum: eo quod magis, quod  
sepius, palis, & topiariis operibus crassæ sunt  
tenuibus aptiores. Illa verò, quæ ad scriben-  
dum vsurpatur, cui auctoritatem penne de-  
rogarunt, plurimis reperitur in locis, esseque  
omnibus notissima: veluti & ea, quæ Cypria  
vocatur, in paludibus nascens, & apud amnes.  
Traditur à pluribus rei agrariæ auctoribus, tum  
etiam à Plinio, inter arundinem, & filicem  
herbam intestinum esse odium: proinde arun-  
dinem vomeri alligatam filicem in agro de-  
struere, ac enecare prodiderunt. At eo maior  
arundinis cum algaribus intercedit amicitia:  
nam si serantur in arundinetis, inibi nrisce  
proueniunt. Quidam præterea prodiderunt,  
arundines in India ad tantam affurgere mo-  
lem, vt singula internodia nauigiorum vicem  
præſtent per fluuios, & lacus, ternos homines  
capiente alueo. At si plura de arundinum ge-  
neribus quis audire cupiat, Theophrastum le-  
gat, qui longiori sermone earum historiam li-  
teris memoriæque mandauit. De arundine  
Galenus librum v11. simpl. medic. hæc scripta  
reliquit. Calami phragmitis radicem cum bul-  
bis aculeis, & stipites ex alto extrahere qui-  
dam scribere, ceu trahendi quædā vi ei inef-  
fet. Nos tamen eius rei periculum non feci-  
mus: verum quantum gustu liceat conicere,  
abstergentem facultatem possidet non pau-  
cam, minimèque acrem. Cæterum folia ipsa  
abstergentis sunt facultatis. Cortex verò eius  
combustus admodum tenuium partium, & di-  
gerentis facultatis efficitur, adiunctum habens  
absterſorium quiddam, vt excicet, & excal-  
faciat tertio quodammodo ordine, plus tamen  
desiccet, quam excalcificat. Vitandum autem  
est eius id, quod anthelem vocant: nam si in  
aures incidat, adeo tenaciter adhærens affigi-  
tur, vt auelli non possit, auditumque vinat:  
quamobrem sepiſſimè exurdat. Arundo sic  
Latina voce vocatur, vt Græca κάλαμος: A-  
rabica, Casab: Italica, Canna: Germanica,  
Kori: Hispanica, Cannas: Gallica, Vng roſcau.

Arundi-  
nis. 55 fil  
cie odium

Arundi-  
nis. 55 fil  
ex Gal.

Arundi-  
nū consil.  
ARUNDINUM quinque genera tantum,  
veluti notiora hoc in loco à Dioscoride pro-  
duntur: licet Plinius lib. x v11. cap. x x v1.  
& lib. x x111. cap. x1. viginti nouè arun-  
dinum species descripserit: inter quas (vt su-  
perius diximus) odoratam recensuit, quæ Græ-  
cis κάλαμος phragmitidis appellatur, in India, Sy-  
riæque nascens, odoris iucunditate vnguentis  
accommodata. Quod aperte indicat calamum  
odoratum esse inter arundinum genera repo-  
nendum, non autem inter radices, vt vulgus  
medicorum, & Brasuolus Ferrariensis con-  
tendunt, acori radices pro legitima odorata  
arundine assumentes. Illa, quæ nastos dicitur,  
solida, farctaque, quamuis gracilis & le-  
uis, in communem sagittarum vsum à Syris  
accepta, non oritur, quod sciam, in Italia,  
nisi uascatur (vt tradidit Plinius) in Rheno

Nomina.

## PAPYRVS CAP. XCVIII.

PAPYRVS, qua chartæ sunt, nullis non cognita, præcipue in medicina vitiliterat ad laxandas fistulas: in defæcta lino inuoluitur, vsque dum inaruerit: constricta enim, atque immissa in hiatum humore completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix: itaque Aegyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes, & mansam expuunt. Ipsi radicibus pro ligno vtuntur. Crematæ papyri cinis depascentia vlcera cum omnium partium, tum oris maximè, cohibet: verum melius id combusta charta præstat.

Papyri  
sisterat.

QUALIS Papyrus sit, Italia nescit: siquidem (vt Theophrastus esse auctor libro III. capite IX. de plantarum historia, & Plinius libro XIII. capite XI.) Papyrus in Italia non nascitur, sed in Aegypto quibusdam in locis tantum prope Nilum fluuium, quiescentibus Nili aquis, vbi hæ euagatæ stagnant, duo cubita non excedente altitudine gurgitum: brachiali oblique radicis crassitudine, triangulis lateribus, decem non amplius cubitorum longitudine, in graciliatatem fastigiatum, thyriformi modo cacumen includens: semine nullo, aut vsu eius alio quam floribus ad deos coronandos. Radicibus incolæ pro ligno vtuntur, nec ignis tantum gratia, sed ad alia quoque vtensilia vasorum. Ex ipso quidem papyro nauigia texunt: & è libro vela, tegetesque, necnon & vestem, etiam stragulam, ac funem. Mandunt quoque crudum, decoctumque, succum tantum deuorantes. Nascitur & in Syria, circa quem odoratus ille calamus lacum. Nuper & in Euphrate nascens circa Babylonem Papyrus intellectum est eundem usum habere, quem chartæ: & tamen adhuc malunt Parthi literas vestibus intertere. Præparantur ex eo chartæ diuise acui in prætenues, sed quam latissimas phylaras, hæc Plinius. Qui deinde sequenti capite suffus docuit Papyrus conficiendi rationem, his verbis. Post hanc papyrus est, extremumque eius scirpo simile, ac ne funibus quidem nisi in humore vile. Texunturque omnes tabulæ madentes Nili aqua. Turbidus liquor vim glutini præbet, cum primò supina tabula scheda adlinitur longitudine papyri, quæ potuit esse, reserminibus vtinque amputatis. Transuersa postea crates peragitur: premitur deinde prælis, & siccatur sole plagulæ, atque inter se iunguntur. proximarum semper bonitatis diminutione ad deterius. Nunquam plures scipo, quam vicenæ, magna in latitudine earum differentia XIII. digitorum opti-

Papyri  
scirpo  
simile.

mis. Hactenus de papyro Plinius. Videntur & Papyri quoddam esse genus, tenuia, leuiorque illa folia è iuncea quâdam plantâ proceduntia, quæ ab insulis diui Thomæ, Brasiliæ, & Mederæ, ad nos conuehantur, sicchareis vt vocant panibus inde delatis circumuoluta. Quandoquidem fragmentum retinemus a clarissimo medico Luca Ghino Pisæ ad nos missum, nigris rubrisque Arabicis characteribus manu scriptum. Quod clarissimum præbet indicium, eorum insularum incolis tenuissimis his foliis, pro papyro passim vti. Veruntamen hoc non esse papyrus, è quo antiquitas suas confecit chartas, certò scimus, quod hoc arte (vt Plinius est auctor) feret, illud verò tale a natura producat, & proprium suæ stirpis sit folium. Antiqui itaque ex Papyro chartam faciebant, quemadmodum nos ipsam ex contritis lineis conficimus: vnde hactenus antiquum retinens nomen, etiamnum Papyrus apud plerisque dicitur. Credidere nonnulli, veram esse Papyrus arundines illas, quas Indicas vocant, quibus imbecilles principes, atque hierarchæ, prelati vulgò dicunt, ad egram senectutem succiendam pro scipione vtuntur, materiem auro, vel argento succingentes. Quod tamen asserere non ausim, nec vtique reprobare, cum huius rei certam cognitionem adhuc assequi non potuerim. Papyrus meminit Galenus lib. VII. simp. medicam. sic inquit. Papyrus ipsa quidem per se in usum medicinale non venit: æt macerata, aut vltà vtilis efficitur. Igitur oxyerato, vinoque macerata, recentia vlcera glutinat, maximè in circulum circumposita. Verum hic quidem est eæ materia, quæ medicamina sanantia accipiat: at vbi vltà fuerit, medicamen est exiccatum, velut & chartæ combustæ cinis, nisi quatenus infirmior est, quam papyri. hæc Galenus. Cæterum animaduertendum est, quod nostri vsus chartæ, quæ

Indica  
runda.

Papyri  
res ex  
Galen.

## MYRICA.



ex veteribus conficitur lineæ, iisdem non posseta cultatibus, quibus ea commendatur, quam veteres ex papyro arbore parabant. Quo fit, vt dubium mihi sit, quoniam modo parari possit illud Galeni medicamentum, quod de charta combusta dicitur, vlceribus fœdidis, & sinuosis vtilissimum: necnon pastillum Passini à Paulo

Nomine

lib. VII. traditus, nuncupat Græcis, Latinis pariter Papyrus appellatur: Arabibus, Burd, seu Berdi: Italis, Papyro.

MYRICA.

CAPVT XCIX.

MYRICA, seu tamarix, arbor vulgo cognita est, cum apud pigras, & stagnantes aquas enascatur, fructum quasi florem ferens, compage muscolum. Aegyptus, Syriæque alteram gignunt mitiorem, sylvestri cætera similem. Fructum parit gallæ proximum, inæqualiter astringentem gustu: quo conuenienter utimur vice gallæ in medicaminibus oculorum, orisque. Datur cruentæ excreationi in potu, & cæliacis, & contra profluvia fœminarum, regium morbum, & phalangiorum morsus: illitus tumores inhibet. Cortex in eisdem vsus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino potum, lienem absumit: ad dolorem dentium in collutionibus salutare, & mulieribus fluxione vulvæ opportunis in desessibus: phthiriasi, lendibûsque circumfusum prodest. Abundantiam fœminarum sistit impositus arboris cinis. Potorios calices è caudice liensis moliantur, quò datus in his potus proficiat.

VRBANA Myrica, quòd sciam, non nascitur in Italia, quanquam in Aegypto, & Syria gignitur. Quæ verò alienubi reperitur in hortis, & in quibusdam viridariis mitior credita, non alia est, quam sylvestris, in locos mitiores translata. Cuius rei certo sunt indicio fructus. & flores, quos omnino sylvestribus similes profert, non autem gallæ modo, vt domestica. Umbra arboris insigni proceritate sæpe per ætatem Romæ me oblectatum fuisse recorder ad Tiberis ripas, in hortulo quodam hospitalis Sancti spiritus. quæ etsi domestica haberetur ab omnibus, florem tamen, & fructum ferebat sylvestri similem. Hæc in fluminum ripis frequentissima nascitur in Italia. Quare non potui non admirari Dioscoridem: quippe qui dicat tantum nasci Myricam apud palu-

des, ac residens aquas, cum oppositum sanè eveniat in Italia. Quòd me sæpius adduxit, vt crediderim, aut Dioscoridis codicem hoc loco de prauatum esse, aut in Græcia secus, quam in Italia myricam proxime stagna, ac paludes oriri. E myricæ trunco alvei excauantur (vt Columella scribit) aquæque replentur, vt subinde postea bibantur: nam hoc potu splenis incremento sanantur, quo morbo æstate maxime torquentur, dum, quæ eorum est pabuli insatiabilis aviditas, arborum fructus confectantur, qui plurimi eo tempore propter ariditatem in terram decidunt. Porro myricæ cinerem omnia ulcera ignis exustione contracta, efficaciter exicare author est Serapio. Folia simul cum tota planta foris frigidas collectiones inhibent, ac reprimunt. Elephantrasiæ ex lienis vitio obortam myricæ radicem decoctum, & cum passis vis epotum finare tradidit Alcanizius Arabs: id quod se vidisse ait in duabus mulieribus, quæ hac labe laborarunt. Ex quo mihi persuasum est, id non incongruum in Gallica peste fore medicamentum, Guataco forsitan ligno non absumile. Myricæ radices pro odorata casia vendebantur impositores. Sed postquam fasia à peritis medicæ materiz viris deprehensa est, eius in officinis vsus penitus exoleuit. Meminit myricæ Galenus libro v. i. i. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Myrica abslergentis est, ac incidentis facultatis, absque perspicua desiccatione: habet verò etiam adstringentem nonnullam. Has ob qualitates, facularisque admodum prodest licni indurato decoctæ cum aceto, aut vino, siue radice, siue foliis, siue extremis ramulis: sanant porro dentium dolores. Cæterum fructus, & cortex non paucam fortia sunt adstringentem, adeo vt gallæ omphacitidi proxima sint, nisi quòd acerbitas euidentis est in galla, sed myricæ fructui temperatura inest inæqualis: immixta est enim naturæ eius multa partium tenuitas, atque vis abslergendi: quod sanè gallæ non accidit. Attramen vbi galla fortè ad manum non erit, eo vti liceat ad omnia, ad quæ illa vrinæ in eisdem & cortice. Porro myricæ combustæ cinis admodum desiccatoriz facultatis est, plurimum habens abslergendi facultatem, pauxillam adstringendi. Myrica arbor ita Græcè vocata, Latine Myrica, & Tamarix nuncupatur: Arabicè, Tarsa, seu Garfa: Italicè, Tamarigio: Germanicè, Tamariskeken, aut Porst: Hispanicè, Tamargueira, & Tamariz: Gallicè, Tamarisc.

Myrica  
medicina.Myrica  
Vires ex  
Galieno.Myrica  
Nemina.

ERICA





ERICA.

CAP. C.

**ERICA** fruticosa arbor, myrica similis, longè minor. cuius flore apes reprobum mel efficiunt. Tam flos, quàm coma serpentium ictibus illitu medetur.

*Erica consideratio.*

**ERICA** stirps fruticosa Asiae, Graeciaeque fructibus ascribitur. Hæc (ut plantarum scriptores asserunt) bis anno floret. quo fit, ut prima, & vltima habeatur, quæ inter sylvestres stirpes floreat. Plinius lib. x xiiii. capite i x. ericam describens inquit. Ericen Græci vocant fruticem non multum à myrice differentem, colore rosis marini, & penè folio. Hanc aduersari serpentibus tradunt, hæc Plinii verba. Verum non ob id facile fuerit affirmare, quænam planta nobis legitimam Ericam præ se ferat, cum tam paucis notis describatur ab omnibus: tamen hæc, cuius hic figuram appinximus, nil aliud, quàm ericam designare videatur. Siquidem fruticosa est planta, semicubitalis, colore rosis marini, foliis ferè myricæ, cui eam Dioscorides affimulat: vere primo & autumnio florescens, quod huius fructus proprium est, si rei herbariarie scriptoribus est adhibenda fides. Adde, quod huiusce flores autumnio maximè depascuntur apes, ea fortasse de causa, quod non modò Erica prima sit, & vltima sylvestrium, quæ floreat, sed quod etiam d'uitius floribus quàm plurimis ornatur, nempe autumnio toto, & ad hyemem vsque. Vnde mel, quod ex iis apes faciunt, ericæum (ut Plinius est author) antiquis appellatur, quod conuehi tradit post primos autumnii imbres, cum erica sola floret in sylvis. Præterea cum libro i x. scribat Dioscorides, corim, hypericum aliquibus vocatum, fruticem esse folio ericæ, minore tamen, sitq; hæc cori folio admodum similis, magis ad huc inclinavit animus ad credendum, hæc esse Dioscoridis ericam. His ergo rationibus adductis non temerè factum putavi, pro legitima

*Alei ericæum.*



ericæ huius effigiem expressam dare. Oritur hæc frequentissima in Goritensi agro eo præsertim tractu, quâ à Diuo Andrea (ita appellatur vicus) ad Vipacum fluvium itur. incolæ ver naculo sermone eam nominant Grione. Sed in Hetruria longè magis adolescit, fiuntq; ex ea scopæ aptissimæ ad mundandas ædes, & ob id vulgo hæc planta propriè vocatur Scopa. Marcellus, nescio qua ratione ductus, ericam magno errore genitæ speciem putat. Ericam aliâ, cuius etiam hic imaginem exhibemus, vt quæ fortasse non minus, quàm antedicta, veram referat, misit ad me Gabriel Fallopius Mutinensis medicus singularis ingenii & eruditionis, dum Patavii honorificè humani corporis dissectionem & materiam medicam proficetur. Eam autem libenter depingi curauimus, atque in medium proferre libuit, vt rei herbariæ peritos in his, quemadmodum & in cæteris plantis, iudices constituamus: quorum sanè iudicio subscribent studiosi, quibus nos quidem, quantum labore atq; industria consequi possumus, non grauamur prodesse. Ericam paucis persternit xii Galenus libro v i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Erica digerendi per balneum facultatem obtinet. Flore eius tenuissimâ, ac foliis vtrèdum. hæc Galenus. Cæterum aqua, in qua Erica decocta sit, sumpta tepida tam mane quàm vesperti triginta dies quinque vnciarum pondere tribus horis ante cibum, valet ad vesicæ calculos comminuendos & expellendos. Verum post id tempus maiè affecti in balneum decoctionis eiusdem plantæ ingredi, atque inibi dum morantur, super Ericam decoctam sedere debent: idque pluries repetendum est. Equidem noui aliquos, qui seruata recta victus ratione, hoc tantum potu vesicæ calculum in minimas partes comminutum eiecerunt. Planta hæc, quæ Græcis *ἔρις* Latinis item Erica nominatur, pariter & Italis: Heyden, Germanis: Queiro, Hispanis: Bruyere, Gallis.

*Erica fruticosa ex Gal.*

*Nomina.*

## ACACALIS CAP. CI.

ACACALIS fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis myricæ quadantenus similis. Cuius aqua, in qua maduerit, ad collyria additur, quæ

ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

ACACALIM Aegyptiæ arbuscula semen ad nos hac ætate conuehi non equidem arbitror. quippe quod inter femina, quæ peregrina nobis importantur, nullum adhuc repererim, quod Acacalim legitime referat.

## RHAMNVS PRIMVS.



## RHAMNVS SECVNDVS.

RHAMNVS TERTIVS.  
CAPVT CII.

RHAMNVS fruticat in sepibus, ramos ferens rectos, & aculeos in acutæ spinæ modum foliis paruis, oblongis, subpin-

30 RHAMNI tria genera facit Dioscorides. *Rhamnus* Primum, & tertium vbiq; in Hetruria fruticant. Illud priuatim in sepibus nascitur, quo nostrates mulieres vtuntur ad insolandas ficus siquidem eas adhuc recentes longis huiusce fruticis aculeis perforant, & ad solem appendunt. Fert aculeos in acutæ spinæ modum: folia oblonga, mollia, subpinguia: corticem habet admodum album. Hoc, quod nigrius est (vt etiam Dioscorides inquit) quindam ferme cubitorum altitudine attollitur, infirmioribus aculeis: fructu tenui, folliculari specie, rotundo, verticillo non abfimili. Secundum verò genus, quod cæteris candidius est, ad nos misit clarissimus medicus Lucas Ghinus, cuius etiam hic effigiem damus. Cæterum Ruellii deceptum esse crediderim. quippe qui Rhamni genus eam esse stirpem arbitretur, quam nos vulgari sermone SPINO merlo, Longobardi Venetique Spin ceruino, Foroiulien-  
40 ses verò Spin guerzo appellant. Hæc enim foliis est latis, pyri quadantenus modo: fructu ligustri effigie, baccarum instar, cuius succo vtuntur pictores, vbi colore viridi insicere sit opus: alii verò ad resoluendam aluum cum saccharo decoquunt: eicit enim atram bilem, & pituitam. quæ sanè notæ Rhamnis minime correspondent. Aberrasse præterea Ruellius deprehenditur, quod Theophrasti testimonio ea de Rhamni fructu tradiderit, quæ statim Theophrastus absoluta rhamni historia de paliuro differuit. Sed in errore longè maiore versan-

*Ruellij et  
ror.*

quadantenus rubetibus: cuius rami qui nū ferè cubitorum longitudinē implēt, spinosiores quidem, sed infirmioribus minusq; rigentibus aculeis. Fructum edit latum, candidum, tennem, folliculari specie, verticillo similē. Omnium folia igni sacro, & serpentibus vlceribus, efficaciter illinuntur. Fama est ramos huius valuis, fenestrisve impositos, veneficia depellere.

## SPINO MERLO ITALICE.

Monacho-  
rum error.Rhamni  
vires ex  
Galeno.

tur Monachi, qui in Mesum commetarios edidere, cum Rhamnū existimauerint rubum quendā, qui humi repens, incultisq; proueniens, mora cæruleo potius, quam nigro colore profert. Rhamni meminit Galenus lib. 11. 1. simplicium medicamentorum, sic inquit. Rhamnus desiccata, & digerit excessu secūdo, re-

frigerat in primo completo, aut secundo incipiente. proinde herpes sanatur, & erysipelata non magnopere calida. Ceterum ad hæc teneris utendum est foliis. Huic plantæ nomen Græcum *ῥαμνός*: Latinum, Rhamnus: Mauritani, Nausig, siue Nausigi: Italicum, Rhamno, & Matruea: Hispanicum, Scambrones.

## HALIMYS. CAP. CIII.

## HALIMYS VULGARIS.



HALIMYS frutex est sepimētis idoneus, similis rhamno, sine spinis, foliis oleæ, sed latioribus. Nascitur in sepib\*, & maritimis. Folia decoquuntur ciborū gratia. Radix conuulsa, rupta, torminaq; mitigat, drachmæ pondere in aqua mulsa pota: eadem lactis vbertatem facit.

Halimi cō  
sideratio.

EST profectò & Halimus planta, cuius varietates sunt inter auctores sententia. Alii enim (vt Plinius auctor est lib. 8. cap. 11. 1.) halimum fruticem esse dicunt, Dioscoridem secuti. Alii maritimum oleas, falso sapore. Tertiū quoq; genus addit. Cræteus sub hedera tantū nasci, longioribus foliis, his latioribusq; odore cupressi. Quæ autem à Dioscoride hoc loco describitur, etsi alicubi fortassis proue-

niat in Italia, tamē qui illam mihi ostenderet, adhuc reperi neminem. Verim, si Ruellio credimus, frequens in Gallia nascitur in sepibus. Solinus plurimam in Creta nasci tradit, mirabili, si credamus, effectu, quod ea tantum admodum famas arceatur. vnde si nomen adinuenerit, ea procul dubio sine aspiratione scribenda esset. Halimus Mauritanis molochia, & atriplex marina appellatur. Cuius historiam referens Serapio, narrat, quod eam venale circumferentes in manuales fasciculos componunt, & per Babyloniam clamitant, molochia, molochia. Quod manifestè indicat, Halimum apud Mauritanos herbam potius esse, quam fruticem, vel arborem, eamq; fortasse, quam Plinius maritimam, ac falsam prodidit. Quo fit, vt falsam quandam herbam (incolæ Biddone vulgò appellant) quæ frequentissima in litoribus Venetis prouenit, hanc esse putauerim: quippe quod ea instar oleis in ciborum vsum recipitur. Hæc nimirum (vt eius pictura, quam hic damus, aperte demonstrat) folia fert olium similia, crassiora tamen, ac perinde ferè pinguis, vt portulacæ, subalbida, læuis, sapore falso. Caules emittit albicantes, tenues, & lentos, in quorum summitate semen profert minutum, racematim coherens. Nascitur frequens prope Tergestu monia circa salinas, vbi etiam separatim, nec minus copiosa visitur atriplex marina, quæ syluestre maximè æmulatur. quanquā apud Mauritanos atriplex marina idem esse videtur cum halimo. Sed quod inter se differant, manifestum fiet libro secundo in atriplicis commentatione. Ceterum putat Adamus Lonicerus, Halimū eam esse plantam vvas ferentem, quam vulgò Ribem vocant. Sed cum huius folia non respondeant oleaginis, sed potius virgineis, eum planè hallucinatum esse constat. Halimi meminit Galenus lib. 1. simplicium medicamentorum, sic inquit. Halimum, hæc planta frutex est plurimo in Cilicia præcipue prouentu, vbi & germina eius recentia escant, & reponit quoque in posterum futura vsum. Semen pariter, & lac planta ipsa generat, estq; gustus falsi, & subadstringentis. Ex quibus omnibus palam est, ipsam esse dissimilem. Maior autem pars eius substantia calida est temperatè, cum humiditate incoacta, & leuiter fluuosa. Quæ planta Græcè *ῥαμνός*, Latine similiter Halimus dicitur: Arabicè, Molochia: Italicè, Halimo: Gallicè Franche pute, vel blanchepure.

Halimi cō  
res ex Ga  
leno.

Nominis

## PALIVRYS. CAP. CIIII.

PALIVRYS frutex cognoscitur, aculeatus, durus: cuius semen pingue, & fuliginosum inuenitur. Quod potum tussi opitulatur, vesicæ calculos comminuit, serpentium ictibus aduersatur.

fatur. Folia & radix astrictoriam vim habent: quorum decoctum potu alui fistit, urinam trahit, contra venena, & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoreque omnes discutit, trita, & imposita.

*Paliuri cō sideratio.*

AD E ò inter se in quibusdam plantarum hi  
 floribus discrepant scriptores, ut per sepe eorum  
 mentes maximè perturbent, qui rerum verita-  
 tem indagare student. Id autem discriminis ni-  
 mirum euenit de Paliuro. Nam quæ huiusce  
 stirpis à Dioscoride traditur historia, omnino  
 differt ab ea, quam diuersis generibus protulit  
 Theophrastus. Hæc autem non conuenit cum  
 ea, quam memoria prodidit Agathocles: neque  
 huic illa correspondet, cuius Plutarchus est au-  
 thor: & hæc à prædictis omnibus prorsus dissen-  
 tire videtur. Paliurus Dioscoridis (ut ab eo pri-  
 mum exordiar) est frutex spinosus, durus, om-  
 nibus notus: cui semen pingue, & fuliginosum.  
 Paucis eius historiam perscrinxit Dioscorides,  
 nulla habita de foliis mentione, quòd superua-  
 cuncum existimauerit pluribus agere de Pali-  
 uro, utpote planta apud suas regiones notissi-  
 ma. quòd nobis est impedimento, quò minus  
 veram Paliurum, de qua ipse intellexit, co-  
 gnoscere valeamus. Theophrasto deinde libro  
 III. cap. x v i i. de plantarum historia plura  
 sunt Paliuri genera, quæ omnia in siliquis semi-  
 na terna, aut quaterna proferunt, lentorem præ-  
 se ferentia, ut lini semen. Amat nasci locis arid-  
 is, quemadmodum & rubus, nec minus quo-  
 que dilutis. Cæterum ab hac non parum differ-  
 re videtur & illa, cuius idem meminit inferius  
 libro, & capite quarto: siquidem hæc plurimam  
 nasci testatur in Aphrica foliis ei, quæ in Græ-  
 cia nascitur, non ab similem. Quæ quannus folio  
 Græcam æmuletur, fructu tamen diuerso  
 provenit, ut qui non latus, neque folliculari spe-  
 cie, sed rotundus, ruberque sit, cedri fructibus  
 magnitudine similis: cui & nucleus inest acino-  
 rum punici modo, qui non manditur. Fructus  
 verò per se iucundus habetur, atque si quis vi-  
 num infundat, tum ipsum suauisorem, tum vi-  
 num suauius reddit: aut. Ex quo aliquando mi-  
 hi persuasus, eum non longe aberrare, qui dixe-  
 rit, hanc illam esse stirpem, quam nos A G R I -  
 F O L I V M dicimus, quæ foliis sit vndique acu-  
 leatis loco maioribus, fructu cedri, rotundo, ru-  
 bro, nucleum intus habente, iucundo, & gustu  
 non ingrato: non tamen, quòd pro certo hoc as-  
 serere velim, quòd hæc propria sit Aphricæ  
 planta, sed quòd aliquando his notis persuasus  
 putauerim, Paliurum hanc aut Agrifolium esse,  
 aut omnino arborem sibi similem. Plinius ex  
 Theophrasto hanc ipsam litteris mandauit lib.  
 x i i i. cap. x x v i i. Sed cum de viribus  
 eius differeret lib. x x i i i. eam recensuit,  
 quam & Dioscorides. Nullam ego arborem ha-

genus reperi, quæ Paliuro Aphricanæ simili-  
 tudine respondeat, præter Agrifolium, ut dixi.  
 Non dico Aquifolium: nam (ut Plinius refert  
 lib. x x v i i. capite v i i i.) Aquifolium ea

*Aquifolium*

AGRIFOLIUM.



baccis æmulans. Huius radicem cortice in-  
 colæ viscum parant, quo etiam modo ex vi-  
 burno conficiunt. Hanc non desunt, qui ve-  
 lent eam esse stirpem, quam Theophrastus  
 Agriam, siue Ariam appellat, sempiternæ  
 frondis arborem, inter robur, & ilicem me-  
 diam. Verum ut ad nostrum institutum re-  
 deamus, Agathocles Paliurum omnino ab  
 illis differenter tradit: quippe quoniam as-  
 surgat in Alexandria (ut ipse inquit) ad pi-  
 nus, vlnique proceritatem, ramis frequen-  
 tibus, & aculeatis: folio viridi, rotundo, tenui.  
 Hæc misera est, nam tam vere, quam autumnò  
 fructum profert, oliuæ phauliæ vocatæ ma-  
 gnitudine. Crudus manditur is ac vires: vbi  
 verò exaruit, in farinam molitur, atque es ita  
 estur nullo liquore subacta. Aliud Paliuri ge-  
 nus in monte Coccygio nasci prodit Plutar-  
 chus ex Ctesiphontis autoritate libro arbori-  
 bus dicato, cui si quis, aut aliud animal voluere  
 fidat, velut inuiscatum coheret, præter cu-  
 culum, soli parcat, si tamen his fides est ad-  
 hibenda. Quare cum de Paliuro, tot ac diuer-  
 sæ ferantur sententiæ, & habeantur historiae,  
 facile crediderim, Paliurum esse nomen ad na-  
 tionum placita variis, ac diuersis aculeatis stir-  
 pibus impositum. et si Iosephus Salandius medi-  
 cus apprime doctus, & in stirpium historia non im-  
 peritus, dum Venera classe in Græciam traiecit,  
 Dioscoridis Paliurum se vidisse mihi pro cer-  
 to affirmauerit, semine fuliginoso, ac pingui-  
 que inibi propriū adhuc nomen retinere. Sunt  
 tamē recentioribus, qui putent Paliurum Diosco-  
 ridis eam esse arborem, quam nos sequenti ca-  
 pitulo oxyacanthum esse pluribus comprobabimus.  
 Sed profectò non placet eorum opinio, quòd  
 planta, quam oxyacanthum censemus, arbor sit,  
 nō frutex: quòdque fructum proferat myrti ma-  
 gnitudine, conseruatum, fragilem, rubrum,

i 2 officul

*Agrifolium*

*Recentia-  
 ram opi-  
 nio repro-  
 batur.*

officulos intus habentem, & in racemi modū coherentem. Paliurus verò non fructum, sed semen ferat fuliginosum, pingue, & (vt Theoph. inquit lib. 111. cap. x v 11. de historia plantarum) in siliquis cōclufum, lentum, pingueq; lni seminis instar. Verum si fortasse Theodorū Theophrasti interpretem sequentes, hac in re decipiuntur. Siquidem is lib. primo cap. x v 1. sic vertit: Quædam folia cū extremo, tum etiā lateribus sinuata concidunt, vt oleis, roboris, 10 smilacis (glandifera scilicet, & cuncta folia spinosa rubi, paluri, & aliorum. Vbi animaduertendum est, cum perperam vertisse *παρρηαρίστη* sinuata, cum ea dictio Græca nō aliud Latine significet, quam spinis horridula. Error præterea ex eo manifestè deprehenditur, quod omnino sensu pateat, ilicem, smilacem, rubum folia non proferre aliqua parte sinuata, vt ea esse cernuntur, quæ plantæ illi exeunt, quam nos acutam spinam arbitramur. sed longa. & per ambitum vbi 20 que tenuissimis, ac crebris aculeis circumsepta, in eiusdem capitis progressu idē ostendit Theophrastus, cū inquit. Simili modo nonnulla ex his caulem primo mitem, post horridulum spinis gerunt, vt lactuca, & cuncta folia spinosa red duntur, acque etiam magis in fruticum genere, vt rubus, paliurus. Quibus palam fit, plantam, quam nos vulgò vocamus Bagaia, alii verò Amperlo, non esse Paliurum, sed potius acutam spinam iis tum rationibus, tum auctoritatibus, quæ sequenti capite à nobis adducuntur. Gale nus Paliuri à Dioscoride descripti meminit lib.

*Paliuri* vbi  
res ex Ga  
leuo.

*Nomina.* Ital. pariter appellatur. Gallis autem, Houx.

ACUTA SPINA.  
CAP. CV.

ACUTA spina, quam pyrinam, aut pityanthem aliqui vocant, arbor est 50 pyrastro similis, spinosa valde, & minor: baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum: radicem multifidam, altè descendentem. Huius bacca potu, aut cibo, alui profluuium, & abundantiam fœminarum sistunt. Radix illita aculeos, & spicula extrahit: abortum fieri tradunt, si ter radice venter aut sensim

feriatur, aut perungatur.



HANET pro *Acuta spi*  
comperito tota re *na confide*  
centiorum medi *ratio,*  
corum familia,  
quod arbor Dio  
scoridi *spina*  
æ, id est, acu  
ta spina, vocata,  
quam Mauritani  
Berberim dixe  
re, ea sit nimi  
rum arbuscula  
spinis horrens,  
quam rura Tri  
deniina, vbi in  
sepibus, syluis,  
& conuallibus fre  
quentissima na  
scitur, Crespino vulgò nominant: medicorum  
verò vulgus, ac officinæ Arabes secutæ Berberim appellant, ita effecerunt credentes, vt opinio ne ducuntur. Veruntamen si rectè delineatio nes, notæque perpendantur, quas oxyacanthæ reddidit Dioscorides, crespini notis protus acuta spina reclamare constabit. Quapossimum ratione adductus, quod magis veritas eluceat, errorisque nebula tollatur, non dubitauimus eorum opiniones rescindere, qui inter recentiores medicos de stirpibus commentaria conscribentes, Crespinum vocatum legitimam oxyacantham esse asseuerant. Neque me fugit, non parum suscepisse negotii, vt eos à concepta iandiu opinione in sententiam nostram, quam veram putamus, venire compellam, cū magna admodum sit tum medicorum, tum seplariariorum turba, quæ hac in historia longo vsu aberrat. Verum cū conpertum habeam, quod veritas sit niue candidior, solèque splendidiore, & eorum tum vera, tum fida comes, qui virtutibus, ac probitate præstant, duxi meas rationes multorum auctoritate comprobatas, nullam horum doctissimorum viro rum auribus molestiam allaturas, qui nolentes aberrarunt: quinimo iis, vapore veri defensoribus, fore iucundissimas, atque gratissimas. Nam qui, vt sibi placeant, malunt errare quàm veritati, & æquo cedentes, errores cognoscere, eosque corrigere, non sunt in philosophorum, ac rationabilium hominum numero recipiendi. Sed ne apologeticis verbis tempus conteratur, rem institutam aggredior. Dioscorides acutam spinam arborem esse pyrastro similem scribit, minore tamè magisq; aculeatam, fructumq; gerere myrti similitudine, plenum, fragilem, iubentem, & intus nucleum, cui radices subsint multifidæ, altèque descendentes. Ex quo palam est, ipsam non alias acutæ spinæ notas expressisse quàm proceri-

*Acuta spi*  
na non est  
offic. Ber  
beris, sine  
Crespino

proceritatis, crassitudinisque, stipitis, ramorum  
radicum, ac fructuum, omnia foliorum, florum,  
& corticis historia. Quæ omnia ipse accuratè  
perpendens, in primis Crespinum omnibus no-  
tis pyrastro reclamantem comperio, cui tamen  
proflus adstipulari acutam spinâ Dioscorides  
est auctor. Siquidem sylvestris pyrus, quem ad-  
modum & oxyacantha, simplex è solo profilit,  
atque unico duntaxat caudice attollitur, ac inde  
tam in longum latumque crevit, ut ad com-  
munem arborum proceritatem assurgat. Cres-  
pinus verò, cuius sanè innumeræ mihi præ-  
oculis quotidie sese offerunt plantæ, nullum  
ab radicibus mittit caudicem, sed pluribus, ac  
diversis aculeatis folionibus fruticat, qui vir-  
garum modo in altum se attollit, nec inquam  
arborescunt, nisi rarò, & longo temporis tra-  
ctu: quippe qui omnium maiores habentur,  
pollicarem crassitudinem rarissimè excedunt,  
nisi ætate longa incrementum susceperint, quin  
& rara inveniuntur eius virgula, quæ homi-  
nis longitudinem æquent. Ad hæc pyrastre  
cortice constat aspero, squamoso, inæquali,  
crasso, colore in nigro rufescente. Crespinus  
verò cortice vestitur albo, lævi, & admodum  
tenui: quo fit ut non adeo leuiter ferat, vel  
lapide tangi possit, quin statim cortex fran-  
gatur, & crocea ligni materies detegatur.  
Præterea pyrastre prunorum modo aculeata  
conficitur, aculeis singulis ex eodem loco  
erumpentibus, licet rami frequentissimis hor-  
reant spinis, nique nigris, validis, candidi  
rharni modo mucronatis. At crespinus tenuis  
per intervalla armatur aculeis, simul ex uno,  
eodemque puncto prodeuntibus, adeo ut tri-  
furcato ordine prodeant, duobus scilicet  
vtrinque se pandentibus, tertio verò medium  
occupante, albis, planis, non quidem ro-  
tundis, fragilibus, & admodum pungentibus.  
Illud insuper discriminis addam, acutam spi-  
nam fructum afferre myrti magnitudine. Cres-  
pinum verò racematim in vix modum, cuius  
oblongi acini tritico paulò maiores, viridi, ac  
rubentes, elegantisque racemis adnexi, puni-  
ces acinos quadratenus repræsentant: quan-  
quam minores, oblongiores, acidiores, & co-  
lore etiam multo vivaciore habeantur. Cres-  
pini deinde folia minime pyrastro referunt,  
sed potius panicam malum, quamvis lanota,  
nec adeo in mucronem definitia, per ambi-  
tum spinis tenuissimis, frequentissimisque hor-  
rida. Radices etiam, quæ profectò æquè flaue  
sunt, ac si croco essent infectæ, etiam plures  
sint, atque exiles, nihilominus altè non de-  
scendunt, veluti acutæ spinæ, sed in latus  
summo cespite vagantur. Flos denique py-  
rastro admodum refragatur: nanque meli-  
sus ex racemo vix simili erumpit, sui fruc-  
tibus interno colore, à quo dum explicatur,  
atque dehiscit, perquam suavem spirat odo-  
rem. Quibus evidentissimè colligi potest, &  
oxyacantham Græcis, & berberim Ara-

bibus non esse crespinum, cuius commu-  
nis est usus apud medicos, & splasfarios.  
Sed præter hæc illud etiam certò credendum  
est, quòd si Dioscorides per acutam spinam  
crespinum intellexisset, nunquam silencio dis-  
simulasset folia mirabili opere per ambitum  
aculeata: neque fructum, quem ramis pendu-  
lum gerit, acinis inter se racematim cohæren-  
tibus, myrti baccis affimilasset: nec scriptum  
reliquisset, radices in profundum agi: nec deni-  
que flauum earum colorem inquam reticulisset,  
quo insigniter natura infectæ sunt. Non præ-  
termisisset etiam spinarum historiam, vtpote  
quæ ternæ suis virginis innascantur, à pede ad  
verticem: non corticis candorem, non tenui-  
tatem: non item, quòd sæpius sine caudice,  
varis veluti folionibus fruticet: non denique  
ipsam pyrastre proflus similem reddidisset, à  
qua profectò non minus distidet, quam quercus  
ab olea. Cæterum si modo dicendum est,  
Oxyacantham nasci in Italia, eam equidem  
aculeatam arborem esse crediderim, stipite,  
cortice, ramis, floribus, proceritate, ac lig-  
ni materie planè pyrastro referentem, quam  
in Hetruria rura nostra Senensis Bagaia vulgò  
nominant, Ananienfes, & cæteri Tridentina-  
rum vallium incolæ quidam Amperlo, qui-  
dam verò Pan d'orso vernaculis nominibus vo-  
cant, & Goritienfes Barazzo bianco vulgari  
sermone appellant: quippe quæ omnibus no-  
tis, ac lineis acutam spinam referat. Primum  
enim hæc manifestò indicio esse possunt, ar-  
boris scilicet stipis, rami in qualibet parte acu-  
tissimis, firmisque aculeis armati, ligni mate-  
ries, subscaber squamosusque cortex, veluti  
pyrastro. Tum ita esse comprobant radices in  
profundum descendentes, & fructus, quem  
fert myrti crassitudine, visu iucundus, rube-  
scens, plenus, fractu facilis, ori subausterus,  
in quo modò vnus, modò plures concludun-  
tur nuclei. Flos etiam, quem album edit, py-  
rastro admodum adstipular: quippe quòd  
sit illi haud quaquam absimilis. Porro folia  
duntaxat à pyrastro diffidere videntur: nam  
dissecta sunt apii modo, paululumque lon-  
giora. Verum mihi quidem illud non viden-  
tur ob multas rationes aliqua ex parte nostræ  
repugnare sententiæ: conuenientia enim plu-  
ribus ex partibus peti certum est, non autem  
ex paucioribus. Quali ergo acuta spina vireat  
flos, hic non explicauit Dioscorides, sed  
tantum dixit, eam esse arborem pyrastre simi-  
lem: quòd magis ad stipitis, ramorum, corti-  
cis, florum delineationem, & ligni mate-  
riem respiceret, quam ad folia, quæ nihilo-  
minus laciniata constant apii modo: tametsi  
hoc in loco id adnotare prætermiserit Diosco-  
rides. Hoc autem probatur manifestò ipsius  
Dioscoridis, ac etiam Theophrasti testimo-  
nio. Nam Dioscorides, cum de mespilo age-  
ret, duo mespilorum genera constituit, & re-  
licia in capitis calce vulgata, quæ frequens, &

*Legitima  
oxyacan-  
tha.*

CRESPINVS.



communis visitur in Italia, illam in primis descripsit, quæ Neapoli nostra tépestate vulgò Azarolo vocatur, & veteribus aronia dicta est, sic inquit. *Méridap. vò dicitur. 2* *in primis dicitur in Italia, illam in primis descripsit, quæ Neapoli nostra tépestate vulgò Azarolo vocatur, & veteribus aronia dicta est, sic inquit.*

aronia vocatur, spinosa est, similis foliis oxyacanthæ: fructum ferens exiguo malo similem, suauem. Quibus autem foliis conficit illa mespilus Azarola vocata, Theophrastus lib. 111. cap. x 11. demonstrauit his verbis. Huius folia dissecta sunt, extremitatēq; apio similia. Ita fit, vt concludamus oportet, si mespilus aronia folio oxyacanthæ prouenit, eodq; scisso (vt Theophrastus prodidit) apii instar, hanc spinosam arborem Bagaia vulgo dictam, esse procul dubio acutam spinam. quandoquidem eius folia in modū apii dissecta sunt, mespili aroniæ modo. Theophrastus lib. v 1. cap. vltimo de historia plantarū scribit, oxyacanthæ fructū fuisse antiquis in coronarum vñu. Quod etiam non paruo est argumentum, illam legitimam esse oxyacantham, quā in mediū attulimus. Quandoquidem fructus eius, qui autumnō toto, & ad mediū hyemem vsq; perdurat, adeo latuore quodā pellucet, ruboreq; decoratur, vt globulos ē præstantiori corallo paratos referat: id quod in coronis maximē præstasse crediderim. Hæc est nostra de oxyacantha sententia, quā nobis satis, vt arbitror, tum rationibus, tum auctoritatibus comprobata. Quam tamen quod infirmare videatur Theophrasti auctoritas lib. 1. cap. x v. & lib. 111. cap. 111. de historia plantarum, vbi oxyacantha connumeratur inter eas arbores, quæ perpetua fronde virent, cum nostræ folia decidant, non est qui non facili intelligat. Sed ego quidem non possum huic auctoritati alioqui grauissimæ assentiri, quin potius adducor, vt suspicer codicem ita in locis deprauatum esse. Suspicionem nobis facit illud, quod ibi tilia, myrica, quercus, & terebinthus sempiterna comia prodantur. quod vt falsum deprehenderit ab omnibus, qui hisce plantis folia decidua esse obseruabunt, ita quoque oxyacanthæ contigisse cognoscere, atque in omnibus mendum codici subesse. Eandem suspicionem augeat nobis Plinius, qui lib. x v 1. cap. x x. & x x 1. dum arbores enumerat, quæ perpetuò virent, nul-

lam tiliæ, nec quercus, neque oxyacanthæ mentionem facit: attamen is reliqua Theophrasto accepta referre potest. Reliquum igitur est, vt dicamus, Crespinum aliud esse ab Oxyacantha, plantamque ideo fuisse veteribus incoenitam, quod eorum nullus, qui de plantarū historia scripserūt, huius aculeatæ stirpis (quod ego sciam) meminerit. Porro *CRESPINVS* frutex potius, quam arbor est, ē terra virgultis plurimis assurgens, veluti corylus ē quibus non desunt, quæ quandoque longo temporis tractu, agrē tamen, arborescant. Hæc ab imo ad summum spinis quibuscumq; acutissimis horret longis, compressis, albicanibus, fractuque minimē contumacibus, quæ (vt supra dictum est) per interualla terræ ex eodem prodeunt puncto. Cortex toti plantæ candidus, læuis, ac tenuis: cui subest ligni materies flaua, fragilis, atque fungosa. Numerosis tora virgultorum congeries nixitur radicibus impense flauis, quæ per summa terræ diuagantur: foliis ferē punice, tenuioribus tamen, latoribus, minuscule in mucronem extensis, per extremum ambitum minutissimis spinis circumseptis. Flores emittit ineunte Maio luteos, racematim cohærentes in vñæ ferē modum, odore non ingrato. Quibus postea succedit fructus acinis oblongis, racemo pendulis, qui maturitate maximē rubent, punice mali acinis haudquaquam ab similes, quāquam figura longiores, gustu acido, & subaustro, paruis reconditis intus nucleis. E fructu post vindemias incolæ vinum exprimūt, quod falsò de Berberi vocant officinæ: cui austeritatis aciditatisq; longē plus inest, quam mali punice succo. Quod si in acuris, perniciosissiq; febribus, vt causus, & quæ pestilens est, iulapio violaceo commixtum, ac aqua ægotantibus exhibeatur, non modò sitim restinguit, sed biliosas, pe-

*Crespini forma, & virtus.*

*Vna spina mentio.*

marina

VVA SPINA



experuntur. Huic accedit & altera planta veteribus, quantum reor, incognita & silentio inuoluta, quam aliqui falso Mauritiano-  
 RIBES VVILGARIS.

Ribis effi-  
 cim. confid.



Ribis effi-  
 cim. confid.

sapore subacido, admisso etiā dulci. Vulgaris est planta, in hortisque frequens: quippe quoniam ad sepiendos hortorum puluinos eleganter feratur. Verum eors hallucinari abunde constat, qui putant, hanc arbusculam esse Arabum Ribem. Siquidem, vt posteritatis memoriae prodidit Serapio, Ribes est arbor proferens capreolos colore viridi rubescente, & foliolata, magna, & rotunda. Quas sane notas huic non respondere satis notum est: neque enim fert hęc capreolos, neque eiusmodi foliis viret, tameis fructu Ribem admodum referat, quod is gustui sit acidus simul & dulcis, qualem esse Ribis baccam auctor est Serapio. Quamobrem is ad ea, quę ille iure poterit usurari, vt pote quod febribus acutis optuleatur, effusantem ventriculum refrigeret, si mire resinguat, nauisam & vomitiones sistat, cibi appetentiam incitet, cœliacos, & lientericos iuuet, & biliosis defluxionibus, vexatos sanguinis feruorem demulceat,

marina, & à pluribus Vva crespinata vocata. Planta hæc antiquis fortasse incognita fuit nunc autem omnibus notior est, quā vt à me pluribus describi debeat. Huius baccę in viti ciborum sunt vuz omphacis loco. Quę & febricitantibus iusculis incoctę non sine vilitate exhibentur. In summa mulieribus vtero gerentibus magnopere luta, quam aliqui falso Mauritiano-  
 RIBES VVILGARIS.

bilis acrimoniam retundat, impetumq; domet. Quare non dammandi, quin potius laudandi videtur seplasarit, qui ex huiusce arbusculę fructu vinum exprimit, & per annum affusant, vt illud Ribis loco medicamenti inmiscuant. Non desunt, qui id esse hanc plantam arbitrentur, quod Galenus lib. v. 1. de compositione medicament. secundum locos vrsi vnam appellat. Quorum error facis ab ipsomet Galeno refellitur eodem loco: quando quidem asserit huiusce vuz plantam memacyli folio virefcere. Bellonio verò in libro de arboribus coniferis Ribes Serapionis planta quędam censetur, quam se inuenisse scribit in monte Libano ad supremum cacumen, foliis oxylapathi, grandioribus retusioribûsq; quorum medio racematim exeunt baccę rubentes, vt in hippoglossio, rusco, & lauro Alexandrina. At certę ego non audeo, nec possum Bellonii iudicio subscribere, quod planta illa non respondeat notis, quas Ribi tribuit Serapio. Ea enim folia non sicut rotunda, sed oxylapathi, non habet capreolos, & baccas ē mediis foliis exerit. Vnde facile adducor, vt putem eius Ribem falsum & adulterinam esse potius, quā veram & legitimam. Oxyacanthę meminit Galenus lib. v. 1. 1. simplicium medicamentorum, sic inquit. Oxyacanthus, arbor vt pyro syluestri similem habet speciem, ita & vires non dissimiles: quin & ipsi fructus, pyri quidem syluestris absolute acerbus est, ceterum oxyacanthę, & tenuium est partium, & paulum quiddam incisuum obtinet. Porro arboris huius fructus pyri syluestris fructui similis non est, verum myrtis, scilicet rubens & rarus. Habet verò & nucleos. Porro non esus tantum, sed & bibitus affectus omnes fluxionum, quos *serapio* Gręci vocant, cohibet. Hęc planta Gręcis *φύκεν* nominatur: Latinis, Acuta spina: Arabibus, Amirberis, seu Amyrbaris: Italis, Bagaia, & Ampello: Hispanis, Pirlitero, & Pirliteros: Gallis, Aubespin.

Bellonio  
 opinio in  
 probata.

Oxyacanthę  
 vrsi  
 ex Gal.

Nominatur.

RVBVS CANIS.

CAP. CVI.

FRUTEX est arboris instar, rubo longę maior. Folia fert multo latiora myrto, robustis circa ramos spinis, flore candido: fructu oblongo, nucleo oliuę simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis est factus, aluum sistit: serucfacti enim ij in vino, mox poti, arteriam infestant.



*Rubicanus confus.*

NON EQVIDEM putauerim esse Rubum canis illud rosarum syluestriū genus, quæ rosas edunt iis quadantenus similes, quas Moschetto vulgò vocamus, quæq; rubentes baccas rosarum fructibus non absimiles licet minores, proferunt: nec etiam quòdvis aliud syluestre rosarum genus, quemadmodum nonnulli existimant. Nam si ita res se haberet, sat erat Dioscoridi dicere, quòd canis Rubus rosæ similis esset, non autem quòd arboris instar affargeret, rubo longè maior, quòdq; folia ferret myrto latiora, à quibus syluestris rosa profectò plurimum diffidere videtur, fructumq; mixtæ nò modò oliuarum nucleis, sed oliui ipsius multò crassiore. In eam autem sententiam non modò me pluries deduxit, sed etiam confirmauit Plinius: quandoquidem ipse lib. v l i i. cap. x l i. peculiari nomine rosam syluestrem cynorrhodon appellat, id est, caninam rosam, non cynosbaton, id est, caninum rubum, cuius radicem ad canis rabidi morsum miris laudibus extulit. Quod iterum asseruit lib. x x v. cap. i i. vbi illud etiam addidit, quòd apud veteres nil aliud cynorrhodon erat, quam spongiola illa, quæ mediis syluestrium rosarū ramis oboritur. Cæterum cūm de cynosbato, hoc est, canirubo idem differret, eum à rosā syluestri longè diuersum fecit, ut videre est lib. x x i i i. cap. x i i i. vbi ait, cynosbaton folio esse vestigio hominis similem. Huc illud etiam accedit, quòd posteris scriptum reliquit Theophrastus libro i i i. cap. x v i i. de plantarum historia, vbi sic inquit. Canirubus fructum subrubrum parit malo puniceo similem: est inter arborem & fruticem medius, & punicea proximus, folio viticis. Ex quibus palam est, non parum inter se habere discriminis canirubū, & syluestrem rosam, de qua postea lib. & cap. v i. particularem tradidit historiam. Vbi cūm primum statius rosas longa prosecutus fuisset oratione, de syluestri ita paucis differuit. Syluestres rosæ domesticis asperiores tū virgis tū foliis constant, & florem minus odoratæ, minusq; coloratæ, nec tanta magnitudine ferunt. Quare pro còperto habetur, aliud genus esse rosam syluestrem à canirubo, quorū alterum *κνιν*, alterum *κνιν* à Græcis appellatur. Quocirca manifestò in errore fuisse deprehendit Marcellum Dioscoridis interpretæ, & commentator: quippe qui idem esse crederet cynosbaton, & cynorrhodon, non animaduertens, quā illa inter se dissimilia fecerit Plinius sibi familiāsimus. Hunc forsitan secuti Monachi in Meliæ scribētes, ipsi quoq; in eundem lapsum inciderunt, credentes syluestre rosam legitimū esse canirubū. Quibus præterea animo exciderat, Dioscoridem scripsisse rubi canis fructū oliuarum nucleis esse similem: quandoquidem ipsi illum puris compararūt. Ex quo aliquis facillè iudicabit, hos nullam canis rubi cognitionē habuisse. Ad hæc non reperio, quòd dixerit Dioscorides, canis rubi fructum semen aliquod includere, quo tamen rosarum sylue-

strium fructus referretur inuenire: sed lanosum quoddam continere dixit. Accedit his Serapionis autoritas, qui de canino rubo inter alia rubi genera egit, non autem inter rosas: quòd omnino compertum haberet, hūc à rosis quā plurimum differre. Illud insuper addiderim, quòd cūm rosæ syluestres ferē omnes non leuiter ex albo purpurecant, cynosbato verò flos perpetuò sit candidus, non est legitimè asserendum, syluestrem rosam esse cynosbaton. Ex iis igitur omnibus satis (ut arbitror) liquet, canirubum à syluestri rosā longè abesse: tantoq; magis quòd memoriæ prodiderit Theoph. lib. & cap. i x. de plantarum historia, caninæ scilicet fructum aucto statu colligendum esse, alioquin periculum oculis imminere. Quod aperte demonstrat, super eo vel tenuem quandam laugine, vel quid puluerulentis insidere, quod si à vento expellatur in colligentium oculos, facillè iis cecitatem inducat. quòd tamen in syluestrium rosarum fructibus nunquam visitur. Memnit Rubi canis Galenus libro v i i. simpl. medic. sic inquit. Huius fruticis fructus, non segnitè adstringit, folia verò mediocriter. Itaque particularis eius vsus haud ignotus est. Cauendum ab eo, quòd in fructu eius lanæ speciem habet, eum atterig infestum. Frutex is Græcè *κνιν* vocatur: Latine, Rubus caninus: Arabice, *Sen*: Italicè, Rouo canino.

*Rubi canis Seres ex Gal.*

*Nomina.*

#### LIGVSTRUM CAP. CVII.



LIGVSTRUM arbor est oleæ foliis circumramos similibus, latioribus, mollioribus, & colore viridioribus: flore candido, muscoso, odorato: semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope, & Ascalo-

ne. Folia astringentia vim habent: quare commanducata vlcibus oris medentur: illita feruidis inflammationibus, carbunculisq; profunt: decocto eorundem igni ambulta fouentur: capillum rufant trita folia, quæ in radiculæ succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprium oleum, quòd ex eo fit, odoratum, excalfacit, emollitq; nervos, si quæ feruenti natura prædita sint, assumat.

*Marcelli, & Monachorum la p. iiii.*

*Ligustri  
considera-  
tio.*

LIGUSTRUM in Hetruria Guistrico cor-  
rupta voce vulgus nostrum appellare con-  
suevit. Quod inibi etiam aliqui Oliuetta, non-  
nulli Oliuella, quidam Chambrosene vulgò  
vocant. Mauritanis verò Alcanna nominatur.  
Nascitur frequens in sepibus secus vias passim  
in Italia. Floret abeunte vere, & incuntes æsta-  
te, flore muscoso, vel (quandoquidem Ori-  
basius legit *σαρπυδα*) racemoso, candido, odo-  
re suavi, sed qui decerpitus statim flaccescit.  
Oritur ex eo baccæ in cacumine racematim  
coherentes pyramidis modo, hederæ baccis  
minores, læuiores, ac nigriores, quarum in  
medicamentis est vsus. Sunt qui has baccas à  
Virgilio, vacinia vocari putent. Sed meo qui-  
dem iudicio non rectè planè sentiunt. Quem-  
admodum nec Fuchsius, qui rubi mora, quo-  
niam Græcis *βακινία*, vacinia esse putat: siqui-  
dem vacinium florem, non fructum esse pluri-  
bus constat. Cæterum in nothis Dioscoridis  
stirpium nomenclaturis legitur, hyacinthum  
vacinium Romanis fuisse vocatum. Ex quo fa-  
cilè crediderim, vacinium Virgilio nil aliud  
designare, quam hyacinthum. Neque mirum  
est, quòd Virgilius hyacinthum vacinii nòmi-  
ne nigrum appellauerit: nam hyacinthus faci-  
lè cum violis colore purpureo certat, purpu-  
reus autem color à compluribus niger intelli-  
gitur. Hanc nostram sententiam comprobant  
Virgilius: quippe qui semper vacinia floribus  
admisceat, iisdemque comparat, non autem fru-  
ctibus. Quod manifestè declarauit in Bucoli-  
cis, vbi de vacinio sic cecinit, primò Eclog. 11.  
Alba ligustra cadunt, vacinia nigra leguntur.

Deinde in eadem.

Mollia luteola pingit vacinia caltha.

Item in vltima.

*Marcelli  
opinio re-  
probata.*

Et nigræ violæ suat, & vacinia nigra.  
Nec placet præterea Marcelli opinio, qui  
pluribus comprobare nititur, vacinium esse  
Irim. Siquidem præterquam quòd nunquam  
legerim Irim in coronis vaseis, color non  
æquè promptè correspondet, quòd varius adeò  
sit, vt non aliunde sibi nomen comparauerit,  
quàm à cælestis arcus colorum varietate. Adde  
etiam, quòd cum iridis flos omnium fragilissi-  
mus caducissimusque sit, poetæ nullo pacto  
hunc ligustro prætulisset. Quidam Ligustrum

eam conuoluuli speciem esse autumant, quæ  
sepibus, fruticibus, & arbutis se circumuoluit,  
ac etiam sepius vitium palis in vineis, flore  
candido, lilii, seu calathi effigie, quam ego læ-  
uem esse simillacem nunquam dubitavi. E quo-  
rum numero fuit Seruius Grammaticus Vir-  
gilius commentator Ecloga secunda Bucolico-  
rum. Nempe falsus (vt arbitror) quòd negle-  
xerit in hac historia Plinium consulere, Dio-  
scoridem, & alios de stirpium aatura differen-  
tes. Non desuerunt etiam qui existimauerint  
ligustrum esse Mauritanorum caprifoliū, quod  
sanè nil aliud est, quàm Dioscoridis pyxan-  
tha, seu lycium, non autem periclymenon, vt  
Ruellius placet. Sed isti quoque à veritate de-  
fiscunt. Ligustri meminit Galenus lib. v 11. *Ligustri  
simplicium medicamentorum*, sic inquit. *Græci ex  
Cypri seu ligustri folia*, summaque germina  
in vsum veniunt, & facultatis, & tempera-  
menti maximè misti: habent enim quiddam  
digerens cum aquea substantia modicè calida,  
habentque etiam adstrictorium quiddam ex  
terrena substantia frigida. Itaque eorum deco-  
cto quiddam ambusta fouent. Vtuntur verò  
etiam aduersus igneas phlegmonas, & carbun-  
culos. Nam absque molestia & morbi defici-  
cant. Quinetiam spontè prouenientibus in ore  
vcleribus aphthodesi, & ipsis puerorum  
aphthis communis accommodata sunt. *Kosqz  
arbor ita Græcis*, Latinis verò Ligustrum ap-  
pellatur: Mauritanis, Kenne, Henne, seu Han-  
ne: officinis, Alcanna: Italici, Guistrico, Oli-  
uella, Oliuetta, & Chambrosene: Germanis,  
Rheinuoelden, Beynhoeltzlin, & Mundholtz:  
Hispanis, Alfena, sive Alhena: Gallis, Du-  
troefine, vel Fresillon.

PHILLYREA. CAP. CVIIS.

40

PHILLYREA arbor est ligustri ma-  
gnitudine, foliis oleæ nigrioribus, &  
lactoribus: fructu lentisci, nigro, sub-  
dulci, racematim coherente. asperis  
nascitur. Huius folia adstringunt: ad  
eadè vtilia, ad quæ oleaster, cum attri-  
tione est opus: maximè ad oris vlcera  
commanducata, aut si decocto colluan-  
tur: pota vrinam, ac menses cient.

I 5 PHYL



Phillyrea.  
& Tilia  
confid.

RECENTIO-  
RES Dioscoridis  
interpretes, vt Her-  
molaus, Ruellius,  
& Marcellus Flo-  
rentinus, Phillyrea  
hic descriptam à  
Dioscoride, eam  
esse arborem cer-  
tò credere, quæ  
Tilia dicitur, nimi-  
rum falsi nominis  
similitudine. Quan-  
doquidè tilia Græ-  
cis *γίληρα*, non  
autem *εσώρια* di-  
catur. Quod cum  
nullus horum an-



maiusculi est, mi-  
nutiusculus autem  
confusus constat:  
cùm ille maiusculus  
scabitus, par-  
uula quædam, ac  
pauciusculi femina,  
quanta atriplicis  
emittit. Folium,  
& cortex dulcia,  
suauiaq; : folium  
forma hederaceu,  
nisi quod in angu-  
lum acutiorem ro-  
tundatur: & quan-  
quam iuxta pedi-  
culu curuatus, ram-  
men de medio in-

maduerit, alter alterum securi concor-  
des phillyream tiliam appellarunt, ita Græ-  
cum nomen malè, meo quidem iudicio, in La-  
tinum vertentes. Quo factum est, vt multis sit  
persuasum, vel quod Dioscorides tiliam nun-  
quam viderit, vel quod illi à vulgari tilia alia  
esset longè diuersa, vapore quæ omnibus notis  
tiliæ refragatur. Sed quod Dioscorides tiliã  
seorsum à phillyrea cognouerit, vel saltè in iis  
plantis discrimen posuerit, facis perspicuum  
fieri arbitror in huius libri præfatione circa fi-  
nem, vbi hæc verba leguntur. Flores, & omnia,  
quæ incundum odorem efflant, reponantur  
*distinctionis gratia*. Quæ sanè voces Græcæ  
non solum quod rectè verantur ab interpreti-  
bus, in arculis tiliaceis, sed quod postrema qui-  
dem non à *γίληρα*, sed à *γίληρα*, quæ Latinis  
tilia est, deduci possit, abunde declarat, has  
plantas diuersas esse in hoc ipso auctore. Porro  
hinc facillè comprehendi potest, quod illi non  
solum nomina, sed etiam rem considerint:  
nam si tiliam cognouissent, nulli dubium est,  
quin phillyream Dioscoridis proprio nomine  
separassent à phillyra, hoc est tilia Theophrasti,  
qui eam libro 11. cap. x. de plantarum histo-  
ria his verbis memorizè prodidit. ΤΙΛΙΑ  
quædam mas est, quædam femina. Distant in-  
ter se tum materie, tum totius corporis forma,  
& quod altera sit fructifera, altera verò sterilis.  
Nam materies mari dura, flaua, nodosior, spis-  
siorque: feminæ candidior, & cortex mari  
crassior, detractusque inflexibilis propter duri-  
tiam est: feminæ candidior, flexibiliorque, ex  
quo ciliis faciunt, item feminæ odoratio. &  
mas sterilis, nulloque flore est: femina & florem  
& fructum gignit. Hos calyculi intractus præ-  
ter folii pediculum, amplexumque: futurum, pe-  
diculo altero annexus, viridis, dum in calycu-  
la est, detectus autem leuiter flauus: flos: cum  
vrbans. Fructus oblongus, orbiculatus, magni-  
tudine fabæ, similis hederæ acino, quin in an-  
gulis velati neruis eminentibus, inque acutum,  
cuius est contrahentibus partibus, qui scilicet

acutius coacti prætendit, seq; prolixius protrahit,  
crispum in orbem leuiter, atq; serratum. Medullam exiguum materies continet, nec mul-  
tò reliquo molliorè corpore: nam & reliquum  
ligni molle est. Hæc de tilia Theophrastus.  
Quibus sanè notis adamussim responderet nostra  
tilia. Sed eas, mea quidem sententia, non inue-  
nias in phillyrea Dioscoridis: siquidem hæc fo-  
lio constat oleæ, illa verò hederæ: huic fructus  
lentisco similis, racematim coherens, rubens,  
gramis, quæ vocant paradisi, non absimilis, illi  
verò oblongis, orbiculatus, ad fabæ magnitu-  
dinem, quin in angulis, veluti neruis, disfuncius,  
cui incus semen atriplicis instat. Quod aptè  
ostendit eorum discrimen. Id etiam declarat  
tiliæ proceritas, amplitudoque, ac ramorum de-  
sitas: nam phillyrea Dioscoridi arbor est pumi-  
la, lugustri magnitudine. Et quamquam tradat  
Plinius, tiliam arborem esse proceritate per-  
quam modica, tamen cùm sensibus, & experi-  
mento contrariu constet, credendum certe pu-  
tauerim, Plinium quoque deceptu propinquitate  
vocabuli & Theophrasti phillyræ, & Diosco-  
ridis phillyream simul confudisse: à quibus fa-  
cile ea, quæ de tilia scripsit, accepit. In quam  
sententiam hæc quoque ratio me deducit, quod  
Plinius vni tantum speciei, scilicet nostre vul-  
gari tiliæ, vires attribuit, quibus pollere phil-  
lyream Dioscorides est auctor, præter alias plu-  
res, quæ ipsi tiliæ sunt propriæ, quemadmo-  
dum fecit & Ruellius illum secutus. Est itaque  
Phillyrea arbor longè diuersa à tilia, multis con-  
gnita, quoniam in Italia prouenit asperis tan-  
tùm montibus, quibus maxime gaudet. Adam-  
mus Lonicerus in suo de stirpium historia li-  
bro constanter asserit, nulla tamen hac allata ra-  
tione, nec auctoritate, ligustrum, & phillyream  
vnam & eandè esse plantam, contenditque: caput  
hoc omnino Dioscoridis spurium esse. Verum  
is idè hallucinatus videtur, quod primum phil-  
lyræ delineatio à ligustro, quod Græcis *γίληρα*  
dicitur non parù dissentiat: secundo quod nò so-  
lùm codices Dioscoridis Græci, & in quidè pro-  
batissimi, habeant phillyream, sed etiam Ori-

Pliny l. 16.  
p. 16.

A dami  
Loniceri  
error.

Interpre-  
tum Dios-  
coridis.

Tilia hysto-  
ria.

basii codex manu scriptus, in quem ipse ex Dioscoride simplicia transtulit: quemadmodum eam etiam habent Paulus, & Serapio, qui Arabico sermone phillyream Mahaleb appellavit. Tiliæ cortex commanfus, ac inde illius vulneribus agglutinandis efficax est. Folia verò trita, & aqua conspersa pedum tumores discu-

tiunt. Humor è medulla castratæ arboris defluens, capiti illitus, capillos reddit, defluentemque continet. Arbor, quæ Græcis *φαιλεια*, Latinis item Phillyrea vocatur: Arabibus, Mahaleb: Italis, Phillyrea. Quæ verò Græcè *παύλα*, Latine Tilia, pariter & Italicè nominatur: Germanicè, Linden: Gallicè Til, vel Tillee.

*Nomina.*

CISTVS MAS.



CISTVS FOEMINA.



HYPOCISTIS. CAP. CIX.



CISTVS, quæ aliqui citharô, aut cissaron vocant, ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus: saxosis locis nascens: foliis rotundis, acerbis, hirsutis. flos ꝑ masculo vt mali punice, fœminæ albet. Vis astringens: vn-

de flores in vino austero bis in die poti, profunt dysentericis, & nomas per se illiti cohibent: vetustati vicerum, & igni ambustus cum cerato medentur. Hypocistis rhobethron, aut cytinus à nonnullis cognominata, iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine. Quædam rufa, ꝑ altera herbacea, tertia candida. Liquatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fractamque macerant, & incoquunt, reliquaque vt in lycio prosequuntur. Vires acaciæ habet, verum aliquantò magis siccatur, & astringit. Prodest dysentericis, cœliacis,

sanguinem excreantibus: fœminarum profluvio & pota, & indita.

NASCITVR vterque Cistus, è cuius radicibus Hypocistis proflit, in pluribus asperis Heruturæ locis, & præsertim in Apennino monte. Quare probi quidem, ac diligentes seplafarii omni studio, atque ope niti deberent, vt sibi vtrunque genus cum hypocistide vel ex Apennino ipso, vel aliunde comportaretur: quandoquidem sine legitima hypocistide legitima non possit fieri theriaca, nec præterea alia quædam, quæ in medicinz vsum veniunt, antidota, ac medicamenta. Nanque hypocistin, qua passim vtrunq. officinæ, ex hirci barbæ radicibus impostores conficiunt, succum inde experimentes, ac vt concrefcat, insolantes. Errandi tamen, ac simul imposturam faciendi causam dederunt Arabes, quod cistum hirci barbulam appellent. Quo factum est, vt ii omnino aberrauerint, qui officinis hypocistidem parant, sibi persuadentes hirci barbam, quam Græci *αρκυριον* vocant, illam esse stirpem, de qua Arabes intelligunt. Quo errore ducti non modò seipsos decipiunt, sed etiam alios, qui passim adulterina hypocistide vtuntur. Atqui Fuchsius in libro de componendis medicamentis, quem secundò edidit, vbi passillos ex succino perpendit, non sine magno errore (pace viri eruditi dixerim) putat hypocistim fungum esse. Quandoquidem hypocistis non fungus est, sed veluti germen, quod è cisti radicibus pullular, effugit ferè puniceorum cytinis representans, vt optimè sciunt ii, apud quos cisti plantæ copiosè proveniunt. Hypocistidis locum supplere acaciæ tradidit Dioscorides, vt etiam habetur in Galenicis succidaneis: qua illius vice vt possent officinæ, si modo & ea ca-

*Cisti, & hypocistidis consideratio.*

*Fuchsi error.*

*Hypocistis in cistidanea.*

*Plinij La-  
psum.*

*Cisti. 83  
hypocisti-  
da Sires  
ex Galeno.*

*Nomina.*

teret adulterio. Potest etiamnum, si desit hypo-  
cisti s. assumi eius loco floris agrestis punice suc-  
cus: quippe qui eadē præstet, quæ hypocistis, au-  
tore Dioscoride. Plinius deceptus vocabulorū  
germanitate ineptē satis, meo iudicio, cōmiscet  
cisti, & cisti historiam quāobré nō immerito eū  
damnauit doctissimus Leoniceus. Cisti me-  
minit Galenus libro v. 1. 1. simpl. medic. sic in-  
quiens. Cistus, aut Cistrus frutex est gustu ad-  
stringens, omnibūsq; particulam operibus.  
Atamen folia, & parua germina trita adeo des-  
sicant, adstringuntq; ut vulnera glutinare va-  
leant. At flores magis sunt efficaces, adeo ut  
cum vino poti dysenterias, ventris imbecillita-  
tes, fluxusque, ac humiditates sanent: carapli-  
smatis ritu illita vlcera putredinosa iuuant.  
Est enim eorum facultas non infrenuē desic-  
cans, serēque secundi excessus à temperatis ab-  
soluti. Adeo verò frutex hic frigidus est, ut te-  
pidi calor sit particeps. Porro Hypocistis, quā  
vocant, multo est magis adstringoria, quā so-  
lia, admodum efficax remedium ad omnes flux-  
ionum affectus, puta sanguinis reiectiones,  
profluvia muliebria, coeliacos, dysentericōsq;que  
affectus. Quin si quam partem roborare consi-  
lium sit, quæ videlicet plusculo humore exolu-  
ta fuerit, robur, ac firmitatem illi non imbecil-  
liter addit. Sic sinē stomachici epihematis,  
hepaticisq; commiscetur, & ex viperis con-  
fectio antidoto inditur, nimirum quod corpora  
confirmet, ac roboret.

Frutex *Kist*, *akist*, aut *akistap* Græcis di-  
ctus, Latine quoque Cistus appellatur: Arabi-  
bus, Kan'et, Altheis, seu Lhaie altheis: Italis, Cisto-  
ris: Hispanis, Cerguacos. Hypocistis verò sic  
Latina voce, quemadmodum *hancastis* Græcè di-  
citur: Arabicè, Taratith: Italicè, Hipocisto: Hi-  
spanicè, Pultegras.

† Hæc dictio non legitur in Græcis codici-  
bus. Sed eam huc ad clariorem (ut puto) sen-  
sum ex Plinio transtulit Ruellius: quod ver-  
bum illud à Dioscoride studio fortasse breui-  
tatis omissum, statim addendum esse duxerit,  
quoniam subintelligendum. quod etiam Hermo-  
laus fecit.

† Nil mirum esse debet, quod Plinio duo  
tantum hypocythidis genera prodantur, colori-  
bus rufis, & candido distincta: quandoquidem  
illis duntaxat Oribasius quoque contentus fuisse  
videretur libro x. 1. 1. ubi genus *gaspap* hoc est,  
he-baceum, ut vulgari codices habent, non legi-  
tur.

LEDVM. LADANVM.  
CAPYT CX.

EST & alterum cisti genus, Ledon  
à nonnullis appellatum, frutex simili  
modo nascens, longioribus foliis, & ni-  
grioribus: quæ verno tempore quid-  
dam contrahunt pingue. Foliorum vis  
astringens, ac eisdem, quos cistus, effe-



ctus præbens.

Fit ex eo quod  
Ladanum dici-  
tur. Siquidem  
cum cisti fron-  
des pascuntur  
capræ, hirci-  
que pinguitu-  
dinem conspi-  
cua barba car-  
punt, & suo læ-  
tore villosis  
cruribus adhæ-  
rescentem re-  
portat: quam

depectentes incolæ, colantesq; cogunt  
in ossas, & ita recondunt. Alij verò at-  
tractis funiculis, insidentem fruticibus  
lentorem abstergunt, conglomerantq;  
in ladanum. Maximè probatur odora-  
tum, subuiride, facillè mollescens, quod  
arenas non collegit, nec squalore obsti-  
tum est, resinosum, quale in Cypro gi-  
gnitur. Arabicum verò, Libicūque vi-  
lius. Natura ei spissandi, cascandi,  
molliendi: ora venarum patefacit: ca-  
pillum fluentem continet, addito vi-  
no, myrrha, & myrteo oleo: cicatrici-  
bus decorem reddit, cum vino illitum:  
medetur aurium doloribus, cum hy-  
dromelite, aut rosaceo infusum: suffi-  
tu secundas elicit: pepsis immistum vul-  
uæ duritiem sanat. In medicamenta,  
quæ aurium dolorem, tussimque fini-  
unt, & malagmata vtiliter inseritur:  
aluum sistit cum vino vetere potum,  
& vrinam ciet.

LADANVM, quod vulgè alij appellant Lau-  
dano, alij verò Odano, tametsi plerumq; impos-  
sibile sit, ut malicia adeo fabulo, & aliis adulteris sit  
vitiatur, ut nihil valoris præstet, ego tamen præ-  
stantissimum sepius Veneris emi ab vnguentari-  
is, qui odoramenta conficiunt. Verum apud  
pharmacopolas, qui medicamenta nobis præ-  
stant, Ladanum, quod syncerum, purumq; sit, rarissi-  
mè reperitur: cum eorum plurimi potius curēt,  
ut rem minoris emant, quam ut seligant legitimi-  
ma ab adulteris: quod tamen iniquum est, in-  
humanum, ac detestabile crimen. Arbuscula, est  
qua Ladanum colligitur, Ledum appellatur, &  
inter cisti genera recensetur. Cæterum Plinius  
vocabulorum vicinitate deceptus (ut etiam  
in super

*L. dani  
considera-  
tio.*

*Plinij La-  
psum.*

in superiori commentatione dictum est) ex cisto, id est, hedera, non autem ex cisto ladanum colligi dixit. Ex quo item multis falso persuasum est, quod non a cisto, sed ab hedera Ladanum legeretur. De Ladano plura memorie prodidit Galenus libro v. i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cistus, aut Ladanum. In calidioribus regionibus hic Cistus proveniens, tamen haud alius sit genere, quin qui apud nos nascitur, eximum tamen a regione, ac peculiarem, digerentemque caliditatem nactus est: atque utroque a nostrate differt, tum quia frigiditatem deposuit, tum quia calorem assumpsit. Itaque cetera quidem huius cisti, illis quae in nostrate videntur, similia sunt. Verum Ladanum, quod vocant, ex eo provenit, medicamentum primo excessu iam quodammodo completè calidum, ut videlicet & secundum attingat, habens etiam adstrictionis paululum. Ad hæc substantia tenui, ac proinde emolliens, siue malacicum pariterque moderatè digerens, ac videlicet etiam *emolliens*, hoc est concoquens. Itaque mirandum non est, si peculiariter ad veteri vicia conveniat: quandoquidem ad dicta paulum quiddam adstrictionis obtinet. Quocirca diffuentes capillos retinet. Nam quicquid ad radices eorum pravi humoris fedit, id omne absorbuit: tum meatu, quibus infixi sunt, contrahit, & confringit adstrictione. Ceterum alopecias, & ophthalmias siue lippitudines, sanare non potest, vtpote magis discussorias vires, quam quae Ladano insunt, poscentes. quippe proveniunt hæc ex pravis succis, lentis, crassisque, quos secantia, ac digerentia medicamenta potissimum euocant, atque euacuant. Ceterum tenuium partium sint facultatis oportet, & minimè astringentis: non tamen vsque adeo tenuium partium, & desiccatoriae, ut nimio plus desiccant, vnaque cum collectis inibi succis præter naturam, naturalem quoque humiditatem incrementa pilis suppediantem absorbant. nam sic non tantum alopecia liberabunt, sed & caluiciem afferent. Sed hæc ad curandi rationem pertinent. Arbuscula, quæ Græcè *αἰθῶν*, Latine similiter Ledum nominatur, Arabice Chafus. Quod verò *αἰθῶν* Græci, Latini item Ladanum vocant: Mauritani, Ieden, siue Laden: Itali, Laudano, & Odaño: Hispani, Xara.

*Ladanum  
res ex Galeno.*

*Ebenina.*

#### EBENVS. CAP. CXI.

EBENVS optima habetur Ethio-  
pica, & nigra, nullos habens venarum  
discurfus, factitij cornus læuore: cum  
frangitur, densa apparet, mordens gu-  
stu, atque astringens. Sufficit iucundo  
odore supra carbones, sine fumi tadio.  
Recens autem ad ignem prolata, ob

pinguitudinem accenditur, & trita ad  
cotem rufescit. Altera est Indica. Inter  
natis segmentis candicantibus, & modicè  
fuluis, item frequentibus maculis.  
ceterum prior bonitate antecedit. Apud  
quosdam sesamina, aut spinea li-  
gna consimilia pro ebena vaneunt.  
Quod discernitur ex eo, quod fungosa  
sunt, & in purpureas asulas resoluntur,  
nihil mordacitatis in gustu, nec redolentiae  
in fuffitu præferentia. Caliginem oculorum  
absterget: ad veteres destillationes, pustulasque  
mirum in modum pollet: si quispiam facta ex eo  
collicula collyriis vtatur, melius proficiet.  
Ad oculorum medicamentum efficax est,  
si scobes, ramentave vino Chio die, non  
stetque macerata, in collyria digerantur.  
Nonnulli præterea ipsa excolant. reliquæque  
eundem in modum peragunt. Alij pro vino  
aqua vtuntur. Vritur in fistili nouo, donec  
in carbones redigatur. Lauatur plumbi vsti  
modo, & ita siccis, scabrisque lippitudinibus  
conducit.

CREDIDIT Theophrastus in India tantum  
nasci Ebenum libro 1111. cap. v. de historia  
plantarum, vbi sic habet. Ebenus quoque  
eius regionis vernacula est. Huius duo genera  
constant: alterum materie laudatum, pulchrum  
que: alterum vile, & viciatum. Rarum, quod  
præstantius: reliquum permultum habetur.  
Colorem commendatum, non recondita, sed  
statim sua natura capefcit. hæc Theophrastus.  
Quod etiam sensisse videtur Virgilius in Geor-  
gicis libro 11. ita canens.

Sola India nigrum

Fert Ebenum, folis est thurea virga Sabzis.  
Plinius etiam lib. x. cap. 1111. Ebenum  
nusquam alibi, quam in India nasci scriptum  
reliquit: nec eam tamen India vniuersam mittere,  
sed exigua sui parte gigni, præter quoddam  
fruticosum genus cythi modo, in tota India  
dispersum. Herodotus verò (eodem auctore)  
Ebenum Aethiopiam solam ferre intellexisse  
videtur: quippe qui de Indica nullam fecerit  
mentionem. Veruntamen ex hoc Dioscoridis  
capite palam est, nasci Ebenum in ambabus his  
regionibus. Indi quidem non nisi ex ebena  
deorum simulacra fingunt, regesque ex eo tantum  
sceptrum sumunt. Item pocula, craterasque  
ex ebena factitant, quod sane credant contra  
maleficia efficacissimum esse, & quicquid  
veneficii fuerit, tactu eius auerri. Itaque nihil  
mirum, si quod peregrinum in Italiam importatur,

tatur, summo sit in pretio, cum etiam ab ipsis, quibus provenit, maximo honore habeatur. Ebenum ex India Romæ primum magnus Pópeius Mithridatico triumpho ostendit, cuius materies densissima omnium constat. Quo fit, ut quævis multis annis exarescat, non fluat in aquis, sed tota mergatur. Ebeni siccatis truncos maxime hac ætate novit Italia: namque innumeris videntur in eorum officinis, qui pestes conficiunt ad explicandos, aptandosq; capillos: itemq; apud illos, qui globulos funiculo transiciendos ad mulierum pices numerosas torno in orbiculos expolunt. Ebeni vires scripsit Plinius lib. x. x. l. i. i. cap. x. i. his verbis. Non omittam propter miraculū ebenum, Scobem eius oculis nisi mederi dicitur: ligno que ad cotem trito cum passo caliginem dissipat, ex aqua verò & radice albuginem oculorum.

Ebeni & res ex Galena.

Item tuisim pari modo cum melle, ac dracunculi adiecta radice. Ebenum medici & inter credentia assument. Ebeni meminit Galenus lib. v. l. simp. med. sic inquit. Ebenus ex iis lignis est quæ trita cum aqua in succum solvitur, ut lapidum nonnulli. Vis ei inest exaltandi, extergendi, & tenuiū partium. Quamobrem quæ pupillis offuscant, extergere creditur: misceatur aliis remediis ocularibus, quæ ad ulcera vetera, fluxiones, & bullas, siue pustulas accommodata sunt. hæcenus Galenus. Sunt qui lignum ex Indis petunt, quod quidam

Guaiacon consideranda.

GUAIACON, nonnulli Guaiaconum, pleriq; verò Lignum sanctum appellant, cuius adversus Gallicam lues præcipuus est usus, ebeni genus esse crediderint. Quod quidem nec asserere, nec negare aulam: quandoquidem nusquam inveniuntur apud quencquam tum veterum, tum recentiorum scriptorum, quas frondes, quos flores, quosq; fructus proferat ebenus: Illud tamen omnibus perspicuum est, Guaiacon nihil, nisi summa nigritia, ab ebeno diffidere, quæ in hoc summo splendore nigritat, in illo abest: cæteris verò qualitatibus id maxime cum ebeno certat. Tria ad nos Guaiacon genera afferuntur, ut in suis Epistolis doctissime annotavit Manardus Ferrariensis: quod & nobis iandiu planè compertū est, cum hæc omnia scriptis nobis præ manibus fuerint. Primum itaque genus crassior, vegetiorque mole constat, quo resecto materies apparet interiore parte nigra, exteriorē verò subpallida, & veluti perplexis lineis quibusdam ad fuscum tendentibus per longum intersecta. Alterum caudice minori, nec adeo vegetiori habetur, cuius extremitates maiore ambitu se diffundit, intimæ verò, quæ pariter nigricant, minore satis orbe concluduntur. Tertium, quod propriè sanctum appellant, caudice cæteris exiliore visitur, intrinsecusq; & extrinsecus albicans, cuius materies lineis admodum exilibus in longum ætis perplexe distinguitur: estq; hoc longè cæteris & acrius, & odoratius. Cæterum credendum non est eiusmodi ligna, est colore, magnitudine, ac pondere inter se discrepent,

idecirco diversarum esse plantarū, diversorumque generum, ut quidam fortasse existimant. Nam quod hoc tam intus, quam extra candicer, illud verò interiore sui parte nigricet, non aliunde provenit, quam quod hoc magis, illud verò minus adoleverit, vel consenuerit. Quippe eò sanè nigrius cernitur lignum Guaiacon, quò ad maturiorem ætatem pervenerit arbor, à qua decisum fuerit: & per consequens tantò magis album apparet, quantò minus adoleverit illa, quemadmodum conspicitur in nostris nonnullis Italiae arboribus, & præsertim in moro, nuce, & anagyris. Veruntamen illud cuius persusum sit, ætatem vni plus, quam alteri virium addere, ac demere. Quæ de re verba facturi, dicamus, cum illud, quod planè omni ex parte albicat, odoratius, acrius, & amarius habetur, cumq; eius decoctum crassius, & cæterorum decocto pinguius sit, & acrimonia, & amarore admodum repletum, ut ipsa inde docuit experientia, nil mirum esse crediderim, si in eo, utpote iuniori, vis insit vegetandi præstantior, ac propterea plus in se succi contineat: quin & cæteris viribus præstet. Ea q; propter putaverim ego, hoc illis in usu perpetuo fore, quibus ob Gallicam luem vacillare emergerint depascencia, contumaciæ: ossa verò cariosa sint, ac putridine consumpta, & tumores in ossæ penè duritiem occurrerint: & quibus denique perpetuus articuloꝝ cruciatus, diuturnusq; capitis dolor inhaerit, eoq; magis, quò patiens iunior extiterit, fortior, & natura robustior. Huic succedere existimamus, quod medium obtinet locum: siquidem hoc & odoratius est, & acrius eo, quod nigrius, ac crassius invenitur: neq; illud quidem ab re, quò doquidem id minus est ætate confectum, & maiore humoris copia redundat. Quocirca commodissime hoc vi poterunt, qui natura delicatiores sunt, & temperamento imbecilliores, acque etiam illi, in quorum artus huiusce luis furor nondum grassari cœperit. Postremo illud minus cæteris præstat, viribusq; infirmius habetur, quod nigrius, crassius, & anosius reperitur. Nanq; quilibet consensens planta (quemadmodum etiam cunctis animalibus evenit) continuo exarescit, humidoq; priuatur. Cuius rei certissimū est argumentum, quòd in annosarum arborū truncis maior apparet nigredo, quam in aliis vel iunioribus, vel ætate tenellis: si nigredo enim siccitatis indicium est, quivèl dependit caloris innati, & humiditatis naturalis: id quod tam in plantis, quam in animalibus locū habet. Nihil tamen secus illud diligenter animadvertendū est, quòd Guaiacon albicanti pio: suo colore prædicto, recens, incorruptumq; sit: quippe cum cæteris exiliis sit, citius ac facilius exarescit, & ob humoris reddendæ velocius carie sentiat, atq; fracefit. Quæ ob causam factus quandoq; foret vetustiore recentioris vi, quam iuniori, quòd multo ante tempore fuerit ab arbore decisum. Sunt quoq; recentiorū nonnulli, de quorū numero vnus est Alpho

Guaiacon lignum præstantius.

fus Ferreus, qui de ligni guaiaci decocto elegans admodum opusculum edidit, qui tantum Guaiacum illud præferunt, quod è plantarum ramis ætatis mediæ desumpsum fuerit. Quorum opinio non planè refellenda videtur: nam quicumque rem naturalibus expendere rationibus, ramos antiquioris à caudice mediocris ætatis parum differre cognoscit: item ramos huius à caudice iunioris, quippe plus humoris ad se trahit ramorum austri facultas, quam caudicis. Idcirco non alia de causa plantæ reiuvenescunt, cum earum rami implantantur, feruntur, & propagantur, nisi quod illud idem humi dum innatum intra se continent, & eodem vigent temperamēto, quo qui adolefcent: etenim surculi, atque rami sunt caudici, perinde atque filii, & propterea animalibus ætate tenellis non ab similes. Atqui mihi longè magis iunioris caudicis placeret vsus: siquidem in hunc immediate à terra humor, & alimentum deferretur, ac præterea quoniam is fortasse nullum adhuc fructum protulerit: quandoquidem fortis à plantis, ut etiam ab animalibus, multum viridum aufert. Præstantissimum itaque lignum Guaiacum illud erit, quod ex iuniori caudice recenter cæsum fuerit: ram exterioris, quam interioris albicans, rimis carens, densum, ponderosum, minimè cariosum, odoratum, gustui & acris, & subamarum. Cæterum quoniam nostra ætate æquè cortices, atque lignum in usum veniunt, eandem in iis rationem feruandam censio, ut quānam meliores, præstantioresque sint, dignosci possint, quam nos in eligendo optimo ligno in medium attulimus, ut scilicet illi eligantur, & probatissimi habeantur, qui à præstantiori caudice detracti fuerint. Importatur Guaiacū tam ex occidentalibus, quam orientalibus Indiis: nam & Hispani è suis regionibus nouiter repperitis, & Lusitani ex Calicet, Taprobana, & Iava insulis, & Mauritani, Aegyptii, Arabes, ac Persæ à mari rubro per camelorum carouanas (ut aiunt) Guaiacum ad nos conuehant: quin & ex Aethiopia, ut quidam narrant. At cum omnibus compertum sit, ea in medicamentorum genere longè magis cætera præcellere, quæ ex orientali plaga comportantur, ob id omnino censendum fuit, Hispanicum viribus esse imbecillius, quàm quod ex Lusitania, vel Alexandria in Italiam importatur. Guaiaci planta (ut ii referunt, qui cum in syriis se vidisse testantur) ad fraxini proceritate, & ad hominis mediocris habitus crassitudinem plerumque assurgit. Folia ferè quadratenus plantaginis annula, dura, ac breuia. Flores eius produntur lutei: fructus verò iuglandis magnitudine, qui esu alium subducit: cortex annosus niger, iuuenibus verò subrutulus. Porro si Guaiaci vires, ac qualitates rectè perpendantur, procul dubio liquido constabit, ea prællare posse, quæ in arcenda Gallica lue requiruntur: nam cum id ex partibus admodum calidis, ac tenuibus consistat, itēque siccis, habeatque sibi resinæ plu-

rimum adinistum, nimirum etiam potest suis viribus ea efficaciter exiccare, attenuare, liquefacere, atque expurgare, quæ humores iniecerint: quinetiam sudorem ciere. Huc accedit etiam, quod parte resinosa, quam possidet, contagioni, atque puèdini mirificè resistit: quæ quidem incommoda hanc pestem comitari solent. Cæterum eo tempore, quo primum in Italiam Guaiacum inferri cœpit, necnon etiam multis post annis, non sine summo timore dabatur potandum. Etenim ferebatur illi manifestum necis periculum imminere, qui rectam exquisiti visus rationem per panis, & vix passè modicum non seruasset, quique non perstitisset in curatione ad quadragesimum diem vsque in tenebris inclusus, ita ut ne aeris quidem claritatem inspiceret, nedum pedem è cubiculo efferret: insuper carniū efflu, & vini potu interdictum erat, non secus atque veneno. Verum enimvero cum sapius cunctis, ut ante constitutum tempus quidam ob tenuissimam visus rationem ita imbecilles, ac viribus destituti conspicerentur, ut penè spiritus, & vita deficerent, si ne in tam manifesto vitæ discrimine versarentur, à confanguineis, & assidentibus persuasi, caporum, gallinarumque iura, ac contrusæ carnes in cibum sumere, tantum inde percipiebant iuuamentum, ut vitam quasi desperitam recuperarent. Quo postea medici experimento edocti, vanam illorum doctrinam ridentes, qui tam grauem ægris legem imponebant, paulò pleniori victu vi iusserunt, nempe iuuenum gallinaceorum carnis, ac maiore panis portione. At nullus tamen adhuc ausus erat vinum exhibere. Qua re à me sapius animaduersi, ego primus (ni fallor) inter Italos medicos rationibus non obscuris adductus tentare volui, posset ne vinum dari ex Guaiaci maceratione iis maiori cum iuuamento, qui Gallica lue correpti essent. Quod cum mihi in frigidis morbis felicissus cessisset, quàm ex aqua tantum lignum decoquere, id potissimum me adduxit, ut hanc vii potandi rationem ad commune omnium commodum literis, posteritatisque memorie mandarem. Id quod feci pluribus iam annis elapsi, quo scilicet tempore Dialogus noster de morbo Gallico Bononiæ excusus prodit in lucem, ubi eodem anno Carolus quintus inuictissimus Imperator à Clemente vii. Pontifice maximo imperiali diademate feliciter esse coronatus. Ex quo postea factum esse audiui, ut plerique medici ex illis nostris lubricationibus, breui temporis tractu plurimum laudis, ac gloriæ sibi comparauerint, utpote qui vinum Guaiaci ad suam proximam vertissent, prospero admodum successu. Licet ferè sint, qui alius persuadere conati sint, suum illud esse inuentum: qui ut rem facilius prætexerent, omnibus huiusmodi vini præparationem dissimulabant, & occultabant: vel id facerent, utem ut plurimi facientes, inde maiorem quæstum consequi possent.

Guaiaci  
cortices ele  
cti.

Guaiaci  
plantæ

Guaiaci  
succulantes



Sed cauendum profectò est à quibusdam impostoribus, qui cum sint earum rerum ignari, quæ ad medicæ facultatis contemplationem spectant, dum lignum, vel eius cortices ex vino decoquant, cyclaminum, bryoniam, pityusam, colocynthidem, & turpitem admiscant, atque alios mille cacodæmones, qui eos de medio tollant. Quippe nulla habita temperamenti, agritudinis, temporum anni, sexus, nec ætatis ratione, singularis diebus huius decocti repidi cyathum omnibus indifferenter præbent potandum. Quo fit, vt si forte quadà vnum quandoque perstant, decem postea iugulent, tanquam improbi carnifices. Verum vt quisque horum manus cuitare, atque effugere possit, operæ pretium visum est, vini Guaiaci conficiendi rationem subiungere, ac subinde hauriendi modum addere. Sumito igitur ligni Guaiaci præstantissimi lima in scobem tenuissimam attriti, aut tornatili instrumento minutim concissi libras quatuor: corticum eiusdem libras duas: cardui benedicti libram vnam & semis: adianthi, aspleni, florum vtriusque buglossi, cuiusque libræ: cassiæ odoratz drachmas sex: seminis anisi sesquialiam: sacchari libras quinq;. Deinde concitiantur omnia in cado vinario mundo apræ capacitatis, desuper affusus vini albi quàm optimi & feruentis, libris centum, & quinquaginta, mox diligenter vas operculetur, omniaque sic macerati triduo dimittantur. Post triduum vero linteo percolentur, asserueturq; huiusmodi macerationis vinum in alto vase ad ægrotantium potum. Siquidem bibitur hoc tam in prandio, quàm in cœna secundi Guaiaci decocti loco: non mane, neque vesperi serapii vice, quemadmodum te multi facere cõsueuerunt. Hoc idem vinũ longè etiam melius, & maiore quantitate vindemiarum tempore confici potest, admissis ligno, cortice, cæterisque aliis, recentibus vni's albis in multum compressis: ibiq; tandiu dimissis, quousq; mustum effervesce desinat, & pellucidum, clarumq; reddatur: veruntamen multiplicanda sunt omnia, quæ conueniunt medicamenta, pro vuarum quantitate. Præter huius vini potum cibus associandum, bis in die mane scilicet, & vesperi tribus, aut quatuor horis, antea quàm sumatur cibus, ægrotantibus exhibeo decocti ligni ex aqua secundum communem medicorum vsum senas vncias, admissis vnciis duobus liquoris hoc modo parandi. Sumito primum adianthi, lupi siliatarii, fumariæ, aspleni, senæ, singulorum manipulos tres: radicem cencaurii magni, glycyrrhizæ, filiculæ, vtriusque buglossi, singularum vncias quatuor: seminis anisi, melanchthi, florum sativi, & erratici buglossi, omnium fantalorum, cassiæ, quàm cinnamomum vocant, singulorum drachmas quinq;. Hæc ex aqua libris viginti quatuor decoquantur ad tertias, demum colentur. Sumito deinde præstantissimæ senæ libras duas, concititque in scitile oris angustis, demum percolatum decoctum seruens superim-

ponito, ac inde obturato scitilis ore puluinaris aserinis plumis sarcto, ignique prius calefacto scitile inuoluito, & loco calido collocato, itaque per diem, ac noctem reponito. Postridie verò manibus sena premitur, mox dilutum per colatur: cui adiciuntur distilli rostrum efficaciter alium subducentis libræ sex, sacchari libræ octo: effervescent deinde simul subiecto igne, quousque tertia pars euanescat. quo facto additur electissimi Rhabarbari minutim concissi vncia, ac ita iterum feruent omnia donec iulapii modo consistat liquor. Postremò percolatur linleo, & vase vitreo reconditur. At si ægrotantes multa pituita redundant, decoctio præscripta optimi turpeti vncia vtiliter addi potest. Superest vigus ratio, quæ agro talis præscribenda est, scilicet vt tam in prandio, quàm in cœna edat panis ternas tantum vncias, sitq; is similaceus, ac probè in cibano coctus: item totidem carnis pullorum gallinaceorum, perdidicum, attagenarum, turdorum, ac auicularum in syluis, vineis, ac montibus victitantium, affatè potius, quàm lixæ: quin & vix passè modicum. Bibat autem oportet præscripti vini æquum cibo mensuram. Quod si quis putum id bibere non possit, diluatur aqua, quæ in phialis vitreis addita Guaiaci vincolo breui temporis spatio effuerit. Tempus autem huic curationi aptissimũ profectò ver est martio, aprilis, & maio mensibus. quod si hoc tempore fieri non possit, fiat mense septembri in autumnio: nam sicuti æstiuus ardoribus, & exurente infirmitate non modò diuturna pharmaca, sed ne quidem brevia tolerant homines, ita nec brumali tempore, dum ingenti frigore sœuit hyems. Interea ægris sine metu noxæ indulgere licet, modò cæli serenitas adsit, vt quandoque in proximis hortis, ac viridariis solatii causâ lento gradu deambulent: quippe quoniam eiusmodi horum amœnitates animus plurimum leuari solet. In hac etiam curandi ratione quosdam magis, alios minus persequere oportet, pro morbi necessitate, & salutis mensura. Hac ergo ratione vinum Guaiaci exhibitum non modo medetur cuique acerrimo Gallicæ pestis incommodo, sed etiam diuturnis articolorum, capitis, neruorum, ventriculi, iocineris, lenisfque morbis pituita genitis mirificè succurrit. Nec minus etiam podagra laborantibus opem fert, modò diuturna admodum non fuerit ægriitudo. Porro in hoc illud etiam obseruandum est, quod ego Guaiaci vinum his tantum potandum exhibeo, quibus pituita redundet: vel saltem non exuperet bilis. Siquidem biliosus secundum, ac tertium ligni ex aqua decoctum, vini loco semper cum cibus præbendum censui, vt communiter ab aliis fieri solet. Non desunt præterea hoc tempore, qui radicem illam, Chinam vocant, aliis Chinam vocant, Guaiaci præferant, cæsi Vesalius admirabilis humani corporis fabricæ professor oppositum sentierit. Huius radicis iandudum apud Hispanos in-

Vini Guaiaci conficiendi, & exhibendi ratio.

China vocant, aliis Chinam vocant, Guaiaci præferant, cæsi Vesalius admirabilis humani corporis fabricæ professor oppositum sentierit. Huius radicis iandudum apud Hispanos in-

ualuit vsus contra podagras, maximèque apud inuictissimum Imperatorem Carolum v. cui meritò præclaram laudem acceptâ referre potest. Aduertitur hæc (vt audio) tam à Lusitanis, quam ab Hispanis ex regionibus æquinoctiali proximis, legiturq; in litoribus maris è terra euulsa. nam in paludibus exorta, ac inde maris fluctibus raptâ, in litus reicitur. Radix est fungosa, perinde ac arundinacea, leuis, colore rufescente, Rhodizæ radicis admodum æmula. Præfertur recens, firma, & quæ neq; teredinem, neque cariem fenserit, & quæ magis rubescat. Damnat eam acriter Vesalius, vt dixi. Sed quibus validis rationibus id faciat, compertum satis non habeo, præsertim cum illud certò sciam Cæsarem inuictissimum nunquam ea toties vsum fuisse, nisi ex ea plurimū adiumenti percepisset. Sunt & qui radici illi, quam nuper aliqui *SALSAM*, aliqui Spartam parillam nuncupare coeperunt, tum guaiaci, tum etiam ipsius chinæ vires, & facultates tribuant. Hæc ebulli tam ad vnguem æmulatur radices, vt quandoque crediderim Spartâ parillam, & ebulum esse idem: tamen id asserere non ausim, cum hætenus eius folia non viderim. Sed iam ad Ebenum redeamus, acque de nominibus agamus. Eius nomen Græcum est *Ἰβανος*, veluti & Latinum ebenus: Arabicum, Abanus, seu Abenus: Italicum, Ebeno. Quod verò Latini Lignum Guaiacum, Lignum sanctum, aut Lignum Indum vocant, Italis, Legno santo, Guaiaco, & Guaiacane appellatur: Germanis, Frantzosem holtz: Hispanis, Legno santo, & Legno dellas antilhas: Gallis, saint bois.

*Salsa parilla consideratio.*

*Nomina.*

ROSEI PASTILLÆ.  
CAP. CXIII.

PASTILLÆ, quos rhodides vocant, hac ratione conficiuntur. Rosarum viridium, quæ nullo antea humore madefactæ extabuerint, drachmæ quadraginta, Indicæ nardi drachmæ decem, myrrhæ drachmæ sex, trita digeruntur in pastillos, qui trium obolorum pondus æquent: siccati; in vmbra in fictili non picato, atque obturato reconduntur. Alij adiciunt costi drachmas duas, iridis Illyricæ totidē, & vinum Chium cum melle miscent. Mulieribus moniliū vice collo circumdato vsui sunt. Retundendum graue sudoris virus. Tritis etiam vruntur ad illitiones, & diapasmata, quæ sunt ad sudores coercendos, ita vt à balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

ROSA. CAP. CXII.



ROSA refrigerat, & astringit, sed sicca magis astringit. Succus recentibus foliis exprimitur, defæctis fornice vnguibus (sic appellantur cādida foliorum partes) reliquū in pila premi, & teri

debet in vmbra, donec cogatur, & ita ad oculorum circumlitiones recondi. Siccantur etiānum folia rosarum, continuò versata, ne muceant, nè sit in iis insideat. Aridis rosis, & in vino

MVITA quidem sunt Rosarum genera, quæ in vsu medicum veniunt. At vulgarissimæ in Italia sunt, albicantes, puniceæ, & quæ ex albo rufescunt, quas vulgò appellat incarnatæ. Præstantissimæ, quæ puniceo colore rubent: proxima laustis, quæ in rusum candicant: vilissimæ albicantes, in quarum tamen genere ex odoratissimæ excipiuntur, quæ Hetruscis Damascentæ, & aliis Moschettæ vulgò dicuntur. Si quid non modò ceteras excellunt, quod odore admodum suauiter fragrent, sed quod etiam magis alium subducant, id quod indicat earum iucundissimus odor. Rosæ diuersis partibus constant, quo fit, vt pro diuersis tam internis, quam

*Rosarum consideratio.*

quàm externis particulis, dūverſum quoq; tēperamentum ſibi aſciant. Prīmum itaq; terreſtribus, & aqueis partibus, quæ tamē in ipſis mediocriter ſe habent, ſubſtantiā, & adſtrictioriam facultatem acceptas reſerunt. Ab æreis verò & ſubdulcem, & odoratum ſaporem aſſumunt. Ex his demum, quæ ignis naturam ſequuntur, amarorē concipiunt, ac etiam coloris rubedinem, quæ ſcilicet rubicundæ ſpectantur. quod ſit, vt plus inſit caloris puniceis, quàm ſubrubentibus. In recentibus adſtrictioni præſtat amaritudinem, in ſiccis verò minimè: eaq; propter compertum eſt, earum deiciendæ alui facultatem, quàm priores Græci non animaduertent, tantum ex amaritudine provenire, cū recentes alium ſubducant, ſiccæ verò nequaquam. Succus medicamentis componendis expetitur, præſtantior eſt puniceis elicitur, item ex ſubrutilis, verum huic infirmior facultas. Dilutum Græcis *ῥωδοφάρμακον*, eſt quo rhodopharmacum alium innoxie deiciens conſciunt, plerumque ex ſubrubefcētium maceratis aqua foliis paratur: eſt hac ita re iis Damascenæ Hetrufcis vocatæ longè præſtant: quippe ex earum vicenis deuoratis foliis faciliè quidem, & citra noxam ſubducitur alius. Roſarū ſuccus reſerat, diſcutit, abſtergit, & deicit: quapropter & bilem trahit, & ſanguinem biliolum expurgat. Idem ſelle ſuſſus, & ventriculi, iocineriſq; obſtructionibus opem miſericè præſtat. Cor item corroboret, eiusq; palpitacioni ſalutare eſt remedium, nam illis deicit humores, qui cordi officiunt. Facit & ad bilioſas febres, cuiuſmodi ſunt cuiuſvis generis tertianæ. Ad hæc roſarum dilutum, ex quo conſicitur rhodopharmacum, quod pharmacopœia Sirupum roſarum ſolutium appellant, in eorum medicamentorum genere recentiores medici recentent, quæ quoniam abſque aliqua noxa alium ſubducant, ſuo more Benedicta nuncupant. Albicantes deinde roſæ (Damascenæ tamen exceptas velim) non alium in medicina ſibi vendicant uſum, quàm vt ex ſe aquam ſtillent: ſiquidem iis deieſtoria vis, qua pollent puniceæ, ac ſubrutilæ, multò infirmior ineſt. Quamobrè videtur Manardus Ferrarienſis, vir alioqui doctiſſimus, immerito id Meſui vitio vertiſſe. Nam alix, quas Damascenæ appellamus, eſt maior deiciendi vi cæteris præſtant, credendum tamen eſt, de his non intellexiſſe Meſium, quod eas illi faciliè incognitas fuiſſe exiſtimem, verum de iis albis tantum, quibus paſſim roſeta florent. Cuius rei illud maximo argumento eſt poſſe, quod Damascenæ Hetrufcis vocatæ nuper in Italia florere cœperunt, quodq; eas veteribus cognitas fuiſſe (quod ſciam) memoriæ prodiderit nemo: ni fortaiſſe eas credamus eſſe, quæ Plinio ſpineolæ appellantur. Sanè roſæ magiſcandæ ſunt, ſummoq; in pretio habendæ, non modò quod viridarius, & hortis ſint ornamento, ac ſpectu perquam iucundo, ſed

etiam quòd in præclariffimis medicamentis conueniant, quibus humanæ vitæ ſuccurritur. Sylueſtres maiore adſtringendi facultate ſunt præditæ, quàm ſatiæ, ſed minori fragrantia redolent, atque deiciendæ alui ne tantillum quidem facultatis retinent. Idcirco Theophrastus libro 1. de hiſtoria plantarum: Sylueſtres, inquit, roſæ dometiſcis aſperiores tum virgis, tum foliis conſtant: florem præterea ferunt, quo ab illis odore, colore, atque magnitudine ſuperâur. hæc Theophrastus. Cæterum quædam etiam roſæ naſcuntur in Italia, quæ aureo colore fulgent, ſed odore ſunt admodum ingrato, atque inſuaui. Roſarum differentias longa hiſtoria proſequitur Plinius libro x x 1. cap. quarto, vbi ſic inquit. Contrà roſæ genera noſtri fecere celeberrima, Præneſtinam & Campanam. Addidere alii Mileſiam, cuius ſit ardenſiſſimus color, non excedentis duodena folia. Proximam eſt Trachiniam, minus rubentem. Mox Alabandicam vilioſam, albicantibus foliis. Viliſſimam verò plurimis, ſed miniuſiſſimis ſpineolam. Diſferunt enim multitudinem foliorum, aſperitatem, lætore, colore, odore. Pauciſſima quina folia, ac deinde numeroſiora. Cùm ſit genus eius, quàm cenſiſolium vocant, quæ eſt in Campania Italiæ, Græciæ verò circa Philippos, ſed ibi non ſuæ terræ proeunt. Pangæus nanque mons in vicino fert, numeroſis foliis, ac paruiſinde accolæ transferentes cōſerunt, ipſaq; plantatione proſciunt, non autem talis odoratiſſima eſt, nec cui latiffimum, maximumque folium: breuitèrque iudicium eſt odoris ſcabritia corticis, Cyrenis odoratiſſima eſt: ideoq; ibi vnguentum pulcherrimum. Carthagine Hiſpaniæ hyeme tota præcox. Reſert & cæli temperies: quibuſdam enim annis minus odorata provenit. Præterea locis ſiccis, quàm humidis, omnis eſt odorator. Seri nec pinguibus vult, nec argilloſis locis nec riguis, contenta raris, proprieque ruderatum agrum amat. Præcox Campana, ſera Mileſia, noſiſſimè tamen deſinit Præneſtina. Roſa ex ſpina naſcitur. Germinat primo incluſa granoſo cortice, quo mox intumeſcente, & in virides alabaſtros ſaltigato, paulatim rubefcens dehieſcit, ac ſeſe pandit, in calycis medio ſui ſtantis complexa luteos apices. hæcenus Plinius. Partes in Roſa ſex antiqui adnotarunt, quæ omnes ſunt & ſcitu dignæ, & in medicina viles, eſt pauci habebantur ſeplafarii, qui ſeparatim eas reponant. Prīmum quidem duæ partes inueniuntur in foliis: quarum altera eſt, vbi calyci folia inferuntur, vnguam modo albicans, ob idque roſarum vngues hæc extremitates appellantur: altera verò foliorum reliquum. His aliæ duæ ſuccedunt, in iis ſoſcillis, qui veluti minuta ſemina tenuiſſimis capillis annexi ſtaucunt in roſarum umbilico: horum enim partem faciunt granula, partem verò capilli. Poſtremo quæ reliquæ ſunt, in ipſo

Rosarum  
succum, &  
dilutum.

Rosarum  
genera ex  
Plin.

Partes in  
roſa, ea-  
rumq; viles.

in ipso Rosarum alabaſtro continentur, vna ſci-  
 licet in cacumine, altera in fundo. Folia, cor,  
 ventriculum, iecur, & retentricem inſuper ſa-  
 culatorem corroborant: dolores ex caliditate  
 provenientes leniunt, & inflammationes au-  
 ferunt. Vngues eſt propriam à ſcriptoribus  
 non receperit dotem, inferuntur tamen vti  
 liter lotionibus, & clyſteribus ad inhibendas  
 fluxiones. Floſculi medii cum ſuis capillis  
 gingivarum defluxiones cohibent, quinetiam  
 auctore Plinio, alba ſeminarum profluua mi-  
 riſicè inhibent. Calix denique, quem caput  
 etiam aliqui dicunt, cum reliqua parte baſis,  
 alii flores, & cruentas excreationes ſiſtit. Cæ-  
 terum præter has, quæ in florentibus roſis  
 conſiſtunt, tres etiamnum in fructu compe-  
 riuntur partes, vbi rubefcit is, & maturitatem  
 ſenſit, videlicet, ſubſtantia carnis, ſemen, &  
 lanugo conſiſta: quibus non obſcura ineſt ad-  
 ſtringendi vis. Idcirco & ipſæ remedio ſunt  
 contra alii flores, & ſeminarum abundantiam  
 qualemcunque item contra gonorrhæam, in  
 qua præcipue pollent. Sunt, qui floſculos  
 capillis appoſitos, qui verò alabaſtros, an-  
 theram eſſe exiſtunt. Sed re vera hæc in re  
 planè hallucinantur: etenim anthera Celſo,  
 Galeno, & Paulo nuſquam ſimplex eſt me-  
 dicamentum, ſed quædam ex pluribus rebus  
 compoſito, quæ frequens erat vſus apud  
 antiquos ad oris vlcera: item ad pedum rimas,  
 digitorumque pterygia. Cuius etiam pa-  
 randi rationem adnotatam reliquit Galenus  
 libro v. 1. de compoſitione medicamento-  
 rum ſecundum locos, de oris vlceribus diſſe-  
 rens. Ex Roſis vti ignis fit aqua pluribus,  
 ac diuerſis inſtrumentis: veruntamen ea cæ-  
 teris præſtantior, ac odore fragrantior habe-  
 tur, quæ per balneum calentis aquæ vitreis or-  
 ganis elicitur, cuiuſmodi & aliæ ſunt, quæ  
 eodem modo ad vniuerſum medicinæ vſum  
 conſici ſolent. Quandoquidem inter has, & il-  
 las, quæ plumbeis inſtrumentis lignorum, vel  
 carbonum igne extrahuntur, tanta deprehendi-  
 tur differentia, quanta inter plumbum, & au-  
 rum deprehendi poteſt. Quippe quæ ſunt  
 in balneo calentis aquæ vitreis roſtratis orga-  
 nis, ab herbis, & floribus, à quibus manant,  
 nec ſapore, nec odore diſſentiunt, adeò vt non  
 ſolum proprias plantarum qualitates ſecum re-  
 ferant, ſed ne etiam tantillum quidem tum ſu-  
 mi, tum rei aduſtæ reſpiciant. Quod quidem  
 in iis non inuenias, quæ vulgo plumbeis, &  
 æreis inſtrumentis eliciuntur: has enim nun-  
 quam, vel rariſſimè gullaſſeris, quin tibi ſumi-  
 dum virus, nidoremque reddant. Quæ res  
 non modò ægris ingentem moleſtiam afferunt,  
 & naſcam plerumque mouent, ſed & pluri-  
 mum noxæ pectori, ventriculo, iocineri, vi-  
 ſceribusque omniſbus inferunt: quòd à metal-  
 licis organis, à quibus diſtillant, malam eorum  
 qualitatem ſibi vendicent, vt libro tertio in ab-  
 ſinthii commentatione, annuète Deo, latius,

explicabimus. Quare hæc ætate perſpecta,  
 doctiſſimi, ac pertiſſimi medici veteres ſecuti,  
 decoctis, ac diſtillis tantum vti cœperunt. Quæ  
 tamen viribus aquas quæſcentique ſublima-  
 tas (ita enim ſtillatitias vocant) præcellunt,  
 ex tamen, quæ calentis aquæ ſeruore (vt lu-  
 præ diximus) ſunt, cum propriis tum odo-  
 res, tum ſpores herbarum, ac ſorum, à  
 quibus extrahuntur, ſecum trahant, iure qui-  
 dem decoctis non modò ipſas æquipoſſere,  
 ſed etiam prællare crediderim: non tamen,  
 quòd viribus præcellere dixerim, ſed quòd  
 guſtui ſuauiores, & viſui iucundiores habeantur:  
 quod non parum ſolati ægotantibus af-  
 fert. Nos quidem aliis aquis non vimur,  
 quàm his, ad quas eliciendas nobis organum  
 affabrè parari fecimus, cuius ope hæcæ ſtilla-  
 titias, ac præſantiſſimas aquas ſuo tempore  
 conſicimus. Quarum aliæ ſapore conſtant  
 amaro, aliæ verò acri, aliæ auſtero, aliæ acido,  
 aliæ denique inſipido pro variis ſimplicium  
 medicamentorum: qualitatibus, à quibus eli-  
 ciuntur. Quapropter ſeplaſarii, & medici,  
 quos magis decet humanam charitatem cole-  
 re, quàm aurum & argentum, dent operam, vt  
 iam plumbea, & ærea organa aboléantur, & bal-  
 nea, de quibus diximus, in eorum locum ſuccedant,  
 quippe in hoc etià (quæuis plus laboris,  
 minus verò emolumentum ſuſcipiāt) & Deo, & ho-  
 minibus ſimul rem grata facere poterit. Ceterū  
 Fuchſius medicus noſtræ ætatis clariffimus in li-  
 bro de compoſitione medicamentorum, quem nu-  
 pter edidit, vnice cauendū præcipit in ſuccis ſtil-  
 laticis eliciendis, ne eius vaſculi fundū, in quo  
 ſtirpes continentur, aquā in cacabo bullientem  
 attingat, ſed ſolo vapore ab ea eleuato inaleſcat.  
 Quæ in re ſecutus potius videtur fuiſſe Ma-  
 nardū virum de arte medica præclare meritū,  
 qui ita ſcriptū reliquit in ſuis epiſtolis, quàm rei  
 experimentū. Verū ipſe non poſſum omnino  
 eorū ſententiæ ſubſcribere, vt qui iudicè non  
 eſſe ſemper ea exquiſita ratione procedendū in  
 herbis diſtillandis, q̄ certò ſciam nihil reſerre,  
 quādo etiam vaſculū herbas recipiens in aquā  
 in maiore vaſe bullientē immergatur. Nam eſt  
 aqua, quas illi voſit ex herbis vapore tantum  
 ab aqua bulliente eleuato extrahi, cæteris præ-  
 ſtatiores habeantur, tamen quæ ex herbis eliciū-  
 tur vaſculo impoſitis, quod aqua bulliſſi circū-  
 luit, parū certè, aut ſerè nihil illis bonitate cedunt,  
 quod mihi cœperum eſt in his aquis, quas  
 ſepiſſimè libuit vtroque modo elicere & experiri.  
 Attamè aliquis illud diſcrimè eſſe dicit, q̄ illo  
 modo aquæ ex herbis extrahant, quæ tenuiores  
 partes retinent, q̄ vaporis illius caliditas imbeci-  
 lior ſit, quàm vt poſſit totam herbæ ſubſtan-  
 tiam conſicere: hoc autem modo aquæ eliciantur,  
 quæ omnes herbarum partes ſecum reſerūt.  
 Hæc ſinè differentia, quæ facile concedi po-  
 teſt, non eſt, meo iudicio, tanti momenti, vt  
 illa regula perpetuò ſit obſeruanda, hæc verò  
 cauitanda: quin potius facis, vt hæc mihi vide-  
 k 2 tur

Quorum-  
 dam lap-  
 ſus.

Aquæ ro-  
 ſarum præ-  
 ſtantior.

Fuchſij opi-  
 nio nō pro-  
 bata.

Rosarum  
facultates  
ex Gal.

tur probanda, illa vero reiicienda tanquam cautio nimis religiosa. Rosarum vires collegit Galenus lib. v. i. i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Rosarum vis, atque facultas superioribus libris pluribus verbis exposita est, nempe quod ex aqua substantia calida mista duabus aliis qualitatibus, adstringenti videlicet, & amara, composita sit. Quinetiam cuius sit naturae utraque, amara scilicet, & adstringens, in horum commentariorum quarto declarauimus. Flos earum magis etiam ipsis rosis adstringit, ac proinde sine etiam exicciorius est. Rosa, quam ita Latini vocant, Graecis *ῥόδον* dicitur: Arabibus, Nard, Naron, seu Vard: Italis, Rosa: Germanis, Rosen: Hispanis, Rosas: Gallis, Vne rose.

Nomina.

#### LYCIUM. CAP. CXIIII.

LYCIUM, quod aliqui pyxacanthā vocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus: foliis buxi, densis: fructu piperis, nigro, laui, amaro, densoque: cortice pallido, non dissimili lycio madefacto: radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisque aliis locis. aspera loca amat. Succus extra hendi ratio haec est. Rami cum radiculis tussi, & antè per multos dies macerati coquuntur, tum abiectis lignis, itidem liquor coquitur, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lyciū, adiecta de coctione iamura, aut absinthij succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamentis additur: reliquo ad alia vtuntur. Simili modo fit lycium semine expresso, & insolato. Optimum, quod vri potest, restinctumque rubentem spumam ostendit, glebis intrinsecus nigris intus, cum tregeris, rufis, odore minime viroso, cum amaritudine astringens, crocino colore: cuiusmodi Indicum est ceteris praestans, & efficacius. Lycium adstringit, caliginem oculorum discutit: genarum scabiem, pruritus, veteresque fluxiones sanat: facit ad purulentas aures, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusque illitum: coeliacis, dysentericis, potum, inditumque conuenit: datur sanguine excreantibus, & tussi ex aqua: contra rabiosi canis morsus in catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur: flauos facit pilos: reduiuis, vcleribus, quae serpunt, aut putrent, medetur: sceminarum profluuia appositum sistit: rabioforum icibus ex melle potum, aut vice catapotij deuoratum, auxiliatur. Tradunt Indicum fieri Lycium, ex frutice lonchitide appellato. Ea spinarium generi ascribitur, ramos rectos habens, ternum cubitorum longitudine, maiore sive, rubo crassiores, a radice numerosos: fractus cortex rubescit: folia oleae similia. Herba in aceto decocta proditor lenis inflammationibus, & regio morbo mederi, & sceminarum purgationes elicere. Asseuerant etiam crudam in potu, eosdem effectus praestare: semen cyathodimidio potum, pituitam expurgare, venenis quoque auxilio esse.

#### LYCIUM.



LYCIUM. medicamentum, quod hodie officinae passim vtuntur, nimirum notis illi plurimum reclinat, quod nobis hic reddidit Dioscorides. Siquidem illud officinarum igni admodum non accenditur, nec in tus rufescit, nec vltam gustantibus affert amaritudinem quae omnia certo sunt indicio, idominino imposturis, & adulteris non

Lycij consideratio.

vacare. Tradidere quidam hoc ab impostoribus fieri: è ligustri fructu, alii id tribuunt periclymenibaccis, alii sanguinea virgae corymbis, alii porro ex his omnibus simul confusis elici product, ac inde insolari. At legitimum, & quod syncerū sit, quoquomodo se res illa habeat, cōperturn est, hoc ex eo ex Lycia, vnde illi nomen, ad nos non importari. Veruntamen & in Italia Lycii arbor nascitur: quandoquidem (vt Brasauolus testatur) in Liguria alpebus frequens illa vifitur. Eadem & in Dalmatia prouenit, vnde nuper eius ramuli suis baccis onusti mihi allati fuerunt: quippe (vt mihi retulerunt) via, quae ex Zara itur Nonam, vbique virefuit. Sed, quae maxima tum seplasiariorum, tum etiam medicorum incuria, ac negligentia est in iis exquirendis, quae ad artem medicam spectant, plerumque fit, vt ne illud quidem, quod nobis spon-

Lycium in Italia nascens.

Lycii  
res ex Ga-  
lene.

te natura tribuit, cognoscatur, nedum recipiatur in usum. Lycii vices Dioscoridi explet amura in cupreo vase decocta, aut etiam rhus decoctus, quousque eius liquamentum mellis crassitudinem acquirit. Lycii meminit Galenus libro v. i. i. simplicium medicamentorum sic inueniens. Lycion, siue pyxacanthos, arbor spinosa, ex qua lycium, quod vocant, conficitur: id videlicet medicamentum liquidum, quo ad sugillata vtuntur, & sedis, orisq; phlegmonas, vlcerationesq; tum herpes, putredines, & vlcera contumacia, & aures pure fluentes, & intertrigines, ac paronychias. Est autem facultatis exiccatorie, compositum ex diuersi generis substantiis, quas *in se ipso* Græci vocant altera quidem tenuium partium digerente, atque calidiora terrefacta, & frigida, ex qua adstrictionem obtinet. Porro hæc qualitas pusilla medicamento inest, digerit verò, & desiccatur non parum, nempe in secundo recessu, in calore autem mediis, & symmetricis proximum est. Proinde ad diuersos affectus hoc vtuntur medicamine, vt abstergente quidem ad ea, quæ pupillis obtenebrant: vt contraheute verò, coeliacis, dysentericis, ac muliebri profuuiio adhibentes. Lycium hoc in Lycia, & Cappadocia plurimum prouenit: alterum verò Indicum ad omnia valentius est. Et primo de antidotis, non facili adulterium lycium à legitimo dignosci idem memoria prodidit. hæc Galenus. Cæterum quoniam Pyxacantha, quo nomine lycium ab aliquibus appellatur, mihi Buxum, quæ Græcis *μύστος* dicitur, in memoriam redegit, non omitendum duximus, quin de ea etiam aliquid dicamus. *μύστος* itaq; nobis notissima est planta, quod plurima in Italia proueniat, folio myrti minore, crassiore, viridioris, ac subrotundioris: vires perpetua coma, eaque propter topiario operi accommodatissima: flore herbaceo: semine rufescente, omnibus animantibus inuiso. Crassissima in Corsica, flore non ferendo: quæ causi amaritudinis mellis. Frigidus gaudet, & apricis. Materies buxo honorata, raro crispanti, nec nisi radice: cæterò lenis quies materia, silentio quodam, & duritie, ac pallore commendabilis. Eadem spississima, & densissima, atque ponderosissima, adeo vt in aqua non fluit, nec cariem sentiat. Hæc etiam nullius sit in medicina usus, vt veteres prodidere, non desunt tamen & recentioribus, qui velint non aliud esse Italicum buxum, quam India lignum, quod guaiacum appellant: ea tantum ratione ducti, quod pluries experimento compertum sit, eius decocto etiam felicius eos sanatos esse, qui Gallica huius affecti erant. Quod etiam experientie concedi possit, illud buxi lignum præstare: attamen quod buxus in Italia nascens, & guaiacum ab Indis peritum vna, & eadem sint planta (vt in secunda centuria Amatus Lusitanus asserere videtur) nunquam profectò crediderim. Siquidem guaiacum pingue, re-

Buxi con-  
sideratio.

Quorum-  
dam opi-  
nio reprobata.

finosimque visitur: materie intus nigra ebeni ferè modo: quin & sapor huius amarior, & acris. quibus omnibus notis siccam buxi materiem carere constat. Quinetiam guaiaco (vt narrant ii, qui ab Indis ad nos redeunt) folia insunt plantaginis, breuiora, crassiora, durioraque: lutei flores, & fructus iuglandis magnitudine. Buxus verò folia fert myrti, breuiora: flores herbaceos, & fructum myrto nissquam grandiorum. Quo fit, vt omnino existimem eos hallucinari, qui putant, buxum quæ in Italia nascitur, idem esse cum Indico guaiaco, vt nuper sensisse videtur Lusitanus loco antedicto. Sed quam ab eo ieiunè, ne dicam imprudenter actum sit de simplicium medicamentorum cognitione, eorum facili iudicium futurum spero, qui non mediocriter in re herbaria versati fuerint, & huius scripta legent: atque etiam legere non grauantur apologiam, quam nos aduersus illum scripsimus, cui plurima errata attexuimus, quæ in eiusdem in Dioscoridem enarrationes adnotauimus. Lycium Latini similiter atque Græci *μύστος* nominat: Arabes, Hadhad, Hadad, Kilelem, siue Felzakarag: Itali, Licio. Quæ verò planta Græcis *μύστος*, Latinis Buxus appellatur: Italis, Bosso: Galliis, Bouis.

Nomina.

# ACACIA. CAP. CXV.



ACACIA in Aegypto nascitur, spina instar arboris, fruticosa, non se in rectis attollens. Flore habet candidum, & semine lupino simile in folliculis: ex quo succus expressus siccatur in vinum

bra, niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligatur modice rufus, & odoratus, vt in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex foliis, & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum, refrigerandumque efficac. Succus oculorum medicamentis utilis: valet ad ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, perniones, pterygia, & oris vlcera: procidentibus oculis reprimat: mensium abundantia sistit,

prociduum vuluam cohibet: citam alium supprimit, aut potus, aut subter inditus: capillos denigrat. Lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso, quod concreuerat, donec pura extet aqua: & ita cogitur in passillos. Vritur etiam in cruda fidelia, donec fessile fornacibus percoquatur: torreturq; in carbonum halitu persalata. Spinæ decoctū solutos artus fotu committit. Præfertur eius spinæ gummi, quod in vermiculorum speciem contrahatur, & vitri modo perluceat, ligni expers: proximum est candidum: sordidum verò, ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam hebetat: ambustis ex ovo illitum, pustulas non patitur erumpere. Alterum Acaciæ genus in Cappadocia, Pontoque provenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, longè minus, tene-rius, humile: aculeorum vallo munitur, folia habens rutæ: semen lenticula minus fert autumnino, in loculis connexis, ternum, quaternumve capacibus. Succus eius adstringit, viribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

Acacia  
Histor. ex  
Theophr.

ARBOR, quæ Dioscoridi Acacia vocatur, Theophrasto Spina simpliciter dicitur libro 1111, cap. 111, de plantarū historia, vbi de ea ita scriptum reliquit. Spina ex eo nomen accepit, quod tota arbor aculeis horret, excepto caudice: nam & super germina, foliaque aculeos gerit. Magnitudine excellit, materies quippe duodenorum cubitorum, testis idonea cæditur. Eius duo genera sunt: quædam enim candida, quædam nigra: & altera imbecillis, facileque putrescens: nigra autem robustior, atque incorrupta, ob id in nauium fabrica ad costas, ventrisq; compagine ea vtruntur. Erecta non valde assurgit. Fructum fert in siliqua, leguminum modo, quo incolæ coria perficiunt vice gallæ. Flos & pulcher aspectu, vt coronas ex eo facerent: & medicamentis perutilis, quæ de causa colligi à medicis solet. Fit & gumma ex ea: manat hæc tum arbore percussa, tum sponte sine ulla plaga: cum autem cæsa fuerit, anno tertio procius resurgit. Copia huius arboris largè habetur, & sylua ingens circa agrum Thebanum est, vbi & robur, &

persea, & olea quoque eo loco emigrat, non aquis fluuii riguo (distat enim plus, quam trecentis stadiis) sed suis fontibus, qui circa eum tractum permultū exiliunt. Materies arboris dura, & cæsa colorum celtis vtiq; repræsentat. hæcenus Theophrastus. A quo Plinius non dissentiens, ipse quoque eius historiæ memoriæ prodidit libro x x x x x. capite x x x. cuius sic verba sonant. Est & acaciæ spina. Fit in Aegypto alba, nigraque arbore, item viridi, sed longè melior è prioribus. Fit & in Galatia tenerima, spinosiore arbore. Semen omnium lenticulæ simile, minore est tamen & grano, & folliculo. Colligitur autumnino, quoniam antè collectum nimio validius. Spissatur succus ex folliculis aqua cælesti persusus, mox in pila tussis: exprimitur organo, tum densatur in sole mortariis in passillos acacia dicta, arboris videlicet suæ nomine. Fit & ex foliis per se minus efficax. Ad coria perficienda semine pro galla vtruntur. Foliorum succus, & Galatiacæ acaciæ nigerrimus improbatum: item qui valde rufus est, hæc Plinius. Succus è recenti semine expressus, ac postea longa insolatione concretus Græcis nomine suæ arboris Acacia nuncupatur. In cuius defectu supponunt tum officinæ, tam medicorum vulgus succum è syluestribus prunis expressum in tenues quasdam placentalas in sole densatur: siquidem legitima acacia ad nos non affertur. Vbi acacia defecerit, licet (si Dioscoridi credimus) eius vice tum rhois arbusculæ folia, tum lenticis foliorum succum, tum etiam hypocistidem medicamentis immiscere. Quamobrem his potius seplasarū vti deberent, quam supposititio syluestrium punorū succo. Scire etiamnum conuenit, gummi, quod ab arbore acaciæ manat, ideo Serapioni Arabicum nuncupari, quod ab Arabia regione Aegypto contraminata suo tempore importaretur. Sed antea ducere oportet, quod Arabicum vulgare vñs gummi longè quidem ab illo differt, quod ab acacia colligitur: nanque illud non contractis vermiculis simile, sed in grumis versicoloribus cõspicitur, quorum alii succinum, alii topatium, alii chrysopatium, alii beryllum colore, & nitore referunt. Quod autem nobis gummi Acaciæ desit, illud argumentò esse potest, quod ipsa quoq; legitima acacia hæcenus, quod sciam, non defertur. Nam si hoc, quo vitmur, syncerum, legitimumq; acaciæ esset gummi, procul dubio ipsa quoq; acacia ad nos conuheretur, cum longè magis in paranda theriaca, aliisq; componendis medicamentis expetatur, quàm gummi. Hinc itaque facillè quisque conicere potest, gummi ex Aegyptia spina defluens ab eo sanè plurimum differre, quod Arabici gummi nomine officinarum vulgus habet. Hoc igitur vulgare gummi illud equidem esse existimauerim, quod Græcis gummi simpliciter vocatur. In quam sententiam me adduxit Galenus: siquidem lib.

Acaciae  
fissuræ.

Gummi  
Arabici.

¶ 11. simplicium medicamentorum, sic inquit. Gummi lachryma est congelata, concretaque in truncis arborum ipsam fundentium, velut resina quoque in multis vitis plantis, quæ resinas fundere possunt. Cæterum quod exicatoris, emplasticæque sit facultatis, constat. hæc Galenus. Ex cuius verbis palam est, gummi sic in vniuersum Græcis appellatum, nostrum gummi esse vulgè Arabicum dictum. Quod quidem (quâtu sensuum iudicio consequi possumus) ex pluribus arborum gummi miscellaneum est. Cuius rei manifestio indicio sunt cum grumorum forma diuersitas, tum colorum varietas. Huc etiam accedit, quod Galenus vnica nomenclatione omnia earum arborum gummi comprehendit, quæ resinam non proferunt. Quamobrem omnino explodenda videtur eorum sententia, qui vbi Græci gummi absolute scriptum reliquerunt, illud gummi intelligendum esse contendunt, quod est spina Aegyptia. 10  
 Nam non desunt præterea, qui gummi spinæ Aegyptiæ illud esse opinentur, quod gummi Dragaganti, hoc est, tragacanthæ officinis appellatur, propterea quod effigie contractos vermiculos referat, quo nihil certè melius illi competere possit. Sed ramen hoc etiam illud non est, vt suo loco dicemus. Galenus libro 11. de compositione medicamentorum per genera, Acaciæ gummi *καμυ λευκῆς* vocat; hoc fortasse argumento, quod scripserit Theophrastus (vt supra dictum est) ingentem huiusce spinæ sylum esse in agro Thebano. Sed etiam ad nos non perferatur acacia (vt paulo ante scripsimus) nec etiam eius gummi importari credendum est. Gummi Acaciæ meminit Iacobus Syluius vir sanè ætatis nostræ ingenio & doctrina celebris, suo de natura simplicium medicamentorum libello, his verbis. Gummi acaciæ nec meminit Galenus in Acacia libro sexto simplicium, vt nec acaciæ mentionem facit paulo post in Acantha Aegyptia, seu Arabica, quo nomine (solum Dioscoridi) vocatur. Vnde colligas licet, acaciæ, & acantham Aegyptiam, seu Arabicam, diuersas esse in Aegypto spinas arbores. hæc ille. Sed mea quidem sententia, Syluius manifestè aberrasse deprehenditur: quandoquidem Galeno acantha Aegyptia arbor vtique non est, sed herba è carduorum genere, quicquidmodum & Dioscoridi libro tertio, *καυῆς λευκῆς*, hoc est, spinæ albæ similis, quam Mauritanii suchaa appellant. Quocirca eo capite acaciæ meminisse Galenum omnino fuisset absurdum. Cæterum alteram Acaciæ, quam in Cappadocia, Pontoque prouenit tradit Dioscorides foliis rutæ, quamq; hic depictam danus, accepimus: hoc anno à quadam ex iis, qui rei herbariæ dant operam. Et quoniam ea Dioscoridis historiam perbellè representare visa est, non potui animus non inclinari ad credendum hanc secundam esse Acaciæ. Est enim aculeis horrida, folio rutæ, semine lenticula minore, in siliquis ternum qua-

ternumque capitibus, quod autumno profert, gustu etiam adstringente: color siliquis aureo quodam fulgore resplens, adeo vt in sole aurei modo pelluceat. Acaciæ vires adnotatas reliquit Galenus libro 11. simplicium medicamentorum, vbi sic inquit. Acaciæ & planta ipsa acerbæ est, & fructus, & succus, qui lotus quidem & imbecillior, & minus mordax redditur, vt pote acrimoniam quandam per lotionem deponens. Porro si parti alicui sanæ illinatur, protinus eam & ficiorem, & contractam efficit, nullum quidem caloris sensum inueniens, sed nec frigoris admodum valentem. Vnde constat medicamen id esse frigidum, & terrosum, immista quadam etiam essentia aquea. Et sanè coniectura est, non esse simile, verum qualem in sese dispersas habere partes tenues, & calidas, quæ in ipsa ablutione segregentur. Estoque & hoc tertii ordinis exiccantium, & secundi refrigerantium, vbi quidem elotum fuerit, illorum verò primi. Nomen, quod *καυῆς* Nomina. habet apud Græcos, idem, quod est Acacia, retinet apud Latinos & Italos. Ea autem Arabicè Aehachie appellatur.

## VITEX. CAP. CXVI.

VITEX, siue lygos, frutex est in arborem assurgens. Nascitur in fluminum ripis, asperisque locis, ac torrentium alueis: ramos gerit longos, fractura peruiacæ: folia oliuæ, sed molliora. Duo genera eius: vna harum album florem mittit cum purpureo: altera tantum purpureum, & semen, vt piper. Excalfactorias vires habet, & astrictorias. Semen eius potum venenatis ictibus, aquæ quæ cutem subiit, lenisior; auxiliatur: lac euocat: menses ciet, drachmæ pondere in vino potum: genituram exoluit: caput tentat, & soporem affert. Decoctum herbæ, & feminis in defensione, mulieribus vuluæ malo oppositis opitulatur: item inflammationibus. Purgationes mouet semen cum pulegio potum, etiam suffitu, vel appositum: capitis dolorem dissoluit illitum: instillatur cum aceto, & oleo capiti in lethargo, & phrenitide. Folia suffitu, aut substrato fugat venenata: illita quoque serpentium morsibus auxiliantur: testium duritias, cum butyro, & foliis vitium emolliunt. Rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat: & cum foliis medetur luxatis, vulneribusque. Virgam qui

gymnocor-  
dant. lach-  
ryma.

Jacobi Syl-  
uij opinio  
reprobata

Acacia al-  
terum ge-  
nerum.





cinis admisto aceto maceratus, illitu clauos, & callos tollit. Ex foliis, & cortice succus cum rosaceo in calyce punice calfactus, aurium doloribus auxiliatur. Decocto eorum podragas foueri vilissimum: furfures purgat in corpore. Excipitur succus, qui manat ex ea, cum floret, exciso cortice: in plaga enim concretus humor inuenitur, qui ad purganda, quæ obstant oculis, suam vim præbet.

Salicis consideratio.



QUANVIS de Salice, vt vna tantum agat Dioscorides, eius tamen plura traduntur genera tum à Theophrasto libr. III. cap. XIII. de plantarum lib. II. floribus, tum etiam Plinio li. XVI. ca. XXVII. Nā quædam in tiam proceritatem affurgunt, vt ex eis in Liguria fiat & peritice, & pali maximi vsus ad vitium pedamenta. Aliæ

non tam proceræ crescunt, colore rufescentes, sequacis lentitæ, quæ ligandis eadum vinariorum circulis commodè funduntur. Rursus aliæ firmiores corbibus, & rusticæ suppellestili admodum expetitæ, Aliæ denique sunt minuscule, ac speciosi tenuitate, texendis canistris, cistellis, ac calathis aptissimæ. Salicis lacrymam trium generum esse prodidit Plinius libro X XIII. cap. IX. tumetis vnius tantum generis meminerit Dioscorides. Vnam arbor ipsa sponte exudat: altera manat in plaga, cum floret, exciso cortice trium digitorum magnitudine: tertia est detruncatione ramorum autumnî tempore à falce distillans. Cæterum qui Salicis albicantem spumam adnotatam reliquerit, inuenio neminem: quæ delapsis statim floribus è ramis suis vix modo depædet, donec ventis arrepta huc, & illuc plumæ modo impellitur. Salix citò senescit, ac breui vitæ spatio perdurat. Eius materies idè scitis faciendis apta, quod lenta admodum sit, tenax, & leuis. Salicis vires memorat prodidit Galeus lib. V. I. simplicium medicamentorum his verbis. Salicis foliis ad cruenti vulneris glutinationem quis vti possit. Verùm floribus eius maxime propè omnes vtuntur medici ad excantantis emplastri præparationem: est enim vis eorum ita desiccatoria, vt morfu abstergeat:

Salicis vires ex Galeo.

habet verò etiam quandam adstrictionem. Sunt verò etiam, qui succum ex ea expressum, medicamentum seruent mordacitatis experts, & excicatorium, ad multas res vtile. Haud enim inuenias quid alius res vtilius medicamentum citra mordacitatem exicantem, quod paulum etiam adstringat: sicut in opere de medicamentorum compositione exactius demonstrabitur. Porro arboris cortex similem facultatem continet tum floribus, tum foliis, nisi quod temperaturæ sit facioris, velut omnes cortices. Sed hunc quidam comburunt, eiusque cinere vtuntur ad omnia, quæ valenter desiccare oportet. Nam clauos quos vocant, callos Græcis ῥάκας, myrmeciasque tollunt, aceto acri ipsum macerant. Nonnulli autem dum floret salix, corticem eius incident, & succum quandam colligunt, vtuntur ad ea, quæ pupillas obsuscant, exurgente videlicet, simuique tenuum partium medicamine. Vt verò illo ad multa alia quis possit, siquidem talis fuerit. Vitex ita Latinis ῥάκας, Græcis ῥάκας: Arabibus, Bulef, Bhulles, Salfas, aut Chalis nominatur: Italis, Salice, & Salcio: Germanis, Væiden, & Felbinger: Hispanis, Salce, aut Salgueiro: Gallicis, Saulx.

Namini.

SYLVESTRIS OLEA  
CAP. CXVIII.

SYLVESTRIS olea, quam aliqui cotinon, id est, oleastrum appellant, alij Aethiopicam oliuam, folia adstringunt: trita autem & imposita ignem facrum, vlcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, reducias, nomasque cohibent: crustas emarginant cum melle illita: quinetiam sordida vlcera repurgant: inflammationes, panosque cum melle imposita discutiunt: cutem à capite vulsam conglutinant: oris vlceribus, & priuatim infantium commaducata medentur. Succus, & decoctum eodem habent effectus: sanguinis eruptiones, ac muliebres profluuium, admodum succus inhihet: vix oculorum, pusillisque prodest: vlcera, & veteres defluxiones silit: quapropter in collyria additur, ad palpebrarum erosiones perquam vtilis. Exprimitur succus tuis foliis, affuso vino, aut aqua, siccatusque sole in pastillos digeritur: sed longè validior ad recondendum succus habetur, qui cum vino, quàm cum aqua expressus est, auribus subuenit, siue vlcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter cœ

liacis cum farina hordeacea illinuntur. Vruntur cum floribus folia, vt spodij vicem cinis præstet, in cruda olla, obli-  
to ore luto, vsque dum figlinum per-  
coquatur: restinctaque vino, & rursus  
subacta, eodem modo vruntur: postre-  
mò cerusæ modo elota coguntur in  
pastillos. Huiusmodi cinerem in me-  
dicamentis oculorum, constat spodio  
non cedere, sed eisdem viribus prædi-  
tum esse putandum est. Foliorum sa-  
tiæ oleæ eadem vis intelligitur, sed ali-  
quantò inferior: vnde ocularibus me-  
dicamentis ob suam mitiorem vim cõ-

uenientior est. Sudor ligni virenti ac-  
censo manans, illitu sanat lichenas, fur-  
fures, & scabiem. Oleaginum semen  
illitum medetur furfuribus, & vlceri-  
bus, quæ depascunt, vorantque: quod  
autem intra nucleum est, ex adipe, &  
farina scabros vngues excutit, Colym-  
bades tritæ, & ambustis illitæ, pustu-  
las gigni prohibent: sordida vlcera  
purgant. Muræ succus collutas gingi-  
uas contrahit, & motus dentium fir-  
mat. Oliua flaua, & recens stomacho  
vtilior est, ventri difficilis: nigra autem,  
& matura corruptioni opportuna est,

OLEA SYLVESTRIS.



OLEA SATIVA.



stomacho aduersatur, oculis non con-  
uenit, capitis dolorem mouet: arefa-  
facta illitu depascentia vlcera sistit, &  
carbunculos emarginat. Oleum sylue-  
stris olææ gingiuis putri vligine labo-  
rantibus colluitur, dentium mobilita-  
tes stabilis: calfacti foras gingiuis flu-  
xione laborantibus utilis est: lanam  
enim specillo circumligatam oleo ma-  
defacere oportet, & gingiuis admoue-  
re, donec albæ spectentur.

LACRYMA ÆTHIOPICÆ  
OLEÆ. CAP. CXIX.

LACRYMA, quam Æthiopica olea

stillat, scammonio similis quâdante-  
nus est, fulua, stillis, exilibus constans,  
mordax. Quæ autem ammoniaci, aut  
gummi similitudinem refert, colore ni-  
gricans, nec gustu mordens, superua-  
cua est. Nostrates olææ, oleastrique si-  
milis lacrymam fudant, quæ commo-  
dè ad oculorum hebetudines illinitur:  
cicatrices, albûginésque illitu emen-  
dat: vrinam, & menses ciet: cauis den-  
tium impressa ad dolores efficax est.  
Inter venena scribitur, partus pellit:  
lepras, & impetigines sanat. Appella-  
tur autem Æthiopica, & agrestis olea.

Amurca

A M V R C A .

CAPVT CXX.

AMVRC A expressa oliuæ recremen-  
tum est. Decocta in cupreo vase ad cras-  
situdinem mellis adstringit, ceteros  
præbēs lycij effectus. Insuper dentium  
dolori, & vulneribus cum aceto, vino,  
aut mulsio commodè illinitur: additur  
in medicamenta ocularia, & meatus  
inductu suo obstruentia. Vetustate me-  
liorem fieri cōstat. Vtiliter infunditur  
sedis, genitalium, ac vuluæ exulceratio-  
ni. Si verò cum omphacino recoqua-  
tur ad mellis crassitudinem, cariosos  
dentes extrahit: iumentorum scabiem  
cum decocto lupini, & chamæleonte  
illitu sanat. Cruda, & recenti amurca  
podagras, articuliōque dolores foci-  
ueri, vtilissimum: peruncta in villosa  
pelle, & hydropicis imposita, tumoris  
molem reprimat.

*Olea syl-  
vestris cu-  
sideratio.*

Cum oliuæ, oleum, oleæ Aethiopice lacry-  
ma, & amurca ex vna tantum arbore proue-  
niant, nō ab re duximus de his omnibus simul  
pertractare, & ita singulis partibus vnica  
commentatione, quantum opus erit, satisfacere, &  
quicquid ad eas spectat, simul perstringere. Na-  
scentur sylvestres oleæ copiosæ in agro nostro  
Senensi, aliisque Hetruriz locis: nascuntur &  
in Dalmatiz tractu, & in quā plurimis Adria-  
tici insulis, verum domesticis longè minores,  
foliis brevioribus, aculeatisque ramis. Earum  
bacca etiam numerosa fecunditate vincant, ma-  
gnitudine tamen satius cedunt: quin & ori sa-  
pidiores existunt. Cuius rei certo sunt testimo-  
nio turdi, merulae, ac sturni: quippe quoniam  
sylvestres oliuas libentius deuorant, quā sa-  
pias. Incolæ, qui aucupii delectantur, agrestes  
oleas summo studio, ac industria ab auibz tūc-  
tur: nempe quod confecta satiarum vindemia,  
auculæ ad has aduolant, vbi mense decembris,  
& Ianuario vides innumere caputur, præse-  
timque turdi. Pauci admodum sunt in Hetrur-  
ia, qui oleastri baccas legant, vt oleum inde  
exprimat: nam ea demum magna satiarum  
copia est, quæ facit, vt inibi omnino paruipen-  
dantur sylvestres. Oliuarum genera decem in  
antiquorum notitiam peruenisse reperio, pau-  
cas videlicet, algianas, sicinianas, sergias, neuas,  
culminias, orchites, regias, circites, murteas:  
et si Virgilius trium generum tantum memi-  
nerit, quemadmodum etiam plura non nouit  
hæc nostra ætate Hetruria, præsertimque no-

*Oliuarū  
genera plu-  
ra.*

rer Senensis ager. Primum harum genus eas  
nostri faciunt, quæ licet à minoribus olearum  
plantis proferantur, sunt tamen spectata forma,  
& magnitudine Bononiensibus non quidem in-  
feriores. His tantum muria asseruatis vtuntur  
in cibis: quandoquidem oleo minus aptæ sunt,  
quod multò plus amurcæ, quā olei fundant.  
Proximæ tum colore, tum magnitudine præ-  
stantes, quauis prædictis longè minores sunt,  
sunt tamen omnium apitumæ ad olei consi-  
ciendi vsum, quippe quod oleum ex eis expres-  
sum, sit non modò statum, dulce, pellucidum,  
ac cæteris præstans, sed etiam copiosum. Gi-  
gnuntur hæ à procerissimis oleis, prægrandi-  
bus, iuglandium nucum instar, ramos in altum,  
latumque amplissimè fundentibus. eas rura no-  
stra Oliuastri vulgò vocant. Tertiæ verò, ac  
postremæ generis ex denique sunt, quæ passim  
in vniuersa Italia nascuntur, & omnium vulga-  
rissimæ habentur. Laudatissimæ oleæ Bono-  
niensibus, & nostratibus grassiores muria asser-  
uata Romam, Venetias, & ad alias complures  
Italiz clarissimas vrbes, vbi magnificæ, opu-  
lenti: parantur parantur mensæ, ex Hispania impor-  
tantur. Cæterum olea, & quercus tam pecti-  
naci odio inter se dissident (si rei agrariz scrip-  
toribus fides est adhibenda) vt altera prope  
alteram depacta breui tempore pereat. Oleæ  
item si primo germinatu à capra depascantur,  
adeò sterileseunt, vt nullo remedio in poste-  
rum prolificæ fiant. At si alia de causa raras ad-  
modum, vel nullas proferant baccas, nudatas  
earum radices à circumstante terra hybernis al-  
goribus opponere, certissimum est remedium.  
Sylvestris, seu Aethiopice oleæ lacryma, licet  
multis polleat viribus, eius tamen in Italicis  
officinis nullus est vsus: neque quod ea ad nos  
asseratur, adhuc compertum habeo. Sunt qui  
hanc putent illud esse gummi, quod medici re-  
centiores, & officinæ gummi elemi appellant.  
Verum illud certo argumento est, oleæ Aethio-  
picæ lacrymam gummi elemi non esse, quod  
gustatu mordax non sit, neque linguam velli-  
cet: tum etiam, quod omnibus perspicuum sit,  
eam lacrymam (et si improprie gummi appel-  
letur) non in gummi quidem, sed verius in res-  
sinarum genere esse recipiendam: cum igni ex-  
posita statim collescat, & diffundatur, quæ  
admodum & resina: quæ è pino, picæ, & aliis  
resinam fundentibus plantis colliguntur: licet  
nobis prorsus ignota sit planta, à qua in oriente  
destitit. Siquidem nullum gummi genus (quod  
ego sciam) igne collescit, nisi addito aceto,  
vel vino: quin potius statim comburitur. Est  
& alia oleæ maris rubri lacryma, ex qua (vt  
Theophrastus inquit lib. 1111. cap. v111.)  
medici sitiendo sanguini medicamentum com-  
ponunt. Cæterum quauis ætate nostra ob-  
scura admodum sit gummi Elemi origo, eius  
tamen vires clarissimæ apud chirurgicos, &  
vulnerarios medicos reperiuntur: nam in cal-  
uariz fracturis, ac vulneribus mirificè vnguen-  
tis, & emp

*Olea. &  
quercus o-  
livæ.*

*Aethiopi-  
ca olea la-  
cryma.*

*Gummi  
elemi.*

*Amurca  
olei.*

tis, & emplastris additur, adeo vt præstantissi-  
mum sit in his sanandis medicamentum. De  
Amurca olei postremo nil aliud dicendum est,  
nisi quod sit admodum vtilis (vt memorie pro-  
didit Cato) apothecarum, & officinarum fabri-  
cis, vbi lancei, vel sericeæ panni reconduntur.  
Nam si calci admisceatur, & ex ea inde parietes  
incrustentur, oblinanturque, item laquea-  
ria, & pauimenta non modo parietes contra-  
ctos, vel aduentitios humores nunquam colla-  
crymant, & situm minime contrahunt, sed nec  
blattæ, nec aranei, nec cuiusvis generis vermi-  
culi ibidem gigni possunt. Oliuæ vires prodi-  
dit Galenus libro v i. simplicium medicamen-

*Oliuæ Si-  
res ex Ga-  
leno.*

QVERCVS. GLANS.



ILEX.

CAP. CXXI



QVERCVS  
omnis adstri-  
ctoriâ vim ha-  
bet, præsertim  
liber, qui corti-  
ci, & ligno in  
tercedit: quin-  
etiam tunica  
putamini glan-  
dis subiecta.  
Decoctum ex  
iis datur dysen-  
tericis, cœliacis,  
sanguinem  
excreantibus. Trita in pello sæminis  
fluxione vuluæ laborantibus subiicitur.  
Glandes eisdem effectus exhibent: vri-  
nam ciunt: capitis dolorem, & flatum in  
cibum sumptæ pariunt: resistent esita-  
tæ venenatorum ictibus. Decoctum ea-  
rum, & corticis cum lacte vaccino po-

torum, sic iniquens. Oliuæ rami quantum ha-  
bent adstrictionis, tantæ & frigiditatis partici-  
pes sunt. Fructus verò, siquidem ad vnguem  
maturuit, moderatè calidus est: sin immaturus  
est, magis tum adstringit, tum refrigerat. Olea  
satiua, sic Latine, vt *olea siva* Græcè voca-  
tur: Arabicè, Zaiton, seu Caiton: Italicè, Oli-  
uo domesticò: Germanicè, Oelbaum: Hispani-  
cè, Oliuo, & Azeytuno: Gallicè, Oliuier. Syl-  
uestris autem Græcis *Ἀγριαία*, & *Ἰκίτις* ap-  
pellatur: Latinis, Oleaster, & Olea syluestris:  
Italici, Oliuo saluatico: Germanis, Vuider  
oelbaum: Hispanis, Azebuche: Gallis, Oli-  
uier sauauge.

*Nomina.*

FAGVS.



tum, prodest contra toxica. Intritæ cru-  
dæ inflammationes illitu leniunt: ad  
duritias, quas cacoëthe vocant, & ma-  
lesicia vlcera cum salsa axungia conue-  
niunt. Iligneæ glandes viribus quernas  
antecellunt. Fagus, & Ilex quercus ge-  
neri asignantur, & consimile munus  
obeunt. Iligneæ radices cortex cū aqua  
coctus, dum mollitus intabescat, & to-  
ta nocte illitus, denigrat capillos, prius  
cimolia terra purgatos. Folia omnium  
tusa, & trita tumoribus profunt, & im-  
becillas mēbrorū partes corroborant.

S V N T & alix glandiferi generis arbores,  
præter Quercum, Illicem, & Fagum: inter quas  
numerantur Cerrus, Suber, Aesculus, & alix  
nonnullæ, quæ suo more rura nostra appellant,  
quarum omnium exactè rationem reddere po-  
test vniuersa Hetruria. Quippe quod & in ma-  
ritimis nostris Senensibus, & Faliscorum agro,  
ac etiam Romano tractu, omnia hæc glandife-  
rarum genera adeo numerosa in vastissimis syl-  
uis proueniunt, vt glandibus innumerabiles  
porcorum greges incolæ ibi quotannis faginet.  
Verum ne aliquis existimet, harum non memi-  
niffe

*Glandife-  
rarum co-  
sideratio.*

nisse Dioscoridem, quod fortasse eas non cognouerit, sciendum est, eum, meo quidem iudicio, *Agor* nomine comprehendisse in vniuersum omnes glandiferas arbores, non solum quod sciret, vna voce omnia illa genera contineri posse, sed etiam vt breuitati consuleret: *Agor* enim apud Græcos non modò quercum particulatim significat, sed vniuersum quantumque glandiferam arborem. Quo fit, vt dixerit ipse: *Αἰστὴν αἰσὴν εὐρυκλίσιν ἀδύσιν*, id est,

*Quercus  
qua profert  
rat.*

Quercus omnis adstrictioriam vim habet, ac si dixisset, arbor omnis glandifera adstringit. Porro mirum est (vt Theophrastus est auctor libro 111. cap. v 111. & x. de plant. historia) quod alia plurima præter fructum ferat quercus. Nā gallam gignit paruum, atq; alteram resinofam, & nigram: quin & aliud specie veluti morum, sed durum, & fractu admodum difficile: id tamen rarum. Ad hæc aliud effigium colis repræsentans. Cum verò perficitur, durū quid parte emicante, & perforatum, & tauri caput quodammodo æmulans profert, quod præruptum nuclei oleæ speciem intrus ostendit. Fert & quod quidam pilum appellant. Id pilulæ est comam gerens lanaceam, mollem, nucleo durior, qua in lucernarum luminibus vtuntur. Flagrat etenim probè, vt galla nigra. Fert & alteram comigeram pilulam, cæterum quidem inutilem, verno autem tempore succo melligeno inficentem tum tactu, tum gustu. Inq; ramorum alijs pilulam aliam gignit sine pediculo, concauofq; fissilem, peculiarem certè, versicoloremq;. Nam eminentes quosdam umbilicos candicantes, vel passim variantes nigris maculis habet: partem medium grani tinctam infusam, splendidamq; ostendit, aperta, nigra, & putricans cernitur. Lapillum quoque puniceum magna ex parte gignit, quamquam rarò. Item aliam eò rariorem pilulam è totius conuolutam, compressam, atque oblongam. Super folijs verò tergo adhaerentem pilulam fert candidam, aquosam, dum tenera est: hæc etiam interdum muscas intrus continet, veniensq; ad incrementum iustum in modum leuissimæ paruulæ gallicæ indurescit. Fungos omitto, qui è radicibus, & iuxta radices erumpunt: communes enim eos cum cæteris habet arboribus. Quintetiam viscum taceo, quippe cum in alijs quoq; proveniat. Sed nihilominus (vt dictum est) ferax hæc arbor habetur plurimarum. hæcenus Theophrastus. Cæterum non dubitandum est, quin omnes ii partus suos habeant vsus, suisq; polleant viribus. Scillaritia aqua, quæ in balnei calentis aquæ vitreo organo à renellis quercus folijs primo ipsarum exortu decerptis elicitur, iocineris defuxiones sistit, renum calculos comminuit, & mulierum alba profluuiā cohibet. Ad hæc eius echinata pilulæ siccæ, ac trite vin apprinè adstrictioriam possident: eaq; propter efficacissimum sunt remedio contra omnes alui fluxiones. In summa præstant, vbi suppressere sit opus. Fagus quoq; glandiferis arbori-

bus adnumeratur, tametsi fructus effigies glandibus prorius reclamer. Hic enim extima parte calyculo includitur rotundo, quadantenus echinato, hispido, ac scabro: interius verò triangulari forma nuclei sunt, qui tenui, & leui cute, castanearum modo, in atrum rubescens obteguntur. Horum sapor dulcis, & subastringens. Glires hoc pabulo maxime delectantur, ac pinguescunt. Quamobrem cum eius aduenit maturitas, innumeri capiuntur glires in Carniola, Sciria, & Carinthia syluis: quippe illi in locis incolae mane inspexeris, qui saccos gliribus plenos ferant vna tantum nocte captis. Delectantur fagi fructu etiam mures: siquidem è longinquis regionibus natura ducti gregatim sylvas ingrediuntur. Item & sciuris gratissimus est cibus, ac etiam turdis, merulis, alijsq; compluribus volatilibus. Quin & obfessos hostibus homines in oppido Chio ea tantum glande victitasse, Cornelius Alexander est auctor, donec se obsidione liberassent. Fagi folia esitata labiorum, gingiuarumq; vitis mirificè opulantur: tusa, illitaq; torpentia membra corroborent. Glandis fagineæ cinis renum calculis vtiliter illinitur. Ilex insuper arbor est in Italia notissima, spectatq; proceritatis, cortice in rufum nigricante. Materies eius densa admodum est, ac robusta, in atrum rubescens. Folijs laurinis, ac perpetuis viret: sed quæ externè candicent, stabraq; sint, internæ verò virefcant, leuesq; cernantur: quin & in toto ambitu adeò ferrata sunt, vt spinarum speciem præ se ferat. Glandes profert quernis minores, quæ & in reliquis minus præstant. Iligneus carbo Hetruscis in pretio est, non modò quod ignem diu foueat, sed etiam quod (vt aiunt) vapore

*Illicis conf  
derato.*

S V B I E.



caput minimè tenet. Hæc præter glandes, pilulas quasdam rubentes gignit, quæ trite cum aceto vulneribus recentibus, & cruentis oculis vtiliter imponuntur. In Illicis genere (vt memoriam prodidit Theophrastus libro 111. capite xvi. de plant. historia) est arbor illa, quam Arcades Smilacem vocant, illici similis ea autem non est

*Smilacem  
confidera  
tio.*

taxus, quæ etiam smilax dicitur, quoniam de taxo capite x. eiusdem libri differuit Theophrastus) folio tamen non aculeato, sed molliori, profundiorique, differentisq; pluribus distinguendum: nec materies, vt illa, solida, spissaq; sed soluta, molliorque in opere. Meminit huius Gal. lib. v 1. cap. 111. de comp. med.

*Fagi conf.  
deratio.*

med. secundum locos in columellæ remediis, sic inquit. His fortiora sunt myrti, ac baccharum eius decoctum, & ex acerbis cotoneis malis, & virgultorum tenerorum ilicis, arbuti, Cornarii quomodo fieri potest, quod smilax (taxum, vel eius speciem intelligit) que ab omnibus venenosa describitur, ponatur à Galeno inter gurgulionis remedia. In dubiis verò solutione nil aliud determinat, nisi quoddam non ubique (sic ipse putat) sit venenosa, ex eo genere sumi debeat, quæ lethali careat noxa. Sed si Cornarius Theophrastum sibi aliquin familiarem consuluisse, qui similacem quandam (vt paulo ante ostendimus) in arborem ilici similem refert, rectius, meo quidem iudicio, & paucioribus rem hanc explicasset. *Suberis cōsideratio.* **S**UBER denique arbor est fructu, & folio ilicis, perpetua similiter coma virens, quamquam id negat Theophrastus, sed crassissimo cortice vestitur, atque ilici magnitudine cedit, vt ii quidem attestari possunt, qui Baccano Romam profecti sunt: eo enim in itinere innumeræ Suberum plantæ visuntur. Hæc cortice exuta minime arefcit, quemadmodum reliquæ arbores: quandoquidem natura haud ignara, quod sepius cortice expolianda esset, materiem duplici cortice munit. Inter plures, ac varios corticis suberei vsus, qui in rebus domesticis celebrantur, ille præcipuus est, & vulgaris, quod futoribus maxime sit expetita ad crepidas conficiendas. Quin & globis ex ea factis vtuntur piscatores, quod ea nunquam aquis mergatur, sed supernatet sustinendis retibus, plumbeis glandibus in altum ductis. Ideoq; Plinius lib. x v l. cap. v l l. scriptum sic reliquit. Suberi minima arbor, glans pessima, rarique cortex tantum præcrassus, ac renascens, atq; etiam in denos pedes vndique explanatus. Vfus eius anchoralis maxime nauium, piscantiumque tragulis, & cadorum obturamentis: præterea in hiberno ferminarum calceatu. quamobrem non infacere Græci mulieres cortices arborum appellant. Sunt qui Suberem ferminam ilicem vocent, atque vbi non nascitur ilex, pro ea subere vtuntur, in carpentariis præcipue fabricis, vt circa Elin, & Lacedæmonem. Nec in Italia tota nascitur, nec in Gallia omnino. Et eodem libro, cap. x l. inquit. Eius materies tardissimè vetustatem sentit, sicut robur, larix, castanea, iuglans, hæc Plinius. Est & alia arbor glandifera, quam, quod folia ferat glubris, corticem verò, & ligni materiem cerro non absimilem, Hæturia vulgò appellat Cerrofuguro, quasi Cerri suberem dicas. Id quod etiam fecisse videtur antiquitas: quandoquidem Theophrasto loco superius citato ea Phello-drys dicitur. Suberis cortex tritus ex aqua calida potus sanguinem fluentē ex vtralibet parte sistit. Eiusdem cinis ex vino calido sanguinem excreantibus magnopere laudatur. Gale-  
no tam quercus, quam quarundam aliarum

glandiferarum arborum medicina commemo- rantur libro v l. simplicium medicamentorum, his verbis. Quercus partes omnes adstringen- tis qualitatibus participes sunt, Sed plus tamen habet, quæ in trunci cortice membrana subest, tum quæ sub glaudis ipsius calyculo, ea videlicet, quæ fructus carni conuulcit. Quamobrem ad profluuium muliebre, & sanguinis expul- siones, tum dysenterias, & diurnos ventris fluxus commodam esse credunt. Maxime verò ea vtuntur decocta. Venerunt tamen adstringunt, fagus, & ilex, seu quis eas species esse roboris velit, seu toto genere diuersas. Quia & folia harum plantarum tenella illita non in- strenuè desecare valent, minus autem quæ sunt alterius roboris, nimirum quanto minus fortita sunt adstrictionis. Siquidem ego quandoq; glutinasse me vulnus memini falce infictum, cum nulum adesset ad manum medicamen præter ipsius quercus folia: triui ea in læui pe- tra, & vulnus, omnemq; vicinum locum con- texi. Eandem vim foliis habet & fructus robo- ris, eoq; medici nonnulli ad incipientes, & crescentes vtuntur phlegmonas. nam quæ iam ve- hementes sunt, adstringencia respuunt. Sed ta- lia ad curandi potius rationem, quam præsen- tem tractatum attinent. Cæterum in præsen- tia nouisse, quod eatenus adstringentem, quan- tens distum esse, facultatem quercus obtineat, sufficit: ac proinde desiccandi, atque adstringendi: excalfaciendi autem paulò infra me- dia, in genere scilicet eorū, quæ (vt sic dicam) tepida sunt. Arbor, quæ *Asis* Græcis, *Quercus* Latinis appellatur: Chuliot, Hullet, aut Beluth, Arabibus: Quercia, Italis: Eych- baum, Germanis: Robre, Hispanis: Chêne, Gallis. Quæ verò *pyris* Græcè, Fagus Latine dicitur: Arabiè, Chinaos, aut Chiachas: Italiè, Faggio: Germanice, Buchbaum: His- panicè, Haja: Gallicè, Fau. Quæ denique Græca voce *aphos*, Latina Ilex nominatur: Arabica, Barbes, siue Carwas: Italica, Elice: Hispanica, Anzina, & Anzinheira: Gallica Yeuse.

C A S T A N E A E.  
CAP. CXXII.

**S**ARDANAEAE glandes, quas ali- qui Castaneas, aut Iopima, aut glandes Iouis appellant, adstringunt & ipsæ, similesque effectus præbent: præsertim tunica, quæ carnem, & corticem me- dia intercurfat. Caro his, qui epheme- rum biberunt, conueniens est.

C A S T A N E A E nuces sunt in tota *Cast.* Italia vulgò notissimæ: item & earum arbo- rum res haudquaquam incognitæ. Antiqui casta-  
nearum

Cornarii  
lappine.

Suberis cō  
sideratio.

10

20

30

40

50

Phell-  
dry.

Glandife-  
rum ar-  
boris  
ex Galeno.





Cornarij  
opinio re-  
probata.

habentur. Cæterum neque in hoc Cornario adhibendum esse iudico, quòd suis in Gale-  
num commentariis tam primo, quàm sexto li-  
bro de compositione medicamentorum secun-  
dum locos, acriter contendat, nil aliud ompha-  
cidem gallam esse Dioscoridi, & Galeno, quàm  
calycem illum, quò glands in arboribus con-  
tinentur. Hoc tantum argumento ductus, quòd  
Paulus capite de dysenteria in quodam clysteri  
scribat: *ἐμπανίδος κικανίου καὶ τριῶν δὲ τῶν κελύφων*,  
*ἢ ὅτι ἐμπανίδος ἢ τῆς ἀπὸ τοῦ βάλαντος*, & *ἢ τῶν ἐκ τοῦ βάλαντος*.  
*κικανίου*. id est: omphacidis vltæ. est autem cauum  
illud, ex quo glans quercina enascitur, quò co-  
riorii vtuntur. Vbi ipse non omphacidos, sed  
omphacitidos putat legendum, vulgatar lectio  
nem immutans. Ex qua postea non aliud om-  
phacitidem gallam (vt diximus) esse existi-  
mat, quàm cauum illud, in quo glands inserun-  
tur, quòd recentiores cupulam vocant. statuit  
que nūquam à sua opinione recedere, nisi quis  
planè corruptum apud Paulum locum docue-  
rit, aut *ἐμπανίδα* ab eo substantiue pro eo, quòd  
calycem Plinius dixit, & vulgò cupula glands  
vocatur, dictum ostendat. Sed equidem non  
possum non admirari, quòd is, quem alioquin  
suorum scriptorum testimonio, acutissimi inge-  
nii, sanissimique iudicii virum semper exi-  
stimaui, in re tam, meo iudicio, clara, tam facili  
aberrauerit. Nam si Paulus non putasset, quòd  
*ἐμπανίς* Græcum vocabulum ob sui raritatem  
permultis fuisse obscurum, quemadmodum  
& Cornario fuisse videtur, ei certè non fuisset  
opus per circumlocutionem illud declarare, vt  
fecit, cum inquit. Est autè *ἐμπανίς* cauum illud,  
ex quo glans quercina enascitur, quò coriarii vtun-  
tur. Quod præterea Paulus pro omphacitide  
galla glandium calycem non accepit, illud ma-  
nifesto argumento esse potest, quòd ipse libro  
septimo de gallis, non autem de glandibus dis-  
serat, duòque gallarum genera constituit, qua-  
rum alteram omphacitidem appellat, alteram  
verò magnam, flauo colore, viribusque inferio-  
rem esse scribit. Quod etiam antea Dioscori-  
des, & Galenus fecere, qui omphacitidem gal-  
lam glandium calycem esse nūquam, quòd  
sciam, tradidere: quòd non ignorauerint (vt  
Cornarius ignorasse videtur) & genere, & spe-  
cie à gallis differre glands. Adde, quòd Gale-  
nus, Dioscorides, & Paulus nūquam, quòd  
equidem legerim, vbi sunt hoc vocabulo *ἐμπα-  
νίς* pro galla, nisi adiectiue, & cum suo substan-  
tuo *κικανίου*. Quare concludendo putauerim, in  
Paulo legendum esse, *ἐμπανίδος*, non *ἐμπανί-  
δος*, vt contendit Cornarius: quinetiam cre-  
diderim Græcis Glandium calycem *ἐμπανίδα*  
propriè appellari. Tameñ Cornarius, & An-  
drenacus, qui in Paulo vocem illam acerbam  
vnam interpretatur, Græcæ lingue peritissimi,  
hæc non cognouisse, neque animaduertisse de-  
prehendantur. Illud peculiari sibi maiores gal-  
læ vendicare, vt quorannis aut annonæ fer-  
tilitatem, aut sterilitatem, aut pestilentem au-

Gallarum  
presagium.

rum prænunciant: nam si rumpantur integræ,  
& quæ perforatæ non sunt, aut muskam, aut  
araneum, aut vermiculum exponant. Si multa  
volat, futuri belli: si reptit vermiculus, annonæ  
penuriæ, si currit araneus, pestilentium morbo-  
rum præsagium est. Neque cuiquam mirum vi-  
deatur, quòd ex omnibus gallis ista exoriantur  
animalcula: etenim ego huius rei sæpius peri-  
culum feci, nullamque vnquam sum consecu-  
tus, prius non perforatam, quæ ex tribus ani-  
malibus vnum intra se non contineret: nam  
foramine conspecto facile indicium summi po-  
test, iam animal exiisse. Dicamus igitur licet,  
quercum & fructum, & animal gignere. Cuius  
rei hand ignari veteres illi patres, non sine cau-  
sa quercum dixerunt Ioui summo esse dicatam.

Gallarum  
vires ex  
Galeno.

Gallarum vires memorie prodidit Galenus li-  
bro 11. simp. medicamentorum, sic inquit.  
Galla, quæ omphacitis nuncupatur, admodum  
acerbum est medicamen, pleraque sui parte es-  
sentia terrene, & frigida: perquam desiccatur, &  
repercutit fluxiones: ad hæc constringit, con-  
trahitque partes laxas, ac languidas: omnibus-  
que fluxionum affectibus strenuè resistit. Est  
verò terri in desiccando, secundum autem in re-  
frigerando ordinis. Altera autem galla, flaua il-  
la, & magna, laxaque, & ipsa desiccatur quidem,  
sed tanto minus, quanto minus acerbæ quali-  
tatis est pariceps. Cocta itaque ipsa per se, ac  
deinde trita, cataplasma est non infrenum sed  
phlegmonarum, ac procidentiarum. Porro  
coquenda est, si modica opus sit adstrictione, in  
aqua: sin vehemētiore, in vino. Ac si sugere  
insuper adstrictionem sit opus, vino vtare au-  
steriore. Hanc rustici nostrates *inueniunt*, quasi  
vini gallam dicas, nominant. Deniq; gallæ com-  
bustæ sanguinis reprimendi facultatem acqui-  
runt, ac mirum etiam calorem, & acrimoniam  
ex visione assument: suntq; istæ, quæ ignem ex-  
pertæ non fuerint, tum subteliorum partium,  
tum maiore desiccadi potestate. Cæterum cum  
ad sanguinis suppressionem preparare eas vo-  
les, carbonibus impositas, dum vndeque  
candant, aceto, aut vino extinguere oportet.  
Quercus fructus *κικανίς* Græcè dicitur: Gal-  
la, Latine, pariter & Italicè: Hæf, aut Hafus,  
Arabice: Galloepffel, & Eychoepffel, Germa-  
nicè: Galha, & Bugalha, Hispanicè: Noix de  
galle, Gallicè.

Nomina.

† Hoc loco Græci codices habent *κικανίδα*.  
Qua voce constat, iudicio meo, Dioscoridem  
gallæ omphacitidis figuram designasse, cum  
prius magnitudinem expressisset. Attamen ex  
interpretibus Marcellum manifestè esse etiam  
ad magnitudinem retulit. Ruellius autem, cum  
eam tuberosam interpretetur, ipse quoque ma-  
gnitudinem innuisse videtur. Quocirca nobis  
sacius visum est, omphacitum rugosæ parti ar-  
ticulorum in digitis, cum extenduntur, similem  
reddere: quòd non solum id innuat Græcum  
vocabulum, sed multò etiam magis omphaci-  
tides ipse apertissime demonstrent.

R H V S. CAP. CXXIII.



R H V S, quæ obsoniis aspergitur, ab aliquibus erythros appellata, semen est coriarij fruticis, sic vocati, quoniã coriorum infectores eo vruntur ad inspissandas pelles. Arbuscula est in petris na-

fcens binum ferè cubitorum altitudine: foliis oblongis, subrubentibus, in ambitu serratis † ilicis modo: acino vuarum gracilium, denso, magnitudine terebinthi, quadantenus lato: cuius corticosa tunica perquã utilis est. Folia vim habent adstringendi, & acaciæ effectus præbent. Decoctum capillos denigrat: dysentericis infunditur, & in potus eorum, infususque adicitur: instillatur auribus purulētis gangranas, & pterygia cohibent folia ex aceto, aut melle illita. Liquamentum fit ex aridis foliis, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem, vt lycium, conueniens. Semen eisdem effectus exhibet: cœliacorum, dysentericorumque obsoniis inspergitur: fracta, desquamata, liquidæque illitæ ex aqua, ab inflammatione vindicat: linguæ asperitates cum melle abstergit: candida fœminarum profluvia sistit: hæmorrhoidas sanat, cum querno carbone intrito admotum. Aqua, in qua semen maduit, decocta cogitur, coitq; efficacior quodammodo ipso semine. Gummi defert, quod dentium canis imprimitur, ad dolores finiendos.

*Rhois com siliatris.* R H V S Græcorum, cui (vt scribit Plinius libro x x i i i . cap. x i .) Latinis non est inditum nomen, Sumach officinis vulgò vocatur, vocabulo nimirum à Mauritanis accepto, vt in aliis quam plurimis ab illis fieri solet. Hac

in condimentis pro fæle vcebantur antiqui: idcirco Dioscoridi in ipsius capitis fronte, Rhus dicitur, quæ obsoniis aspergitur. Cuius vsus, vt audio, & apud Syros, & apud Aegyptios in hunc vsque diem perdurat, vbi rhus prouenit præstantior. Nasctur & in Italia Apennino monte pluribus in locis, iis omnibus planè notis, quæ illi à Dioscoride tribuuntur. Huius aridis foliis hircorū, caprarumq; pelles illæ suspiciantur, crispantur, concinnanturq; quas vulgò Somachi nuncupant. Caterum illud non videtur prætereundum, quod etsi Galenus tum alibi, tum præcipuè lib. v i . de compositione medicamentorū secundum locos, plura Rhois nomina, & genera explicasse videatur, vt qui id modò Syriacum appellet, modò Ponticum, modò obsoniorum, modò coriariū, modò rubrum, non tamen propterea censendum est, Rhois arbores inter se genere, vel specie differre. Quandoquidē nobis constat, vnum tantum genus Dioscoridi hoc loco descripiū esse, quemadmodum & Galeno lib. v i i i . simpl. med. Atqui hac in re scire cōuenit, quòd Rhus obsoniorum nil aliud est, quàm semen: coriariorum verò nil aliud, quàm folia, & fruticis ramusculi. Nostræ enim sententiæ subscribit Dioscorides, qui scriptū reliquit. Rhus semen est exiguæ plantæ, qua coriari ad inspissandas pelles vruntur. Quod etiam Galenus confirmat loco citato. Rhus verò rubens nil aliud esse comperitur, quàm eius semen immaturum, cui maior adstringendi vis inest, quàm maturi, cuius acini quadantenus nigricant. Syriacæ præterea, atque Ponticæ rhus, etsi in aliis nascatur regionibus, à quibus nomen inuenit, nihil tamen genere distat ab Italica, atq; Iberica nisi illa magis, hæc verò minus viribus præstet. Ideoq; Monachos illos, qui in Mesuem commentarios edidere, longè hallucinari crediderim: nempe qui sibi persuaserint, Rhoem Ponticam alterius esse generis ab ea, cuius exitit vsus apud antiquos in obsoniis. Qua in re & Plinius deceptus esse videtur, eūdem de coriario particulariter scripserit, ipsumq; diuiserit ab eo, quo in ciborū condimentis antiquitus vcebantur. Fuchsius verò medicus singularis etuditionis, non contentus duobus Rhois generibus Plinii imitatione, tertiu adiuuenit. Etenim is in libro de componendis medicamentis, què secundo loco edidit, Rhoem Syriacū non solum differre scribit ab eo, qui tum culinis, tum coriariis expetitur, sed peculiarè quidem Syriacæ arbusculæ succum esse censet, quòd Galenus lib. v i . de compositione medicamentorum secundum locos succum rhois Syriaci in quoddam medicamentum addat. Sed errat Fuchsius in hoc, mea quidem sententia. quandoquidem non video, quomodo ex mentione succi rhois Syriaci à Galeno facta, colligi possit, rhoem Syriacum esse genus separatum: nem ego potius adducere vt credam, ita eum cognominat

*Monacho. rhus error.*

*Fuchsius. Rhosia. Rhosia.*

minatū fuisse à Galeno, quòd apud. Syros celi & soli illius temperie proueniat cæteris præstantior. Et quanuis Theophrasto libro 111. cap. x v 111. Rhus duplex reddatur, mas scilicet, & femina, quòd alia sterilis, alia fructifera sit, non tamen ob hoc posteritatis memorie prodidit, quòd altera cibis, altera coriis nasceretur, sed ambas ad coria inficienda destinauit: quòd coriarii folia, & ramulos tantum accipiant, non autem semen. Rhoë, quæ in Cornelio Celsò ro Syriacus deprauatè legitur, Mannâ, quæ ex Syria nobis aduehitur, esse putauit Petrus Crinitus Florētus capite septimo libri vltimi de honesta disciplina, falsus vocum similitudine, quòd ros, quæ dictio rhus Græcè legenda est in Celsò, æris rorem significare crediderit: etenim manna ros quidā est. Veruntamen eius sententiam acriter explosit Manardus Ferrariensis libro epistolarum suarum primo. Theodorus in Theophrasto, Rhois vocabulum fluidam interpretatur, quòd nomen Græci ctyumum securus sibi Latine finxit: quippe (vt Plinius est auctor) rhus Latium nomen non habet. Id quòd mihi errandi præbuit anam, cum iandudum pro certo existimauerim, fluidam Theophrasto eam arbutusculam esse, quæ vulgo Lantana vocatur, è cuius radicibus viscum quidam faciunt. Verum cum accuratius Græcum Theophrasti codicem

VIBURNUM.



perlegissem, Theodoriq; nouū vocabulum non sine bile examinasse, erroris mei causam facile deprehendi. Quo factū est, vt iam fateri liceat, fluidam Theodori nil aliud Theophrasto designare, quàm Rhoë, & ob id Lantana sic à vulgaribus vocatam, vt prius credideram, non esse. Quæ tamen (vt mea fert opinio)

potius VIBURNUM imitatur, quòd maxime lenta, obsequiosa, flexuq; sinuata sit. Tale enim esse viburnum Virgilius in Bucolicis cecinit hoc carmine.

Quantū lenta solent inter viburna cupressi. Exit hæc ramulis digitali crassitudine, bicubitalibus, foliis vineis, incanis, & pilosioribus, quæ paribus internodijs aduersis pediculis coniugatis adhærent, per ambitum tenuissimè ferrata. Florem edit album, vmbellæ modo coherentem: à quo acini prodeunt lentium modo pressi, qui primo statim exortu virides, deinde rubri, demum verò nigri spectantur:

radice per summa cespitum vagante. Hanc Ruellius rhoëm existimat, cum tamē alia Dioscoridi, & Galeno rhus sit planta, Hetruscis notissima, quòd plurima oriatur eo Apennini tractu, qui Hetruriam respicit. De Rhoë hæc, quæ sequuntur, nobis scripta reliquit Galenus libro v 111. simplicium medicamentorum, sic inquit. Rhus fruticosa planta adstringit, desiccet. Nam & coriarii ad desiccandam, & adstringendum pelles planta vtuntur: ac proinde *βυρσκήλη*, hoc est, excoriaria appellata est. Porro medicis in vsu sunt in primis fructus eius, & succus multum austeræ qualitatis. Consentaneus est vsus particularis ipsi gustui sensui. Fuerit itaque & hoc medicamen ex tertio ordine exiccantium, ex secundo verò refrigerantium. *Plur* vt Græcis, ita etiam Latinis Rhus nominatur: Sumach, Adurion, Rosbar salsilicos, seu Rosidicis, Arabibus: Rhu, & Somacho, Italis: Sumach, & Sumagre, Hispanis.

† In vulgaris Græcis codicibus hic legitur *ωρενδύρε*. Hoc est, illicis modo. Hæc dictio quæ ratione ab interpretibus Ruellio, & Marcello omissa fuerit, certè nescio. Sed mihi quidem visa est non omittenda, quòd non modò eam quoque Oribasius legat, sed quòd etiam Rhus folijs pulchrè Illicem amuletur.

PALMA. CAP. CXXV.



PALMA in Aegypto gignitur. Ea medio inaturitatis vigore, autumno decerpi solet, Arabici myrobalani similis, pomaris cognomine, colore viridi, & odore mali cotonei: quòd si ad maturitatem

peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet. Palma acerbata est, & adstringens: contra alui, seminarumq; profluvia, in vino austero bibitur: hæmorrhoidas sistit: vulnera glutinat illiti. Phœnicobalani recentes plus siccis adstringunt: capitis dolorem afferunt: copiosiores in cibo inebriant. Sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis, & dysente

Petri Crinitus la-  
psum.

Rhois Si-  
res ex Ga-  
leno.

Nomina.

Viburnum.

dyſentericis vtilis in cibo: illinuntur cum cotoneo, & cerato cenanthino veficæ vitii. Caryotæ præſertim eſu, faucium aſperitatem medentur. Thebaicarum decoctum potu aſtuationem ſedat: vires recreat cum hydromelite veteri ſumptum: cibo idem faciunt. Fit ex eis vinum ad eadem conueniens. Decoctum per ſe potu, & gargarizatione magnopere adſtringit, & cohibet. Nuclei palmarum, cæterorum more, cremati in crudo ſictili, & vino reſtincti, cinere loto, ſpodij vicem efficiunt, miſcenturque in calliblephara. quod ſi non iuſtâ viſtionem acceperint, denuo cremandi. Vim adſtringendi habent, & ſpiracula cutis obductu ſuo claudunt: contra oculorum vnam, & puſtulas, palpebrarum deſluuia, cum nardo effectum præbent: corporis excreſcentias cum vino reprimunt: vlcera ad cicatricem perducut. Sed inter primas vtilis ex palmis humilibus Aegyptiæ.

## PALMA ELATE .CAP. CXXVI.

PALMA, quam aliqui elaten, aut ſpathan appellat, fructus palmarum adhuc ſtudentium inuolucrum eſt, calyxque: quo in ſpifamenta vnguentarij vtuntur. Optima habetur odorata, adſtringens, ponderoſa, præcluſa, intus pinguis. Viſ ei adſtrictoria: ſiſtit vlcera, quæ depaſcunt: laxatos artus comititur: trita miſcetur cataplaſmatis, & malagmati: prodeſt præcordiis, imbecilli ſtomacho, & iocineri affecto, miſta conferentibus cataplaſmatis. Eius decoctum ſubinde deterſum, capillos denigrat: datur bibendum congruè renum, veficæ, & viſcerum vitii: vuluæ, ac ventris fluxiones ſiſtit: ſcabiem cum reſina, & cera ſanatur, ſi viginti diebus recens apponatur. Inuolutuſque in ea elate fructus, quem ſuo amplexu fouet, elate etiam vocari ſolet, & ab aliquibus boraffus. Adſtringit, & ſpathæ effectus præſtat, non ſic vnguentis expetit. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta, eadem facit, quæ boraffus.

TAM ET SI in compluribus Italia ciuitatibus, nempe in hortis, viridariis, & monachorum clauſtris diſtis, reperiantur Palma inſigni magnitudine, ac ſpecioſi proceritate, cum tamen climatis noſtri temperies earum naturis inclementior ſit, fructum nobis non proferunt, ſed ſteriles conſeſcunt. In Hiſpania tamen maricimis quibuſdam locis fructum edunt, verum immitem, & qui nunquam matureſcat. Que in Creta proueniunt, fructum ſanè percoquant, ſed magis admodum Cypriæ. Principem locum tenent, & palmas omnium præſtantiffimas ferunt, quæ in Iudæa proueniunt, & inter has maxime (vt inquit Galenus) quæ in Hiericente naſcuntur. Venetiæ palmarum fructus, qui nonnullis palmulæ, aliquibus cærioræ, quibuſdam vero daſyli dicuntur, ex Syria, & Alexandria Aegypti aduehuntur, ac etiam ex Neapoli illuc prius ex Numidia importati. Ex recentibus ab arbore ſtatim decerpis, quibus Italia caret, vinum fieri auctor eſt Plin. libro x i i i i. capite x v i. quo Parthi, & Indi vtuntur, ac cæteri, qui orientalem plagam incolunt. Et vt idem reſert libro x i i i. capite i i i i. Palmæ ſemina fructum non proferunt, niſi prope marem conſerantur: quo exciſo, aut excicato, viduæ poſtea ſterileſcunt. Nec tamen ob id putandum, quod mares fructum non ferant. Quandoquidem ſcribit Theophrastus libro i i. capite v i i i. de hiſtoria plantarum, quod ex fruſtiferis (plures enim ſunt, quæ fructum non ferunt) tam mares, quam ſemina fructus edunt. Quorum plures ſunt differentię, quoniam alii ſine offe, alii duro ſunt, alii molli proueniunt. Colore quoque inter ſe differant: alii enim candidi, alii nigri, alii flauii ad ſummum non pauciores, quam ſcorum colores, neque abſolutè pauciora genera ſtatuant. Ad hæc diſſerre magnitudine, ſiſtæque volunt: quosdam enim rotundos eſſe, & modum malorum: magnitudinemque tantos, vt quatuor tantum in ſpicam teneantur, alios minores eſſe, eorum magnitudine. Saporibus item plurimum diſſerre inquirunt, ſed optimum tam inter nigros, quam inter cædidos, genus, quod regium vocant, cum magnitudine, tum virtute, ſed rarum id eſſe. Quædam non ſi uſu modo, verum & arbore ipſa, longitudine, formaque reliqua diſtant: non enim magnæ, exceſſæque, ſed breues ſecundiores, quam cætera, trimæ proſinus fruſtificantes. Tales etiam in Cyprio, in Syria quoque, Aegyptoque palmæ proueniunt, quæ quadrimæ, aut vt plurimum quinqueennes fruſtificant, hominis altitudine aſſurgentes. Genus aliud eſt in Cyprio, quod & folium amplius habet, & fructu multo ampliorem diſcrimineſ: peculiari diſcretum, magnitudine mali punici, figura oblongum: non tamen ſpiffum, tanquam cætera, ſed radicebus ſimile, vt nõ deuoretur, ſed ſucco tantum expreſſo expuatur. hæc de palmis hiſtoria ex Theophrasto.

us sapla  
ca historia  
& brevis

Sunt præterea, qui palmarum generi adscribant plantam in Aegypto, Cyproque nascentem, quam Veneri inde redeuntibus *M V S A M* appellant, & Musas similiter fructus. Adolefcit hæc (vt referunt) ad quoniam, semine cubitorum proceritatem è folionibus alterius sita: folio est arundineo, quod tamen perquam longo, latèque ambitu se diffundit, adeò vt in longum triu cubitorum mensuram quandoque excedat, in latum verò sesquicubitum spatietur, lata, crassaque per medium excurrente costa. Torrescunt folia æstate sui natura, vel etiam fortasse solis ardore, adeò vt mense septembri eorum costæ prorsus nudæ cernantur, decedente foliorum materia, quod admodum sit tenuis. Caulis squaroso foliorum cortice vestitur, palmæ, vel arundinis modo. Ramos habet nullos, sed caudice tantum consistit. E vertice germen emergit materie molli, longitudine ferè cubitali, à quo alia ab origine, ad summum prodeunt germina ternum, quaternumve digitorum inuicem distantia: è quibus circumeminent fructus, parui cucumeris magnitudine, qui per maturitatem quadantenus flauescunt, cortice fici, qui eodem modo digitis detrahuntur. Substantia pulpæ confistit melopeponum modo, quod intus osse, neque semine. Primum gustantibus fructus insipiditatem quandam præ se ferre videntur, adeò vt primo statim gustu non placeant, verum qui esu assuescunt, iis indies magis delectantur: quippe qui quadam occulta saporis suauitate allecti, quæ nisi tractu temporis cum palato init gratiam, nunquam saturari videantur. Ita Musam mihi describere qui ex Aegypto, & Cypro ad nos reuertuntur. Sed quænam antiquis Musa fuerit planta, quid referam non habeo. Inclinat tamen animus eam esse, quæ Theophrasto in palmarum genere recensetur: quam idem in Cypro nasci tradidit, folio cæteris ampliori, & fructu longè maiore, magnitudinem mali punci, & figura oblongo, Musæ ex Arabibus Serapionem inuenio mentionem fecisse inter simplicia, vbi de eius viribus in hunc sensum dixerit. Musa exalfacit in medio primi abcessus, humectat autem in eius fine, paucum præbet alimentum. Priuatim prodest thoracis, pulmonis, ac vesicæ ardoribus. aluum emollit. Verum liberalior eius vsus stomacho aduersatur, ac iecur obstruit. Quamobrem si quis, cum frigidi sit temperamenti, ea copiosius vescatur, subinde aquam musam, oxymel, aut gingiber conditum sumat necesse est. Fortum in vtero alie, renibus optulatur, vrinam ciet, & veneris stimulat. hætenus Serapio. Palmas plurimas gignit maritima nostra in vallis Almæ campistris, sed pumilas, & quæ cubitalem mensuram nunquam excedat. Paulò his maiores & illæ habentur, quæ ex Sicilia Neapolim inuehuntur, quas vulgò, vocabulo ab Arabicis accepto, Cefaghioti appellant, de quibus supra in Bdellii commentario abunde diximus. Palmæ genus India profert (vt Iosephi Indi nauigatio-

nes perhibent) è cuius truncis, excisis confusè ramis mense augusto, distillat liquor, quem incolæ vasis excipiunt, ebibuntque suauiter vini vice: veruntamen nisi excoquatur, post triduum in acetum aceri immò desiccat. Eaque propter illud decoquunt, vt nos destrutum, siquæ hoc modo, velut mel suauissimum, quod postmodum ex aqua resoluunt, & diebus viginti artificio quodam percolant, donec optimè sit defecatum, atque pellucidum: quo artificio iucundissimus redditur potus, diuque perennat. Porro Palmulæ, quas Dioscorides Thebaicas vocat, quantum ex pluribus auctoribus comperi, adeò tractu temporis insolatæ siccescunt, vt molitæ cogantur in panem. Est & aliud ab his palmarum genus, quod officinæ Mauritianos secute *TAMARINDOS* appellant, Græci verò à saporis acrimonia oxyphœnicæ, siquidem Mauritaniam per Tamar daclylos significant: quare Tamarindorum vocabulo idem intelligunt, quod nostri palmulas Indicas. Indici igitur daclyli producantur (vt inquit Serapio) à quibusdam plantis, quæ foliis longis, acuminatisque, filiginis similibus virent: licet à nonnullis existimetur Tamarindi fructus ægrestium palmarum. Sed equidem malim adimplurique Serapioni, quam illis, præterim cum non constet è veteribus, qui de Tamarindis quicquam memoriz prodiderit. Ex his, qui ad nos importantur, nulli, vel pauci admodum integri reperiuntur. Nam plerunque contriti, & in massam quandam compacti deferuntur, quam si disceris, flauos nucleos inuenies, variis formas referentes. Præstant, qui in obscuro rubescunt, molles, recenteq; & qui nervosis quibusdam villis fæcti inueniuntur. Adulterantur ab impostoribus prunis, sed deprædèditur fraus tum colore, tum etiam gustu: quippe nec admodum sunt acidi, nec tam saturato colore nigricant. Refrigerant, ac desiccant (vt scribit Mesues) ordine secundo, tamen si Auerro tertio adscribantur. Aluum ciet, quapropter poti bilem facillè soluunt: item & præstatiatos humores leniunt, & insaniam, & furorem muelcent. Dantur obstruictis, aqua intercutè affectis, à quatuor, & lientosis viliter. Faciunt & ad scabiem, lepras, vitilignes, & lichenas: quin & contra omnes cutaneas exulcerationes, quæ à sanguine præstato emerfere. Officiunt tamen frigidum ventriculi habentibus: sed noxa tollitur, admissis macti, mattheæ, cassia, aut Indica nardo. Aegremunus obcuti sunt, sed roborantur, si admixto caprino sero, aut fumariz, aut lupi salictarii succo bibantur. In summa palma: uariæ, ac diuersa sunt genera. Quare curiosum remitteamus ad Theophrastum loco superius citato, & ad Plinium libro xiii. cap. iiii. vbi de his latissimè scripsit. Cæterum quid in palma illud sit, quod aliqui elaten, aliqui spatham vocant, manifestè declarat Dioscorides, cum inquit. Palma, quam aliqui elaten, alii spatham appellant, fructum palmarum adhuc florent

Tamarindorum considerat.

Tamarindorum Si res.

Palmacea

florentium inuolutum est. Cui adspolatur Theophrastus loco iam citato, vbi ita scribit. Fructiferarum alia mascula, alia foemina. Interest autem, quod mas primum super spathan floret: foemina fructum oblongum illico praeflat. Sed elatæ, siue spathæ Galeno duo videntur esse genera libro *V I I I*. simplicium medicamentorum, alterum quod tenerum sit palmæ germen, alterum quod eius sit tegumentum. Primum verò genus fortasse illud erit, quod in interiore parte inuolueri gignitur, antequam flores prodeant. Id, Dioscoridis testimonio, ab aliquibus Borassus appellatur: atque etiam Elatæ dici solet. Verum hac in re maximè cæcuisse Plinium illud apertissimè ostendit, quod ipse libro. *x i i*. cap. vltimo scriptum reliquit, sic inquitens. Est præterea arbor ad eadem vnguentâ pertinens, quam alii elaten vocant, quod nos abietem, alii palmam, alii sathan. Quibus palam est, Plinium palmæ adhuc florentis fructus inuolutum cum abiete arbore confudisse, vocabulorum propinquitate deceptum: Græcis enim *δάρε* Latinis abietem significat. Quinetiam eundem putasse elaten palmam arborem esse, cum tamen vel germen palmæ tantum, vel florum sit inuolutum. Nec minus inter recetiores hallucinari deprehenditur Adamus Lonicerus Germanus, qui spatham in palma nil aliud esse censet, quam folia, quod eniformia videantur.

De Palmarum viribus pertractans Galenus lib. *30* *V I I I*. simplicium medicamentorum ita scriptum reliquit. Phœnix arbor adstrictoriæ facultatis omnibus sui partibus est particeps. Igitur ramorum succus austerus est, ex aequa substantia tepida, & terræ frigida constans. Similis naturæ est encephalos, quem vocant, hoc est cerebrum, siue medulla, etiam aptus. At fructus eius, & maximè dulcis, non paucam obinet caliditatem. Ceterum cum edendo sit, multo est vsui, non tantum foris impositus, vbi quid roborare, & desiccare, contrahere, siquæ, densareque consilium est, sed & tanquam cibis sumptus & simul cum aliis, & per se. Porro quod elaten vocant, nempe tenerum illud palmæ germen, eandem cum cerebro eius facultatem possidet. Quod verò velut tegumentum eius est, adstringentem & ipsum qualitatem habet: verum plus quam dicta omnia exiecat, vrpote quod & essentia consentientia illis siccat, & minimè particeps est humiditatis. Itaque iure videntur illo ad vlcærum putrescentia, miscensque medicamentis articulos plus iusto laxatos contrahentibus: ad hæc facularibus hepaticis, & stomachicis, seu intro sumantur, seu foris admoveantur. Sed & radix plantæ desiccatorie citra morsum facultatis est, adiunctum habens & ipsa adstrictionis quippiam. Et de Palmarum fructu differens libro secundo de alimentorum facultatibus, sic inquit. Est autem non parua in Palmulis differentia: alie namque sicca sunt, & adstringentes,

vt Aegyptia: alie molles, & humida, & dulces, vt quæ caryotæ appellantur. Hæ autem præstantissima in Syria Palaestina nascuntur in Hierichunte: reliquæ omnes palmarum inter dicta duo genera mediæ censentur. Verum concocti difficles sunt, capitique dolor inservant: quarum alie quidem magis, alie minus sunt humida: ac dulces, sicque atque adstringentes. Sed constitutis extremis, iam omne quod in medio est, facillime deprehendes. Nulla ergo ex ipsis est, quæ non dulcedinem quandam, & adstrictionem habeat. Siquidem caryotæ leuiscule adstringunt, & Thebaicis obscura quædam inest dulcedo. At succum quidem dulcem nutrire, austera autem gratum esse stomacho, & alium sistere ostendimus. Omnes autem palmarum, si largius sumantur, concocti sunt difficles, & capiti dolorem adferunt. Quædam etiam morbus cuiusdam sensum ori ventriculi, quod medici stomachum vocant, inducunt. Succus autem ex iis in corpus distributus, crassus quidem omnino est, cum quodam etiam lentore, vbi pingues fuerint palmarum, vt caryotæ. Cum autem huic succo dulcedo etiam misa fuerit, celerrimè quidem hepar ab eo obstruitur: læditur autem maximè ab ipso esu, quod & inflammatur, & scirrhus obseidatur. Post hepar autem & lien obstruitur, ac læditur. At multo sanè maximè virides palmarum ad omnia sunt noxiæ, si paulo largius sumantur. Perspicuum porro est, dulces quidem calidiores, adstringentes verò frigidiore succo præditas esse. Virides præterea palmarum inflationes pariunt, veluti & ficus: eadè namque palmarum viridum ad alias est proportio, quæ ficuum ad caricas. Ceterum in regionibus non admodum calidis, palmarum non perfecte maturescunt, adeo vt reponi queant. Quo fit, vt homines ipsis viridibus vesci coacti, erudis succis impleantur, rigoribusque, qui agrè calefiant, & hepatis obstructionibus prehendantur. Arbores quæ *φείνη* Græcis, Latinis Palma vocatur: Arabibus Machla, aut Nachal: Italis, Palma: Germanis, Dathelbas: Hispanis, Palmera: Gallis, Arbre de dattes. Huius autem arboris fructus, qui *δάρε* vocatur, quæ *φείνη* Græcis, Latinis Palmule & Dactyli dicitur: Arabibus, Tamar: Italis, Dattoli: Germanis, Dattilen: Hispanis, Tamaras, & Datiles: Gallis, Dattes.

MALVM PYNICVM.  
CAPYT CXVII.

MALVM PYNICVM omne boni succi est, stomacho vile, perexiguū sufficiens alimentum. Dulcia stomacho viliora habentur, sed aliquantulum in eo calore gignunt, inflationes pariunt, vnde in febris abdicantur. Acida adstringunt, æstuati stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt, ac urinā crient.

Plinij. &  
Loniceri  
hæc sunt.

Palmarum  
vires ex  
Galeno.

Palmula  
cum facie  
tas ex eo

Nomen.

MALVM PUNICVM.



ora, gingiuaf-  
que lædūt. Vi-  
nola verò me-  
diā fortiuntur  
naturam. Nuclei acinorum  
acidi punici in  
sole ficcati, &  
obsoniis in-  
sparsi, conco-  
ctiue, fluētē  
alum, stomachumq; sistūt:  
cœlesti aqua  
malescūt, bi-  
bunturq; commodē sanguinē excre-  
tibus: ad defessus dysentericorū, scēmi-  
narumq; fluxione vuluæ laborantium  
vtilēs sunt. Expressus nucleorū succus  
coquitur cū melle, ad oris, virilitatis, &  
sedis vlcera, nomas, reduuias, & ea, quæ  
in corpore extuberant, aurīū dolores,  
& narium vitia, præsertim acidorum.  
Huius flores cytini vocantur: qui ad-  
stringunt, siccant, cohibent. sanguino-  
lenta glutinant: quas puniciū, præstant  
vtilitates. humida gingiuarū vitia, mo-  
bilesq; dentes decocto colluuntur: her-  
niam prolapsu intestini erumpentem,  
cataplasmate repellunt. Memorīæ tradū-  
t, qui tres quā minimos cytinōs de-  
nouerit, nullam eo anno lippitudi-  
nem passurum. Eliquatur hypocistidis  
exemplo. Malicorium asperū est mali  
punici putamen, quod aliqui fidion ap-  
pellant. Id spissandi vim habet, & quos  
cytini, præbet vsus. Decoctum radices,  
potu latas ventris tinea pellit, & ras-  
dem euocat. Balauistiū syluestris puni-  
cæ flos est, cytino similis. Cuius cōplu-  
ra genera reperiuntur, candidum, ful-  
uum, colore rosaceo. Succus ex eo ex-  
primitur, hypocistidis modo: cui ad-  
strictoria vis inest, eadem faciens, quæ  
hypocistis, & cytinus.

PUNICA mala in pluribus Italiæ locis vul-  
gō, sicut etiā Latine Granata dicūtur, a multis  
intus cōclulis granis: quanquā non desunt, qui  
ita appellari velint à Granata Hispaniæ regio,

quòd inibi numerosa proueniāt. Sed quomo-  
docunque se res habeat, nusquam non cognita  
sunt in Italia: siquidem inibi & in hortis, & in  
vinetis, & in viridariis, eorum frequentissimæ  
visuntur arbores. Triplici (vt etiā scribit Dio-  
scorides) distinguūtur species: quippe quòd alia  
dulcia sint, alia acida, alia vinosa. Vinolenta ea  
sunt, quæ vulgō Vaiani vocat. Hetruria, quæq;  
alibi Schiaui, & alibi di mezo sapore Italico  
sermone appellantur. At Plinio lib. x i i i. c. 1.  
cap. x v i i. quinq; enumerantur species, dul-  
cia scilicet, acra, mista, acida, & vinosa. Verū  
hæc omnia Dioscorides in tria redegit fasti-  
gia: vt pote qui vni dulcia, alteri acra, & acida,  
tertio verò generi mista, & vinosa adscripserit.  
Hæc omnia Italia habet, & celebrat: sed & fru-  
ctus, & acinorum magnitudine, tum liquoris  
copia excellunt dulcia, & vinolenta. Acida mi-  
tescere, & dulcia fieri tradunt, si folio, aut hu-  
mano stercore foueantur arboris radices, & ve-  
tere vrina sapius irrigentur. Cæterum ne fru-  
ctus in arbore dehiscant, remedium sunt lapides  
tres, cū seritur arbor, ad radices collocati:  
quin etsi iam confita sit, & fructum ferat, eadē  
ratione emendatur. Sed & hoc item præ-  
stabitur, si stilla secundum radices confertur.  
Si florem arbor non continet, vrinam veterem  
cum pari aquæ mensura temperare, & ter per  
annum radicibus infundere, efficacissimum est  
remedium. Eundem præstabis effectum, si ar-  
boris florentis truncum plumbeo conculseris,  
circulo, vel anguis corio inuolueris. Seruan-  
tur punica mala incorrupta anno toto, si cū  
ferē matura fuerint, petioli, quibus pendent,  
intorqueantur in arbore: vel si postquā de-  
cerpta fuerint, argilla ex aqua resoluta vadiq;  
oblinantur, ac deinde pluribus diebus infon-  
dentur. Sunt & qui, vt diu integra perennēt, ea  
in feruentem aquam immergant, statimq; exi-  
mant, & sic siccanda exponant, octo dierum  
spacio. Vini ex omnibus conficiendi ratio hæc  
est. Acini maturi diligenter à coriis, & mem-  
bris purgati prælo committuntur, ac exprimuntur:  
mox vinum facies ad id accommoda-  
tis percolatur, & in vasculis reponitur, quous-  
que fæx residat: defæcaturq; deinde, & clarum  
reponitur, affuso desuper oleo, ne corrumpatur,  
vel acetat. Sunt & qui sine oleo illud  
in cadis assentent, sed id per ætatem facile  
acetit. De flosculi nomine inter se discrepant  
austorum sententiæ. Dioscorides florem satiuæ  
punicæ cytinum appellat, balauistiū verò  
syluestris. Plinio libro x i i i. c. 1. cap. v i.  
primus tam satiuæ, quā syluestris partus flo-  
rere incipientis cytinus vocatur, balauistiū  
verò flos vtriusque in ipso erumpens cytinus.  
Laudatissimi satiuarum flores colore per quā  
rubro ex Creta, & Cypro hoc uoc Venetiæ  
importantur, aspectu quidem specioso, & vi-  
ribus cæteris præstantiores. Sed & mango-  
nio sunt in Italia peregrinis non dissimiles,  
non tamen vsque adeo præstantes. Immatura  
sunt pun

Cytinum,  
Balauistiū.  
Plinio.

*Malicorin* rus punici cortex ideo Malicorium antiquis dicebatur, quod eo, ut Rhu ad perficienda coria vterentur. Dulcia punica, quæ apytana alio nomine vocantur, ventriculo inutilia haberi, dentes gingivalesque lædere, auctor est Plinius, et si rectius forte id Dioscorides acidis attribuat. Fulus mali punici in olla noua operculo indito in furno tosti, potus fluentem aluum efficaciter sistit. Syluestres verò acinorum officuli viliiter bibuntur tristi ad aquam, quæ cutem subierit, sicandam. Cortice punici ex vino decocto, & imposito perniones sanantur. Punica, & myrtus, (si rei agrariæ auctoribus credimus) mutua consuetudine mirum in modum oblectantur, ita ut etiam reddantur fertiliores, si altera in alteram inferatur. Malorum punicorū vires prodidit Galenus libro v 111. simp. med. sic inquit. Malum granatum omne adstringentem qualitatem obtinet, non tamen in omnibus ea exuperat. Sunt enim inter ea quedam acida, quædam plus dulcia, quàm austera: & sanè quæ ab unoquoque eorum procedit utilitas, secundum vincentem eueniat qualitate necesse est. Dictum autem in quarto horum commentariorum est super dulci sapore, austero, & acido. Itaque ex illis de malorum punicorum differentia liceat colligere. Porro acini magis, quàm succus tum adstringunt, tum exiccant, his etiam magis putamina vocantur autem sidia. Adsimilem illis vim habent cytini. Malum, quod Græcis *πῆλ*, Latinis Malum punicum appellatur: Arabibus, Kumā, Rumiā, seu Romanis: Italis, Melagrano, & Pomo granato: Germanis, Granatoepfisch: Hispanis, Granadas, & Romanas: Gallis, Pomme de grenade, & Mygrenes.

*Mali puni viret ex Gals.*

*Nomina.*

## MYRTVS CAP. CXXVIII.



MYRTVS fatiua nigra vtilior est medicinæ, quàm candida, & in hoc genere multò magis montana: semmentamen imbecillius parit. Vis & myrti, & feminis adstringit. Semen viride, aut aridum in cibo datur sanguinem excreantibus, & vesicæ erosionibus. Succus virètibz baccis expressus, eosdem effectus exhibet: stomacho vtilis, vrinam citè prodest contra phalangij morsum, &

scorpionis ictus in mero. Seminis decoctum capillū tingit. Ius decocti in vino vlcera in extremis mèbris nata sanat: oculorū inflammationes illitū cū polline polætæ lenit: cōtra ægilopas illinitur: crapulā arceat præsumptū vinū, quod feruefacto aliquantum eius semine exprimitur: aliis enim acorem cōtraheret. Præstat idē seminis effectus: vtile procidentia vuluarū in defensionibus, sedis vitii & foeminis fluxione vuluæ laboratibus. purgat fursures, vlcera capitis manantia, atq; eruptiones popularū: fluentes capillos cōtinet. Additur quoq; in medicamēta, quas liparas vocat, vti oleū, quod ex foliis eius factum est. Decoctū foliorū ad defensiones bainearū conuenit, & contra laxatos artus, & malè soli descēdentes: eo fracta ferruminationi repugnantia vtilissimè fouētur: vitiligine emendat, purulentis auribus infunditur, & capillos denigrat. Succus eorum eadē efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis vlceribus, & partibus omnibus fluxione laborantibus, cōstiacisque profunt: & admisto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo cū vino, ad vlcera serpentina, ignem sacrū, testium inflammationes, epinyctidas, & condylomata. Arentiū foliorū farina vtiliter inspargitur paronychiis, pterygiis, & contra alarū, feminiūq; perfusiones: cardiaco-rum sudores cohibet. Folia cruda, seu cremata cū cerato, ambustis, paronychiis, pterygiisq; medētur. Exprimitur foliis succus, adfuso vetere vino, aut aqua cælesti, cuius recētis vsus est: nam exiccatus planè cariem sentit, & vires amittit. Myrtidanum dicitur, adnatum inæquabile, verrucosum, intumescēsq; & concolor: quod perinde quasi manus, myrti caudicem amplectitur. Magis quàm myrtus adstringit. Tursum addito austero vino reponitur, coactumque in pastillos siccat in umbra: multò efficacius & folio, & semine, cerato, pelsis, infensionibus, cataplasmatris admistum: vbi adstringendum aliquid est.



*Myrti com* MYRTVS arbor frequens in Italia nascitur. Cuius duo produntur genera: satiuū, quod in candidum, & nigrum diuiditur: & syluestre, quo vniuersa ferē Tyrrheni litora virefcunt, ac redolent. Siquidem in agro nostro Senensis in maritimis, ac in vniuerso Liguriæ tractu, Romano, atque Neapolitano vbique Myrti sponte proueniunt. Satiuarum arbores facili adulescunt, ramis flexilibus, ac lentis: rubro cortice: foliis longiusculis, perpetuūque virentibus, punice æmulis, quanquam in nigris nigriora, in candidis candidiora spectantur. Flores omnibus insident candidi, odorati: ideoque aqua ex iis confecta odoris suauitate vnguentariis plurimum expetitur. At cum nostras æquē sit odorata, atque olfactu iucunda, eam tamen odoratissimam existimauerim, quæ ex Aegyp̃ta myrto elicitur: siquidem & odoratissimam & iucundissimam in Aegypto nasci Myrtum memoriz prodidit Theophrastus. Satiuarum vtrumque genus baccas fert oblongas, agrestes oleas quadantenus referentes, multo sanē syluestribus maiores: etsi contrarium asseueret Marcellus. Quippe experientia compertum est, quod vbicunque satia Myrtus colitur, grandiores, vegetioresque baccas edit, quam syluestris: cultura enim Myrti mansuescunt, & longē magis humore replentur, vapore & aliæ satia stirpes omnes: quod quidem indomita tellus syluestribus denegat. Cæterum, ne quis

decipiatur, hic lectorem admonendum esse duxi, cum de syluestri Myrto loquor, non me de rustico intelligere, qui & Dioscoridi, & Plinio syluestris, & acuta myrtus appellatur, sed de vera syluestri myrto, quæ sua sponte in litoribus sine cultu oritur: quæ item in mediterraneis, in collibus, syluis, ac campestribus prouenit. Hæc tamen præter rusticum a Dioscoride non fuerit expressa, cum tamen dicat initio capituli, Myrtus satia, & reliq. his verbis & syluestrem eiusdem generis myrtum tacitè dari fateatur. Porro inter syluestres alba quoque, & nigra reperitur, quemadmodum & inter vrbanas. quandoquidem ipse quàm plurimas syluestres myrti plantas vidi in mille locis, quibus maturæ inerant bæccæ, non sanē nigre, sed in purpuram albicantes. Myrti montes nō amant, quin & frigidos odere tractus: tamen cum in mediterraneis, nempe in hortis, viridariis, vineis, & campis maximè proueniunt, tum in maritimis præcipuè, atque amœnis stagnorum, & lacuum ripis a natura nullo studio edicæ, mirificè proficiunt, viramque lætam agunt. Quod Dioscoridi Myrtidanum nominatur, vulgo notissimum est, vbi scilicet myrtus frequēs nascitur. Sunt & alia veteribus Myrti genera, nobis quoque non ignota, nempe Tarentinum, & exoticum: quorum Plinius meminit lib. x. v. cap. x. x. his verbis. Satiuarum generatoparii faciunt. Tarentinam folio minuto, no-

*Myrtideum.*  
*Myrtidum.*  
*Myrtidum.*

MYRTVS TARENTINA.



MYRTVS EXOTICA.



stratem patulo, exoticam densissimo, senis foliorum versibus. Hæc non est in vsu: ramosa vtraque alia. Myrti nostratis in Hetruria coria vbique perficiuntur: quippe quod ea pelves densentur, crispentur, atque crassescant. Myrti bæccis vltimam maturitatem adeptis, nostres mulieres vtuntur ad ciborum incinctus, qui cum affatis carnibus esitanti maxime cum palato ineunt gratiam. Ideoque Plinius loco supra citato ita scriptum reliquit. Succorum

natura præcipuam admirationem in myrto habet, quando ex vna omnium olei, vinique bina genera fiunt. Item myrtidanum, vt diximus. Et alius vsus bæccæ fuit apud antiquos, antequam piper reperiretur, illius obonens vicem. Quodam etiam generosi obsonii nomine inde tracto, quod etiamnum myrtatum vocatur, Eademque origine apertum sapor commendatur plerumque ad intinctus additis myrtis. hæc Plinius, Myrteum condimentum languidos ventriculos

*Myrti*  
*folia.*

culos roborat : idcirco & coeliacis , & dysentericis uile : quin & fecminarum fluxiones , qualescunque sint , valenter inhibet. Myrti frondes , itemq; baccarum semen tritum cōtra fungorum strangulationes mirificè præstat.

*Myrti Cerasi* ( vt memorie prodidit Galenus libro septimo simplicium medicamentorum ) ex contrariis substantiis planta conficit : vincit tamen in ea frigidum terrenum. Habet verò etiam tenue quiddam calidum : vnde valenter deficcatur. Porro tum folia , tum germina , tum fructus , tum succus , non parum inter se in adstrictione dissident. Ceterum quod ramis , & trunco adnascitur tuberosum , quam quidam myrtada nuncupant , quando dictis siccius est , tanto & deficcatur , & adstringit vehementius. Quidam id tundentes reponunt , postea vino subigentes in pastillos formant. Italia item arida viridibus plus deficcatur : miscetur enim virentibus humiditas quædam. Porro succus non tantum ex virentibus foliis exprimitur , sed & fructu. Restringendi vim hæc omnia habent tum foris imposita , tum intro sumpta in corpus , quòd scilicet nondum villam dederint , aut purgatoriam substantiam habent admistam.

*Nomina.*

Planta , quæ *μυρτιά* Græcis , Latinis *Myrtus* nominatur : Arabibus , *Aes* , *Alas* , siue *As* : Italis , *Myrto* : Germanis , *Vuelfch heydelbeer* : Hispanis , *Murta* , aut *Raiam* : Gallis , *Mourte*.

CERASIA. CAP. CXXIX.

CERASIA aluo vtilia sunt , si viridia fumantur : eadem siccata illam fistunt. Gummi , quod *cerasi* resudarunt , cum vino diluto , rursi vetustè medetur : colorem commendat , visum exacuit , appetentiam inuitat : idem ex vino potum calculosis auxilium est.

*Cerasorum*  
*considera-*  
*tio.*



& consortium , vt non solum ager is satiuarum

plantas seruauerit , propagauerit , & adauxerit , sed & veluti ex eius humore ( quæ summa fuit inter se societas ) grauida terra facta , sine aliquo semine in campis , in montibus , & sylvis numerosissimas plantas procreauerit , & ediderit. Satiuarum speciosissimi fructus , qui *Cerasa* , & *Cerasia* Latinis etiam appellantur , diuersorum sunt generum : quo fit , vt diuersa quoque fortiantur nomina. Inter hæc illa prin cipem sibi locum vendicant , quæ *Hetrustici* vulgò *Marchiane* , & *duracine* vocantur : tamen istis horum alia maiora , alia minora , alia saturato colore rubeant , alia verò potius albescent. Quæ autem *Plinio* *Italiana* , nobis verò vulgò *Acquaiuolo* , hoc est , aqueæ dicuntur , in nullo sanè habentur pretio : quandoquidem adeò sunt tenera , & fragilia , vt nisi sub arbore sua comedantur , facili gestatu colliduntur , & marcescant : quin & ob aqueæ partis redundantiæ insipida sunt , orique ingrata. Quæ autem , quòd admodum nigricant , *Corbine* nos vulgò vocamus , *Plinio* verò *actia* , & *cæciliana* , cum sint duriuscula , & dulcia , gustari habentur non iniucunda : veruntamen quòd manus , dentes , ac labra atro colore inficiant , discumbentesque deturpent , mensis rarò apponuntur. In *cerasorum* genere nuncrantur & illa , quæ *Romæ* *Visciole* , *Senis* *Amarine* , & in aliis compluribus Italia locis *Marasche* vulgò nuncupantur , à sapore ( vt puto ) dicta , quòd non iniucundi amaroris tantillum respiciant. Horum porro varia notantur genera , quæ etsi omnia sibi acidum asferant saporem , hæc tamen eius plus , illa verò minus habent. Rura *Tridentina* ea *Marasche* vulgò nominant , quæ minus acida gustu deprehenduntur , quorum genus quoddam est , quod ori admodum gratum habetur : quippe quòd in iis acido dulce sit admixtum , ob idque illa palato maxime placeant. Quædam præterea inibi *Marine* , & *Marinelle* cognominantur , & quæ minora , & rotundiora sunt , & breviori pediculo appensa , gustu nihil ferè prædictis reclamant. Est & horum tertium genus , quæ vulgus illud *Verule* nominat , longiore pediculo , bacca etiamnum ceteris crassiore , gustu acerbo , & admodum acido , colore perpetuò rufescente , nec vnquam in atrum vergente. etsi cætera , ubi plenè maturuerint , in atrum rubescant. Omnia hæc *cerasorum* ( vt ita dicam ) *Amarinorum* genera aptissima sunt , vt insolentur , & vt scicharo condiantur. Quinetiam sapore commendantur ad intinctus conficiendos , quibus non modò sanis edulia iucundissimè condiantur , sed etiam ægrotantibus , præsertimque biliosis febribus vexatis. Siquidem illis non modò sitim extinguunt , sed oris insuauitatem emendant , & cibi appetentiam conciliant. *Sylvestris* horum genus nulla adhibita cultura *Ananien* sibus in *Tridentino* agro sponte prouenit , nihil prorsus tum colore , tum etiam sapore ab illis dissidens , quæ inibi , vt diximus , *Verule*

vulgò vocantur. Hæc breui pediculo pendunt in arboribus admodum pumilis, tantæque breuitatis, vt rarè, vel potius nullæ dodrantalem æquent mensuram. Quo factum est, vt crediderim (etsi id pro comperto asserere non a-sum) hæc eadem esse, quæ Plinio Macedonica dicuntur. Syluestria, quibus plerumque vescuntur aues, rarò in cibis admittuntur, præterquam à rusticis, tum quòd plus ossis, quàm carnis habeant, tum etiam quòd cum quadam acerbitate amara sentiantur. Degenerant cerasi quocunque simo radicibus admoto, id vsque adeò oderunt, & horrent. Contrà proficiunt, si sui ipsius putamina fale concisa circum radices sepeliantur, ibique marcescant. Præcoces illæ fructus ferunt, quibus ante florum exortum calx viua radicibus circumponitur: vel quibus aqua calida sæpius pedes irrigantur, etsi postea paruo temporis tractu inarescant. Galenus habita Cerasiorum omnis generis ratione lib. v. 11. simplicium med. ea hisce paucis perstrinxit. Cerasus arbor fructum fert non parvis adstrictionis in omnibus particulatim plâtis participem. Nam & in horum, sicut etiam malorum granatorum, & malorum, quibusdam austera qualitas, in quibusdam verò dulcis, in nonnullis autem acida exuperat. Quintetiam ipsorum dulcium ea quæ nondum cocta sunt, ac matura, quædam admodum acerba sunt, quædam similiter moris acida. Sed in moris immaturis acida qualitas acerbam exuperat, in cerasis non semper. Ergo que dulciora sunt, magis quæ in intestinis sunt, subducunt, sed minus vitia stomacho sunt. contrà austera. Quæcunque verò acida sunt, ea pituitosis, excrementosisque stomachis conueniunt: siquidem austerris magis desiccant, & nonnihil etiam incidunt. Porro ipsius arboris gummi communera omnibus viscosis, & mordacitate carentibus medicamentis facultatem obtinet, quæ & ad arterias exasperatas accommodata est. Propriè autem (si quidem verum est quod quidam scribunt) calculus vexatus cum vino potù adiuuat. Nauticè illi tenuium partium quædam facultas inest. Cerasorum fructus, qui Græcis *κεράσια*, Latinis item Cerasia, & Cerasa dicuntur: Arabibus, Sarasie; Italis, Ciregie; Germanis, Kirsfen; Hispanis, Cerefas; Gallis, Cerises.

## SILIQVAE. CAP. CXXX.

SILIQVAE, recentes stomacho aduersantur, aluum soluunt: eadem siccata sistunt, stomachoque vtiliores sunt: vrinam ciunt, sed præcipuè, quæ vinaceis coniunguntur.

*Siliquarum*  
*com. id.* SILIQVAE, quæ Græcis *καρνια* dicuntur, in Italia officinis vulgò Carobæ, & Carobole appellantur. Nascuntur arbores, quæ siliquas ferunt, in regno Neapolitano, præsertim

in Apulia, ac etià in Cápania, vt optimè sciunt illi, qui Fundo Itrum, & hinc Molam iter faciunt: siquidem in illa ob læuigatos lapides inibi stratos laboriosa admodum via, quam Appiam vocant, frequentissimæ conspiciuntur. Incolæ has plantas Salequa vulgò nominant, vocabulo nimirum à Siliqua detorto. Arbores in speciatam satis proceritatem attolluntur, ramis in latitudinem protensis: cortice cinericio ad caruleum inclinate, loci arboris in illar. Folio vident fraxineo, latiore tamen, du-

SILIQVAE.



riore, rariore, ac magis circumnato. Florent descendente hyeme, aut vere iam appetentes fructificant verò æstate, & autumno. Siliquæ recentæ ab arbore decerpæ in grato displicent sapore, sed tractu temporis in cratibus expasæ, & siccatae, adeò mitescunt, vt & dulces euadant admodum, & gustui suaves fiant. Aliud siliquarum genus, quod

sic Aegyptiis cognominant, scripsi tradiderunt Theophrastus, & Plinius: de quibus mihi differendum non proposui, tum quòd Italis nusquam (quantum equidem sciam) nascuntur, neque cognoscantur, tum etiam quòd nullum habeant usum in medicina. Siliquas in cibus damnauit Galenus lib. 1. 1. de alimento: tum facultatibus, his verbis. Ceratia, quorum uertia syllaba per, t, literam & scribitur, & pronuntiatur, nihil cum cerasis per, s, scripsi habent similitudinis. Est autem prauis succi edulium, ac lignosum: vnde necessàriò sequitur, vt concoctus sit difficile: nihil enim quod lignosum est, facile coquitur. Præterea incommodum illud ipsis incit non paruum, quòd non celeriter deiciantur. Proinde satius est, ea ad nos non importari à regionibus orientalibus, in quibus nascuntur. Sed de viribus, quas & arbor, & ipsæ habent in medicina, idem Galenus differens lib. v. 11. de simplicium medicamentorum facultate, sic inquit. Ceratonia exicantis est, & adstringetis facultatis, sicut & fructus eius, quæ ceratia vocant, nonnihil etiam dulcedinis continent. Accidit autem illis quidam simile cerasis. Nam si humida sumas, magis ventrem subducit: sicca verò magis sistunt: vtpote cum humiditatem expirent, & quod essentia est crassioris, tantum reliquum habeant.

*Καρνια* Græcè, Latine Siliquæ vocantur: Arabice, Charnub; Italicè Carobæ & Carobole: Germanicè, S. Ioannes brot: Hispanicè, Alfaro bas: Gallicè, Carouge.

MALVS.



COTONEA MALVS.



PERSICA MALVS.



ARMENIACA MALVS.



MEDICA MALVS.



AVRANTIA MALA.



*de Porasimago*



FOLIA, flores, & germina cum omnis mali, tum maxime cotoneæ adstringunt. Po-<sup>10</sup> mis acerbis ad stringendi vis inest, maturis verò longè secus. Ex iis verna bilem gignunt, nervos omnes lædunt,

inflationes pariunt. Cotonea stomacho vitia, vrinam cient: verum tosta mitiora habentur. Profunt cæliacis, dysentericis, purulenta extnsientibus, cholericis, præsertim cruda. Maceratorum liquor commodè in stomachi, aut ventris fluxionibus, potui datur. Succus crudorum assumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fouentur vuluæ, & sedes, si procident. Cotonea, quæ melle conduntur, vrinam mouent: mel autem sibi constringentem illorum vim, & inspissantem adsciscit. Quæ cum melle coquantur, stomacho, atque origiora sunt, sed minus inspissant. Cruda cataplasmatibus adi-<sup>20</sup> ciuntur, ad cohibendum aluum, aut si stomachus æstuet, aut in vomitiones effundatur, ad mammarum inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit vinum ex ipsius tuis, expressis: sed quò perduret, quindecim sextariis succi vnus mellis adiungitur, alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia, quæ dicta sunt. Fit & oleum ex iis, quod melinum vocauimus: quo utimur, quoties adstringenti oleo est opus. Eligio portet vera, quæ sanè sunt rotunda, parua, & odorata. quæ verò strethia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus vitia. Flos & viridis, & siccus cataplasmatibus imponitur: iis conueniens, quæ adstrictionem desiderat,

inflammationibus oculorum, reiectio-  
nibusque sanguinis: contra citam al-  
uum, & mensium impetus, in vino bi-  
bitur. Melimela ventrem molliunt, &  
ab eo animalia expellunt: stomacho  
negotium exhibent: æstuationem faci-  
ciunt. ea multis dulcia mala vocantur.  
Epirotica mala, quæ Latine orbicula-  
ta dicuntur, stomacho vitia: sistunt  
aluum, vrinæ euocant: malis tamen  
cotoneis inualidiora. Syluestria mala  
similia sunt vernis, & adstringunt. Sa-  
nè in huc usum immatura omnia opus  
sunt. Persica poma matura tam stom-  
acho, quam ventri vitia sunt. acerba  
aluum cohibent, sed sicca vehemen-  
tius. Decoctum è siccis alui, stomachi-  
que fluxiones sistit. Armeniaca, quæ à  
Latinis præcocia dicitur, minora sunt  
supradictis, & stomacho vitiora. Me-  
dica mala, persicæ, aut cedromela,  
quæ Latini citria vocant, nemini non  
cognita. Arbor ipsa omnibus anni tem-  
poribus pomifera, aliis deciduis, aliis  
subnascentibus. Malum oblongum est,  
rugosum, colore aurum imitans, cum  
grauitate odoratum. semen habet py-  
ri. Id in vino potum venenis resistit.  
aluum mouet: oris suauitatem com-  
mendat, decocto eius colluto, aut suc-  
co: æstus in malacia mulieribus. Ves-  
tiariis impositum ab erosionis vitio  
vestes vindicare existimatur.

In malorum quoque genere Dioscoridi re-  
censentur Persica, Præcocia, Cotonea, & Ci-  
træ quippe quod eandem effigiem, & formam  
representare videantur. Sed nos primum de  
vulgaribus malis agemus, reliqua subinde sigil-  
lacim prosequemur. Eorum itaque (vt Galenus  
libro secundo de alimentorum facultatibus pos-  
sleritatis memorie prodidit) varii, ac multipli-  
ces sunt siores, quos etiam variæ sequuntur  
functiones. Alia nanque austera, alia acidum,  
dulcive siores gerunt. Sunt etiam quæ ex  
iis mistum habeant, ita vt appareant & dulcia  
simul & austera. Quædam præterea cum dul-  
cedine manifestè acida sentiuntur: ad hæc alia  
cum acore acerbata. Inuenias autè nonnunquam  
& quæ tres simul siores planè referant, dul-  
cem siliet, & acidum, acerbisq; nonnullis. Cæ-  
terum mala quidem, quæ adstringunt, succum  
habent frigidum, ac terream. Quæ verò acida  
apparent, frigidum quidem succum habent,  
verum

verum tenuium est partium. Medix autem temperatae sunt dulcia, quae ad calidius vergunt. Quaeque modum quae omnis qualitatis sunt experta, insipidae, ac veluti aquosa, ad frigidum inclinant. Malis igitur vteris pro vincetium saporum facultatibus : austeris quidem cum vetriculus vel propter calidam inemperiem, vel ob multam humiditatem fuerit imbecillus, acerbis autem, cum haec aucta admodum fuerint : acidis, cum crassum succum, qui non magnopere frigidus sit, fuscipaberis in ipso esse collectum. Siquidem succus frigidus non acidus, sed acris postulat. Veraque certe & acidus & acris succos crassos insidunt in eo tamen differunt, quod haec quidem cum refrigeratione, illa autem cum caliditate id praesent. Porro dulcis malorum succus, cum sine acrimonia, & crassitie, hoc est, cum solus exquisitus fuerit, celerius, quantum in ipso est, distribuitur. Quod si acrimoniam, aut crassitiam habuerit, citius subducitur. Ceterum optima etiam genere mala vitanda sunt, antequam in arboribus maturuerint : quippe quoniam concocti sunt difficilia, & frigida, tardeque permeant, & pravi sunt succi : ad haec succum habent frigidum, & leuiter crassum. Quae vero bellè matura in hyemem, & ver proximum asserunt, ea morbis saepenumero perquam vtilia sunt, aut farina aqua subacta circumlita, aut calidis cineribus medio eriter asata, aut pulchre in aquae bullientis vaporibus percossa. Dare autem ipsa conuenient statim post cibum, aliquando etiam cum pane, ad ventrem, & stomachum roborandum, iis qui cibum fastidiunt, tardeque concoquunt, quique vomitu, diarrhoea, ac dysenteria infestantur. In hunc quoque usum apta sunt acerbanam parata, vel modò dixi, mediocrem retinent adstrictionem. In Hetruria principatum obtinent, quae Appie, & Mele rose vulgò vocantur : quod quidem haec duo genera, cum suauiter oleant, gustuique arrideant, cum naribus, & palato maximam ineunt gratiam. Eaque propter non longè eum aberrare putauerim, qui dixerit Appia esse Dioscoridi melimela : Rosea vero, quae eidem epirotica, & Latinis orbiculata dicuntur, Quae vero adeò rebus, vt cruore perfusa videantur, & acido gustu sunt praedita, non alia de causa ita rubescunt (si rei agrariae auctoribus credimus) nisi quod ex mali, & mori nigrae infusione niam traxerint originem. Cornarius sua tantum, ni fallor, opinione ductus, putat in suis commentariis in Galeni libros de compositione medicamentorum secundum locos, Cestiana poma esse trantia, siue aurantia mala, quae in Citrei mali genere ab omnibus recensentur. Nec cum potuit à sua sententia reuocare Plinius, qui libro x v. capite x l i i i. apertissime scribit à Cestio cestiana, à Matio mariana, à Manlio manliana, à Claudio claudiana, & ab Appio appiana mala per inuentorum nomina, à quibus habuerunt originem, Romanis fuisse cognominata. Quocirca eo loco

scriptum reliquit Galenus ex auctoritate Apollonii, quod in capitis dolore ex ebrietate celsita na mala sic in vrbe Romana appellata, in cibis cocta conferunt, quod auctera sint facultate : non vt somniasse videtur Cornarius, aurantia. quae praeterquam quod Apollonio, & Galeno incognita fuisse censentur, nusquam gentium, quod equidem sciam, cocta exhibentur. Quo fit, pace omni um dixerim, vt qui suae ceruicis duritiam consulunt, suas sepius reprobare sententias audiant. Malos, quae fructus suos tanquam steriles, dare recusant, fecundas effeceris, si plumbeo circulo earum caudicem altitudine pedis à terra strictim conculseris ante florum aduentum, & cum mala coeperint adulescere soluto vinculo eas libertate donaueris. Mala Cotonea primum in Italiam aduecta fuerunt à Cydone Cretae oppido, vnde Graecis cydonia dicta sunt. Horum tria in Italia inueniuntur genera. Palma illis, quae peculiariter Mala cotonea cognominantur, pressa, incisuris intersecta, colore ad aurum inclinato, lanuginosa, & longè ceteris odoratiora. Proximum locum feruntur, quae maiore admodum corporis mole proueniunt, Dioscoridi, & Galeno struthia vocata. Hetrusci haec pyra cotonea vocat : quippe quod forma magis pyrae, quam mala referant. Pulpa, ac succo ceteris praevalet, colore tamen, saueolentia, ac viribus cedunt. Postremo Plinio miluana sunt, quae nonnullis notha dicuntur, quod tantum proueniunt ex cotoneis malis, quae struthis instae fuerint, vel ex struthis, quae cotonearum furculos receperint. Haec malis grandiora, pyris vero, siue struthis minora videntur : forma vero, ac facultate inter vtrunque media. Ceterum sane haec omnia, praecipue mala, maxime officinis expetuntur in medicinis usum. Nempe quod ex omnibus praeter vinum, mizum, oleum, & quod Dyacidonium vocant, conficiantur & intinctus, & congelati liquores : quae omnia non aegris modò apta sunt, sed etiam sanis vtilia aequè & grata. Galeni auro (vt ipse testatur in libris, quos de alimentorum facultatibus conscripsit) Cydonie placenta, quam officinae Dyacidonium nuncupant, ex Iberia, & Syria Romam conuehebatur, ex melle tantum, & cotoneorum carne confecta, tam ad cibi, quam medicamenti commodum. Quae sic chara, vel melle condita reponuntur, perfectè matura legi debent, alias indurescent insignorum instar, ita vt dentibus confici nequeant. Quae cruda per hyemem asseruntur, seorsum à pensilibus vuis reponenda sunt, quod vvas suo acerrimo sapore adeò vitient, vt ex statim marcore conficiantur. Persicorum quoque plurimè reperiuntur species. nam quaedam rubent, alia aureo colore fulgent, alia virescunt, alia candida sunt, alia sanguinea, alia duracina, alia cotonea vocantur. Ad haec quaedam habentur dulcia, quaedam acida, quaedam vinosi, quaedam amariuscula, & quaedam etiam auctera

*Malorum cotonearum consuetudo.*

*Curmery spinio reprobat.*

*Persicorum confid.*

austera. Prima laus in cibis duracinis, sic ex re dictis, quod caro tam pertinaciter hæreat ossi, ut nullo pacto ab eo anelli queat. Præcipua autem in hoc genere illis laus, quæ ab aurei coloris nitore, odoreque perquam iucundo Cotonæa cognominantur. Secundas fidei vindicant partes, quæ cortice detracto sanguineum succum fundunt, non propterea modò quòd sint gustu reliquis suaviora, sed etiam quia magnitudine, & colore sunt speciosa. Proxima sunt, nec prædicto generi fortasse cedunt, quæ à nucis similitudine Nuciperfica cognominantur: hæc enim cum colore, & sapore non refragantur percisis cotoneis, tum etiam non ingrata dentibus duntaxat, gustum mira afficiunt voluptate. Est & genus aliud Persicorum in Hetruria, ac in aliis Italiae locis agricolarum magno facium, quæ ideo Persica amygdala appellantur, quoniam persicorum ossium vice dulces amygdalarum nucleos includunt. Cæterum sane multis contendit Cornarius, in suis commentariis in secundum Galeni librum de compositione medicamentorum secundum locos, ubique corruptum esse Plinii codicem, iis in locis, in quibus de duracinis persicis tractatur: quin & Pauli, & Palladii, & Constantini Cæsaris libros corruptos esse, ubi in iis de duracinis persicis aliquid scriptum reperitur. Quandoquidem is, ubi in horum monumentis de duracinis persicis factam fuisse mentionem legitur, ibi de rhodacenis, non autem de duracinis legendum esse censet. Verum cum inibi nulla vel ratione, vel auctoritate nitatur, quibus id comprobe, sua tantum datus opinione videtur: atque ob id facillè pronunciasse, horum omnium codicibus (quod tamen absurdum esset credere) mendâ subesse. Quamobrem in hoc potius Cornarium hallucinatum, quam libros depravatos esse crediderim. Quinimo verum alioquin doctissimum admittor, quòd rem per se clarâ obscuram reddere conatus sit, quòdque non intellexerit, quid Plinio, & Palladio duracina, quid Paulo *Aspæna*, quidve *Aëdo*, & Constantino, ac aliis quibusdam Græcis *ψαδάνα* existerint. Nam si animaduertisset, hæc inter se & nominibus, & re ipsa differre, facilius, meo quidem iudicio, rem dubiam explicasset, nec omnes in vniuersum auctorum codices depravatos pronunciasset: cum, ut equidem arbitror, eorum nullus his in locis sit vitiosus. Paulo enim *Aspæna*, ut vulgata habet lectio, non *ψαδάνα* Cornarii modo, legendum semper existimaui, quòd ipse eo loco de præcocibus, & armeniacis tantum malis differat, non autem simpliciter de persicis. Siquidem, ut Cornarius ipse fatetur, Rhodacena non est alia, quam mala persica, quemadmodum Rhodacena nil aliud sunt, quam mala ipsa Larinis persica vocata. id quod & nos sine

vlla controuersia probamus. Sed Paulo *Aspæna* (ut diximus) genus est præcocius, siue armeniaci mali, ut ipse declarat his verbis. *τὰς ἡ τριανθικὴν καὶ ἡ ἀσπῆνα, καὶ ἡ ἀρμενικὴν τὰς ἀσπῆνας, οὐκ ἔστιν ἡ ἀσπῆνα, οὐκ ἔστιν ἡ ἀρμενικὴ ἀσπῆνα.* id est. Præcocia, dornacia, & armenia persicis præstant: neque enim aciescunt, neque similiter corumpuntur. Quibus palam est in Paulo potius *Aspæna*, quam *ψαδάνα* esse legendum, quòd tantum persica malus Græcis *ψαδάνα* vocetur, non autem armenica, dornacia, & præcociorum fructus, tamen à quibusdam inter persica numerentur, quòd forma tantum iis similes videantur, non tamen vera sunt simpliciter persica, quæ propriè Græcis nonnullis *ψαδάνα* *μᾶλα* in vniuersum vocantur, ut ipse etiam Cornarius testatur. Quippe nugar etur ineptè Paulus, si vellet, quòd rhodacena percisis præstaret, cum nil aliud fingit rhodacena, quam persica. His itaque rationibus liceat nobis dicere, *Aspæna* Paulo nec *ψαδάνα*, nec duracina designare, sed præcocius, siue armeniaci mali genus sibi peculiare. Sed iam ad Plinium venio, cui duracina persica persicorum species sunt, quibus palma inter omnes, non autem genus, quemadmodum & duracina cerasia, & vix omnia duracinæ inter varias cerasorum, & vuarum species eodem Plinio, & Palladio describuntur. Quod maxime arguit, aliud eisdem designare duracina, aliud verò Græcis *ψαδάνα*, quòd verbum hoc vniuersaliter de omni persico prædicetur, non autem de aliqua particulari specie. Neque, ut ait Cornarius, vocat nostra ætas quædam persica mala duracina, quòd esse cæteris duriora sint, sed antiquos secuta, quòd pulpæ consistentia gustui gratiora esse offerant & longiori tempore perdurent. Quod quidem palam facit Plinius lib. x. 111. cap. 111. cum ait. Duracina vix sine vllis vasis in vite seruabilis est: tanta est contra frigora, æstus, tempestatesque firmitas. Hanc & Columella prætulit in cibus. Postremò quòd rhodacena arbor, persicam arborem in vniuersum significet, cum Cornarius ipse id fernerit asserat, opus sane non esset, hoc pluribus comprobare. Sed ne fortassis putaret sibi ipsi non esse adhibendum fidem, Aërium consular, Constantinum Cæsarem, & Symeonem Serthi inter recentiores Græcos. Siquidem si pluribus in locis manifestè demonstrant, nil aliud per Rhodacenam se intellexisse, quam veram, legitimamque persicæ plantam: Persicorum omne genus dæmonstrat Galenus libro 11. de alimento: um facularibus, ut prauis succis, & quæ facillè corumpantur, ac noxam ventriculo inferant: quapropter Persica primis mensis semper edenda præcipit. Quare ego cerè nescio, ex quorum scriptis deprompserit Plinius, quòd inno

Cornarij  
opinio re-  
probata.

Plinij la-  
psum  
cua

Marcelli,  
& Sim-  
pliciani  
error.

cua expetantur agilis. Nisi fortasse & ipse pro  
persico persem deceptus acceperit, quemad-  
modum fecerē recentiorum nonnulli. Persici  
flores esu alium deiciunt, itēque vomition-  
es cient, sed non absque labore, ac detrimen-  
to. Non deservunt, vt Marcellus Florentinus,  
& Simphorianus Campegius in historialibus  
Galenī campis, qui existimauerint eandem plan-  
tam esse persicam, & persicam, de qua agit Dio-  
scorides in huiusce primi voluminis caele. Que  
(vt tradunt) ea profecto est, quę in Perside  
exitialis nascitur, etī translata in Aegyptum  
cōli illius clementia mortiferam in salutare  
verterit naturam, adē vt in cibos recepta, tam  
sanis, quā morboſis proſus habeatur inno-  
cua. Huius historiam laus prosequitur Theo-  
phrastus libro 111. de plantarum historia  
(vt infra suo loco dicemus) quam si quis per-  
legerit, hanc a nostris persicis plurimum dissi-  
dere comperiet. Manifesto etiānum argumen-  
to sunt Dioscorides, & Galenus, quōd hę plan-  
tę inter se differant: quandoquidem ii de his  
vt forma, & genere differentibus seorsum suis  
scriptis tradiderunt. Armeniaca præterea, quę

Armenia  
corum con-  
sideratio.

Latini, vt in Dioscoride legitur, præcōcia no-  
minant, & Græci bericocia pronuntiant, nos in  
Hecuria Græcos imitari vulgō Eacochę, & Mo-  
niache corruptis vocabulīs appellamus, ac si di-  
ceremus Bericocia, & Armeniaca. Iura eorum  
visuntur generā magnitudine potius, quā ge-  
nere differantia. Quod euenit non modō cōli  
clementia, & terrę admodum fugiferę do-  
cibus, sed & cultus a mangoniō: namque ex mul-  
tiplicata infusione maxime prōſtunt. Porrō om-  
nia, vbi mauritica emiserint, aureo colore  
splendent. Idcirco Romanis vulgō Grifome-  
lę, quasi chryſomela dicuntur, eaq̃ue præci-  
piuē, quę eo tractu cum persicis magnitudi-  
ne certant. Matureſcunt ineunte æſtate menſe  
iunio ante alios fugaces fructus, vnde merito  
Præcōcia dicta. Ea parum genere, & naturę  
dotibus a persicis dissidere, testis est Galenus  
libro secundo de alimentorum facultatibus: sed  
non item in ventriculo, vt illa, tam citō cor-  
rumpi, quanquam recentiores medici ea longē  
magis, quā persica, corruptioni obnoxia ex-  
perientia contendunt. Insuper Medica mala, vt  
ex nomine cognosci potest, ex Media primū  
aduēta sunt. hęc Latini Citria, vel Citroma-  
la vocantur. Eorum arbor aurantium, ac li-  
moniorum plantę magnitudine æquat. Folia,  
quę perpetuō ei vireſcunt, aurantis parum, vel  
nihil refragantur, foraminibus vſum serē effu-  
gentibus vbiq̃ue punctim traſiecta. Quamob-  
rem nesciuerim ego, qua ratione Theophras-  
tus (vt Theodoros interpretatur) ei folia as-  
signauerit portulacę, quę illi nullis notis con-  
ſentiant. Quo fit, vt admirari non liceat, si  
recentiorum plerique existimauerint Theo-  
phraſti codicem hoc in loco ſcatere mendis, &  
quōd vbi legitur *ἀνθήκη*, id est, portulacę,  
legi potius debeat *ἀράνη*, id est, araneorum

telę. Quandoquidem iis fortasse videbatur,  
quōd, cū mali Medice folia sint vbiq̃ue mi-  
nutis admodum punctis perforata, ita vt lin-  
teoli spissioris modo sint transparentia, facili  
telis araneis comparari possent. In quorum sen-  
tentia ego quoque perſiſti, quouſque Plinius  
inde me reuocauit. Quippe cū accuratius Pli-  
nium perlegiſſem, comperi Theodorum, alio-  
quin virum & Græcum natione, & Latine lin-  
guę peritiſſimum, malę Theophrastum hoc in  
loco fuſſe interpretatum, & vocabuli significa-  
tum minus rectē accepſiſſe, liquidem, vt aperitiſ-  
ſimē declarat Plinius lib. x 111. cap. x x 11.  
Adrachne Arbor est arbutio admodum ſimilis.  
Inquit enim, Adrachnem omnes ſerē Græci  
portulacę nomine interpretantur, cū illa ſit  
herba, & andrachne vocetur, vnius literę diuer-  
ſitate. Cæterū adrachne est ſylueſtris arbor,  
neque in planis naſcens, ſimilis vnedoni, folio  
tantū minore, & nunquam clementis. Hinc  
ergo facili colligi poteſt, huius plantę, quę ar-  
buti frondibus perpetuō vireſcit laurinis ſim-  
ilibus, Medice mali folia comparaffe Theophras-  
tum. Citrea arbor omnibus horis pomifera  
eſt: ſitalia namq̃; matura cadunt, alia matureſcunt,  
alia verō ſubnaſcuntur. Hę Plinii æuo non  
erant in Italia, vt ipſe teſtatur libro x 11. cap.  
111. vbi inquit, ſæpius tenaſſe gentes, plan-  
tas ē Media tranſſerre ad ſe, quę tamen ibi diu  
vivere nequiverunt, licet magna cultorum ſol-  
ertia fuerint enutritę. Nunc verō contra tranſ-  
ſarictę factę ſunt, atque cum Italo ſolā tantam  
inire gratiam, vt non modō in maritimis, ſed  
in mediterraneis quidem tum hortis, tum viri-  
dariis, tum etiā nobilium lætium ripis fre-  
quentiſſimę feliciter germinant. Poſtquam cul-  
tu, & diligenti Palladii (is enim proutur pri-  
mus artem adinuēſiſſe) ſaciūm eſt, vt ex Me-  
dia in Italiam tranſſare proſiliſſent, ac propa-  
gauerint. Theophrasſti ætate Citria mala nondū  
in ciborum vſum venerant, eorum teſtimonio,  
quę ipſe lib. 111. de plantarum historia me-  
morizę prodidit, ſed tantū odoris gratia veſti-  
bus inferrebantur. Quin & eorum vſus erat an-  
tiedoſi loco contra venenā, ad quę demolienda ſe-  
men præcipuē efficaciffimum habent. Refert  
Atheneus, quōd cū princeps quidam Aegy-  
ptius maleſicos quosdam damnaſſet nebulo-  
ſes, quō ſuorum ſacrorum luerec pœnas, ſpi-  
dibus ſecūdm Aegyptias leges in prædam ex-  
ponendos, ii Citrium in itinere, dum ad beſtia-  
rum pabulum ducerentur, cōiēderunt, quod  
caupona quædam vicem eorum dolens, atque  
miſeriam, illis dederat. Mox cū in theatrum  
deſcendiſſent, & ab immanibus, ferociſſimis  
ſeris demorſi eſſent, nihil ſanē moleſtię ſenſi-  
runt. Qua de re præſectus non parum cepit  
admirationem, & a militibus diligenter inqui-  
rens, an anecdotum aliquod præſumpſiſſent, cer-  
tior factus eſt, citrium tantum ex integra ſimpli-  
citate donatum, eos comediſſe. Poſtridie verō  
iuſſit vni præberi, alteri denegari, & demum in  
theatrum

Theodori  
113. ſeu.

Citriorm  
mira ſan-  
citas.

Medicorū  
malorum  
conſidera-  
tio.



theatrum trudi ad supplicium. Quo facto, qui comederat, demorsus nihil incommodi passus est: alter verò à fera ictus vndique liuidus factus, confestim interit. Narrat præterea Theopompus Chius duodequadragesimo suarum historiarum volumine, Clearchum Heracleotam, Ponti tyrannum multos veneno necasse: sed ille, inquit, plures adhuc interfecisset, si populum præstantissima citrii vis lacuisset. Seruantur Citria mala diutius incorrupta, si hordei, vel milii aceruis obruantur. Sed habita medicinz ratione, iam de eorum viribus plenius disserendum est. Citria itaque venenis aduersantur, eorumque maximè semen. Citrii decoctum collutione, oris halitum commendat, suauitatemque accersit. Ipsa autem integra vestiaris condita, vestes non modo gratissimo odore perfundunt, sed eas etiam à tineis, & blattis vindicant. Si cruda tamen manduntur, non facile cotioni obediunt: quin & crassum generant succum: ob hoc vesi si melle, aut saccharo conditis satius est, quòd ventriculorum commodè calefaciant, ac roborent: quauis hæc nostra ætas gulæ nimium indulgens in cibis citria cruda præferat cum assatis carnibus esctata. Citria aduersus aeram bilem, & morbos maxillos, quos hæc excitat, optulatur. Semen priuatim scorpionum ictibus & porum, & appositum mirificè medetur. Acidus eorum succus fluxum reprimat bilem, ac cæcæque pestis contagia. Proinde recentiores medici ad febres pestilentes serapiis ex eo confectis feliciter vtuntur. Ea principem in cibis obtinent locum, quæ in lacus Benaci ripis proueniunt, quæ est parum mala Limonia dicta magnitudine superent, maiorem tamen cæteris ab ore ineunt gratiam. Quæ verò ex Liguria viridatis, & Adriæ, & Aegæi pelagi insulis, aliisque locis afferuntur, etsi melioreponum modo crassescant, speciosaque magnitudine excellent, cum tamen insipido gustu non multum placeant, in cibis non æquè ac illa, præstant: verum quod pulpa copiosiore consistit, officinis expectantur saccharo, vel melle asservanda. Citrii mali meminit Galenus libro 1. simplicium medic. sic inquit. Mali medicæ fructus non amplius malum medicum, sed ab omnibus Citrium nuncupari adsolent. In semine quidem vincentem habet qualitatem acidam, & siccam, ut ipsum tertii sit ordinis refectantium, refrigerantiūque. In cortice verò itidem desiccantem temperiem est sortitus, non parum tamen habentem acrimoniam: proinde desiccet hic secundo excessus, non tamen frigidus est, sed aut temperatus, aut paulò infra Porò caro eius pariter crassi succi est, & pituitosa, frigidaque nam & ipsa editur, sicut & cortex. Semen omne edi ineptum est, tum humidum illud, & acidum, de quo primum differui: tum nucleus, qui in illo inuenitur, id quod re vera semen est. Hic amarus est, & digerendi videlicet, siccandique facultatem obtinens, secundo quodammodo ordine à temperatis recedens.

Folia verò denique exiccandi, ac digerendi vim obtinent, hætenus Galenus. Vbi animaduertendum est, quòd cum initio capitis inquit, In semine quidem vincentem habet qualitatem acidam, & siccam, ut ipsum tertii sit ordinis refectantium, ac refrigerantium, Galenus non de nucleis intellexit, neque de vero eorum semine, sed tantum de acido Citrii succo, in cuius medio vbique includitur semen. Eam autem fuisse in hoc Galeni sententiam, eius verba in calce ferè capitis ostendunt, quæ ita sonant. Semen omne efui ineptum est, tum humidum illud, & acidum, de quo primum differui: tum nucleus, qui in illo inuenitur, id quod re vera semen est. Hic amarus est, & desiccet, hoc est exsiccet, & exsiccat secundo recessu. Quam rem malè, meo quidem iudicio, assensu Auenenna, vt potè qui non rectè distinxerit, neque hac in re planè Galeni sententiam accepit, libro suorum canonum secundo semini Citrii secundam calidorum, & secorum sedem assignauit: tractatu verò, quem cordis viribus dicauit, eidem tertiam frigidorum, & secorum classem adscripsit, nullum quidem verbum faciens de acido Citrii succo, quem à Galeno sub seminis nomine comprehensum fuisse demonstrauimus. Non longe natura, & viribus à citriis distant mala LIMONIA, & AURANTIA dicta, & illa, quæ ADAMI poma vulgò vocantur, nos verò Loniæ dicimus: tamen si Limonia, cum sint gustu omnibus his speciebus acidiora, ob id succo & frigidiore, & sicciore esse, argumento duci possit. Quin & Aurantia cortice calidiora censenda sunt, quandoquidem is reliquis acrior, atque amarior gustu deprehenditur. Aurantiorum (quemadmodum etiam de punicis superius diximus) in Italia tria obseruantur genera, dulcia, acida, & vinolenta, siue mista. Dulcia in omnibus partibus exalaciunt. Aliorum verò succus refrigerat, prout maiore, seu minore referta sunt aciditate. Quocirca febricitantibus ad refingendum suum, acida quidem, & vinosa, non autem dulcia sunt exhibenda. Sic Limoniorum succo, sicut & citrorum, serapium ad refingendum bilis feruorem non inutile. Item & ad pestilentes febres, & eas, quæ contagione non vacant. Aqua, quæ è Limoniorum succo calentis aquæ bulneo, & vitreis organis extrahitur, præter quàm quòd mulieribus expetitur pro fuso ad faciem expolendam, vitilignes vbiqueque sunt, & totius corporis maculas emendat, varos delet, & acaros interimit. Serapiis admissa febribus acutis, & contagiosis mirè succurrit. Epota ventris cinas necat: id quod etiam præstat succus recenter expressus, vncie pondere potus. Cæterum non parum laboris impendisse videtur Brasiliolus in præfatione sui de simplicium examine libri, ut doceret, vnde emanauerit Aurantium vocabulum. Sed licet ibi plura de eius origine referat, ea tamen, meo quidem iudicio, non multum nomini quadrant. Quandoquidem ego

Citrii  
Siret.

Anise-  
na nota-  
tur.

Limonia,  
Auritia,  
& Adami  
poma.

Citrii mali  
Siret ex  
Galen.

potius existimauerim, vulgò Arátia, quasi Aurantia, altera expuncta litera, dicta fuisse. Nam cum hæc poma auri colore reluceant, ab auro meritò nomen accepisse videntur: vnde, quantum euidem reor, Aurantia, hoc est, aurea mala dicta fuere. Reliquū est, vt singulis malis sua reddamus nomina. Mala ita Latinis dicta, Græcis *μᾶλα* vocantur: Arabibus, Tuffa, seu Tufaha: Italis, Mele: Germanis, Oepffel: Hispanis, Manfanas: Gallis, pomes. Ea verò, quæ Græcè *καλὴν μᾶλα*, Latine Cotonea, & Cydonia mala dicuntur: Arabicè Saffargel: Italicè, Mele cotogne: Germanicè, Quitten, aut Kuttien: Hispanicè, Membrillos, & Marmellos: Gallicè, Coing. Quæ autem Græcum nomen habent *μαλὰ*, & *καλὴν μᾶλα*, eorum Latinum est Mellita, vel Dulcia mala: Arabicum, Melomella, & Galopomella: Italicum, Mele dolci. Mala, quæ *αἰσχρινὰ μᾶλα*, & *καλὴν μᾶλα* Græco nomine, Latine Persica mala appellantur: Arabico, Sauch, seu Chauch: Italico, Pefche: Germanico, Pferfich: Hispanico, Pexegos: Gallico, Pefches. *μαλὰ αἰσχρινὰ*, & *καλὴν μᾶλα* Græco nomine, quæ Græci, Latini Armeniaca mala, & Præcocia nominant: Mauritiā, Mermex seu Mirmix, Mex, Mesines, siue Mismis: Itali, Armeniache, Bacoche, Moniache, & Grifomele: Germani, S. Iohans pferfich: Hispani, Albiricoques, Albarchigas, & Aluaricoques: Galli, Abricos. Mala denique *μαλὰ καλὴν μᾶλα* Græcis vocata, Latinis similiter Medica mala, aut Citromala, & Citria dicuntur: Italis, Cedri, & Citroni: Germanis, Citrin oepffel, Iuden oepffel, & Citronaten: Hispanis, Cidras: Gallis, vng Citron.

## P Y R A. CAP. CXXXII.

## PYRORVM

multa genera. Quæ tamē omnia adstringunt: proinde adduntur conueniēter in repellētia cataplasmata. Decoctum ē sic- & cruda ipsa alium fi-  
sunt: ieiunus  
estitara lædūt.

Achras pyrastri genus est, quod tardissimè maturescit. Vim pyro adstringentiorē habet, & ad eadem conuenit. stringunt etiam eius folia. Ligni

pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiunt fungos, si syluestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Q V O N I A M Pyra vulgarissima sunt non modò in Italia, sed vbique in tota Europa, ideo superuacaneum duxi eorum arbores per historiam explicare. Multa, ac varia apud nos Pyrorum numerantur genera, quemadmodum & apud antiquos. Qui, vt Plinius refert libro, & capite x v. celebrauere superba, salerna, decumiana, dolobelliana, pompeiana, liceriana, feueriana, tyranniana, fauoniana, lateriana, anitiana, tiberiana, signina, purpurea, fementina, laurea, amphorina, corioliana, cucurbitana, & alia, quorum enumerationem longa foret. Quas sanè varias appellationes mutuata sunt, vel ab hominibus, qui primum ea in ciborum vsum reuocarunt, vel à locis, vnde venerant, aut à notis, quas aliquibus fructibus acceptas referebāt, aut à colore proprio, aut à tempore, in quo ab arboribus decerpebantur. In hoc itaque nostri quoque Hetrusci antiquiorum consuetudinem secuti, variis nominibus à diuersis inditis causis sua Pyra vulgò appellant moschatelle, giugnoles, ciampoline, roggie, ghiacciuolo, spinose, quadrate, carouelle, papali, san Nicolo, durrelle, zuccaie, campane, vernareccie, gentili, porcine, fementine, & plura alia habent aliis nomenclaturis appellata. Cæterum si quis vellet in nostris veterum Pyra collatione assequi, operæpretium esset, vt vnumquodque eorum genus peculiarem, perspicuamque habuisset descriptionem: quandoquidem fieri non potest, vt ex sola nomenclatura innotescant. Porro in vniuersum de eorum viribus differentes, dicamus, sicuti etiam de malis diximus, quòd pyrorū facultates, ex saporibus gustu dignoscuntur: cum dulcia natura dissent ab acerbis, acidis, austeris, & ab his, quæ vomu, vel plures præ se ferunt saporē: & contrā, hæc deinceps ab illis sint diuersa. Pyra (vt scriptum reliquit Galenus libro v. simplicium medica.) esu stomacho grata sunt, quin & vim habent extēdendi. Atqui syluestribus magis adstringendi facultas inest: ob id etiam magis præstant contra fluxiones. Ex libro 1. de alimentorum facultatibus ita scribit. Quæ de malis diximus, si omnia ad pyra, & puncta transferantur, nihil nouo alio super his sermone opus erit. Nam in his quoque alia austeria tantum, vel acerbiora apparent: veluti quædam acida, quædam dulcia, quædam denique ex horum mixtione composita: sunt quæ nullam penitus huiuscemodi qualitatem exuperantem habent: quo fit, vt cum aqua sint, ac hebetia, nulla roborandi vi polleant. Talis igitur omnino pyrorum vsus, qualis malorum. At pyris, præ-



fertimq; grandibus, quæ apud nos menaræ vocantur, aliqua alendi facultas donata est. Proinde ea secta in tenues orbiculos, siccataq; reponunt. Quibus coctis per hyemem, & ver, cum fames est, ciborum parum nutritivum

vix vescuntur. Pyri fructus, qui *ῥῆμα* Græc. *Nemina*, *cis*, Latinis Pyra dicuntur. Arabibus, Humechte, Cirmetre, seu Kemetri: Italis, Pere: Germanis, Byren: Hispanis, Peras: Gallis, Poires.

MESPIIVS PRIMA.



MESPIIVS. CAP. CXXXIII.

**MESPIIVS**, quæ à nonnullis aronia vocatur, spinosa arbor est, folio  $\dagger$ pyracanthæ, siue oxyacanthæ. Fert pomum suaue, exiguo malo non dissimile, tribus intus ossiculis: qua ex causa id nonnulli tricocon appellauere. Tarde maturefcit, esu adstringit, stomacho gratû est, aluumq; supprimit. Alterum mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui fetanium, alij epimelida vocant. Arbor foliis mali, sed minoribus. Pomum fert rotundum, esui aptum, vmbilico latiore: quod adstringit, seroque maturefcit.

*Mespilora confid.* **MESPIIVORYM** hic à Dioscoride duo recensentur genera: quorum illa, quæ foliis est pyracanthæ, siue oxyacanthæ nostratibus haud quaquam adspulari videtur. Quippe (vt sensu patet) nostratæ Mespili foliis oblongis, laurinis ferè similibus virent, non autem apii modo per ambitû incisîs, veluti oxyacantha. Fructum ferunt non quidem gustatu suaum, sed potius iniucupdum, quod acerbus sit, & austerus. Quin & is quina includit ossicula, non sanè terna, vt primo Mespilorum generi assignat Dioscorides. Cæterum si fructum profert Italia, qui priori Mespilo legitime adscribi possit, eius nimirum arboris erit, quæ Neapoli, vbi copiosa feritur in hortis, vidariis, ac vineis, Azarolo vulgò nominatur,

MESPIIVS ALTERA.



Huius plures plantas vidi ego primû Neapoli in amplissimo viridario Pompei Cardinalis à Columna via, qua itur ad poeta Maronis sepulcrum, vel vt vulgò dicunt à Pedigrotta. Arbor est mediocri proceritate, cortice, ac materia prauo haud absimilis: spinis horrida, non tamen admodum acutis: foliis lacinatis, apii æmulis. Ex quo perspicitur, eos Dioscoridis codices hoc loco scelerè mendis, in quibus deprauatè legitur, hanc arborem foliis esse pyracanthæ, non autem, vt legitimè legi debet, oxyacanthæ. Nam (vt superius suo loco explicauimus) oxyacantha foliis germinat dissèctis, pyracantha verò buxi modo oblongis. Cuius rei illud manifestum est indicio, quod de hoc Mespilorum genere posteritatis memoriæ prodidit Theophrastus lib. 111. cap. x11. cû inquit. Magnitudine arbor ista excellit, gyroq; comatur. Foliû magna ex parte infissum, quod vel apii parte postrema imitatur, ampliore figura, quodq; promissû, nervosû, apio tenuius, oblongius, totûq; circumfissum est, & pediculo tenui, ac longo dependente: antequâ decidat, vhemèter rubet. Radice numerosa, altaq; arbor coheret: ob id diuturna, & inextirpabilis est. hætenus Theophrastus. Quæ sanè verba certo sunt argumento, cû Dioscoridis lectione planè deprauatè esse, quod huic Mespilorum generi pyracanthæ frondes reddit. Quinetiâ foliû explicant oxyacanthæ à Dioscoride eius in historia silentio dissimulatum, quod scilicet apii modo per ambitû sit dissèctû. Sed illud etiâ nō ignorandum, tantam oxyacanthæ cum hac Mespilo intercessisse cognitionem, vt si Mespilus hæc oxyacanthæ inferatur, omnî speciosissima proveniat, & longè magis fructifera euadat. Sed vt

*Azarolo  
descripta*

redcam

redeamus eò, vnde codicis menda, quæ librorum incuria est, nos diduxerant, dicimus, quòd Azaroli vocatæ fructus nullis prorsus notis reclamant Mespilis, quæ primo loco à Dioscoride descripta sunt. Si quidem illi exigui sunt, ter na includunt oscula aliis Mespilis duriora, quàm magnitudine, & forma dissimili, ferè sentiant auituracitatem, origrati habentur, stomacho non iniucundi, & reliquis denique notis, ac qualitatibus illorum speciem adeò repræsentant, vt non aliud hac in re afferendum putaerim, quàm quòd idem sint Azarola, & Dioscoridis Mespila à quibusdam Aronia dicta. Quæ porrò Mespili aliquibus Setania, & Epimelides appellantur, vulgaribus nostratibus collatæ, nihil inter se dissentire comperuntur. Quapropter nil mirum scriptis mandasse, Dioscoridem alterum hoc Mespili genus copiosum in Italia nasci. Veruntamen Galenum Epimelides appellatione aliam arborem à nostratis Mespilis diuersam sumpisse liquet, quòd constat. Quandoquidem lib. v. 1. simplicium medicamentorum scribit, eius fructum acerbum esse, & ventriculo noxiom. Epimelida autem à rusticis Italie vnedonem nominari. Hoc insuper illud confirmat, quòd Galenus de vtroque Mespilorum genere, seorsum diuersis capitulis tradiderit. In Mespilorum historia Serapio aperte hallucinari deprehenditur: quippe qui forbitulo omnia referat, quæ de vtroque Mespilorum genere scripsit Dioscorides. Verum est hac in re is quidem aberrat, declarat tamen primum Mespili genus nobis Italiae Mauritanos secutis Azarolum esse nancque is Arabico idiomate Mespila Zaror appellat. Mespilorum vires recensuit Galenus lib. v. 1. simplicium medicamentorum, sic inquit. Mespili fructum, alii tricoccum nominant, quòd trian-  
tus in vniuersum gerat grana, quorum vnumquodque arboris est semen, cœu ea, quæ in malis inueniuntur, ipsius mali, & acini, ipsius vitis, & ficus, minuta illa grana, quæ cenchramidas Græci vocant. Arboris huius fructus admodum acerbus est, vixque edi potest, ventrem strenuè coercens. Quin & in germinibus, & foliis acerba hæc qualitas non pauca reperitur. Et libro 11. de alimentorum facultatibus sic inquit. Horum eadem quoque prædictis est ratio. Ambo enim adstringunt, sed multo fortius Mespila, quàm sorba. Quamobrem aliofluat in cibo accommodatissime exhibentur: sorba tamen ipsi sunt suauiora. Prorsus nancque nihil acerbi, vt Mespila obtinent, sed succus eorum citra acerbicatem austerior est. Illud porrò neminem puto latere, hæc omnia parè, non asfacim, vt ficus, vnaque esse comedenda: nequaquam eam eis, vt cibus, sed vt medicamentis potius indigemus. Hæc nouisse longè tibi fuerit vtilius, quàm si primum huius dictionis

Mespilus, & Mespila nominatur: Arabibus, Zaror, seu Zarur, & Aizaror: Italis, Nespolo: Germanis, Nespel: Hispanis, Nesperas: Galis, Nespier.

† Ne videamur hic temerè communem lesionem inmutasse, quæ est pyxanthæ, lectorem admonere non alienum duximus, variam esse huius loci scripturam in Græcis tum impressis, tum vetustis exemplaribus. Verum ea nobis magis probata visa sunt, quæ habent pyxanthæ, vel oxyacanthæ (idem enim esse putamus) innixi rationibus, quas in commentario adduximus.

LOTVS ARBOR. CA. CXXXIII.

LOTVS arbor est vastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibus gratam, stomacho facilem. Aluum sistit baccis. Ramentorum ligni decoctum siue potu, siue infusione dysentericis, ac scæminis fluxu ne vulgæ laborantibus, auxilio est: rusfat capillos: citam aluum cohibet.

LOTVS

LOTVS

Arbor Latine Celtis vocatur. Differt generum plures (vt li. & ca. 1111. de plantarum historia prodidit Theophrastus) eaq, maxime fructuum varietate inter se discreta proditur. Sed Loti proprium genus confurgit pyrami-  
tis vocatur. Differt generum plures (vt li. & ca. 1111. de plantarum historia prodidit Theophrastus) eaq, maxime fructuum varietate inter se discreta proditur. Sed Loti proprium genus confurgit pyrami-  
nitudine, aut paulo minore: foliis per ambitum serratis, aliqui illic viderentur. Fructum proferit magnitudine fabæ, q, vna modo maturefcente, variè colores immutat, gustat prædulcis, suavis, atq, etià stomacho salubris. Gignitur alter absq, interiore nucleo, qui nò modo cæteris præfert, q, ventriculo suauior sit, sed etià q, vinu reddat. Numerosa hæc arbor in Phæride insula, ideo Lotophagia vocatæ, q, inibi Loti fructu victit incolæ. Cæteru nò minor Lotorū copia in cōtinēti, sed lōgè largior: plurima enim hæc in Africa, vbi tāta fructus & arboris copia narrat, vt diebus pluribus exercitū Ophelli Cartaginē penentis in comæuatum defectu, hoc tantum fructu vitasse ex historiis habeatur. Scribit Plinius li. x 111. cap. x v 1. Locum arborem ætate sua extitisse Italiae familiare, ac vulgò cognitū, licet mutato solo, celique climate, vnde nobis alla ta est, à grata illa fructuum dulcedine degenera uerit. Dioscorides nò aliis notis reddidit Lotū, quàm quòd arbor esset vastæ proceritatis. Cui



gignitur alter absq, interiore nucleo, qui nò modo cæteris præfert, q, ventriculo suauior sit, sed etià q, vinu reddat. Numerosa hæc arbor in Phæride insula, ideo Lotophagia vocatæ, q, inibi Loti fructu victit incolæ. Cæteru nò minor Lotorū copia in cōtinēti, sed lōgè largior: plurima enim hæc in Africa, vbi tāta fructus & arboris copia narrat, vt diebus pluribus exercitū Ophelli Cartaginē penentis in comæuatum defectu, hoc tantum fructu vitasse ex historiis habeatur. Scribit Plinius li. x 111. cap. x v 1. Locum arborem ætate sua extitisse Italiae familiare, ac vulgò cognitū, licet mutato solo, celique climate, vnde nobis alla ta est, à grata illa fructuum dulcedine degenera uerit. Dioscorides nò aliis notis reddidit Lotū, quàm quòd arbor esset vastæ proceritatis. Cui

LOTVS

LOTVS

LOTVS

LOTVS

LOTVS

LOTVS

LOTVS

LOTVS

LOTVS

Mespilus  
altera.

Serap. le-  
psus.

Mespilus  
Galen.  
Galen.

Arbor pueri, q, pueri, Græcis, Latinis item

LOTVS

LOTVS

LOTVS

subscribens Plinius lib. x v l. cap. x x x. sic inquit. Lotus præcipue domibus expetitur, ramorum petulantia, latissima expatiantium umbra, & in vicinas domos sæpe transilientium. Item eodem loco ita scribit. Loti fructus sylvestris quidem est, sed cerasorum penè natura. Nulli breuior opacitas, nec aufert solem hymne decidentibus foliis. Nulli cortex iucundior, aut oculos excipiens blandius. Nulli rami longiores, validioresque, aut plures, vt dixit totidem arbores liceat. Cortice pelles tingunt, radice lanas. Quamobrem putauerim ego, si modo hodie Loti nascuntur in Italia,

*Lotus Ita  
lica.*

cum non aberrare, qui veram lotum, præsertim Dioscoridi, & Plinio, eam esse arborem dixerit, quæ in Tridentino, & Goritienfi agro vulgò Bagolaro vocatur: in Veronensi verò, & in aliis quibusdam Italiæ locis Perlaro. Si quidem licet harum arborum multæ pyri magnitudinem æquent, pleræque tamen conspiciuntur, quæ longè pyrum proceritate vincunt. Hæ itaque præterquam quòd caudice constant crassissimo, ramis latissimis in altitudinem se extollescentibus, cortice spectantur læui, colore in caruleum nigrescente. Quo fit, vt is grato coloris aspectu respicientium oculis mirum in modum ad se alliciat, vt tradidit Plinius. Foliis virent illic proximis, per ambitum serratis, aspersisque, quæ medio autumno flaccescunt. Fructus eis cerasorum similitudine, qui vt illa, longiore pediculo pendet. Is primo viret, mox in candidum flavescit, deinde per maturitatem rubescit: denique, postquam maturuerit, nigricat, gustu suavi, non ingrato. Quæ omnes huiusce arboris delineationes, ac notæ Theophrasti, Dioscoridis, & Plinii loto planè respondere videntur. Quare non equidem diffitebor, Lotum quoque hoc ævo Italiæ esse copiosum. Cæterum nesciuerim ego, quorum testimonio, & auctoritate fretus Ruellius lotum existimauerit plantam exiguum illam, quam Hetrusci vulgò Agrifolium dicunt: è cuius cortice (vt superius de palstro differentes distimus) vt ex viburno nostro, vulgò verò lantana, quidam viscum consiciunt, quo aues capiuntur. Quæ sanè opinio tantum abest ab historia loti, quam ex Theophrasto, Plinioque retulimus, vt etiam ei prorsus aduersetur.

*Ruellij et  
ror.*

Quippe quoniam Agrifolium arbor est, perpetua virens coma, foliis admodum per ambitum aculeatis, exigua proceritate, & cortice viridi: quæ notæ penitus loti descriptioni repugnant. Lotum scripsit tradidit Galenus libro v l. l. simplicium medicamentorum, his verbis. Lotus arbor non ita multæ adstrictionis qualitate est particeps, sed & tenuium partium est, & exiccatoria. Itaque lignorum ipsorum ramenta muliebri accommodantur profuuiò, & dysenteris, & colicis affectibus. Deconquantur verò interim in aqua, interim in vino, nimirum prout vsus poposcit, nec

*Loti Gires  
ex Galeno.*

infunduntur tantum, sed & bibuntur. Quinetiam quòd pilos defluentes cohibeat, non parum signum est ipsum adstringentis esse cuiusdam, similiter mediocriter desiccantis facultatis. Dictum quippe est & in sermone de Iadano, eiusmodi esse facultatis oportere, quòd fontes capillos esset cohibiturum. Planta, quæ Græcis dicitur *Alisapp*, Latinis Lotus arbor, & Celtis appellatur: Arabibus, Sadar, Sedar, seu Alsfadar: Italis, Loto albero: Hispanis, Almez: Gallis, Alisier.

CORNVS. CAP. CXXXV.

CORNVS dura arbor est, baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primum virent, dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ colorem repræsentant. In cibo adstringunt: profuuiò alui, atque dysenteris salutaris, siue in edulio, siue in defructo exhibeantur. Muria, vt oliuæ, conduntur. Sanies, quam virentia folia torrendo refudarunt, impetigini còuenienter illinitur.

CORNVS.



CORNVS est *Cornicoma* vulgaris notitiæ. *sideratis.*

Cæterum (vt lib. 111. de plantarum historia, ca. x 11. memorie prodidit Theophrastus) sexus in ea duplex inuenitur. Nanq; còsurgit mas duo decim cubito alitudine: folio amygdalis, nisi quòd pinguius, crassiusque: cortice neruo so, & tenui: caudice non minus crasso. Fœmina virgas paruas, sicut salix

amerina, suo latere pferit, & fruticosior est. Nodos ambæ, perinde ac virex, tû geminatos, tum inuicè congruos habet. Materies maris excoars, totaq; solida, cornibus densitate, firmitateq; similis, vnde illi nomen. Fœminæ verò medullam continet, & mollior est, atque cauitur: ob id ad venabulorum vsum inutilis. Qui Idam Troianam incolunt, matrem sterilem dicunt, fœminam autem fructuosam. Nucleum fructus oliuæ similem habet, gustu dulcis, odoratèque gratus. Flos oleæ, & floret, fructificatque eodem modo, vt singulari pediculo plura profert. In Macedonia verò (veluti etiam in Italia) ambæ fructiferae sunt: sed mas per æstatem, fœmina verò per autumnum baccas maturat, huius tamen baccæ tantum masculæ bonitate cedunt, vt mandî vix possint. Porro cauendum

dum est, ne Corni arbores prope aluearia cōferantur, vel à natura productæ ibidem permittantur: quandoquidem apes flore eius degustato aluo citata commoriantur. At certè mirandū est, quòd scriptis mandauerit Theophrastus, Cornū arborem amygdalæ folio viderescere, cum longè diuerso prorumpat. Eaque propter dixerim ego, aut in Theophrasti exemplaribus hoc loco mendum subesse, aut in Ida monte prope Troiam tum foli, tum etiam calis magis æfluente natura, cornu folia adeò restringi, vt amygdalæ quadantenus æmula videantur: etsi, meo quidem iudicio, potius putandum sit, Theophrasti lectionem hoc in loco deprauatam esse. Fit ex baccharum pulpa quoddam obsonii genus cydonie non dissimile.

Theophrasti  
locus in  
specul.

Cornu  
vires in  
cibus.

Corni  
vires ex  
Galen.

Quin & ex eorum decocto, & saccharo liquor ignis opere, & coctura concreuit, coagulaturq; qui præterquam quòd gratissimum placeat gustu, datur vtiliter dysentericis, ac foeminis mensum profluuiū laborantibus. Corni vires memoria prodidit Galenus libro v. 11. de simplicium medicamentorum facultate, sic inquit. Corni arboris fructus admodum acerbus est, esui aptus. Itaque mirum videri non debet, ipsum valenter ventrem restringere, sicut & mespila. Folia quoque, & germina gustu acerba sunt, valenterque deficiant. Itaque maxima vulnera glutinare possunt, potissimum durorum corporum: ac paruis vulneribus, & mollioribus corporibus magis contraria sunt. Nam nimium ea contendunt, ac plus satis deficiant. Arbor, quæ Græcis *ἀμυγδαλιά*, Latinis Cornus vocatur: Italis, Corniolo, veluti fructus eius Cornolæ Germanis arbor, Cornelbaum, Kurbeerbaum, & Dierlem: fructus verò Vuelfsch Kirsen: Hispanis, Cornizolos: Gallis, Cornier.

Nomina.

SORBA. CAP. CXXXVI.

ΚΕΡΕΥΣ.



sumatur. Quod & decoctum eorum

SORBA  
colorem lu-  
teum referen-  
tia, priusquā  
maturefcant,  
dissecta, & so-  
le siccata man-  
duntur, vt al-  
uum sistant.  
Eadem est fun-  
ctio molito-  
rum farinæ, si  
potentæ loco

in potu præstat.

SORBA fructus sunt in Italia vulgaris-  
fimi, nullisque non cogniti. Veruntamen il-  
lud non duxi prætereundum (vt hic nonnul-  
la perstringam ex his, quæ de Sorbis latius tra-  
dit Theophrastus libro 11. capite xii. de stirpium historia) quòd in sorbo etiam mar-  
ris, ac foeminæ differentia dignoscitur, certo  
quidem argumento, quòd vna sterilis sit, altera  
verò fructifera. Quinetiam in pomis discrimen,  
quòd alia sint orbiculata, & succo odoratiore,  
dulcioreque placeant: alia verò ouata, vt quæ  
etiam pyri effigiem repræsentent, gustui acidiora,  
& asperiora prædictis, minusque olentia. Sunt & syluatica Sorba, quæ  
maturitatem adeptæ ori non insuauia habentur.  
Hæc adstrictoria vi domesticis longè excellent,  
si tamen immatura insolentur.

Sorba, testimonio Galeni tum libro v. 11. de  
simplicium medicamentorum, tum libro 11. de  
alimentorum facultatibus, eandem adstringen-  
di naturam præstant, quam mespila, sed  
imbecilliore effectu. Vtraque tamen in me-  
dico vsu magis, quam in cibis expetuntur,  
probanturque. Sorbi fructus Græci *ἄμυγδα*,  
Latini Sorba: Itali, Sorber: Germani, Speierling,  
Sporoeffel, Sperbieren: Hispanis, Sorbas  
Galli, Cormes nominant.

Sorborum  
confidera-  
tia.

Sorborum  
vires ex  
Gal.

Nomina.

PRUNVS. CAP. CXXXVII.



PRUNVS  
arbor est no-  
ta. Cuius po-  
mū estur, sed  
stomachū ma-  
lè habet, al-  
uum mollit.  
Syriaca pruna,  
& præcipuè  
quæ Damasci  
gignitur, exic-  
cata stoma-  
chovtilia sunt:  
aluū adstrin-

gunt. Folia pruni in vino decocta col-  
lutione, & gargarizatu, viam, gingi-  
uas, & tonsillas fluxione laborantes  
reprimunt. Præstant idem syluestriū  
Prunorum baccæ, post maturitatem  
exiccata: cum sapa verò decocta sto-

macho vtiliores redduntur, aluumq;  
magis adstringit. Gummi prunorum  
agglutinatur: potum in vino calculos com-  
minuit: ex aceto quoque illitum, li-  
chenas infantium sanat.

*Prunorum  
considera-  
tio.*

PRUNORVM differentie inexplicabiles  
ferè sunt. Nam alia reperiuntur herbaceo co-  
lore perfusa, alia rubeo, alia eburneo, alia lu-  
teo, alia purpureo: quædam deinde magni,  
quædam verò parvi, quædam mediocriter dul-  
cia nonnulla, alia acida, alia vinosâ, alia dura,  
alia mollia: alia denique rotunda, alia oblon-  
ga, alia ovata conspiciuntur. Cæterum licet  
Dioscorides pruna Damascena sicca alium si-  
stere prodiderit: Galenus tamen aliter sen-  
sisse videtur seprimo simplicium censu, ubi sic  
inquit. Pruni fructus ventrè subducit, recens  
quidem plus, aridus verò minus. Sed haud  
scio, cur Dioscorides pruna Damascena sicca-  
ta ventrem sistere dicat, cum & ipsa perspicuè  
solvant, minus tamen iis, quæ importantur

*Galenus in  
rela. citra  
Brausio-  
luni.*

ex Iberia. hæcenus Galenus. Atqui in hoc  
Brausiolus Ferrariensis medicus nostræ ætatis  
clarissimus, apertè refragatur. Galeno in sim-  
plicium medicamentorum omnium peritissi-  
mo æquè atque doctissimo, suo de simplicium  
examine, ubi Galenum scribit hac in re, non  
Dioscoridem fuisse deceptum. Quippe quod  
Galenus non animadverterit, Dioscoridem de  
siccis prunis Damascenis loqui: quæ præter-  
quam quod sicca sunt, gustu etiam acida sen-  
tiuntur, & adstringentia. Quæ quidem in re  
Brausiolus potius (pace sua dixerim) planè  
hallucinatus, & à recto veritatis tramite lapsus  
deprehenditur. Quandoquidem non memi-  
nerit, quod non solum pruna Damascena sicca,  
sed etiam alia quàm plurima simplicia medi-  
camenta deiectionum simul & adstringentem  
viam obtinent, ut manifestè testimonio sunt  
tamarindi, & myrobalana omne genus: item  
rhabarbarum, & alia pleraque, quæ præter id  
quod primum alium deiciant, postea illam  
adstrictam relinquunt. Quam sanè prunorum  
facultatem etiam Brausiolus non penderit,  
Galenus tamen optime novit, & expertus est.  
Idcirco cum loco citato pruna Damascena sicca  
alium ceterè tradiderit, eadem etiam ad-  
strictoria vi pollere, libro 1. de aliment. fa-  
cultatibus his verbis attestatur, Prunis æquè  
ac ficibus concessum est, ut vel exicata vili-  
a permanent. Damascenis à Damasco Sy-  
riæ monte, in quo nascuntur, appellatis, prima-  
lione bonitatis magna hominum opinio de-  
fertur. Proxima iis, quæ in Iberia, & Hispa-  
nia proveniunt. Verum hæc quidem nihil ad-  
strictionis præ se ferunt: nonnulla verò Da-  
masceorum vel plurimum. Probatissima in

his sunt, quæ cum mediocri adstrictione, ma-  
gna, laxaque sunt. At parva, dura, acerbâq;  
& in cibo prava sunt, & ventri subducendo  
minùs idonea. hæc Galenus. Ex cuius verbis  
facis constare arbitror, nulla ferè ratione, nec  
nisi inualidis admodum argumentis Brausio-  
lum adductum fuisse, ut hac in re Galenum  
ipsum accusaret, quasi Galenus omnino igno-  
raverit, quam sapores, quam odores, quam  
cæteræ denique non fructuum modò, sed &  
omnium ferè simplicium medicamentorum qua-  
litates naturam, & facultatem fortitè essent.  
De quibus omnibus adeò doctè, & copiosè  
disputavit, ut parem inquam repperit nemi-  
nem, ut omnibus perspicuum esset ex suis pri-  
mis quinque libris, quos de simplicium me-  
dicamentorum facultatibus accuratissimè con-  
scripsit. Huic sententiæ æquè & rationibus  
accedit quoque communis medicorum experi-  
entia: nempe quod compertum sit, pruna  
Damascena laudatissima, iis similia, quæ Ga-  
leno præferuntur, esse ventrem solvere non  
inefficaciter, adstricta alio postmodum reli-  
cta, tamarindorum, & myrobalanorum modo.  
Sic igitur Galenum à Brausio reprehensio-  
ne servasse volumus. Sed si Dioscoridem quo-  
que tueri velimus, nil aliud dicendum pu-  
tauerim, quàm quod pruna Damascena sicca-  
ta alium adstringere tradiderit, ut referuntur  
ad alia, quæ minus adstringunt: non tam-  
en, quod voluerit, ea esse deiectionis facul-  
tatis experia. Porro pruna bilem deiciunt:  
proinde ea vtiliter vsurpant medici ad febres,  
aliòque biliosos affectus. Quin & seplasaris  
expetuntur: quippe qui ex iis quotannis ele-  
ctaria, incinctus, liquoreque varios parare  
côsuverint, quibus non modò sani gustu non  
ingrato delectantur, sed etiam qui languent,  
resocillantur. Habetur & in Aegyptio prunus  
ut Theophrastus est auctor libro 1. 1. 1.  
capite 1. 1. 1. de plantarum historia) insignis  
magnitudinis, fructum ferens natura, & ma-  
gnitudine mæspilis proximum, nisi quod ro-  
tundum nucleum habet. Florere incipit men-  
se Iulio, fructum circa brumam perficit, nec  
folia dimittit. Qui circa agrum Thebanum  
habitant, propter arboris copiam fructum faci-  
cant, & ossè exempto tundunt, ossisque faciunt.  
Non dissident effigie à prunis, nec dissimili  
admodum sunt facultate fructus ii, quos offi-  
cine Arabes secute *SEBASTEN* nominant,  
quique Græcis Myxa, & Myxaria vocantur.  
Quod etiam Dioscorides, & Galenus horum suis  
momentis non meminerint, de iis tamen à  
posterioribus Græcis, nempe Paulo, Aetio,  
Pseudo, & Actuarius frequens facta fuit men-  
tio. Arbores feri in Italia coeperunt Plinii  
ætare: nunc verò non ubique familiares, sed  
raris admodum hortis, & viridariis virent.  
Arbor est pruno valde similis, et tamen ma-  
gnitudine cedens. Cortex caudici candicat, ramis

*Prunorum  
Sma.*

*Sebasten  
considera-  
tio.*

mis verò viret. Folii comatur rotundis, ac firmis. Fructus adolescenti exigui pruni magnitudine, nucleo intus triangulari forma, qui satis bacce proportionem responderet. Fructus maturitate adepti, in atrum virefcunt, gustu sunt prædulci, ac lenia, tenacique pulpa. Ex quæ Syri, & Aegyptii visum conficiunt, quod Venetiis Alexandrinum appellant, aucupii commodissimum: Argumento sunt nuclei, qui in eo reperiuntur, color, & dulcedo, quæ gustatu deprehenditur. Pollent autem deiectionis facultate, non secus atque pruna, tam Græcorum, quam Arabum testimonio: id quod etiam comprobatur quotidiana medicorum experientia. Tamen contrarium senserit Fuchsius medicus hæc nostra ætate celeberrimus: quippe qui suis in paradoxis cap. x. x. v. i. vt fortasse in Arabes inueheretur, quos vbiq; ferè odisse videtur, nullam Sebestenii deiectionis esse facultatem contendit, quin potius ea adstrictoria vi pollere. Sed longè dissentit ab eo opinio nostra, & vulgata, comprobataque continua medicorum experientia. Quandoquidem quòd Sebestena assumpta in medicamentis alium ciant, testis in primis est Paulus Aegineta, qui lib. v. i. de iis verba faciens, sic inquit. Myxa arboris fructus est, minor quidem prunis, siccitate verò confimilis. Ex quibus Pauli verbis elicitur, quòd ita ventrem molliant Sebestena, quemadmodum pruna. de quibus idem discens eodem libro Galenum secutus: Pruni fructus, inquit, ventrem subducit, recens quidem magis, aridus verò minus. Neque huius rei nescius Actuarius hæc pluribus commiserit medicamentis, quæ bilem eiciunt, vt videre est suo de compositione medicamentorum compendio. Eorum insuper deiectione alui facultatem maxime comprobatur vulgaris experientia, clarissimum omnium lumen. Siquidem (vt iam milles expertus sum) eorum pulpa drachmarum

decem pondere deuorata, aut ad summum duo decim, eosdem ferè præbet effectus, quos Aegyptia siliqua cassia vocata. His ergo rationibus, & auctoritatibus adducor, vt illam quoque Fuchsi opinionem minus probem, quæ est, quòd electuarium de Sebesten officinis dictum ventrem deiciat, non Sebestenorum facultate, sed aliorum simplicium medicamentorum deiectionis vi præditum, quæ iis adduntur. Nam si id per se præstant, vt ostendimus, idem etiam aliis admissa præstarent. Quare, vt ingenuè dicam quod sentio, non Fuchsius tantum, quem aliquin semper admiratus sum, vt vitum doctissimum, & de medicina amplissimè meritum, sed plerique alii, nunquam adeò Græcis addicti esse deberent, vt præfusi à Mauritana familia descendentibus, nonnunquam & rationes, & experimenta, summa nostræ artis, & voritatis præsidia, cogantur de ferere. Sed vt nos nostra reuertatur oratio, vnde diuerterat, dicimus auctoritatibus, & experientia fieri, Sebestena deiectionis

viam vim habere. Quocirca velleit dantur ex bile febricitantibus, atque (vt auctores sunt Paulus, Aëtius, Psellus, & Actuarius) linguz asperitatem mirifice leniunt: quin & pectori, atque tussi opitulatur: ventris tinea pellunt: vineæ ardoribus à bile, vel falsa pituita proueniens maximam opem præstant.

## ΖΙΖΥΦΑ



Cæterum quoniam Sebestena nobis ΖΙΖΥΦΑ, quæ officinis Iulibæ dicitur comparatur, in mentem reuocant, cum eorum Diostorides nufquam, quod extet, meminerit, duximus non fore quidem ab re, hic id eorum viribus disferere, quòd à Galeno, qui ea Serica nominat (si tamen Serica esse Galeno Iulibæ asserere liceat) libro 11. de alimentorum facultatibus proditur, vbi sic ait. Ne his quidem, quid ad tuendum sanitate, morbosque profligandos valeant, testis esse possum.

Nam ab insolentibus, ac effrenatis pueris, & mulieribus cibo duntaxat expetuntur. Exiguam præbent alimentum, difficile concoquantur: ideo stomacho non sunt vtilia. Eandem sententiam ex ipso Galeno sumptam redidit Auenenna, cui tantum illud addidit, quòd ea ad pectoris, atque pulmonis vicia conferant, & quòd quidam (vt ferunt) cum maxime renum, tum etiam vesicæ affectibus prodesse censent. Verum quoniam (vt diximus) scribit Galenus, nullam se adinuenisse in Sericis facultatem ad corporum affectus curandos, hinc capta occasione Fuchsius iterum digladiatur, honesto quidem studio, non modo cum Auenenna, sed etiam cum cæteris Arabicæ familiæ auctoribus, asserens id omne, quod de zizyphis Arabes suis monumentis commendauerunt, omnino falsum esse, & à veritate alienum. In quo tamen si vitium aliquod Mauritanis adscribendum est, illud quoque Græcis posterioribus adscribendum erit. Quandoquidem constat, Actuarius & Græcum, & medicum peritissimum suo de compositione medicamentorum volumine, zizypha ad pectoris vicia compositis medicamentis compluribus admiscere, vbi scilicet ex calidiorum humorum redundantia morbus emerferit eandem in his usurpare, quæ bilem deiciunt. Quod & Nicolaus Alexandrinus in suis compositis medica-

Zizypho-  
rium com-  
paratio.

Auenenna  
defensio  
contra Fuch-  
sium.

Fuchsi opi-  
nio repro-  
bata.



mentis, per sepe fecisse comperio. Ideoque nil mirum, si ad hæc omnia præstare zizypha tradiderit Auicenna: nanque suo lentore, ac sua, qua ægrè permeant, crassitie (vt rei veritas adstruit) sanguinem crassum reddunt, qui fluxu bilis redundantia tenuior, quam par sit, redidit. Cum itaque tradat Auicenna, zizypha & pectori, & pulmōni prodesse, non temerè quidem eum locutum esse crediderim (vt fortasse aliqui putant) sed illud ea ratione scripsisse, vt in morbis tantum calidis, & acutis intelligendum esset, in quibus medici vitiliter zizyphis vti possint & debeant. Id quod eius verba aperte indicant, cum dicat, quod sanguinem incrassant. Neque enim erat Auicenna adeo ignarus, vt datis iam præmissis nesciret subinde conclusionem inferre. Sed certè pulchrum, atque tutum esse iudicio, quod quodammodo cum mortuis luctemur. Et quoniam (vt sepe antea polliciti sumus) nulli medicorum scēte, nec huic magis, quam illi noster animus erit additus, sed veritati propagandæ, addam ex prædictis rationibus cum Auicēna, eos meo quidem iudicio, labi, ac falli, qui zizyphis sanguinem expurgari, ac abstergeri contendunt, quique ea iis committunt medicamentis, quæ pectoris affectibus frigiditate obortis parari solent, vt recentiorum nonnulli: qui zizyphis nulla eorum habita ratione ad quoduis pectoris vitium indifferenter vtuntur, & plerumque cum maximo ægotantium discrimine. Cæterum an Galeno Serica zizypha sint, debitandum sanè fuerit, cum aliud Plinio fuisse reperiantur libro x v. cap. x i i i i. vbi sic habet. Aequè peregrina sunt zizypha & tuberes, quæ & ipsa non pridem venire in Italiam. Hæc ex Africa, illa ex Syria Sextus Papinius, quem consulem vidimus, primus vtiq; attulit, diu Augulst nouissimis temporibus in castrorum aggeribus sata, baccis similiora, quam malis: sed aggeribus præcipue decora, quoniam & tecta iam sylvarum scandunt. Tuberum duo genera, candidum à colore Sericum dictum. Et libr. x v i. cap. x x v. Ab amygdala, inquit, proximè florēt armeniaca, dein tuberes, & præcoces: illæ peregrinæ, hæc coactæ. Item libro x v i i. capite x. Et zizypha ait, grano feruntur mense aprilis. Tuberes melius inferuntur in pruno sylvestris, & malo cotoneo, & in calabricæ, ea est spina sylvestris. hæc Plinius. Columella tamen tuberum nusquam, quod legerim, meminit, sed zizyphorum libro i x. cap. i i i i. duo tradidit genera, quod harum floribus maximè delectentur apes, nempe rutilum, & album. Quo fit, vt suspicandum sit, Plinii codicem hoc in loco deprauatū esse. Illud suspicionem auxit, quod inter Arabes Auicenna, & inter Græcos recentiores Simeon Sethi, duas zizyphi species scriptis mandauerint, & quod tamen in Plinio vna tantum legatur zizyphus. Verum cum Actuario, Nicolao Myrephico, & Symeoni Sethi *ἡ ζιζυφα, ἡ ὑψηλὴ, ἡ ὑψηλὴ* (tot enim modis scrip-

inueniuntur) ea esse videantur, quæ Galeno Serica, eademque Auicennæ, Serapioni, aliisque pluribus Mauritanis, mihi quidem statendum videtur, Galeno Serica non aliud designare, quam zizypha. Ex his præterea omnibus maximum esse argumentum crediderim, in Plinio hic subesse mendam, & illi de zizyphis id adscribendum esse, quod de tuberibus deprauatè fortasse legitur. Fructus pruni, qui *ἡ ζιζυφα* Græcis, Pruna Latinis appellantur: *Nomina.* Arabibus, Anas, Awas, seu Agias: Italis, Prunæ, & Succine: Germanis, Praumen, Pfäumen,

ARBYTVS.



Hispanis, & Kriechen: Hispanis, Prunas, Andrinæ, & Aimeas: Gallis, Prunes. Fructus vero, qui Græcis recentioribus, *ἡ ζιζυφα, ἡ ὑψηλὴ, ἡ ὑψηλὴ*, Latinis similiter Myxa, & Myxaria, atq; etiam Sebestena Mauritanorum imitatione dicuntur: Arabibus, Sebesten, Morheica, Mukeita, & Mokaita. Vulgo & officinis, Sebesten: Gallis, Sebesten. Fructus præterea, qui item recentioribus Græcis *ἡ ζιζυφα, ἡ ὑψηλὴ, ἡ ὑψηλὴ*, & Galeno *ἡ ζιζυφα*. Latinis Zizypha vocantur: Arabibus, Hunen, Zuzalzef, seu Hanab: Officinis, Iuiuba: Italis, Giuggiole: Germanis, Rotbustbeerle: Hispanis, Azufecifa: Gallis, Iuiubes.

ARBYTVS. CA. CXXXVIII.

ARBYTVS, siue vnedo, arbor est cotoneæ malo non dissimilis, tenui folio: cuius fructus pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo. huic memæcylo cognomen est. Maturus aut flauet, aut rubescit: in esu acerosus, stomacho aduersatur, capitique dolorem mouet.

ARBYTVS in Hetruria frequentissima *Arbuti cō sideratio.* prouenit, vbi vel per hyemem perpetuis viret frondibus. Hæc etsi Dioscoridi reddatur malo cotoneæ dissimilis, magis tamen putauerim, ab eo arboris proceritatem representari cotoneæ, quam folia, & caudicis corticem. Vel deprauatus fortasse (vt magis suspicor) est hoc in loco Dioscoridis codex: quandoquidem Serapio,

AMYGDALAE.  
CAP. CXXXIX.

Serapio, Dioscoridis ipsius testimonio, Arbutum non describit in vniuersum coronæ malo similem, sed eam tantum proferre folia malo coronæ minora. nec scribit tenuia habere folia, vt vulgata habet Dioscoridis lectio. Siqui dem, vt palam est, Arbuti folia insunt laurinis, & iligneis crassiora. Meminit Arbuti Theophrastus libro 111. cap. xvi. de plantarum historia, sic inquit. Arbutus, quæ pomum cibo idoneum ferat, magnitudine non ninium præstat: corticem tenuem, tamarici similem habet, folium inter ilicem, & laurum: floret mense iulio. Flores singulari appendice parte postrema racematim coherant, specie quisque myrto oblongo similis, & magnitudine tantus: non foliatus, concavus, tanquam ouum exalptum, ore aperto. cum autem desfluerit, retinaculum perforatur: quodq; desfluerit, tenuæ sicut verticillus circa solum. Fructus anno integro maturefcit, vt simul hunc haberi, atq; alteru flore sponderi contingat. hætenus Theophrastus. Quæ in Hetruria nascitur, iolla profert laurinis, iligneisve similia, breuiora tamen paulo, crassioraq; colore potius pallido, quam viridi, in ambitu vbique serrata, rubra per medium excurrente costa. Caudex cortice vestitur subrubro, aspero, squamosoque, à quo rami prodeunt rubentiores, ac læuiores. Floret mēsbus iulio, & augusto, floribus candidis, paruis, lilii conuallii vocati figura, racematim dependentibus. E quibus fructus gignuntur rotundi, forborum ferè magnitudine: qui primo exortu virent, deinde flauescunt, maturi verò rubent, aspero tactu, nullo intus officulo, fragorum modo; quorum etiam effigiem referunt. Sapor his insipidus, simul & austerus: quinetiam dum eduntur, linguam, & palatum stimulant acerosa quadam substantia, quæ exterius continguntur, ita vt planè acerosi videantur. His maximè delectantur turdi, & merula. Quo fit, vt hyeme, quo tempore ipsa poma maturitatem sentiunt, eiusmodi aues inibi laqueis, retibus, aliisque aucupij generibus facile capiantur. Arboris folia coriariis expetuntur. Sunt qui credant, arbutum maximam opem præstare aduersus pestem. Quamobrem aquam, quæ ex folijs extracta sit, admodum esse in cerui corde reperto, vbi statim morbus inuasisse, magno (vt ipsi aiunt) iuuamento ægrotantibus exhibent. Arbuti meminit Galenus libro v11. simplicium medicamentorum, vbi paucis inquit. Arbutus arbor ipsa qualitate acerba vnà cum fructu est. cum memecylum nuncupant. Est autem hic, & in sensu stomacho, & capiti dolore inferens. Huius arboris nomen Græcum est *ἀρβυτος*: Latinitum, Arbutus: Arabicum, Hatladib: Italicum, Albatro: Hispanis, Madronho, aut Madromeiro: Gallis, Arbouces.



AMYGDALAE amaræ radicum tritarum decoctum vitia cutis in facie corrigit. Illitæ nuces idēmunus præstant: menses admotæciunt: capitis dolori auxiliantur, illitæ fronti, aut tēporibus cū

aceto, vel rosaceo: epinyctidas sanāt ex vino: item putrescentia vlcera, & quæ serpunt, & morsus canum cum melle. Earum autem esu dolores sinuūtur, aluum emolliunt, somnum faciunt, vrinam cient: contra sanguinis reiectiones cum amylo, † & mentha asumuntur: renum vitis, & pulmonum inflammationibus ex aqua in potu, aut eclegmate cum resina terebinthina dantur: calculosis, difficilique vrinæ in passo auxiliantur: & illinctu cum melle, & lacte hepaticis, tussi, & inflammationibus coli, nucis auellanae magnitudine. quinis, septenisve præsumptis, ebrietatem non sentiunt potores. Vulpes si cum quadam esca eas vorauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit, & adstringit: reiiciētibus sanguinem, potum auxilium est: impetigines, quæ summum corpus occupant, illitum cum aceto tollit: tussi vetustæ cum diluto vino potum medetur: calculosis cum passo bibere prodest. E nucibus Græcis, dulces cibo idoneæ, sed multò minus valent in remediis, quàm amaræ: attamen extenuant, vrinam ciunt. Recentium seu cum suo putamine, humidam stomachi vitia emendantur.

m 5 AMYG

Arbuti &  
sue, & si  
res.

Nomina.

*Amygdala  
in compo-  
sitione*

AMYGDALAE tam dulces, quam amaræ fructus sunt ubique vulgò notissimi. Differunt tamen inter se: nam amaræ maiore exaltandi, exiccandi quæ facultatē præditæ sunt, quàm dulces. quo fit, ut etiam dulcibus longè præferantur ad crassos, pituitososque humores expectorandos. Galenus dulces paucis perstrinxit libro 11. de alimentorum facultatibus, sic inquit. Amygdalæ nihil profus adstrictoriæ facultatis sortitæ sunt: sola enim extenuandi, atque abstergerendi vi pollent: qua tum viscera purgant, tum humorum è pulmone, ac thorace excreatæ molientur, ac promouent. Et de

*Amygdala  
lævis vires  
ex Gal.*

utroque Amygdalarum genere differens libro 1. simplicium medicamentorum, primò amaras, deinde dulces prosequitur his verbis. Amygdala, quæ quidem palam amara sunt, omnino extenuandi vim possident: quod & qualitas ipsa indicat, & experientia comprobatur. Ac de amara quidem qualitate in quarto horum commentariorum proditum est. Cæterum duo experientiæ exempla proponi satis est, unde vim eorum possis discere. Siquidem ephæis expurgant, & excretionibus ex pectore, pulmonèque crassorum, lentiorumque humorum impendio conferunt. Porro hæc obfusa sunt genere quidem incidentis, specie verò exurgentis esse facultatis. Quin & quòd per accidens facultatem item habeant ab obstructio-  
ne liberandi, & ipsum supra demonstratū est, sed & experientia monstat: nam in icore crassorum, viscosorumque humorum in extremis vasis impactorum obstructiones abunde expurgant, expediuntque. Quin & laterum dolores ab huiusmodi causis natos, & flenis. & coli, & renum sanant. Porro & ipsa arbor vniuersa similem sortita vim est. Nam huius radices co-

stæ, atque illitæ ephelæ purgant. Quotquot verò sunt amygdala dulcia, & ipsa leuiculam amaritudinem possident, quæ tamen dulcedine superante occultatur: cæterum id temporis spatio clarum fit. Demonstratum autem retrò est, qualitate dulcè moderate esse calidam. hæcenus Galenus. Amygdalæ, ut Theophrastus, & Plinius prodidere, ex amaris dulces sunt, si circumfosso stipite, & ab ima parte circumforato, defluens vndique humor abstergarur. Et contrà, dulces amarescunt, si primo germinata tenella arbores à pecore decacuminentur. Amygdalæ (ut etiam tradidit Galenus) non multum suppeditant alimenti: quanquam eis plerique vtuntur & ad roborandam venerem, & ad rescindenda vires. Hæc ut Græcis *ἀμυγδαλές*, Nomina. ita etiam Latinis Amygdalæ vocitantur: Arabibus, Iauz, Kauz, seu Lauri: Italis, Mandorle: Germanis, Mandelkern: Hispanis, Almendras: Gallis, Amandes.

† In vulgatis Græcis exemplaribus hic non legitur *ἐπὶ ἐπὶ*, id est, & mentha. Verùm dictionem hanc vertit Marcellus ex antiquis codicibus, quos habuisse testatur, eam quoque & Oribasius, & Serapio ex Dioscoride transferri bunt. Quæ ut verè Dioscoridis lectioni adscripulantur, ita hoc loco mentham addendam esse putamus.

# PISTACIA. CAP. CXI.

PISTACIA, quæ constat in Syria gigni, pineis nucibus similia sunt & sto macho amica. Trita cum vino contra serpētium ictus prosunt, siue edantur, siue bibantur.

## PISTACIA.



*Pistacia  
in compo-  
sitione*

PISTACIA, quorum est communis in officinis usus, ex Syria Venetias importari solent. Quæ & è Syria (ut Plinius auctor est) Lu-

## STAPHYLODENDRON.



cius Vitellius censur in Italiam primus intulit, cum legatus in ea prouincia fuisset, nouissimis Tyberii Cæsaris temporibus. Horum arbores

bores Venetiis, Caietæ, Neapoli, & in aliis  
Italix locis vidimus, foliis lentis maioribus,  
colore ex viridi in luteum inclinante, ac eo-  
dem ordine extremis ramusculis emergenti-  
bus, è quibus racematim suis quæquæ pediculis

*Pistacia-  
rum Noces  
ex Gal.*

pendent pistacia. Hæc (vt libro 1. de alimen-  
torum facultatibus scriptum reliquit Galenus)  
parum præbent alimentum, tamen infarctas hu-  
more iocineris vias expediant, & à vitis libe-  
rent. Porro an stomacho noxia sint, an vitia, an  
alium molliant, an adstringant, nullum huius  
rei certum habere testimonium scribit Gale-  
nus. Cuius sententia refragatur Auicenna, qui  
cum palam, & nominatim Galenum refellere  
nollet, libro secundo hac dicendi ratione uti-  
tur, his ferè verbis. Inquit quidam, non inue-  
nio, quod Pistacia stomacho profuit, aut sanè  
officiant. Ego autem dico, quod nauseam di-  
scutiant, & ventriculi os roborant. Argumen-  
to est subamara, subausterisque qualitas, quæ  
gustui in iis deprehenditur. Hæc igitur ratione  
freti medicorum nonnulli, non modò ad ioc-  
ineris infarctus Galenum secuti pistacia ex-  
hibent, sed ad iecur ipsum, ventriculūque  
roborandum, ea tam cibus, quàm medicamen-  
tis immiscet. quin & ad conciliandam vene-  
rem, & ad pinguedinem inducendam macie, &  
marasmo affectis commendant. Quibusdam in  
locis pistaciorum syluestrium nomine appel-  
lantur cuiusdam arboris fructus, quam Plinius

*Staphylo-  
dendron.*

libro 1. & capite XVI. STAPHYLODEN-  
DRON nominat, etsi à pistacia effigie, & sa-  
pore plurimum diffideant. Planta hæc humi-  
lis est, folio sambuci, materie admodum imbe-  
cilli, floribus albicantibus, racematim depen-  
dentibus, quemadmodum & fructus: qui folli-  
culis prouenit, rufo colore, cicoris effigie, ma-  
ior tamen: in quo subuitens nucleus includit-  
ur, sapore dulcis, sed nauseam commouens.

*Nuclei pi-  
staceæ.*

Sapores pistacis similes sunt Pinei nuclei, qui  
in strobilis includuntur. Hi enim (vt loco ci-  
tato tradidit Galenus) corpus alunt, bonum  
procreant succum, sed crassum, tamen ægrè  
concoquantur. Verum, si Auicennæ etiam  
credimus, digerunt, leniunt, resolunt, ac  
impingunt. Profuit præterea pulmonum vi-  
tiis, purulenta excreantibus, & tussi molestis:  
sed priusquam edantur, aqua calida ma-  
cerare eos oportet, alioquin ventriculū læ-  
dunt. Semen augent, & venerem excitant.  
Renes, & vesicam non modò expurgant, sed  
etiam roborant, eorūque vlcera prohibent.  
Vringe stillicidio opem mirificè præstant. Quam  
ob causam strobili nuclei apud recentiores  
medicos in frequentissimo habentur vsu ad  
huiusmodi affectus. Quæ nuxes Græcè *πυστά-  
κη*, Latine quoque Pistacia, & Pistacea ap-  
pellantur: Arabicè, Pustech, aut Festuch: os-  
sienis & Barbaris, Fistic: Italix, Pistacchi: Ger-  
manis, Vuelsch Bimpermuzlin: Hispanis, Al-  
hacigo: Callis, Pistaches.

*Nomina.*



N V C E S Iu-  
glandes, quas  
nonnulli Per-  
ficas vocant,  
sunt difficiles  
concoctæ, sto-  
macho inuti-  
les, biliosæ, ca-  
pitis dolorem  
inferentes, tus-  
sientibus ini-  
micæ: vomit-  
uris tamen ie-  
iunis in cibo  
aptæ. Cum ru-  
ta verò, & caricis præsumptæ, & à sum-  
mo cibo, venenis resistent, nec minus  
si à veneni haustu comedantur: largius  
esitratæ, tinea latas pellunt: illinuntur  
mammarum inflammationi, abscessi-  
bus, luxatisque, cum mellis exiguo, &  
ruta: cum cepa autem, sale, & melle,  
canis, hominisque morfui proficiunt:  
tormina, cum calyce suo perusta, &  
vmbilico admotæ, sedant. Putamen  
combustum, tritūque in oleo, & vi-  
no, infantium capite peruncto, nutrit  
capillum, alopecias replet. Siftunt men-  
ses nuclei vsi, si triti ex vino admo-  
ueantur: iidem è veteribus illiti car-  
bunculis, gangranis, & agilopiis me-  
dentur: alopecii commanducati, &  
impositi præsentis sunt remedio. Nuci-  
bus tuis oleum exprimitur. Recentēs  
stomacho innocentiores sunt, vtpote  
suauiores: itaque allio mistæ eximunt  
acrimoniam. liuiores in corpore illicitu  
tollunt.

N V C E S Iuglandes, quæ in communi sunt  
vsu, iteque arbores, à quibus eduntur, omni-  
bus vulgo in Italia notiores sunt, quam vt à no-  
bis representari debeant, cum nulla arbor Nu-  
ce vbiq; frequentius occurrat. Hæc Latine  
Iuglandes, quasi Iouis glandes interitis literis  
appellantur. Quo nomine primo mundi ævo  
eas appellatas esse, plures tradidere auctores.  
Quippe

*Nucem in  
glandibus  
considera-  
tio.*

Quippe cum homines primum glandibus tantum dū viderent, inuenta tandem arbore, quæ nuces ferebat, degustato nucleorum sapore, horumque dulcedine mirum in modum allecti, nuces Iouis glandes ob excellentiam appellauere. De his differens Galenus libro v. 11.

Inglan-  
dies ex  
Gal.

simplicium medicamentorum, ita scriptum reliquit. Nux arbor tum in foliis, tum in germenibus adstrictionem quandam possidet: ceterum euidentem, multamque in nucis putamine recenti pariter & sicco. proinde eo tinctores quoque, vii solent. At nos eius expressi succo similiter, vt mororum, & ruborum in melle decocto, vice stomatici medicaminis vitium, & ad omnia reliqua adhibemus, ad quæ modò dicti succi conuenire censetur. Porro nucis ipsius id, quod edendo est, oleosum est, & tenue: itaque ob id etiam facile exprimitur, & quod diutius reconditum fuerit, magis tale efficitur. Quamobrem oleum ex eo inueterato exprimere liceat. Tunc sanè admodum sic per halitum euaporatorium. Itaque quidam eo gangrenas, & carbunculos, & agilopas sanant, ac nonnulli ad *respiratoria*, hoc est, neruorum vulnera vtuntur. Et libro 1. de alimentorum facultatibus sic inquit. Habet Iuglans & adstringentis qualitatis non exiguum, quæ temporis processu marcescit, degenerante tota eius substantia in pinguem succum, adeo vt cibo prosum fiat inidonea, quod veteri oleo, sua pinguitudine adsimilis appareat. Viridis autem, arque etiamnum humida, neque adstringentis qualitatis, neque oleose conspicuè est particeps: sed magis est quodammodo *anæsthesia*, id est, qualitatis experti: quod saporis genus aqueum (vt dixi) vocare consueuimus. Iuglans facilius, quam auellana concoquitur, stomachoque vtilior est, & multò magis, si vnà cum caricis edatur. Proditum autem est à plerisque medicis, si ambo hæc cum ruta ante alios cibos sumantur, hominem non magnopere à lethalibus pharmacis lædi posse. Constat præterea humiditas dejectioni magis aridas verò minus conuenire. Non pauci quoque cū garo iuglandes præsumunt, vètris subducendi gratia. Ad hoc autem virides aptiores sunt, vt potè quæ adstringentis qualitatis minùs particeps sunt. Quin & aridarum quoque, vbi prius in aqua fuerint macerate (vt nonnulli faciunt) similes, ac viridum facultas habetur. hæc Galenus. Ceterum Iuglandes virides decerpit mense maio, vel iunio appetente, antequam earum putamina obdureant, saccharo, vel melle asseruæ stomacho viles euadunt, & ori non ingræte. Sed quoniam sermo nobis est de nucibus, cum Dioscorides, Galenus, ac ceteri posteriores Græci de Indicis, Myristicis, Metellis, ac Vomiceis nihil, quod constet, in memorie prodiderint, hic ea non dissimulanda putavi, neque alienum duxi recensere, quæ de his ex Mauritanorum monumentis, & recentiorum quorundam historiis sum consecutus. Sed primò de Indicis dica-

mus. Nuces igitur *INDICAE* myropolii omnibus vulgarissimæ, fructus sunt arboris cuiusdam (vt Mauritani auctores sunt) palmæ effigie, prægrandes, magnorum melonum instar, ab arbore dependentes: namque magna inuolucrorum mole obteguntur. Cortex is extimus colore conlar in atrum rufescente, subdurus, tenax, callosusque: intus verò villosa materie compactus, quæ manibus extrita in capillamenta facit. Subrus est putamen triquetrum, villosum, barbaramq; cornu instar prædurum, eiusdem ferè coloris nucleum continens, oui asnerini magnitudine, intus concuum: substantia illi pinguis, crassitudine semidigitali, duriuscula, tenax, callosaque, albicans, sapore dulci, butyrum referens, tenui sed aspero obtecta cortice, putaminis colore. Probanter recentes, exq; præsertim, in cuius concavitate liquor quidam dulcis includitur: siquidem hoc argumento recentiores faciliè cognoscuntur. Excalfaciunt secundo abscellu, humectant verò primo. In cibis sumptæ, etsi noxium admodum succum non gignant, ventriculo tamen laborem inferunt: semen augent, & venerem excitant. Oleum, quod è nucibus Indicis exprimitur, vtiliter hæmorrhoidibus inungitur, oleo præsertim admisto, quod è persicorum nucleis elicitur: per se illitum lumborum, & genuum dolores mulcet, & ventris alimonia pellit. Quod verò recentes nuces pressæ stillauerunt oleum, densum est, candidum, & pingue in summa substantia, qualitate, sapore, ac denique facultatibus butyro non dissimile, sed longè melius subministrat alimentum. Nux Indica lætiori sagina corpora reficit. Ideo strigosas mulieres mirum in modum impingat, & ad crassitatem reducit. hæc MYRISTICA. Genus de Indicis.

His succedunt MYRISTICÆ, quæ vulgarè officinis ob odoris præstantiam Mustate, quasi moschatæ dicuntur. Hæ (vt referunt illi, qui Indica littora perlustrant) proueniunt copiosissime in insula quadam nomine Iadan: ibique eas proferunt arbores quædam nostratibus persicis haud absimiles, angustioribus tamen foliis, ac brevioribus. Hæ post foliorum germinationem, florem statim emittunt, quem Macim Arabes vocant. Indiditur is syluestrium rosarum modo: è cuius medio nux erumpit, & processu temporis perficitur, & vbi maturitatem senserit, nuciis rosarum instar

Oleum ex  
nucibus  
Indicis.

Nuxis My-  
risticæ in-  
sideratis.



Inglan-  
dies com-  
ida.

instat, expansus eam circumplectitur: quam postea suo tempore cultores legunt certatim, & quum quisque potest uberius, quoniam sunt ibi omnia communia. Arbores absque cultu, suppedite tantum naturam, suos fructus edunt. Myrsitice nuces suo maci, tanquam rete comprehense, Venetiis in officinis quam plurimis videntur, duro putamine conclusæ, auellana modo, colore subnigro: quo fractio compactilis subest globulus, nuclei vice, & is est nux Myrsitica, quam vsurpare solemus. Præstantur recentes, quæ nullam præsenferint cariem: item ponderosæ, sarctæ, præpingues, humore redundantes, ita vt adacta acu confestim è vulnufculo exeat humor. Siccant (vt Mauritanii scribunt) & exalciaciunt ordine secundo completo. Altringunt, oris suauitatem commendant, & foetentis animæ virus commanifce abolent: lenigines in facie emendant, visum acuunt, ventriculū & iecur roborant: lienem absument, vrinam ciunt, fluentem aluum sistunt, flatūs discutiunt, & frigidis vteri affectibus mirificè profunt: & vt in vniuersum dicam, facultas eis eadem, quæ & caryophyllis. E recentibus prius confusis, & in cacabo calefactis prælo exprimitur liquor, qui refrigeratus ceræ nouæ instat concreuit, fragrantissimum spirans odorem, nervorum & articularum diuturnis doloribus à frigore excitatis vtilissimus: quin & veneris inunctionibus maxime expetitur. Myrsiticas nuces veteribus Græcis ignotas fuisse illud fides facit, quod Theophrastus, Dioscorides, & Galenus earum, quod in suis monumentis legerim, nusquam meminerint. Quare & hic quoque asserere nō dubitauerim, macerem (vt in eius mentione diximus) Dioscoridi, & Galeno myrsitice nucis florem esse nequaquam. Nam si ad eos floris cognitio peruenerit, veri quidem simillimum est, quod etiam fructus notitiam habuissent: quos, certo scio, ob suas admirabiles facultates, & naturæ dotes nunquam scriptis disseminassent. Præter odoratas, eas etiam nuces memorant Mauritanii, quas vomicas, & metellas vocant. Sed tam officinæ, quam medicorum vulgus has magno errore confundunt, quod plerumque legitimas vomicas metellarum loco vsurpent, & contrā metellas nonnunquam vomicarum vice. Nam Vomica quidem eas appellant errore ducti, quæ lupinorum instat compressæ sunt, & tenui quadam lanugine contextæ, quarum est canes necantur. Metellas verò, quæ nonnihil extuberantes, quibusdam nodis, veluti parvis oculis, per ambitum sunt resectæ. At eorum lapsus facile deprehendi potest Serapionis testimonio, qui Abrahami auctoritate reddidit nucem Vomica colore inter glaucum, & album, auellana paulo maiorem, nodosamq; Quibus notis eas esse præditas cōstat, quas seplasiariorum vulgus metellas appellat, quæ nullo modo respondent legitimis metellis à Serapione descri-

ptis, his verbis. Nucis metallæ arbor, vomica arbori non dissimilis, fructū gerit mandragoræ, oleosum, hirsutum cortice, sapore non iniucundo. Quæ notæ perspicuè adimplentur iis, quas Vomica nuncupant: ex siquidem corticem habent hirsutum, oleosum sunt, & gustui non ingrata. quin & facultatibus, non autem notis (vt quidam falsò exilliant Serapionem intellexisse) mandragoræ fructus referunt, cum auctore Serapione, quarto refrigerent excessu, ita vt drachmarum quatuor pondere estitate interimant, minore verò mensura temulentiam faciant. Quos quidem effectus præstare videmus non modo in canibus, sed etiam in hominibus, quibus hæc data fuerint, quas vomica esse contendunt. siquidem Serapio de Vomicarum facultatibus differens, nullam lethalem vim eis adscribit, sed quod tantum duarum drachmarum pondere cum anethi decocto, vel sale haustæ, mirificè vomitum excitat. Quamobrem dixerim ego, illas, quibus callosa tubera supprement, nodiq; visuntur, oculorum ferè instat, legitimas esse vomicas: metellas verò, quæ pressæ, & hirsutæ canibus necandis aptissimæ habentur. Ceterum nesciuerim ego, qua ratione ductus Leonarthus Fuchsius vltimo libello, vbi tantum stirpium imagines in exiguum formam contraxit, dixerit nuces metelles hispides esse fructus peregrinae illius plantæ, quam antea magno volumine Stramonium vocauerat. Quod prorsus reclamare videtur Mauritanorum sententiæ, à quibus harum historiarum acceptimus. Sed quoniam scribenti mihi de Nucibus omnibus anacardiam sese obtulere Græcis veteribus ignota, cum & ipsa in officinarum vsu expetantur, de eis quoq; verba facere ex Arabum testimonio, non quidem ab re fore duximus. Sunt igitur Anacardia (vt testis est Serapio) fructus cuiusdam arboris auiularum coreulis non dissimiles, vnde & nomen, colore etiamnum cordis modo rufescente, cum scilicet ab arbore decerpuntur. Inest iis liquor mellis crassitie sub cortice recondens, sanguinis modo rubicundus, sub quo & nucleus parue amygdalæ effigie. Nascuntur in Sicilia montibus, qui continuè igneis eruant flammæ exalciaciunt, & exiccant tertio excessu. Præstat in medicina liquor, ceteri myropolæ cōmuni errore & cortice, & nucleo vtiuntur. Anacardia (vt aiunt) labantes reuocant sensus, memorie iacturam rescant, & nervorum, & cerebri affectibus, quos frigida causa attulerit, auxiliantur: nihilominus sanguinem exurunt, & cutim vlcant. Quare Anacardia iuuenibus noxia sunt, cum & adurant, & deleteria facultate non vacent: cui tamen remediū est lac asfatim potum, & oleum ex eorum nucleis expressum. Hactenus de variis nucibus, nunc nomina. Latini nuces Iuglandes: Arabes, Iez, Iez, aut Giuzi, Itali, Noci: Germani, Nüssen, & Vuelch

Myrsitica  
rū virens.

Fuch. la.  
p. 100.

Anacardium  
morio.  
S. G. G.

Nucis Vomicae,  
metella.

Multarum  
arbor.

Nomina.

Vuellfnufz: Hispani, Nuezes: Galli, Noix. Nux verò, quæ ex India defertur, recentioribus Græcis *κέρυκιν* appellatur: Latinis, Nux Indica, Arabibus, Neregil, Dabig, seu Giauzi alhend: Italis, Noce d'India: Germanis, Indianisch nusz: Hispanis, Nuez de las Indias: Gallis, Noix d'Inde. Nux deinde, quæ *μυρτινός*, *μυρτινός*, *κέρυκιν*, *κέρυκιν*, *κέρυκιν* Græcè, Nux myrsinica, aut Nux moschata Latine dicitur: Ieuropaue, Iusbague, seu Giauzi ban, Arabicè: Noce moscada, Italicè: Muschat nusz, Germanicè: nuez de especie, Hispanicè: Nois muscades, Gallicè. Nux præterea, quæ Arabibus Leuz alkei, seu alke, officinis ac Barbaris Nux vomica, & Italis Noce vomica nominatur. Nux denique Arabica voce Leuz alrachah dicta, Latina Nux metella: Barbara, Nux methel: Italica, Noce metella nuncupatur. Quod autem *ανανήδιον* Græci, Latini item Anacardium dicunt: Arabes, Baladar, seu Beladur: Hispani, Anacardo.

NUCES AVELLANAE.  
CAP. CXLI.

NUCES AVELLANAE. NUCES auel-



lanæ, quas & leptocarya vocant, stomacho infestæ sunt: ipsæ tamen tritæ, & in aqua mullæ potæ, tussis veteri medentur: tostæ, & cum exiguo piperis potæ, destillationem coquoquant. Crematarum cinis

cum axungia, aut adipe vrsi perunctus, alopecij capillum reddit. Aiunt nonnulli vsta earum putamina, & in cineris speciem redacta, cum oleo, cæsi-  
50  
orum oculorum pupillas infantibus denigrare, persuso scincipite.

rum tamen oblongas & præstantiores, & gustui gratiores esse constat, & illæ præsertim, quæ putamine vehementer rubent, & fractu minime sunt contumaces, quales sunt Vicentinæ. Oblongæ serius maturitatem sentiunt, celerius verò rotundæ. quapropter illæ vegetiori sunt nucleo, diuque perdurant. Sylvestribus coryletis ferè innumeris scæret Tridentini montes, quæ oblongas pariter, & rotundas largiuntur nuces, tanta vberitate, ut eas rura facies legant, ubi maturitatem senserint. Auellanae (vt memoriarum prodidit Galenus tum libro vii. simpliciū medicum secundo de alimentorum facultatibus) plus habent essentia terrestri, ac frigida, quam Iuglandes, quin & plus præbent alimenti: siquidem densiores sunt, & minus pingues. Diocies auctor est, Auellanas nuces minus amygdalis alere, cibus in ventriculo supernare, largius esitatas caput tentare, innocentiores tamen esse virides, quam aridæ. Nuces, quæ *κέρυκιν*, *κέρυκιν*, *κέρυκιν* Græcis, Latinis Nuces Ponticæ, nuces Prænestinæ, & nuces Auellanae dicuntur: Arabibus, Agileux, seu Boudach: Italis, Noeciualæ, Auellane, & Nocecelle: Germanis, Haselnusz: Hispanis, Auellanas: Gallis, Noysette, Malline, & Auellaines.

Auellana  
rum Cives  
ex Gal.

Nomina.

MORVS CAP. CXLI.



MORVS arbor nota est. Cuius fructus aluum soluit, stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idè præstat mori succus: decoctus autem reo vase, atque insolutus, adstringentior redditur.

Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed inolefcit vis eius adiecto seissili alumine, galla, croco, & myrrhæ item myrica femine, iri, & thure. Immatura mori poma siccantur, tussaque acinorum rhois vice, obsonijs miscuntur, vt cæliacos iuuent. Radicis cortex decoctus in aqua, & potus aluum

*Auellana* AVELLANAE nuces ideo Græcis Ponticæ dictæ sunt, quod in Græciam (vt Plinius inquit) è Ponto primum allatæ fuerunt. In Italia tamen & in vrbis, & in syluestribus genere numerosè reperiuntur. Cæterum ex domesticis aliæ oblongæ, aliæ rotundæ sunt: ve-

tus aluum resoluit: latas ventris tineas excutit: his quoque auxiliatur, qui aconitum hauserunt. Folia trita ex aceto illita, ambustis igni medentur: tinguntque capillum, vitium, & fici nigrae frondibus simul coctis in aqua celesti. Succus foliorum cyathi mensura potus, contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruefacti corticis, & foliorum iure, dentes aptissimè in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facta in ambitu scrobe, succum emittit, qui postriedie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula discutit, & aluum purgat.

*Mori com-  
sideratio.*

Est & Mori vtrunque genus album, & nigrum passim vulgaris notitie in Italia, præcipue his in locis, vbi bombyces sericifici aluntur. Constat alba mororum poma adstringentem facultatem longe minorem, quam nigra esse adepta (est) Dioscorides, & Galenus alborum non meminerunt ex inulta & perspicua, sed paululum insipida dulcedine, quæ gustatu deprehenditur: siquidem in maturis nulla adstringendi vis plane percipi potest. Morus nouissima vrbanae germi nat, foliaque emittit: eaque propter veteribus dicta fuit arborum sapientissima. Mora (vt prodidit Galenus libro 11. simplicium medicamentorum, item secundo de alimentorum facultatibus) matura quidem ventrem subducunt, immatura verò vbi aruerint, admodum restringunt. Inaque ad dysenterias accommodata sunt, item ad coeliacas, & quasvunque alias fluentes affectiones. Porro quod maturorum succus ad oris medicamenta sit utilis, propter eam videlicet, quæ inest illi, adstrictionem, neminem latet. Præterea ad alia complura particularia, quæ mediocrem exposcunt adstrictionem, competit. At immatura mora præter acerbitatē, sortita sunt & aciditatem, & tota adeo arbor in omnibus suis partibus missam aliquam vim obtinere videtur, ex restringente, & purgante compositam. Attamen in radicis cortice purgatoria cū quadam amaritudine exuperat, adeo vt & latas interaneorum tineas perimat. In aliis autem partibus restringens vincit, in foliis tamen, & germinibus quodammodo media vtriusque temperies est. Mora vbi primum mansa fuerint, ingesta ciuissimè transcunt, & aliis cibis suo veluti ductu viam struunt. Verum secundo loco sumpta, celerrimè aliis vnà cum cibis corrumpuntur: id quod etiam faciunt, si cum eduntur, prauo in ventriculo humori occurrant. Quod si corruptionem non sentiant, corpus quidem humectant, sed non planè refrigerant, nisi actu frigida assumantur. Paucissimum ministrant alimentum similiter atque pèpones, haud tamen

vomitum cient, nec stomacho, vt illi aduersantur. De Moris autem, quæ rubi ferunt, libro 11. in ruborum commentatione, Deo fauente, latius differemus. Sed quoniam mori foliis & vescuuntur, & aluntur vermiculi, qui admirabili naturæ spectaculo nobis sericivm velulus consunt, quo recentiores medici in his, quæ cordi conueniunt, medicamentorum compositionibus vtiuntur, vt, quantum per me fieri potest, omnibus rei medicæ studiosis fiat satis, ea de Serici viribus hic perstringam (quandoquidem non inuenio è veteribus Græcis, qui de hoc quicquam prodiderit) quæ Auicenna posteritatis memoriæ commendandis tractatur, quem de viribus cordis inscripsit. Sericum itaque (eodem auctore) misericè exilarat, qua in re crudum eo longè præstat, quod ignem fuerit expertum, tametsi coctum, quandoque in vsum veniat, verum antequam in insectorum corinis immersum inciesatur. Excalcificat sericum, ressecatque ordine primo: excicat, & attenuat ea naturæ dote, vt cor recteet, laxumque efficiat. Quapropter laxat, firmat, purificat, & illustrat spiritus, neque eius facultas vni tantum assignatur spirituum generi in vna tantum dispositione, sed ei propriū est, omnibus aequè spiritibus opem ferre, ita vt spiritus cum vitales, & animales, quam naturales rescere valeat. Cæterò quauis negauerit Auicenna decoctum sericum, & fussionum coloribus imbutum in medicos venire vsum, Mesues tamen in eo serapio, quod de pomis inscribitur, id sericum admittit, quod coco legitime sit infectum. Idg; similiter inserit in ea medicamenti compositione, quam Alchermes, ipse nuncupauit. Arbor, quæ *mesia* è *euasipar* Græcè, Latine Morus appellatur: Italice, Moro. Eius fructus Græcis *euasipar*. Latinis Morum dicitur: Italis, Moro. Arabes vtrunque Tur, seu Thut nominant: Germani, Maulberbaum, & Maulber: Hispani, Moras del mora: Galli, Meurter & Meure.

*Nomina.*

# SYCOMORVS. CAP. CXLIIII.

SYCOMORVM, aliqui etiam sycaminum, id est, morum, vocant, cuius fructus sycomorum etiam, propter inefficacē gustum, appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans: foliis mori: pomum ter, aut quater



*Mori Si-  
res ex Co-  
lene.*



quater anno fert, non ramis, vt fico, sed caudice ipso, caprifisco non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus: quod non maturefcit, nisi vngue, aut ferro scalpatur. Nascitur plurimū in Caria, Rhodo, locisque non multi tritici feracibus: vbi prouentu fecundo, restibilique iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum aluo vile est, sed perquam exilem præbet alimoniam: stomacho aduersatur. Succus primo vere tenera arbore antequam fructum ferat, eximitur, lapideis icu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga violetur cortex, nihil effluet. Spongia, aut vellere lacryma excipitur, quæ siccata, & in pastillos coacta, fictili vase reponitur. Vis succi emollit, vulnera conglutinat, discurit collectiones coctioni repugnantes: bibitur etiam, aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & perfrictiones. celerimè teredinem sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quæ cum sit vlmus, prædita tamen est foliis sycomori, fructu pruni magnitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis,

vna cum fructu, paræ, candidæque, sicuti adsimilem. Is fructus nullam habet acrimoniam, exigua dulcedinis est participes, estque facultate humidior quodammodo, ac frigidior, veluti mora. Quinimo inter mora, ac ficus medium iure quis ipsum collocarit, atque hinc nomen ipsi inditum esse mihi videatur. Ridiculi nanque sunt, qui fructum hunc ob id aiunt sycomora fuisse nominatum, quod paruis ficibus assimiletur. Ipsius autem nascendi ratio ab aliis arborum fructibus quodammodo est diuersa: haud enim ex primoribus ramulis, ac germinibus, sed ex prægrandibus ramis caudiceque enascitur. hæc Galenus: Sycomori similis est (vt loco citato memoriæ prodidit Theophrastus) quæ prius in Creta vocatur Cypria ficusnam & ipsa fructum edit, caudice, ramisque crassissimis. Differt tamen à priore, quod germen quoddam emittit sine vllis foliis, radiculæ simile, cui fructus præpilatur. Candex arboris magnus, & populo alba proximus, eiusque folia vlmum representant. Quater anno fructum fundit, sed nullum ad maturitatem perducit, nisi pomo ipso immaturo incisio, emissioque lacte. Dulcedo ficibus non absimilis, & interna grossis planè cõueniunt. magnitudo autem pruni est. hæc Theophrasti verba. Quæ sanè maximo sunt argumento, hanc quoque plantam in Sycomori genere annuerandam esse. Cæterum apertè hallucinantur ii, qui putant arborem Sycomorum esse, quæ plerunque visitur in monachorum claustris vulgò vocatis, & in templorum plateis, vbi mortuorum cadauera humanantur, cuius baccis monachi verticillos faciunt, quibus mulieres suas numerant preces. Hanc (vt Bellunensis castigauit) Azadaracht appellat Aui-cenna, quam deleteriarum facultatis participem esse prodit Fen sexta quarti, vt latius libro sexto dicemus. Arbor, quæ *Συκοι* Græcis, Latinis Sycomorus, & ficus Aegyptia nominatur: Arabibus, Mumeiz, Iumeiz, Alumeiz, seu Giumeizi: Italis, Sicomoro, & Fico d'Egitto.

FICI.

CAP. CXLV.



FICI mature recentescens stomachum laxant, aluum soluunt, sed facile contracta ab eis fluxio constituit: sudore euocant papulasque, sitim sedant, calorem restinguunt. Sic cis natura excalfaciendi, vires alunt, sed sitim magis stimulant, aluo

viles

*Sycomori* SYCOMORVS (vt Theophrastus est auctor libro 1111. cap. 11. de plantarum historia) arbor est moro nostrati similis, quippe forio, magnitudine, aspectuque proxima. Fructum præter cæteras peculiariter gignit: non enim germinibus, non ramis extremis, sed caudice pomum parit magnitudine ficus, & visu proximum. succo atque sapore caprificis sanè simile, verum longe dulcius, granisque internis omnino carens, multitudine numerosius maturescere nequit, nisi scalpatur. Scalpatur autem vngui bus ferreis: & cum scalpata poma sunt, ad quartum diem maturescunt: hisse ablatis, alia, & alia ex eodem loco subnascuntur, terro ita, & quarto partu copiosa. Lactuosa arbor admodum est, & materies (quod sit solida, robusta, & nigra) ad multa commodam existit. Hæc inter cæteras arbores id sibi proprium viderat, quod cæsa continuo viret, neque siccatur vnquam, nisi aqua obruat. Eaque propter & lacubus, & stagnis demergitur, maderatque in profundo siccatur, cumque sicca omnino fuerit, superbitat, atque innatat. hæcenus Theophrastus. De Sycomoro differuit Galenus libro 11. de alimentorum facultatibus, ubi ita scriptum reliquit. In Alexandria Sycomori plantam vidi

*Sycomori*  
mentio ex  
Gale 10.

vtiles: rheumatismis ventris, & stomachi contraria: gutturi autem, arteria, renibus, vesicæ, & iis, quos longa valitudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus aptissimæ. feruēfactæ cum hyssopo, & potæ, thoracem purgant: tussi veteri, diuturnisq; pulmonum vitii conueniunt. aluum molliunt tussæ cum nitro, & enico, dein manducatæ. Decoctū arteriæ, & tonsillarum inflammationibus gargarizatu prodest. cum hordeacea farina cataplasmatismis miscetur, & in muliebres foras cum sœnogræco, & ptisana. Cæterum cum ruta coctæ, torminibus infunduntur: coctæ, illitæq; daritias discutiunt: parotidas, & furunculos emolliunt: panos ad maturationem perducunt, maximè nitro, iri, aut calce addita. Crudæ, si cum antedictis tundantur, eadem efficiunt: cum malicorio, pterygia purgant: cum atramento furtorio, deploratis ferè tibiæ fluxionibus, & cacoëthicis vlceribus medentur: quin & cum vino decoctæ addito absinthio, & hordeacea farina, vtilissimè hydropicis illinuntur. Crematæ cum cerato sanant pernioles: prurignes, sonitusq; si crudæ terantur, & sinapi, liquorēque aliquo exceptæ auribus instillantur. Tam syluestris, quàm fatiæ ficilacteus succus coaguli modo lac contrahit, concretumque dissoluit vt acetum: exulcerat corpora, meatus aperit, soluit aluum, vuluam recludit cum detrita nuce Græca potus: menstrua ciet cū luteo oī appositus, aut Tyrrhenica cera: podagricorum cataplasmatismis cum farina sœnigræci, & aceto vtiles: lepras, lichenas, vitilignes, vitia cutis in facie, psoras, vlcera in capite manantia, cum polenta expurgat: instillatus plagæ, percussis à scorpione, venenatorum ictibus, & rabiosi canis moribus auxiliatur: prodest dentium dolori lana exceptus, & canis eorum additus: verrucarum infirmitates tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem

præstat succus è teneris ramis syluestris fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo, tussē exprimuntur, & scicatus in vmbra reponitur. Et lac, & succus imponūt exulceratoriis medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramuli ficulni, facilem afferunt decoctionem. Lac efficitur, quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo furculo, spathe loco, moueatur. Grosi, quæ erinei nonnullis vocantur, coctæ illitæ, strumas, nodosq; omnes emolliunt. Cruda: formicas, verrucas, & thymos, nitro, farinæque additis, tollunt. Folia eadem possunt. Illita cum sale, & aceto vlcera in capite manantia, epinyctidas, & furfures sanant: iis ficosæ extuberationes, & palpebrarum scabritiæ perfricantur. Nigræ ficus, foliis, cauliculisq; candidæ vitilignes perunguntur: faciunt ad canum morsus, & vlcera, quæ ceria, id est, sanos, vocant. Grosi cum syluestris papaueris foliis ossa extrahunt: furunculos cum cera discutiunt: contra muris aranei morsus, & scolopendræ venena, cum eruo, & vino illitæ, auxiliantur. Fit ex cinere ficus tam syluestris, quàm fatiæ lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod subindè maccari opus est, & inueterascere: siquidem inter caustica intelligitur. Gangrænis prodest: nanque expurgat, & consumit, quæ excrecant, eoque sic vtendum est: spongia assiduè hoc lixiuium imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & in fluxiones vetustas, & sinus cuniculatim exedentes, magnosque, instillari conueniet. Etenim purgat, conglutinat, carne replet, & oras committit, non secus atque emplastra, quæ cruentis vulneribus iniiciuntur, enzima vocant. Bibitur ad discutiendum sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, conuulsa, cū cyathos aquæ recenter colatū, addito olei exiguo: cœliaci, dysentericis, per se cyathus datus prodest: neruorum vitiiis, cōuulsionibus, com-

modè illinitur ex oleo, vtpote quod sudores moueat: aduersus gypsi potù, & phalangiorum morsus bibitur. Hac eadem præstat reliqua lixiua, præsertim quernu: omnia tamè adstringunt.

*Ficorum  
considera-  
tio.*

**F I C I** fructus sunt in Italia vulgò notissimi. Quarù etià plura notentur genera in candicantibus, & nigrescentibus discrimine, sunt tamen omnibus notiores ob frequentissimum in autumnò earum in cibis vsum, quam vt nobis præstantiores repræsentare, ac describere sit opus. Siquid omnes satis gustus edocuit, eas esse laudatissimas, quæ planè maturæ pinguedine, & sapore cæteras antecellunt. Sed vt præter id, quod à Dioscoride proditum est, earum omnibus facultates innoceant, & temperantur: quin & vt omnes cognoscant, quod præbeant alimentis, quamq; vilitatem, ac noxam inferre possint, ea paucis edisseram, quæ ex Galeno deprompsi, qui in primis lib. 1. de alimentorù facultatibus sic scriptum reliquit.

*Ficorum  
facultas  
ex Gal.*

Ficus tamen si minus præni succi gignant, quam cæteri omnes non modò fugaces, sed etià autumnales fructus, non tamè id vitium prorsus efugere poterunt. Cæterum hæc ipsis insunt bona, nempe quòd commedabiles sint, & faciliè in totum corpus peruant, penetrantq;. Nam & ab ægendis vi possunt haud obscura: cuius præcipuè ipsi etiam nephritici multas arenas excernunt. Cum porrò omnes autumnales fructus exiguum corpori alimentum præbeant, minimè omnium ficus id vsum venit. Carnem tamè non compacta, neq; firmà generant, ceu panis, & suilla caro, sed turgidula, & subnanè, veluti fabæ. Quin ventrè flatibus implet & ipse, & non mediocrè hinc profectò molestiam intulissent, ni etià celerè descensum essent adeptæ, cuius beneficio, cum celeriter peruant, status què excitant, non diu manet, atq; ob id minus cæteris autumnii fructibus lædere cõsueverunt. Cæterum maturæ ficus immaturas nõ mediocriter antecellit, quod & in aliis quòd omnibus cernitur fructibus: quanquam non tantù in illis discrimè exsistit. Siquidè ad plenà maturæ ficus paulò minus omni prorsus noxa vacat. Et sequenti capite, vbi varu facultates recenset, sic inquit. Ficus, & vix què admodu inter seuclus autumnales principatim obinè, ita fugacibus omnibus magis nutrit, minimuq; præni succi habet, præsertim cum exactà maturitatè fuerint adeptæ. Porro quòd ipsa nutrit, maximo argumento sunt ij, qui vnicu fructu custodiunt: siquidè hi cum duos menses solis vis, ac sicus, quorum custodie præfunt, veltatur (nisi fortè panis quidpi cum illis addant) obesi tamè, ac pingues fiunt. At caro, quæ ex ipsis gignitur, haud quaquam est firma, ac densa, quemadmodu ea, quæ ex carnibus fit, sed laxa est, ac præhumida: ob id cele-

riter etiam, cum vesci ipsis desierint, contrahitur, ac cõsudet. Idem etiam de Ficubus scis dicens loco prius citatò, ita scribit. Caricæ multiplicè quidem habent vilitatè: si quæ tamen largius esitauerit, ab eis offendetur: non admodu enim probum sanguinè gignunt, quapropter pediculorù quoq; agmen eas comitatur. Incidendi, extenuandiq; vim habent, quæ & ventrem ac excretionè irritant, & renes expurgant. Iecori autem, lieniq; inflammatione obfessis sunt noxiæ, quemadmodu & ficus, non peculiari quiddam eximia facultate, sed communi ratione dulciù omnium ciborù, ac potuù. Obstructis autem illis, aut scirrho tentatis, ipsæ ex sese nihil profunt, nec obstant sed medicamentis incidentibus, ac extenuatibus, & abstergentibus mistæ, nõ mediocriter auxiliatur. Ideoq; nonnulli medicorù in dictis lienis, ac hepatis affectibus exhibent ipsas longè ante cibù cum thymo, aut pipere, aut zingibere, aut pulegio, aut satoreia, aut calamintha, aut origano, aut hyssopo. Ad eundem etiam modum, si caricæ cum alio quopiam eorum, quæ facultatè habet acrem, aut omnino incidenti, ac extenuandi assumantur, non solum sic affectis, sed sanis quoque viles erunt. Siquidem iecoris mætus, per quos fertur alimentu, apertos esse non negorantibus modò, sed benè valentibus etià tutissimum est. Proinde hoc pacto ficus cum sale extenuat, aceto, & garo præparatas vulgò comedunt, quòd id vtile esse experientia didicerint. Verisimile autem est, ipsorum nonnullos medicos cuiusdam consilio adductos, ficus hoc modò primu comedisse, deinde eam notitià ad vulgus dimanasse. Qui verò cum cibo aliquo incrassante ficus, & caricæ edunt, non mediocriter offenduntur. Item libro v. 1. 1. de simplicium medicamentorum facultate idem Galenus ita scribit. Ficus aridæ vim habet excoalscendi ordine primo etiam completo, aut secundo incipiente: habent verò etià partem tenuitatem quandam. Ex istis duobus idoneæ sunt, quæ tumores duos concoquant: statim verò etiam ea discutunt. Atque ipse per se illius eiusmodi vimobrinet. Sed & decoctum earum eiusdem vrique naturæ est. Verum vbi magis concoquere consiliu est, miscenda est farina triticea: vbi verò plus discutere, hordeacea. panis horum in medio est. Sed hæc magis sunt propria tractatus de medicamentorum compositione, & rationis curandi, verum in præsentia hæc de caricis nouisse sufficiat. Porro scire oportet, quòd quæ pinguiora sunt, magis possunt concoquere: quæ verò gustu acriores, magis tum extergere, tum discutere. Cæteru quòd ex his plurimu in aqua coctis efficitur, simile est melli, nõ solum cõsistentia, sed & facultate. Porro ficus virides comestæ, propter admixtã humiditatè, facultatis sunt imbecillioris: subducunt tamè alium vtræque tũ humiditatu siccat. Ficus arbor calidæ, tenuiùq;

partium temperaturæ est, ceu indicant tum liquor eius, tum foliorum succus valenter enim eorum uterque calidus est. Itaque non mordicatur tantum, aut absterget vehementer, sed & vlcera, & ora vasorum referat, & formicas, quas myrmecias vocant, eicit: quin etiam purgare potest. Porro ficus agrestis, quam erincum Græcè (Latine caprificum) nominant, tum liquor, tum succus ad omnia quæ ficius valentior est. Sed & crudæ, hoc est rami earum adeo sunt calidæ, tenuiūque partium temperamento, vt carnes bubulis duras, si coquendis adiciantur, friabiles, ac teneras efficiant. hæc

*Fici Præcocæ.*

*Nomina.*

de ficibus Galenus. Democritus præcoces ficos fieri pollicetur, si oleo, & columbaceo fimo arbor illinatur. Et contra, serocinas, si primæ grossi, cum fabæ magnitudinem excessere, detrahantur. Ficum arborem item atque laurum, è celo fulminibus non ici compertum est. Fici fructus *erincæ* Græcis, Latinis Fici, & Ficus appellantur: Arabibus, Sin, Fin, seu Tin: Italis, Fichi. Germanis, Feighen: Hispanis, Higos: Gallis, Figuier.

PERSEA. CAP. CVLVI.



PERSEA arbor est in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho vtilem. in quo phalangia cranocolapta nomine inveniuntur, præsertim in Thebaidæ. Arida folia in farinam redacta, illitum sanguinis eruptio

nes siliunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perside exitiosam esse, translataque in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

*Persea arboris consuetudo.*

QUæMADMODUM superius in malorum commentatione prodidimus, Persea arbor Aegyptia non est (vt putat Marcellus Virgilius Florentinus) nostræ Italiae malus persica, sed planta plurimum diffidens ab ea, vt & Dioscoridis, & Galeni testimonio facile probari potest: quandoquidem ij vtrunque, sed vt alteram ab altera diuersam, diuersis capitibus tradiderunt. Hæc (vt libro 1111. de plantarum historia cap. 11. scribit Theophrastus) arbor est Aegypti, aspectu magna, for-

mossique: folio, flore, ramo, totaque figura potissimum pyro vicina, nisi quoddam altera folio perpetuo, altera deciduo est. Fructum abunde parit, omnique tempore perficit: quippe nouus anniculum semper occupat. Maruritas anniuersarius afflatu conficitur: reliquum crudiorum auferunt, atque recondunt. Est magnitudine pyri, figura oblongus amygdalæ modo, colore herbideus. Nucem intus habet, vt prunum: verum longè minorem, mollioremque. Caro eius suauis, ac prædulcis manditur, concoctique lactis, & innocuus, etiam largiore cibo sumpta. Radice arbor exuperat, tum longitudine, tum etiam crassitudine, multitudineque. Materie constat robusta, dura, visque decora, veluti locus. Quapropter ex ea & simulacra, & lesculos, & mensas, & reliqua similia faciunt. Ex his igitur Theophrasti verbis, si Persea nota, ac delineationes cum nostra persica malo diligenter conferantur, liquidò parere arboris, has plantas inter se diuersas esse. De Persæ verba faciens Galenus libro 11. de alimentorum facultatibus, hæc memorie commendauit. Hanc etiam plantam vidi in Alexandria, quæ & ipsa magnis arboribus est ænumeranda. Tradunt autem fructus huius apud Persas adeo noxium esse, vt edentes interimar: in Aegyptum verò translant, in esculentum miscere, & pyrorum, malorumque modo, cum quibus & magnitudine conueat, editari. Eadem recensuit Galenus libro 11. de compositione medicamentorum secundum locos, vbi de cephalæ curatione agens, sic inquit. In sola Alexandria persæ arborem vidi, at non in alia Romanis subdita gente. Quidam person ipsam appellant, aiuntque in Persis lethalem eius arboris fructum esse, cum tamen is in Aegyptiorum regione innocuus existat. hæc Galenus. Ex cuius etiam verbis palam esse crediderim, persæm à persica malo prorsus diffidere, cum in tota ferè Europa persica malus frequentissima proveniat. Quin & ex iis facile dixerim, Columellam errasse, quod existimauerit, persica ea esse poma, quæ à Persis ad Aegyptios allata persæ dicuntur, vt libro cultui hortorum dicato his versibus testatur.

*Persea mentio ex Gal.*

*Columella 12 p. 12.*

50 Tunc præcox bifera descendit ab arbore ficus, Armeniisque, & cereolis, prunisque Damasci Stipantur calathi, & pomis quæ Barbara Persis Miserat (vt fama est) patriis armata venenis. At nunc expositi paruo discrimine lethi Ambrosios præbent succos, oblita nocendi.

Arbor, quæ *myrica* Græcis, Latinis similiter Persea nominatur: Italis, Perseo Græcè vocis imitatione dicitur.

*Nomina.*

IBERIS. CAP. CXLVII.



† IBERIS,  
siue cardaman  
tica, folia habet  
nasturtij, vere  
virentiora: cau  
lem cubitalem, 10  
aut minorem,  
in incultis nasci  
tur. Aestate la  
cteam florem  
promit, quo tē  
pore efficacior  
est. Radices  
duas nasturtio 20  
similes habet,

calfaciētes, & adurentes. Ipsa enim is  
chiadicis cum falsa axungia emplastri  
modo vtilis, quaternis horis alligata,  
vt dein in balneas descendatur, & post  
ea oleo cum lana locus perungatur.

*Iberidis cō  
sideratio.* VIDIMVS primum Iberidem, quam no  
bis indicauerat Iulius Alexandrinus medicus

Tridentinus, qui nunc ob præclara sui ingenij,  
& doctrinæ dotes, apud Sereniss. Ferdinandum  
Regem Romanæ artem medicam exercet, extra  
ciuitatem Tridenti, vbi vulgò dicitur alle Laste,  
effigie nimirum, qua describitur à Dioscoride,  
ac alijs pluribus Græcis auctoribus. Huius Ga  
lenus in simp. censu nusquam separatim memi  
nit, sed hanc, & Lepidium non nisi nomine dis  
ferre prodidit. Quod etiam idem testatus est li  
bro x. de compositione medicamentorum se  
cundum locos circa finem de coxendicum cu  
ratione agens, vbi ex Damocrate sic inquit. Da  
mocratis extat libellus, qui Clinicus inscribitur,  
in quo versibus iambicis, quemadmodum solet  
de tribus differre medicamentis. Ac primum qui  
dem de eo differit, quod ex herba constat, quā  
ipse Iberidem appellat, quod ad coxendicum do  
lores commendauit. In Iberide medicum  
quendam amicum suum curatum fuisse ait her  
ba, quam (vt dixi) ipse Damocrates Iberidem  
vocat, vt qui tantum visu herbam cognouerit,  
nomen autem eius nullum audierit, cum etiam  
id ipsum ignorauerit is, à quo eius vsum didice  
rat. Porro ex notis, quibus eam representat, vi  
detur Iberidem appellare, quæ à Græcis lepidiū  
nominatur, appellatione ducta à regione, in  
qua amicus eius curatus fuit. Describit autem  
ipsum formam iis carminibus.

*Iberis. &  
sepidium  
nomen.*

Herba hæc vbique multaque frequens nasci  
tur,  
Monsueta iuxta antiqua, muros, & veteres.

Tristisque quondam publicè pedibus vias,  
Quas iuxta aratrum duxit haud quis agri  
cola.

Semper viretens, folijs nasturtij  
Florentibus vere, attamen maioribus.  
Caulē cubitalis longitudinis gerit  
Paulò minorem, aut rursus ampliorem: ab  
hoc

Aestate pendēt folia, donec multa hyems  
Sarmentitiam deducat hęc ad imaginem, &  
Deiecta, & exicata depereant gelu.  
Adnata radici tamen cernēs alia.  
Aestate florem fert colore lacteo,  
Multum tenuem, variūque valde, cauli  
culus.

Ad quem sequitur semen penitus sic exiguū,  
Visum ferē vt fallens, oculos quoque effu  
giat.

Odorem habet radix at indē acerrimum,  
Verò similem quā maxime nasturtio.

Huc illud etiam accedit, quod Galenus  
item loco citato, Hygieni Hipparchi auctorita  
te, Iberidem, & Lepidium idem esse testatur  
his verbis. Si coxendicum dolores leuare est  
animus, herbam Iberidem, quam aliqui lepi  
dium vocant, aut nasturtium syluestre colligito. *Iberidica  
put addi  
tissimum.*  
Ex cuius ceret sententia asserere non dubita  
rim, Iberidem apud Græcos eandem esse cum  
Lepidio. Vnde perspicuum est, hoc Iberidis ca  
put huiusce primi voluminis calci accreuisse ni  
mia vel librarium, vel medicorum curiosita  
te. In quam sententiam cum antedictis causis,  
ea ratio me potissimum deducit, quod constat,  
huius primi voluminis calcem, non esse legiti  
mum locum, in quo Iberidis historia fuerit col  
locanda: quandoquidem eiusmodi herbas Dio  
scorides libro i. i. ordinatè disposuit, ac de eis  
differuit, vbi priuatim Lepidio, quod Damocra  
ti Iberidem existimamus, propriam assignauit  
sedem. Idcirco rectè Paulus Aegineta Lepi  
dium Iberida etiam appellari scribit, & ex ter  
tio exalfaciendum ordine esse, ac nasturtio vi  
ribus proximum. Et libro i. i. in ischiadis  
curatione: In totum, inquit, ischiadicos resti  
tuit sanitati iberidis herbæ vsus, quam lepidiū  
quoque appellant. Quare aperte hallucinari de  
prehenduntur monachi illi uenerandi, qui in  
Mesuem commentarios scripsere, cum expres  
se contra Galeni, & Pauli auctoritatem, & con  
tra rationes, quas superius adduximus, aliud à  
lepidio iberidē esse contendant. Quos tamen  
excusatos habeo, vt potē, qui fortasse maius stu  
dium rebus diuinis impenderint, quam vt cer  
tam simplicium medicamentorum cogniti  
onem assequi potuerint. Ceterum non ignoran  
dum est, paulum præter Iberidem, de qua nūc  
agimus, alterius etiam meminisse ab illa longē  
diuersæ, eiusque item vsum ad ischiadas com  
mendasse. Quod eius verba demonstrant, quæ  
eodem loco ita sonant. Quæ verò apud nos  
Iberis fructuosa nascitur similis lauri folijs,  
& mul

*Monacha  
rum la  
psum.*

*Iberis al  
tera Pan  
lo.*

& multò amplioribus, respondere multa experimenta testantur, non solum in coxarum, sed in aliis quoque diurnis affectibus. Huic planè adtipulatur Lepidium, quod Plinio lib. x. x. cap. v. i. i. his paucis describitur. Exit lepidiū in cubitalem altitudinem, foliis laurinis. Quibus sanè notis suis apparet, hoc secundum Iberidis genus, vel lepidij dicamus, quod lauri folia mittit, eam esse stirpem, quæ hodie passim in hortis frequens nascitur, à quibusdam Piperitis ob vehementem eius acrimoniam dicta. Itaque manifestè aberrarunt viri aliqui clarissimi Barbarus, & Ruellius, cum lepidium illud esse putauerint, quod vulgus herbariorum Raphanum rusticorum appellant. Veruntamen folia, quæ huic raphano infant, verbasco maio-

ra, & helenio æqualia, manifestè declarant, his legitimum non innotuisse lepidium, nisi forsitan lepidium Raphani nomine acceperint. Plantæ, quæ ἰβυρία, καρύδα, μαρτίνου, καὶ ἀργυροδρόσου Græcis dicitur, nomen Latinum est Iberis, & Lepidium: Arabicum, Seitaragi, Asceitaragi, seu Sitharegi, & Hauslab: Italicū, Iberide, & Lepidio: Germanicum, Vuilder krefz: Hispanicum, Nasturtio montesino: Gallicū, Chasse rage, Passe-rage, & Nasturt sauvage.

† Quod caput hoc de Iberide accreuerit in Dioscoride, eique adscriptum sit, illud maximè corroborat rationes in commentario allatas, quòd reperti sint vetustissimi Græci codices, in quibus hoc caput non legebatur.

## LIBRI PRIMI FINIS.

Barbari,  
& Ruell.  
lap/iss.



PETRI ANDREAE  
MATTHIOLI MEDICI  
Senensis Commentarii,  
IN LIB. SECVND. PED. DIOSCORIDIS  
ANAZARBEL, DE MEDICA

MATERIA.

\*.\*



**N** PRIMO, charissime Aree, libro, quem de medicinali materia cōdidimus, de aromatis, oleis, vnguentis, arboribus, & nascētibz ex eis succis, lacrymis, seminibusque differuimus. In hoc autem secūdo de animantibus, melle, lacte, adipe, frugibus, atq; oleribus explicabimus, subnexis herbaceis, quæ acri prædita sunt facultate, vtpote quæ cum ipsis cognatione iuncta sint: qualia allium, cepa, fīnapi intelliguntur. Idque ideo, ne cognatorum vires disiunxisse videamur.

ECHINVS MARINVS.

CAP. I.

MARINVS Echinus stomacho, vtrique utilis est: urinam cit. Huius testa cruda inasata commodè medicamentis admiscetur, quæ pforas abstergunt. Cremata: verò cinis sordida vlcera expurgat, luxuriantem carnem reprimi.

*Echini marini confectio.*

ECHINVS marinus norissimus est, iis præsertim, qui in Italia tam Tyrsheni, quam Adria

tici litora accolluat. Ingentem Echinorum numerum videmus nos, dum placidis mare ageretur vndis, in alueo magni portus Ciuitatis veteræ in Romano litore, nigris horrentibus spinis. Alios verò vidi ex Firano Istriz oppido



allatos, his longè maiores, purpureo colore suffusos, quos Echinometras appellauimus, quod scripserit Aristoteles libro 1111. de historia animalium capite quinto, hos ceteros magnitudine excedere. Habentur circa Toronem Echini marini candidi testa, spina, & ouo: augeri forma productiore, quam ceteri, soliti spinis paruis, non rigidis, sed mollioribus. Genera (vt idem inquit) Echinorum plurima sunt. Primum, quod cibo idoneum est, in quo, quæ oua appellantur, magna, esculentaque consistunt, pariter in maiore corpore, & minore, nam nouelli adhuc, paruique pleniufculi illis constant. Secundum, ac tertium spatagi, ac brissi, quæ genera pelagia sunt, raræque inuentu. Ad hæc, quæ Echinometra appellatur quasi (matrem

utrem, aut matricem dixeris echinorum) quæ  
quidem omnes magnitudine excedit. Genus  
item aliud est minutum, spinis longis, prædu-  
risque, gigni in alto gurgite solitum, quo non-  
nulli ad destillationes vinæ medicamentæ uti-  
tur. Quo fit, ut Paulum Iouium planè aber-  
rasse crediderim: quippe qui suo de Romanis  
piscibus libello, Echinometram Aristoreli de-  
stillationibus vinæ opulari, non autem hu-  
iusce minuti genus, memorie prodiderit. Corpus  
Echinis cibani forma visitur, priore, atque  
nouissima parte spissum, & continens: cætera  
verò non continuum, sed simile latens, cui  
non obducta membrana est. Omnium maximè  
à natura muniti sunt, vixit qui testis vindi-  
que spinis circumuallata celeratur, quibus vtun-  
tur petinde ac pedibus: iis enim nitibandi mo-  
uentur, sedemque permutant, cuius rei argu-  
mentum est, quod semper algam spinis imple-  
xam gerant. Euenit autem, ut quod caput ap-  
pellant, & os, echinis verum in terram sit:  
quod verò ad excrementi exitum deputatum  
est, id supra habeatur. quod idem omnibus  
turbinaris, parcellisque euenit: passus enim de  
imis petatur necesse est. Vnde fit, ut os inuer-  
sum ad passum sit, excrementum verò supe-  
rius parte prona testæ contineatur. Dentes  
quini Echinis omnibus sunt, cavi intrinsecus:  
inter quos caruncula quædam interiacens lin-  
guæ officij fungitur, mox iungitur gula, de-  
inde venter in partes quinque distinctus, per-  
inde ac si plures numero venteres hoc animal  
habeat: sunt enim omnes distincti, plerique  
vacantis materie, & ex vno stomacho depen-  
dent, in vnamque ostium excrementi fini-  
unt. Caro echinis circa ventrem nulla, si-  
cuti in vniuerso corpore. Sed quæ oua ap-  
pellantur, numerosiora testæ adherent, mem-  
braulis singula obuoluta, & paribus distin-  
cta intervalis: nigra etiam quædam circum  
ab ore fusum sparguntur, nomine adhuc nullo  
appellata. Sed cum non vniua, sed plura ge-  
nera Echinorum sint, omnium partes quidem  
eas omnes sortiuntur: sed oua appellata, nec  
omnes cibo idonea, & parua admodum con-  
tinent, exceptis iis, qui vadancolant. Tradunt  
fructum maris Echinus præfigere, correptisque  
operiri insipillis, mobilitatem pondere stabili-  
tes. Quod vbi videre naurici, statim pluribus  
anchoris nauigia infirant. hæc ex Aristotele.

*Echinorij  
Gires ex  
Galen.*

*Nomina.*

Meminit vniusque Echini Galenus, marini,  
scilicet, & terrestris vniuo tantum capite li-  
bro x. simplicium medicamentorum, sic  
inquiens. Erinacei vniusque tum marini,  
tum terrestris corpus totum vltum cinerem  
efficit facultatis tum extergentis, tum dige-  
rentis, tum derahentis. Itaque eo quidam  
& ad excrecentia, & ad fordida vi sunt vlcera.  
Animal, quod hæc dixerit Græcis, Latinis  
Echinus marinus appellatur: Hispanis, Erizo-  
de la mar: Italis, Riccio marino, Gallis Heri-  
son marin.

HYSTRIX ECHINVS  
TERRESTRIS.



ECHINVS TERRESTRIS CAP. II.

TERRESTRIS erinacei corium  
combustum alopecii cum pice liquida  
aptissime illinitur. Alsicatum corpus,  
& cum aceto mulsio potum renum vi-  
tiis auxilio est: item aquæ, quæ cutem  
subiit, consulsionibus, elephanæ, &  
malè habitis, quos cachectos vocant:  
viscerum fluxiones exiccat. Eiusdem  
tecar scitili folibus excocto arefactum,  
ad eisdem vsus vtilissimè reconditur.

TERRESTRIS Erinaceus vulgaris noti-  
tia animal in Italia est. Duplici collat genere, ca-  
nino scilicet, ac fusillo, quemadmodum & talus.  
Differètia dignoscitur ex eorū rostro. Id namq;  
alii suillum, alij verò caninū habet. Rarè ex ca-  
ueris excutit, nisi noctu. quo fit, ut nocturno tē-  
pore à venatoribus pierung capiantur. Mature  
scetibus vuis per ellatè, & autumnū vineas pe-  
runt, vbi ad vuas, quæ solū attingunt, accedentes,  
acinos pedibus diducunt. His cōstratis in terra,  
in orbē se conglomerant, & super eo se volutāt  
itaq; spinis arctos portant in se, eum. Eodemq;  
actu syluestrium arborū poma à vennis decussa,  
aut maturitate decidua, in cauas arbores gerūt.  
Inter quadrupes solus Erinaceus volarilium  
more testis renibus herētes habet, quæ propter  
velocissimè coit, non quidè aliorum quadrupe-  
dum more superuenies, sed erectus cōiungitur  
propter spinas. Vbi præsentē venant, statim in  
globū se cōtrahit, ne quid cōprehēdi possit pre-  
ter aculeositaq; oblatrātes deludit canes. Affi-  
si conglomerato aqua, illico soluitur, & ingre-  
ditur. Frigidū tēperamentū animal Echinus est,  
excrementis cōpūribus redundans, quibus aculei

*Echini ter-  
restris con-  
sideratim.*

*Echini ter-  
restris si-  
cut.*

nutriuntur. Idcirco eius carnes in medicamēto-  
rum potus, quā in ciborū vsu sunt expetendæ:  
terrestres enim cum sint, agrè concoquantur,  
& minimum sanè præbent alimentū. Vires longè  
plures iis Echino reddidit Rasis libro de sexagin-  
ta animalibus. Verumtamen quoniam illa, quæ ibi  
leguntur, potius apocrypha, quā fide di-  
gna semper existimant, ideo hic ea adnotanda.




*Hyfrici  
mentis.*

non duxi. Cæterum qui sunt harum rerum cupidi, eo se conferre poterunt, ubi diffusus tractantur. Erinaeorum generi adscribitur. HYSTRIX, quod forma sit illi non ab similibus, quanquam corpore longe maiori: quoniam & longioribus aculeis, finis, tenuissimæ mucronatis undequaque riget: in specubus moratur, & non ita magis, quam interdiu ad pascua exit. Latet hoc animal hyeme in cauernis, ut versus, totidemque diebus fert vtero foetum. Irata hystrix intendit cutem, & tunc suos iaculatur aculeos. Quo fit, ut non modo canes, sed quandoque venatores feriat. Combusti cinis potus (ut Plinius est auctor) partus conceptos continet. Animal, quod *hystrix marina* Græco sermone, Echinus terrestris Latino vocatur: Arabico, Cusud, siue Caused: Italico, Riccio terrestre: Germanico, Hechel, aut Ygel: Hispanico, Erizo: Gallico, Herisson.

# HIPPOCAMPVS. CAP. III.

HIPPOCAMPVS marinum animal est exiguum. Cuius cremati cinis exceptus cum liquida pice, aut axungia, seu amaracino vnguento illitus, alopecias replet.

## HIPPOCAMPVS, LOCUSTAE GENVS.



## HIPPOCAMPVS, EQUVLVS MARINVS.



*Hippocampus  
per confide-  
re. Inter  
opinionem.*

QUANQVAM non desunt scriptores, tam inter veteres, quam recentiores, qui in locustarum genere Hippocampus recenseant, quique

ad multos in medicinis vsus eum commendent, eorum tamen hæcenus reperi neminem, qui peculiaribus notis eius historiam tradiderit, effigiemque exprompserit. Cæterum sunt, qui credant, Hippocampus id nominis sibi astutissimè ab erucis, quæ in hortis olera, in campis verò herbas vniuersas, & arborum frondes depascunt, quasque propriè Græci *ἀκρίαι* vocant, quippe quod illis fortasse forma, ac facie sit permixtis. Ad hæc non desunt, qui Dioscoridem mirentur, quod scripserit, Hippocampus exiguum animal esse, cum tamen nomen plerumque magnitudinem innuat: *hystrix* enim Græcis grande significat, ut hippofelinum, hippolapathum, hippomarachnum clarissimè demonstrant. Veruntamen non ob id Dioscoridè impugnandum existimant, nec pariter alios, qui de eo idem scripsere. Quoniam licet comparatum hoc animal marinis beluis, aliisque in aquatilium genere grandioribus, paruum videatur, si tamen eo erucarum generi comparetur, quatum imaginem, formamque reddit, & à quibus nomen accipit, grande sanè fuerit. Vnde inclinavit quandoque animus, cum esse Hippocampus, qui piscatoribus Aquileiensibus vulgò vocatur Faloppa. Corpus huic inest locustæ modo in longitudinem protensum: capite, & ceruicè oblongis: chelis minimè bifidis, sed acutissimis solidisque aculeis rigentibus: pedibus sexdenis, quorundecem, qui circum os habentur, scorpionum caudas extremitatibus referunt, cæteri verò ut in locustis spectantur. Cornua capite gerit sex, quorum postrema in latus funduntur. Dorsò est flexuoso erucarum modo, adeò ut in sicco earum ferè modo perambulet. Caudam gerit latam, alis pluribus se pandentem, rigentibus undique aculeis, maculis duabus purpureis naturæ artificio insignitæ: adeò ut his notis quasdam villosas erucas referat in nigro rufescentes, quæ pari forma sub terra degunt in hortis, & agris, olerum, & segetum radices erodentes. Has Tridentina rura vocant vulgò Cagne, Ananienfes verò, quod villosæ sint, Orsolane. Qua appellatione planè videtur vulgus illud secum Columellam, qui has erucas hirsutas nominat. Proueniunt hæc in Tridentino agro frequentissimæ, excuntque è terra plerumque imbrum tempore: nam quæ prope herbarum radices in cauernulis se condunt, faciliè aquarum ingressu suffocantur. Quapropter olitores iis venantur aduenientibus pluuiis, irrigantque hortos, ut postea executionibus mortem inferant. Quo fit, ut, si vera referunt, qui dicunt, Hippocampus è locustarum genere esse (id enim videtur inter antiquos fateri Plinius lib. x x x i. cap. x i. & inter recentiores Marcellus Dioscoridis interpretæ) nullum aliud marinum animal sese offerat, quod illud magis referre valeat, quam id, de quo diximus. Sunt & alij, qui pro certo velint, Hippocampus esse pisciculum illum, vel porius marinum monstrum, qui quibuscumque Dracunculus, aliis verò Equiculus marinus vocatur, cuius nullus in cibis

*Prima  
opin.*

*Opinio al-  
tera.*

in cibis vsus, flexuosum equum Hippocampum verentes. Visitur plerunque hic in piscariis foris inter minutiores pisciculos, semidrantali longitudine: capite porius draconis, quam equi: rostro anteriori parte prebante, pectore arcuato, gibboso dorso, duplici utrinque aculeorum processu, rectis lineis à capite ad caudam vsus. Gerit & in capite spinas adeo sursum porrectas, vt crassa speciem præbeant, nec disparibus aculeis torquis in modum colum præcingitur: è quibus alia oritur aculeorum series medium interfecans pectus, duorum media, quæ utrinque latera transcurrunt. Cauda illi tenuis, & vni modo reflexa. Horum opinionem, sicut & aliorum, cum rationibus, aut auctoritatibus comprobem, cur item contra reprobem, sanè non habeo, cum hæcenus nusquam in probatissimorum auctorum monumentis legerim, qui per notas ipsum delineauerit. Nam est Plinius libro x x x v i. cap. v. dum Praxitelis, & eius filij Cephefodori admiranda percurrit marmora, videtur asserat in maxima dignatione Cn. Domitij delubro in circo Flamminio Neprunum, Therim, atque Achillem, Nereidasque supra delphinos, & hippocampus, cum tamen hæc poetica fabulosaque sint, nullam certe iis adhibendam esse fidem existimaui. Multa enim & pictorum, & sculptorum adhuc extant figmenta, vbi locis innumeris marini visuntur equi piscium in morem nanantes, quibus tantum equina sit facies, reliquum verò corporis partim numerosis squamis contextum, aliisque perquam amplis ad narandum munitis piscium modo, partim verò serpentis instar prælongum ac sinuosum, magna quidem, non parua corporis mole. Quod si fabulosa sequamur, hos facile Plinio Hippocampus esse probabitur. Quare potius dixerim ea, quorum historia ignoratur, omnibus fuisse, & esse cognitu difficillima, cum alias consuecturis tantum agatur. Hippocampi vires recensuit Galenus libro x i. scilicet piscium medicamentorum, sic inquit. Et Hippocampus animal illud marinum sit totum visceris, alopecii prodesse prodictum quibusdam est, ipsūque videlicet desiccantis esse facultatis, & tenuium partium, aut certe eius cinerem: quem quidam vnguento amaracino commiscunt, quidam pici liquida, alij veteri adipi suillo. hæc Galenus. Cæterum longè alias Hippocampi vires retulit Aelianus libro x i. cap. i i i. de historia animalium: cuius verba hic subiiciam. Rei piscatorie ritè periti

Hippocampi vires ex Gal.

Hippocampi vires ex Aeliano.

homines dicunt Hippocampi ventrem in vino decoctum si quis dederit culpiam bibere, eam primò ex ea potione acerrimè singultu affici, deinde tussire, & sicca quidem tussi vehementer torqueri. At enim nihil excreare, sed & superiorem ei ventrem intumescere, & calidos vapores in caput sursum effleri, ac inde per nares minutatim defluere, & pusculentum odorem reddere, simul & oculos eius sanguine suis


fusos ignei coloris flagrantia laborare, & eorumdem oculorum genas inflari, & vomendi quidem cupiditate ardere ferunt, verum n hil emittere. Quod si natura euicerit, hunc tamen, periclitata prius morte, in obliuionem, & dimentiam incurrere. Sin in venrem inferiorem delapsam fuerit, ipsum omnibus iam membris caprum è vita excedere. Ex morte porò qui euadunt, mente capri aquam summo studio persequuntur. hanc enim ipsam idcirco expetunt aspicere, tum stillantem audire, quòd sanè eis ægritudinis leuacionem afferat. A summo conciliet. Itaque ad perennes fluuios, per ad litora, aut iuges fontes, aut lacus commorantur: nec eis gratæ sunt, & iucundæ: cum tamen non magnopere desideret bibere, sed ipsam natam, & pedes aqua alluere eis pluit, tum in conditiis adsert. Sunt qui non hæc mala dicant: huius bestie ventrem creare, sed Hippocampus algam acerbissimam, ex qua ita afficitur, depasci. Veruntamen solertia veterani piscatoris, & ad res maritimas bene prudentis, salutaris etiam repertus est Hippocampus. is & Cretensis erat, & filios admodum adolescentis piscatores etiam habebat. Accidit autem, vt hic piscator Hippocampus simul cum aliis piscibus caperet, & peradulescentes à rabida canicula morderentur. Cum eorum in Methyna Cretensi ad litus iacentium vicem dolentes spectatores interficiendum caniculam censerent, & illius secur medicamentum ad rabiem edendum iuuenibus dandum esse, alij consulerent à Diana salutem petendum esse, senex piscator eos de consiliis, quæ afferrent, laudatos dimisit, & Hippocampus exenteratorum alios assos eis comedendum dedit, alios in acetum & mel contriuit, iisq; morsus vlcera obligauit, atque hominum adolescentium rabiem viciit, eosque ad incolunitatem tandem restituit. Hæcenus Aelianus de Hippocampi viribus. Hoc animal vt Græcis *ἵπποκαμπος*, ita etiam Latinis Hippocampus appellatur: Italis pariter Hippocampo.

PVRPURA, BUCCINA,  
GIONIA. CAP. IIII.

PVRPURA vsta exiccat, dentes abstergit, excrecentias in carne cohibet, vlcera purgat, & ad cicatricè perducit. Eadem præstant concremata Buccina, sed vehementius vrunt. Si quis salis plena fictili crudo adurat, dentifricio conueniunt: ambustis vtiliter illinuntur, quibus solui medicamentum non oportet: nam posteaquàm vulnus cicatricè duxerit, ipsum in testæ modum induratum, sponte sua decider. Fit etiam calx è buccinis, vt in eius mètione demon-

strabimus. Cionia vocantur purpurarum, buccinorumque mediæ partes, circa quas testæ volumen clauiculatim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem purpuris, buccinisque facultatem vrendi consequuntur, quoniam apprimendi naturam obtinent. Buccinorum carnes origratæ sunt, & stoma-cho vitæ, sed alium non molliunt.

PURPURAE. BUCCINA.



*Purpuræ* SVNT & Purpuræ marini pisces, eius sine generis, quæ testâ integuntur. Hæ (vt auctor est Plinius lib. 1 x. capite x x x v i.) illum purpuræ præfatis florem retinent, purpureum propriè dictum, tingendis regum vestibus expetitur. Hunc in mediis faucibus gerunt, candida quadam vena conclusam, colore nigricantis rosæ pellucidum. Vivas capere contendunt, quia cum vitâ sua succum illum euomunt. Latent circa canis ortum tricenis diebus. Congregantur verno tempore, mutuoque attritu lentorem cuiusdam ceræ saluant. Lingua Purpuræ digitali longitudine, qua pascitur perforando reliqua conchylia: tanta duritia aculeo est. Capiuntur autem purpuræ paruulis, rarisque textu veluti nassis, in alto factis. Inest iis etia, cluissæ, mordacisque conchæ, quales miculos videmus, has semineces, sed redditæ mari audio hauri reuolutescent, appetunt purpuræ, porrectisque, linguâ infestant. At illæ aculeo extimulata claudunt sese, comprimuntque mordentia pendentes auisitate sua purpuræ tolluntur. Aqua dulci necantur, & sicubi flumini imine: guntur: alioqui captæ diebus quinquagenis viuunt salua sua. Anno magnitudinem implent, celerimque crescant, quemadmodum & conchylia omnia. Est in purpurarum genere & Buccinum ad minutudinem eius buccini, quo sonus editur: unde & causa nomini, & rotunditate ois in margine incisâ. Sed maior est purpura, cuniculatim procurrente rostro, & cuniculi lazere inuoriss tubulato, qua proferendum lingua. Cui circum orbis aculeati, qui buccino non infunt, sed vrisque orbis toridem, quot habent annos. Buccinum non nisi petris adhaeret, circaque scopulos legitur. Pur-

puræ, buccinæque simul, quemadmodum & reliqua conchylia genera longa sanè narratione scriptis celebrata sunt ab Athenæo. Ad eius igitur volumina accedant ipsi, qui plura scire desiderant. Sed quoniam

MARGARITARVM CONCHA.



MARGARITAE, quæ non modò ad mulierum, hominumque decorem, sed etiam ad medicamenta maximo luxu expetuntur, à marinis & ipsæ gignuntur conchis, hic inter pretiosâ conchylia eas recensere nò ab re fore diximus, præsertim quòd neq; Dioscorides, neq; Galenus de his quicquam, quod legerim, posteritatis memoria prodiderunt. Nasti itaque animalia, quæ margaritas gignant, in oceano Indico refert Plinius libro 1 x. capite x x x v. Fertilis admodum carum est Taprobane, & Torois, item Perimula promontorium Indiæ, circa Arabiam in Persico sinu maris rubri. Origo, arque genitura: conchas est haud multum ostracarum conchis differens, vt liquidò constat ex iis, quas nostri vulgò Madriperle appellant, quæ ad nos deferuntur. Has vbi genitalis anni stimulae rit hora, pendentes sese quadam oscitatione impleri in osido conceptu tradunt, grauidas factas postea entis, partumque concharum esse Margaritas, pro qualitate, rois accepti. Nam si purus inflexerit, candorem conspici: si verò turbidus, & fortuni fordescere: eundem pallere calido minante conceptum. Et ex eo quippe constare, & celiq; eis maiorem societatem esse, quam maris. Inde nubium trahi colorera, aut pro claritate matutina se: enim: si tempestiue fatientur, grandescere & parcus: si fulgure, comprimi conchas, & pro ieiunij modo minui. Si verò & tonneris, pauidas, ac repente compressas, quæ vocant Phylasma efficere speciem, verum inani inflatum sine corpore. Cæterò in aqua molles sunt Margaritæ, at exemptæ protinus durefunt. Quidam tradunt, sicut apibus, ita concharum examiniibus singulas magnitudine, & vetustate præcipuas esse, veluti duces, miræ ad cauendum soleritæ. Quocirca has summo studio percutunt vrinantes pilatores: siquidem capta rege facilius cæteras palantes resibus includunt. Concha ipsa cum manâ videt caprio sum, compri

comprimit sese, operietque opes suas gnata propter illas se peti, manumque se praeruenat, acie sua abscondit, nulla iustiore pena, & aliis munera supplicis. Captae multo obruuntur sale in vasis fictilibus: namque erosa carne, vniones, siue margaritae purae, & expurgatae decidunt in ima vasis. Dos omnis in candore, magnitudine, orbe, lauore, pondere, tametsi raræ admodum sint Margaritæ, quæ his omnibus dotibus præfiant. Tradit Iuba Arabice concham esse similem pestini insecto, hirsutam echino: um modo, inesseque illi Margaritæ grandini similem. In conchis quatuordecim, aut ad summum quinque vniones reperiunt Plinius scriptum reliquit. Verum Americus Vesputius, qui nostro ævo libris multis omnem ferè australem oceanum explorauit, talem ibi concham se quandoque habuisse testatur, in qua vniones ultra centum, & triginta reperiuntur. Quod non modò confirmantur, qui post ipsum ad occidentales Indias nauigauerunt: sed etiam addunt numerosiores ibi vniones in vna tantum concha nasci: præterea alia plura de Margaritarum historia referunt, quæ à Plinij sententia plurimum differunt. Porro certum est & nasci, & capi margaritas in oceano occidentali Scoto, & Anglico sinu, sed eas quidem paruas, nec adeo pellucidas, vt orientali- bus comparari possint, è quibus contextu thoracem afferunt, quem Diane templo Iulius Cæsar dicauit. Ad hæc non in mari tantum, sed etiam in fluminibus aquæ dulcis conchæ proueniunt, quæ margaritas gestant. Huius autem rei ego quidem testimonij perhibere possum, quòd iam mihi in Bohæmia degenti comper- tum sit in Vuoraua, flumine & reperiiri & capi conchas, quæ pulcherrimos includunt vniones, magnitudine, forma, & candore præstantes. Atque certè mihi subit quandoque mirari, cum earum margaritarum copiam vidi tum apud Scenissii. Principem dominum meum, tum etiam apud primarios Bohæmici homines. Margaritæ in medicum etiam vsum veniunt: quandoquidem scribunt Serapio, & Auicenna, eas ad cordis affectus præcipuam opem ferre. Quin etiam collipitis admixtis oculorum nubes- culas detergere, & aquam eò defluentem absumere. Animal, quòd *πυρρα* Græcè, Purpura Latine nominatur: Arabice Naporam, & Porphyra: Italice, Porpora. Quæ verò Latine Buccina, nuperrimè Græcis dicuntur: Arabibus, Barcora, Cobros, seu Cobron: Italis, Buccine: Hispanis, Bozios: Gallis, Cornetz: de Pourpre. Cæterum quod Græci *μαγαστρας*, Latini item Margaritas & Vniones vocant: Arabes, Hageralbat: Itali, Perle: Germani, Perlin: Hispani, Perlas.

lorum medicamentis cum melle vtiles habentur: palpebrarum crassitudine absumunt, albugines purgant, & cætera, quæ oculis caliginem ostendunt. Carnes eorum ad canis morsus vtiliter imponuntur.

## TELLINAE.

## CAP. VI.

RECENTES Tellinæ aluo vtiles, sed maximè ius earum. Salitæ vruntur, tritaque in cinerem, & cum cedria instillatæ, anulos palpebrarum pilos renasci non patiuntur.



Nō s̄ desunt, qui Mitulos, & Tellinas idem esse censent. In quam sententiam potissimum venisse comperio Paulum Iouium virum ap- primè eruditum: quippe qui libello, quem de Romanis piscibus edidit, malit (etsi medicus esset) cum Athenæo errare, quàm cum Dioscoride rectè sentire. Ex cuius scriptis satis apertè constat, aliud esse mitulos, aliud tellinas: nam præterquam quòd de his duobus diuersis capitibus ipse differuerit, differentes etiam vtresque reddidit dotes, haud nescitis illis inesse differentiam. Idem similiter fecit Galenus libro x. i. de simplicium medicamentorum facultatibus, vbi de viperis differens, eodem capite mitulorum etiam meminit, tellinarum verò peculiari capite, singulis proprias, & diuersas reddens facultates. Non secus ac illi, sensit Paulus Aegineta, fidelis nempe vtiusque sectator. Quamobrem dicendum putauerim, differentes nimirum esse mitulos, & tellinas. Notissimæ sunt in Italia Tellinæ, præsertim Romæ, vbi plurimæ venales circumferuntur, quòd edendo sint, & ori admodum gratæ, si tamen ab arena optimè repurgentur. Cæterum quales Mituli sint in Italia, qui hac nostra tempestate explicauerit, haecenus nueni neminem. Præter vnum Massarium Venerum, qui eos mitulos putat, quos Adriatici accolæ vulgò appellant Muscioli, quasi musculos dixerint. Guinus opinio nobis maximè probatur: quippe quòd & forma, & nomine cœchylia ita vocata legitimos referat mitulos. Sunt enim tellinis paulo maiores, testa exterius lineis quibusdā sca-  
bra

## MITULI.

## CAP. VII.

MITULI laudatissimi in Ponto. Cremati eundè buccinis effectum præbent. priuatim plumbi more eloti, ocu-

bra: intus verò pellucida, & tota pondere levis. *Nuxius* ita Græcis, Mituli Latinis appellantur, pariter & Italici: Arabibus verò, Amarchas: Hispanis, Mixillus. *Taxius* ut Græcè, ita etiam Latine Tellina, & Italicè Telline dicuntur: Arabicè, Sedes, & Talfam: Hispanicè, Brigniois, Gallis espece de Moules.

CHAMÆ.

CAP. VII.

CHAMARVM, aliarumque conchylarum in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet. id cum vino assumitur.



*Chamarum  
considera-  
tio.*

QUANQVAM Chamæ inter cætera conchyliorum genera longa descriptione ab Athenæo referuntur, nihilominus tamen tot huiusmodi testaceorum habentur species, ut non facile sit, eas inter se distinguere. Cæterum præter cæteras conchas, id sibi peculiare ascribere Chamæ, quod peruenire in litore hiantes inueniuntur. Idcirco eas rectè Chamas dici posse putauerim, quæ in marinis oris, pendentes sese læui testa connectæ reperiuntur. Harum quàm plurimas ipse vidi in Adriatici litore. Verùm quoniam nulla alia facultate sunt præditæ, præter eas, quibus & reliquæ concharum genera commendantur, ideo non est, ut plura de his dicamus. Quæ Græcis *χάμας*, Latinis Chamæ, Arabibus Hame, & Italis Chame nominantur.

VNGUIS ODORATVS.

CAPVT VIII.

VNGUIS, siue onyx conchylis tegumentum est, ei simile, quo purpura integitur: quod in Indiæ nardiferis paludibus inuenitur, suauem ideo spirans odorem, quod conchyliis inibi nardi pabulo vescantur. Colligitur postea, quàm stagnantes aquæ æstius squaloribus inaruerunt. Laudatissimus qui à rubro mari defertur, candicans, pinguis. Babylonicus nigrescit, atque minor confpicitur. Ambo odoris gratia suffiuntur, sed aliquidatenus castoreum oïent. Iidem suffitu excitant fœminas vuluæ strangulatu oppressas, comitialēque: poti ventrem molliunt. Crematum conchylium eadem efficit, quæ

purpura, & buccinum.

VNGUES ODORATI.



QUI diligenter caput hoc de vnguibus odoratis legunt, & expendunt, non ab re fortasse mirantur Dioscoridem, quod scripserit, onyches, id est vngues odoratos in Indiæ nardiferis paludibus inueniri. quando nusquam à veteribus & recentioribus memorari proditum sit, nardum in paludibus nasci, sed in montibus, arido & sicco solo. Admirationi suæ illud non obstat putant, quod memorari Dioscorides, Indici nardi genus esse, quod Gangitis vocatur, à fluuio Gange, apud quem enascitur, montem præterfluente. Neque enim volunt eam nardum in fluuio illo, aut in paludibus provenire, sed in monte, aut infima eius parte, quæ flumen ipsum alluit. Præterea cum scribat Dioscorides, conchulas odoratas in Indiæ paludibus inueniri, illis planè absurdum videtur, quod præ cæteris eas laudauerit, quæ à rubro mari deferuntur: quod item Babylonici generis meminere. Addunt insuper, quod cum vngues isti, quorum in officinis pharmacopœorum communis est usus, si vruntur, non suauem spirent odorem, sed potius castoreum oleant, qui nimirum odor ab omnibus & iniucundus, & ingratus habetur, fieri non potest, quod odoris gratia suffiantur: præsertim quod iidem suffitu (ut Dioscorides tradit) excitant fœminas vuluæ strangulatu oppressas, comitialēque. Sciunt autem, quod qui huiusmodi morbis tentantur, ab odoratis læduntur, & à fœtidis iuuantur. Verùm quia nitimur quantum possumus pro nostra virili parte Dioscoridem defendere, & ab erroris suspitione vindicare, quid mihi illa cogitatione occurreret, nunc edisseram. In primis igitur non ita mihi mirum videtur, quod à Dioscoride scriptum sit, vngues odoratos in nardiferis Indiæ paludibus inueniri. Nam si, eodem auctore, aliqui arborati sunt, malabathrum esse Indici nardi folium, falsi quidam odoris congnatione, facile fieri poterit, ut iidem rei herbariæ imperiti paludes, quæ malabathrum gignant, nardiferas vocauerint, simili ratione decepti. Quorum fortè Dioscorides appellationem secutus, eas paludes Indiæ nardiferas nominauit, in quibus vngues odorati inueniantur. Deinde illud quoque mirum non esse debet, quod ad nos adferantur cœchula Indiæ ex mari rubro, ac Babylone. Etenim hoc

hoc non euenit, quòd inibi nascitur, sed quòd Dioscoridis tempore non secus ac nòstro, mercimonia, quæ ex India in Græciam & Italiam conuehebantur, omnia prius per mare rubrum conueherant in Aegyptum, nempe Memphis, aut Alexandria. Sed quomodo fit, dicit aliquis, quòd raræ admodum reperiantur conchulæ Indicæ, quæ suauem spirent odore, eodè nardum imitentur, atque odoris gratia suffiantur? Certè non aliam ob causam fieri puro, nisi vel quòd propter maximè locorum distantiam in longo itinere adficiunt illum malabathri odorem amittant, vt Indicæ nardo euenire libro superiori in eius mentione diximus: vel quòd ex, quæ ad nos adferuntur, in paludibus capiantur, quæ malabathro profus deficiuntur. Nam quoniam multo iam tempore malabathrum ad nos non aduehitur, faciliè adducor, vt credam id in India cultorum negligentia perisse, perinde ac balsamum in Iudæa. Quippe vt malabathrum renascatur (id quòd Dioscorides refert) necesse est, vt siccatis zeffi-uo seruo aquis, humus aridis fruticibus vratur. Quod cum ab Indis fortasse fuerit omis- sum & neglectum, faciliè possea factum est, vt inuiuerum malabathri genus omnino perditum sit. Atque adeò hinc est, vt vngues ij, qui hodie ad nos adferuntur, nullo nardi odore commendantur. Postremò illud mihi haud-quaquam absurdum esse videtur, quòd conchulæ Indicæ suffitu pressas vteri suffocatione mulieres comiciales; reuocent. Nanq, quòd fieri poterit, nos non negamus, onyches olim fuisse odoris grati atque iucundi, vt pote qui malabathrum redolerent. Sed equidem existimo odorem illum partibus ita tenuibus inhe- sisse, vt igni imposita testæ illæ statim exhalaret. Testa vel eadem relicta & incensa, quid mirum si odorem fetidum emiserit, & casto-ream oluerit? ex quo sanè (vt experientia docet) mulieres vilæ stragulatione laborantes sufficiunt. Cæterum cum onyx vnguem fi- gnificet (vnde conchula Indica vnguis odorati nomen accepit, quòd fortassis vnguis alca- ius effugium referat) ipso purpuræ tegu-mento similem fecerit Dioscorides, mihi ha-ctenus incompertum est. At certè, vt dicam quòd sentio, mihi non placet eorum opinio, qui non alia de causa hoc conchylii genus ony-chem appellari volunt, quam quòd eius tegu-mentum sit rogarum, concauitatis, asperita-tisq; experts : leuore autem, ac candore præ-dictum, humanorum vnguium modo. Siquidem purpuræ testæ, cui onychem affimilat Dioσκο-rides, in inuiuerum aculeata conspicitur: quin & inæquali, sinuosisq; cortice obducitur. Porro quòd videam vngues odoratos, qui in myropolis passim habentur, brutorum quorundam vngues repræsentare, atque si vnan-ctore calore olere, facit vt ferè non dubitem affirmare eas legitimas esse. Euchsian in suis in-

Nicolaum Myrepticum doctissimis annotationibus in compositione aureæ Alexandrina, ubi ipso vertente legitur, ossis anterioris narium purpuræ, scribit id nil aliud Nicolao designare, quam quod Actuario, & aliis posterioribus Blattium byzantium, siue bysantiis dicitur, quod in quibusdam interpretationibus in Nicolaum legatur *βαλάνιον συλφωρ ενωτον εστι γινωσκειν μαγειροις*. Quin & differre inter se ait Blattium byzantium, & Dioscoridis onychem, quod onix cōchilijs fit tegumentum, blattium autem os anterius narium purpuræ. Quod etiam confirmat libro primo de compositione medicamentorum, illud etiam addens, officinis hodie hoc os, quod in ore, sive narium purpuræ perierit, Blattam bysantium vocari. Sed longè quidem ab eo diffidet opinio nostra. Primum quod Serapiō, & Auicenna, quorum vocabula medicamentaq; tam simplicia, quam composita (vt ipsemet fateatur Fuchsius) recentiores Græci sæpius vsurpant, nil aliud designat Blattium byzantium, quam Dioscoridi onyx, Latinis vnguis odoratus dictus, ac pariter conchula Indica. Huic alia accedit ratio, quod cum hæcenus non inuenierim, qui purpuram os tam oris, quam narium (vt Fuchso placeat) siue tella earum tegumentū odore aliquo communi-dauerit, quicquē inter odoramenta recensuerit, atque antidotis inferuerit, sed qui tantum scripserint, earum crematarum cinerem exsiccare, dentes abstergere, excrescentias in carne cohibere, vlcera purgare, & ad cicatricem perducere: contra verò conlit odoratos vngues à Mauritiano præferri, quod aroma quoddam respiciat, & tenuium, atque adstringentium sint partium, ac ventriculi, iocineris, tordis, verique affectus, non modò Fuchsij, sed Nicolai quoque sententia (modò huius codex non sit deprauatus) manifestè profectò, & planè refellenda videtur. Quod autem ad hos affectus odoratos vngues prætulerint Arabes, quibus recentiores Græci longè plura accepta referunt, testis est Serapio auctoritate Meshehae, cum inquit. Conchula Indica exsiccatur, & siccatur ordine tertio: quin & adstringentis, & tenuium partium est particeps: ventriculo, cordisque palpitanti, iocineri, vulnèrūque odoris fragrantia confensus. Quo fit, vt etiam facile crediderim, Actuario nil aliud Blattium, siue blattium bysantium representare, quam Indicam odoratam conchulam, non vt Fuchsius arbitrat, os in ore, vel narium purpuræ inuentum. Misceatur itaque Indica conchula, vel eam voces odoratum vnguem, non sine magna ratione, & auctoritate à posterioribus Græcis in aurea Alexandrina, quod ad cardiacos, & viscerum morbos fit admodum vilis. Quin & in ancidoto ē margaritis, quod omnem virium imbecillitatem haurit, animi defectum siue à corde, siue à ventriculo originem ducat, maxime iuuat: longo morbo deiectione

defectus, & imbecillitate languētes recreet, & vteri strangulatas in mulieribus auertat, vt Actuarius, & Nicolaus Myrepsicus testantur. Quæ omnia odorata conchula per se ferè præstare potest, si primum eius qualitates, demum verò facultates perpenderit, quarum nullæ (quod sciam) purpuris assignantur. Quare non immerito Nicolaum damnauerim (si tamen error illi adscribendus est) qui narium purpurarum ossa excogitauerit his antidotis esse admiſcenda, cum purpuræ in vniuersum præter testam, qua contegentur, ossibus careant. Nisi forte is in purpuris narium os appellauerit, quod in anteriori testæ parte prominet, & rostri potius, quam narium speciem repræsentat. Illud præterea falsum esse deprehenditur, quod officinis hæc excogitata purpurarum ossa Elatæ bizantiæ vocentur, cum etiam quæ legitimæ in officinis habentur, propriè sint odorati vngues. Postremo quæquæ sint illæ in Nicolaum expositiones, quibus maximè nititur Fuchsius, eas nostris rationibus, & auctoritatibus adductis haudquaquam obſtare posse putauerim, cum fortasse incerti sint auctoris, vel si certi, minimè probandi, quod is rationi, ac veritati refrageretur. Nisi quis dixerit, illum contra quæ Fuchsius intellexerit, Nicolai verba interpretatum fuisse, & lectores admonuisse, nil aliud Nicolao designare debuisse, nisi *testam*, quam *Elatæ* vocantur, id est, vnguem uideantur. Siquidem cum Nicolai verba secundum Fuchsij interpretationem adeo per se clara sint, vt nulla indigeant explanatione, non erat opus, vt ille interpres ea aliter exponeret, sed potius, vt declararet, animaduersa deprauata Nicolai lectione, pro eo purpurarum osse in Nicolai antidotis Elatum byzantium, id est, Indicam conchulam admisceri debere, quod facile sciret, fabulosum esse purpuras in naso vel ore gerere ossa. Quod etiam sensisse videtur antiquus fragmeniorum Nicolai interpres: quippe qui non purpurarum ossa in aurea Alexandrina, & diagma garito sit interpretatus, sed byzantium blaram, quam odoratum vnguem esse, hæcenus nos abunde demonstrasse existimamus. Huic nomen Græcum est *κνέφ*: Latinum, Vnguis odoratus, & conchula Indica: Arabicum, *Arshar ateb*, aut *Adhar althab*: Italicum, Vnguita odorata.

Nemina.

## COCHLEAE.

## CAP. IX.

TERRESTRES cochleæ stomacho viles sunt, & non facile corrumuntur. Optimæ Sardonica, Africana, Astypaleica, & quæ in Sicilia, ac Chio gignuntur, & quæ in Liguria alpinis, pomatiæ, id est, operculares, cognomi-

nata. Marina stomacho idonea, & facile aluo excernitur. fluuiatilis virus olet. Quæ verò vepribus, frutetisque



glutinata cohaeret, quam vocant nonnulli fesiſion, Ventrem, & stomachum turbat, vomitiones excitat. Crematæ omnium testæ excaſiendi, & vrendi naturam fortiuntur: purgant lepras, vitilignes, dentresque: emendant oculorum cicatrices, & vitia cutis in facie, albugines, ac viſus hebetudines, si cum carne sua vſta, tritaque ex melle illinantur. Cruda cum tegumentis imposita, aqua inter cutem tumores exungunt: sed non ante ſoluantur, quam omnis hauriatur humor. podagricas inflammationes leniunt: impactos corpori aculeos illitæ euocant: menſes trita, & admotæ ciunt. Carnes earum cum thure, & myrrha illitæ, cum vulnera alia, tū maximè quæ nervi acceperunt, conclutinat: trita in aceto, sanguinem naribus erumpentem inſtruant. Viuæ corpus, & præſertim Africana, cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat. trita cum testa, vino, & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli vſicæque cruciatus sanat. Terreſtris pilos incommodos replicat, si quis abraſo aculento eius, pilum attingat.

COCHLEAE vulgò notiffimæ ſunt. Hæ *Cochlearis* licet albæ, nigraeque reperiantur, tum magnæ, confectum parua, tum mediocres, omnes tamen eandem naturam in vniuerſum obtinent. Si verò aliquo pacto inter ſe differūt, id natalis ſoli cauſæ adſcribitur: nam quæ in apricis admodum locis odoratis vſcitant herbis, iis ſine præſtant, quæ in opacis degūt, ac in paluſtribus. Id enim guſtu facile deprehenditur, quod hæc vel inſpidæ habeatur, vel paluſtrem reſpiciant limum,

illæ

illæ verò fapidiore, efuique gratiores exiftant. Quandoquidem abſinthium depaſte amaritudinem reddunt, ſicuti quæ ſerpyllum, pulegiũ, calamintum, origanum, aliſque odoratas herbas aſſumunt, odoris gratia commendantur. In quarum numerum æquè reſſeri poſſunt, quæ paulò lupinis maiores in agro Romano leguntur, ubi autumno quorundam carduorum cauſibus acuatim coherentes innumera viſuntur. Cochleas oliu viſque ad eòs expetitis memorat Plinius libro i. x. capite i. v. i. vt iis viuaria a nonnullis fuerint inſtituta, diſiunctis quidem generibus earum, quò melius gula fieret agis: ſeparatim vt eſſent albæ, quæ in Reatinis ſar: o naſcuntur: ſeparatim Illyricæ, quibus magnitudo præcipua: Aphricanæ, quibus fecunditas Solitanæ, quibus nobilitas. Saginam quæneriam commentari ſunt ſapa, & farre, aliſque rebus, quæ eas alebant. Non me fugit, quæ Dioscorides pomarias vocat, plurimas reperiri in montibus Tridencenis, viciniſque aliis locis, & eas quidem præſantiſſimas. Erunt enim e terra hyeme in ſepibus, & frutetis, vnicis quibuſdam ferreis, prope futicum radices terra circumſoſa. Concluduntur hæ contra frigoris iniuriam, quodam albo operimento, duro, gyſſi ſpeciem referente, ſicquæ contextæ terra fe condunt. Fit enim ab hoc, vt in cibis iis longè ſuauiore, gratioresque habeantur, quæ vere, & æſtate imbribus excitatæ hinc inde vagantur. Quòd autem ſic hyeme recondantur, deſiteſcantque ſub terra circum ſuorum radices, Hæturia planè ignorat, cum tamen & ibi eodem modo ab his eruantur, qui alibi artem didicerunt. Cochleæ ſi toræ cum teſtis vrantur ( vt Galenus memorie prodidit libro x. i. ſimulicium medicamentorum ) admiſta galla omphacitide, ſimulque pipere albo, miſcicæ proſunt dyſenteris, in quibus vlcera nondum putredinoſa ſunt. Conuenit autem vt piperis ſit pars vna, gallæ vero duas, quatuor cinetis cochlearum. Hæc ubi ad vnguem leuigaris, cibis inſpergito, bibendumque, aut ex aqua aut ex vino albo, & auctore præbeto. Cæterum abſque gallæ miſtione cinis cochlearum admodum reſecantis eſt facultatis, obtinens item nonnihil ex viſtione calidum. Porro cochleæ, quæ viſionem non ſunt expertæ, ſi tritæ vna cum teſtis imponantur, & toti ventri aqua inter cutem laborantium, & in arthriticis articulorum tumoribus, ægrè quidem diueſſi poterunt, cæterum impensè deſecant. Et omnino inhiærere iſtis ſuere oportet, quoad ſponte decident. Idemque faciendum in tumoribus ex icthi natis diſſicilè ſolubilibus, & ex conſuſione facta in auribus. Deſecant enim illos magnopere vniuerſos, etiamſi viſcoſus, craſſiſque in alto humor contineatur. Idem libro citato, cum de diuerſis carnis verba faceret, ſic de cochlearum quoque carne diſſeruit. At cochlearum caro prius in mortario conuſa, ac poſtea ad leuorem redacta, omnium valentiſſimè deſecat par-

tes ſuperſuo humore grauatæ, aded vt & hydericis conueniat. Iſſurum autem humor ſolus per ſe circa carnem ſumptus ( vocatur autem iſis à multis *μύξα κελύων*, hoc eſt, mucus limacis ) thuri miſſus, aut aloæ, aut myrrhæ, aut horum quibuſdam, aut omnibus, quoad habeat cerati craſſitiem, medicamentum ſit glutinatum, deſecetque pulchrè purulentos mucus aurium: ſed & fronti impoſitum inhiærere, oculorum fluxiones reſecant. Quidam etiam ad palos eximendos vtuntur totis vna cum teſtis ad leuorem tritis: ſed & quidam ad ſiſtendos menſes. Et quidem ego aliquando in agro carnes iſſas ſolas in vulnus cum nerui vulneratione, & conſuſione factum tritas impoſui, iſſumque vulnus pulchrè glutinatum eſt, & neruus phlegmonem haud perpeſſus. Erat autem homo durus, & agreſſis: miſui tamen illis contritis pollinem farinæ acceptum à pariete mole proximo. Scribere autem maiores me nonnulli medici, ad eiuſmodi vſum miſcendum iſſi thus, aut myrrham. Verum horum habebam tum neutrum, vt qui tunc ab vrbe abeſſem in villa. Poſſis autem & reſinæ tritæ contritæ admixcere, ſi adſit, quippiam. Porro ubi multi muci cochlearum accipere voles ſcorpiſum, ſtylo carnem earum pungito. Sed non ante multos dies venatis eſſe expedit: alioqui enim tempore deſecantur. Nam recentes plurimum habent viſcoſe illius humiditatis, quem ſtylo compunctæ effundunt. Humiditas hæc pilorum in palpebris præter naturam gluten eſt, hæc Galenus. Cochleæ tum crudæ, tum coctæ cum teſtis ſuis, aut ſine, contritæ emplaiſtris concoquentibus, & ſaniem è vomice fracta cure eductibus vtiliter immiſcentur. Marizæ in Italiæ mediterraneis perquam raro in cibis veniunt: quanquam iis, qui maris littora inhabitant, frequentiori ſint vſui. Sunt & in cochlearum genere, quæ tegumento, vel teſta carent, quæ nobis ſpeciatim Lumache vulgò appellantur, noctu potius, quam interdiu ad paſcua exeuntibus. Degunt hæ non modo in campis, & hortis, ſed in cellis v nariis, & aliis vlterraneis vliginoſiſque adium locis. Gerunt in capite lapidem ( non tamen omnes ) quem febris tertianis adalligatum vulgus prodeſſe exiſtimat. At Plinius libro x. x. capite x. v. auctor eſt, hunc lapidem adalligatum denſionem facilem præſtare. Experantur hæ mulieribus ad expellendam ſaclem: namque ex iſtis in ſtillatorium vas coniectis, additis quibuſdam aliis, aquam eliciunt, qua inde earum cloaca facies leuorem meretur. Quin & his Aphricam abundare ſcriptum reliquit Plinius libro x. x. x. capite x. v. i. & eas combuſtas dyſentericis vtiſſimas eſſe, darique ex eo cinere cochlearia bina in vino myrritæ, aut quolibet auſtero. *Κελύων* vt Grecis, ita Latinis Cochleæ nominantur: Arabibus, Balzum, & Halzum, Kalis, Chiocciolæ: Germanis, Schnecken: Hiſpanis, Caracoles: Gallis, Escargots.

Cochleæ pomarias.

Cochlearia vites ex Gal.

Cochleæ marina.

Cochleæ ſcintilla.

Nomen.



CANCRI.

CAP. X.

CANCROVUM fluuiatilium exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adiecto dimidio radicis gentiana modo, triduo potus cum vino, magnopere prodest canis rabiosi moribus: rimas pedum sedisque, perniunculos, & carcinomata, cum decocto melle lenit. Triti crudi, potique ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalangiorumque morsus, atque scorpionum ictus. Decocti autem, & cum iure esitati, iis profunt, qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt. Necant scorpiones triti, & cum ocimo admoti. Possunt eadem marini, verum inefficacius omnia præstant.



Cancrorum  
considera-  
tio.

Multorum  
error.

HALLUCINANTUR, qui credunt Cancros à Dioscoride, & Galeno descriptos illos esse, quos vulgus Italorum Gambari nominat. *Gambari* enim Græcè (vt hoc loco scribit Dioscorides) non eum significat cancerum perpetuum vocatum, qui *ἀνάνης* appellatur à Græcis, sed qui rotundo corpore habetur, quem nos Hetrusci vulgari nomine dicimus Granchio. Is Venetis, vbi marinorum numerus propè infinitus habetur, vbi crustam exuerit, à corporis mollitie vulgò vocatur Mollecca. E quorum genere sunt etiam quæ appellantur Macinette: nam & hæc suo tempore crustam exiunt. Hoc ita esse testatur reliquit Aristoteles lib. 11. 1. 1. cap. 1. de historia animalium, vbi sic inquit, *ὁ δὲ καρκίνος μὲν τῶν τοιούτων ἀνθρώπων, καὶ τῶν τε τοῦ σώματος καρκίνος, καὶ καρκίνος τῶν ὀφθαλμῶν*. hoc est. Cancer solus ex crustaceis non regitur cauda, & corpus cum quidem ioculis, squillisque longum sit, cancris vidè rotundum est. Porro affascos Oppiano specie clamat dictur gammarus magnus ille marinus, quem Romani, & Tyrreni litorea incolentes Leonem appellant. Veneri autem, quasi adhuc Græcum nomen retineant, cum vulgò Affascos nominare consueverunt. Idem diuisus est gammarus à Theodoro Aristotelis interprete: quip-

pe quòd vulgaris gammari faciem repræsentent. Veruntamen (ni fallor) Aristoteli *ἀνάνης* nil aliud esse crediderim, quàm quòd Venetis affasc, Romanis verò leo nūcupatur: quòd qui de is paulò inferius postquam de marinis, quæ crusta integuntur, animalibus differuisset, videtur sanè vulgares fluuiatiles gammaros describere statim post fluuiatiles cancras, cum inquit, *ἔστι δὲ καὶ τῶν ψυχρῶν γινώσκων καὶ τῶν θερμῶν τῶν δὲ ἰσχυρῶν τῶν ἀσθενῶν*. hoc est. Genus item aliud est, quòd quidem paruum est veluti cancri, facie verò affascis simile. Hæc, meo quidem iudicio, declarant, Græcis fluuiatiliem gammarum proprio carere nomine, vt pote & paruarum cancrorum aliqua generà, vt ipse eodem loco testatur Aristoteles, cum inquit. Cæteri minores, & nullis penè nominibus annotari. Quo fit, vt putauerim ego gammaros Galenò appellari *γᾶμμαργίδας*, mutato, cum Romam venisset, à Latinis vocabulo, quòd eo careret Græci. Nanque libro 11. 1. de alimentorum facultatibus: *Ἀφᾶσκος* (inquit) *καὶ γᾶμμαργίς*: καὶ *καρκίνος* καὶ *καὶ καρκίνος*, καὶ *καρκίνος*, καὶ *καρκίνος* καὶ *καὶ καρκίνος* καὶ *καὶ καρκίνος*. hoc est. Affasci, paguri, cancri, locustæ, carides, gammarides, & id genus alia tenui testa concluduntur. Magisq; hoc asfirmare non dubitauerim, quòd nomen hoc à Galenò Græcum factū, nec apud Aristotelem, nec apud quenquam repperim vnquam. Quibus etiam ex verbis palam certè est, inter gammaros, & cancras manifestè esse differentiam. Quamobrem eos medicos hallucinari censens, qui pro Cancris ad canum rabidorum morsus, itèmq; ad tabidos, & marasmo laborantes Gammari ventunt: quandoquidem cum Dioscoridem, tum Galenum non de gammariis quidem, sed de cancris intellexisse nobis compertum sit. De cancris Galenus libro 1. de simplicium medicamentorum, hæc fusius scripta reliquit. At fluuiatilium cancrorum cinis, quanquam similiter prædictis exiccatorius est: substantiæ tamen proprietate mirificè contra rabiosorum morsum efficax est, isque tum solus, tum cum gentiana, & thure multò præstantior. Thuris sinè partè vnāq; oportet, quinque autem gentianæ, porò cancrorum decem. Et rarò equidem aliter illis vltis nos sumus vti: cæterum ad eum modum plerunq; quo Aesculion empiricus ille utebatur, medicamentorum peritissimus senex, concinis, ac præceptor meus. Patella erat æris rubri, in quā impositos cancras viuentes, hactenus utebatur, dum faciliè ad læuorem redigi possent. Hic Aesculion præcūm promptum semper in ædibus hoc habebat medicamen, vrens cancras tempore æstiuo post ortum canis, quando sol in leonem transisset, luna decima octaua. Porro bibendum hoc medicamen iis, qui à cane rabido fuissent morfi, præbebat quotidie vsq; ad diem quadragesimum, mensura cochlearij facis magni aquæ infusi sum. At si non prociuis ab initio, verum aliquot post dies curam coepisset demorfi

Cancrorum  
vires ex  
Cris.


demorſi, tunc quotidie duo cochlearia aquæ inſpergebat. Ad iſpum verò vulnus emplaſticū applicabat medicamentum, quod ex pice brutiæ, & opopanax, acetoſo conficitur, habens picis libram vnam, vnum acetū acerrimi ſextarium Italicū, opopanax verò vncias tres. Hæc tamenſi præſenti inſtituto eſſent aliena, ſcribēda tamen cenſui, quia magnopere medicamēto huic ipſe cōſiderē: nimirum cū nullum vnquā eorum, qui illo, vt dictum eſt, fuerunt vſi, ſit mortuus. Cæterum ſeorſum alterum librum conſcribam aliquando de iis, quæ proprietate ſubſtantiaæ totius quid agunt, & quorū numero ſunt id genus omnia. Ignoscēdum itaque tum hoc in loco ſcribēdi importunitati, tum ſcibi præterea id mihi hoc in opere contigit: nempe quia ex dictis ſumma proveniret vilis, quam ſine poſteris impertire volebam, ſi forſan me prius, quā quæ his deinceps ſunt opera, perfectiſſem, motu occuparet, propoſitum impediens. Cæterum Pelops doctōr meus, & ipſe omnium euſinodi cauſas reddere volens, non abs re inquit. Cancer cū animal ſit aquaticū, prodeſt à cane rabido morſis, quibus videlicet metus eſt ne corripiantur affectu ſiccifiſſimo, nempe rabie: quamobrē ſine etiā aquam metuunt. Ac fluuiales, non marinos conuenire caneros diſcitabat, ſcilicet quod animalia marina ob admiſſionē ſalis natura ſiccifiſſima haud æquē exactam tuerentur eam, quæ eſt aduerſus rabiem, contrarietatem. Ac cū quidam ſubiceſſet, cur non omnia, quæ in potabili aqua degunt animalia, perinde vt cancri, ſuauē aſſolēt? quia, inquit, ſimilem cancri præparationē non admittunt. Nam horum vſorū cinerem, exicca totius cū ſit, canum mordentium venenum abſumere, ſimulque digerere profeſſus eſt. Hæc igitur Pelops dicebat ambitione magna iactans, omnium ſe talium noſſe cauſas. At ego niſi planē me ſcire quippiam prius perſuaſum habeam, aliis perſuadere non tento. Itaque nec Pelopis rationem, vt veram accipio, vt quæ crebras habeat cōtradictiones: verūm caneros opinor ex proprietate totius ſubſtantiaæ prodeſſe. Quoniam autem nullum eorum mortuum ſceneram, qui fuerant illis vſi, totis vtique corporibus, hoc aperiendum, recenſendūque à me exiſtimaui, tamenſi nō eſſet huius inſtituti proprium: nam id non erat propoſitum. hæcenus Galenus. Cæterum gammarorum faciē reſerunt locuſte, & ſquillæ, quāquā hæ chelis careant. Gerunt gammarū eo tantū tēpore, quo cruſtam exuunt, duos in capite lapillos albos, rotundosque, quibus vtuntur medici vtiliter ad expellendos renū calculos: conterunt enim hos in puluerem, & ex vino potandos exhibēt. Rotundus autē cancris marinis ſimilibus, quos Adriaticū accolat, maris & ſæminæ diſtissime vulgō Granci, & Macinette nuncupant, abidat maximē vbique ſuis in fluminibus, ac riuiſis Hetruria. nam quemadmodū Inſubria, Transalpinarūque regionum fluuij, ac lacus gam-

maros alunt, Ita Hetruria caneros, vt ipſe & Græcia, vbi ab Aefchryone, & Galeno à cane rabido demorſis ex eorum cinere ſiluberrima parabat antidotus. Sed & illi nō minori in errore verſantur, qui putāt marinos miniores (vt ita dicā) gammarulos, quas vulgō Gābarelli, & Gambaruſoli appellamus, eos eſſe, quos tum Ariſtoteles, tum Galenus, tū Aelianus, tū Plinius cancellos nominant. quippe quod hi gammaruli Ariſtotelei propriē ſquillæ paræ dicantur. Siquidē ij, qui in hoc genere nunquā uſcūt, Venetis, alijs quā plurimis populis proprium adhuc Squillæ retinent nomen: vulgō enim Schille dicuntur, quāquā in Hiſpania, præſertimque in Cantabria omnes hi gammaruli Squillæ nulla differentia vocentur. His, vt diximus, adſtipulatur Ariſtoteles lib. i. c. i. de partibus animalium capi. v. i. cū inquit. Squillæ à cancrario genere diſferunt, eo quod caudam habeant: locuſtario verò, quod forſepe careant. Quibus ſine claret, cancris nullam ineſſe caudam. quapropter omne cruſtatorum genus, cui cauda deſit, in cancrario genere fuerit recenſendum. Cuiuſmodi ſunt maiæ vulgō Granceuole, paguri vulgō Granci-porri, marini ac fluuiales cancri vulgō Grāchi appellati, & id genus plura. Nec aliam ob cauſam diximus, gammarulos paruos dici ſquillas, niſi vt omnibus notum ſit, eas etiam haberi his longē maiores, vt memorie prodidit Ariſtoteles lib. i. c. i. cap. i. de hiſtoria animalium, ſic inquit. Squillarum enim genere continentur gibbæ, crangones, & parux, quæ maiores nunquam eſſe poſſunt. Quibus liquidō conſtat, vulgares gammarulos Ariſtotelei paruos facile eſſe Squillas, cū ij maiores nunquam euadant, quā qui ſemper parui in piſcarijs habentur venales. Quinetiam id ipſum affirmare non dubitamus, quod iis cauda ſit locuſtarum, & gammarorum modo, chelæ verò, ſeu forſepes deficiant. Qui autem, qualēſye

Quoniam  
da error.

Squillarū  
conſidera-  
tio.

GRANCEVOLA.



CANCELLI ſunt, nomine Maia, vulgō ipſo parulos caneros deſignantes, ſcripſit Galenus libro tertio de alimentorum facultatibus: Cancelli, inquit, animalcula ſunt perexiguis cancris ſimilia, colore ſauro. Afferuntur enim cancelli inter minutulos piſciculos duplici ſanē gene

Cancelli  
rurū con-  
ſideratio.

Gammara-  
rum la-  
pilla.

Canceri ſim-  
iles.

PAGVRVS, VVLGO

GRANCEPORRO.



CANCELLI.



genere, vt quarto tum libro, tum capite de ani-  
malium historia retulit Aristoteles his verbis.  
Quem autem cancellum appellamus, communis  
fere socius crustatorum, & testatorum generu  
est, quippe qui natura locustis similis spectetur,  
nasciq; scorum per se solitus sit. Verum quod  
testat deinde petit, quam ingressas vitam tra-  
ducat, hinc similis testa contextis animalibus  
est, quapropter is in ancipiti esse, genusq; sibi  
vindicare verumque videtur. Forma tamen  
(quod simplicius dixerim) similis araneis est,  
nisi quod partem capiti, & pectori subdita am-  
phioem, quam aranei habeat. Cornicula duo  
rufa, tenuia gerit, quibus oculi magni toridem  
subiacent, qui nunquam intrò recedant, vt can-  
crorum, sed semper eminentes appareant. Os  
sub his est, quod velut capillamentis quibuscū  
pluribus circumdatur. Iis pedes subiuñcti duo  
bifurces, quibus cibum ori admoneat: bini itē  
verique adherent lateri, & tertius parvus. Tho-  
racis pars inferior mollis tota est, dissectioque  
sinu pallidum intus cernitur. Meatus ab ore ad  
ventrem pergit, foramen excrementi perspic-  
tuum nullum potest. Pedes, ac thorax duritiem præ  
ferunt, sed minus, quam cancri. Nexu nullo  
testis adheret, purpurarum modo, & buccina-  
rum, sed absolutus liberque vagatur. Oblon-  
gior est, qui turbinem subit, quam qui neritem  
(quem naticem interpretamur) genus enim  
diuersum est, quod in naticæ degit, cætera qui-  
dem non asimile: sed dextrum bifurcularum  
pedem paruum habens, cū læuū grandius-  
sculū habeat, & ingredi eodem ipso gran-  
diore potissimum solet. hæc Aristoteles. Aelia-  
nus verò lib. x i i i. cap. x i x. de cancellis

ita scribit. A conchis quidem inopes, & nudi  
primū cancelli nascuntur, deinde eas tanquā  
domicilia ad habitandum deligunt. Cū enim  
vacuas, & inanes offenderunt conchas pur-  
puræ, aut turbinis, primò intra eas ingrediun-  
tur: deinde cū in ampliores magnitudinem  
excreuerunt, quā his vt capi queant, in testam  
laxiorem tanquam domum alteram demigrāt,  
neque modò in supradictorum conchas immi-  
grant, sed & in permultas alias capiores trā-  
seunt, & amphioem nati, ea tanquam maiore  
domicilio gaudent: ac sepe de spoliis multo  
certamine inter se contendunt, viribusque in-  
feriore repulso, victor exuias affequitur. hæ-  
tenus Aelianus. Cui in omnibus subscribit  
Plinius libro i x. capitu. x x i. & x l i i.

His igitur diligenter perspectis, omnibus, vt  
arbitror, palam fiet, & caneros à gammaris, &  
cancellos à squillis differre. Animal, quod  
nascitur Græcè, Cancer Latine appellatur:  
Arabice, Sartham, seu Sartham: Italicè, Gran-  
chio: Hispanicè, Cangrejo: Gallicè, Cancres.

Nomina.

SCORPIO TERRESTRIS.

CAP. XI.

TERRESTRIS Scorpio tritus cru-  
dus, & impositus, suæ plagæ remedium  
est. Quin estur assatus, ad eadem.



TERRESTRES Scorpiones animalia  
sunt vulgò nota, quod in quacunque domo, nò  
modò in cubiculis, & cellis vinaris, sed vbiq;  
passim reperiri urazdeo est hominum vita pe-  
riculis obnoxia. Licet autem sint in Italia mi-  
nus venenosi, minusque nocui, quam aliis  
regionibus, quæ sub meridie sitæ sunt, ipse ta-  
men complures vidi in Hetruria à Scorpionibus  
ictos, qui grauissimis perpestis sunt exacer-  
bationes, & quasi ad mortem redacti. Cætera  
in regionibus frigidis minus nocui sunt. In agro  
Tridentino à scorpionibus icti nihil noxæ per-  
cipiunt. Quod tamē euenire affirmat gratia pe-  
culiari sibi à Deo impetrata precibus dñi Vi-  
gilij episcopi, quem & patronū præcipuum ha-  
bent, & aduocatu apud Deum. Hoc idē asserit  
Aristoteles lib. v i i i. cap. x x i x. de anima-  
liū historia, vbi sic inquit. Morfus belluarū ex  
locorum diuersitate plurimum differunt, vt in  
Pharo, locisque aliis, scorpiones nò lædunt. At  
in aliis

Scorpionū  
considera-  
tio.

Scorpius  
genera.

in aliis locis, & precipue in Scythia, multi & magni nocui sunt, & vel hominem, vel quāvis bestiam perculserint, interimunt: nec fies euadere possunt, quanquam ceteros virulentos ictus minimae sentiant. Plinius, Auicenna, Albertus, Aelianus, & aliorum plerique noem Scorpiionibus genera assignant, diuersis duntaxat coloribus distinctam: mirum quod alij sint flauij, alij rufi, alij cinerei, alij ferruginei, virides alij, alij lutei subatraque cauda, alij vniuersi, alij albi, alij denique fuliginis colore. Præter nigros, & ferrugineos, virides quā plurimos me vidisse, legisseque recordor, in comitatu Arci non longe à Sarca flumine, quodam in syluula nouellis quercubus confita apud sacellum diui Pauli, vbi paruo admodum tempore, siccio ardente, ego, & eremita quidam, de his qui sub saxis latebant, plus quam mille, & quingentos collegimus, crassos, & plurimum scarites. Plures inter eos feminas inuenimus, quæ suos nuper editos foetus albos, pediculi magnitudine, sub ventre secum vbique gerebant, singuli singulis cruribus adherentes. Quapropter non ab re prodidit Aristoteles lib. v. cap. x x v. de historia animalium, quod terrestres Scorpiiones vermiculos oorum specie pariant complures, & incubent: mox vt prolem perfecerunt, pellantur ab ea ipsa, & interimantur à suis liberis magno numero: sapius enim videntur pariant. Plinius auctor est, Scorpiionum ictum, multo magis feminis perniciosum esse, quam viris, præsertim virginibus, quibus semper lethalem esse ait. Quibus septeni in cauda internodij numerantur, longè feuiore habentur, quā iij, quibus tantum seni insunt. Nonnulli præterea literis mandarunt, quibus subscibit Strabo lib. x v. suæ Geographiæ, Scorpiiones quosdam habere alas, quibus per aera volitantes de vna in aliam regionem deferuntur. Hoc enim credere non videtur absurdum, cum idem formicis similiter eueniat: quandoquidem & hæc iisdem ferè coloribus distinguuntur. Tantoque magis credendum est, quod in Castellis Hispaniæ regione sæpius agricola aliquos tetræ cespites aratro scindant, vbi formicarum more innumeri scorpiiones gregatim hyeme delitescunt. Citra Cynamoluus Aethiops latè deserta regio est, à scorpiionibus gente sublata, si Plinio credimus. Qui præterea tradit, quod, si decem cancri cum oculi manipulo adalligentur, omnes, qui ibi sunt scorpiiones, ad eum locū coibunt. Quod tamen Dioscoridi manifestè refragari videtur, nam superius in cancriis ita scriptum reliquit Dioscorides. Cancrī scorpiōnes necant, si triti cum oculo admoventur. Ferunt à vespiis, apibus, & crabronibus eos non icti, qui prius à scorpiōne percussī fuerint. Quinetiam narrat Plinius lib. x x v. cap. x. Scorpiōnes mortuos reuiuiscere, admotō albo veratro. Quidam medici videntur Scorpiōnum cinere, qui viui sint exussit, ad vrinam ciendam, iis præcipue, qui renum aut vesicæ calculo obstruuntur. Quo fit, vt in

Scorpius  
niger.

Scorpius  
fasciatus.

hunc vsam commendauerit Mesues oleum ex iis paratum, quod officinæ habent, renibus & pubi illitum, Hoc idem commendauit Auicenna ad aurium dolores. Ego tamen illud vsu exploratum habeo, quod oleum per me factum, in quod sanè magnus scorpiionum ingreditur numerus, eordi duntaxat, & pulsanibus tempore, manuum, & pedum arteriis illitum, ab omnibus liberat venenis, dummodo erodenti facultate vacent. Quin & eos sanat, qui tam à vi peris, quā ceteris venenosis animalibus vel icti, vel demorssi fuerint. Qua de re ij (absit tamen verbis iactantia) testimonium perhibere possunt, qui prius oleo sancto à sacerdotibus illiti, nostro postmodum peruncti euasere incolumes. Præstat item maximè hoc oleum, cum in homines pestilentiali feuit: quippe quod non modo peste insectos iuuat, sed & sanos præseruet. Præstat denique ad omnes interarcorum vermes, omnesque dolores mulcet ex flatu, vel ex frigore genitos, præsertim ventriculi, colici, ac vteri. Eius parandi rationem trademus (Deo concedente) libro sexto, vbi de venenorum remedijs, siue antidotis latius differemus. *Scorpius*

Olei ex  
Scorpiōib.  
vires.

Nomina.

#### SCORPIO MARINVS CAP. XII.

MARINI Scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines, & hebetudines.



CREDIDERE quidam marinum Scorpiōnem, & Scorpanam vocatam, nihil inter se rimari, & differre. Veruntamen q̄ scorpana sit marinus scorpiō, nemo non ibit inficijs, qui & Aristotelis, & Athenæi auctoritate nitatur: vterque enim ad inuicem distincti illi. Porro Scorpana in dorso spinam gerit venenatam, quæ imprudentes piscatores sæpius icti: neque iam defuerunt, qui eius ictū sint interempti. Proinde exstimarunt nonnulli, ictū similitudine falsi, inter

scorpenam, & marinum scorpiionem nullem  
 proflus interesse discrimen. Ceterum Scorpio,  
 & Scorpena (vt euidem arbitror) eiusdem fe-  
 re generis sunt, sed in specie & forma, inter se  
 pluribus differunt. Siquidem Scorpius è pelagi-  
 gis piscibus est, scorpena longè maior, adeò vt  
 ostionas, nouenisque quandoque ponderet li-  
 bras. Scorpena verò piscis, est litoralis, scorpio  
 ne multò minor. Scorpius item vniuerso corpore  
 ruber: cornua bina in capite gerit, sed mol-  
 lia: & acutos in ore dentes, minutulos tamen:  
 pinnis constat aculeatis, tam his, quæ per me-  
 dium excurrunt dorsum, quàm his, quas an-  
 teriore, & posteriore parte gerit, sed iis tantum  
 aculeis icit, qui dorso annectuntur: quorum ta-  
 men vis his, qui scorpenæ insunt, imbecillior  
 est. Hunc sunt, qui vulgò vocent Pefce cap-  
 pone, sed in Hetruria maritimis quibusdam  
 locis vocatur Cerna. Scorpena autem, quæ  
 suum apud omnes retinet nomen, nec cornua  
 habet, nec dentes adeò acutos: gerit tamen in  
 dorso aculeos scorpij modo, sed eminentiores,  
 ac duriores, nec vsque adeò pinnatos: in cæteris  
 verò pinnis iis omnino caret, præterquam cir-  
 ca branchias, vbi duos prælongos habet acu-  
 leos, & nonnullos circa caput: corpore est in ni-  
 gro virescente. Sunt tamen, qui indifferenter  
 scorpium scorpenam vocent, quòd quadante-  
 nus sibi inuicem correspondant non modò fi-  
 gura, sed & carnis bonitate. *Aspersione Draconis*  
*Græcè, Scorpio marinus Latine, Scorpione ma-*  
*rino Italice dicitur.*

DRACO MARINVS. CAP. XIII.

DRACO marinus dissectus, & aper-  
 tus, impositusque ictus spinæ suæ, qua  
 ferit, medela est.



DRACO MARINVS ALTER.



VARIAT auctorum sententia in marini  
 Draconis historia. Quandoquidem Alberto ma-  
 rinus draco ingens est bestia, serpentis faciem  
 referens, alis non amplioribus, quàm quæ ad  
 natandum sufficiant, sed ob virium præstan-  
 tiam omnium aqualium velocissimus censetur.  
 quapropter breui admodum tempore ingre-  
 tia meretur maria. Quin & venenosum est illi  
 animal, adeò vt quosunque pisces, vel alia quæ  
 cunque animalia dente vulnererit, interimat.  
 Piscatorum præterea artificio captus, statim vt  
 in arenam sese protrahi cernit, mira celeritate  
 ferobem in litore fodit, quæ se condere possit.  
 hæc Albertus. Qui etsi ex Aristotele, & Plinio  
 (vt opinor) transcribat, plura tamen addere  
 videtur, quibus an multa sit adhibenda fides,  
 quid statum non habeo. Siquidem hoc ani-  
 mal Aristoteli tanta admiratione non præstat,  
 nec draco appellatur, sed serpens, vt is pos-  
 teritatis memoriæ commendatui libro 1 x. cap.  
 x x x v i i. de historia animalium his verbis.  
 Serpens marina colore, & corpore congro pro-  
 xima est, sed obscurior, atque acrior. Hæc si ca-  
 pta dimittatur foris, in arenam rostro quàm pri-  
 mum adactò terebrat, subitque tota. Est ore acu-  
 tiore hæc, quàm terrestres. Et libro 1 1. capite  
 x 1 1 1. Sunt etiam (inquit) maris indigenæ  
 serpentes terrestribus similes, nisi quòd caput  
 habeant congrui. Et quidem genera earum plu-  
 ra sunt, colore numerosè varietatis. Nasci eas  
 non in aleissimis gurgitibus certum est. Plinius  
 hoc animal non serpentem, sed draconem ma-  
 rinum pariter cum Alberto vocat libro 1 x.  
 capite x x v i i. sic inquit. Rusus draco  
 marinus caprus, atque immixtus in arenam, ca-  
 uernam sibi rostro mira celeritate excavat. At  
 hic, mea quidem sententia, Draco marinus haud  
 quaquam fuerit, de quo scribit Dioscorides, sed  
 per se maris serpens. Quandoquidem Aristoteli  
 libro v 1 1 1. capite x 1 1. draco marinus  
 piscis est litoralis, quemadmodum dentex, sca-  
 rabeus, cernua, aurata, mugilis, nullus, turdus,  
 pulcher, gobius, atque alij complures, & omne  
 saxatile genus. Proinde dicebat Plinius libro  
 x x x 1 1. capite x 1 1. Extra has sunt rotun-  
 dae in oleario vsu cochleæ, cucumis, cynopus,  
 cammarus, cynosdextra, draco. quidam volunt  
 esse dracunculum. Est autem graculo similis: acu-  
 leos in branchiis habet ad caudam spectantes.  
 Huic sane non parum correspondere videtur is,  
 quem Veneti piscatores, itémque Aquileienses,  
 & Tergestini Araneum vocant, & vulgò Pefce  
 ragno. Quippe qui inter litorales aculeos cir-  
 cum branchias habeat, caudam versus specta-  
 ntes, & alios in dorso adeò venenatos, vt ab eo  
 icti, nisi curam admiserint, facillè interimantur.  
 Itaque & is videtur Plinio fuisse draco, vel  
 dracunculus, quem libro 1 x. capite x 1 v.  
 1 1 1. ipse araneum quoque vocauit, cum in-  
 quit. Aequè pestiferum animal araneus, spinæ  
 in dorso aculeo noxius. Præsertim cum libro  
 x x x 1 1. capite vltimo inter litorales, & ma-  
 ris

*Draconis  
 marini cõ  
 sideratio.*

*Piscis ara-  
 neus.*

ris magis peculiares pisces non aliter araneum  
recensere videatur, quam draconē Aristoteles.

*Nomina.* Ὠπίον Ὠπίον Græcis ita dicitur, vt Latini  
Draco marinus, & Italis Drago marino.

SCOLOPENDRA.  
CAP. XIII.

SCOLOPENDRA marina in oleo  
decocta si illinatur, auellit capillos: sed  
contactu pruritus facit.

*Scolopendra dracifide.*  
SCOLOPENDRA marina animal est exi-  
guum: atque, vt prodidit Plinius lib. 1 x. cap.  
x l i i i. ea est terrestri non dissimilis, quam  
etiam Hetruria centipedam appellat. Dicunt  
hanc (si tamen iis auctoribus est adhibenda fi-  
des) statim, deuorato hamo, omnia interanea  
innocue euomere, ac deinde, eo ab intestinis  
explicato, sua eadem resorbere viscera. Quo-  
circa mecum sepius cogitavi, non iniucundum  
fore, eius viscerum speculari anatomē. Sed nec  
ipsam hætenus mihi videre licuit. Ea Græcè  
Ὠπίον Ὠπίον appellatur: Latine, Scolopendra  
marina, panter & Italicè.

TORPEDO. CAP. XV.

MARINA Torpedo diuturnis ca-  
pitis doloribus admota, cruciatus ve-  
hementiam mulcet. eadem apposita  
euerfam sedem, prociduumq; coërcet.

TORPEDO.



*Torpedo conficiatur.*  
TORPEDO in chartilagineorum, plano-  
rumque piscium genere ab auctoribus recen-  
setur, perinde ac raia, leuiraia, rhombus, solea,  
passinaca, & alia id genus plura. Hæc dorso ru-  
bescit, maculis quinque nigris (quod in adul-  
tis tantum visitur) interiectis, oculis similibus:  
supina verò parte albicat. Tanta huic vis pecu-  
liaris inest, vt retibus capta, antequam manu

*Torpedo mira facultas.*  
attingatur, & manus, & lacertos piscatoris stu-  
pore non modico afficiat: id quod etiam fit, si  
capiatur hamo. Talis nanque huius facultas per  
setas, & hastam insensibili quodam modo per-  
means, ad manum piscatoris tandè transuecta,  
celeriter torporem inducit. Idcirco Galenus

libro v i. de locis affectis: Ea (inquit) poten-  
tia corpedo prædita est, vt si fuscina attingatur  
à piscatore, transmissa qualitate per hastam ad  
manum, eam repetè obstupefaciat. Idem postea  
retulit Plinius libro x x x i i. cap. 1. sic in-  
quiens. Torpedo etiam procul, & è longinquo  
vel si hasta, virgave attingatur, quàmuis pra-  
ualidos lacertos torpere facit, & pedes quâ  
libet ad cursus veloces alligat, & retinet. Et lib.  
1 x. cap. x l i i i. ita scribit. Nouit torpedo vim  
suam: ipsa enim non torpens, merisque in limo  
se occultat, pisces, qui securi adnatares obtor-  
puere, corripens. Quod ante ipsum prodide-  
rat Aristoteles lib. 1 x. cap. x x x v i i. de hi-  
storia animalium. Cæterum proprietates hæc vi-  
uis duntaxat inest: nam si eadem in exanimatis  
persisteret, comestæ (veniunt enim frequenter  
in cibis) vniuersum corpus stupidum redder-  
ent. Quamobrem Galenus li. x i. simplicium  
medic. de ea ita scriptum reliquit. Sed & Tor-  
pedinem totam (dico autem animal marinum)  
capitis dolores sanare capiti admotâ, sedemque  
euerfam coërcere, à quibusdam est prodictum.  
Verùm ego cùm vtrumque essem expertus, neu-  
trum facere comperi. Eam igitur cùm cogita-  
sem, adhuc viam esse applicandam, cui caput  
doleret (posse enim fieri, vt hoc medicamen-  
anodynon sit, hoc est, dolore liberet, similiter  
aliis, quæ sensum obstupefaciant) ita habere  
comperi. Putoque eum, qui primus est vñs tali  
quapiam motum ratione vti aggressum, hæc  
Galenus. Venetiis piscis hic ab effectu, vulgò  
Tremolo appellatur: siquidem membro stupe-  
facto, subinde tremorem incutit. Romani verò  
(me quidem latet, vnde id nomen traxere) eū-  
dem vulgari nomine Batti potius, & Forterigia  
dicere consueuerunt. Quæ Ὠπίον Græcis, Tor-  
pedo Latinis nominatur: Arabibus, Tead: Italis,  
Torpedine: Hispanis, Hugia: Gallis, Torpille.

*Torpedo  
vis. Vires  
ex Gal.*

*Nomina.*

VIPERA.



VIPERA. CAP. XVI.

VIPERINAE carnes si coctæ edâ-  
tur, claritatem oculis afferunt: neruo-  
rum vitii auxiliantur: incrementis stu-  
mas reprimunt. Detracta autem cute,



Mafculi quidem fuprà canini dentes duo colo-  
res notantur, venenum eructantes: at plures fem-  
per fœminæ infunt. Illud infuper addiderim,  
Aristotelem memorie mandafle libro v i i i .  
capite x v . de hiftoria animalium, quòd licet  
hyeme ceteri ferpentis cauernas fubeant terre,  
vipera tamen fub faxis condantur. Ex quo pal-  
lâm eſt, Plinium hoc etiam loco non rectè intel-  
lexiſſe Ariſtotelem: quippe quòd traderit li-  
bro v i i i . capite x x i x . Viperam ſolam  
terra condi, cæteras arborum, aut faxorum ca-  
nis. Illud item reuicuit Ariſtoteles. quod Pli-  
nius poetas ſecutus retulit, fœminam ſcilicet in  
coitu mari caput abrodere voluptatis dulcedi-  
ne. Sed vt iam Viperis vires ſuas, ac facultates  
reddamus, hic ea nunc referam, quæ de iis  
libro x i . ſimplicium medicum, tum libris de  
antidotis pluribus poſteritatis memoriæ prodidit  
Galenus. Viperarum igitur carnes palam vi-  
dere eſt excaſcificantes, & deſiccantes, vbi con-  
diuntur ceu anguillæ, nempe oleo, ſale, anetho,  
porro, & aqua, ſeruato nimirum modo. Quòd  
autem totum corpus per cutim purgent, diſce-  
re tibi liceat vel ex iis, quæ ego iuuenis etiam-  
nam in Aſia noſtra ſum expertus: quæ ſingu-  
latim deinceps narrabo. Homo quidam morbo,  
quem elephantia cognominant, laborans ali-  
quoſque cum ſodalibus conuerſabatur, donec  
ex ipſus conſuetudine conuerſationeque qui-  
dam noſtrum morbi inſuſciteret contagione: ſe-  
le iam graue ſens erat, ac deſormis. Conſtru-  
cto igitur illi tugurio proximè vicum in iugo  
collocat, ſibi propter fontem, illic hominem col-  
locant, tantum illi quotidie ciborum ferentes,  
quantum victui ſuppeteret. Cæterùm ad ca-  
nis exortum, cum ſortè meſſoribus haud procul  
inde metebus vinum eſſet allatum in ſicti  
li ſanc quàm fragrans, is quidem, qui attulerat,  
depoſito illo prope meſſores, abiit. Verùm vbi  
eius bibendi adueniſſet tempus, ſublato ſictili  
adoleſcens, vt pro more impleto cratere, com-  
petente aqua vinum temperaret, in cratera vi-  
num effudit, & vnà excidit vipera mortua. Qua  
re attoniti meſſores, veriti ne quod, ſi ebibiſ-  
ſent, inde ſibi malum eueniret, ſuam quidem  
ſictim aquæ porione ſedare maluerunt. Cæte-  
rùm cum ſilene diſcederent, quaſi præ humani-  
tate ac miſericordia, homini illi elephantino obno-  
xio vinum largiuntur, rati expedire illi potius  
mori, quàm viuere in ea miſeria. At ille, vbi ex  
hoc bibiſſet, admirabili quodam modo ſanita-  
ti reſtitutus eſt. Nam tuberoſum illud omne cu-  
tis totius non alter, quàm animalium à teſtis  
mollicie nuncupatorum malacoſtracæ, reg-  
men decidit. Quantum autem reliquum erat,  
molle admodum apparuit, inſtar cutis cancro-  
rum, & locuſtarum (carabos Græci vocant) vbi  
extima teſta exciderit. Alterum quoque eiuf-  
modi non diſſimili caſu in Myſia Aſiæ, non pro-  
cul ab vrbe noſtra accidit. Vir quidã elephan-  
tum laborans proſectus eſt ad aquarum calida-  
rum ſponte naſcendum vſum, ſperâs inde non-

nihil ſe commodi adepturum. Erat illi ſcortum  
ancilla, iuuenula ſanè formoſa, compluribus  
amatoribus ambita. Proſectis igitur illis, cum  
aquis vteretur, in ædibus, quibus vicinus erat  
locus ſqualidus, & viperarum plenus, fortè for-  
tuna ex illis vna in vrceum vini incidit negli-  
gentius poſitum: extinctaque eſt. Ac ſcortum  
quidem in luero id reputans, quod ſors eueniſ-  
ſet, hero id vini propinat. Cæterùm ille, vbi  
ebibiſſet, ad eum modum, quò ille, quid ege-  
bat in tugurio, perſanatus eſt, hæc Galenus.  
Qui eſti alia è viperis experimèta ibidem ſcri-  
pſerit, vnde ſimiliter alij incolumes euafere,  
vt eius firmior redderetur ratio, quòd ſcilicet  
viperarum eſu elephantiaci ſanentur, autem  
breuitati conſulentes, ea hoc loco ſilentio in uol-  
uenda diximus. Verùm ennuero nil mirum  
alicui fuerit, Viperas ambas, quarum meminit  
Galenus, ſe tam facile immeriſſe vino: ſi-  
quidem illis natura comparatur cap, vt vino  
ſummopere deſcendant. Quamobrem nar-  
rat Ariſtoteles libro v i i i . capite i i i i . de  
hiftoria animalium, quòd ideo viperas aliqui vi-  
no cum ſiſilibus ad ſepes diſpoſito venantur,  
quia vini incontinentes ſunt: ebriæ enim capi-  
untur. Id quod etiam dixit Dioſcorides in ſexti  
libri præſatione de venenis, venenatiſſimæ  
agens. Quinetiam viperæ (vt ad Piſonem ſcribit  
Galenus) buſpreſſis, & cantharides deuorant.  
Item Ariſtotelis teſtimonio libr. v i i i . capite  
x x i x . de hiftoria animalium, ſcorpium deuorari  
à vipera certum eſt: ob idq; (vt idem eſt  
auſtor) eorum venenatorum morſus grauiores  
ſunt, quæ aliis animalibus venenatis veſcuntur:  
quod proſectò faciunt viperæ. Hæ theriacen  
ingrediuntur: at non omnes, nec omni tem-  
pore captræ probantur. Proinde Galenus li-  
bro primo de antidotis rem hanc ſcitè & aper-  
tè declarauit, ſic inquit. Viperas non vt ali-  
qui faciunt, æſtate media, neque ſtatim, vbi ca-  
uernas egreſſæ fuerint, venari conuenit: æſtate  
ſiquidem earum caro ſit excitat, ſtatimque  
ab egreſſu frigida ſit, ſicca, & extenuata. Opti-  
mum itaque tempus eſt, quod iis mediū inter-  
cedit, quod & Andromachus ipſe ſignifica-  
uit, quo tempore & qui Baccho ſacra faciunt,  
viperas dilacrare ſolent, vnde quidem finiente  
nondum tamen æſtate inchoata. Vel ſi ver ad  
magnam ſui partem hyemale fuerit, circa prin-  
cipium æſtatis, non multo tempore poſt plea-  
dum ortum. Viperas autem, quæ prægnantes  
ſunt, reliquere oportet: aliarum verò caput, ac  
caudam abſcindere. nam præterquam quòd hæ  
particulæ violentiores eſſe videantur, etiam  
duræ, & parum carnis habent. Sufficit autem in  
magnis viperis, id, quod vtriusque amputatur,  
quatuor digitos æquare. Totum verò reliquum  
corpus, inteſtiniſ exemptis, pellèque detracta,  
aquis primo abluendum, atque in vas facile  
conſiciendum eſt: deinde aqua pura ſuperin-  
fuſa, viridique anetho (tunc enim viget) ollæ  
prunæ, vt coquatur ſubſicere conuenit, vel ari-

Plinij la-  
pſum.

Viperina  
carnis vi-  
res ex Ga-  
leno.

Vipera vi-  
no deſcendit  
tur.

Viperarum  
venenatio,  
& earum  
paſſilla.



da ligna, quæ, quod fumū non emittant, *ἄστυ* vocant, vel quod melius adhuc est, vitium fæmentia. Salis autem, siquidem suo tempore viperas ceperis, tantillum immittere oportet: sin æstate iam incipiente, nihil. Porro observandum est, ne illæ capiantur, quæ in maritimis locis, quæve in aliqua falsa aquarum lacuna degunt: antidotus enim quæ ex huiusmodi viperis confecta fuerit, sitim excitabit. Cū igitur viperæ probè coctæ fuerint, ac si quis comedere vellet, eas ex aqua eximere oportet, deinde carnes ita à spinis auellere, vt nihil ex spinis simul auferatur: atque his exquisitè contritis, panis ex purissima farina optimèque confecti, qui præcipuè & benè fermentatus sit, & in furno, non sub cilibano coctus, modicum quiddā admiscere. Nonnulli tamen in commiscendo panem Viperis hanc mensuram seruandam præcipiunt, vt panis pondus viperinarum carnum dimidio minus sit: alij ne tertiā partem excedat malunt. Ego verò quandoq; quartam, quandoq; & quintā panis imposui. Cæterū nisi probè coctus fuerit, periculū est, ne aliquid aciditatis medicamentum contrahat. Ar facius est, panem hūc ita coctum per aliquot dies loco aliquo sicciori prius exicasse. Verū cū vipers, & panem coniunxeris, diligenterque adco subegeris vt nulla viperinæ carnis particula non confusa remanserit, pastillos ex ea massa conficito, qui tenues sint: nam crassi cū difficulter siccescere soleant, & carnem putrere, & panem ac scere sinunt. Quomobrem panem quoque antè siccitum terere melius est, & non, quemadmodum ante nos qui Cæsari theriacam faciebant, viperarum iure maceratum: id quod ipse quoque diu feci, sed mihi postea melius esse visum est, panem antea contritum viperarum carnis exactè iam subactis admiscere: citius namque pastilli siccantur, qui siccum panem, non madidum acceperint. Sit autem cella, in qua pastillos siccabis, in superiori domus parte, ad meridiem conuersa, vel saltem ad septentrionem non respiciat, solis radios tota penè die admittat. tali enim in loco commodè siccificent. Statim vbi fuerint conformati, ea parte collocentur, qua solares radij peruenire non possint. Frequenter autem ipsos conuerrere opus erit, vt æqualiter vtraque ex parte siccificent. quod facere si quis omiserit, superior quidem pars celeriter arefcet, inferior autem humida diutius permanebit, periculūque erit ne marcescant. Postea verò quā exiccati fuerint, maneant adhuc aliquot diebus eadem in cella longius, quā prius à solis radiis, spèpè denuo conuercantur. Sufficient autem ad hæc omnia quindecim dies ad summum: post quod tempus donec theriacam conficere volueris, recondi debent in vase stanneo, aut vitreo, aut etiam aureo. Vitrum squidem, & aurum nullam fraudem admittit: stannum autem plumbi misura adulteratur. quod vitare conueniet, non solum in hac, sed & in quibuscunq; aliis an-

tidotis: quemadmodum & argentum, si purum non fuerit: vasa namque ex eo fabricata celerimè rubiginem contrahunt, purum autem argentum, Romani candidum vocant. Cæterū longè melius est, haud multò post, quā pastillos confeceris, ipsis vt, quamquam non multum detrimenti capiant, etiamsi peracto anno, atque etiam multo post eis vtaris. Restè namque à principio siccati, ad tertium, quartūque annum integri perseuerant, dummodo tamen aptè reponantur, & subinde puluisculis quiddam, qui ipsis obnasci consuevit, mundis linteis interdum abstergatur. Is namque si diutius inhæreat, pastillos perforabit. Perspicuum est autem eos inuiles euadere, qui perforati fuerint, quemadmodum antequā hoc ipsis accidat, etiamsi multum tempus intercesserit, viles permanent. Hæc Galenus de conficiendi pastillos Viperæ ratione, quò optimi & præstantissimi habeantur. Cæterū illud Dioscoridi ridiculum videtur, quòd qui vipers essent, pediculos procreent. Cui tamen reclamant Galenus libro x i. simplicium medicamentorum, vbi id certò iis euenire asserit, quibus plurimum mali succi in corpore exuperat. Narrat Plinius libro x x x. capite x i i i. quòd Antonius Musa Cæsaris Augusti medicus cū incidisset insanabilia vlcera, vipers edendas dabat, miræque celeritate perfabatur. In Aegypto Aegyptios ipsos vipers, aliisque serpentibus similiter, atque anguillis victitæ prodidit Galenus libro. i i i. de alimentorum facultatibus. Quibus item eos vesi traditum est, qui occidentales, nouitèrque repertas Indias incolunt, perinde ac iij, qui orientales inhabitant, vt libro v i i. auctor est Plinius. Viperæ ita Latinis dictæ Græcis *ἰχθυόνα* vocatur: Arabibus, Labane al-fahay: Italis, Vipera: Germanis, Brantschlange: Hispanis, Biuora, & Bicha: Gallis, Vipères.

SENECTA ANGIIVM.  
CAP. XVII.

SENECTVS anguim in vino decocta dolori aurium, infusu: & dentiū, collutione auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed præcipuè viperinam.


Nullis non cognita anguim Senecta: quippe quæ sepe in campestribus inter saxa, & stirpes inuenitur. De hac cū differeret Aristoteles libro v i i i. de historia animal. capite x v i i. sic inquit. Serpentes senectam exuunt vere, cū egrediuntur, tum etiā autumno. Vipera etiam exuit tam vere, quā autumno. Cū serpens exuere incipit, ab oculis pri-

*Ang. ptyx  
Vipera ci-  
bina.*

*Nomina.*

*Senecta an-  
guim cū  
scleratio.*

mum detrahi aiunt, ita vt obsecari videatur  
iis, qui rem non intelligunt. Tum caput exui-  
tur: glabrum enim hoc omnium antequam  
reliquum corpus, appareat: atque vna ferè no-  
cte, & die senectus tota exiit à capite orsa  
ad caudam: & cure altera intrus subnascente,  
ipsa remouetur. Vi enim foetus inuolucro se-  
cundarum, quo contentus prodierit, exiit,  
sic ista senectute detracta renouantur. Porro de  
ea nil aliud memorie prodidit Galenus libro  
x. 1. de simplicium medicamentorum facultati-  
bus, quam quòd in aceto decocta dentium  
dolori medetur.



*Nemina.*

*Figat ipse* Græcè, Seneca anguim Latinè  
vocat: Alchalha, & Selach alhaia, Arabicè:  
Spoglia delle Serpi, Italicè: Schlagen balck,  
Germanicè: Pelle de la culebra, Hispanicè,  
Despouille des Serpens, Gallicè.

LEPVS MAR. ET TER.  
CAP. XVIII.

LEPVS marinus loligini paræ si-  
milis est: qui per sese trius, aut cum  
vrtica marina illitus capillos euellit.  
Terrestis leporis inassatum cerebrum  
manditur, iuuandis tremoribus, qui  
valetudine contracti sunt: affricto, aut  
cibo facilem infantibus dentitionem  
præstat: exustum caput, & cum adipe  
vrsino, aut aceto illitum, alopeciarum  
inanitatibus medetur. Leporinum co-  
gulum post triduū à cōcubitu potum,  
conceptum adimere, partusque spem  
intercipere proditur: vuluæ, & alui fluo-  
rem sistit: comiciales iuuat: contra ve-  
nena ex aceto bibitur, præsertim ad-  
uersus concretum lac, & viperarū mor-  
fus. Sanguis eius si calidus illinatur,  
vitia cutis in facie, lentiginem, lentigi-  
nèque sanat.

*Leporis  
marini &  
terrestis.*

MARINVS Lepus (vt nonnulli memorie  
prodidere) sic primum appellari cæpit, quòd  
terrestis leporis faciem referat. Quapropter

hæc de eo à Plinio produntur libro 1 x. cap.  
x l v i i i. Lepus, inquit, qui indicio mari  
nascitur, etiam tactu pelilens, vomitum, dis-  
solutionemque stomachi protinus creat. In no-  
stro ossa infomis, colore tantum lepori similis:

LEPVS TERRESTRIS.



in Indis & magnitudine, & pilo duriore tan-  
tū. nec vnius ibi capitur. hæc Plinius. Ex  
quibus facile conici potest, Dioscoridem po-  
tius de nostratum marium Lepore intellexisse,  
quàm de iis, qui in Indico innatant pelago, ar-  
gumento quòd paræ loligini similem marinum  
leporum reddiderit. Albertus auctor est, ter-  
tium Leporis marini genus reperiri, communi  
piscium magnitudine, sed capite lepori non  
abssimili, dorso rufescente, esculentum: tamen  
it à nonnullis explodatur, vt pote quòd & con-  
cocto contumax sit, & elephaniasim gignat.  
Cæterum terrestis Lepus notissimum animal  
est, & cursu velocissimum. Solum hoc inter  
cætera terræ animalia, quæ vtrunque dentata  
sunt (vt scripserunt reliquit Aristoteles lib. 1 1 1.  
de partibus animalium, cap. x v.) & quæ vni-  
cum tantum continent ventrem, coagulum ha-  
bet. Sunt & lepores albi, quales etiam Plinius  
lib. v 1 1 1. cap. 1 v. refert in Alpibus inueniri.  
Hi hyberno tempore admodum albicantes in  
summis vallis Ananiz montibus frequentes  
reperiuntur, eo præsertim tempore, quo ij ni-  
uibis altissimis vestiuntur: qui tamen adeo ma-  
gni non sunt, nec ita in cibum parati cum pa-  
lato ineunt gratiam, vt qui in campestribus ca-  
piuntur. Cæterum candidi hyeme tantum con-  
spiciuntur: nam liquefcente niue subrubescunt,  
quemadmodum & cæteri. Cuius rei indicio  
sunt illi, qui cum non perfectè priores pilos  
exuerint, partim candidi, partim subrustili vi-  
suntur. Lepores apertis oculis dormiunt, nec  
(quæ sua maxima timiditas est) alio quàm fu-  
ga se tutari sciunt. Huic soli pilos in bucca  
intus, & sub pedibus esse adnotauit Aristoteles  
libro 1 1 1. de historia animalium, cap. x 1 1.  
Archelaus auctor est, cui etiam sententia ple-  
rique subscrubunt, Leporibus vtrunque sexum,  
& vtranque gignendi viam inesse, & omnes le-  
pores æquè gignere, ac si essent hermaphro-  
diti. Quod ita facillè posse pari naturam, nullo  
pacto crediderim: sed potius ridiculum hanc

*Leporis  
terrestis  
confid.*

*Vna opi-  
nio.*

opinionem in hominum mentibus instam putaverim, quòd viderint, Lepores, quanquam plurimi quotidie capiantur, etiam quodammodo fecundius procreare. Verutamen id non evenit, quoniam mares ipsi pariant, sed quia (teste Aristotele libro v. de historia animalium: cap. x. x. x. i. i.) superfoetant, dum adhuc vtero gerunt, similiterque statim à partu concipiunt, ita quòd singulis mensibus generant: Sed foetus edunt non vniuersos: interpositis enim diebus, quos restulerit, peragunt partionem. Vnde tam innumera fecunditas: nam etsi foemina lac nuper natis praebeat, nil tamen prohibet, quin eadem repetat coitum, & lactans, gerensque vtero, denuo concipiat foetum. Mares (vt loco citato idem prodidit Aristoteles) aucti coeunt cum foeminis: retro enim iis genitale membrum à natura datum est, vt apparet, dum vrinam reddunt. Ex quo etiam multis persuasum est, mares foetum concipere: siquidem cognitu perquam difficile est, an mares, an foeminae sint, vt etiam cuniculis contingit: qui cum fecundius etiam prolificet, quam lepores, non ob id tamen mares vniquam parere visi sunt, quanuis quolibet mense foeminae pariant. Tradit Plinius libro x. i. cap. x. x. x. v. i. i. bina iecinora Leporibus inesse circa Britum, & Thernem, & in Cherronefo ad Propontide: mat transfatis aliò alterum statim absumi. Id quod ante ipsum memorie prodiderat Aristoteles libro i. de historia animalium, capite x. v. i. i. Item libro i. i. i. de partibus animalium, cap. v. i. i. vbi hoc leporu genus pluribus in locis reperiri testatur, speciatim verò in Syecino agro, circiter Bolham lacum. In Ithaca insula (vt idem tradidit libro v. i. i. de historia animalium, cap. x. x. v. i. i.) Lepores à aliunde illati dimittantur, viuere nequeunt: sed eòdem reuerfi, vnde maris introierint insulam, moriuntur. Leporina carnes in cibis esse: prater id quòd agre conquantur, crassum, atrabilemque generat succum. Verutamen (vt inquit Rafis libro de x. animalibus) dysentericis conferunt, si affosse sumantur. Iecur verò arefactum, iecinorosis vtiliter exhibetur potandum. Integer cum pelle Lepus, operculato fictili impositus, in cli-banoque igne succenso tandu dimissus, vt penitus exuratur, vrinæ vitiiis mirifice opitulatur, adeò vt calculos eiciat, tam in renibus, quam in vesica genitos. Leporinum sel saccharo exceptum, oculorum argemas, nubeculasque deler. Leporinum stercus (vt aiunt) mulieribus gestatum, conceptum impedit. Sed illud experientia compertum est, quòd vniuersarum immisum, & mensum deluxiones cohibet, & hu mentem exicat vitium. Animal *λεπρος* & *λεπρος* Græcis, Lepus marinus Latinis nominatur: Italis, Lepe marina. Quod verò, *λεπρος* Græcè, Lepus terrestris Latine dicitur: Arabicè, Arneberis: Italicè, Lepe terrestre:

Germanicè, Hase: Hispanicè, Lieure: Gallicè item Lieure.

PASTINACA MARINA.  
CAP. XIX.

MARINAE Pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squamis reflectitur, dentium dolorem mitigat, nam eos frangit, & euocat.



PASTINACA marina suuiter atque rasa, Pastinaca & alia id genus, in piscium planorum, & char-*piscis con-*tilagineorum genere collocatur. Hanc quædam vulgò vocant Peste colombo. Gerit hæc in calda supernè radios duos præduros, acutos, & vtrinque minutissimè dentatos, quorum venator idu piscatoris grauitur afficiuntur. Quam ob causam memorie prodidit Aëtius libro i. i. i. quòd qui à marina pastinaca percussus sunt, his vulneris locus manifestè apparet. Sequitur autem dolor pertinax, & totius corporis stupor: acutum enim, & firmum habet aculeum, quo vehementissima vi in altum impulso nervi lauciantur. Quapropter in ali-  
40 quibus mors derepenit totum conuellens corpus comitatur. Idcirco non absque sorti ratione Plinius libro i. x. cap. x. l. v. i. i. ita scriptum reliquit. Nullum is squam exerebilibus venenum, quam radius super eandem eminens trigonis, quam nostri Pastinacam appellant, quincunciali magnitudine, arbores infixus radicis necat. Aima vt telum perforat & ferri, & veneni malo. Latet piscis hic: & vt idem auctor est libro citato, cap. x. l. i. i. h-  
50 trocinatur ex occulto, transuentes radio sigens. Marcellus Virgilius, nimirum cupidus inuendi rationem, qua pastinacæ radio vi posset, dentium doloribus sedandis, quippe quòd id silentio inuoluerit Dioscorides, fateretur, etsi diligenter, vt consentaneum est, inquisuerit, nunquam tamen apud antiquos scriptores eam esse consecutam fuisse. Quia in re aperte declarat, sibi eam Plinio parum intercessisse consuetudinis: quandoquidè Plinius lib. x. x. l. i. cap. v. i. i. nos abundè docuerit modum, quo eo radio in dentium doloribus vi valeamus, sic inqueps.

*Lepra fa-  
cultate.*

*Nomina.*

*Marelli  
ignatio.*

*Pastinaca* inquit. Pastinacæ quoque radio scarificare gingivas, & in denticum dolore vtilissimum. Conteritur is, & cum helleboro albo illitus, dentes sine vexatione extrahit. Quapropter mirari non licet, si quandoque in plateis circulatorios, denticum extractores cernimus, qui dentes absque ferreis instrumentis, nullo illato dolore extrahant. Idem radius equos perfrangit, qui subcutaneis vermibus exeduntur, si eo vlcera scarificentur, punganturque. Pastinacæ secur oleo incoctum non modo hominum scabiem sanat, sed etiam brutorum. Pisces tamen esculentus est, si abscessis in vniuersum cauda & capite, decoquatur. *Tuyoly dardiana* ita Græcis, ut Pastinaca marina Latinis, pariter & Italis nuncupatur.

## SEPIA.

## CAP. XX.

SEPIÆ coctæ dum estur atramentum, agrè concoquitur: alium mollit. Collyriis est testa factis conuenienter genarum scabritiæ perfricantur. Vsum in sua testa, donec id, quod crustosum est, abscedat, postea tritum, expurgat vitilignes, furfures, dentes, & vitia cutis in facie, eloritur in medicamenta oculorum addi solet: contra albugines, oculis iumentorum efficaciter inspiratur: pterygia oculorum absumit, cum fale tritum, & iniectum.

*Sepiarum*  
*considera-*  
*tio.*



SEPIÆ in omnibus Italiæ piscariis, proprium recinent nomen, venalesque habentur, in his inquam, in quibus marini veniunt pisces. Hæ polypis similes sunt, præterquam quod hi innumeris pedibus excellunt, illæ vero maiore corporis mole. Est Sepiis in dorso os candidum, superiori parte durū,

ac læue: inferiori autem fungosa quadam medulla repletum, quæ & leuiter aspera, & ligni modo frequentibus venis distincta visitur. Expetunt Sepiæ ossa aurifabris: facili enim in partem illam fungosam anulorum, cæterarumque rerum formas imprimas, quæ metallis igne colliquis expleri solent. Sepiæ suo etiam usu non vacat: ubi enim piscantem sensere effuso atramento, quod pro sanguine his est, infusata

aqua absconduntur. Id quod etiam faciunt aduenientibus voracioribus piscibus. Pariunt (vt prodidit Plinius libro 1 x. capite 11.) omnibus mensibus, plerumque autem in terreno inter harundines, aut scubi enata fuerit alga: neque his bimacæ longior est vita. Id quod de polypis retulit Aristoteles libro 1 x. de historia animalium, capite x x x v 11. Quæ in re dixerim, quod si historia, quam tradit Plinius libro 1 x. capite x x x. de illo tam ingenti Polypo, cuius caput Lucullo ostensum fuisse narrat dolij magnitudine amphorarum quindecim capax, atque pedes, quos vix vtroque brachio complecti esset, longitudine pedum triginta, vera perhibetur, nullum sequetur absurdum, quin polypi & denis, & his denis annis vivere possint. Quod etiam tum Sepiis, tum loliginibus euenire posse non dubitauerim, præsertim cum eodem loco scripserit Plinius, Sepias, loliginesque eiusdem polypi magnitudine in Hispanico litore vndis expulsi esse reptantes. Sepiæ atramento tantam vim esse Anaxias est autor, vt eo in lucernis accensis addito, cæteris ablatis luminibus, homines circumstantes Aethiopes videantur. Sepiæ, polypi, loligines, & cætera id genus mollia difficillimè concoquantur, quam ob causam antea cædi verberibus solent, quam excoquantur. Quamquam Athenæus Sepias aqua elixas ventriculo viles existimauerit, dixeritque eas sanguinem attenuare, atque hæmorrhoidas ciere. Cæterum (vt Galeno placet libro 111. de alimentorum facultatibus) duræ sunt carnis, agræ consuecuntur, & succi crudi plurimum gignunt. Atramentum is, quibus probè concoquantur, non parum corpori præbent alimentum. Quin & eius testa exusta (vt libro x 1. simplicium medicamentorum, idem scriptum reliquit) ad vitilignes, lentes, & scabiem vsum vtilem præstat: mista præterea fossili salis, in oculis existentes vagues eliquat: & antequam vratur fritione dentibus splendorem affert, & illitione vlcera desiccant. Sepiæ ossa in cibis sumpta vrinam ciere Plinius commemorat, renūque lentorem dissicere. Sepiis nucibus, & alio paratis quidam vescuntur, vt salaciores in venerem prorumpant. Quæ omnia Græcis, Sepia item Latinis, & Italis appellatur: Arabibus, Sarachan, & Sarthan: Germanis, Blacich: Hispanis, Siba: Gallis, Seche.

*Polypus*  
*et*  
*mollius*  
*est.*

*Sepiarum*  
*facilitate*

*Nomina.*

## MVLLEVS PISCIS.

## CAPVT XXI.

MVLLORVM assiduus cibo, aciem oculorum hebetari constat. Is marini draconis, aranei, ac scorpionis moribus medetur: si crudus, atque dissectus admoueat.



inflationes, tormina, singultus, venena, ixiámque ex aceto bibuntur: lethargicos, & vtunque veterino obdormiscentes excitant infusi: cum aceto autem, & rosaceo olfactu, & odoris suffitu, idem faciunt: pori & illiti profunt tremulis, conuulsis, & omnibus nervorum vitiis. In summa calfactoriam vim habent. Eligi debent testes, qui ex vno ortu connexi sunt (fieri enim non potest, vt gemini folliculi in vna membrana coniuncti reperiantur) liquore intus veluti ceroso, odore graui, & virus redolente, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corruptum, coniciunt in follem gummi, aut ammoniacum cum sanguine, & castorio subactum, & ita exiccantes. Vanum est, quod traditur, testes ab ipsis euelli, & a sese abiici, cum venatu vrgentur: siquidem tangi nequeunt, ita, vt in sue, substricti. Operæ autem pretium est, diuisa pelle melleum liquorem cum eueffiente tunica assumere, & siccatum potui dare.

## FIBER.

Fibri cōst-  
deratio.

QVEMADMODVM in superiore spectatur Germania, vbicunque Rhenu influit: quin & in Austria, atque Pannonia, vbi Danubius, in aliisque finitimis prouinciis, vbi Drauus, & Sauus discurrent, Fiber sane quem Græci *αἰγάριον* appellant, animal est (vt Dioscorides inquit) quod ex amphibio habetur genere: quippe quod & terris, & aquis vitam ducat: sibi nanque videtur modo in fluminibus natare, modo in litore vagari, modo in propinquis syluis spatari. Fiber lutæ se è faciem refert, maior tamen. Pedes huic sunt posteriores asserinis similes, anteriores vero vt tassus habet. Cauda est illi glabra, lata, piscium ferè modo squamosa. Estur hæc, quod gularu piscium carnes planè sippiat, iis etiam die-

bus, quibus nobis carne interdum est à lege. In cæteris denique corporis partibus parum, aut ferè nihil à lura diffidet. Quo factum est, vt crederent medicorum nonnulli easdem lutæ testibus inesse vires, quæ fibrorum testiculis insunt. Dentes Fibris anteriores ferocissimi, atque acutissimi sunt, quibus arborum ramos, vt ferro, cædit, quos postea miro coaptat artificio, sibi domum construit pluribus tabularis in riparum cauis, vbi iuxta flumina degit. Animal est horridi moris: nam hominis parte comprehensa, non ante, quam fracta concreuerint ossa, moru resolut. Vanum profecto est (vt etiam scribit Dioscorides, itemque Sestius medicus diligetissimus) credere Fibros sibi testes dentibus amputare, cum venatu vrgentur, ob hoc se peti gnari. Quandoquidem id nunquam in his compertum sit, qui nostra ætate capiuntur. Plinius huius facti anceps id affirmat lib. v. 11. cap. x. x. quod tamen postea negauit lib. x. x. 11. cap. 11. Cæterum diligenter animaduertere oportet, ne ab impostoribus adulterati Fibrorum testes emanent: namque pauci admodum habentur ex iis, qui venales Venetias importantur, qui quidem adulterio careant. Cuius manifesto est indicio nimia eorum magnitudo, cum legitimi parui admodum sint. Quin etiam præstantiæ iudicium præber conclusus liquor in recentibus mellis instar, in diutius verò asseruatis, cæra modo concretus. Adulteratur contritis eiusdem animalis renibus, sacris inde testium folliculis. At mihi quidem sæpius contingit, & videre, & habere ex Austria, Stiria, & Carniola Fibri testes, qui omni prorsus adulterio vacant: quos magnitudine, colore, odore, gustu, atque etiam viribus longè ab iis dissimiles esse comperimus, quibus officinarum vitur vulgus. Plinius lib. x. x. 11. cap. 11. eos Castoris testes efficacissimos putat, qui è Pôto afferuntur. Cui tamè refragatur Strabo lib. 11. suæ Geographiæ his verbis. Producit Capreas Hispania, equosque syluestres affatim. Quibusdam in locis lacus incrementa suscipiunt. Cygni, & eius generis aues plurimæ: similiter & Otides aues. Fluuij quidem ferunt Castoras: sed Castoreum non eam, quam Ponticum, habet vim. Pontico enim proprium est, vt venenosum sit, vt in aliis permultis. hæc Strabo. Ex quibus faciliè constat plurima in Pôto venenosa nasci. Id quod etiam in Bucolicis testatur Virgilius his versibus.

Has herbas, atque hæc Pôto mihi læta venena  
Ipse dedit Mæris: nascuntur plurima Ponto.  
Hinc verò sit, vt nesciam ego, cur iusserit Damocrates castorium Ponticum addi in Mithridatis antidotum, cum tamen Andromacho in theriacis compositione elegantur testes illi, quos castor Isthri, hoc est, ad Danubium viuens, protulit. Horum meminit Galenus libro x. 1. simplicium medicamentorum, sic inquit. Testiculos castoris nuncupant Castorium, medicamentum & celebre, & multi vsus, adeo vt

Vana opi-  
nio.Fibri re-  
stis adul-  
teratio.Castorei  
vires ex  
Cul.

Arch

Archigenes de Castorij vfu totum conscripserit librum. Arque ille sanè particulares eius facultates exposuit, nos verò velut in aliis medicamentis fecimus, ita & in hoc quoque generali modo facultatem dicemus: ad quam si quis respiciat, ipse per se particulares inuenire poterit. Itaque quod excalfaciunt manifestum est. nam si voles ipsum ad vnguem læuigatum oleo maceratum parti cuiuspiam illinire, & inficcare, euidenter illam incallescere percipies. Porro calfacientia omnia, vbi contacta substantia quippiam digerunt, continuò etiam illam desiccant, nisi si quid naturae fuerit humidum, seu oleum & aqua, atque aduentitiam qualitatem calidam, non facultatem assumpsit: sicut certe hæc ipsa igni, & soli æstiuo admoda. Itaq; cum Castorij consistentia quoque sit secca, & calfacienti potentiam habeat adiunctam merito desiccet. Atque hoc illi cum multis aliis medicamentis commune existit. Porro quoniam impense subtilium est partium, ob id plus valet, quam alia, quæ similiter vt ipsum & calfaciunt, & desiccant. Nam quæ tenuium sunt partium medicamenta, iis quæ sunt crassarum, plus sunt efficacia, etiam si parem sortita fuerint facultatem, nimirum quia penetrant, & in altum subeant admodum corporum, potissimum si ea densa fuerint, velut neruacea. Palam igitur talia ob causam positam magnifice iuuantur à castorio. Cæterum falluntur medicorum plerique in vfu Castorij, cum id modo considerant, partem quampiam aut tremere, aut conuelli, aut sensu motuue priuatam, aut agere sentire: haud scientes id genus symptomata ad dissimiles sequi corporis affectus. At tu ab Hippocrate doctus, ex plenitudine pariter, & inanitione consulationem fieri, vbi quidem quæ in nervis continentur præter naturam, euacuare consilium est, ibi & bibendum exhibe, & foris cuti castorium impone. Vbi verò ex siccitate nimia obuenerit consilium, scito hoc medicamen illic esse aduersissimum. Ad eundem modum, iis qui præ plenitudine tremunt, vtilissimum: aduersissimum verò iis, quibus huiusmodi affectus accedit ab inanitione. Ad portionem modò dictorum assestuum, vbi singulus euenerit stomachi, perfructato prius, inueneritque illius affectu, ac discretato, si quidem à plenitudine ipsum ægroti perperiantur, ad castorij vsum accedito. Sin autem à siccitate, & euacuatione, aut acuum humorum morfu prouenerit, medicamen hoc fugito. Sanè si odori, gustuq; aduersat animum, suspicaberis humano corpori aduersissimam habere substantiam: tamen si in natura nihil efficere conperiat eorum, quæ talia facere assolent. Si quidem alia stomachum viciant, alia ventrem, alia cauent, alia aliam quamuis partem lèdunt. At hoc medicamen se corpori humido applices refecationem poscenti, siue frigido excalfactionem, siue humido simul frigidoque excalfactionem pariter & refecatio-

nem requirenti, magnam vique ostendit vtilitatem: nec vllam parti cuiquam noxam impertit, potissimum si febris vacet, aut non admodum calidam perpetiatur homo febrem, sed vt sic dicam tepidam, qualis accedit in caraphoris maximè, & lethargis. Ac multis sanè Castorium exhibuimus vnà cū pipere albo, vt trun-  
 10 que mensura cochlearij ex melicrato bibendū præbentes: nec quisquam vllam sensie noxam. Sed & mensibus retentis, vbi per venam, quæ in talo est, modicè euacuassent, chlaro castorio vnà cum puiegio, aut calamintha, semper medicamen hoc expertus sum purgationem  
 20 ciere, absque vt scemnam læderet. Præterea locos morantes eicit. eaque omnia ex melicrato potum efficit. At quibus ita venter statim distenditur, vt ægrè curationem admittat, aut torminibus vexatur, atque singultu, idque ob frigidum, viscososq; humores, aut crassos, flatulentosq; spiritus, eos ex oxysterato potum adiuuat. Quæ porro iuuat in corpus intrò sumptū,  
 30 iis prodest quoque cuti impositum cum scyonio, aut veteri oleo. Quæ vero ampliori caliditate indigent, iis etiam per sese inficari debet. Iuuat etiam, si quis suffitum eius in prunis impositi inspiratione hauriat, maximè humidos, & frigidus affectus in pulmone, aut cerebro consistentes. Attamen lethargicos, & cataphoricos affectus, qui quidem adiunctum habent febrem, præstat non dictorum oleorum quopiam macerantes curare, sed potius ex rosaceo capiti, colloq; imponere. hætenus de castoreo Galenus. Cæterum, vt Plinius est auctor lib. x x i i .cap. i i i . Castoreum sumptum comitialibus auxiliatur. Medetur & dentibus ex oleo in aurem infusum, à cuius parte  
 40 doleant. Aurium doloribus melius, si cum meconio infundatur. Vrina quoque Fibri resistit venenæ, & ob id in antidota additur. Afferuatur autem optimè in sua vesica, vt aliqui existimant. Animal, quod natus Græcè, Fiber Latine dicitur: Arabicè, Inchiam alginde bedufier, Giendestiar, seu Giendibidistiar: Italicè, Castoreo: Germanicè, Byber: Hispanicè, Biuario, & Buiero: Gallicè, Bieure.  
 50 † Cum in impressis hoc loco legatur *arsisop*, id est, potui dare: tamen in codice manu scripto, in quem Oribasius (vt alias diximus) Dioscoridis verba retulit, legitur *amrisop*, id est, reponere. Quæ lectio ideo verior esse videtur, quòd castorium (teste Dioscoride) non solum potui datur, sed etiam infundatur, & suffiatur.

MVSTELA VULGARIS.  
CAP. XXIIII.

MVSTELA, quæ in domibus nostris oberrat, ambugta exenteratur, & inueterata sale, in vmbra siccat. Ea binis drachmis cū vino pora, aduersus omnia serpentiū venenarū præsentaneo est remedio:

remedio : toxico, simili sumptâ modo, resistit. Eius ventriculus coriandro farctus, inueteratusq; , percussis à serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Cre mata in fistili podagricis confert, cinere ex aceto illito. Sanguine peruncatâ strumâ iuuantur : comitialibus etiam prodest.



*Mustela  
considera  
tio.*

*Vana quo  
rundam  
opinio.*

*Encely la  
pisc.*

*Martes,  
Es earum  
historia.*

MUSTELA vulgaris notitiâ in Italia, animal est mirâ sagacitatâ, & quamquam corpore paruum, animo tamen inuicâ conflat, atq; feroci. Mustelarum duo genera esse auctor est Plinius libro x x i x. capite i i i i. Alterum syluestre, quod in agris, & vepribus vicam agit. Alterum domesticum, quod in domibus nostris oberrat. Vtraque adeo cupidè catulos suos diligit, ut eos hinc aliò transferant, verentes ne sibi ij surripiantur. Quo factum est, quemadmodum memoriâ prodidit Aristoteles libro i i i. de generatione animalium, capite v i. ut eum vidisset quidam, Mustelas catulos suos, quos paruos admodum parit, ore suscepro transferre, falsò opinati sunt, eas ore parere. Quorum opinionibus adimplatur Ouidius: cui tamen venia danda est, cum poetis quilibet audenti amplissima sit potestas. Non est similiter in eo audiendus Christophorus Encelius, vir alioquin eruditus, quod lib. i i i. cap. i i i i. de fossiliâ natura, vulgi fortasse sententiæ addidit magis, quam Aristotelis & aliorum probatissimorum auctorum, sepas, loligines, locustas, & squillas ore coire ac parere, ridenda historia scriptum reliquerit, qui præterea coruos & syluestres gallinas ore concipere magno errore tradidit. Cæterum in mustelarum genere recentenitur quæ MARTES appellantur, quarum duæ in Italia habentur species. Vna namque pilo vestitur fuluo nigricante, excepta gutturis parte, quæ albacit. hanc nos vulgò dicimus Faina. Hoc animal oderunt rura, quod sæpe domos illorum ingreditur, vbi non modò gallinas, quas inuenit, uigulat, sanguine plerumque exucto, sed etiam oua exhaunt & exorbet. quin & in turres ascendit, atque inibi columbas (modò eas comprehendere possit) earumque pullos enecat. Altera syluas incolit, raòque illas deserit. hæc propriè Mars vocatur. Differt ab illa, quòd corpore consistat aliquan-

tulàm longiore, gutture sit luteo, & pilo con-  
tegitur clariore, tactuque molliore. ut vel his  
nominibus eius generis pelles magnatibus ex-  
petantur ad hyemales velles suffulciendas. Sunt  
qui putent, postremam hanc duorum esse ge-  
nerum: alterum quidem, quod in fagis, quer-  
nâ, iligneisq; syluis versatur: alterum verò,  
quod in piceis & abiegnis tantum oberrat, pul-  
chrius nimirum aspectu. Mustelarum quoq; ge-  
neri adscribitur quod Germani ZOBELLAM, *Zobella hi  
storia.*  
nos verò Zibellinum vocamus. Hæc corporis  
tum forma, tum magnitudine parum differt à  
marte, quantum paulò minor sit. Totum corpus  
habet pilis fulvis vestitum, præterquam guttur,  
quod ex albo nigricat. Zobellis referta est Mos-  
couia, & Lituania, atque etiam iis abundant fin-  
itimæ aliæ regiones, à quibus eorum pelles ad  
nos conuehuncur. Vaneunt magnò pretio in  
locis etiam, ubi capiuntur, quo sit, ut venatores  
quandoque distissimi fiant. Horrò & VIVERRA *Viverra.*  
& inter mustelas annumeratur. Ea autem ani-  
mal est siuri magnitudine, pilo subluco, audax  
admodum, & animantibus ferè cunctis inimi-  
cus, præsertim caniculis, quos sæpe gregatim  
suis ex antris pellit. Oblectatur sanguine mi-  
rum in modum, adeo ut sanguine potius, quam  
carnibus victitet. Inueniuntur præterea, (ut  
diximus) in Germania, Polonia, & vicinis locis alia  
Mustelarum generaque quoniam hæcenus ipse  
non vidi, neque explorata sunt mihi, ideo quid  
de iis scribam, non habeo. Verùm quòd nunc  
in Bohemâ vitam agam, equidem futurum  
spero fauore atque auxilio Sereniss. Ferdinan-  
di Archiducis Austriæ Principis, & domini mi-  
hi colendissimi, ut non solum mihi liceat tra-  
ctu temporis hæc & alia animalia videre & co-  
gnoscerè, quæ in hac boreali plaga proueniunt,  
sed & multa rara consequi, quæ ad rem tum  
herbariam, tum metallicam spectabant. Muste-  
læ serpentes acriter persequuntur, dimicantq;  
deuorata prius rura. Basilisco mustelæ virus ex-  
tio esse auctor est Plinius libro v i i i. capite  
x x i. addit naturæ nihil placuit esse fine parti.  
Iniciunt enim eas cauernis faciliè cognitâ, sola  
tabe. Necant illi simul odore, moriunturque, &  
naturæ pugnam conficiunt. Mustelæ etiam ocu-  
lis puncti erutis aiunt visum reuerit, eademq;  
quæ in lacertis, & annulis faciunt. Mustelæ cu-  
suslibet simus moschum nonnihil respicit. Is  
melle exceptus, addita lupinorū aut fœni græ-  
ci farina, strumâ, cæterisque picuitosis tumo-  
res discutit. Mustelarum felle cum succo fœni-  
culi vtuntur quidam ad oculorum argemas &  
nubeculas. quin etiam idem lentiginis, & alia  
huiusmodi cutis vitia emaculare perhibent, si  
cum melle, & vitis albæ radicis, aut ari farina  
illinatur. Nec desunt, qui putent Mustelarum  
pulmonem ad omnes pulmonis morbos effica-  
cem esse. Mustelurū combusturū cinis aqua sub-  
actus illitu capitis dolores mulcet: oculis verò  
iniecus suffusiones emendat. Hoc animal *Nemina.*  
Græcis dicitur: Lacinis, Mustela: Italis, Donnola.  
RANAE



RANÆ.

CAP. XXV.

CONTRA omnium serpentium venena pro antidoto sunt Ranæ, si ex sale & oleo decoctæ edantur, iusque earum itemdum forbeat: contra inueteratos tendinum rigores pollent. Illitus earum cinis, profluentis sanguinis impetus sistit: explendis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illinitur. Viridium ranarum cruor auulso genis pilos renasci prohibet, in vestigia euulso rû instillatus decoctus in aceto, & aqua, dentium dolore collatione leniunt.



Ranarum  
consideratio.

RANÆ Italis, præsertimque Insularum populis frequentissimæ. Genere sine differunt, quemadmodum magnitudine, colore, ac natura. Aliæ nanque ex putredine gignuntur æstiuis imbris, puluere madefacto, quibus sic ortis brevis est vita, nullisque earum usus. Aliæ verò ritè, & secundum naturæ ordinem, proueniunt in mari, fluuiis, paludibus, ac lacubus. Sunt & terrestres, quæ in frutetis, & rubetis plerumque viciant, ob idq; Rubetæ Latinis dicuntur. Nec defunt in hoc genere, quæ etiam Calamitæ dicantur, quod in arundinetis vitam agant. Verum utraq; & venenatæ, & lethales habentur. Cæterum illæ in fluuiis, paludibus, & lacubus versantur, & degunt, quarum nobis in cibis inualuit usus, colore viridi, aut subrutilo, cinereo vè. tamen si & inibi quandoque ex his cernuntur, quæ non tutò edi possunt: vix potest quæ à rubetis non multum perniciæ distent.

Ranarum  
descriptio.


Partiunt Ranæ, ut Plinius tradit libro 1. x. cap. 1. & experientia quotidie comprobari potest, minimas carnes, nigras, quas gyrynos vocant, oculis tantum, & cauda insignes: mox pedes figurantur, cauda findente se in posteriores. Mirumq; si mestri vita resoluuntur in limum nullo cernente, & rursus vernis aquis renascuntur, quæ sunt natæ, perinde occulta ratione, cum omnibus annis id eueniat. hæc Plinius. Cui tamen sententiæ proflus refragatur experientia: quippe quod in paludibus maritimis, quæ glaciem nunquam i. yeme contrahunt, quocumque anni tempore ranas conspiciere liceat. Quapro-

pter dicendum fuerit, Plinium eas tantum quocumque in limo resoluere existimasse, quæ ex ipsius aquæ, & terræ putredine gignuntur. Atque sic Græcè, Ranæ Latine vocantur: Arabicè, Didda, seu Dadda: Italicè, Rane: Germanicè, Frofchi: Hispanicè, Ranas: Gallicè, Granoille, & Raue.

SILVRVS.

CAP. XXVI.

SILVRVS recens in cibo nutrit, & facilem præbet alium: sale verò conditus, minimum suppeditat alimentum, arteriam expurgat, & vocem expedit. Illita saliti caro, aculeos, & infixæ corpori spicula extrahit. Muria eius incipientibus dysenteris prodest, si in desidentium foras adiciatur: fluxiones siquidem ad summa cutis elicit, ischiadicis infusa medetur.



EXISTIMAT Paulus Iouius in libello de Pauli Romanis piscibus, Silurum eum esse piscem, cui opinio quem vulgus Sturionem appellat. Veruntamen si Aristoteli, & Plinio est adhuc benda fides, liquet, aliud constabit, aliud piscis genus esse Silurum, aliud Sturionem. Nanque Aristoteles Siluros dentes assignat adeo firmos, atque acuros, ut iis hamos etiam ferreos frangere valeat. Plinius item libro 1. x. cap. x. v. tradidit, Silurum ubique sit, grassari, omnemque animal appetere: idcirco innatantes equos sæpe demergere, præcipue in Rheno Germaniæ: anne prope Liffiboum, & in Danubio. At Sturiones etsi prægrandes sint, edentuli penitus habentur. Ad hæc Silurus Aristoteli, & Plinio fluuiatilis semper describitur piscis, cum tamen Sturio frequentius in mari, quam in fluminibus reperitur. Quo factum est, ut facile deductus sim in sententiam clarissimi Manardi Ferraviensis: quippe quod pro certo crediderim, Silurum Italici haudquaquam esse cognitum. Quandoquidem inibi in fluminibus, quanquam ingentibus, nunquam (quod sciam) Silurus fuerit repertus. Pannoni Danubij accolæ Silurum vulgari sermone vocant Acchia: Rheni verò litora inhabitantes Germanica lingua Bolich appellant: siquidem is maxime grassatur, morsuque perit omne animal.


mal, quod sibi obuiam fit. Is effigie gobium refert capite magno, ore amplo, & dentibus ferocissimis. Hac in sententia me quoque Plinius confirmat: is enim Silurum & in Rheno, & in Danubio nasci auctor est. Piscis, qui *ἀσπιδος* Græcis, Silurus Latinis appellatur: Arabibus, Harbe: Italis, Siluro: Germanis, Bolich, & Balich.

## SMARIDES.

CAP. XXVII.

SMARIDIS piscis saliti caput exultu excrescentes ulcerum oras, puluillosque reprimat: nomas cohibet: thymos, clausosque absument. Caro non fecus atque salsamentum prodest: a scorpione percussis, aut a cane demorsis.


## SMARIDES.



## MAENAE.

CAP. XXVIII.

MAENARVM ex capitibus cinis, si illinatur, callosas fedis rimas abolet. Eius etiam garum oris putrilagine collutione fedat.



ET SI studij, ac diligentiae plurimum impenderit, ut quoniam piscis sit Smaris, certior fierem, nunquam tamen apud Aristotelem, nec Plinium, nec denique veterum quonquam aliquid certi nactus sum, ita ut plane Smaridem cognoscere, ac describere possem. Illud tantum inueni, iis Smaridem esse pisciculum, menis

facie similem. Ex quo facile adductus sum, ut eos non longe aberrare putarem, qui Smarides eos pisciculos dixerit, quos vulgo Veneti appellant Giroli: namque hi præter id quod corpore minores sunt, menas notis omnibus representant. Cæterum cum Menæ, quæ vulgo Menole dicuntur, sint vulgaris notitiæ, non est, cur plura de eis differam. *Σμαρίδης* ita Græcis, ut etiam Latinis Smarides nominantur: Arabibus, Abfumaris: Italis, Smaridi. Quæ verò Græcè *μαρίδης*, Latine Menæ dicuntur: Italicè, Menole: Hispanicè, Pandelhas.

## GOBIVS. CAP. XXIX.

GOBIVS recens in suillu ventrem coniectus, si confusa rima in duodecim aquæ sextariis, donec duo super sint, decoquatur, excolatus & sub diuo refrigeratus potui datur, alius sine molestia deicitur. Illitus contra serpentium, canumque morsus auxilium est.

## GOBIVS.



## GOBII ALIUD GENVS, OVER PAGANELLO.



GOBII in Venetis ichthyopoliis frequentissimi conspiciuntur, quod inibi in finitimis lacunis mirum in modum fecerint, ac numerosi proueniunt. Quare non immerito prodidit Aristoteles in maiinis litoribus, ubi in profundum non labatur aqua, summa cum voluptate morari Gobios. Hos Veneti detrahis postremo syllabis Go vulgo vocant. Capite sunt culices amplo, gustuque persuasus, quod carnem ha-

*Smaridis consideratio.*

*Gobij fa-  
culatiles  
ex Gal.*

beant tum pinguem, tum etiam friabilem. Proinde de his differens Galenus libro 111. de alimentorum facultatibus, sic inquit. Gobius litoralis est piscis, ex eorum numero, qui parvi perpetuò manent. Præstantissimus autem ad voluptatem, coctionem, simul ac distributionem, & succi bonitatem est is, qui in arenosis litoribus, aut saxosis promontoriis vivit. At qui in fluminum ostiis, aut stagnis, aut stagnis marinis versatur, non æque suavis est, neque 10  
probi succi, neque concoctu facilis. Cæterum sciendum est (vt etiam annotauit Galenus) Gobios non in mari tantum reperiri, verum etiam in fluminibus, & lacubus, quemadmodum testantur ij, qui in Lario lacu, itémque

*Gobij flu-  
uiatiles.*

# GOBII FLUVIATILIS.




Verbano capiuntur, laudatissimi quidem, propterea quod eorum iecur maximam cum palato inest gratiam. In fluuiis vniuersim minores existunt, quamquam ex iis etiam nonnullos inuenias, qui duas, aut tres vncias pendat. In agro Tridentino pauci, admodum sunt fluuij, qui Gobios non alant: namque & Athesis & Nosiis, & Lauisus, & Sarca iis refertissimi sunt. Hos inibi quidam vulgò vocant Capitoni, quidam verò Marfoni: at in Hetruria, vbi tamen rarissimi habentur, corrupto à Gobii vocabulo, vulgò dicuntur Ghiozzi. Sunt hi pisciculi non modò cœcoctu facillimi, sed & oris suauissimi, atque gratissimi, præsertim cum ovis turgent: hæc enim in his & pinguia, & copiosa sunt, gustui verò suauissima. Quo fit, vt solertissimi piscatores horum fortunas obseruantes, non minus expiscandis ovis operâ naueat, quam piscibus ipsis. *Xephis* Græcis, Latinis similiter Gobius appellatur: Arabibus, Kamen: Italis, Gobio: Germanis, Goeb: Hispanis, Cadozes: Gallis, Gour: ons.

*Nomina.*

THUNNVS. CAP. XXX.

CONDITANEI thunnicaro, quam omotarichon vocant, sumpta iis auxiliatur, quos vipera nomine prester mo mordere: sed oportet vinum quam plurimum subinde cogantur haurire, ita vt vomitione reddatur. Contra acrimonias esitatorum maximè valet: canum moribus vtilissimè illinitur.



THUNNI pisces inter cetaceorum genera recensentur. II multitudine sua omnibus litoribus sunt notè, præsertimq: Tyrreni ac colis magis, quàm iis, qui Adriatici litora inhabitant. In Euripis maxima eorum est captura. Irrumpant maio mense, ac iunio in mare nostrum mediterraneum per Herculis columnas ab Atlantico oceano, cogentibus xiphis, hoc est, spathis piscibus, qui ensè à rostris prominente instructi, eos toto mari persequuntur: sunt enim xiphie immanes beluæ. Nam (vt Plinius inquit libro xxxiii. cap. 11. mucronato rostro tam validè naues perfodunt, vt in oceano mergantur, præsertim ad Mauritaniam locum, qui Cotta vocatur, non procul à Lixio flumine. Thunni igitur cum piscium simplicissimi, timidissimiq: sint, non aliter in fugam à xiphis gregatim aguntur, quam ouium greges à lupis. Quam ob causam vel inanibus terrore acti, facile vadis, atque litoribus intruduntur. Porro summa spectantium voluntate maio, & iunio mensibus Thunni à Gaditanis non longè ab Herculeo fretu capiuntur, ad quam piscationem vniuersis concurrunt populus, maximo clamore, tympanorum sonitu, ac bellicis puluere, & igne concepitantibus terrore actis. Hæc enim eorum capturam faciliorem reddunt: quandoquidè stolidi cum sint, vocibus, & strepitu territi, concitantur ad vada: quo in loco postea gregatim retibus capiuntur, maximoq: omnium plausu trahuntur in litus. Thunni diuersa fortuntur nomina: namque primus thunnorum factus ab ipso statim ovo. Cordilla dicitur, qui mox in Limarias euadit: ex limariis autè adulescentibus Pelamides sunt, sic à luto dictæ: cum verò hæc pedalem excessere mensuram, in Thunnos abeunt. Athenæus hos diu viuere ait, & in prægrandes euadere pisces. Sed huic opinioni videtur aduersari Aristoteles, cum asseueret, eos biennio vitam finire. Animal est paruum (vt scribit Plinius) scorpionis effigie. Hoc ardente srio sub pinna affigit aculeo, tantòque infestat dolore, vt in naues exiliant: quo tempore, vt maxime noxii damnantur in cibis. Cæterum thunnorum ventres, quò in cibatu ori gratiores habentur, eò magis ventriculo nocent: contra eorum carnes, quæ o-

*Thunni cō-  
siderati.*

*Xiphie pi-  
scis.*

*Thunni cō-  
captura,  
cōnomi-  
na.*

*Thunni cō-  
in cibis fa-  
culatiles.*

tam

tantâ cum palato ineant gratiam, minorem tamen ventriculo inferunt noxam. Quamquam huicemodi pisces, qui in ceraceorum genere recensentur (vt Galenus est author libro 111. de alimentorum facultatibus) dura carne sunt præditi: quam ob causam & prauis sunt succi, & excrementi præbent alimentum. Quapropter sale macerata plerumque eduntur, quod inde alimonia tenuior facta ex ipsis in corpus distribuitur: ob idq; sit coctioni, & sanguini faciendo accommodatio. Nam recens horum caro ni admodum probè concoquatur, magnam crudorum succorum copiam in venis congerit. Piscis, qui Græcis *ῥυζός*, Latinis item Thunnus vocatur: Arabibus, Kefam, & Aliena: Italis, Tonno: Hispanis, Atuni: Gallis, Thon.

Nomina.

## GARVM. CAP. XXXI.

GARVM omne, quod ex piscibus, carnibusque sale maceratis liquamen est, si ex eo fatus fiat, depascentia vlcera sistit. Morsus à cane medetur. dynterici, atque ischiadici infunditur: nonnullis, vt exulcerata adurat: aliis autem ad laceranda, quæ vlcera non senserunt.

## IUS PISCIVM. CAP. XXXII.

RECENTIVM piscium ius, modò per se, modò ex vino potum, aluû subducit. Priuatim ad hunc vsum conficitur è phycidibus, & scorpionibus, & iulide, è percis, & recentibus aliis faxatilibus, nec viris respicientibus, simpliciter cum aqua, oleo, & anetho.

Garicon-  
sideratio.

GARVM dictum esse à veteribus tradidit Plinius lib. x x x i. cap. v i i. quòd olim conficeretur ex pisce, quem Græci garon vocabant, intestinis illius sale maceratis, ac eliquatis. Quod item postea è scombri exitis confectum est. Fuit olim Garum complurium ciborum condimentum, ad vò vt nullus ferè liquor, qui ad gulæ luxum magis præstaret, ab antiquis fuerit excogitatus. Veruntamen de hoc non intellexit Dioscorides, sed generatim de omni piscium, & carniû maria, quæ hæc diutius asseruari solent. Cæterum de piscium iure non est cur pluribus agam, cum satis ab ipso auctore de eo proditum sit. Quod Græci *γαρὺν*, Latini similiter Garum dicunt: Arabes, Muri, siue Al-muri: Itali, Garo, & Salamuoia. Quod verò Græcis *ῥυζός*, Latinis ius piscium dicitur: Italis, Brodo de pesti.

## CIMICES LECTVLARES.

## CAP. XXXIII.

CIMICES, qui in cubilibus enascu-

tur, cauis fabarum inclusi, si ante febrium significationes septeni deouentur, quartanis auxilio sunt: & citra fabas sumpti, percussis ab aspidè profunt: vuluarum exanimationes olfactu reuocant. Poti cum vino aut aceto, adherentes sanguifugas abigunt: triti, & vrinariæ fistulæ impositi, vrinæ angustias leuant.



INTER omnes nocturnos hostes, qui nobis dulcem somni quietem intercipiunt, nulli quidem nocentiores, infestioresque habentur, quam Cimices: quippe qui non solum morsu dilacerant, quo & somnum interturbant, & sanguinem nobis adimunt, sed etiam fororè ad eò detestabilem, abominandumque nobis ex se relinquant, vt eo longè magis sensus, spiritusque lædantur, quam vniuersæ corporis partes, quæ ab iis fuerint istæ. Cæterum tamen infestissima, foetidissimaque sint animalia, noluit tamen eos genuisse natura omnium rerum parens, quin suum haberent in medicina vsum. Vtuntur iis recentiores quidam ad curandam vrinam viuis in penis organum immisiss, non autè mortuis, & tritis, Dioscoridis modo. Quod mihi magis consentaneum esse videtur: siquidem in meatum vrinarium inditi, ingressu titillationem excitant, & vrinæ vim expultricem proritant.

Cimices  
considera-  
tio.

30

40

Sunt & syluestres Cimices, qui ex herbis victu, & locu habent, lectulariis maiores, colore viridi, æquè ac illi foetidi. Sed hi nullum, quod sciam, obinent in medicina vsum. Cimices ita Latinis, *népas* Græcis appellatur: Italis, Cimici: Germanis, Vuantzen: Hispanis, Chismes, Chime-fas, & Parauelhos: Gallis, Punaïses.


Cimices  
syluestres.

Nomina.

## MILLEPEDÆ. CAP. XXXIIII.

MILLEPEDÆ, quæ subaquario vase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ contacta manu contrahuntur in orbem. Hæ ex vino potæ difficili vrinæ, & regio morbo auxiliantur. Milleepæ cum melle anginis vtiliter illinuntur. tritæ, & in cortice mali punici calfactæ, doloribus aurium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.

Nomina.



*Millepeda-  
da-  
rum  
genus.*

**MILLEPEDAE**, quas vulgò appellamus Porceletti, animalia sunt exigua, & omnibus vulgaria. Proinde non operæpretium duxi, ut plura de eis in præsentia referam, quam tradiderit Dioscorides. Cæterum animalcula hæc Galeno commendata sunt libro 11. de compositione medicamentorum secundum locos ad diurnos capitis dolores, vbi sic inquit. Maxime etiam profunt sub aquario vase nascentes aselli, millepedæ appellati, si oleo incoquantur. Quamobrem nesciuerim, cur dixerit Plinius libro xxi. cap. ultimo, Millepedam animal esse et vermibus terræ pilosum, multis pedibus arcuatim repens. Animalia, quæ Græcè *aselli*, Latine Millepedæ, Aselli, & Millepedæ vocantur: Arabice, Harna: Italicè, Millepedi, & Porceletti: Germanicè, Esel: Hispanicè, Gallimilha: Gallicè, Cloporre.

**BLATTA.** CAP. XXXV.

**BLATTA** eius, quæ in pistrinis invenitur, interanea trita, aut cum oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

*Blattarum con-  
sideratio.*

**BLATTARVM** plura esse genera, auctor est Plinius lib. xxi. cap. ultimo. Verum hæc, quorum in Hetruria aliquibus locis ingens, est multitudo, & quæ vulgò vocantur Piattolle, noctu magis, quam interdiu in cellis vinariis apparentes circa latrinarum ora, in pistrinis, balneis vliginosisque ædium partibus, foedissima quidem, nausæosaeque sunt animalia. Gryllos hæc, qui noctibus æstare frident, quadantenus referunt: planiores tamen, cruribus etiam tum tenuioribus araneorum modo: proinde fugæ citissimæ. Lux istis aduersissima, ita ut, si nocte lumen repente inferatur humentibus locis, in quibus degunt, celerissimo cursu refugiant. De his igitur, vapore quæ multum in pistrinis versantur, intellexisse Dioscoridem credendum est: non autem de illis vermiculorum modo oblongis, quæ in apum alucariis, & in carnis diu sale inueteratis enascuntur: quanquam & hæc Blatæ nomen sibi vendicauerint. Nobis hæc vocantur vulgò Barbeggie, aliis verò Carpe. Blattarum vires, quas pluribus Plinius conscripsit, silentio inuoluimus, rati gravioribus, salubrioribusque remediis morbos

posse sanari, quam iis, qui à tam foetidis, æque execrandis fumantur animalibus. Quæ Græcis *σάπες*, Latinis, pariter & Italis Blatta nominatur: Germanis, Grillen, & Heymichen: Hispanis, Rapa coua.

*Nomina.*

**PVLMO MARINVS.**  
CAP. XXXVI.

**PODAGRAS**, pernionisque emendat pulmo marinus recens, tritus, & illitus.

**PVLMONES** marini animalium pulmonibus non absimiles habentur. His (ut Plinius est auctor libro 11. capite xlii.) eadem quæ fructi inest natura, perinde ac spongiis, vitæis, stellis, & olorhyris. Conspiciuntur marini pulmones plerumque vndis supernatantes, futuram maris procellam præsigentes. Mirum, quod si iis virgæ baculique perungantur, nocte facium accensarum modo lucem edunt. *πνεύμα λανθάνον* ita Græcis, Latinis verò Pulmo marinus appellatur: Italis, Polmone marino: Hispanis, Natura de vieya, & Ca pacha de velha.

*Pulmonis  
marini  
consideratio.*

*Nomina.*

**PVLMONES.** CAP. XXXVII.

**SVILLVS**, & agninus, vrsinusque pulmo impostu, attritus à calcamentis contractos, ab inflammatione tuetur. Vulpinus verò si aresfactus bibatur, suspiriosos adiuuat. Adeps quoque liquefactus, infususque aurium dolores finit.



**MVLTA** præterea sunt horum animalium membra, de pulmonibus quorum differit Dioscorides, quæ medicamenti vim possident, de quibus postea speciatim suis locis dicetur. Verum cum hæc animalia nemini non sint cognita non opus esse existimo, ut de iis plura dicamus. Quanquā illud silentio non dissimulandum, quod scilicet Vrsarū partus non sit plarimis membris indifferetis, cruribus præsertim, & vndique rudis, ac informis: nec quod parentis linctu formam tandem recipiat vrsinam, ut nonnulli scriptis commendarunt, & credit vulgus.

*Vana de  
Vrsa par-  
tu opinio.*

Quando

Quandoquidē in valle Anania supra Tridentum vidimus nos prægrandē Vrsam prægnantem, ab ipsis venatoribus exenteratam, cuius catuli adhuc in vtero existentes, omnibus suis membris distinctis, ac formatis reperti sunt, non autem informes, vt plerique existimant, magis fortasse Aristotelis, & Plinij auctoritatibus freti, qui ita esse memoriæ prodiderunt, quàm sensibus, & experientia. *Ursus* Græcè, Pulmones Latine dicuntur: Arabicè, Rich, & Riche: Italicè, Polmoni: Hispanicè, Leuianos: Gallicè, Poulmons.

Nomina.

## IOCINERA. CAP. XXXVIII.

ASINI IECUR inassatum est comitalibus prodest: verumtamen ieiunius edendū præcipitur. Capræ verò inassati decidua sanie, inungi lusciosos prodest: & dū coquitur, apertos oculos halitu eius vaporari. prodest in cibotustum ad eadem. Tradunt hircini iocineris cibo comitiales deprehendi. Aprinum recens si arefactum teratur, ex vino potum, contra serpentium, † volucrumque morsus auxilio est. Iecur canis, qui rabie exagitur, tostum, & in cibo ab emorsis sumptum, ne tententur metu aquæ tueri creditur. Vtuntur autem ad arcendos aquæ pauores dente eo, qui caninus dicitur. hunc à cane, qui momordit, exemptum, & folliculo inditum, pro amulero brachio adnectunt. Inueteratum autem sale mergi iecur, ex hydromelite binis ligulis potum, secundas pellit.



*Iocineris  
lupi confici  
debet.*

PRAETER Asini, Capræ, Hirci, Aprini, rabidi Canis, & Mergi iecur, est & Lupinum, quo vtuntur medicorum nonnulli, qui primas tenent in vniuersa Italia. Siccant enim lupinum iecur, mox in puluerem conterunt, & tanquam præcipuum medicamentum iis exhi-

bent, qui iocinerosis afficiuntur fluxionibus: iisq; similiter, qui aqua intercurem laborant. Quanquam id probare non videatur Galenus libro x. simplicium medicamentorum, sic inquit. Iecur lupinum saepenumero in medicamentum indidi hepaticum, quod ex eupatorio conficitur, nec tamen quod memoria dignum sit, amplius præstare comperi, ad illud videlicet comparans, quod sine ipso componitur. Secus autem Galenus de iecore lupino scripsit postea libro & capite. v. 111. de compositione medicamentorum secundum locos,

vbi iecinoris medicamenta recenset, cum sic inquit. Cochlearum terrestrium carnem valde probe terito, & affusus vini nigri cyathis tribus calfacito, ac bibendum dato. Videntur autem hæc iuxta totam substantiam efficacia esse, non secundum vnam aut alteram qualitatem. Quale est & Lupinum hepar, cuius abunde experimentum habemus. Vfus autem ipsius consimilis cochleis est. teritur enim exacte hepar lupinum, & datur drachma vna cum vino aliquo dulci, qualia sunt theriacum, Creticum, & scybelites, ac dulce protopium. Benigna enim hæc sunt viscera, ipsum nutrire potentia, & media iuxta calidi & frigidi oppositionem: & ob id talia pharmaca omnibus in temperaturis conuenire videntur, vt quæ ex substantiæ proprietate commoditatem de se exhibent, & neque calidas, neque frigidas intemperies lædant, hæcenus Galenus. Ceterum idem in simplicium medicamentorum censu, libro paulo antè citato, Canis rabidi iecur non iis præstare viribus, quibus aliquorū fert opinio, scriptum reliquit his verbis. Iecur rabientis canis, si assum datur, remedium existere iis, qui ab ipso fuerint demorsi quibuscumque memoriæ est proditum. Ac scio certè quoddam, qui ipsum sumpsere, mansisse superstitēs, verum non illo solo. Siquidem aliis præterea remediis vsi sunt, quorum fecimus periculum in rabiosorum morsibus. Audiui verò quosdam, cum illi soli fidem habuissent, postea mortuos. De iecore Mergi in aqua degentis, tamen si Galenus nihil literis mandauerit, Paulus tamen id renam calculos eiecere tradidit. Dioscorides verò secundas, non autem calculos pellere protulit. Quo fit, vt Pauli codicem deprauatum esse crediderim. At ventris quidem Mergi meminit Galenus citato loco, eorum opinionem vt vanam explodens, qui ventriculo roborando ipsum exhibent. Eosque item deridet medicos, qui ad idem vsurpant internas ventriculorum gallinarum tunicas: siquidem ait, se vtunque expertum fuisse, nec inde quicquam consecutū emolumenti. Quod tamen cum ignoret recentiorum quidam, cum seplasiatis ad ventriculum roborandum aliquid præcipiant, nihil frequentius habent in ore, quàm illud, Recipe stomachi gallinarum, longè magis vulgum, quàm Galeni dogmata secuti: quanquam in hoc Galenus sua

*Canis rabidi.*

*Mergi iecur, & Senter.*

expert

experientia fretus, aperte Dioscoridi refragetur. Quod Græci *ἥπαρ* Latini item hepar, & iecur vocant: Mauriani, Bedib: Itali, Fegato: Germani, Leber: Hispani, Fígado: Galli, Foyes.

† Sunt qui hoc loco non *ἥπαρ*, quod est volucrum, legant, sed *ἡνέριον*, id est, quadrupedum, priore tantum mutata litera. Certè *ἡνέριον* hic fuit librariorum lapsus: tamen quæ sit vera Dioscoridis scriptura, non facile intelligi potest, cum Plinio aures etiam dentatæ prodantur.

GENITALE CERVI.  
CAP. XXXIX.

GENITALE cervi tritum, & in vino potu, à vipera demorsus auxiliatur.

*Genitale cervi Galienus res.*

RASIS auctor est, Genitale cervi, præter vim, quam sibi natura comparavit contra viperarum morsus, ut etiam scribit Dioscorides, auxilio esse remorantibus vrinis, ac coli cruciatibus affectis, si vbi aqua probè fuerit elotum, ipsa statim ablutionis bibatur aqua. Atunt in pulcrem tritum, & iis medicamentis inditum, quæ venerem excitant, ea valentiora efficere. Quin & dysentericis mederi magno successu à nonnullis expertum est. Quod *ἡνέριον* *ἡνέριον* Græci, Genitale cervi Latini dicunt: Itali, Verga del ceruo.

*Nomina.*

VNGVLAE ASINI, ET CAPRAE.  
CAPUT XL.

VNGVLARVM asini cinis per dies multos binis cochlearibus potus, proditur comitiales adiuuare: eadè oleo subacta strumas discutiunt: & illarum perionibus medentur. Caprinarum cinere perunctæ ex aceto alopecie sanantur.



*Vngularum Galienus res.*

NON solum Asini, & Caprarum vngulae in medicum veniunt usum, sed & Vaccarum ex prioribus tantum pedibus extæ, ut auctor est Rasis libello de 1 x. animalibus. Siquidem harum combustarum cinerem potum, nutritibus lactis copiam præbere existimat, Mularum

verò mulieres infæcundas reddere. Quinetiam mures earum sufficit fugari, ipsis carbonibus impositis, & accensis. Earum nomen Græcum *ἄνγες*, Latinum Vngues, & Vngula: Arabicum, Chafit, Stes, & Dalef: Italicum, Vnghie: Hispanum, Vnhas de animal: Gallicum, Ongle.

*Nomina.*

LICHENES EQVORVM  
CAP. XLII.

LICHENES sunt in equorum genibus, & super vngulas indurati calli, qui triti, & in aceto poti, comitialibus mederi traduntur.



20

DE CALLIS, qui equorum cruribus innascuntur, meminit Plinius libro x x viii. equis *capite x l. & x v. iisq;* tritis, & per aurè cum res. oleo infusis, dentium dolorem mulceri scribit, diebusq; quadraginta ex vino aut melle potis calculos expelli. Cæterum Galenus, cui etiam subscribit Paulus, addidit hos quibusdā vsuari ad quælibet animalium morsum. *Alexi res Galienus.* ita Græcis, Latinis verò Lichenes equorum nominantur: Arabibus, Zeide: Italis, Calli de caualli: Hispanis, Impigenes dellos: Gallos, Surots des cheuaux.

*Nomina.*

CORIA VETERAMENTARIA.  
CAP. XLII.

VETERIS corij cremati illitus cinis ambausta igni, inter rigines, necnon calceamentorum attritus sanat.

CORIA vetera, quæ videlicet veteramentorum sunt, vsa (ut Galenus memorie prodidit libro x l. de simplicium medicamentorum facultatibus) ad attriciones commodari leno. calceamentorum scriptum à quibusdā est, tanquā scilicet hoc faciant ex anipathæa quadam. Certè quæ phlegmone obdidentur, haudquaquam iuuantur: verù vbi sedata fuerit phlegmone, non iniuria iuuantur, nempe quia rescantur. hæc Galenus. Cæterum veteramenta prunis accensa fumo nariibus accepto, efficacissimum constat esse remedium ad vuluæ strangulatus,

*Veteramentorum Galienus res ex Galieno.*

50

gularis, ut mihi quoque experientia comprobatur est: quandoquidem hoc tantum remedium ego deploratis in eo affectu mulieres incolumes pluries reddidi. His similiter accensis serpentes effaciter sugari conperiturum est, neque eos modo, qui in domibus nostris oberrant, sed eos etiam, qui in hominum corpora ingrediuntur, dum homines per extremam ad somnum oppressi, ore aperto in campetribus obdormiunt. Quod scriptis tradidit Marcus Gattinaria nostræ æraris medicus non contemnendus, acuisse quo tempore cuidam homini, cui cum frustilla adhibita essent innumera medicamenta, ipsaque alioquin efficacissima, illud tamen magnificè præstiterit veteramentorum fumus traiditio in corpus haussus. Siquidem cum primum immanis fera (erant enim viperæ non parvæ) sumi nidorum præsentit, visa est à circumstantibus egredi per anum non sine magna omnium admiratione. καὶ οὕτως sic Græci, quæ Latini Coria veteramentaria vocant Arabes, Galdalanche: Itali, Scarpe vecchie: Hispani, Zepatos vieiros Galli, vieux cures.

tium morbus tam gallinis, quam gallinaceis vultu  
tur medicis, non tantum ipfis difficit, & appo-  
sitis (vt docet Dioscorides) fed viuentibus ad-  
huc piumas detrahunt ab ano, eumque demo-  
stratis partibus apponunt: atrahunt enim hae ani-  
malia cucurbitularum modo in se venenum,  
quo mox interficiuntur. Quamobrem alios gal-  
linaceos viuos continuo apponere necesse est,  
donec infectum virus penitus absumatur. Vt  
tur praeterea gallinarum adolefcentium iure,  
ad æquandos corporis humores, post febrium  
discidium, cum faccharo, terapij modo. Ad  
hec gallorum cum gallinis nondum coeuntium  
testes, deperditas in morbis vires mirifice resti-  
tuunt: quam ob causam hectis, & marasmo la-  
borantibus, morborumque diuturnitate ma-  
crefactis vtiliter exhibentur. Insuper gallina-  
ceorum testes semen prolificum suppeditant, &  
veneras roborant vires. Plinius cum de gal-  
linis differret libro x x i . capite i i i .



hæc inter cætera memorizæ prodidit. Non præteribo (inquit) miraculum, quamquam ad medicinam non pertinens: si auro liquefactis gallinarum membra misceantur, consumunt illud in se. Ita hoc venenum auri est. At gallinæis ipsi circulo è fæmentis addito collo non canunt. In quibus illud quoque sibi à natura datum, non est non summo opere admirandum, quod noctis horas distinguere suo cantu: quæ in re nunquam adeo somno capiuntur, quin fratris horis cædent, etsi per anni circulum noctes modò breves, modò maxime fiant. Gallinæ sic Latinis, *ἀστερίαι* Græcis vocantur: Arabibus, Dagedi, siue Giæz; uduch: Italis, Galline: Germanis, Han, & Hennen: Hispanis, Gallinas: Gallis, Gelines, & Coq.

† Codices Graeci typis expressi hoc in loco habent. *ὁ δὲ θυμὸς τὸν σπένδαρον μάλιστα διδραναί κατακτείνει καὶ τὸν σπένδαρον καὶ τὸν θυμὸν τὸν σπένδαρον καὶ τὸν θυμὸν τὸν σπένδαρον*. hoc est ad sensum. Ius galli iunioris maximè datur ad contemperandum humores vitiosos, & in ardoribus stomachi simpliciter paratū. Verba illa Ruellius, cuius interpretatione alioquin sequimur, vel neglexit, vel illegitimè iudicavit. Nos verò huc ac asserendū duximus, nō solum q̄ in vulgatis codicibus, ac antiquissimo (teste Maccello) legatur, sed quia etiam à Serapione reseruantur. Quibus etiam

*Narrative*

p 4 subscri

DISSECTAE gallinæ, & adhuc calentes appositæ, serpentium moribus auxiliantur: sed identidem alias sufficere oportet. Earum cerebellum in vino bibendum datur contra serpentium morfus: sanguinem à cerebri membrana profluentem sistit. Quæ interiore ventriculi galli sinu residet membrana, secti in laminas cornus specie similis (ea verò inter coquendum abici solet) siccatur, tritaque in vino conuenientissimè stomachicis datur in potu. † Ius è vetere gallinaceo alium deiecit. Abiectis itaque interaneis salem cuncti oportet, & consuto ventre decoqui in viginti sextariis aquæ, donec ad tres heminas redigantur: totum id refrigeratum sub duo, datur. Aliqui incoquant olus marinum, mercurialem, cinicum, aut filiculam. Crudos humores, crassosque, acram bilem, & strigmenta elicit: prædest longis febribus, fuspiriis, articularis morbis, & inflationibus stomachi.

**TAMETSI** Gallinarum ius simplex (vt Galeno proditum est libr. x. i. simplicium medicamentorum) retinendi vim habet, gallorum tamen veterum cum sale diutius decoctorum, subducendi facultatem obtinet. Adversus serpen-

Gallorum  
E<sup>3</sup> galli  
parum vi  
res ex Gal.  
E<sup>3</sup> a<sup>1</sup> n<sup>2</sup> s.



subscribere videtur verborum series, & conum-  
nis rei usus.

## OVVM. CAP. XLIIII.

OVVM molliculum plus alit forbi-  
li, & durum plus molli. Luteum oui cō-  
rra oculorum dolores vtile est: inassa-  
tum sedis inflammationibus prodest, 10  
cum croco, & rosaceo: & condylomatis  
cum meliloto: cum vna autem fruticis  
eius, quem rhoa dicunt, aut galla in pa-  
tinis frigitur, vt cibo alius fittat: per se  
etiam offerri solet. Candidum oui cru-  
dum refrigerat: spiramenta cutis occlu-  
dit: inflammationes oculorum infu-  
sum lenit: ambusta, si statim eo perun-  
gantur, pustulas non sentiunt: faciem à  
solis adustione tuetur: fronti impositū  
cum thure fluxiones arceat, auertitque:  
inflammationes oculorum lava exce-  
ptum, addito rosaceo, melle, & vino  
mitigat: vtiliter contra hæmorrhoidis  
serpentis morsus crudum forbetur:  
summè tepidum prodest vesicæ rosioni 30  
bus, renum exulcerationibus, gutturis  
scabritiæ, reiectionibus sanguinis, destil-  
lationibus, & thoracis rheumatismis.



Ovorum  
sideratio.

DE GALLINARVM tantum ouis hic lo-  
cutum fuisse Dioscoridem, credendum est: quip-  
pe quæ sint cæteris præstantiora, eorūque sit-  
tum in cibis, cum in medicinis præcipuus usus.  
Nam quemadmodum testatur Galenus libro  
III. de facultatibus alimentorum, & Hæch  
Arabicus in suis dietis, gallinarum oua gratio-  
ris sunt saporis, ori iucundiora, plūsq̃ affe-  
runt alimentū, quàm cætera. Alunt hæc, & bre-  
ui reficiunt tempore, recreant, semen prolificū  
augent, & vires ad coitum suppeditant. Quæ  
omnia eo præstant efficacius, quò recentiora  
sunt, & à gallinis edita, quæ prius admissarios  
gallos susceperint: quandoquidem (vt Galenus  
inquit) recentia veteribus plurimum præstant:

quippe optima sunt recentissima, pessima, au-  
tem vetustissima. Secundum locum sibi vendi-  
cant à perdicibus, & phasianis edita, quanquam  
gallinacea viribus non excellant. Deteriora ve-  
rò sunt anatium, anserum, gruum, & reliqua-  
rum aquatiliū: aggrauant enim ventricu-  
lum, succum crassum gignunt, & ægrè conco-  
quantur, tametsi plurimum præbent alimen-  
ti, vbi à validis, robustisque ventriculis opti-  
mè conficiantur. Columbarum oua admo-  
dum calida sunt, potius in medicamentorum,  
quàm ciborum usum expetenda. Pauonum  
autem, ac struthiocamelorum pessima sunt,  
saporis horrendi, concoctum contumacia, &  
humanæ temperaturæ inimica. In ouis lu-  
teum candido longè præstat: nempe quòd il-  
lud temperatum constat, ori non ingratum,  
boni succi, & concoctū minime contumax:  
hoc verò frigidum est, pituitum gignit, ægrè-  
que concoquitur. Oua variis, & diuersis mo-  
dis decoquuntur. quo fit, vt etiam diuersum  
asserant nutrimentum, & ob id diuersos in cor-  
pore pariant succos. Probantur, quæ cum pu-  
tamine decoquuntur, & horum præ cæteris,  
quæ tremula vocant, quòd lactis semicoagu-  
lati instar tremant. Solibilia, quæ vt velocius  
hauriantur, breviorē cocturam experiuntur,  
minus sanè nutriunt. Quæ autem cum  
putamine longiore elixatione indurescunt,  
difficillimè concoquuntur, crassos generant suc-  
cos, obstruunt, in ventriculo marcescunt: are-  
nulas, & calculos gignunt: & coli, & ventri-  
culi excitant cruciatūs. Porro ex iis, quæ ex-  
tra putamina coquuntur, ea cæteris præstant,  
quæ integra in feruentem immerguntur aquam.  
hæc à nostris, quòd quasi dispergantur, vulgo  
Sperduce vocantur. Veruntamen curan-  
dum, ne hæc quoque indurentur: siquidem  
vbi duritiem contraxerint, non secus atque 40  
vbi duritiem cocta, redduntur noxia. Quæ  
deinde ex oleo, aut butyro integra frigan-  
tur, ventriculum lædunt, ructus commouent,  
ægrè conficiuntur, consocium corrumpunt ci-  
bum, malum præbent alimentum, & putridas  
pariunt exhalationes. Quæ demum super pru-  
nis torrentur, aut ignitis figulis regulis inas-  
santur, alium cohibent, difficilèque concoquun-  
tur. Et hæc sufficiant ad oporum in alimentis  
facultates. Cæterum quibus, quantisque oua in  
medicamentis polleant viribus, reulit Ga-  
lenus libr. x. i. de simpl. medicam. facultatibus,  
sic inquit. Ovorum album & tenue illud,  
quo item ad ophthalmias vtimur, ex numero  
est medicamentorū minime modicū. Itaq;  
vtendum est oui albumine non tantum ad ocu-  
los, verum etiam ad alia omnia, quæcunque me-  
dicamenta requirunt maximè expertia morda-  
citate, vt sunt omnia sedis, ac pudendorum vl-  
cera maligna. Missetur quoque vtiliter medica-  
mentis profluuium sanguinalis ex cerebri mem-  
bris suppressimentibus, quæ nimirum citra mor-  
sum illinuntur, atque adstringunt. Sed & ad vi-  
cera

cera rebella miscetur iis, quæ absque morfu  
ea possunt desiccare: cuiusmodi est medicamen  
pompholyx elota, & metallicorum quedam  
elota, de quibus priuatim supra differimus.

Porrò & ipse vitellus adsimilis est naturæ, ac  
proinde miscetur ceratis morfus expertibus,  
ouis videlicet aut lixis, aut assis. Verum id ta-  
men manifestum est inter hæc leuiculus existit  
re differentiam, quod paulò plus desecent quæ  
sunt assa: ac quantum huius accipiunt facultatis,  
tantum deperdant de mitigandi potentia.  
Miscetur, & cataplasmas phlegmonem arcenti-  
bus, vt iis quæ ex mellito constant, sed applica-  
tâdis. Crudo verò ouo toto vitrum admissio  
rosaceo ad palpebrarum, aurium, mammarumq;  
phlegmonas, quæ scilicet aut ictis illis, aut alio  
quouis modo euenierint aut extiterint in neruo  
sis corporibus, puta cubito, & digitorum tendo-  
nibus, aut articulis, idq; in pedibus pariter, &  
manibus. Porrò in aceto coctum ouum si edat-  
ur, fluxiones ventris desiccant. At si etiam qui-  
piam eorum, quæ ad dysenteriam, aut colicam  
affectum conueniunt, illi miscueris, atq; in igne  
modico, fumigis experte (qualis est qui ex prunis  
constat) in sartagine frixeris, edendumque ita  
præbeas, non minime sanè laborantes adiu-  
ueris. Aptissima talem ad missionem sunt om-  
phacium, rhus, tum ipse qui cibis adspersitur  
erythros nuncupatus, tum succus ipsius, galla,  
sidia, hoc est mali granati putamina, cinis co-  
chlearum integrarum vilarum. Apia quoque  
& vuarum acini, & myrta, & mespila, & corna.  
Magisistis medicamentosa sunt balsamum, hy-  
pocistis, cyncin, siue mali punicis flores. Sed &  
ad ambustiones protinus crudum impostum  
est vile, siue quis seorsum albumen duntaxat  
ipsum molli lana excipiat, siue etiam cum vi-  
tello totum commissis applicet. Etenim me-  
diocriter refrigerat, & citra morsum desiccant.  
Nam medicamentis, quæ humiditates desic-  
cant, aut lixum, aut assum, aut in sartagine  
frictum miscetur: iis vero, quæ crassa in pecto-  
re, pulmoneq; incidunt, forsile quod vocant:  
id quod in aqua eo vsque lixari debet, dum in-  
caluerit. Eiusdem ipsius naturæ nomine & ad  
eos, quibus fauces aut ex vociferatione, aut ex  
humorum acrimonia exasperate sunt, assumit-  
ur: tum scilicet quod affectis partibus illini-  
tur, atque cataplasmatas modo inhæret: tum  
quod substantiæ suæ lenitate eas mitigat, san-  
tatq; Eadem ratione stomachi, ventris, inte-  
stinorum, ac vesicæ medetur asperitatibus. hæc  
Galenus. Cæterum oleum, quod è vitellis diu  
in sartagine frixis oleitur, illius asperitatibus  
cutaneis mirifice prodest: serpiginis, & vitil-  
iginis emendat: rimas laborum, manuum, se-  
disq; sanat. Quinetiam vicerum dolores, &  
articulorum cruciatus mulcet. Prodest & au-  
rium doloribus, atque vlcibus: item ambu-  
stis vituiter illinitur: cerebri contusus mēbra-  
nas putrilagine affectas mirum in modum à  
paribus sanis segregat, vt nos compluries ma-


gno cum honore periculum fecimus. Ex ouis *Animæ*  
præterea omnibus volucibus generatio eue- *liæ ex ouis*  
nit, quanquam & aquatilibus ferè omnibus, *erit.*  
præterquam phocæ, delphino, & aliis nonnul-  
lis. Gignuntur item ex iis & è terrestribus quæ  
dam, vt crocodili, lacertæ, testudines, stellio-  
nes, & alia: & è reptilibus omnia, vipera ex-  
cepta. Verum, vt Hippocrates auctor est libro  
de natura pueri, seu ætatis (nisi fortassis libra-  
riorum culpa eo in loco codex sit deprauatus)  
pullus ex vitello nascitur, informaturq; ex  
albumine vero alimentum, & augmentum ca-  
pessit. Cui sanè sententiæ illud prorsus refra-  
gatur, quod de pullorum creatione longo sa-  
tis sermone posteritatis memoriæ prodidit Ari-  
stoteles lib. v. t. cap. 111. de historia animalium.  
Illud insuper eam refellit sententiam, quod  
experientia sepe à mulierculis comper-  
tum est, quæ suis gallinis oua incubanda subii-  
ciunt. Siquidem exempto quandoque fœtu,  
dic vno, atque duobus ante tempus exclusio-  
nis, fractis pulli visceribus magnam vitelli  
partem inuenerunt in corpus assumptam. Te-  
studium oua, quanquam diutius elixantur,  
nunquam ramen eorum albū concreuit, quan-  
uis luceum admodum durecat. Præterea ex-  
perimento comperit habeo, testudines ita-  
tum oua non edere cōm testa obducuntur,  
quemadmodū volucres, sed postquam omnia,  
quæ in corpore fuerint, testaceum contraxe-  
runt putamen: nanque mihi quandoque contig-  
it dissecuisse testudinem, quæ vte o septena  
gerebat oua, suo putamine obducta, quod &  
serpentibus euenire quidam existimât. Ouum  
quod Latini, *œip*, Græci vocant: Arabes, Naid,  
Beid, seu Baid: Itali, Vouo: Germani, Ein, &  
Ey: Hispani, Hueuo, & ouo: Galli, Oeuf.

*Oua testa-  
dinum.*

*Nomina.*

#### CICADAE. CAP. XLV.

CICADAE, quæ in assæ mandun-  
tur, vesicæ doloribus profunt.



CICADAE passim in Italia cognoscuntur, Cicadae  
atque adeo inibi vulgaris notitiae sunt, vt sepe considera-  
zistat assiduæ canu mēsores, agricolas, ac riuo  
viatores in campestribus obstant. Cæterum,  
quemadmodum tradidit Aristoteles libro v.  
cap. x x x. de historia animalium, & Plinius

*Ouorum  
partes, et  
cūctura Sa-  
ria.*

*Ouorum  
vires ex  
Gah.*

*Oleum ex  
ouarū in-  
ten.*

libro x. i. cap. x. x. i. qui certè ea omnia Aristoteli accepta referre potest, Cicadarum duo sunt genera: alia enim minores, quæ primæ prodeunt, & nouissimæ percunt. Alia maiores, quæ canunt, eisdemque nouissimæ prodeunt, & primæ intereunt. Sunt quæ canunt præcinctu diuiduæ, siue minores, siue maiores sunt: quæ autem non canunt, indiuiduæ sunt. Pariunt in aruis celsantibus, excavautes facturæ locum asperitate præacuta, quam parte habent posteriore, quemadmodum & bruci. Cyneteriam in arundinibus, quo adminiculo vires eriguntur, nidum facturæ excavaunt. Proueniunt largè copia imbrum. Crescit primò in terra vermiculus, deinde fit ex eo, quæ tetterometra vocatur parentis nomine, quo tempore gustu suauissimæ sunt, anteaquam cortex rumpatur. Postmodum circa sollicita noctu exeunt, statimq; rupto cortice prodeunt cicadæ ex matrice illa cicada, quam modò tetterometram dixi. Mares canunt in utroque genere, fœminæ verò silent. Vnum hoc animal ex his, quæ viuunt, sine ore est. Pro eo quiddam aculeatum linguis simile habent, & hoc in peccore, quo rorem lambunt. Pectus ipsum fistulosum, unde illis redditur cantus. Oleas maximè amant, vt minus umbras, quamquam & cæteras non aspernantur arbores: proinde vbi arbores desunt, nasci non possunt. Loca præterea frigidiore oderunt: quomobrem in umbris memoribus esse nequeunt, nec in frigidis etiãnum regionibus. Quo factum est, vt crediderit Albertus cognomen magnus, gryllos, qui noctu strident, cicadæ esse: quippe quòd in Germania, quæ fuit oriùs, frigidissima regione ad arcticum spectante, tametsi frequentes habeantur grylli æstate in campestribus, hyeme verò ad hypocaustorum fornaces plerunq; stabulantes: cicadæ tamen desunt. Parthi Cicadis vescuntur, quemadmodum & gentes ad orientem. Idcirco mirum non est, quòd dixerit Aristoteles, eas esse gustu suauissimas, anteaquam tetterometræ rumpatur cortex. Cicadarum vires descripsit Galenus libro x. simplicium medicamentorum, sic inquit. Sed & cicadis siccis quidam vtuntur ad colicis affectus, cum paribus numero piperis granis, datæque aut tres, aut quinque, aut septem, per infusionem videbunt, & ipsos etiã paroxysmos. Porro alij affas edendas offerunt, quibus affecta vesica est. Trissey Græcis, Cicadæ Latini dicuntur: Italis, Cicale: Hispanis, Ciguatregas: Gallis, Sigale.

nullo sunt in vsu. Est & quoddam genus locustæ, quæ asiracos, aut onos dicitur, sine pennis, prælongis cruribus. Exiccata autem si ex vino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abunde vescuntur Aphri, qui Leptin incolunt.



LOCUSTÆ omnibus notæ, varia pro morum, & locorum diuersitate sortiuntur nomina. Verùm herbis, & segetibus infestissimæ, quòd sæpius quibusdam in regionibus paucis admodum diebus vniuersa terræ germina absumant. Harum, quemadmodum tradidit Aristoteles libro v. cap. x. v. i. i. de historia animalium, qui mares sunt, fœminis magnitudine cedunt. Pariunt in terra fixo cauliculo, quo mares vacant: ac vniuersæ, & loco eodem sortum deponunt, ita vt quasi fauus esse videatur. Hinc vermiculi speciem oui gerentes oriuntur, qui terra quadam præterui tanquam membranula ambiuntur: quæ dissecata emergunt locustæ, ac euolant. Tam mollis factura hæc est, vt ad tactum leuissimum dilabatur, & pereat. Pariunt exitu veris, & statim à partu moriuntur, vermiculis circa collum innascentibus tempore partus, qui eas strangulent. Mares quoque eodem tempore obeunt. Locis montanis, aut tenuibus locustæ non sunt, sed planis, rimosisque: pariunt enim in rimis sua oua. Transiunt Locustæ immensa maria, immensisque tractus permeant (vt Plinius inquit) diraque mæssibus contegunt nubes, multa contactu adurentes, omnia verò morsu erodentes. Italiam ex Aphrica maximè coorte insistant tanta suæ multitudinis, vt inde obuenirent sollicitè suspensantibus populis, ne silentes suas operiant terras. quòd non modò vniuersas cùm segetes, tum herbas deuorent ad radicem vsque, sed & radices ipsas regerminare prohibeant. Huius rei testimonio fuisse inaudita Locustarum agmina, quæ nostro tempore voluere anno domini m. d. x. i. i. ex paludibus Marotidibus profectæ, non solum vniuersam

#### LOCUSTÆ. CAP. XLVI.

LOCUSTÆ odoris suffitu vrinæ difficultates adiunant, præsertim quæ fœminas malè habent. earum carnes

Sam Pannoniam, maximamque Germaniæ partem, sed totam etiam Italianam occuparunt, non sine magna omnium Æ terra nascens perniciosissimum omnem segetem, omnemque viuentem herbarum radicibus deuorant. Hæ Parthis in cibo gratæ. Quamobrem admirandum non est, si sacris literis mandatum sit, vt Leuitici x. capite legitur, à Mose probatas esse in cibis. Nec mirum etiam, diu Ioannem Baptistam iis ex syluestri melle victitasse in deserto: tametsi non desint interpretes, qui velint pro Locustis quasdam herbarum radices intelligi: alij verò nonnullas arborum summitates. At meretricule in horum sententiam deuenire nunquam potui: quin potius certo crediderim, ipsum nempe legis Mosæicæ sectatorem acerrimū, hisce Locustis animalibus victitasse, quem admodum etiam sentie diuus Augustinus, exponens diui Pauli epistolæ ad Romanos. In Cyrenaica regione (vt Plinius est auctor) lex est ter anno debellandi Locustas, primò oua obsterendo, deinde fœtum, postremò adultas, desertoris poena in eum, qui cessauerit. Et in Lemno insula certa mensura prænitia est, quam singuli enecatarum ad magistratus referant. Necare & in Syria militari imperio coguntur: tot orbis partibus vagatur id malum. In India ceruicem pedum longiitudinis esse traduntur, adeò vt feminarum crura ferarum vsum præbeant, cum inatuerint. Earum nomen Græcum *ἀνθήκη*: Latinum, Locustæ: Italicum item Locustæ: Hispanicum, Lagostas de tierra, & Gafanhotos grandes: Gallicum, Locustes, & Sauterelles.

## OSSIFRAGVS.

## CAPVT XLVII.

VENTER eius auis, quam Latini ossifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere prodirat.

VARIA admodum est inter scriprores Ossifragi historia. Siquid Aristoteli volucris est aquila maior, colore cinereo, albicæte. Probè hæc fortificat, & viuif. Piz, & benigna est: non enim suos tantum nutrit pullos, sed & aquilæ. Cum autem illa suos è nido eiecerit, antea quam adoleuant, quod inter

educat. Parum Ossifragus oculis valet: nubescula enim oculos habet lætos. At Plinio lib. x. capite 111. Ossifragus in aquilarum genere annumeratur, isque ab eodem prodicitur ex haliaëto, hoc est, aquila marina natus. Marinam hanc suum genus non habere, sed ex diuerso aquilarum coitu nasci, idem auctor est. Alberto præterea Ossifragus ea videtur auis, quam idem libro x. x. 111. Arabica voce appellat Kirij, cum sic inquit. Kirij auis est præda victitans bonæ pullificationis, & diligenter pullos nutrit non solum suos, sed & ab aquila abiectos tradit nutriendi. hæc ille. Qui vel clarius meminit Ossifragi inter aquilarum genera, ubi ita scribit. Quintum autem aquilæ genus est paruulum valde, & à quibusdam vocatur frangens os, eò quod quando carnes comedit, ossa in altum desert, & super lapidem cadere permittit, vt ex iis contractis medullam fugat. hæc genus Albertus. Verum is ab Aristotele dissentire manifestè cognoscitur, quod Aristoteli Ossifragus non sit genus aquilæ minimum, sed auis maior aquilis, dempta Germana. Quo fit, vt in hac historia Albertum hallucinatum esse credam, quemadmodum & Plinium in eadem deceptum puto. Nanque marina illa clarissima aquila vocata (vt Aristoteles tradit) oculorum acie maxime pollet, ac pullos adhuc implumes cogit aduersum intueri solem: tum cuius oculi prius lacrymarint, hunc occidit, reliquum educat. Id quod abunde ostendit hac in re Plinium errasse, atque oscitante fortasse Aristotelem legisse. quippe cum marinæ aquilæ pulli acerrimi omnino sint visus, nullam ij cum Ossifrago cognationem habere videntur, quod hic potius quadantenus cæcitare laboret. Cæterum, quod nobis esset Alberti codex librariorum culpa deprauatus, in quo ossifraga pro ossina legebatur, iandudum credidimus ossifragum apud Albertum eam auem esse, quod hic in maritimis nostris Senensibus circa Herculis portum, & Orbelli stagnum frequens visitur, cygno maior, rostro longo, inferiori parte sacculi instar ampli. Hæc autem incolis vulgò vocatur Agrotto. Sed cum postea animaduertissem Albertum in hac historia aperte Aristoteli refragari, atque aliud Alberti exemplar nactus essem, in quo ossina, non ossifraga, vt vitiose in alio, scriptum erat, cepi eos acriter accusare librarios, quorum negligentia in causa fuit, vt in hoc mihi ipsi hæctenus imponerem, secutus deprauatam Alberti lectionem. Auis, quæ Græcis *γύς*, Latinis Ossifragus nominatur.

## GALERITA. CAP. XLVIII.

GALERITA auicula est parua, apicem in vertice, pauonis modo, gestans. Hæc assa, & in cibo sumpta, cæliacos adiuuat.

Locustæ  
in cibis.

Nomina.

Alberti.  
& Plinij  
lappus.

Ossifragi  
consideratio.



se cibi audacitate diuincit, hæc recipit eos, &



Alaudarum hysto-  
ria

ALAUDARVM (vt memoriae prodidit Aristoteles libro x. capite x x v. de historia animalium) duo sunt genera. Alterum terrenum, cristatum, Galerita à crista appellatum. Alterum gregale, nec singulare, more alterius, verum colore simile: quanquam magnitudine minus, & galero carens. Campestris ambæ sunt aues, vermiculis vitantes, decidentibusq; feminibus. Mares suauiter canunt, primæq; sunt aues, quæ æstatem cantu pronuntiet. Porro Alaudæ adeo ad aucupes aues expauescunt, vt sæpe, dum sentiunt se persequi, in hominum gremia confugiant, ne rapiantur. Mares in caueis diutius reuerti, altero sæpius obæcantur oculo. Quæ auis Græcè *νεσφιδίς*, Latine Galerita, & Alauda vocatur: Arabicè, Hanabroch, seu Kana-broch: Italicè, Lodola: Germanicè, Vualde-lerch: Hispanicè, Cucuyada: Gallicè, Alouette

Nomina.

HIRVND.



HIRVND. CAP. XLIX.

DISSECTIS crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendes: è quibus duos, vnum colore varium, alterum purum eximes: ij priusquam terram attigerint, in iuuentæ corio, aut cervina pelle brachio, aut collo adalligati, comitialibus proderunt, & sæpe profus eos recreabunt. Hirundines, vt ficedulæ, in cibo, aciei visus medicamentum præbent. Tam pullo- rum, quam matrum in fictili olla cre-

matarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert: angina eo commodè perunguntur: vix & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ, & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant, qui angina morbo confistantur.

HIRVNDINVM tria habentur genera: vnum nostra testia subit: alterum vecutorum ædificiorum muros, cauernulas, & montium scopulos expetit: tertium verò nidificat in altis fluminum ripis. Hæ quotannis (vt Plinius auctor est) ex Aphrica maria transuentes, appetente vere ad nos aduolant, & martio plerumque mense nostras ingrediuntur: ædes ibique è luto, & quibusdam stramentis sibi construnt nidos, in quibus bis oua pariunt, & bis pullos excludunt, tantum humanæ fidunt benignitati: atque vbi vicinos educauerint partus, æquinoctij autumnalis tempore in suas remigrant regiones. Chelidoniam herbam ab his inuentam tradunt, vnde illi nomen esse inditum. Hanc suis obæcant pullis deferunt in nidum, hoc tantum medicamento iis visum redentes. Quinetiam experientia compertum est, quod si data opera pullorum hirundinum oculi acu perforentur, sanantur paucis diebus, allata à matre chelidonia herba. Hinc igitur edocti medici ad oculorum claritatem chelidonium adhibent. Hirundinum verò sterces oppositum præstat: excæcat enim, si calidum in oculos decidat. Quod etiam sacra restantur monumenta, in quibus, Tobias hoc stercore excæcatum fuisse, legitur. Cæterum vires Hirundinum recensuit Galenus libro x i. de simplicium medicamentorum facultatibus, sic in- quiens. Hirundinum quoque vfi sunt multi, comburentes videlicet, & cineri mel admiscen- tes, ac deinde synanchicos inungentes, & in totum omnes quicunque in faucibus atque columella cum tumoribus constitunt affectus. Vnum tur & ad acendum visum hoc cinere nonnulli. Alij verò eas arefactas drachmæ pondere bibendas exhibent. Auis *νεσφιδίς* Græcis, Hirundo Latinis appellatur: Arabibus, Tharaf, Chataf, aut Chataf: Italis, Rondine: Germanis, Schuaalb: Hispanis, Golandrina, & Andorinha: Gallis, Arondelles.

HIRVNDINVM tria habentur genera: vnum nostra testia subit: alterum vecutorum ædificiorum muros, cauernulas, & montium scopulos expetit: tertium verò nidificat in altis fluminum ripis. Hæ quotannis (vt Plinius auctor est) ex Aphrica maria transuentes, appetente vere ad nos aduolant, & martio plerumque mense nostras ingrediuntur: ædes ibique è luto, & quibusdam stramentis sibi construnt nidos, in quibus bis oua pariunt, & bis pullos excludunt, tantum humanæ fidunt benignitati: atque vbi vicinos educauerint partus, æquinoctij autumnalis tempore in suas remigrant regiones. Chelidoniam herbam ab his inuentam tradunt, vnde illi nomen esse inditum. Hanc suis obæcant pullis deferunt in nidum, hoc tantum medicamento iis visum redentes. Quinetiam experientia compertum est, quod si data opera pullorum hirundinum oculi acu perforentur, sanantur paucis diebus, allata à matre chelidonia herba. Hinc igitur edocti medici ad oculorum claritatem chelidonium adhibent. Hirundinum verò sterces oppositum præstat: excæcat enim, si calidum in oculos decidat. Quod etiam sacra restantur monumenta, in quibus, Tobias hoc stercore excæcatum fuisse, legitur. Cæterum vires Hirundinum recensuit Galenus libro x i. de simplicium medicamentorum facultatibus, sic in- quiens. Hirundinum quoque vfi sunt multi, comburentes videlicet, & cineri mel admiscen- tes, ac deinde synanchicos inungentes, & in totum omnes quicunque in faucibus atque columella cum tumoribus constitunt affectus. Vnum tur & ad acendum visum hoc cinere nonnulli. Alij verò eas arefactas drachmæ pondere bibendas exhibent. Auis *νεσφιδίς* Græcis, Hirundo Latinis appellatur: Arabibus, Tharaf, Chataf, aut Chataf: Italis, Rondine: Germanis, Schuaalb: Hispanis, Golandrina, & Andorinha: Gallis, Arondelles.

Hirundinum hysto-  
ria

Chelido-  
nia.

Hirundinum vires  
ex Gal.

Nomina.

EBUR.

CAP. I.

EBORIS scobeillito, paronychiam sanantur. Vim adstringedi ebur obtinet.

OMNIBVS sine perspicuum est, nil aliud Ebur esse, quam Elephantinorum dentium materies, multis apta operibus. Elephantorum meminit Plinius longa admodum historia initio libri octauo pluribus capitibus: tamen non omnia

Elephantorum hysto-  
ria.

omnia, quæ scribit, probanda putauerim. Elephantos fert Africa vitra Syrticas solitudines, item Mauritania, & Aethiopia: sed maximos India mittit. Ij quamquam magnitudine cætera excedant quadrupeda, Aristotelis tamen testimonio adeo cicurantur, vt omnium ferarum mitissimi, & placidissimi euadant: quippe qui per multa officia & erudantur, & intelligant. Corio Elephanti integuntur bubalino simili, vt is verum præbuit exemplum, quem Roma vidit Leonis decimi Pont. Max.



æuo, etsi rarissimis horreat pilis. Caput eis magnum; collum breue, aures verò vadique duum palmorum amplitudine: nasum, quem peculiariter in Elephantis promuscidem appellant, longissimum habent, concauum, grandis tubæ instar: hic infra anteriores dentes ad terram ferme promittitur, quo pro manibus vtuntur. Os gerit prætori proximum, vt quod cum sulco inear similitudinem: è cuius superna parte dentes duo prominent præcipuæ magnitudinis (quales plurimi venales conspiciuntur Venetis in publico foro vulgò Marceria dicto, ac in aliis Italix emporiis) qui proni cuspidè deorsum vergunt. Pedibus nituntur rotundis, disci instar, latitudine duum, triumve palmorum, quos callosa materia obducit: vngulis quinque circum, rotundis, mediocrium concharum magnitudine. Crura eis magna, ac fortia, neque (vt quidam imperiti existimant) vno tantum osse constant indiusa, sed genua flectunt, vt pote & cætera quadrupeda. Quamobrem Elephanti (vt refert Aloisius Cadamustus, qui classe in Aethiopiam, & ad Calicut nauigauit) vt eos, qui deferri volunt, suscipiant genua submittunt, seseque erigunt deinde. Elephantis cauda bubali, trium palmorum circiter longitudine, rarissimis fetis referta. Quocirca haud facile se tueri possent à mustura iniuria, nisi aham illis indutritiam natura tribuisset, qua ab his se vindicent: quandoquidem ferientibus muscis, cutim, quam cancellatam obtinent, contrahunt. Quo fit, vt arctatis in rugas repente cancellis, muscas comprehensiones eeneant. Hominibus non nisi lacessiti nocent. Veruntamen irritati homines promuscide comprehensos, adeò in sublime iaciunt, vt priusquam in terram decendant, suffocentur, & pereant. Ad hæc nullus hominum tantæ pernicietatis inuenitur, quem mox Elephas non co-

prehendat: etiam non currens, sed gradatim incedens. Id efficit vasta animalis moles: quandoquidem sui gressus longitudine, humanam omnem pernicietatem euincat. Visitant a borum tam frondibus, quàm fructibus: neque vlla tam ingens est arbor quam ij promuscide nõ proflerant, frangant, ac dilacerent. Adolescunt ad sexdecim palmorum altitudinem: quapropter qui eos conscendere non assueuerunt, non secus fastidio afficiuntur, ac illi, qui nauibus nõ affuerit maria sulcant. Effrenes præterea adeò natura Elephanti sunt, vt nullis habentis cohiberi possint. quo fit, vt liberi incedere dimittantur: verum cum maximè gubernantibus suarum regionum hominibus parent, & eorum sermonem intelligant, idcirco verbis facillè reguntur. Adeò conspectum ignem expanseunt, vt eo ter riti à fuga reuocari non queant. Qua re ab his non cognita, qui eius Elephanti curam gerebant Romæ, in cuius dorso oppidulum construxerant, eo die, quo Iulianus Medices Pontificis Max. frater uxorem è Gallia duxit, in magno fane discrimine versati sunt: nam vbi bellica cetera ignem eructantia conspexisset, magnamque, ac terrificum sonum sensisset, tantæ se fugæ dedit, vt nunquam cohiberi voluerit, donec vnà cum conclusis in oppidulo hominibus in Tyberim sese commiserit. Elephanti nõ coeunt neque signant, nisi annum vigesimum agant, vt auctor est Aristoteles lib. v. i. cap. x. v. i. de historia animalium. Qua in re Plinij error manifestus deprehenditur: quippe qui marem quin quennem, forminam decennem generare memoriz prodiderit. Elephanti nulla nouere adulteria: nam vnus tantum semine coitu vtuntur, eamque cum vterum gerentem viderint, non amplius tangunt. Quantum verò temporis vna quæque femina vtero gerat, haudquaquam sciri potest: quòd Elephanti pudore nunquam nisi in addito coeant. Idcirco alij eis annum & sex menses statuerunt, alij biennium, alij denique triennium. Pariunt femine cum dolore, quemadmodum & mulieres. Pullum editum ore lambunt, qui statim cum natus est, cernit, & ambulat. Viuere Elephantos (vt inquit Aristoteles) tradunt quidam annos ducentos: sed florere ætate circa sexagesimum, vel septuagesimum narrant. Idem hyemis, ac frigoris impatiens sunt. Gaudent annibus maximè, circaque fluuios vagantur, quos intrant libenter bubalorum more. Cæterum Elephanti ingento, & intellectu hominibus proximi sunt: siquidem patros sermones intelligunt, summani præstant obedientiam, prudentiam seruant, & religionem præ se ferunt: solem namque, ac lunam venerantur. Cuius rei auctores sunt Mauriani, in quorum regionibus Elephanti innumeri conspiciuntur: qui gregatim noua nitescente luna ad amnes descendunt, ibique lauantur: mox purificati genibus flexis saluant fidus, & in sylvas reuertuntur. Sunt, qui tradant tanta intellectus sagacitate Ele-

phantos pollere, vt maria transfiri ad alienas regiones, non antea naues confendere voluerint, quam ij, qui eos ducebant, iureiurando de reditu promiserint. In sylvas ituri gregatim ferè semper ingrediuntur, quorum agmina ducit natu maximus: cogit verò ætate illi proximis. Produunt Elephantos à venatoribus circumuentos, cum sciant prædā solum in dentibus suis ab illis expecti, dentibus vehementer impingentes arboribus eos sibi euellere, prædaque se redimere. Quod faciliè crediderim vanum, ac fabulosum esse: quemadmodum esse falsum superius ostendimus, quòd fiber viso venatore, sibi ipsi testes amputet. Elephanti omnes natura indomiti, syluestresque sunt: mitemtunt autem arte, vt pleraque alia fera animalia. Item si parui, & ætate tenelli educantur: quamquam Plinius scribit, natu grandes domari fame, & verberibus, præsertim si aliis domitis, qui tumultuantem coercerant, admo-  
ueantur. Porro non desunt in Elephantorum genere, qui naturæ feritate nunquam domari possint, quales in Senega (vt in suis nauigationibus scriptum reliquit Aloisius Cadamustus) Aethiopiæ regno reperiantur. Elephantorum dentes admirabilis magnitudinis venales spectari possunt in compluribus Italiæ urbibus, veluti Romæ, Venetiis, Mediolani, & Neapoli: è quibus non solum innumeri pectines parantur ad explicandos capillos, sed etiam alia plura instrumenta, quæ ad humanum vsum accommodantur. Hinc itaque fit, vt nesciam ego, qua ratione ductus Fuchsius, vir alioqui rerum peritus, scripserit in libro de compositione medicamentorum, quem nuper auctum edidit, Ebur nullibi penè verum reperiri: atque illud, quod vulgò eius vice in officinis prostat, marinorum piscium dentes esse. quòd in hoc erret euidentius, quàm vt à nobis ostendatur. Præstat Ebur ad albas mulierum fluxiones, si tamen in tenuissimum puluerem, lapide porphyreo redigatur, propineturque ex lactuæ feminis cremore, aqua, in qua chalybs extinctus fuerit, prius macerato semine. Quod Græcis *ὀπάς*, Latinis Ebur nominatur: Italis, Auorio: Germanis, Helfsantheyn: Hispanis Diente de elephante, Aut Marfil: Gallis, Yuoire.

pellatur, de quo non operæpretium est, vt plura dicamus. Nomina subiiciam. Græcum est *ἑλέφας*, *ἰός*, Latinum Talus Suillus: Italicum, Talone del porco: Hispanicum, Tornizuelo de pie de puerco: Gallicum, Talon de porceau.

SVILLVS TALVS.



CERVINVM CORNY.

CAPVT III.

CERVINI cornu cinis elotus, binis ligulis epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, cœliacis, regio morbo, & vesicæ doloribus cum tragacantha, feminis fluxione vuluæ laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu contusum, crudo sicili, luto circumlito, & in furnum indito, vritur donec albescat. Id cadmiæ modo elotum, vlcibus oculorum, & defluxionibus salutare est, infictum dentes expurgat. Crudi cornu fustis indore serpentes fungantur, feruesactum in aceto, si eo gingiuæ colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit.



SVILLVS TALVS.

CAPVT II.

SVIS talus comburitur, dum è nigro albescat: qui tritus, & potus inflationibus coli longisque torminibus medetur.

TALVS in animalibus os illud vltimum pedis est, quod tibiæ cruris annectitur. Id Græcis *ἄρμα*, vulgò autem os claviculæ ap-

CERVUS animalia sunt notissima. Sed quoniam eorum natura non omnibus cognita est, vt candido cuique lectori fiat satis, ea de Ceruis hic referam, quæ Aristoteles tum v. 1. & 1 x. de historia animalium libris, tum 1111. de partibus

Eburis  
rta.

Nomina

Cervinum  
historia.

partibus eorundem posteritatis memorie prodidit. Cerui itaque syluestrium animalium genere constant, magnitudine asinorum, cursu velocissimi, & ingentibus armati cornibus. Ij cum turgente iam venere coitum appetunt, adeo rache libidinis seuiunt, vt insaniunt, & maximo cum strepitu, & clamore vagentur in sylvis. quo fit, vt conualles, & montium cauitates, eorum boatu resonent. Tanto impetu, tantaque rabie mares feruntur in coitum, vt sepe inter coeundum feminas declinant, atque prosterantur in terram. Cum autem maris genitale utpote durum, sustinere non possint, feminæ cunctes, & currentes coeunt, & concipiunt. Mares non in eadem immorantur, sed mutant, & hircorum modo, breui interposito tempore aliam, & aequè aliam supergrediuntur. Si forte fortuna in vnam tantum feminam concurrant plures, inis cornuum adminiculis statim supra frontem enatis, acriter inter se pugnant ad mortem vsque. Cum mares impleuerint feminas, separantur per se ipsi, & propter libidinis grauiolentiam quisque solitarius scrobes fodit. Fœtent vt hirci: facies quoque eorum nigrescit aspergine, vt hircorum. Degunt ita quousque iunior accedat, tum pascua repetunt. Hæc ideo ceruo accidit, quia silax animal fœpæ naturæ est, & aequè etiam quia pingui abundat: pinguescunt enim æstate supra modum. Quamobrem nec currere quidem possunt: sed secundo, aut tertio cursu capiuntur ab iis, qui pedibus insistant. Quo fit, vt vbi se præpingues sentire, latebras querant, satentes incommo- dum pondus. Coitus est ab æstiuo, mense augusto, & septembri. Implentur ceruæ paucis diebus, & ab eodem multæ. Vtero ferunt octo menses. Pariunt magna ex parte vnum: sed non nullis etiam geminos ceruam peperisse perspectum est. Ferarum quadrupedum Cerua maxime prudentia præstare videtur, tum quia circa semicas pariat, quò scilicet beluæ rapaces propter homines minus accedunt: tum etiam quia cum peperit, inuolucrum primum exedit, quod ad multa (vt nonnulli asserunt) in medicamentis expeditur. Redeunt mox ad prolem, deuorata à partu fœseli herba. Anniculis maribus nondum cornua nascuntur, nisi quoad indicij gratia sit initium quoddam præuberans, quod breue, hirtumque est. Bisulis cornua primum oriuntur simplicia, & recta ad fœcularum similitudinem: quamobrem subuisiones per id temporis eos vocant. Trimis bifida exeunt. Quadrimis trifida, & acceps ad hunc modum (vt Aristoteles inquit) procedit numerus vsque ad annum sextum. Ab hoc similia temper procedunt, ita ne sit dignoscere ætatem ramorum numero. Verum in Italia (sit tamen cum Aristotelis venia dictum) vsque ad vnderarium numerum ramificant. quod & Albertus testatur se vidisse in Germania, quemadmodum, & nos vidisse fatemur. Addam præterea, quod certo scimus, Gulielmum Bavarie ducem in-

ter res suas pretiosas habuisse bina cerui cornua, quorum singulus vnum & viginti ramos fundebat. Hæc admiranda cornua postea dono, vapore raro ac singulari, data fuerunt Serenissimæ Pannoniorum Reginae Mariæ, Caroli v. Imperatoris, & Ferdinandi Romanorum Regis forori. Vanum est credere Ceruorum ætatis annos dignosci posse ramorum numero, quod singulis annis vnum superaddant: quippe cum longæui admodum sint, si quotannis ramorum numerus augetur, profecto iis, qui vltra centum annos vixisse narrant auctores, cornua quercubus, & pinis maiora fuissent. Cæterum (vt Aristoteles scribit) duplici indicio senes cognoscimus, tum quod dentes aut nullos, aut paucos habeant: tum quod adminiculis careant, qui imis cornibus prominent ante frontem. Nam iis in pugna videntur iuniores, sed in senibus non re nascuntur, cum præliis omnino cessent. Cerui (vt etiam Theophrastus inquit libro, & capite primo de historia plantarum) quotannis cornua amittunt: ideo sub ipsa die quam maxime inuia perunt. Latent amissis velut inermes, sed & ipsi bono suo inuidentes. Fit hoc mense aprili, staturo tempore. Idq; opacis faciunt locis, vt mæscarum radio vacent. Pascuntur per id tempus noctu quasi vercundantes, donec recipiant cornua. Decidua amittunt difficilibus, & inaccessis locis, & qua inueniri nequeant. vnde illud prouerbium ortum. Qua cerui amittunt cornua. Quasi enim sua amiserint arma, cauent ne inermes reperiantur. Cornu sinistrum comperum esse (inquit Aristoteles) à nemine adhuc feruit: occultum enim id tanquam quodam medicamento præditum: ceteri Plinius, & Albertus oculi dextrum memorie prodiderint. A phalangio demorfi, vel à quouis generis eiusdem, caneros edunt: quod idem homini etiam prodesse putatur: sed non caret fastidio. Cerui sibilo, & cantu venantium, pastorumq; fistulis capiuntur: mulcentur enim allicienturq; ea volutate, ita vt alter venantium cantet palam, aut sibilat, alter clam feriat à tergo, vbi socius iam tempus esse significat. Nanque animal simplex ceruus est, & omnium rerum miraculo stupens, in tantum vt equo, aut bucula, accedete propius hominē iuxta venantem non cernat, aut si cernat, arcum ipsum sagittasque miretur. Si ceruus erectas auriculas teneat, acerrime sentit, nec latere insidie possunt, in demissa, facile interimitur. Maria tranant gregatim nantes porrecto ordine, & capita imponentes præcedentium clunibus, vicibusque ad terga redeunt. Hoc maxime notatur à Cilicia Cyprum traicientibus. Nec vident terras, sed in odore earum natant. Ceruorum feminæ cornua non habent: nec maribus nascuntur, si cum per ætatem nondum cornua gerunt, castrantur: sed si cornigeris testes excidunt, non decidunt cornua, & magnitudine eadem seruantur. Ceruus tamen cornigeras, non

*Vulgari opinio vna.*



fine naturæ miraculo, quandoque inuentas esse  
comptum habeo. Huius autem miraculi fi-  
dem facere possunt illa cornua ceruæ, quæ sunt  
Augustæ Vindellicorum apud Antonium Euge-  
gerum nobilissimum d'item, in quorum singu-  
lo flexi rami conficiuntur. Arque idipsum  
confirmari potest non dissimilibus ceruæ cor-  
nibus, quæ argento laborato ornata consuevit  
Dux ille Bavariz, de quo à nobis paulò antè fa-  
cta est mentio. Vita Ceruis (ut Plinius memo-  
riz prodidit libro v. l. i. capite x. x. l. i.)  
in confesso longa, quandoquidem post centum  
annos quidam capri sint cum torquibus aureis,  
quos Alexander magnus addiderat, adoptis  
ille cute in magna obestare. Cæterum quod  
vita tam longa sint cerui, quanta eos esse fer-  
runt, non videtur approbasse Aristoteles libro  
v. i. de historia animalium, ubi sic inquit. Vita  
esse quam longa hoc animal ferit. Sed nihil  
certi ex iis, quæ narrantur, videmus: nec gestio-  
re, aut incrementum binuli ita euenit, quasi  
vita esset prælonga. hæc Aristoteles. Qui re ve-  
ra nihil certi nasci potuit ex his, qui centum  
annos post Alexandrum capri sint cum torqui-  
bus aureis. Nec etiamnum ex Cæsaris Augusti  
cerua, quæ similiter innumeris elapsis annis  
post eius imperium capra, nunquam iugulari  
potuit, prohibente torque argenteo temporis  
diurnitate cure quasi confectio, in quo scripta  
legebantur verba hæc. Noli me tangere, quia  
Cæsaris sum. Monte Asii Elapho nomine apud  
Arginsum, quo loco Alcibiades mortem obiit,

ciriter vertebram , qua ceruici innectitur ca-  
put, magnitudine haud minores iis, quos maxi-  
mos carnes putres ediderint. Gigni vniuersi, at-  
que contigui solent numero adeo circiter vigi-  
nti. Ceruinus sanguis ( vt Rasis inquit libro  
sexaginta animalibus dicato ) clysteribus infu-  
sus intestinorum vlcera sanat, & d'urtarnas alui  
fluxiones cohibet: ex vino vero sumptus, vene-  
natis sagittis resistit. Eius cerebrum neruorum,  
& compaginum collectiones mundat. Cornu  
ad candorem vsq; exustum, ex melle haustum,  
alui tineas pellic. Iuuenum ceruorum tenerima  
cornua, quae adhuc lanuginosa cuticula ope-  
riunt ( auctore Scribonio Largo ) in taleolis  
confecta, & nouo fittili indita, ac inde operculo  
argilla circumlito, in dibanum imposita, donec  
adeo arescant, vt in puluerem facile conterí pos-  
sint, additis pipere, & myrrha, colí cruciatibus  
mirifice medentur. Os praeterca, quod in ceru-  
orum corde reperitur ( tamen Valsalius vir  
alioqui clarissimus libro, quem de humana fa-  
brica edidit, nullum inibi os reperiri falso con-  
tendat ) omnibus cordis affectibus confert.  
Quin & contra omnia venena mirifice praestat,  
antidotisque admiscetur, quae pestilentiae ad-  
uersantur. Sed cauendum est, ne huius loco se-  
plastarij bubulam tracheam arteriam accipiant  
in compositionibus, vt facere consueuerunt.  
Quod Graeci *ιδανειγας*, id Latini Ceruinum  
cornu vocant: Itali, il Corno del ceruo: Germa-  
ni, Hirtzhorn : Hispani, Cuerno de ceruo, &  
punta de ceruo: Galli, Corne de cerf.

ERYCAE. CAP. IIIT.

ERVCIS, quæ in oleribus gignuntur, cum oleo peruncti, à venenatis bestiis feriri negantur.

40 ERVCAE, quibus olitores maximè inimicantur, animalcula sunt vulgaris notitiæ, sed horis admodum noxiæ, quòd quandoque adeo numerosè proveniant, ut inusitatis olitoribus olea cuncta vna tantum devorent nocte. Gignuntur (ut memoriae prodidit Aristoteles libro v. capite x i x. de historia animalium) ex virentibus herbarum foliis, maximèque ex brassica. Primum minus quid milio cossit in folio: mox 50 vermiculi inde contrahuntur, & augentur tum intra triduum eruculæ affirmantur. Hæ tempore succedentes motu cessant, & iudeque forma immutatur, duriorque cortice integuntur, cuius color auro fulget: ob idque (ut Aristoteles prodit, & post ipsum Theophrastus libro v. de causis plantarum) appellantur tantisper chrysalides, quasi aureas dixeris. Dum eo puramine integuntur, ad tactum tantum mobiles sunt, & palpitantes, meatibus araneis obductæ: non os, non aliud ex membris, quod conspicuum sit, possident. Longo post tempore puramine abrupto, evolat inde an malia pennigera, quos papiliones vocamus. Itaq; primum dum Erucæ

Aristote-  
lis et Pla-  
tonis lapsus.

Vermes  
in capite  
ETC.

sunt, cibo aluntur, atque excrementum emittunt: at verò cum in aurelas transferint, nihil vel gustant, vel excrementum. Harum, dum adhuc puer effem, ingentem copiam quodā anno peperit Hetruria, adeò vt pueri omnes mirabili quadam ostentatione numerosas in plateis gressant aurelas, ita aureo nitore fulgentes, vt ex puro auri metallo factas quisq; credidisset, nisi deprehensæ fuissent palpitantes. Fuit eo anno tanta Erucarū multitudo, vt vniuersas eroderent herbas. Quo postmodum factum est, vt vbique stirpium folia, ac rami, ædificiorumq; parietes, ijs veluti viuo ac palpitanti fulgerent auro. Facies eis quasi humanā, capite bicorni, corpore infantuli modo fasciæ obducti: id quod silentio dissimulauit Aristoteles. Hæ quærentibus quotannis sese offerunt circa vrbiū moenia, & ædificiorum muros, circa eos præsertim, quibus adiacent hori, ac viridaria: plerumque enim in ædificiorum caui capite ad terram verso reperiuntur appensæ. Cæterum etsi dixerit Aristoteles, Erucas ex herbarum, oleumq; præferim folijs ex sese gigni, absque animalis semine, visuntur tamen hoc æuo papilionis ex aurelis exorti, auersis oleum folijs oua parere subalbida, milio minora, ex quibus erucæ tandē prodeunt, vt scribit Erucarum generi cœnere compertimus. Vnde mihi quidem dubitandum videtur, an rem hanc diligenter perpenderit, vel exquisitè tractauerit Aristoteles. Quanquam minime negauerim, quin & ex putri quodam humore per se Erucæ nasci possint, quemadmodum & mures, angues, vermes, aliq; complura generantur. Plinius grana illa ex rore feri putat, solēque addensuri, quod tamen naturæ speculatores non ita facie comprobant. Erucis olera non erodi auctor est Plinius, si palo imponatur in hortis ossa capitis ex equino genere feminae duntaxat. Aduersus quas & cancrum fluuiatilis in medio horto suspensum auxilium narrant. Sunt etiam qui sanguineis virgis tangunt ea, quæ nolunt his obnoxia esse. hæc Plinius. Columella præterea lib. x. 1. de re rustica circa calcem, necandis prohibendisque erucis hæc in medium protulit. Vbi verò apricis regionibus post pluuia noxia incesserunt animalia, quæ à nobis appellatur Erucæ. Græcè autem *κάρυα* nominantur, vel manu colligi debent, vel maturis temporibus frutices oleū concuti. Sic enim dum adhuc torpent nocturno frigore, si deciderint, non amplius superiorem partem prorupunt. Id tamen superuacuum est facere, si ante sationē semina succo herbæ sedi macerata sunt: nihil enim sic medicari nocet erucæ. Sed Democritus in eo libro, qui Græcè inscribitur *πρὸς ἀντίδοτον*, affirmat, has ipsas bestiolas enecari, si mulier, quæ in mensuris est, solutis crinibus, & nudo pede vnamquamque aream ter circumeat: post hoc enim decidere omnes vermiculos, & ita emori. Sed postrema hæc,

quæ à Columella referuntur, superstitiosis sunt relinquenda. *κάρυα* ita Græcè, Latine Erucæ vocantur: Arabicè, Riaph: Italicè, Bruchi: Germanicè, Rapp, seu Holzauurm: Hispanicè, Bruchi: Gallicè, Chenilles.


Nemina.

## CANTHARIDES. CAP. LIIII.

ERVMENTIS congesta Cantharides ad recondendum idoneæ sunt, quæ fictili vase non picato conduntur, & raro mundoq; linteo obligato ore, & deorsum cōuerso suspenduntur super aceti feruentis quàm acerrimi halitum, donec æstu exanimetur: postea lino trāsfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes variæ, luteis lineis, quas in pennis transuersas habent, promissosq; corpore, crassæ, ac blattarum modo perpingues: sed inertes, ac imbecillæ, quæ vnius sunt coloris.

## BYPRESTES, ET PINORVM ERUCÆ. CAP. LV.

SIMILI modo reconduntur byprestes, genera quædam cantharidum, & pinorum erucæ: quæ supra cribrum suspensum feructi cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omnium communis erodere, vlcerare, calorem elicere: qua de causa admiscuntur medicamentis, quæ lepras, ferosq; lichenas, & carcinomata sanant. menses ciunt pefsis emollientibus additæ. Aliqui cantharidas antidotis impositas, aquæ subter cutem auxiliari prouiderunt: argumento, quod vrinam moueant. Alij pennas, pedesque contra potarum veneficia, remedio esse tradiderunt.



CANTHARIDES vulgata sunt animalia, Canthari nomine à cantharo, qui Latine scarabeus est, dum confuso deducto, ac si eas dixeris paruos scarabeos: deratio.

Erucarū generatio.

Remedia contra e. Erucas.

Sunt in Italia frequentissimæ, calidioribus præsertim regionibus, ubi non modò in frumentis inveniuntur, sed in fraxinis quoq; stabulantur. Præstant quæ solidæ, recentesq; sunt, nam veterescentes facili cariem sentiunt, vnde inutilis sunt in medicamentis. Buprestes autè (vt

*Buprestes.*

*Pino-  
rum  
eruca.*

Plinius inquit lib. x. x. x. cap. i. i. i. nò perinde in Italia sunt vulgares, & frequentes, sunt tamen scarabeis similes, quamquam minores. At pino-ru eruce numerose sanè habentur in Tridentinis montibus, quòd inibi pino-ru perpetuò vireant sylvæ, Ananien- si præsertim tractu, ac Flemarum conuallibus. In extremis arboru ramis, & iis plerunq; cui in earum cacumine atolluntur, innumera- biles Erucæ rufescentes, ac pilosæ miro artificio n' d'ificant, quibuscùq; tenuissimis velleribus innumeri- s involucris còtextis. Latent in his hyme, ita frigoris noxam evitantes. Nidi magnitudo adeò ampla est, vt nonnunquam conclusi vermiculi millenarium numeru excedant. Involucris materies, qua conclusuntur, tenuissima ferici velamina maximè æmulantur, tenuior tamen est. Hæc sanguinis manationibus aptissima est: quare imposita confecti in fluore sistit. Sed de his hæcenus. Cæterum sunt medicorū quam plurimi Mauritanos præcipue sequentes, qui quotiescunq; Cantharidas medicamentis miscent, præciunt capita, alas, & pedes abiecti, tanquā partes cæteris nocitiores. Quod tamen Galeni sententiæ omnino repugnat. Quippe qui lib. x. i. simpl. med. integras cantharidas medicamentis addendas præcipit, quemadmodum & iis integris ipse perpetuò fuerat usus.

*Error  
militari.*

Sed si responderint ip, illud nec eorum esse institutum, nec Mauritanorum, sed Hippocratis lib. i. i. i. de victus ratione in morbis acutis, audiant quæso quibus verbis eodè loco Hippocratis sententiam declarer Galenus, cum inquit. Quidam dictionis huius mentem haud quamquam intelligens auidæ medicus, prædictas partes à cantharidibus abiecti, deditq; hydro- picu cum à primo die abscissus in fura comparuisset, post tres alios dies sectus est, effusq; copiosa aqua, curatus esse v'sus est: quòd pars tumoris præter naturā plurima statim ad moderatorem redacta sit, veruntamen non multis post diebus obiit. Quam ob causam medico quidam erimen ingessit, perperâ data esse cantharidum corpora inquit. Nempe propinanda, ablatis corporibus, tum caput, tum pedes, tum alas, idq; esse quod in dictione enunciaretur. Quare non cunctatus auidæ ille medicus, hydropi alteri ita propinavit: moxque factò similiter in femore abscisso, sectoq; multis post diebus hominem mori contigit. quanquā vrinarum promotorio medicamento ex cantharidibus confecto, quidam circa bibentium incommodum v'si sint. hæc Galenus. Ex quibus faciliè cognoscitur, Arabes non rectè Hippocratem intellexisse. Quamobrem dicendū esse existimauerim, quòd ablatis cantharidum ex-

tremitatibus, exuantur antidoto, quo natura sunt præditæ in proprii veneni remediū. Quod cum accuratè perpèdisset Galenus, eas integras suis medicamentis semper admiscuit, vt facili attestantur quæ lib. x. i. de simplicium medicamentorum facultatibus memorat: prodidit; sic inquit. Veruntamen sufficientè habemus de cantharidibus experientiā, quòd in vngues p'sorodis cum idoneis ceratis, aut emplastris impositæ, sic illos educant, vt toti cadant. Misceimus eas etiam facultatibus p'oris, & lepris congruentibus, necnon quibuscùq; sepius, atque interim etiā iis quæ clausos, quos vocant, citiunt. Porro præceptoru meorum quidam carum paulum quiddam in medicamenta vrinam cientia iniiciebat. At quidā solas alas, & pedes iniiciunt, quæ sunt esse alexiteria iis, qui corpora ipsoru bibissent. Alii contrā. At nos totas indimus. Cæterum aptiores sunt ad ea, quæ expertu me dixi, ex cantharidū, quæ inuentæ in frumento, lucea trāsuerim in aliis cingula obtinent, potissimū si iniiciantur in vas fidele nouum, deinde ori vasis linteū obductū sit rarum, & vas ita teneas inuersum, vt linteum, quod cantharidibus subest, vaporem ab aceto sursum elatu excipiat, donec emoriantur ipse cantharides. Et de buprestibus agēs, ita subdit. Sic Buprestes quoq; reponere expedit. Sunt autè & ipse animalis quoddā genus cantharidibus tum specie, tum viribus ad simile. Mox de pino-ru erucis: quin & erucæ (inquit) quæ in pinis nascuntur, meritò nuncupatæ ptyocampe, huius sunt facultates. *Cantharides* vt Græcis, ita etiā Latinis Cantharides appellantur: Arabibus, Dherare, siue Cavaritha: Italis, Cantarelle: Germanis, Goldteffer: Hispanis pariter & Gallis, Cantarides. *Buprestes* Græcè, item Latinè Buprestes nominantur: Arabicè, Xofostis: Italicè, Buprestis: Germanicè, Knoefster: Hispanicè, Arebenta buci. *Pino-ru eruca* Græcis, Pino-ru eruce Latinè dicuntur: Buchi de pini, Italis: Pytoriapla, Arabibus: die vum von fichen, Germanis: Gufanos del pino, Hispanis.

*Canthari-  
dum Erucæ  
ex Gal.*

*Nomina.*

#### SALAMANDRA. CAP. LVI.

SALAMANDRA lacerta genus est, iners, varium, quod frustra creditur esse, ignibus non vri. Vim habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. Ad- dirur, vt cantharis, in medicamenta, quorum vis est exesse, & lepras abolere: similiq; modo reconditur. Liquefacta in oleo pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus, & capite, in melle seruatur ad eundem usum.

SALAMANDRAE in agro Tridético copiose inueniuntur, Ananien- si præsertim valle, iuxta semitas, & in opacis, vliginosque locis.

*Salam-  
dra consi-  
deratio.*

Incip

Incipiunt enim apparere verno tempore, atque etiam autumnum, celo maximè pluuio. Sed æstate ob solis feruores, itemque hyeme ob vrgentissima frigora, suis è latebris non exeunt. Salamandra corporis magnitudine, formæque lacerato similis est, verum capitis, ac ventris crassitudine excellit, breuiore tamen constat cauda. Illa est altioribus nitatur cruribus, ad gressum tamen ignauior est, hic verò contrà agilis, celèrque confpicitur. Color illi niger, luteis non minimis infectus maculis, quodam læuitate pellucidus. Visu Salamandræ horribiles, atque abominandæ sunt, ita vt facile eorum aspectus hominibus nauseam pariat. De hac differens Plinius libro x. capite 1 x v 11. sic inquit,



Salamandra aquatica.

Nomina.

Salamandra animal laceri figura stellatum, nunquā nisi magnis imbribus prouenit, & serenitate deficit. Huic tantus rigor, vt ignem tactu extinguit, nō alio modo, quàm glacies. Quod qui dem facit prunis superposita, non secus atque, cæteræ animalium carnes, quæ prunis assandæ traduntur. Veruntamen in medium magni ignis, vbi flamma valentius agit, vel in fornacem proiecta, statim comburitur. Vanum est ergo credere (vt etiam Dioscorides inquit) igne cum minimè absumi posse, eoque viciatire, vt chamæleon aere: quandoquidem factio periculo, igne exustam breui salamandram vidimus. Quo fit, vt scripserit Galenus libro 111. de temperamentis, Salamandram ad certum vsque temporis spatium ab igne nihil pati: vti tamen, si ea longius igni sit admota. Quod postea efficit, vt explicare nesciam, quo argumento, quauerratione prodiderit Aristoteles libro v. cap. x 1 x. de historia animalium, Salamandram igne minimè comburi, sed per eum inambulantem flammam, & prunas extinguere: cum contrarium experientia facile probari possit. Illud prætereā mihi dubium est, an idem eodem capite vera retulerit, cum asserit in Cypro insula arariis foracibus, vbi chalcites lapis ingestus com pluribus diebus crematur, in medio igne exoriri pennatas bestiolas, paulo muscis grandibus maiores, quæ per ignem saliant, atque ambulænt, amoroque igne statim emoriantur. Quippe quod maximè id naturæ operibus repugnet. Adde etiam quod si hæc vera essent, ea nunquā reticisset Galenus, qui diligentissimè omnia Cypro metalla inuestigauit, ac nouit, pariterque metallorum fornaces, cum fuerit ipse ha-

rum memorabilium rerum accuratissimus indagator. Vidi ego in Germania ærarias complures fornaces, à quibus vranque cadmiam, pompholygem, spodium, æris florem, & alia cum retuli, sed muscas per ignem obambulantes mihi nunquam videre licuit. Quam in re nesciuerim, quoniam pacto Aristoteles feruari possit. Nisi dixerimus, ipsum hoc in loco non suam, sed aliorum historiarum recensere. Sed de his hætenus. Cæterum Salamandræ nihil gignunt (vt Plinius tradit) neque est in eis genus masculinum, formineumve. Nascuntur enim ex putri quodam humore terræ. Morfu venenum inferunt, serpentium modo. Quinetiam fructus, & herbas quadam oris salua veneno inscunt, maxima degustantium iactura, quandoquidem non pauci reperti sunt, qui hoc veneno interire. Est & Salamandræ aquaticum genus Vtinentibus frequentissimum, capite terrestribus breuiore rotundiorque, cauda anguillarum modo, nigro vndique dorso, ventre autem rufescente, luteis maculis resperfo, horrendo aspectu, æquè atque terrestre. Animal, quod Grecis *εχιδνα*, Latinis similiter Salamandra nuncupatur: Arabibus, Adhaya: Italis, Salamandra: Germanis, Olm siue Molch: Hispanis, Salamantega: Gallis, Salamandre.

## ARANEVS. CAP. LVII.


ARANEVS, quem holcum, alij lyccon, id est lupum vocant, subactus cum splenio, & lineo illitus, prolatûsque vtriusque temporibus, aut fronti, tertianos circuitus persanat. Tela eius imposita sanguinem sistit, vulnera, quæ summam cutem occuparunt, ab inflammationis iniuria vindicat. Est & alterum aranei genus, qui candidam, tenuem, densamque telam orditur, quem in aluta ligatum, & lacerato appensum, quartanis circuitibus mederi narrant. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

ARANEORVM, & phalangiorum (vt libro 1 x. capite xxxix. de historia animalium scribit Aristoteles) plura sunt genera. Mordax, quod in duo distinguitur, alterum simile iis, quæ lupos appellant, est paruum, varium, prociac, salax, pulch nuncupatum. Alterum maius, coloris nigri, cruribus prioribus nigris, tardum, & lentè ambulans, nec viribus valens, neque saliens. Cætera, quæ medicamentarij proponunt, aut nullum, aut certè exilem inferunt morsum. Genus secundum, quod lupi nomen accepit, partim exiguum est, quod

Araneorum, &amp; phalangiorum genera.

non texit: partim maius, quod asperam, par-  
uantque telam apud terram, aut sēpes ordatur,  
bucculis intexere solitum primordius intus pos-  
sitis observatur, dum aliquid in tela offendens  
commouerit, mox accurrit, vt capiat: par-  
tim varium est, quod paucani vilēque telam  
sub arboribus facit. Tertium genus,  
quod sapientissimum, laurissimūque omnium  
est, nostris edificiis latissimas contextit telas.  
Huius, vt equidem arbitror, hic meminit Dio-  
scorides. Plinius araneos, qui ictu, vel mor-  
su venenum inferunt, phalangia nominat,  
quorum historiam libr. x x i x. capite 1111.  
diffusus enarrauit his verbis. Phalangium  
est Italix ignotum, & plurium generum.  
Vnum simile formicæ, sed multo maius, ru-  
fo capite, reliqua parte corporis nigra, albis  
intercurrentibus respersum guttis. Acerbior  
huius, quam vespa ictus. Viuit maximē cir-  
ca furnos, & molas. Acque phalangion Græ-  
ci vocant inter genera araneorum, sed di-  
stinguunt lupi nomine. Tertium genus est eo-  
dem phalangij nomine araneus, lanugino-

Phalan-  
giorum ge-  
nera ex  
Pli.



pus, grandissimo capite. Quo dissecto inueni-  
ri dicuntur intus vermiculi duo, qui ceruina  
pelle conclusi, & mulieribus adalligati ante so-  
lis ortum, præstant, ne concipiant. Vocatur  
& rhagio, acino nigro similis, ore minimo  
sub aluo, pedibus breuissimis, tanquam im-  
perfectis. Dolor à morfu eius, qualis à scorpio-  
ne. Vrina similis araneis textis. Idem erat alter  
tion, nisi distingueretur virgulis albis. Huius  
morfu genua labefactantur. Peior vtroque est  
ceruleus, lanugine nigra, caliginem concitans,  
& vomitus araneosus: etiānum deterior, à  
crabrone penna tantum differens. hic & ad  
maciem perducit. Myrmecion capite formi-  
cæ similis, aluo nigra, guttis albis distinguen-  
tibus, vespæparum dolore torquet. Tetranga-  
thij duo genera habent, peior medium caput  
distinguentē lineā alba, & transuersum altera.  
hic oris tumore facit. At cinereus posteriori  
parte candicans, lentior. Minimē autem no-  
xius, eodem colore, qui telas muscis in parie-  
tibus latissime pandit. Hactenus de araneis,  
& phalangis Plinius. Cui subscribens Aëtius

libro x i i i. capite x v i i i. Phalangiorum  
genera, inquit, plura sunt. Quæ verò apud  
eos, qui de noxiis bestijs scripserunt, referuntur  
vt plurimum sex numero existunt. Vnum  
quidem ex eis rhagium, alterum lupum, tertium  
formicarium, quartum cranocolaptes,  
quintum sclerocephalon, sextum scolecion ap-  
bellatum. Ac primum quidem rhagium, id est  
acincum, figura rorundum est, colore verò ni-  
grum, acini vix nigræ similitudine, vnde etiam  
appellationem accepit: & os quidem iuxta me-  
dium ventrem habet, pedes verò ex utraque  
parte quàm breuissimos. Alterum vero lu-  
pus appellatum, muscas perdit, eisque pascitur:  
ac corpus quidem habet latum, ac volubile,  
partes verò circa eius ceruicem incisæ sunt am-  
plius autem, & os eius eminentias tres habet.  
Tertium autem myrmecium, hoc est, formica-  
rium dictum, quod formicis maximē assimile-  
tur, colore est fuliginosum: corpus verò eius ve-  
lut astris quibuscumque insignitum, præsertim cir-  
ca dorsum. Quartum deinde cranocolaptes,  
oblongum est, & viride, stimulumque iuxta  
collum habet, atque si in aliquem irruat, locos  
circa caput petit. Quintum sclerocephalum di-  
ctum, caput habet saxum, & obduratum: linea  
menta verò per omne corpus semina animalium  
illis, quæ lucernas noctu circumuolitant.  
Sextum postremū scolecion, siue vermæ carum  
appellatum, sublongum est, & submaculosum,  
maximē circa caput. Atque hæc quidem species  
phalangiorum enumerantur. Hæc de phalan-  
gis Aëtius. Ego autem asserere non dubita-  
uerim, omnia hæc phalangiorum genera habe-  
ri in Italia: quippe quæ à me sæpius sint visi-  
quantum scribat Plinius, phalangia in Italia  
non oriri. Quin potius præter prædicta ge-  
nera, inibi & alterum reperitur omnium pernicio-  
sissimum, quod à Taranto Apulix ciuitate,  
vbi innumera æstare tota vagantur in campis,  
Tarantulum appellant. Icti verò ab his variè, ac  
diuersè torquentur: siquidem alij perpetuò can-  
nunt, alij ridet, alij plorant, alij clamitant,  
alij dormiunt, alij vigilis afficiuntur, plerique  
vomitionibus laborant, nonnulli salant, sunt  
qui sudant, alij tremebundi sunt, quidam pa-  
uoribus infestantur, & alij alia patiuntur incom-  
moda, sicutque phreneticis, lymphaticis, ac ma-  
niacis similes. Quæ quidem symptomata tam  
varia, ac diuersa non aliunde prouenire dicen-  
dum est, quàm aut ex vario horum animalium ve-  
neno, aut ex demoriorum hominum temperame-  
tis. Nam atia bile tentatis, pro eorum tempera-  
turis omnia hæc accidisse conspeximus: tametsi  
non desint, qui putent Tarantulæ venenum  
dictum, vel horatim immutari, ferique ob hoc,  
vt tam variis symptomatibus vexentur, qui ab  
ea ciuntur. Habentur Tarantulæ etiānum in  
maritimis nostris Senensis Tyrreno litori  
adiacentibus, & Romano agro frequentes: ve-  
runtamen non perinde ac in Apulia numerose.


Tarantula  
la confide-  
ratio.

Degunt

Degunt hæc inter segetes in quibusdam terræ cauernulis, è quibus interdum exeunt, sæpe eos messoris sciunt, qui huius insidie ignari, crura ocreis non munierunt. Ictos vidi ego nonnunquā in plateis iacentes, & in xenodochiis, qui prædictis affectibus torquebantur. Sed mirum certè, quàm facili huiusce veneni vis musica mulceatur. Quandoquidè (vt equidem attestari possum) auditis lyricis instrumentis, vel tibiarū sono, primo statim occurſu icci à Tarantula à languoribus cessant, & in mediū tripudiare, & saltare incipiunt, tamq; diu rem prosequantur, ac si sani essent, & nullo vnquā tenerentur dolore. Quod si eueniat, vt tibicines tantillum conqueſcant, ac interponant, nō multo post tempore in terram concidunt, & ad pristinos redeunt languores: nisi tandū indeficiente sonitu saliant, atque tripudent, donec veneni virus, partim insensibiliter per cutis meatus, partim per sudorem exeat, & discurtiatur. Ob id igitur tibicines stipendio conducuntur, alternatimq; mutantur, vt absque villa sonitus intermissione, tandū tripudent demorſi, quousque penitus curati quiescant: cum tamè, dum hæc aguntur, sint, qui antidotis eos corroborant, nimirum theriaca, mithridatica, ac aliis, quæ venenosorum morbus adueſantur. Nomen *χάλαια* Græcum est, vt Latinum Araneus: Arabicum, Hamdebut, seu Hanchebur: Italicum, Ragno: Germanicum, Spinn: Hispanicum, Arana: Gallicum, Araigne.

## LACERTA. CAP. LVIII.

LACERTA caput intritū, & appositum, aculeos, & omnia corpori infixæ extrahit: varos, formicantes verrucas, & pensiles, quas acrochordonas vocant, tollit. Tetur exesis dentibus coniectum dolores finit. Si diuulsa admoueat, iccis à scorpione leuamentum præstat.



## SEPS. CAP. LIX.

SEPS, quam aliqui lacertam chalcidicam vocant, in vino pota, morſus suos sanat.



LACERTA, quæ vbiq; vulgares oberrant, oua quemadmodū serpentes pariunt, & cochleis maximè insidiantur. In Arabia (vt Plinius est auctor) cubitalè æquant mensuram: & in Mauritania, auctore Strabone, bicubitalis reperitur: in India verò Nisā monte, si Plinio credimus, ad  $x \times x \times x \times x$  pedum longitudinē lacerti reperitur, colore fului, aut puniceo, aut æruleo. Est & Insula Caprarū lacertis maximis referta, vt referunt, qui ad fortunatas nauigarunt insulas. Cæterū, quæ Chalcidicæ vocantur, in Libya, & Cypro copiosè prouenientes, nō habentur in Italia. Morantur hæc plerumq; in locis aridis, & inter saxa. Varia est harum historia apud auctores: nam quidam nostratibus lacertis similes ipsas fecere, quidā verò inter serpentis genera recensent. Nicander Dioscoridi subscribit: quippe qui in theriacis suis dicit. Vitabis & Sepem corpore humilibus lacertis similem. Vt. unciāmen Aëtius lib. x lxx. Sepem inter mortuos recolit angues, sic inquit. Seps, qui Seps appellatur, longitudine quidem duorum cubitorū reperitur, ex crasso autem in tenuem abiecta verò, ac tardè prosperpit. Caput habet latum, os acutum, vniuersum autem corpus multis albis notis respersum. Cæterū illi, qui ab eo percussī sunt, intra tres, aut quatuor dies pereunt. hæc Aëtius. Pausanias porro aliter sentire videtur: inquit enim. Egyptum Arcadiæ quondam regem in venatione occupatum, & imprudentem Seps oppressit. Vipera similis est minimè, cineris colore, maculis ex intervallo variis, lato capite, angusta ceruice, aluo maiori, cauda breui, obliquo incesso, quasi cancer, quod & cerasæ serpenti proprium est. Quamobrem credendum putauerim, aut fabulosam esse lacertæ Chalcidicæ historiam, aut pluribus hoc nomen conuenire serpentibus. Verum minimè reticendum duximus, reperi in Hetruria, in Romano agro, ac etiam in Apulia quoddam lacertarum genus Terrantola vulgò dictum, quoniam sub terra delitescat. Quæ cum homines morſu perimat, fecit, vt mecum quandoque cogitauerim, an ea forestis Nicandro, ac Dioscoridi Chalcidica esset lacerta: aut Stelio, quod stellis maculata, in signatūque cernatur. Sed hæc libro sexto, duce Deo, latius explicabimus, vbi de his, quæ morſu, vel icu ve-

Lacerta-  
rum con-  
sideratio.Chalcidi-  
carum cō-  
sideratio.Terranto-  
la.

*Nomina.* nenum emittunt, sermonem faciemus. Quæ Græcis *σαῖνα*, Latinis Lacerta nominatur: Italis, Lucertola: Germanis, Heidex: Hispanis, Gartixa. Quæ verò *σαῖνα* Græcè, Latinè Seps, & Lacerta Chalcidica vocatur. Italicè, Seps, Gallicè Lardes.

## SCINCVS. CAP. LX.

SCINCVS aut Aegypti, aut Indiar, aut rubri maris alumnus, quanuis inueniatur in Lydia Mauritanias. Est autem terrestris crocodilus, sui generis, sale inueteratus cum nasturtio. Aiunt carnes, quæ renes amplectantur, id sibi virum vendicasse, vt si drachmæ pondere bibantur, venereum accendant. Verum decocto lentis cum melle, aut femine lactucæ cum aqua potio, veneris cupiditates inhibentur. additur in antidota.

## SCINCVS.



*Scinci con- sideratio.*

TAMETSI scribat Dioscorides, Scincum esse terrestrem crocodilum, sui generis, aquatile tamen animal est. Quandoquidem qui Venetias importantur, in mari rubro, & in Aegypto Nilo flumine capiuntur. Hi quanuis fortia crocodilos referant, magnitudinem tamen longe minorem habent: namque qui ad summum adoleuerunt, nostrates lacertas magnitudine non excedunt. Squamis vestiuntur subluteis, cæsa à capite ad caudam discurrente linea. At non eadem crocodilis tunica: quippe qui nigro natura sunt dorso. Pausanias in Libya bicubitales reperiri Scincos tradidit: veruntamē id ad nos non deferuntur. Sunt in agro Vicentino lacus quidam, qui Scincos etiam gignunt. sed minutulos, ac nigricantes, quibus sæpius vtuntur seplarsarii deficientibus marinis, non sine magno fortasse hominū discrimine. Reperbat hos Fuchsius quoque libro primo de compositione medicamentorum, sic inquit. Scincus animal est in aquis degens, lacertæ magnæ simile, sed ventricosius: cauda lata, vt anguilla, ad natandum apta. Quapropter quos officinæ

*Scinci V- centini.*

subiiciunt, cum duabus caudis, veri non sunt, sed ex Vicentino agro allati. hæc ille. Qui tamē dum aliorum errore merito damnat, ipse (pace viri aliquo clarissimi dixerim) in alterum non minorem mihi quidem incidisse videtur, quod existimauerit, legitimū Scincum, cuius effigiem damus, regi lata cauda ad natandum, anguillæ modo. Quandoquidem Fuchsi Scincus, quo Foroiulienis ager, & quæ circum Venum ciuitate stagnantes sunt aquæ, maximè scaturit: & cui lacertæ magnæ corpus, tumidus venter, ac maculis variis, rotundum quadritenue caput, anguillæ cauda, nigrumque dorsum est, Scincus verus non est: sed potius animal salamandræ generi adscribendum, quod terrestrem salamandram non paucioribus refert notis, quem aquatiles testudines terrestres representant. ob id itaque rectè Vtinentes hoc animal Salamandram aquaticā vocant, abhorrentque maximè, quod inter venenata omnino reputet. Huic finē cum Aegypto scinco nulla est cognatio: quippe Aegyptius capite constat longo, dorso quadritenue elato: ventre lacerta non maiore: corio squamis subluteis, numerosis, minimisque in vniuersum refero: cauda lacertæ modo tereti, breuiore tamen: cæsaque à capite ad caudam discurrente linea. Talis nimirum Scincus est, qui quotannis ab Alexandria Aegypti Venetias numerosus conuehitur. Scincorum meminit Plinius libro 30 x x v i i i . cap. v i i i . vbi ita scribit. Ex chæmæleontis similitudine est Scincus, quem quidam terrestrem crocodilum esse dixerunt: candidiore autem, & tenuiore cute. Præcipua tamen differentia dignoscitur à crocodilo aquatilis squamarum seta à cauda ad caput versa. Maximus Indicus, deinde Arabicus. Afferuntur falsi. Rostrium eius, & pedes in vino allopoti, cupiditates veneris accendunt. Vtique cum saryrio, & erucæ semine singulis drachmis omnium, ac piperis duabus admixtis, ita vt passilli singularum drachmarum bibantur. Per se laterum carnes obolis binis cum myrrha, & pipere pari modo potæ efficaçes ad idem creduntur. Prodest & contra figittarum venena, ante posteaque sumptus. In antidota quoque nobilia additur. hæc Plinius. Porro CROCODILVS (vt refert Aristoteles in libris de historia, & partibus animalium) animal est magnam, ad quindecim vsque cubita crescens: quanuis ad duodecimum scripserit Plinius. Hic animal non parit, sed ouum asserunt magnitudinem non excedens: idque in terra, non autem in aquis. Parit cum plurimum sexaginta, viuuntque diu, maximumque animal minima hac origine euadit: namque totus ex ovo exclusus proportionem respondet, lacertorū magnitudinem æquans. Linguam adeo indifferenter habet, vt omnino ea carere videatur. Cuius rei causa est, quod idem & terrestris, & aquaticus quodammodo est. Ergo vt terrestris, locum obtinet linguæ, vt vero aquaticus eling

*Crocodili historia.*

elinguunt. Pisces enim aut nullam habere linguā videntur, nisi valde resupinentur, aut inexplanatam habent. Solus inter cetera superiorem mouet mandibulam, minimèque inferiorem. causa est, quòd pedes ad capiendum, retinendumque inuitiles habet. Oculi crocodilo suilli, dentes exerti, & vngues in pedibus acutissimi, coriūque durissimum, telis, ac sagittis minime cedens. Interdum plerumque terram incolit, noctū verò aquis se mergit, innatāque flumine. Duo eius esse genera Plinius est auctor loco citato. Vnum maius, de quo diximus: alterum minus illi simile, multum infra magnitudinem, in terra tantum, odoratissimisque floribus viuit. Ob id intestina eius diligenter exquiruntur, iucundo nidore fasciā. Crocodileam vocant, oculorum vitis vilissimam, cum porri succo inunctam, & contra suffusiones, vel caligines. Illita quoque ex oleo cyprino mollescit in facie enascentes tollit. Ex aqua verò morbos omnes, quorum natura serpit in facie, nitoremque reddit. Lentiginis tollit, ac varos, omnesque maculas. Et contra comitales morbos bibitur ex aceto multo binis obolis. Felle inunctis oculis contra suffusiones nihil vilius prædicant. Maioris dentes à dextra maxilla adalligati dextro lacerto (si credimus) coitus stimulant. Coisj vtriusque cinis, ex aceto illitus his paribus, quas secari opus sit, aut nidore cremati, sensum omnem scalpelli auferit. Sanguis vtriusque claritate visus inunctis donat, & cicatrices oculorum emendat. Cor annexum in lana onis nigra, cui nullus alius color incurruerit, & primo partu genitæ, quartanas abigere dicitur. Corpus ipsum, excepto capite pedibusque, elixum manditur ischiadicis. hæc Plinius. Veruntamen quæ is alterius intestinis assignauit, ea Dioscoridem fimo tribuisse constat.

Crocodile  
genera, et  
vires.

Chama-  
leontis ka-  
loria,

Cæterum cum Scincus Chamæleontem, cuius formam refert, mihi in mentem reuocauerit, veniarque & ipse in medicum usum, non ab re fore duxi, eius tum historiam, tum etiam facultates enarrare. CHAMÆLEON igitur (vt Aristoteles memorie prodidit lib. 11. cap. x 1. de historia animalium) figura totius corporis lacertam planè repræsentat. Latera deorsum ducta ventri iunguntur, vt piscibus: &, spina modo piscium eminet. Rostrum simia porcarie simillimum: cauda prælonga in tenue desinens, & lœgis implicata in se orbibus. Elatio à terra est, quàm lacerta. Pedes singuli biartati secantur, partemque talem inter se habent fixam, qualem pollex ad manus, reliquum partem obiectam. Sed ipse etiam reliquæ partes paulatim in digitos quosdam sinduntur, aduncis vngueculis. Corpus asperum totum, vt crocodilo. Muræ suum colorem inflatur. Omnium ouiparorum tenuissimus est: quippe qui omnium maximè inopia sanguinis riget. Causa ad mores animæ eius referenda est: præ nimio nanque metu multiformis efficitur. Motus ei piger admodum, vt testudinis. pallefcit eum moritur,

defunctusque colorem eundem seruat. Subitæ cauernas, & laratæ more lacertarum. Caput eius, & guntur si quernis accendatur lignis, imbricatum, & tonitruum concursus facere. Democritus narrat. Item iecur in tegulis vltum. Dextro oculo, si viuienti eruat, albugines oculorum cum lacte caprino tolli. Lingua adalligata, pericula puerperij adimi. Linguam, si viuienti exempta sit, ad iudicium euentus polleere dicunt. Item dextram maxillam ad formidines, pauoreque corpore vero illito detrahi pilos: & felle glaucomata, & suffusiones corrigi. Zaiyag. Arabibus, Afchanchur, siue Scanchur: Italis, Sinco, & Scinco: Hispanis, Sinco.

Nomina.

# TERRENI VERMES. CAP. LXI.

TERRENI vermes impositi, præcis nervos glutinant: tertianas discutunt. Decocti cum anserino adipe, infusi, affectis auribus medentur: cum oleo autem decocti, si in contrariam aures instillentur, dentium doloribus præstant auxilium. Triti in potu ex passo vrinam ciunt.

TERRENI vermes etiam in medicū usum veniunt. quandoquidem oleo incoquantur ad articulos nervorumque cruciatos. Veruntamen aberrant plerumque myropilati in olei conficiendi ratione. Imponunt enim vermiculos in aneum cacabum, & affuso inde oleo igni ferue faciunt: quo fit, vt paruo momento igni non modo inassentur, sed penitus comburantur, nullo in oleo humore relicto. Fit autem rectius, cum vase vitreo excipiuntur, & diutius calore balneæ macerantur, oleo innatantes: nanteque hoc modo eorum succus ciliatur, comburique nequeunt. Præstat hoc oleū ita paratū, præsertim si vermes rosaceo macerentur, ad podagricosque dolores, & calidis deflexionibus proueniens, inunctis prius locis dolentibus oleo, ac mox superpositis: vermibus in eo elixis, tuis, admistisque cum æquali cerati pondere, quod triaphar macū vocant, ex argenti spuma, oleo, & aceto co flatū. Quibus etiam cōmendauit Plinius libro x x. cap. 1. ipsorum vermium cinerē cū mel le triduo empiatris more impositum. Quin & ipsos vermes in oleo veteri elixos, & superpositos. Ad hæc terrestres vermes prius vino albo eloti, ac per se absque oleo vase vitreo excepti, operculato vasis ore, ne quid expirare possit, in balneū calentis aquæ immerguntur, tandiq; effervescente permittuntur, donec in liquore oleo similem vertantur. Præferunt quidā hoc, quòd maximè præstat nervorum, & intestini: cum vulneribus glutinandis. Quod longè efficacius efficit, si facticio balsamo, de quo libro primo diximus, fuerit admistum: aut oleo, quod vitreis

Terreni  
vermes  
minimè  
eorum olei  
vires.



organis à larigna, siue abiegna lacryma elicitur. Nanque his additis vniuersa corporis recentia vulnera breui tempore glutinat, iis exceptis, quæ capiti inferuntur. Dantur vitiliter terreni vermiculi igne cremati, & in puluerem contriti felle suffusis, ex marrubij, vel absinthij decocto: addunturque in electuariis ad idem paratis, vt Galenus docuit libro de theriaca ad Pisonem. Triti, ac rosaceo subacti (vt idem author est) podagricorum inflammationes extinguunt.

*Nomina.*

*Aranea.* Græcis dicuntur: Latini, vermes terreni: Arabibus, Charatio: Italici, vermi terrestri, & Lombrichi: Germanis, Regen wurm: Hispanis, Lumbrices de tierra: Gallis, Vers de terre.

MVS ARANEVS. CAP. LXII.

MVS araneus dissectus, & impositus, sui morsus veneficia luit.



*Aranei muris consideratio.*

ARANEVS mus (vt Aëcius inquit) colore quidem mustelæ similis est, magnitudine autem muri. Os verò sublongum habet, & exiguum caudam. Dentes ei tenues, duplici ordine nati, in vtraque maxilla: quo fit, vt quatuor dentium ordines habeat. Quibus vtique noxæ abunde respondent ij, à quibus picturam, quam hic damus, mutuati sumus. Meminit muris aranei Nicander in suis theriacis, dixitque perire in rotarum orbita, si progrediens in eam incidere. Quod tamen fabulosum, poeticumque censens: tamen non desinit, qui terra è plaustrorum rotis excussa, huic se succurrant moribus. Scribit Plinius lib. viii. cap. l. viii. mures araneos vltra Apenninum non haberi, cum tamen hoc æuo in vniuersa reperiantur Italia. In Ananienibus montibus, Tridentino agro frequentes visuntur. Nihilominus incolæ inter venenata non habent: id quod fortassis & cæli, & solis temperamento euenit. Siquidem nec scorpiões ibidem exorti ictu venenum relinquunt, vt in eorū mentione superius diximus. *Mures Græcè, Mus araneus Latinè appellatur: Italice, Topo ragno: Germanicè, Ziff mauff: Hispanicè, Mur-ganho: Gallicè Musraignes, vel, Musets.*

*Nomina.*

MVRES. CAP. LXIII.

MVRES, qui in domibus oberrant,

toncisos scorpionum plagis vtilissimè imponi, in confesso est. Si inaffatos infantes ederint, oris saluam exiccare promittunt.



MVRES diuerforum sunt generum: siquidem domestici, syluestres, ac montani reperiuntur: sunt etiamnum aquatiles marini. Verum primùm de iis differentes, qui nostris in domibus oberrant, quique etiam in agris in magnam fegetum perniciem morantur, Aristotelis verba referam, qui libro vi. de historia animalium, cap. ultimo sic habet. Murium generatio mirabilis præter cætera animalia, maiorem in modum est, tum numero, tum celeritate. Iam enim femina prægnante in vase miliario aliquâdo occupata, paulo post reserato vase, musculi numero viginti & centum reperti sunt. Murium etiam percipimus ortum redundantis agrestis murium generis. Locis enim copuluribus agri, tam inaudito modo oriri solent, vt parum ex vniuerso frumenti relinquatur: tam cito absumitur, vt nonnulli mediocres agricolæ, cum pridie metendum statuerint, post die mane cum messoribus accedentes ad segetem, absumptam inueniant totam. Interitus autem minimè euenit ratione: paucis enim diebus omnino aboleantur: quanquam superiore tempore homines vincere, vel suffiendo, vel sues, vt latibula effoderent, admittendo, non possent. Quinetiam vulpes eos venantur, & cati syluestres in primis: sed tamen superare copiam, & celeritatem prouentus nequeunt. Nec aliud quicquam omnium vincit, nisi imbres: his enim quàm primùm intereunt. Terræ Persicæ parte quadam mure femina rescissa, fortis femini prægnantes comperiuntur. Sunt qui vehementer conspiciunt, Mures, si salem lambant, impleri sine coitu. Aegyptiis muribus prædurus, ferè vt crinaceis, pilus est. Habentur in murium genere & GILLES. Idcirco (vt Plinius auctor est libro x. xvi. capite primo) apud Romanos case foræ extabant leges, Gilles in coenis apponi verantes. Verum hoc æuo ganeonibus maximè expetuntur in cibis, non modicam palato iniuriam fieri putantes, si tam pingui priuatur alimento. Sed ij minimè perpendunt, vel potius negligunt, quod glires pinguedinis exube

*Murium consideratio.*

*Gillem consideratio.*

exuberantia ventriculi appetentiam destruant, lentum ac frigidum gignant succum, concoctūq; cōtumaces existant. Notatum nō congregari glires, nisi populares eiusdem sylvar, & si misceantur alienigenar, amne, vel monte disferet, interire dimicando. Genitores suos festos senecta alunt insigni pietate. Senium finitur hyberna quies. Conditi enim & hi cubāt, rursus æstate iuuenescunt. Montibus Goritiēsi agro contermini, & in Carniolæ, Carinthiæ, ac Stiria alpinis sylvis maxima est horū quandoque fœdera. Quo fit, ut numerosi à venatoribus capiantur, præsertim cūm sagina glande abundant sylvar. Exeunt venarum nocte, & arbores suffientes, in quibus stabulantur, sic eos suspensatos innumeros capiunt, ad eū vt iis repletis faccis domum plerunque redeant, quos postea excoriant, & impositos præ nimia copia cadis sale, & muria asseruant, quemadmodum pisces. Horum caro iis vtiliter estur, qui canina laborant fame: namque exuberante pinguedine obtunditur appetentia, & tollitur morbus. Discoquitur Gliris caro detracta pelle, & intestinalis exemplis melle in fictili nouo, addito nardo ad tertias, atque ita asseruntur, quod constet deplorata aurium vitia eo remedio sanari.

*Agricola error.*

Georgius Agricola, vir aliqui doctissimus, & acerrimus rei metallicæ indagator, quod fortasse veros glires non viderit neque cognouerit, non sine magno errore putat in libello, quē subterranis animalibus dicauit, Sciuros à villosa cauda, qua se operiunt & inumbrant, ita vocatos, Glires esse. Sed quod hæc duo animalia inter se maximè differant, omnibus notius esse arbitror, quā vt pluribus exponi debeat.

*Murium montanum compositum de alio.*

Porrò MONTANI mures cuniculos magnitudine æquant, ac etiam nonnunquam superant, cruribus non vsque adeo longis. Capite leporem referunt: verum tam breuius auribus sunt, vt vix supra pilos appareant. Pilo vestiuntur vario tassi modo, oblongo. Breuem habent

vulgò corrupto vocabulo Marmontane, quasi Mures montanos dixerint. Eriguntur lepius vsi modo, anterioribus pedibus veluti manibus, cibum ori ministrantes. Dentes anteriores quatuor habent leporis instar, sed longiores, atque acutiores, quibus seuisimè mordent. Sed mirum est (ego enim qui periculum feci, id certò testari possum) quod si acutis forcipibus secentur, vna tantum nocte renascuntur. Domi reuerti si iuuenes sint, exuta quadantenus feritate mitescunt, sed vtenilibus damnum inferunt quippe qui omnia, quibus obuāt, erodant, & destruant. Hyeme delirescunt, feno ac paleis, in acuum congestis plerunque se condentes. Dormiunt integris mensibus, quemadmodum & glires. In montibus viuunt. Stramenta in caernas comportant, quibus à frigore se tueantur. Exterrefacti acutissimè vociferantur, ac sibilant, & ad tumultus confugiunt. Horum carnes syluestri, & graui quodam odore adeo spirant, vt quibusdam nauseam moueant. Quo fit, vt sale, & muria asseruati tum odoris grauitate, tum etiam exuperantē humiditatem eo pinguedinis copiam exuant: cūm tamen tam recentes, quā sal conditi concoctū admodum cōtumaces existant, ventriculo laborem inferant, corpusque vniuersum exalcent. Horum pinguedo medicis expetitur, quod cōtractos molliat & restituat nervos. Sunt verò & alia quæ murium genera, nempe Ponticum, Lassicum, Noricum, Pannonicum, Indicum, à regionibus prouinciisq; cognominata. Ponticum pilo est niuei candoris, sed superiore caudæ parte saturatè nigricat: ex enim digiti longitudinem non excedit. corporis magnitudo illi vt sciuro, infectatur aues & mures. Hunc sane id esse censemus, quod Armellinum vocamus. Lassicus pilis vestitur in cinereo candidis, ventre tamen albicante: est Pontico paulò maior.

30

hunc Varium appellamus. Noricus corporis mole domesticam musellam æquat, pilis leporinis ferè similibus. breui constat cauda. caret auribus, non tamen foraminibus, quæ habet aurium instar. Pannonicus, cui color subuirdis, mustelæ speciem refert, verum magnitudine domesticos mures non superat. Postremò Indicus colorem habet ferè murium montanorum, albis tanè compluribus intercurrentibus pilis. capite est & ore in longum porrectis, quin

40

& auriculis breuiusculis: cauda ab ipsa clunibus crassiore in exilitatē ad inum proximè defluente: cruribus dodrantalibus. Corpore fœlem æquat, pedibus aliquantū breuioribus, ac pilo hispidiore, præsertim si aduerso tractu mulceas. Atque hæcenus de murium generibus. Cæterum murium stercus (vt in libro de theriaca ad Pisonem legitur) aceto subactum, capillis defluentibus vtiliter illinitur. Quinetiam per se porum, vesicæ lapidem comminuit. Mūs ita Græcis, Latinis verò Mures appellantur: Italici, Topi: Germanici, Mausi: Hispanici, Raxones: Gallici, Soriz.

*Murium alia genera.*

*Nomina.*

#### MVS MONTANVS.



caudam, & pedes acutis vnguibus armatos. Hyeme admodum pinguescunt: & obesi fiunt, ita vt aliquando monstruosè intumescant. Hi Ananienibus, Phœbeisque montibus, in Tridentino agro frequenter habentur, vocanturq;

L A C generatim omne boni succi est, corpus alit, aluum emollit: stomachum, & intestina <sup>†</sup> inflatione vexat. Verum tamen dilutius astiui habetur, & ē viridi pabulo aluum magis emollit. Probatum autem candidum, æquali crassitudine, quod vngui instillatum cogitur. Aluum minus tentat caprinum: quoniam pecus hoc adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, & terebintho magna ex parte vescitur: inde stomacho accommodatissimum reddi solet. Onilum autem dulce, crassum, & præpingue: non autem vsque adeo vtile stomacho. Bubulum tamen, asinum, & equinum, ventri magis idonea: sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora, scammoniam, veratrum, clematidem, aut mercurialem pascuntur, lac omne ventrem, & stomachum subuertit: quale in Iustinis montibus esse, à nobis proditum est. Siquidem capræ, quibus candidum veratrum pabulo fuerit, primo foliorum partu euomunt: & eorum lac haustum nauseam creat, & stomachum in vomitiones effundit. Ventrem adstringit lac omne decoctum, præcipueque candentibus calculis marinis exustum. Et in summa, omnibus auxiliatur internis exulcerationibus, præsertim faucium, pulmonis interaneorum, vesicæ, & renum: foris verò contra pruritus cutis, eruptiones papularum, & viriatis corporis succos, recens cum melle crudo, addito sale, datur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcumque semel feruesactum. Decoctum cum calculis marinis addimidiis, vlcerosas vètris fluxiones adiuuat. Lac quodcumque serum continet implicitum, quod vbi discescit à lacte, multò potentius ad purgationes redditur. Datur quibus sine acrimonia volumus deiectionem moliri, vt melancholicis, comitialibus, lepris, elephantiis, & erumpentibus toto corpore papulis. Ex o-

mni lacte fit, quod schiston, id est scissile, appellant. Lac autem scissili nouo feruet, ramoque siculneo recenti mouetur, insparfis, postquam bis, aut ter efferbuerit, totidem aceti mulsi cyathis, quot sunt heminae lactis: ita enim serefescens liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum concreuit. Sed cum feruet, ne superfundatur, conuenient spongia ex frigida continuo scissilis labrum detergere, sextariumque argentum frigidæ aquæ plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singulis, vsque ad quinas. ita vt intercedentibus spaciis, potantes ambulent. Lac autem recens efficax est contra rosiones, vstionesque, ab exitalibus medicamentis factas: vt à cantharidibus, aut salamandra, bupreste, aut pinorum eruca, hyoscyamo, dorycnio: aconito, aut ephemero: præsertim bubulum ad id eximie confert. gargariatur autem exulceratis faucibus, tonsillisque. Asinum peculiariter collutos dentes, gingiuasque stabilir. Fluxiones alui, si vlcera sentiantur, tenesmosque, ouilum, bubulum, aut caprinum, cum marinis lapillis decoctum, sistit. per se autem, & cum hordeacea pristana, aut halicaceo cremore infusum magnopere intestinorum rosiones mitigat: exulceratæ vuluæ immittitur. Humanum lac dulcissimum est, & maxime alit: mammas autem exustum, prodest tabi, & stomachi rosionibus: contra haustum leporem marinum præsidio est: oculis cruore ex ictu suffusis, cum thuris poline instillatur: podagricis vtile est, cum meconio, & cerato illitum. Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitialibus, vertiginosis, & nervorum vitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus: nisi si quis interdum purgationis gratia, vt ostendimus, schistum præbeat. Primiparæ canis lacte perunctos narrant glabrescere: potum contra venena antidoti vicem obtinet: abortus mortuos expellit.

CASEVS.

CAP. LXV.

CASEVS recens sine sale sumptus alit, stomacho utilis est, & facile in mēbra delegatur: carnem facit, aluum modicē emollit: alius tamen alio præstantior, pro natura lactis, à quo conficitur. Decoctus autem, & expressus, deinde inassatus, aluum sistit, illitus, oculorū inflammationibus, & sugillatis prodest. Qui verò recens salutus est, minus alimenti præbet. carnem aptè minuit, stomacho aduersatur, negotium ventri, intercanēisque exhibet. Vetustiore sistitur aluus. Sero, quod à caseo manauit, quā optimē canes aluntur. Quod hippacen vocant, caseus est equinus: ea virus redolet, magnopere alit, bubulōque proportionē respondet. Nec desunt, qui hippacen, equinum coagulum appellarint.

BUTYRUM, ET EIVS FVLIGO.

CAPVT LXVI.

E LACTE pinguisimo probatum fit butyrum, quale ouillum est. Fit & ex caprino, agitato in vasis lacte, donec pingue separetur. Butyrum natura oleosum est, & emolliens: vnde largius epotum, ventrem resoluit: prodest, vbi oleum non adfuerit, contra venena. Cum melle si infricetur, dentitiones adiuuat: gingiuarum pruritus, & oris vlcera infantibus emendat. Illitum foris capaciora alimentorum facit corpora, & ab albidis pustulis per summa scattentibus asserit. Contra inflammationes, & duricias vuluæ, quod nec virus respicit, nec vetustatem sentit butyrum efficax est: dysentericis, & coli exulcerationibus infunditur. In medicamentis addi solet, quæ pus mouent: vtile præsertim cum nerui, aut cerebri membrana, vesicæ ceruix, vulnera acceperit. Id autem purgat, replet, carnem creat: ab aspide percussis vtilissimè imponitur. Recens obsoniis additum olei vicem pensat, & adipis vice fungitur in bellariis. Colligenda ex eo fuliginis ra-

tio hæc est. Butyrum in lucernam novam ingestum accenditur, fistilique operculato, quod superne in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris: penna post deraditur ad vsus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exicare, & adstringere: fluxiones cohibet, & vlcera celeriter ad cicatricem perducit.

L A C.



L A C est benigni alimenti superfluum in foeminarum mamillis ex bina sanguinis coctione progenitum. Constat autem id tribus diuersis essentiis: nimirum caseosa, butyrofa, ac serosa, quæ abinuicem separatæ, variam consequuntur temperiem. Sed à lacte primum rem exorsus, de eo tantum facultates disseram, cuius hæc tempestate tam in cibis, quā in medicamentis est vsus. Tale autem est humanum, caprinum, ouillum, bubulum, bubalinum, & asininum. Et quanuis veteres vsi fuerint tum camelino, tum etiam equino, cum tamen in Italia, ac in aliis conterminis regionibus, quod sciam, eorum nullus sit vsus, hæc tanquam superuacanea omnino reicenda censeamus. Præcellit igitur humanum, quod temperatum sit in omnibus suis partibus. Hoc sequitur caprinum, etsi aliquantō siccius sit. His crassius est ouillum, minusque serosum. Bubulum deinde, bubalinum, præter id quod admodum sit crassum, cæteris longè pinguius habetur. Quamobrem libro x. simplicium medicamentorum dicebat Galenus. Miror autem quo pacto Dioscorides ex ouillo, & caprino butyrum confici referat. Ego namque ex bubulo feri noui, ac proinde nuncupatum esse butyrum existimo. hæc Galenus. Porro asinum sicut lac omne ferri exuberantia superat, sic cæteris pinguedine cedit. Probatur in vniuersum lac colore, odore, sapore, ac substantia. Ob id igitur præfertur quod colore perquam albo visitur, pellucidum, ac clarum

Lactis co-  
sideratio.Lactis pro-  
bat. o.

ac clarum, non viride, non luteum, non nigrum, nec aliquo liore suffusum: odore suavi, sycero, minimè graui, aut viroso: sapore quidem dulci, non amaro, acri, acido, aut salso: substantia media inter crassum, & tenue, ita vt eius gutta vngui infusilla non defluat, sed in sua sphaerula permaneat. Quod autem tale fuerit, omnium sanè præstantissimum erit, & in cibis optimum. Contrà pessimum præbet alimentum, ventriculum, ac totum corpus subuertit, quod contrarias notas habuerit, quòdque ex morbois animalibus emulsam fuerit, vel etiànum ab iis, quæ reprobatæ, venenosæq; plantas depascuntur. Quocirca memoriæ prodidit Galenus libro 11. de facult. alimentorum, quòd si capræ, aut alterius cuiuspiam animalis scammoniam, aut tithymalum depasti, lac cibi loco quis sumperit, omnino alius illi fluat. Optimum datur vtiliter ætate consistentibus, senibus non naturaliter frigidis, biliosis, & marafino affectis, & denique vbi ventriculi excrementis vacet. Nocet lac potum contrà febrientibus, capitis dolore affectis, ophthalmicis, resolutis, conuulsis, fluxione tentatis, calculo oppressis, pituitosis, adolescentibus, obstructis, & iis præsertim, qui lacte, & edulis lacte paratis, cœnas & prandia claudunt: tanquæ maior inde sequitur noxa, quantò crassius lac assumptum exierit. Eaque propter citato loco inquit Galenus. Lac, quod feri plurimum habet, etiam si semper eo vtare, nullum prois periculum adfert. Quod verò huiusmodi humiditatis exiguum habet, caseosæ autem crassitudinis multum, omnibus qui ipso frequentius vtuntur, est periculosum. Cæterum vt lac, quod bibendum est, prosit, hæc præterea adfuit oportet, & lac nimirum recenter sit mulsam: aliq. mellis, fachiari, aut salis admissum sit, ne in ventriculo concreseat: tantumque ex eo sumatur, quantum concoque re valeat ventriculus. A' cibis etiam omnibus, & vino, postquam assumptum fuerit, abstinendum est, quousque à ventriculo secesserit, minimeque exercitio vtendum est. At quoniam lac dentes inficit (etsi Dioscorides contrarium de asino scripserit) eo statim ebibito, vino, aut hydromelite eo abluere oportet. Quod autem nimis coagulo concreuit, quanquam verò, ac asino tempore, mensis frequentissime expetatur, tamen angustiam parit, ventriculum opprimit, caput vaporibus replet, agrè concoquitur, & crassum gignit succum. Quamobrem si quandoq; in cibum veniat, primum omnium ingeratur: siquidem vltimo loco sumptum (vt si. i. adsolet) aut statim putrescit, aut subsidentem cibum secum ad ima incoctum trahit. Lac omne, humanum præsertim, cerebrum auget, corpus impinguat, siccam & asperam tussim lenit, venetem roborat, vrinæ ardoribus subuenit, dissoluta corpora reficit, probi multique est alimentis, bonam facit alium, facile in sanguinem vertitur, carnem auget, pectus dilatat, & cæteris alimentis maius adfert nutrimentum.

*Lactis fa-  
culentia.*

*Lactis bi-  
bendi va-  
tio.*

*Lactis  
coagulatio  
vires.*

Quòd autem lac primiparæ canis perunctos glabrescere faciat, potum verò emortuos edu-  
cat fœtus, vt nonnullis proditum esse scribit  
Dioscorides, reprobat Galenus libro x. simpli-  
cium medicamentorum. Buryum præterea (vt  
loco citato scribit Galenus) facultatis est conco-  
quentis, paulum habens etiam digerendi po-  
tentia, in mediis nimirum corporibus secun-  
dum duritiæ, ac mollietis. Corporum etenim  
planè durorum tumores præter naturam hoc  
nequit medicamen digerere: at quæ in molli-  
bus sunt phlegmonæ, eas & concoquit, & dige-  
rit persacile. Nam parotides, & bubones, & oris  
phlegmonæ, aliæq; partes complures illo pro-  
fus solo curantur, nimirum in pueris, ac mulie-  
ribus. Sed & dentitium puerorum gingiuis  
illitur, nihilo imberillius melle gingiuis ex-  
tenuat, per quas exitus est dentibus: & alios o-  
mnines in ore affectus phlegmonosos, posteaquã  
fluxio resisterit, digerit pariter & concoquit.  
proinde cataplasmatibus inditur, quæ extrinsecus  
imponuntur parotidibus, hypochondriis, &  
bubonibus. Sed & in ventrem deuoratur, &  
ex eo distributum, magnificè confert expulsi-  
onibus ex pulmone, idque in pleuriticis, & peri-  
pneumoniacis affectibus, cum hoc, quòd eos  
etiam concoquat. Atque si solum lingatur, ma-  
gis quidem concoquit, verum minus educit  
plus verò si cum melle, & amaris amygdalis,  
sed minus concoquit. Fit ex bubuli præsertim  
lactis pinguedine id, quod vulgò Romæ, ac in  
vniuersa ferè Italia Capo di latte appellat, men-  
sis plurimum expetitum, quòd gustui, ac palato  
maximè arideat. Verum enimvero ob pingue-  
dinis copiam, præterquam quòd ventriculum  
relaxat, & cuncto supernatat cibo, nutrimen-  
tum elicit, anteaquam concoquatur, vapores in  
caput mittit, & crassum generat succum. Ca-  
seus autem fit ex crassiore cuiuslibet lactis sub-  
stantia, admissio coagulo, & expressio inde sero.  
Præsertim in cibis recens, quòd noxam ventri-  
culo non inferat, concoquanturq; facilius, quam  
qui diutius asseruatur. Nanque vetus, qui quòd  
linguam parumper vellicet, quam plurimis gra-  
tior redditur, omnium pessimum est: quippe qui  
cæteris magis adurat, sitim excitet, & difficiliter  
concoquatur. Quin & calculos in renibus gin-  
git, iecur obstruit, alium cohibet, & in cale-  
factis corporibus atram bilem gignit. Quo fit,  
vt plus damni ex eius succi prauitate, & feru-  
entel qualitate inferat, quam quòd humores  
crassos attenuando compensare possit. Fugien-  
dus igitur istiusmodi caseus est, cum neque ad  
concoctionem, neque ad mouendum vrinam,  
neque ad ciendam denique alium, quicquam  
boni conferat, quemadmodum neque ad succi  
probitatem. De hoc autem edisserens Galenus  
libro x. simplicium medicamentorum, sic in-  
quit. Itaque cum mihi olim caseus allatus esset  
bubulus, quem ex odore acrem esse conicie-  
bam, abiecti, & iam à fauulis assumptum puta-  
bam: verum illi talia seruare soliti, longo post  
tempore

*Butyri vi-  
res ex Ga-  
leno.*

*Caput le-  
dis.  
parat, his  
panis*

*Casei con-  
sideratio.  
& facul-  
tates.*

tempore ex promptuarioproferentes, quidnam de illo fieri iuberem, rogant. Cum igitur edendo non esset propter acrimoniam, ludicrum nobis problema exiit, proponenibus, cui rei quis illum vtiliter posset accommodare. Interea cum ad me arthriticus quispiam in curru conuectus esset, tophos, quos Græci *αἰσπες* nuncupant, in articulis habens, sibi mihi crure fuillo salso decocto casum ex decocto macerare, ac probe in mortario subigendo vnitum, tophis imponere. Et sanè arthriticus ab hoc medicamine magnè adiuutus est. nam rupta sponte sua cute absque incisione videlicet, emergebant quotidie citra dolorem tophorum patriculæ. Vbi autem totus, qui apud me erat casus, fuisset absumptus, talem sibi alium comparans arthriticus in posterum seruauit, & postea rursum vsus est inueterato: atque vbi tunc quoque idem percepit commodum, sepius deinceps vi perseuerabat, & quodam anticos similiter affectus docuit. Atque id quidem nos excogitauimus: ceterum comprobaui, ac confirmauit experientia. hactenus Galenus. Ex quo palam fit, eiusmodi casum esse omnino in cibis reprobandum. Qui vero nec recens, nec vetustus fuerit, cum & ipse non sit expertus læsionis, minore tamen constat noxa. Præstat ceteris ouillis. Verum sicuti Pergamenum casum Galenus in laudem suæ patriæ præ ceteris commendauit libro 11. de alimentorum facultatibus, ita nec mihi sine vitio vertendum existimauit, si Hetruricis ceteris Italicis præferam, cum præferam, qui in nostris Senensig agro, ac etiamnum Florentino ex ouillo lacte conficitur, qui vulgò appellatur Cascio marzolino, gustu dulcis atque suauis, quod lac, ex quo paratur, coagulo non sit concretum, sed cinaræ floribus, qui passim vniuersæ ferè Hetruriæ coaguli vicem præstant: quo fit, vt senescens nunquam acris euadat. Cui nec alter cedit, qui in nostro agro præstantissimus fit ex caprarum lacte, mense septembri, recens estur. Hunc vulgò Rauggiuolo appellamus. Desertur is Romam, quod à Præsulibus, aliisque primatibus summo prepeatur. Quippe qui odoratas redolere herbas, quibus vbiq; nostrates ferunt colles, tique præferam, qui non longe distant ab vrbe nostra. Bubulus præterea casus, etpius plus ceteris nutriat, pinguiorque existat, est tamen reliquis concoctu difficilior. Caprinus verò quanquam ex temperatiori lacte sit confectus, inueteratus tamen reliquis casis est deterior, cum statim excicetur, & friabilis fiat. Bubalinus denique in globos illos iuncea vinculis constrictus conformatur, qui nostris Mozze, Romanis autem priuare vulgari sermone dicuntur. Is casus, quo passim Hetrusci vescuntur, oriquidem gratissimus est, & dulcis, sed ægrè concoquitur, quod substantiam habeat admodum pinguem ac lentā. His accedit, que vulgò nobis Recorta dicitur. Fit hæc ex serosa lactis parte ad ignem deco-

cta. Recens (si Auicennæ, Rasi, & Isachi credimus) minus ventriculum vexat, quam casus omnis recenter pressus. Confert calidis deffusionibus obnoxius, sitim sedat, somnum conciliat: verumtamen obest ventriculo frigidum habentibus, & neruorum morbis. Inueterata autem ægrè concoquitur, sitim excitat, parum nutrit, alium cohibet, & flatu procreat. Reliquum est Serum, quod lactis aquosa est substantia. Hoc (vt Galenus inquit lib. x. simplicium medicamentorum) extergendis potentiam possidet, sumiturq; subducendi ventris gratia, ac per clysteres iniicitur, extergens, & abluens sine mordacitate intestinorum acrimoniam. Præterea si quis vlcera, quæ sine infestatione acris, vice aquæ sero collatur, optimè sanè fecerit. Præterea quæcunque medicamenta digerere solet ecchymomata, & atra, ea præstat sero, quam aqua diluere. Sic etiam eo vitumur ad fugillata, & hyposphagmata, peculiaribus ad hæc medicamentis commiscendis. Præstat Menses seru, quod ex nigrarum caprarum lacte elicitur, deinde quod ex ouillo, sic inquit. Aqua lactis macerationis materia est, & per se quidem innocuum medicamentum. Præfertur, quæ fit ex lacte nigrarum caprarum, in laudatis passis, vitætiatum, recenterq; sotatum. Excalcificat hæc, atque siccatur ordine primo completo, & vsque ad secundum. Quinetiam attenuat, abluat, abstergit, & nitrosa, qua resecta est facultate, alui absque aliqua mordacitate leniter subducit. Bilem tum sanam, tum atrā ab exustis humoribus genitam deicit: quo fit, vt misicè consecrat maniacs, & melancholicis. Præstat item ad viscerum infarctus, & morbis inde prouenientibus opitulatur: nimirum aqua inter cute laborantibus, felle suffusa, & lienosus. Datur vtiliter febricitantibus ex bile, & viscerum, ac vasorum obstructionibus. Competit etiamnum vitis in cute à bile, & perustis humoribus emergentibus. Quare lichenibus, vitiliginibus, alphis, psoriasis, leprisque admodò conuenit. hæc Menses.

Lactis autem facultates memorie prodidit Galenus loco nuper citato, vbi ita scribit. Lac vbi aliam quampiam excitantem facultatē habuerit adiunctam, optimum est remedium dysenteriae, & omnium ventris acrim fluxionū. Eam accipit à lapidibus, qui prædecocto ipsi iniiciuntur igniti. Porro eos esse oportet, quos vocant *καυκάας*. Et lac quoque decoqui debet, dum pleraque terosia in eo humoris abluimpta pars fuerit. At nos iniectis ferreis in ipsum cylindris candentibus eandem, aut etiam meliorem facultatem efficiamus. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorum quopiam est vtile: præterea ad hypopia, & hyposphagmata. Quinetiam palpebris extrinsecus, vbi qui ophthalmia laborant, somno sese dabant, impositum simul cū rosaceo, & ouo, phlegmonas eorū concoqueret. Sed hoc est lac mulieris recens ex mammillis expressum. Infundimus ipsum & vtero vicia

Seri Gires ex Gal.

Ex Menses

Lactis facultates ex Gal.

ulcerato tum per sese, tum iis medicamentis commiscentes, quibus misceri potest, utiq; citra morsum curantibus, & ubi in sede ulcera mitigamus præ saniei acrimonia dolentia, aut phlegmonas, aut rugas perpetiendi. Sic & ad ulcera pudendorum utimur, & omnia quæ leniri possunt, siue ob inflammationem, siue morsum, siue ob malignitatem. Eaq; propter & cancris applicatur ulceribus, medicamentis anodynis commixtum, qualia sunt, quæ ex pompholyge constat. Et quid attinet commemorare, quod ore cõtentum, collutum, gargarizatumq; vel maxime phlegmonas eius mitigat? Sed & tonsillas, & columellâ, & antiadas phlegmone affectas admodum mitigat, & proinde anginam.

Atque ut semel dicam, medicamentum est leniens, totam quidem substantiam habens mordacitatis expertem: sed multò magis, ubi concoctione moderata potissima pars serosi humoris absumpta est. Sic mihi videntur etiâ medici ad venena, quæ erosionem interunt, lac dari suadere, velut & lepus marinus interficat, & cãtharis. Sed & sunt, qui exhibent iis, qui aconitum, & thapsiam sumpserint. Sed hæc ex ratione fecerunt. Quod Græci γάλα, Latini Lac dicunt: Arabes, Leben: Itali, Latte: Germani, Milch: Hispani, Leche: Galli, Lait. Caseus verò ira Latinis, τυφός Græcis vocatur: Arabibus, Lubon, seu Giebb: Italis, Caseio: Germanis, Kesen: Hispanis, Queso: Gallis, Fromage. At Serum Latine dictum, Græcè σήρην γάλακτος appellatur. Italicè, Siero: Germanicè, Molken: Hispanicè, Suero de leche: Gallicè, Ser du lait. Quod deniq; Græci στέρην, Latini similiter Butyrû nominât: Arabes, Zebd: Itali, Butro: Germani, Butter-, & Anchen: Hispani, Manteca: Galli, Beurre.

† Illud hoc loco non prætereundum duxi, quod in Græco codice manu scripto non *γυναικί*, hoc est inflatione pariens, sed *γυναικί*, id est, naturale legatur. quod lac potius stomachum iuuat, quam inflatione vexet: id enim innuit verbum naturale. Hanc lectionem secutus fuisse videtur Serapio, quippe qui ex Dioscoride ita transcribat. Et lac confert stomacho. Quin & facilis potest esse libranorû lapsus ob vocum similitudinem.



LANÆ, ET OESYPVVS.  
CAP. LXVII.

SUCCIDAE lanæ molles è collo, feminibusque laudatissimæ habentur. Subueniunt inter initia vulneribus, percussis, desquamatis, liuidis, ossibus fractis, aceto, oleo, aut vino imbutæ: siquidem facili succos combibunt, quibus immerguntur, & ob pecudum sordem (sic enim oesypum vocant) emolliunt. capitis, stomachi, aliarumque partium doloribus, cum aceto, & rosaceo efficaciter imponuntur. Crematarum lanarum cinis crustas obducit, excrecentias in carne cohibet, & ulcera ad cicatricem perducit. Mundæ autem, & carptæ, in fictili crudo, cæterorum more, vruntur. Nec secus fimbriati marinarû purpurarum flocculi cremari solent. Aliqui cum sordibus lanas carpunt, & melle irrigat, eodémque modo vrunt. Alij in fictili oris patuli, veruecula inter se distantia componunt, & conceptas carminatæque lanas, oleo ita suffusas, vt ne stillare quidem possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem, lanisq; permutatim interstratis, leuiter succendunt, & vltas tollunt. Quod si è teda pix, pinguitudine vlla profluit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. cinerè in labellis, aqua addita, manibus confricant, & confidere patiuntur: idque sæpius, mutâtes aquam, donec linguam adstringat, nec mordeat. Oesypum vocant Græci, succidarum lanarum pinguitudinem: cuius paradi ratio hæc est. Succidæ molles, radiculâ non curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunque sordibus expressis, & in labellum oris amplius coniectis, aqua infunditur, magnòque impetu ligula, vt respumer, agitur, aut lignea rude validiusculè conturbatur, quo largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur: & confidente pingui, quod supernatat, collectoque in altero fictili vase, denuo aqua in labellum fusa agitur: spuma iterum mari perfunditur, & de

& demum eximitur. hoc tantisper fieri solet, dum cōsumpta pinguitudine, nihil prorsus spumæ extet. Collectum cœsypum manibus emollitur, & si qua insedit spurcicia, confestim demitur: exclusiſque sensim omni aqua, recentique affusa, manibus miscetur, donec admodum linguæ cœsypum adstringat <sup>10</sup> leuiter, nec mordeat, atq; pingue, candidumque spectetur: tum in fictili vase conditur. verum omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatur pingue frigida aqua eluunt, & manibus, non secus atque ceratum mulieres, confricant: ita enim candidius redditur. Alij elotis lanis, & sordibus quibuscunque <sup>20</sup> exemptis, ac lento igni in æneo vase ex aqua decoctis, pingue, quod supernat, collectum aqua, vt diximus, lauant: collatumque in fictilem patellam, quæ calidam aquam contineat, linco operiunt, atque soli mandant, donec candidū fiat, & satis crassum. Alij bidui <sup>30</sup> spatio aquam effundunt, nouamque adiciunt. Melius est læue, radícula non curatum, quod succidarum virus oleat & si manu in concha fricetur cum aqua frigida, albefcat, nihil in se duri, aut creti habens, veluti quod cerato, aut adipe adulteratur. Oesypum excalfacit, explet vlcera, & emollit, præsertim <sup>40</sup> sedis, ac vuluæ, cum meliloto, & butyro. In vellere appositum menses, & par tus euocat: vlcera non aurium modò sanat, sed & genitalium cum anserino adipe: cōtra crosos angulos oculorum, scabiososque, genus quæ occalluerunt, & ciliorum defluuia, efficax est. In testa <sup>50</sup> noua torretur, donec redactum in cinerem pinguitudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligitur, vti demonstrauimus: quæ in oculorum medicamenta commodè addi solet.

Cum Lanz succidæ, & earum sordida pinguitudo, quam Græci Oesypum appellant, & officinarum vulgus Ispum humidum vocat, plenissimè à Dioscoride descripta sint, nihil nobis hic relictum est, quod declarandum, vel addiciendum esse putemus. Cæterum *ispum* quod

Græcis, Lana Latinis dicitur, pariter & Italis Arabibus, Sauf, aut Suf: Germanis, Schmutz: ignolet: Hispanis, Lana: Gallis, Laine. Quod verò Græcè *ispum*, Latini item Oesypus nominatur: Arabice, Senferatab, sive Iufaratab: Italice, Espo: Hispanicè, Ispillo humido, Gallicè, Gresse de la laine sorge.

## COAGVLVM. CAP. LXVIII.

LEPORIS coagulum tribus obolis ex vino, venenatorum morſibus, cœliacis, dysentericis, & fœminis fluxione vuluæ laborantibus, ac reiectionibus à pectore, auxiliatur. sanguinem in grumos concretum discutit. Post mēstruas <sup>10</sup> purgationes appositum vuluæ cum butyro, præstat mulieribus, vt concipiāt: potum verò partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulum, quam hippacen aliqui vocant, priuatim cœliacis, dysentericisque conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capræ laticornis, & dorci, apri, cerui, vituli, bubæ <sup>20</sup> lique coagula, similes naturas fortiuntur: contra aconiti potum in vino, & concretum lac in aceto conuenienter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei vires repræsentat: comitialibus, strangulatis vuluis, potu conferre existimatur. <sup>30</sup> Sed si sit vituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, qua paulisper cum alterius animantis, tum præcipuè agni coagulum, maduerit: nam si erit syncerum, statim liqueſcit in aquam: sin minus, consimile permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum <sup>40</sup> natare possunt. In summa, coaguli omne dissipata cogit, & coacta dissoluit. <sup>50</sup>

ANIMALIUM coagulum (vt Aristoteles memoriz prodidit libro III. capite xxi. de historia animalium) lactis substantia est: quippe quod in eorum ventriculo, quæ adhuc lactent, continetur. Est ergo coagulum lac ignem habens intra sese, quod cum animalis tepore concoqueretur, casum traxerit. Habent coagulum omnia ruminantia, & inter denotata verimque lepus. Quò vetustius coagulum est, eò præstantius: tale enim profuſio alui mederi præcipuè

Coagula  
considera-  
nt.



præcipue potest: atque etiam quod leporis est. Sed laudatissimum hinnuli: hæc Aristoteles. Quod autem leporinum coagulum sanguinem reicientibus conveniat, ut Dioscorides scribit, minimè quidem probare videtur. Galenus libro x. simplicium medicamentorum vbi sic inquit. Coagulum omne acris, ac digerentis potentie est, ac nimirum etiam exicatoria: nam necessariò id superiora comitur. Ac leporis quidem coagulum comitiali morbum, si cum aceto ebibatur, præterea profuvium muliebre sanare proditum est: sed & lac in ventre coagulatum dissolvere: quod certè & nos experti sumus, non solum in leporino, sed etiam in aliorum animalium coagulo. Attamen leporinum omnium est præstantissimum. Sed & sanguinem in ventre concretum simili modo epotum dissolvit, ac efficacius fortasse cæteris leporinum: verum non solum, quod quibusdam scriptum legitur, sed & hoc commune est omni coagulo. Quidam autem sanguinis ex thorace reiectiones leporinum coagulum epotum suppressere prodiderunt. cæterum nec alium quenquam eo usum novi, nec ipse sum ausus. acri vi remedio ad affectum adstrictionem poscentem. Porro coagulum equinum ad dysentericos, & coliacos accommodari scripserunt nonnulli. At phocæ coagulum eximie aptum esse quidam prædicant, tanquam vires obtineat castorij. Verum quæcunque proditum est, quodque coagulum secundum essentia totius præstare proprietatem, non est nunc tempus exponere. Eius nomen Græcum *πρωτα*: Latnum, Coagulum: Arabicum, Ansea, Anshæ, seu Anshæ: Italicum, Caglio: Germanicum, Lypp, Kynn lypp, & Kæss lypp: Hispanicum, Coalho: Gallicum, Presure.

*Nomin.*

ADEPS.

CAP. LIX.

ADEPS anserinus, aut gallinæ recens, & sine sale conditus, ad vulvæ vitia proficit. Sale inueteratus, & qui temporis spatio acrimonia in concepit, vulvæ inimicus est. Recens exemptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere capacior sit, quantus sit modus adipis, quem curare institueris, obstructo diligenter vase, flagrantissimo soli exponitur: eliquescent inde humor in fictile alterum excolatur, donec adeps omnis absumatur: mox loco vehementer frigido reconditur, & ad usum digeritur. Alij fictile fulciunt super aquam calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ solis vicem penitet. Est & alia curandi

ratio. Exemptis membranis teritur, coniectusque in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momento: mox lineo colo transfusus reponitur. Vtiliter in medicamenta additur, quæ lassitudines, & fatigationes leuant. Suillus adeps, & vrsinus hoc curantur modo. Recens, præpinguis, renibus potissimum detractus, in largiore aqua celesti, & quàm frigidissima, exemptisque tunicis, diligentissimè manibus confricatur, & exprimendo ferme siccatur, subindeque noua aqua abluitur: cæterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam demergitur, & subditis leuibis prunis spatha mouetur: eliquatusque, colo transfunditur in aquam. Vbi verò refrigit, & guttatim aquam omnem excludit, in prælotum fictile demittitur, & infusa aqua leniter eliquari debet, & manu deprimi, quò facilis facultentum virus pessum eat: postea in pilam spongia madefactam transfunditur. Vbi coire cepit, residens in imo fordes eximitur. Tertiò citra aquam eliquatur, repurgatusque, fictili bene operculato, perquam frigidis locis reponitur. Hircinum seuum, ouillum, ceruinumque ita curato. Elotum ex his quodcunque tunicis (vt in suilli mentione dictum est) exemptis, pilæ emolliendū tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua: donec ne amplius quidem cruentum virus excernatur, aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. Deinde in ollam fictilem coniecto, & adiecta aqua, vt superemineat, leui pruna liquefacito, & moueto, atque in aquam colato: cumque refrixerit, iterum in loto fictili eliquato, & quæ antè diximus, facito. Tertiò sine aqua liquefactum, in persufam liquore pilam colato, refrigeratumque, vt in suilliratio ne diximus, recondito. Bubulum autem seuum, renibus maximè detractus, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluendum est: mox in pilam tundendum diligenter, affusa maris aqua. Cum verò dissolutum fuerit, in fictilem

ficilem ollam coniciendum, & marina aqua, quæ non minus dodrante supereminet, proluendū, decoquendū, donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticas minas, quaternis Tyrrhenicæ ceræ drachmis: excolatumq; detractis quæ pessum ierant foribus, in nouo fictili reponendū, operatumq; soli interdū credendū, vt ad cādorem reducatur, & odoris virus euanescat. Priuatim taurorum pingue sic curari debet. Renibus euulsum pingue profluente amnis aqua abluito, detractisq; tunicis, fictili nouo, postquā exiguum salē insperferis, liquefacito: dein in nitentem aquā excolato: & vbi crescere cœpit, manibus iterum conficando vehementer lauato, aqua sæpius infusa, refusaq; donec quā optimè elotum videatur. Rursus in olla cū pari modo vini odorati decoquito, & cū modo iterū efferbuerit, dempto ab igni vase, ibidem finito pernoctare: postridie si grauiter adhuc oleat, noua olla repetitum, vino odorato perfundatur. eadem quæ prius, fiant, dum omne virus euanescat. Colliquatur & sine sale, præsertim affectionum earum causa, quibus sal aduersari solet: sed ita paratum non magnopere albescit. Eodem modo pardorū, ac leonū pinguis curari oportet. Taurinum autem, & vitulinum pingue, necnon ceruinū, atque etiam huius animalis medulla, odorem imbuatur, hac ratione. Pingue, quod odoratum reddi debet, demptis, quo diximus modo, mēbranis, elotū, & vino quā odoratissimo, nulla maris aqua diluto, seruescētū, pernoctare sinitur: alterū id genus vinum eadem mensura infunditur, colliquatur, & exquisitè colatur: nouemq; eius heminis, iunci Arabici septem drachmæ adiiciuntur. Quod si ipsum odoris fragrantioris fieri voles, quadraginta floris eiusdē drachmæ, cū paribus palmæ, calami, & cassiæ modis adduntur: & xylobalsami, aspalathi singulæ drachmæ: cinnamomi, cardamomi, & nardi, sin-

gulæ vnciæ. omnia exactius tunduntur, & affuso vino odorato, in vase operto, quod supra carbonēs firmiter collocatum sit, ter efferuescunt, & semoto ab igni vase inibi pernoctant: postridie vinū effunditur, aliudq; generis eiusdē adiicitur. Ter simili modo bene cōferuescat: deinde matutinis exēpto adipe vinū effundatur, & abluto vase, si quid imo subfidēs hæsīt, detergatur. postremò eliquatū pingue, & excolatum, ad vsus reconditur. Hoc autē modo odoramētis imbuatur, quod antea curatū est. Verū antē dicta prius inspissari solent, quò facilius sibi odoramētōrū vires adsciscant. Itaq; assumēs quodcūq; horū voles, cum vino seruescāto, impositis vnā myrti ramulis, serpyllo, cypero, itē aspalatho plenius tuso. Aliqui tamē ad hunc vsū, vno duntaxat horū cōtenti sunt. Cū autē ter efferbuit, exemptū leniter, & linteo colatū aromatis, vt expositum est, imbuatur. Adipibus spissamēta sic fiunt (quēcūq; acceperis, oportet, vt recēs tundatur.) Syncerus, & sanguinis expertis adeps, reliquas habens notas, quas sæpe retulimus, in ollam nouā demittitur, infuso vino albo, vetere, odorato, quod semipedis altitudine superet: lēto igni seruescat, dū vernaculus odor aboleatur, planeq; vinū redoleat. At vbi depositō vase refrigit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo vini eiusdē sextarij, & feminis loti, eius inquam, cuius ē ligno ludicræ tibiz facitūtur, tusi minæ quatuor adiciuntur: lento igni subinde miscēdo decoquuntur: cūmq; odoris virus evanuerit, excolatusq; adeps refrixerit, vna cōrussi aspalathi mina, cū amaracini floris minis quatuor, & vetere vino subigitur. Nocte vna hac odorē rapiūt, cōbibuntve: postridie in fictilē ollā tricongialē ea omnia cū adipe iniecta, additis sextariis tribus vini, vna seruescūt, quousq; & vim, & odorē spissamentorū adeps ipse contraxerit: qui eliquescēs colatur, & reponitur. Quod si maiore odoris fragrantia efflagites,

drachmas octo quā pinguisimā myr-  
tha vino macerata, quod multos in  
annos asseruatū est, misceto. Gallina-  
ceus, anserinusq; sic odoribus imbui  
solēt. Cuiusvis eorū percurati sextarij  
duo fictili olla excipiuntur: erysiceptri,  
xylobalsami, palmæ elata, & calami pla-  
nē cōtusi, singulorū sesquincia admisce-  
tur: vini Lesbij veteris cyathus vnus  
adiicitur: ea ter effruefcūt prunis, mox  
vase sublato ab igne, die, noctuq; refri-  
geratur: postmodū liquata per linteum  
crassum mundū in vas excolantur. vbi  
verō adeps coierit, cōcha excipitur, fi-  
ctiliq; nouo densius operto perfrigidis  
locis reponitur. Hyberno tempore id  
instituitur oportet: astate siquidē pin-  
guia nō cogūtur. Nec desunt, qui Tyr-  
rhenicæ ceræ momentū adiciant, quod  
facilius in vnū corpus omnia coalescāt.  
Eadē ratione suillus adeps, & vrsinus,  
cateriq; id genus, odoramentis imbu-  
untur. Verū sampsuchi odorē adeps  
ipse repræsentabit hoc modo. Curati  
quā optimē adipis, præferim tauri-  
ni, mina vna, tēpestiuiq; sampsuchi ex-  
quisite cōfracti sesquimina miscentur,  
& inperfo largiore vino digerūt in  
offas, quæ in vase cooperto nocte quie-  
scunt. Matutinis in fictili olla leuiuscu-  
lo igni, affusa aqua leuiter coquūtur:  
dumq; suū adeps odorē exuerit, defæ-  
catus, ac bene opertus, nocte tota per-  
manet. postero die deterfa sorde, quæ  
pelsū ierat, sampsuchi, vt dictū est, cō-  
tusi iterum sesquimina priori pastillo  
adiicitur, eodēmq; modo in offas cogi-  
tur: aliis quæ diximus peractis, deco-  
quitur, & colatur, & si qua fundo hæsit  
spurcitia, deraditur, & frigido loco re-  
cōditur. Si quis tamen incuratū adipē  
anserinū, gallinacēū, aut vitulinū a pu-  
treddine tueri velit, ita faciendum est.

Quemuis adipē diligētē elotū, & sic-  
catū in vmbra super cribrū, per linteā  
mūda manibus vehemētē exprimat,  
linoq; consutū vmbroso in loco suspē-  
dat, & post multos dies noua charta  
inuolutum, frigido loco recondat. Pin-

guia autem indito melle vindicantur a  
putredinis vitio. Vis omniū est excal-  
facere, mollire, rarefacere. Taurinus  
adeps, bubulus, & vitulinus aliquantū  
adstringunt. Earundē virum compos-  
leonicus: nam resistere eum aiunt iis,  
qui insidias moluntur. Ceruino, ele-  
phantinōque perunctos, serpentes fu-  
giunt. Adstringentior est caprinus: quæ  
ex causa decoctus cū polenta, rhoë, &  
caseo dysentericis datur, & cū ptisanæ  
succo infunditur. Ius decocti phthi-  
sici in forbitionibus, pdest, datur quoq;  
vtiliter iis, qui cātharidū venena hau-  
serunt. Hircinus, vt qui validissimē di-  
scutiat, podagricis auxiliatur, cū simo  
capræ, & croco impositus. huic pro-  
portione respōdet ouillus. Suillus ve-  
rō contra vuluæ, & sedis vitia idoneus  
est: ambustis igni medetur. E sue vetu-  
rissimus quūq; sale conditus excalfacit,  
& emollit: elotus vino pleuriticis  
prodest: cinere, aut calce exceptus, in-  
flammationibus, fistulis, ac tumoribus  
succurrit. Asininū tradit cicatrices cor-  
pori concolores reddere. Anserinus,  
gallinaceusq; cōueniunt muliebribus  
malis, & ad laboriū rimas, ad mango-  
nizandā faciem, & contra auriū dolo-  
res. Vrsinū constat raptos vitia alopec-  
iæ capillos restituere, pñionibus sub-  
uenire. Vulpinus medetur auriū dolo-  
ribus. Fluuiatiliū pisciū pinguiā per-  
unctis oculis claritatem afferunt, si in  
sole liquecant, & melli admiscantur.  
Viperæ adeps contra oculorum hebe-  
tudines, suffusionesq; efficax est, addi-  
ta cedria, melle Attico, & pari oleo ve-  
tere: pilos alis euulsos perunctis radi-  
cibus recens, & per se illitus obliterat,  
atque renasci non patitur.

TAM ET SI de adipibus, feuis, & pingui-  
bus, quæ in medicū vsum veniunt, copiosæ,  
& abundanter locutus sit Dioscorides: vipore qui  
non eorum modō facultates, & vires tradide-  
rit, sed etiam rationem docuerit, quæ illa cu-  
rentur, spissā & odorata reddantur, & a putre-  
dine vindicentur, tamen cum de eorum na-  
tura, & facultate accuratius (meo quidē iudi-  
cio) copiosius etiam, & particularius disserue-  
rit Galenus, nec vanum, nec à nostro instituto  
alienum

Pinguedi-  
dum vi-  
res ex Ga.

alienum duximus, hic ea omnia referre, quæ ab ipso memoria prodita sunt libro x i. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Pinguedo, & adeps & hæc quoque communissima sunt inter animalium partes. Nam omnia, quæ bene nutriuntur, aut pinguedinem, aut adipem obtinent. Quæ verò macilentia sunt, malèque nutriuntur, sæpe omnino ne habere quidem apparent, sæpe verò adeò pauculum, idè; siccum, vt ægrè vi possis. Porro differt à pinguedine adeps crassitie: ac propterea animalibus totam naturam terrosiorem habentibus adeps provenit, velut humidioribus pinguedo. Proinde pinguedo celeriter ab igne liquefit, nec fac ille, ubi liquata fuerit, rursus concreverit, cogiturve. At adeps nec facillè funditur, liquefitve, & fusus celeriter coit, ac conglaciatur, multoque apparet pinguedine durior. Sus enim bene nutritus, passivè multam habet pinguedinem, ob naturalem temperamenti humiditatem. Ad boues, & capræ, & quæcunque id genus cor nigeræ, ob siccitatem adipem plurimum generant. At tu si volēs, oleosam, & pinguem in animalibus substantiam omnem adipem appellato, vt plerique medici. Sed & pinguedinem appellare totum hoc genus tibi licet. Non tamen licet tibi citra mendacium adipem caprinum humidiorē esse dicere, quam suum. Nam hic omnium ferme aliorum est humidissimus, ac proinde actione sua vicinā oleo vim possidens, quamquam oleo magis tum emolliat tum concoquat: ac proinde cataplasmatibus, quæ ad phlegmonas accommodantur, commiseri solet. Qui verò mordicationes perpetuuntur aut in recto intestino, aut in colo, iis potius caprinum adipem, quam suillum iniciamus: non quod acrimonia plus obundet (nam ex natura sua suillus obundat magis, ac proinde miscetur medicamentis vlcera curantibus, cuiusmodi est, quod vocant parygrem) sed quod caprinus ob crassitiem citius concresecat, suillus autem instar olei defluat: proinde ipsum potius dysentericis, & tinea morosis iniciamus, quando morsum eorum mitigare consilium est. Porro ob teruitatem partium nonnulla acrimonia magis retundunt, ubi nimirum in alto mordicatorum corporum, quod molestum est, hæserit. Nam quod crassum est partium, minus, magis autem quod subtilius partium est, tota corpora penetrat, & omnibus ipsum saniebus mordicantibus permiscetur. Hac ratione adeps asperius, quæ in alto corporum mordant, magis obundat: sed & suillo calidior est. Horum tamen in medio est gallinaceo rum adeps, ac gallinarum. Porro calidior semper, ac siccior est masculinum animalium, & horum ipsorum exectorum minus tum calidus, tum siccus. Quippe mas castratus eiusdem semper generis feminæ assimilatur. Hoc autem sermonis caput commune est, cuius meminisse

oportet: Pro animalium tēperatura semper existere differentias eius, quæ in illis est, pinguedinis, aut adipis, aut quocunque modo appellare li-  
bebit totū hoc genus corporis in animalibus oleosi, & pinguis. Igitur cū sus omnibus propè quadrupedibus animalibus in caliditate, ac siccitate inferior sit, proinde pinguedinē quoque minus habet calidam, magisque humidam. Omnis igitur pinguedinis facultas est humectatoria, & exaltatoria humanorū corporū. Huius enim meminisse perpetuū oportet in principiis huius operis dicti. At differentia, quæ sunt cuiusque singulati, in maioris, minorisque ratione sunt. Nam pinguedo suis, vt ad nos quidem, largius humectare potest, sed non æquè exaltare, vt oleum: verum pinguedinis suum talis est caliditas, qualis spectatur in nobis. Porro taurorum adeps suillo multo calidior est, & siccior. Rursus id & hic memoria reperentibus nobis, marem fœmina esse tum calidiorē, tum sicciorē: marem autem castratum affimilari fœminæ, velut quicquid iuuenilis est ætatis. Et inter iuuenilia fœmina mare humidior est, minus calida. Sic & adeps vitulinus, taurino minus tum calidus est, tum siccus: & hædorum, quam caprarum: sed & caprarum minus, quam hircorum. Et rursus taurorum minus, quam leonum: nam horum adeps omnium propè quadrupedum adipe potentius digerit. nam & ipsorum calidissimus est, & maximè tenuium partium. Itaque si ipsum medicamentis ad vlcera, & phlegmonas conuenientibus commisceas, non modò nihil adiuueris, verum etiam læseris, nimirum addita maiori, quā cōueniat acrimonia. Inueteratis tamē tumoribus atque scirrhi in morē induratis, tumi tumorum curaturis (ἀρκυαί Græci vocant) & in summa quæcunque scirrhosa sunt, iis aptissimus est, in quibus sanè inefficacissimus apparet suillus. Taurinus autem ab vtroque ex æquo distat, vt quantò calidior, sicciorque suillo est, tanto superetur à leonino. Itaque tanquam in medio confensus, meritò vtrique medicamentorum miscetur generi, & iis scilicet, quæ scirrhosis medentur, & iis, quæ phlegmonas concoquunt, cuiusmodi est tetrapharmacū quod vocant, ex cera, resina, pice, & adipe constans. Nam siue in hoc taurinum, siue vitulinū, siue hircinum, siue caprinum, siue suillum indideris, semper puri mouendo aptum, & concoctorum medicamen effeceris. Sed suillus si addatur, in pueris, & fœminis, & vt breuiter dicam, omnibus, quibus caro est mollior, compe-  
tuit. Sin taurinum adideris, fossoribus, & messoribus, & omnibus carnem duram habentibus, siue ob naturālē temperiem, siue ex ratione ac forma vitæ, conueniens effeceris. Ceterum adeps omnis dum inueterasset, se ipso & calidior, & tenuior efficitur, & proinde quoque magis diffusior. Verum id omnibus ferè inueterascentibus accidit, quæ quidē putresce-

re non anticipent. Nam vinum, mel, acetum, frumentum, butyrum, lana succida, oleum omne, siue lentiscinum, siue cicinum, siue raphaninum, siue ipsum quod ex olivis conficitur, vetustate & calidiora, & tenuioris essentiae efficiuntur: ac proinde gustantibus apparent aciora, & ad induratos, ægræque solubiles affectus omnes adhibentibus potentius digerentia. Atque ego sanè gustantibus aciora videri dixi. At quidam, quibus studium est nomen significatus corrumpere, non acria, sed adstringentia vocant id genus omnia, adusque piper: tanquam inter sit nihil, adstringens, an acre dixeris. Et si denuo illos roges de galla, myrtis, melspilis, mali punici putaminibus, quæ fida vocant, rhoë, & omphacio, & hæc dicunt adstringere: tamen si aduersissimum ex illis sensum percipiamus ei, qui in nobis sit à pipere, pyrethro, napy, euphorbio, cepa, alio, & adacre. Igitur si quemadmodum attractionis vocabulum de vitroque affectu, quem gustu percipimus, communiter efferunt, si ipsos quoque affectus vnam habere naturam existimant, quidvis aliud potius habendi sunt, quam homines, ut qui soli proprios sensus obtineant. At si omphacia, rhoë, gallam, balauistum, hypocistida contrahere, confringereque nostram fateantur substantiam: secernere verò, mordicare, ac penetrare, piper, napy, pyrethrum improprie adstringentia nuncupant, quæ mordicant, & excalescunt: cæterum in cognoscendis ipsis medicamentis non peccant. Verum si oportet consuetudinem dicere, an in vocabulis, aut in rebus hallucinentur, quidem in vocabulis potius falsos viros illos dixerim, & maximè quibus Græca lingua infusa est, qualis est Dioscorides Anazarbenus, qui profectò multa bene dixit eorum, quæ de materia medica memorie prodidit, cæterum significata Græcanicarum vocum non satis permouit. Hic ergo cum ait magis esse adstringentium adipem caprinum suillo: si quidem actiorem significare velit, per magis adstringentium, accipimus sermonem eum verum. At si illud, talem habentem qualitatem, & facultatem, qualem rhus, rheon, hypocistis, balauistum, haud verum esse sermonem dicemus. Porro quoniam viperarum adipem, ubi radicitus pilos sub alis euulseris, prohibere illos recrescere, illiurum referunt, visum est mihi eius facere periculum esse satius: ac ubi prout iubent, recidem, menthos comperi, sicut etiam quod initia suffusionum sanat. Verum visorum adipem alopecias curare verè scripturum: cum tamen probatoriæ habeamus ad eum affectum remedia. Porro cum dicant tamen vulpinum adipem dolores aurium sanare, absque vt explicit, quos aurium dolores dicant, cum non noscentibus ipsis distinguere, quæ dicunt, attendendum non est. Alij piscium adipem laudant, tanquam ad suffusiones, aut quemcumque alium affectum nominare velint, congruat. Alij non simpliciter piscium, sed addunt flu-

uiatium: alij verò potius marinorum, quod videlicet aliquid plus scire videantur, quam vulgus. hæc Galenus. Cæterum de Tassi pinguedine, quæ (vt experimento manifestò constat) contractos nervos, & articulorum duritias emolliat, & discutiit, nihil posteritatis memorie prodiderunt Dioscorides, Galenus, & Paulus. Nec præterea Galenus pinguedinis curandæ, ac parandæ rationem vllam, quod sciam, tradidit: nec quibus odoramentis veteres pinguedinem imbuerent, & in vnguenti morem conficerent. quemadmodum hæc nostra ætate vnguentarij illam parant, quam vulgò POMATA vocamus. Ea autem hoc modo paratur. Sumunt ceruini adipis, aut hædi binas libras: suilli verò recentis vncias sex: deinde exemptis membranis, vino albo lauant, exprimuntque tandiu, donec vinum omne exeat. Post hæc elorum pinguedinem in scitile nouum, vitro, vel plumbo oblitum conficiunt, additis nardi Indici granis tribus, caryophyllorum semenciis, nucis myristicæ dachm's duabus, malis appian's, vel syluestribus semicentis fenis, vel septenis. Hæc omnia in sufficienti aquæ rosacæ quantitate macerant die vna. deinde lento igne tandiu decoquant vas operculo contegentes, & rudicula sæpius miscentes, quousque vniuersa ferè aqua euascescat. Percolant deinde linteolo spissiori subdito vase mundo, aqua rosarum madente, dimittuntque concrelescere. Quo facto in scitile nouum iterum conficiunt, adiectis olei amygdalini dulcis vncias sex, ceræ albæ vncias quatuor, & ad ignem colligant, ac postmodum linteolo percolant in nitidissimum catinum aqua rosarum affusa: sinuntque concrelescere. Demum eadem aqua moschum experta, aut aliis refragantibus aquis, tandiu lauant rude miscentes, donec vnguentum illud ad summum abescat. Tunc enim extrahunt, & vitro vase recondunt, seruantque in frigido loco, ne rancorem contrahat. Hoc in Italia frequentissimum obtinet vsum ad labiorum, marium, & mamillarum rimas, tam à frigore, quàm ab acri succo factas. Vtuntur eo præterea ad desquamatam cutem, & ad crustulosas papulas, quæ pueris in capite enascuntur. Sunt qui ei corallia porphyreo lapide leuigata admisceant, vt melius, citiusque rimæ occludantur. Alij verò cinnabari addunt, vt flammæum referat colorem. Porro (vt libro tertio de facultate alimentorum scribit Galenus, & Isach Arabicus in dietis) Adeps omnis in cibis sumptus ventriculum effundit, appetentiam deicit, pituitam auget, parum nutrit, succum illaudabilem gignit, alui fluxione commouet, retentricem ventriculi facultatem imbecillem reddit: sensus, & intellectum hebetat, somnolentiam includit, & in ventriculis facillè in bilem vertitur, & in vapores caput petentes. Quare adeps est potius in ciborum condimentis, quam in alimentis expectendus. Zrlag Græcis, Latins

Pomata  
parande  
ratio, &  
S/m.

Adipem  
cibus facit  
lat.

Non mina.

Latinis adeps, & pinguedo appellatur: Arabibus, Menim, Vxaham, siue Saham: Italis, Grasso: Germanis, Feyß, Fettigkeit, & Schamaltz: Hispanis, Gordura: Gallis, Gresse.

MEDULLA. CAP. LXX.

LAUDATISSIMA est ceruina, mox vitulina, post hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Colliguntur ætatis exitu, cum appetit autumnus: quippe cum aliis anni temporibus concrementum sanguinis, & veluti caro friabilis, in ossibus inueniatur: nec facillè cognosci potest, ni quis eam ossibus extrahat, & recondat. Omnes medullæ molliunt, calcifiunt, rarefaciunt, vlcera expleunt. Ceruina perunctos venenata fugiunt. Curantur recentes, adipis modo, aqua respersu subacta, selectisq; ossibus tantisper elota, & in linteis expressa, donec aqua sincera emanet: & deterfa forde pinna, siqua innatet, liquata in duplicato vase in pilam exprimuntur: & vbi coiere, omni face, quæ ad ima sedit, derafa, fictili nouo reponuntur. Quòd si liber incuratas reponere, facito omnia, quæ de anserum, & gallinarum adipe demonstraui.

*Medulla*  
*Vires ex*  
*Gal.*  
MEDULLA, vt scriptum reliquit Galenus x. l. simplicium medicamentorum, vim habet indurata, & scirrhusa corpora emolliendis, siue musculis, siue tendonibus, siue ligamentis id accidat, siue etiam visceribus. Optimum semper expertus sum ceruinam: deinde ipsorum iuniorum bouum, quos vitulos etiam nominant, ac proinde medullam eorum vitulinam appellant. At hircorum, & taurorum tum acrior est, tum scior. Itaq; durities scirrhusa dissoluere nequit, siqua etiam memoria manet eorum, quæ in quinto libro de his sunt prodita. Ex vitulina igitur, & ceruina medulla pessi componuntur veros emollientes. Et extrinsecus vteris medicamenta imponunt, quæ ex medulla præparantur, vim habentia emollientis. Accipitur autem non solum medulla ex ossibus, quæ sanè re vera est medulla, sed & ex spina, quam & ipsam medullam nominant, spinalem videlicet: quæ tum durior, tum scior est, quâ alia. Illa enim mollior est & pinguior: ac proinde ego spinalem seorsum per sese absq; illa repono. Sed ea mihi vtriusque medullæ cura est, ne aut putrescant, aut situm colligant. Itaq; in hyeme primum eas capio, velut & adipem, deinde in ædibus siccis, atque editis, plene humoris expertibus, cum solis lauri siccis repono. Nam quæ recentia sunt & humida,

multum etiam qualitatis suæ illis impatiunt, vt aciores fiant medullæ. At si quando ambiente calido, & austro medullas, aut adipem volens reponere, paratum sit in hoc cubiculum neque calidum, qualia ferè sunt quæ meridiem spectant (putrescunt enim in talibus) nec humo proximum, atq; humidum (nam in talibus situm contrahunt) sed supernum, atque excelsum, & ad aquilonem obuersum, paruas habens fenestras apertas, vt tam noctu, quam interdiu ab Arcto spirantes ventos accipiat, hæcenus Galenus. In vsu vero ciborum spinalis medulla id nutrimenti corporibus exhibet, quod cerebrum. Idecirco piscitosum, ac crassum generat succum, ægrè concoquitur, ventriculo nocet, nauseam concitat: robullis tamen ventriculi concocta, bonum præbet alimentum. Porro quæ ex ossibus elicuit medulla, quanquam largius sumpta ventriculi appetentiam destruat, piamq; gignat, si tamè probe conficiatur, valentissime nutrit, magisq; ori placet, quam spinalis, quod hæc sapidiore sit in omnibus suis partibus. *Medulla* Græcè, Medulla Latinè vocatur: Arabicè, Mochial halbadâ, seu Moch simpliciter: Italicè, Midolla: Germanicè, Mark: Hispanicè, Tueranos, & Tutanos: Gallicè, Moelle.

FEL. CAP. LXXI.

FEL omne reponitur hoc modo. Reces præligato ore folliculi lino tantum demissum in feruentem aquam, dum quis spatium trium stadiorum percurreret, mox exemptum siccatur vmbroso loco, asperginem non dolente. Sed quod ad oculorum medicamentum adici solet, ligatum lino in vitreum vas, quod mel habeat, immittitur: circumuoluto ad os vasis lini principio, & operto vase reconditur. Est autem omnis fel vis acris, & exalfaciens: intensus tamen, & remissis viribus differtur. Siquidem præstantius in effectu esse videtur fel marini scorpionis, & piscis qui callionymus appellatur, marinæ testudinis, hyanæque: item perdis, aquilæ, gallinæ candidæ, & syluestris capræ. quod priuatim prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, argemas, & genarum scabritias. Ouillo, suillo, hircino, atque vrsino, taurinum multo efficacius. Felle omni perfacilem, præsertim infantibus, deiectionem quis molietur, si intinctum eo tomentum, aut fimbriam sedi subiiciat. Priuatim

uatim taurino anginae cum melle perunguntur: sedis vlcera sanat, & ad cicatricem vsque perducit. Idem auribus fractis, & purulentis cum muliebri lacte, aut caprino instillatum, medetur: & sibilu earundem ex porri succo. Admisceri insuevit vulnerariis emplastris, & circumlinationibus, quæ contra venenata parantur: phagedænicis vlceribus, colicis, & scroto doloribus ex melle prodest: lepras, furfures cum nitro, & terra cimolia quàm optimè purgat. Ouillum, & vrsinum contra eadē polent, verum inefficacius hæc præstant. Vrsinum eclegmate comitiales adiuuat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis, prodest: naribus inditum comitiales erigit. Syluestriū caprarum felle peculiariter peranti lusciosi sanantur. Hircinū idem obit munus: thymia abolet, & luxuriantes elephantiorum extuberationes illitu reprimunt. Suillū autē contra aurium vlcera, reliquaq; omnia magnovsu assumitur.

QUANTVS de fellis reponendi ratione, acque etiam de eius viribus abunde scripserit Dioscorides: non tamen ob hoc prætermittenda existimaui nonnulla, quæ à Galeno libro x. simplicium medicamentorum de fellis facultatibus scite memorie sunt commendata. Est igitur fel (auctore Galeno) succerum, qui in quoque sunt animalium, calidissimum. Itaque sicuti sanguinem, & carnes dissimiliter temperata obtinent animalia, eadē ratione & fel. Quocirca calidissimum fel, aliorum quoque animalium fel excellere necesse est: & quæ illis minus sunt calida, proportionem huc humorem illis inesse minus calidum, quāto scilicet & in aliis sunt inferiora. Cæterum hæc differentiæ habentur non modò pro diuerso animalium genere, quod hæc magis, illa verò minus calida sint, verum etiam pro diuerso eiusdem generis animalium temperamento: ac etiam irritamento. Quandoquidem fel tauri interfecti, qui sumibus adaligatus, violentèrque diu tractus, & cursu, & canum latratu defatigatus, & sitim, famemq; & multum laborem perpeffus fuerit, ab eius felle plurimū differe inuenietur tum substantia, tum colore, tum facie, qui in pacis lætus, liberq; vitam desiderat, ac quietam duxerit. Nam defatigati, ac vexati animalis fel substantia crassius erit, colore nigerius, aut viridius, aut magis caeruleus, magisque ærugini similis: ob idque etiam longè calidus erit, quāto

alterius, qui in pace, & otio degerit. Ideoq; fel animalium quāto tenuius est, ac colore constat diluore, tantò minus spissioribus & magis colore saturatis excalcit. Gignitur in bubulo felle lapis quidam nonnunquam oui magnitudine, croceo colore, facileq; friabilis, cuius Dioscoridem, & Galenū meminisse non reperio. Hic (vt plerique perhibent auctores) potus, vesicæ calculos comminuit. Naribus inditus visum mirificè acuit, & aquam in oculis fluentē inhibet. Tritus lentis quantitate, & beatæ succo commistus, & in erinis naribus attractus, comitialibus subuenit. Non desunt etiam qui idē magno successu ex vino exhibere potandum felle suffusus. Denique auratæ, lupi piscis, perdicis, & galli gallinacei felle mirificè lestantur in coitu feminae, si viri penis eo perungatur. Quod Grecis γαλ, Latinis, Fel appellatur: Arabibus, Saracac, aut Merar: Italis, Fiele: Germanis, Goll: Hispanis, Hiel: Gallis, Fiel.

SANGVIS. CAP. LXXII.

SANGVIS anseris, anatis, & hædi, vtilissimè in antidota miscentur. Palumbi autem, turturis, & colubæ, necnon perdicis, oculis cruore suffusus, & recentibus eorum vulneribus, lusciosisq; illinuntur. Peculiariter columbæ sanguis, cruorem membranæ cerebri erumpentem inhibet. Hirci, capræ, cerui, & leporis sanguis inassatus sarragine, dysenterias, & celiacorum profluvia sistit: in vino potus contra toxica efficax est. Leporinus sanguis ita vt tepet illitus, vitia cutis in facie, lètinigineque emaculat. Caninus commodè ab his bibitur, quos efferata in rabiem beftia momorderit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestres sanguinem epotum tradunt prodeste comitialibus. Marinae autem testudinis cum vino, & leporis coagulo, cuminoq; contra serpentium morsus, & hausta rubetæ venena conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias discutit, emollitque. Sanguis equarum, quæ admissuram expertæ sunt, in medicameta additur, quæ erodunt, septica vocant. Sanguine chamæleonis genarum palpebras euelli creditum est. Hocidem viridiū ranarum sanguine præstatur. Menstruus sanguis foeminarum, circumlitu cōceptum inhibere existimatur: aut si omnino mulier.

Fellis bubuli lapis, & eius res.

Nomina.

Fellis Viri ex Galeno.

lier menstrua supergrediatur, leuat po-  
dagræ dolores, & igne sacrum illitus.

*Sanguis  
nimis conside-  
ratis.*

DISSERENS de sanguine Galenus, sta-  
tim initio libri x. de simplicium medicamento-  
rum facultatibus, etsi minimè eat inficias, quin  
animalium sanguini aliquid insit, quod medica-  
mentorum v. sui rectè competat, vt Dioscorides,  
& plerique alij, qui de eius viribus scripserunt,  
liquidò affirmarunt: declarat tamen multa de  
sanguinis viribus à scriptoribus esse prodita, que  
facto periculo fabulosa potius, & vana reperit-  
tur, quàm vera. Siquidem, vt idem refert Ga-  
lenus, falsum sanè esse omnibus in confesso est,  
quòd e potus nocturæ sanguis difficulter spiran-  
tes sanitati restituat. Vespertilionum verò per-  
unctis virginum mammis, eas extubere non  
sinit: pilosque renasci inhibeat, iis paribus  
illitus, vnde recenit ipsi euulsi fuerint. Falsum  
similiter esse asserit, comitiales ebibito agni  
sanguine curari: pilosque è palpebris euulso-  
renasci prohiberi viridium ranarum cruore.

*Vana san-  
guinis ex-  
perimèta.*

Quibus facile conicere possumus, hoc in loco  
Dioscoridis codicem librariorum fortasse culpa  
mendosum esse. Quippe quòd ibi legatur,  
oculorum palpebras ranarum viridium sangui-  
ne depilari, cum potius Galeni testimonio (etsi  
sententiam hanc non approbet) euulsi in  
palpebris pili harum sanguine renasci prohibeā-  
tur. Quin & aliud huic capiti mendum subesse  
videtur: quod hic ea, quæ de admissiorum  
equorum sanguine prodidit Galenus, de equarum  
sanguine, quæ admissuram expertæ sunt, le-  
gantur. Nisi forte interpretum vitium sit, qui se-  
xum in Dioscoride perperam mutarint. Præterea  
inquit Galenus. Tamest non desint, qui tur-  
turis, vel columbe sanguinem præferant in per-  
forata caluaria, vbi rosæco melius inuenire ni-  
hil possit: nonnulli verò laudibus extollant gal-  
lorum, gallinardumque sanguinem ad sanguinis  
fluorem è cerebri membranis: crocodili verò  
terrestres ad roborandam oculorum aciem: ad-  
missiorum equorum, quòd septicus sit, ad exul-  
cerandam vbi que curim: domesticorumq; mu-  
rium ad *hæmorrhoides* Græcis vocatas, id tamen  
nunquam experiri volui. Metuebam enim (in-  
quit) ne curiosus, vel stolidus viderer, si tantis,  
tamq; probatis remediis semel præteritis con-  
siderem, sanguinem horum animalium illis plus  
posse præstare. Quòd si quis hæc experiri vo-  
let, certò scio, damnabit non modò, qui talia  
scripserunt, sed & se delusum facto periculo re-  
periet. Taurinus autem sanguis e potus antea  
quam concrecat, inter delecteria recensetur me-  
dicamenta, quòd haurientem protinus strangulet,  
vt sexto volumine diffusius dicitur. Eius  
nomen Græcum *αἷμα*: Latinum, Sanguis: Arabi-  
cum, Dem: Italicum, Sanguis: Germanicum,  
Blut: Hispan: cum, Sangre: Gallicum, Sang.

*ima.*

FIMVM. CAP. LXXIII.

ARMENTARIAE bouis simum, si  
recens admoveatur, vulnere inflamm-

mationes mitigat: folijs autè indolui-  
tur, & calfactū cinere feruenti superpo-  
nitur. coxendicis cruciatus fotu cōpe-  
scit: illitum ex aceto duritias, panos,  
& strumas discutit. Priuatim suffitu fi-  
mi, quod à masculo boue redditū est,  
procidentes vuluæ reprimuntur: accensi  
nidore culices abiguntur. Fimū capra-  
rum, præsertim in montibus degen-  
tium, potum in vino, regium morbum  
emendat: menses cit cum odorem  
emendat: haultum, & partus euocat. Tritum  
in farinam, & impositū lanis cum thu-  
re, seminarum profluuiā sistit, cæte-  
rosque sanguinis impetus ex aceto co-  
hibet. Medetur alopecis exultū, & cū  
aceto, aut oxymelite illitum: cum axun-  
gia verò impositū his, qui podagra ten-  
tantur, auxilio est. Caprillum in aceto  
decoctū imponitur serpentum morsu-  
bus, vlcibusque quæ serpunt, igni sacro,  
& parotidibus. Vtilè ischiadici vitione  
hunc in modum accipiūt. In eo intersti-  
tio, vbi pollex brachiali committitur,  
cana veluti lacuna subsidet, in qua lana  
oleo imbuta substernitur, deinde sigil-  
latim seruētes stercoris caprini pilulæ  
imponuntur, dum vapor per brachium  
ad coxā sentiat peruenire, & coxendi-  
cis dolorem mitigare. adustio id genus  
Arabica appellatur. Ouillū ex aceto  
illitum sanat epinyctidas, clauos, pen-  
siles verrucas, thymos, & ambusta igni,  
rosæco cerato exceptū. Fimum suis syl-  
uestribus aridum, in aqua, aut vino potū,  
resectiones sanguinis sistit, vetustū late-  
ris dolorem mulcet: ad rupta, & con-  
uulsa ex aceto bibitur: luxatis cum cera  
to rosæco medetur. Tam asinorū, quā  
equorū simū, siue crudū siue crematū,  
addito aceto, sanguinis eruptiones cō-  
hibet. Armētarij, qui herba pascitur, sic  
cum simū liquatum in vino, mox potū,  
cōtra scorpionum ictus magnopere au-  
xiliatur. Columbinum vehementius au-  
excalfacit, & vrit: cum hordeacea farina  
mixtum, strumas ex aceto discutit: car-  
bunculos emarginat, tritū cum melle,  
lini semine & oleo: ambustis igni me-  
detur.



detur. Gallinaceum verò omnia eadē, sed inefficacius præstat: priuatim tamē contra venena fungorū, & coli cruciatus ex aceto, aut vino bibitur. Ciconiæ fimum, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini simi nidore pattus excutiuntur. Murinū detritū cum aceto, & illitum, alopecii<sup>10</sup> medetur: cum thure, & mulso calculos expellit: subditā infantibus miferda, alui deiectionem promouet. Caninū, quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptū, cum vino, aut aqua potum, sistit aluum. Humanum sterces illitū, vulnera ab inflammatione vindicat, & obiter intumescere non patitur: sed ea statim glutinat. siccō ex melle anginae perungi commodissimē traduntur. Terrestris crocodili fimum, crocodileā vocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, miorēque seruat. Optima est candidissima, & friabilis, amyli modo, minimē ponderosa, in humore statim eliquescent: quæ cum teritur, fer<sup>30</sup> menti acorē quādamtenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo, quos capros oryza pascunt, ipsūque non dissimile vendunt. Alij amyllum, aut cimo liam miscent, & adscito anchusæ colore per rarum cribrum paulatim exprimūt, vt se contrahat in vermiculorum speciem: qui siccati pro crocodileā vaneūt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum sterces, caninūque gutturi impostum, anginis auxiliari.

*Stercoris* STERCUS, vt posteritatis memorie prodidit Galenus libro x. simplicium medicamentorum, vim habet vel maximē digerentem. Verū humanum ob fetorem abominandum est. At bubulum, caprinum, crocodilorum terrestrium, & canum, vbi ossibus duntaxat vescuntur, neque grauior olet, & multa experientia non tantum nobis, sed & alijs medicis me natu maioribus comprobatum est. Siquidem Asclepiades, cui cognomentum erat Pharmacean, & alia omnia composita medicamenta collegit, vt multos implevit libros, & stercore ad multos se<sup>50</sup> per affectus vtitur, non modō medicamentis, quæ foris imponuntur commiscens, sed iis quoque, quæ intro in os sumuntur. Ceterū humani stercores hoc habeo experimentum. Assidue

quidam à phlegmonis ad fauces existentibus vexabatur, adeo vehementer, vt suffocationis subiret periculum, & sanē hoc ob periculum venam secare cogebatur. In hunc cū forte quis incidisset, pollicitus est se præbiturū medicamēti experimentum, & se vocari, si quidò rursus aliqua in parte gutturis emiculis phlegmone, ante sanguinis missionem præcepit. Itaque vocatus, medicamento illito, statim hominem curauit. Vt autem iterum profecti, non in ipso tantum, sed & in alijs, qui similes erant affecti, rogabat is, qui assidue suffocari periclitabatur, data mercede, vt se medicamentum illud doceret. Erat enim ille & locuples, & in pecuniæ sumptu liberalis. Porro vbi conuentum esse de pretio, is qui vendebat scripturam: Hoc medicamentum, inquit, per antipathiam quandam vitæritatem obtinet. Esse autem eam antipathiam, vt qui curatur nesciat, vnde conficiatur. Iussit itaque alium daret, qui pro ipso disceret, quique iureiurando reciperet, sese nulli eius medicamenti secretum copiam, priusquam ipse, qui dedisset, foret defunctus. Itaque à morte eius, qui indicarat, non tantum ille qui didicerat, suum hominem, sed & alios sanabat: & mihi ne petenti quidem medicamenti exemplum volens ac lubens obtulit. Erat autem sterces pueri siccum, cum melle Attico ad leuorem tritum. Vicitabat autem puer, cuius sterces accepturus erat, vt ipse qui medicamentum dederat offendit, lupinis, illis videlicet, qui ex more edi solent cum pane bene cocto in clibano, modicum sale, & fermentum habente. Præbebat autem bibendum vinum vetus: atque hæc omnia mediocri in quantitate, modō vt perfectē ea puer posset concoquere. Itaque cū primo die eo victu esset vltus, postero tamen die nondum sterces capiebat, sed in eo quoque die rursus eodem alebat victu, ac tertio demum excrementum fumebat: ac postea facto utebatur, similiter vt stercore canino, vt antè dictum est. Dicebat autem illum, qui docuerat, fugitantem alios cibos ob fetorem, prætulisse lupinos: sese verò experimenti gratia, carnes gallinaceas, aut perdicum ex aqua, aut te nui iure bene coctas persæpe exhibuisse, & medicamentum nihilominus operatum. Atque ego sanē hæc tibi de humano stercore narrare possum. hæc Galenus. Ceterū sit ex humano stercore vitreis organis aqua, præsertimque ex eo, quod homo rufus excreuerit, quæ cuniculosis, exedentibus, sinuosis, & contumacibus viceribus mirifice opem præstat. Delet & oculorum argemas, ac nebulas. Quinetiam carcinomata sanat exterius adhibita. Inus verò sumpta comitales iuuat lapidem in renibus, & vesica comminuit: aqua intercutē laborantibus prodest item & iis auxiliatur, qui non modō à cane rabido demossi sunt, sed etiam ab omnibus alijs animalibus icti, quæ venenum ei aculatur. Porro oleum, quod post eius stillatitiam aqua ab organo emanare solet, carcinomata, sinus,

*Aqua, & oleum ex humano stercore.*

*Humani stercores experiri soles.*

*Bubuli  
ster. Sires  
ex Gal.*

ta, sinus, aliæque vlcera, quæ Græcis cacœ-  
the dicuntur, etiam valentius sanat. Bubul-  
um deinde stercus (vt idem Galenus citato lo-  
co scriptum reliquit) exiccantius, attrahentisq;  
& ipsum est facultatis, vt palam facit, etiam  
apum vespariûmq; morsus iuuat. Atque hæc  
vt à proprietate substantiæ totius inueniunt,  
feri potest. Cæterum humidum illud vere  
collectum, cum bones herbas depascuntur,  
impositum rusticorum plegmonas discutit, &  
aqua intercute laborantes iuuat. Scire tamen  
oportet, omnia id genus medicamenta duris  
agrestium hominum corporibus aptari, nempe  
fossorum, & messorum, & qui opus obeunt  
ad eodè validum. Quæ & ad eorum scirrthosos  
tumores aceto in cataplasmatibus formam com-  
posita inlinuntur. Caprinum præterea dige-  
rentis, & acris est facultatis, adeo vt induratis  
scirrthorum in modum tumoribus congruat,  
nec tantum lenis, ad quos creberrimè medici  
non pauci huiusmodi stercora applicant, sed  
etiam aliarum partium. Siquidem ego (inquit  
Galenus) eo vsus sum ad genu tumorem ha-  
bens inueteratum, & ægrè solubilem, iussu fieri  
cataplasmate ex farina hordeacea per oxycrat-  
um, indito videlicet hoc stercore, & misicif  
homo ille fuit adiutus. Erat autem rusticus, in  
quo id factum est. Et iam etiam alius rusticus,  
cum sic vsus esset, non tantum in genu, sed  
etiam aliis in partibus ad tumores similes, per-  
inde adiutus est. Nam acrius est medicamen-  
tum, quam vt mulieres vrbanas, aut pueros, aut  
omnino qui molli sunt carne, sanare possit.  
Quin & ad aquam intercutem, & ad splenicis  
varie caprino stercore vtimur. Sed & vltum te-  
nuiorum quidem partium, verum haud mani-  
festo redditur acrius. Quamobrem sanè ad alo-  
pecias congruit, & omnia adeo quæ extergen-  
tia medicamenta desiderant, vt lepras, pforas,  
lichenas, & hoc genus alia. Miscetur & dige-  
rentibus cataplasmatibus, qualia sunt quæ accom-  
modantur ad parotidas, & bubonas diutur-  
niores. Est enim vis eius cuiusque etiam vsti,  
absterforia, & digerens, nec eam paruum ha-  
bet digerendi potentiam. Nam medicus qui-  
piam ex iis, qui in agris, & vicis medicinam  
exercent, vtebatur eo ex aceto ad viperarum  
morsus, & multo sanè etiam magis aliarum be-  
stiarum, ac profecto ex iis cõplures seruauit. Et  
hic ipse quoque medicus arquet potandas ipsas  
anusticos, hoc est, pilulas caprinas ex vino præ-  
buit, & ad profluuium muliebri cum thure  
apposuit. Quæ omnia sanè optimus medicus  
ignorare non debet. cæterum potiora eligere  
potissimum ad vrbanos, & honoratos, ascu-  
susque exiffimationis viros: in quibus equidem  
ego tali nunquam sum vsus medicamine, cum  
multo meliorum suppeteret copia. Attamen  
existit nonnunquam talium vsus, aut in itinere,  
aut in venatione, aut rusticatione, cum scilicet  
meliorum nihil adfuerit, aut homo rusticus  
perinde fuerit carnis duræ, ac asinus. Nam eius-

*Caprini  
ster. Sires  
ex Gal.*

modi multos in agris reperias dignos, qui bi-  
bant spyrarhos. Cæterum è canibus ossa com-  
edentibus stercus, præterquam quod cæteris  
stercoribus præstantius, tum candidius habeatur, fi-  
stula gutturi insusillatum anginem curat: sicuti  
& dynteriam ex lacte caprino haustum, in quo  
prius igniti calculi fuerint extincti, aut ignitum  
ferum, quod Græci σίγνυς vocat. Quinetiam  
periodicas, circularèsv fugat febres, si co-  
chlearis mensura in accessu ex vino præbeatur  
bibendum infcio patiente. Prodest & malignis  
viceribus inspersum, vel emplastris ad id fa-  
cientibus commistum. Pollet etiam suis vi-  
ribus Lupinum: idcirco id magnis laudibus ex-  
tulit Galenus citato loco, sic inquit. Lupi-  
num stercus quidam colicis potandum dabat,  
non tantum in ipsis paroxysmis, sed etiam in  
intervalis, si quidem plegmone vacarent.  
Quorum ego quosdam vidi non amplius hoc  
affectu correptos, & correptos non amplius id  
grauiter passos, sed nec post paucum tempo-  
ris. Accipiebat autem ille albus potius lupor-  
um stercus, quæ vbi ossa ederint, solent ex-  
cernere. Verum illud etiam in eo mirabar,  
quod vel suspensum euidenter sepe numero  
iuuisset. Itaque hic stercus capiebat, quod non  
decidisset in terram: id quod non erat inueni-  
endi difficile. Ea enim est luporum natura, quæ  
canum, vt suspensio altero posteriorum currit,  
& meiant, & cæcent in eminenti quopiam loco  
ex terra. Itaque in spinis sepe æstate stercus  
lupinum reperitur, & fructibus, vepribus,  
herbisque procerioribus. Inuenitur porò in  
stercore illorum & nonnihil ossium denorati  
animalis, quod vt effugit commanfonem, ita  
& concoctionem: quod & ipsum contundens,  
ac conterens, bibendum præbuit colicis: ac si  
homo esset puritatis amans, miscebat & salis  
quippiam, aut piperis, aut quippiam eiusmo-  
di. Vt plurimum autem ex vino albo consisten-  
tiæ tenuis bibendum præbebat: interim verò  
etiam ex aqua. Hoc ergo stercoris, quod pater-  
tibus ilibus applicandum esset, iubebat suspen-  
di vinculo confecto ex lana nõ cuiuslibet ouis,  
verum multo præstabat eam esse ouis à lupò  
laniatæ, vnde quod ad hunc vsu accommoda-  
retur, esset consiciendum. Quod si talis non  
adesset lana, ex pelle ceruina, & lorum quod  
cingeret illa, & in quo stercus contineretur,  
parari præcipiebat. At nos ollulam ad magni-  
tudinem maximæ fabæ confecimus, quam ex-  
periundi gratia indito stercore quibuscumque sus-  
pendimus, nec potius non mirari, cum  
plurimos ipsorum videremus adiutos: cæterum  
ad ollulam duas ceu aures affiximus, per quas  
lorum transfiniri posset. Quod autem ciconi-  
æ sinum comitiales inuict planè refellit Ga-  
lenus, asserens eos esse redarguendos, qui talia  
scripserunt. De ouillo, columbino, gallina-  
cco, murino, & crocodilino, cum satis sus-  
perque differuerit Dioscorides, nec plura à Ga-  
leno, & aliis descripta repererim, quæ medi-

*Canini  
stercoris  
Sires.*

*Lupini  
ster. Sires  
ex Gal.*

30

40

50

*Ciconia  
stercus.*

cinn: magis competere possint, non est quid amplius addendum existimem. Veruntamen animaduertendum est, quòd, quemadmodum etiam de animalium felibus diximus, sterco ipsa inter se plurimum differunt temperamenti, & vicius animalis ratione. Quippe quòd alterum sit altero plus, minusve calidum, pro animalium diuersorum generum temperie, aut pro alimentorum temperamento in eisdem speciei animalibus. Quod Græcè *ἀνίστατο*, Latine Stercus & simum vocatur: Arabicè, Hebel, Zebel, aut Bhar haïuan: Italicè, Sterco: Germanicè, Drecken: Hispanicè, Estiercol: Gallicè, Fiente.

VRINA CAP. LXXIII.

HYMANAM vrinam suam cuique bibere, contra viperæ morsus, ac venena, incipientemque aquam inter cutem proderit: scorpionis, viperæ marinorum, draconisque morsus, ea conuenientissimè fouentur. Canina ad perfundendos canis morsus idonea est: pruritus, & lepras nitro addito expurgat. Sed vetus vlcera capitis manantia, furfures, pforas, & feruidas eruptiones, multò magis abstergit: nomas, & præcipuè genitalium, cohibet: auribus infusa manans pus supprimit: decoctaque in calyce mali punici, earum vermiculos abigit. Pueri impubis resorpta vrina, orthopnoicis auxiliatur: decocta in æreo vase cum melle emendat cicatrices, argema, caliginisque. ex ea, & cupro idoneum auri ferrum conficiunt. Quod in vrina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat: feruesfactum cum cyprino, inditumque, vuluæ dolores mulcet, strangulatus leuat, genas deterget, oculorum cicatrices expurgat. Taurina si cum myrra instilletur, aurium dolores lenit. Aprina viribus eisdem prædita est: priuatim comminuit vesicæ calculos, & potu expellit. Caprina ad aquam quæ cutem subiit, cum nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur, vrinamque per alium extrahit: aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renum vitiis nederi. Lyncis vrinam quam lyncurium appellant, simulac excernitur, glaciari coirève in calculi duritiâ, vulgo creditum est.

quare quod de ea proditum est, vanum esse conuincitur. Est enim quòd à nonnullis vocatur succinum prætygophoron, ideo dictum, quòd pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua stomacho, aluòque fluxione laboranti conuenit.

VRINAE omnes quidem, vt scriptis tradidit Galenus libro x. simplicium medicamentorum, facultate sunt calidæ: sed plus tamen animalium calidorum, minus autem frigidorum. At vrina hominis omnium propè aliarum vrinarum est imbecillima, exceptis porcis domellicis, quibus exempli sunt testes. Nam illorum similis est totius corporis temperatura temperiei hominum, & vrina similiter debilis. Verum montanorum aprorum valida est, vt etiam ex odore apparet, qui vtiq; acerrimus est. Hac vtuntur Hetrusci ad puerorum vermes, oleum suo in vtriculo vrinæ admiscerentes, & in fumo tandiu suspēdentes, donec crassescat ad mellis spissitudinem: deinde illud diligenter asseruant, eoque puerorum nares, tempora, & vmbilicum inungunt magno sanè successu: nam & ego saepe periculum feci. Sed quauis Dioscorides complurium vrinarum vires descripsit, vt quas variis, ac diuersis morbis viles esse existimauerit, Galenus tamen vrinarum medicamēta parua dispēditur. Quippe qui crediderit (quemadmodū & de sanguinis diuersis inquit) quæ parua reperiatur valentiora medicamēta, ac experimēto cōprobat, iis præcipuè morbis cōgruentia, quibus vrinā conferre nōnulli autumant, earū medicinas ad curiosos supersticiososq; spectare magis quàm ad certos medicos, qui hæc nauseosa, incertaq; remedia nunquā probatis, expertisq; præponūt. Quòd autē puerorum vrina egrē spiratibus cōferat (vt Dioscorides auctor est) minimè probat Galenus, cum loco citato inquit. Vrinam pueri orthopnoæ vocatæ gratia cibere necessarium non est, cum sint & alia medicamēta, quæ huic medeatur affectui. Quin cum bibisset quidā, affectu liberatus nō est: vñ eximium quid præter alia possideat. Chrysocollæ cōficiendæ rationem, quā fieri ex puerorū vrina prodidit Dioscorides, quamq; seplasiarū, & arifices vulgò Borace nominant, duobus in locis scriptā reliquit Galenus lib. i. x. simp. med. cāmētorum, vbi de ea speciatim egit, & lib. x. eorundem de vrinis differens. Et quauis (vt libro quinto dicitur) legitima, probataq; chrysocolla fossilia habeatur, sit tamen artificio ex pueri vrina in ardentissimis solis caloribus æreo mortario, atq; etiā pistillo zero tandiu circumacta, donec mellis spissitudinē assequatur. Exteritur, quæ hoc modo parata sit, ad cōtumacia vlcera sananda, exdentiaq; coercenda. Illud profectò vanum, ac fabulosum esse manifestè deprehenditur (vt hic Dioscorides scribit, & nos cum secuti superiores libro in succini mentione ostendimus) quòd

vrina

Nomina

Primari  
facultates  
ex Gal.

Vrina  
apri.

Vrina me  
dicinae  
tēpē Gā  
leni.

Chrysocoll.  
de fossili  
tia.

vrina lyncis, simulac excrenitur, duretur, coeat  
ve in lapidem illum, quem Lyncurium vocant.  
Quippe quod is inter succini genera ab omni-  
bus fide dignis auctoribus recensetur, quod  
suz proprietate naturæ pennas ad se trahat,  
quemadmodum & cætera succini genera pa-  
leas, fellucas, ac leuissima quaque alliciunt.  
Quantum verò à legitimo lyncurio vulgaris il-  
le lapillus differat, qui officinis lapis lyncis ap-  
pellatur, & cuius est vsus apud seplasiarios, &  
medicos, qui simplicium medicamentorū scien-  
tiam negligunt, ij diiudicent, qui simplicium  
historias, & facultates optime norunt. Quando-  
quidem is, quem pro fabuloso lapide lyncis  
venditant impositores, lyncurium succini genus  
haudquaquam est nec alius quouis lapis ei viri-  
bus respondens, nec si quidem vrinam cieat, &  
renum, vesicæq; calculos comminuat, vt seplasi-  
ariorum, & medicorum vulgus opinatur: qui  
parum Dioscoridis, aliorumque in re medica  
bonorum auctorum familiaritatem curant. Ceterum  
hinc satis constare arbitror, Christophorum  
Encelium Encelium (pace viri aliquando docti dixe-  
rim) planè hallucinari, quod libro 111. capite  
xxvi. de re metallica, poetarum fortasse,  
& aliorum quorundam fabulis adductis magis,  
quàm veris probatissimorum auctorum testi-  
moniis, probare contendat, Lyncurium ex  
vrina lyncis coalescere, atque ex maris vrina ful-  
tura fieri, ex femine verò vrinam album. Hanc  
autem opinionem suam ex eo comprobare vi-  
detur, quod aliquando in vesica apri, itemque  
suis domesticis lapillos inuenierit. Ex quo postea  
colligit, mirum non esse, quod lyncis quoque  
vrina in lapillos concreseat. Sed quàm leuis &  
infirma sit hæc ratiocinatio, vt cõprobet quod  
contendit, quàmque vana sit opinio hæc, eo-  
rum sit iudicium, qui magnis laboribus, multis  
studiis, summaque diligentia rerum simplicium  
peritiam sunt assecuti. Atque hæcenus de vri-  
nis, & lyncurio. Restat modò, vt etiam de Sali-  
ua aliquid in medium afferamus. Itaque cum  
eius non meminerit his libris Dioscorides, pos-  
sitq; nonnullis humani corporis morbis opitu-  
lari, ea de eius viribus, & facultatibus hic refe-  
ram, quæ à Galeno lib. x. simplicium medica-  
mentorum memorizæ produnditur his verbis. Sie  
lon, siue salon, siue ptyelon appellare libet, ni-  
hil interest. Verum id sciendum est, vim eius  
esse differentem. tum in animalium speciebus.  
tum in eorum vnoquoque sene, aut ægrotò, ie-  
iuno aut sitibundo, aut cibo potuque sumpto.  
Etenim vt vrinæ, & bilis, & sudor, sic etiam sa-  
liua sumpto quidem cibo imbecilla est: valida  
& acris eorum, qui ingenti aut inedia, aut siti  
premuntur. In medio versusque est eorum, qui  
probe concoxere quidem, nondum tamen ci-  
bum potumve ingesserunt. Hac ergo salua nu-  
trices puerorum lichenas curant, paruum vi-  
delicet digitum rigantes, ac deinde cutem affe-  
ctam conficantes. Idq; faciunt subinde, tanto  
scilicet intervallo, dum saluæ vires in lichene

perdurent, ac nondum sint extinctæ. Sed & tri-  
ticum mandantes rustici non pauci surunculis  
imponunt. Nam celeriter eos & digerit, & con-  
coquit: cum si macerarent aqua, non æquè pro-  
deret. Ex quo liquet, saluam ipsam auxilij ro-  
bur adferre. Atque corporibus mollibus, &  
puerorum, panem, non triticum imponunt ore  
commansum. Porro omnia sic commansa dige-  
runt, & sagillata, cæteraque ecchymomata, ma-  
ximè vbi panis simul cum pauco radiculae fu-  
rit commansus. Porro tota substantia vel ma-  
ximè aduersa est salua bestijs hominem inter-  
ficietibus, ceu alicubi etiam Nicander poeta  
refert. Pollicitus autem mihi quidam incanta-  
tionem sese ostensurum, quæ scorpius interfi-  
ceret: vbi illam semel dixisset, in scorpium ex-  
puit: inde rus sum eam obmurmurans iterum  
scorpium conspuerat: vbi tertio dixisset, atque  
expuisset, mortuus est scorpius. At postea ego  
absque incantatione à sola salua morientem  
vidi scorpium, idque celeriter passum à salua  
esurientium, aut sitientium: tardè autem ab il-  
lis, qui cibo, potuque fuerant impleti: illis  
autem proportionem. Quod *ῥαῖς* Græcis, Latine,  
vidi scorpium, idque celeriter passum à salua  
esurientium, aut sitientium: tardè autem ab il-  
lis, qui cibo, potuque fuerant impleti: illis  
autem proportionem. Quod *ῥαῖς* Græcis, Latine,  
Nominis. *ῥαῖς* Græcis, Latine, pariter & Italicè  
vocat: Arabicè, Busach, Bezach, & Lhab.

MEL.


CAP. LXXV.

PRINCIPEM locum obtinet mel,  
quod Atticæ regionis est, præcipuè ex  
Hymetto, mox Cycladibus insulis, & è  
Sicilia, cognomine hyblæum. Magis  
probatur dulcius & acre, odoratius,  
subflauum, nec humectum, graue, &  
minimè fluxum, quod ob sequacè len-  
titiarum non faciliè abruptum, tractum  
que resilit in digitos. Mel abstergendi  
vim habet: ora venarum aperit, humo-  
res euocat. qua ratione in sordida vlcera,  
sinusque, commodissimè infunditur.  
Decoctum, atque impositum, ab-  
scedentem carnem glutinat: medetur  
impetigini coctum cum liquido alumi-  
ne, & illitum: item aurium sonitui, &  
dolori cum fossili sale trito, tepidum  
instillatur: lendes, & scæda capitis ani-  
malia illitum necat: nudam glandem  
recutitis operit, præsertim quæ circun-  
cisione aperta non est, frontelle præpu-  
tium à balneo triginta diebus emol-  
liatur: oculorum caliginem discutit:  
faucibus, tonsillis, angina collutum,  
gargarizatumve medetur: vrinam ciet:

auxiliat

Encelii  
opinio fa-  
m.Salua  
res ex Ga-  
leno.

auxiliatur tussi, & à serpente percussis: contra haustum meconium, cum rosaceo calidum assumitur: aduersus venena fungorum, & rabiosi canis morsus linctum, aut potum proficit. crudum tamen aluum inflat, tussim laceffit, & ea dere desumpti vsus aptior est. Primatum tenet in mellis genere vernum, deinde æstiuum: hybernium verò, utpote quod crassius constet, deterrimum reputatur, ceragini faciundum idoneum. Quod in Sardinia gignitur mel, amarum est: quoniam apes inibi absinthio vescantur. quo vitia cutis in facie, & macula aptissimè perunguntur. Heraclia in Ponto quibusdam anni temporibus, propria quorundam florum dote, mel confiat: quod qui edere, mente abalienantur, ac sudore diffuunt. Remedio sunt esitata ruta, & salsamenta, aut epotum mullum, resumpta, quoties vomitione reiciuntur. Acre autem est, & olfactu sternutamenta mouet. Quod cum costo illitum, & seminarum cutem emendat, & cum fale sugillationes rapit. Est & aliud concreti mellis genus, quod saccharon nominatur. In India verò, & felici Arabia in arundinibus inuenitur. falsi modo coactum est, dentibus, ut sal, fragile: alio idoneum, & stomacho vtile, si aqua dilutum bibatur: vexatæ vesicæ, renibusque auxiliatur. Illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt.



Mellis com-  
sideratio.

Mel, quod apes colligunt, omnibusque vulgarissimum est, auctore Galeno libro 11 de alimentorum facultatibus) oritur in plantarum foliis: carumque neque succus, neque fru-

ctus, neque pars, villo pacto dici potest, sed eiusdem cum rore generis est: non tamen assidue, nec copiose, ut ille, prouenit: repertumque est aliquando æstate super arborum, ac fruticum, herbarumque folia mel quam plurimum, adeo ut agricolæ velut ludentes canerent, Iupiter melle pluit. Cui subscribens Plinius libro x. 1. capite x. 11. sic inquit. Mel ex aere venit, & maxime siderum exortu, sitque præcipue ipso serio explendente, nec omnino prius vergiliarum exortu sublucanis temporibus. Itaque cum prima aurora arborum folia melle rosca inueniuntur. At si qui matutino sub dio fuere, vntas liquore vestes, capillumque concretum sentiunt. Siue ille est coeli sudor, siue quædam siderum filia, siue purgantis se aeris fuccus, vti nam esset & purus, ac liquidus, & suæ naturæ, qualis desinit primò. Nunc verò è tanta cadens altitudine, multumque dum venit sordescens, & obuio terræ halitu infectus. Præterea à fronde, ac pabulis potus, & in veterculus congestus apum: ore enim vomunt. Ad hæc succo florum corruptus, & alueis maceratus, totisque mutatus: magnam tamen celestis naturæ voluntatem affert. Ibi optimus semper, ubi optimorum doliolis florum conditur. Atticæ regionis hic, & Siculæ Hymetto, & Hybla ab locis, mox Calydna insula. Hactenus de melle Plinius citato loco. Verum enimuero (ut idem auctor est libro x. 1. capite x. 11. 1.) mel, quod in Creta Carnia monte colligitur, muscæ non attingunt, nec eo in monte eadem vsquam reperiuntur. Porro venenatum mel, quod in Heraclia Ponti prouenit, cuius hic meminit Dioscorides, Plinius quoque recensuit libro antè citato, capite x. 11. 1. Subiunxitque & alterum eodem in Ponto gigni gente Sannorum, quod ab insania, quam gignit, Menomenon vocant. Id existimatur contrahi flore rhododendri, quo scatent syluæ. Habentur præterea & alia mellis genera, quæ rosca non sunt, sed ex plantis nascuntur, ut illud, quod ex anacardiis fluere Arabes scribunt, & inter Græcos Strabo Geographicorum libro x. v. ex arborum siliquis, quas arbores proferunt, denorum digitorum longitudine, mellis plenas, quod qui ederint, non facile euadant. Quinetiam refert Pomponius Mella tertio de situ orbis, tam pinguis alicubi, & tam feracis foli India esse, ut in eo mella ex arborum frondibus defluant. Ex primitur etiamnum è vulgaribus siliquis, quæ Græcis *μαρνια* dicuntur, quo tam Indi, quam qui Troglodyticam Arabiam incolunt, gingiberis radices recentes viridesque, asseruât, ac etiamnum myrobalana omne genus. Quod facile conicitur ex iis, quæ ex Alexandria Aegypti Venetias quotannis comportantur. Cæterum non de sunt inter recentiores medicos, qui dispuunt, an Saccharum, quod sub mellis genere scripserunt veteres, præsertim Dioscorides, & Galenus in India, & felici Arabia nasci, idem cum nostrate Saccharo dici possit. Et quanuis plerique

Mel Hera-  
clia Ponti  
prouenit.

Mellis ge-  
nera non  
rosca.

Saccharo  
considera-  
tio.

reper

reperiantur, qui dubio procul existiment, ac pro certo affirmant, communis usus sacchari, & quod ab antiquis describitur, vnum & idem esse, quod ex eadem proveniant planta, tamen Manardus Ferrariensis, & Leonardus Fuchsius ipsum secutus, maximam inter ea ponunt differentiam, omnino opinantes in alio arundinum genere concreuisse antiquorum saccharum, de quo inter mellis genera scripsere Dioscorides, & Galenus: concrevereq; ad hanc diem vsque ex coelesti rore, quemadmodum & id, quod mannā vocamus: non autem in iis arundinibus, è quibus in aqua decoctis huiusce ætatis saccharum in Medera, Sicilia, Creta, Rhodo, & Cypro insulis, ac etiam in Aegypto exprimitur. Qua in re eos viros aliqui doctissimos, planè hallucinatos crediderim, quòd nullo, v. puto, auctorum probatorum testimonio ducti sibi persuaserint, mannæ in modum ex rore concrefcere antiquorum saccharum solis ardore super arundinum folia tam in India, quàm in felici Arabia. Quippe quòd nusquam reperim scripsisse Dioscoridem, Galenum, nec veterum, vel recentiorum quemquam, concrefcere saccharum in arundinum foliis ex rore solis feruore concreto, siue potius exiccato, quemadmodum in quibusdam arborum frondibus manna per se concrefcit. Quo fit, vt mihi refellenda videatur eorum sententia. Nam si verum illud esset, vt ipsi imaginantur, non modò non id credendum, sed ne cogitandum quidem, Dioscoridem, qui diligentissimè simplicium medicamentorum historias literis, memoriæq; mandauit, silentio præteruisse tam pulchrum, & admirabile, scitūque dignum naturæ opus in saccharo conficiendo. Nec minus id reticuisse Galenus naturæ operum maximus indagator, quemadmodum nec reticuit lib. 1. & 11. de alimentorum facultatibus, ærei mellis historiam, quod nos mannā vocamus, quòdque sua ætate in monte Libano, alijsq; locis super arborum frondes repertum scribit. Quamobrem magis veritati consonum videtur, vt dicamus, nil aliud veteribus saccharum extitisse, quàm nostratis sacchari arundinum lacryma, seu liquor, qui nimia fucci copia aperto in latere calamo, perinde ac gummi, exterius concreuerit. Huic nostræ opinioni subscribit Plinius lib. x. & 11. cap. v. & 11. sic inquit. Saccharon & Arabia fert, sed laudarius India. Est autem mel in arundinibus collectum gummi modo, candidum, dentibus fragile, amplissimum nucis auellanz magnitudine. hæc Plinius: Ex quibus facile cognosci potest, quòd non ex rore, vt mannæ euenit, coalesceret antiquorum saccharum super arundinum folia, sed quòd fractis calamis earum internodiis cohereret et collacrymans, è quibus vulgare nostrum conficitur. Quandoquidem hoc modo resinæ, gummiq; omnes fuso sui arboris cortice emanant. Alia præterea huc accedit ratio, quæ (vt equidem ar-

bitror) Manardi, ac Fuchsi sententiæ prorsus aduersatur. Nam quemadmodum in Apulia, & Calabria manna à sole tacta, dum arborum inhæret foliis, paruo temporis intervallo in auram euanesceat (vt libro primo diximus in mannæ mentione) eadem sanè ratione id saccharo euenisset, si ex rore (vt ipsi contendunt) concrefceret. Siquidem à sole tactum, rarefactūque facile dissilisset in auram, nec gummi modo concreuisset. Eoq; magis, quòd nusquam legerim in Dioscoride, nec Galeno saccharum è foliis arundinum colligi, sed in ipsis calamis concretum reperiri. Quod etiam testatur Strabo libro x. v. Geographiæ, vbi aperte scribit, in India arundinem mel sine apibus gignere: non autem quòd ex rore in arundine fiat, vt quidam peruicax, ignarusque medicus mecum contendere, atque etiam, vt suam mordicus teneret opinionem, Strabonis codicem corrumpere non est veritus. Præterea cùm memoriæ prodiderint Dioscorides, Galenus, & Plinius, antiquorum saccharum durum esse, salis modo coactum, album, dentibus fragile, ex his coniectare licet, è rore saccharum nequaquam fieri. Quippe quoniam manna, quæ eodem modo è rore concrefcit, sal minimè refert, nec dentibus fragilis deprehenditur, sed potius mandentibus tenax, & ceræ modo lentescens. Quare crediderim antiquis saccharum fuisse tenuiorem, ac præstantiorem illius partem in arundinum sacchariferarum medulla, quæ per internodiorum fissuras exiit solis calore concreuerat, vt & saccharum nostrum calore ignis arte concrefcit, & addensatur. Quod cùm accuratissimè perpenderent homines, liquorisq; præstantiam agnouissent, à natura edocti hoc arte se facturos existimauerunt. Neque id incassum attentasse videntur, quandoquidem sacchari integros calamos assumptos, minutimq; incidentes, ignis calore tandiu decoxerunt, donec vniuersus liquor, absumpta igni aqua, diu effruescens in saccharum salis modo in vasis fundo concreuerit. Verum est sacchari arte facti nihil meminere Dioscorides, & Galenus, non desunt tamen qui dicant, hoc etiam ante eos factum esse, Solini auctoritate freti, qui in Indiæ palustribus arundinem ita crassam progigni ait, vt fissis internodiis lembi vice vèctitet nauigantes, è cuius radicibus dulcem etiam exprimit humorem ad mellis fusuaretem. At qui liquorem hunc, qui ex harum cannarum radicibus elicitur, saccharum nostri vsus fuisse existimant, proculdubio falluntur. quòd Indi non modò ex decoctis cannarum, sed aliarum quoque arborum radicibus sibi potus parent, cùm illius cœli & soli clementia frequentissimè sint plantarum radices, quæ mellea dulcedine imbuntur, vt Strabo testis est loco nuper citato, vbi sic inquit. Nullus annus in India inuenitur vtroque tempore sine pluuia. Quapropter contingit annum feracem esse, cùm

Manardi,  
& Fuchsi  
opinio re-  
probatur.

Antiquorum  
saccharum.

Factū  
sacchari  
inuenta.

Aquarum  
lapis.

semper

semper terra sit fecunda: fructus autem arbores multos gigni, arborumque radices, præsertim magnarum arundinum, & natura, & decoctione dulces esse, aqua à foliis tepida, tam celesti, quam fluviatili. Ad eod quod ea, quæ apud alios & fructuum, & succorum maturitas dicitur, apud illos concoctio est: quæ tantum ad dulcedinem operatur, quantum ea, quæ per ignem fit. Sententiæ nostræ Lucanus quoque suffragatur, illud explicans hoc carmine,

Quisq; bibunt tenera dulces ab arundine succos.

Quintilianus Marcus Varro, qui eodem ferè tempore claruit, his tribus verbis attestatur, dum inquit.

Indica nō magna nimis arbore crescit arūdo,

Illius & lentis præmitur radicibus humor,

Dulcia cui nequeant succo contendere mella.

Ex iis palam est, hos omnes de saccharis Indorum portionibus, quæ iis vini loco sunt, fuisse locutos: non autem quod ex illis cannarum radicibus saccharum aliquod pararetur. Quandoquidem & nos è glycyrrhizæ radicibus, quin & è decoctis, pressisq; siliquis, sicut & alij è dactylis, dulces elicimus succos ad varij usus potationes. quemadmodum & occidentales Indi è pluribus dulcibus arborum fructibus suos sibi parant potus. Sed non ob id dicendum hos liquores, quod mellis dulcedinem præstent, esse mel, neque saccharum. Nec mirum sanè si Indici arundinis radicibus dulcissimum præbeant succum non modo illæ magis, sed etiā quæ ibi nascuntur nostris fortasse non multo grandiores: cum etiam nostrates recentes manse quadrantenus ori dulces sentiantur. Quod autem minores arundines in India radicibus dulces præbeant potus, superioribus carminibus explicauit abunde Marcus Varro: cui non magna nimis est arbor. In hoc tamen à Solino descendit: cui arundines, quarum meminit, vastissimæ sunt proceritatibus. Hinc ergo eorum sententia explodenda videtur, qui credunt ex illarum magnarum arundinum radicibus, saccharum nostro similis facitasse Indos, quod non quidem saccharum, sed dulces inde potus vini loco sibi faciant. Sed ut suam opinionem auctoritatibus fulciret Manardus Ferrariensis, utq; lucidius comprobaret antiquorum saccharum, perinde ac mannam, ex rore fieri, lib. i. x. epit. v. Auicennam etiam admittit, quæ tamen alijs vbiq; reiecit, ac reprobaui, asserens, quod cum ipse huius fuerit sententiæ, ultimo capite libri secundum antiquorum saccharum mannam vocauit, cum inquit. Zucchârû alhusar est manna cadēs super alhusar, & est sicut frusta salis. At nos, qui huic opinioni minimè adspulsumur, dicimus Alhusar, siue Alhaffer (ut Bellonensis castigauit) nullo pacto Arabica

lingua arundinem significare, sed aliam Aegypti, & Arabiæ arborem, sic ab eius loci indigenis appellatam: quandoquidem Arabes (ut testatur Serapio) arundinem casâ dicit. Quod manifestè declarat zuccharum alhaffer apud Auicennam huiusce arboris esse mannam, vel gummi, non autem Græcorum saccharum in calamis cōcretum. Illud insuper nostram comprobatur sententiam, quod eodem loco addidit Auicenna, sic inquit. Et in zuccharo quidem alhusar est cum abstersione pauca, stipticitas, & amaritudo. Siquidem austeritatis, & amaritudinis, quæ in antiquorum saccharo fuerint, nusquam meminere Dioscorides, & Galenus: nec item quid conferret id pulmonum, & aquæ intercuti, ut paulo infra voluit Auicenna. Qui etsi dixerit deinde zuccharum hoc oculorum morbis, pariterq; renum, & vesicæ vitiis auxiliari: non tamen ob hoc dici potest, zuccharum alhaffer esse antiquorum saccharum. Sed rectè quidem contra Manardi sententiam, Auicennæ testimonio (cū & ipse hoc in loco Auicennæ auctoritate nitatur) probari potest, quod antiquorum saccharum gummi modo collactyrmans in arundinibus concreuerit, non autem ex rore. Quippe quod is de zuccharo agens loco nuper citato, ibique antiquorum saccharum recensens, inquit. Assumptum sicut gummi ab harundine abstergit oculum. Quibus palam fit, antiquorum saccharum, perinde ac gummi, ab interiori medulla exteriori emanasse, ibique postmodum solis ardoribus concreuisse. Verum enimvero quod alhaffer apud Arabes sui generis arbor sit, & ab arundine maxime differat, & quod eius zuccharum, quantum ab Auicenna manna dicatur, quod fortasse granulis concreuerat mannae similibus, ex rore haudquaquam fiat, sed gummiu modo ab arbore destillet, manifestè ostendit Serapio capite de saccharo his verbis. Alhaffer habet lata folia, & habet zuccharum, quod egreditur ab oculis ramorum suorum, & à locis foliorum eius, & colligunt de eo homines rem conuenientem, & in zuccharo eius est amaritudo, & egrediuntur ab hac planta mala quædam, sicut testiculæ camelorum, & quibus liquor quidam emanat adurens, stipticq; facularis, ad cauteria peridoneus. Et lignum quidem Alhaffer est leue, crassum, rectum, pulchrumq; & ideo assimilauerunt canulenarij in canelensis suis brachia, & crura domnarum ligno eius. hæc Serapio. Ex quibus facit & Manardum, & Fuchium, viros aliqui doctissimos, hac in re hallucinatos putauerim. Cæterum Fuchius, ut probaret antiquorum saccharum è roscido cæli succo in calamis concreuerit, utq; illud à nostrate diuersum ostenderet, dicit, quod cum nostri vsus saccharum, perinde ac mel, calidum reperiatur, scitumque facit conctet, an-

tiqua

Manardi  
astro infir  
sua.

Alhaffer  
quid ex  
rapio.

riqorum saccharum esse non potest, eo quod Galenus suæ ætatis saccharum id efficere non prodiderit. Cuius tamen sententia (pace sua dixerim) experimento minime respondet: à quo non discedens Galenus libro VII I. simplicium medicamentorum, de saccharo ita scribit. Sacchar, quod ex India, atque feliciter Arabia conuehitur, in calamis, vt aiunt, cōcrefcit, & ipsum mellis est species: minus certe nostrate dulce, sed adsimiles ei vires obtinens, quod ad abstergendum, desiccandum, & digerendum attinet. Porro quatenus nec inimicum stomacho est, ceu nostras, nec sitim afferens, eatenus ab illo substantia differt. Quibus Galeni verbis clarum est, quod cum saccharum melle minus sit dulce, minus etiam calidum sit necesse est. Eaque propter asserit Galenus, saccharum non perinde ac mel, sitim excitare: non tamen quod nulla ab eo sitis excitetur, vti Fuchsius interpretari videtur. Quinetiam idem Galenus libro VII I. capite IIII. methodi medendi. saccharum inter ea connumerat, quæ febrilibus exhiberi possunt. His igitur rationibus, & auctoritatibus adductus sum, vt certo crediderim, antiquorum saccharū ab istdem arundinibus emanare, à quibus vulgare nostrum exprimitur: sed hanc tantum inter se differentiam esse, quod à natura factū sit nostrate factitio longè tenuius. Ideoque Auicenna Zuccharum (inquit) tabaræ frigidus est, & subtilis. Hoc laudibus extulit Paulus, & post ipsum Auicenna Archigenis auctoritate Sal Indum ipsum appellans, ad linguæ scabritiem, ariditatemque in acutissimis febribus. Sed eo nos hac ætate caremus, quod amplius non asseratur. quanquam ego non ita pridem à viris fide dignis accepi, qui diui Thomæ insulam, itemque Mederam lustrarunt, adhuc iis in locis saccharum inueniri in arundinibus sacchariferis concretum (illi non dissimile, quod arte fit, & candidum cognominatur) postquam ab illis sponte emanarit gummi modo. Quod autem adferri deserit, non aliud in causa esse existimamus, quam quod hodie paucum admodum proueniat. Siquidem Dioscoridis, & Galeni tempore, quo ad eos copiosum conuehebatur, cum adhuc non innotuisset exprimendi ratio, necesse quidem erat, vt arundines sacchari liquore prægnantes, eum annis compluribus adoleuissent, & salcem nunquam expertæ essent, per se liquorem exdarent, veluti innumeris arboribus gummi, & resinæ emanat. Proinde non mirum, si eius à natura facti antiquis fuerit vbertas. Sed postquam lucri dulcedo, fulgentisque auri scis docuit homines artem modumque, quo saccharum coactis, decoctis, pressisque arundinibus copiosius elicere, factum est, vt Indi quotannis vniuersos inciderint calamos, & æterum quotannis fuerint. Hinc igitur euenit, vt nullis remanentibus, quæ saccharo plerum annorum ætate surgant, naturæ impedita sit operatio,

deperditumque hac de causa sit antiquorum saccharum. Cuius vice eo recentiores vtuntur, quod officina candidum cognominant, arte factum, pellucidum, falsis fossitij modo, dentibusque fragile, vt antiquorum saccharum vndeque referat. Competit perinde ac illud, scabritiei linguæ, pectorisque asperitatibus. Verum ad hæc id præstantius est, quod in fistilibus, vbi violaceum Tulapium asseruatur, æstate concreuit: eo quod violarum diluti facultate humefceret, leniatque magis. Quod Græcis μέλι, Latinis Mel appellatur: Arabibus, Hael, seu Hassel: Italis, Mele: Germanis, Honig: Hispanis, Miel: Gallis, Myel. Quod autem Græcè ζάχαρις, Latine quoque Saccharum dicitur: Arabicè, Zuchar: Italicè, Zucchero: Germanicè, Zucker, Hispanicè, Azucar: Gallicè, Sucre.

Namina.

## CERA. CAP. LXXVI

CERA optima est subfulua, subpinguis, pura, odorata, & halitum quadam tenus melleum referens, natione Pontica, aut Cretica. Secundum locum obtinet candicans, & suapte natura pinguis: Candida fit hoc modo. Ex ea radunt album, syncerumque, atque transfundunt in vas. quod satis habeat marinæ ex alto petiæ, inperfoque nitri momento, decoquunt: cumque iterum, tertiove inferbuit, separatim vas refrigerant, ac ceræ pastillum eximunt, deterfa sorde, si qua forte adhæsit: tum denuo indita noua maris aqua feruet, vt retulimus: & vase dempto exigue, fundum ollulæ nouæ aqua frigida madefactum, in ceram summam suspensa manu intingunt, quò celerius concreseat, & quam minima portio extrahatur. Suscepto primo ceræ orbiculo, iterum vass inum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immitti debet, dum tota excipitur. Orbiculi lino confusi, interuacante spatio suspenduntur, & interdum continuo sub sole, noctu sub luna asperguntur, vsque dum perfecte albescant. Verum si eximius ille candor desideretur, eadē factitari, & identidem recoqui operæ pretium est. Nec desunt, qui pro marina, in muria quam acerrima semel, aut iterum excoquant:

dein



dein laguncula tenui, rotunda, ansam habente extrahunt: postea orbiculos substrato affatim cespite herbofo, infolant, donec candorem summum contraxerint. Præcipiunt hoc obundum munus vere, cum sol remissa vehementia humorem pariat, vt non facile liquetur. Cera omnis mollit, calfacit, modicè explet corpora: datur in forbitione dysentericis. ac milij magnitudine decem grana ceræ hausta, lac in nutricibus non patiuntur coagulari.

*Cera Sires  
ex Galeno.*

CERA, vt Galenus scriptis mandauit libro v 11. simplicium medicamentorum, medio quodammodo tenet calfacientium, refrigerantium, humectantium, & desiccantium. Habet verò quiddam etiam in crassum partium, atque emplasticum, quia nobrem non modò exicare, sed & per accidens humectare videri fortassis poterit, perspirationes videlicet prohibens. Quapropter aliorum medicamentorum tum excalfacientium, tum refrigerantium materia est. Ipsa autem per se ex genere fuerit debiliter concoquentium: nec tamen intrò in corpus assumpta, sed foris imposita. Siquidem paulum quiddam digerentis, calidioris, facultatis retinet, quæ plurima melli inerat. Eius nomen Græcum κηρί: Latinum, cera: Arabicum, Hamah: Italicum, cera: Germanicum, Vuachs: Hispanicum, Ciera: Gallicum, Cire.

*Nomina.*

#### PROPOLIS. CAP. LXXVII.

PROPOLIS eligi debet statim, odorata, styracem referens, in vehemēti ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere calfacit, & euocat: aculeos, & omnia infixa corpori extrahit: in vetere tussi suffusa proficit, impetiginis admota tollit. Ea in alueario rum foribus, cerosa naturæ inuenitur.

*Propolis  
considera-  
tio.*

QUANQVAM, vt hic Dioscorides inquit, & Marcus Varro libro tertio de re rustica, Propolis ea est cerosa materia, quæ in alueariis præforibus reperitur, seu, vt apertius dicam, præ spiraculis, vbi intrandi, exeundi quæ apibus patet aditus: tamen Plinius libro x 1. capite v 1. ita scriptum reliquit. Prima fundamenta comosin vocant periti, secunda pissoceron, tertia propolis. Inter coria, cerasque magni ad medicamina vsus. Comosis crusta est prima, saporis amari. Pissoceros super eam venit picantium modus, seu diluitor. Cera initium, plerumque è mitiore gummi. Propolis crassioris iam materiam, additis floribus, nondum tamen cera, sed

fauorum stabilimentum, quæ omnes frigoris, aut iniuriæ aditus obstruuntur: odore & ipsa etiam graui, vt quæ plerique pro galbano vrantur. Huius etiam meminit Galenus libro v 11. simplicium medicamentorum, sic inquit. Propolis extergentis, non ita valentis est facultatis, cæterum admodum valenter attrahentis: est enim essentia tenui. Porro exalfacit recessu secundo completo, aut certè tertio incipiente. Et vt idem quoque scribit libro 111. de compositione medicamentorum secundum genera, Propolis valentius attrahit, quam cuiusvis generis resina. Quamobrem illis in neruorum vulneribus medendis propolin admiscet. Cæterum cum propolis, cera, & mel, de quibus hic discitur Dioscorides, medicamenta sint omnia miro artificio ab apibus constituta, non ab re his quoque addendam fore duximus.

Apum historiam. A P E S igitur (vt Plinius auctor est) sunt & rustice syluestresque, horridi aspectu, multò iracundiores, sed opere ac labore præstantes. Sunt & vrbana, quarum duo genera. Optimæ breues variegæ, & in rotunditatem compactiles. Deteriores longæ, & quibus similitudo vesparum, etiamnum deterrimæ ex iis pilosæ. Apes odore fædos odores, procule fugiunt, sed & insectos. Itaque vnguenta redolentes infestant.ICIENTES pereunt: eliso enim aculeo interiora distrumpunt. Quin & morbos suapte natura sentiunt. Index eorum tristitia torpens: & cum ante fores in teporem solis promotis alix cibos ministrant: cum defunctas progerunt, funerantiamque more comitantur exequias. Reges habent, pluresque inchoantur, ne desint. Postea ex his soboles cum adula esse cœpit, concordii suffragio deterrimos necant, ne distrahan agmina. Duo eorum genera: melior rufus, quam niger, variisque. Omnibus forma semper egregia, & duplo quam cæteris maior: pennæ breuiiores, crura recta, ingressus celsior: in fronte macula quodam diademe candicans. Multum etiam nitore à vulgo differunt. Cum rex procedit, vnà est totum examen, circaque eum conglobatur, cingit, protegit, cerni non patitur. Reliquo tempore cum populus in labore est, ipse opera intus circuit, similis exhortanti, solas immunis. Circa eam facillres quidam, listoresque assidui cluodes auctoritatis. Procedit foras non nisi migraturo examine.

Id multò intelligitur antè aliquot diebus murmure intus strepente, apparatus indice diem tempestiuum eligentium. Si quis alam eide trunget, non fugiet examē. Cum processere, se quæque proximam illi cupit esse, & in officio conspici gaudet. Fessum humeris subleuant: validius fatigatum ex toto portant. Si quæ lassitas deficit, aut fortè aberrauit, odore prosequuntur. Vbiunque ille condesit, ibi cum ctarum castra sunt. Duce prehensò totum tenetur agmen: amissò dilabatur, migrant ad alios. Esse vique sine rege nō possunt. Inuitæ autem intermunt eos, cum plures fuere, potiusque nascuntur domos

*Ex Galeno  
ex Galeno.*

*Adm. di.  
fidelat.*

*Apū rex,  
& regi-  
men.*

domos diruunt. Rege cōsumpto, mœret plebs ignauo dolore: non cibos cōcūhant, non procedunt, sed tristi tantum murmure glomerantur circa corpus eius. Subtrahitur itaq; deducta multitudo: nec alias spectantes exanimem luctum non minuant. Tunc quoq; si subueniant, fame moriuntur. Gaudet Apes aeris plaustrum, ac tinnitum, amoenissimisque locis, & fragrantibus herbis. Harum ergo causa prope alucaria oportet ferere thymum, apiastrum, rosam, violas, lilium, cythum, fabam, eruium, cunilam, papauer, conyzam, casiam, melilotum, melisso-<sup>10</sup> phylum (malum legere myriophyllum) cerinthem. Est autem cerinthe folio candido, incuru- uo, cubitalis, capite concavo, mellis succū habente. Horum florum audissimæ sunt, atque etiam synapis, quod miremur, cum oliuæ florem ab his non attingi constet. Ideoque hanc arborem procul esse melius est, cum aliquas quàm proximè feri conueniat: quæ & euolantium examina inuenit, nec longius abire patiuntur. Cornum quoq; arborem caueri oportet: nam flore eius degustato (etsi si nobis profuua sit) a'uo concita moriuntur. Remedium forba confusa è melle præbere his, vel vrinam hominum, vel boum, aut grana punici mali am'neo vino confersa. Amant & genistas circumferi aluearibus, sique gratissimum. Mira apum prudentia, earumq; operis obseruatio, vt annotauit Aristomachus Solensis, quem admirabili admodum diligenter duodecexaginta<sup>30</sup> annis, apum amore captum, nihil aliud egisse tradunt. Ratio autem operis ita se habet. Interdū statio ad portas more castrorum: noctu quies in matutinum, donec vna excurret omnes gemino, aut triplici bombo, vt buccino aliquo.

Tunc vniuersæ prouolant, si dies mitis futurus est. Prædiu'nant enim ventos, imbresq; & tunc se continent testis. Itaque temperie calli (hanc enim inter præscita habent) cum agmen ad opera processit, alix flores aggerunt: pedibus, alix aquam ore, guttasq; lanugine totius corporis, quibus est. Quarum adolecentiores<sup>40</sup> ad operam exeunt, & supradicta concuehant: seniores intus operantur. Quæ flores comportant, prioribus pedibus semina onerant, propter id natura scabra, pedes priores rostris, totaq; onestæ remeant: sarcina pandaræ. Excipiūt eas tenæ aut quaternæ, atq; exonerant. Sunt enim intus quoque officia diuisa: alix struunt, alix poliunt, alix suggerunt, alix cibum comparant ex eo, quod allatum est. Neq; enim separant vscutur, ne in æqualitas operis, & cibi<sup>50</sup> fiat, & temporis. Struunt orā ea concameratione alui, textumq; vel vsque ad summa tecta deducunt, limitibus binis circa singulos arcus, vt aliis intrent, aliis exeant. Fauis superiore parte affixi, & paululum etiam lateribus simul hærent, & pendunt vna. Alueum non contingunt, nunc obliqui, nunc rotundi, qualiter possent alueus, aliquando & duorum generū, cum duo examina concordibus populis dissimiles

habuere ritus. Ruentes ceras fulciunt, pilaram intergerinis a solo fornicatis, ne desit aditus ad sarcientum. Primi ferè tres versus inanes struunt, ne promptum sit quod inuit furantè. Nouissimi maxime implentur melle: idèque auerso alueo faui eximuntur. Gerula secundos flatus capiant. Si cooritur procella, apprehensi pondusculo lapilli se librant. Quidam in humeros cum imponi tradunt. Iuxta verò terram volat in aduerso statu vespribus hebetato. Mira obseruatio operis. Cessantium inertia notant, castigant, mox & puniunt morte. Mira munditia. Amoluntur omnia è medio, nullaq; inter opera spurcitia iacent. Quin & excrementa operantium intus, ne longius recedant, vnum congesta in locum, turbidis diebus, & operis ocio egerūt. Cum aduersperasset in alueo strepunt minus, ac minus, donec vna circumuolant, eodem quo excitauit bombo, ceu quietem capere imperans: & hoc castrorū more. tunc repente omnes conticefcunt. Si fortè fortuna

apum vnuiuersum deperderet genus, facile reparari posset ex bienni vitulo, vt lib. 11. 11. Georgicorū clare docuit Virgilius, ita canens.

Exiguus focus, atq; ipsos contractus ad vsus Eligitur locus: hunc angustiq; imbrice tecti, Parietibusq; premūt arctis: & quatuor addūt Quatuor à ventis obliqua luce fenestras.

Tum vitulus bima curuans iā cornua fronte Queritur: huic geminæ nares, & spiritus oris Multa reluctanti obstruitur: plagisq; perpeo Tunsa per integrā soluantur viscera pellē. Sic postū in claufo linquunt: & ramea costis Subticiūt fragmēta, thymā, casiasq; vires. Hoc geritū zephyris primum impellentibus vndas.

Antè nouis rubet quā prata coloribus, antè Garrula quā tignis nidū suspendat hiruando. Interea teneris tepesfactus in ossibus humor Aestuāt: & visenda modis animalia miris, Trunca pedū primò, mox & stridētia pinnis Miscētur: tenuēq; magis, magis aëra capūt. Donec, vt æstius effusus nubibus imber, Erupere aut vt neruo pulsante sagittæ,

Prima leues inuent si quando prælia Parthi. De reparatione Apum hæc Genus Virgilius. Ceterum etiam apes in medicina vsu habent: quidem sicca & in puluerem contrita, his admixta, quæ ad id faciunt, ex oleo, & cera inunctis alopecis capillum restitunt. *Propolis* vt Græcis, ita etiam Latinis Propolis appellatur: Arabibus, Mum, vel Isach alcut: Italis, Propoli: Germanis, Vorkstoff: Hispanis, Betum de colmena, Gallis Cire vierge.

TRITICVM. CAP. LXXVIII.

OPTIMA è tritici generibus ad secundæ valetudinis vsus habentur, quæ recentia, & iam perfectè adulta, colorem luteum referunt. dein sequuntur

f trimestr

Apes quæ  
huius generis  
sunt.

Mira apum  
in opere  
suo industria.

Apum re-  
paratio ex  
Virgilio.

Nomina.



trimestria, quæ nonnullis sitania nominantur. Itaq; crudes in cibis teretes tineas gignunt: canum morsibus profunt, mansa & imposita. Confectus eorû simlagine panis, plus alit, quàm cibarius. E tri-

mes trium farina panis, leuiorem cibû præbet, & qui faciliè in membra demâdetur. Farina eorum cum hyoscyami succo illinitur aduersus neruorum fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant: item contra interaneorum inflammationes: lentigines ex aceto mulso tollit. Furfures autem in acri aceto decocti, turgentes mammas sedant: viperaum ictibus auxiliantur: & torminosos profunt. Farinaceum fermentum calfaciendi, extrahendiq; vim habet: priuatim callos pedum, clauosque extenuat: & cætera tubercula furunculosa, quæ ex sale concoquit, & aperit: Sira-niorum farina, contra venenatos ictus cum aceto, aut vino commodissimè illinitur: eadem si decocta in glutini modum delingatur, cruentis excretionibus proderit: contra tussim, & exasperatas arterias, cum mentha & butyro decocta, efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsâ, aut hydrelæo decoquatur, omnem discitit inflammationem. Panis & crudus, & coctus cum aqua mulsâ inflammationes omnes illitu mulcet, cum emolliat, & quadantenus refrigeret: sed herbis, succisve huic rei accommodatis admisceatur. Verus panis aridus, adiectis conuenientibus, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus, illitu vetustas impetigines sanat. Glutinium ex simlagine, & polline, quo charra glutinantur, sanguinem ex-

creantibus prodest, si liquidius, ac tepidum cochlearis mensura detur forbendum.

TRITICI genera (vt Theophrastus auctor est libro VIII. capite IIII. de planta: um historia) plura norantur, cognomina ex locis sortita, vt Aphricum, Ponticum, Thracium, Asyrium, Aegyptium, Siculum. quæ & colore, & magnitudine, & specie, & proprietate inter se differunt. Quædam vel aliunde cognominata sortiuntur pro suis viribus tum aliis, tum vel maxime quæ ad cibum pertineant, vt cachrydias, flengys, alexandrinus. quorum omnium differentias in supradictis colligere licet. Nec verò ab re fuerit, si illa quoque pro differentis capies: & aliud præcox, aliud serum: & aliud auctum amplum multumque reddens, aliud ieiunum quoddam parumque ferens: & aliud spicam grandiore effundens, aliud paruum: & aliud diu in folliculo manens, aliud aptum breui absolui, vt Aphricum: & aliud culmo tenui constans, aliud crasso, quod etiam ipsum Aphricum datum est: crasso tamen & cachrydias dictum consistit. Item aliud tunicis paucis, aliud multis vestitur, vt Thracium: & aliud vniculatum, aliud multiculatum, & magis, minusque. Adde etiam si quid aliud his, aut prædictis, ratione virium proximum est: eiusmodi namque differentie naturaliores profecto appareant. Quibus & trimestrium annumerari quidem ad consummationem, sed inuentu rarissimum est. Et bimestria verò quædam habentur, quæ ex Sicilia & in Achaia aduecta sunt: sed hæc paucum reddunt, parumque fecunda habentur: quanquam cibo facilia, & iucunda sunt. Nascuntur & alia quædam genera in Eubœa, & præcipue apud Caristum. Trimestria verò permulta, & vbique habentur: leuia hæc, & parum fecunda, vniculata sunt, acque in totum infirma. Leuissimum igitur triticum, quoad simplici ratione agere licet, Ponticum est: ponderosius ex iis, quæ in Græciam aduehi solent, Siculum datur. Sed eo ponderosius, quod Bæonia fert. Indicium asserunt, quod athlete, qui Bæotia ternos semisextarios vix possint consumere, cum Athenis fuerint, faciliè quina consumunt. Leue faris & quod in Læconico agro conficitur. Horum igitur causa in terris cæloque intelligi debet. Nam & Alia vltra Bactra quodam in loco adeo grande

*Tritici genera ex Theophrasto.*

*Triticum  
Italicum.*

grande frumentum ferit tradunt, vt nucleis oli-  
ux sui æquiparent magnitudinis grana singula.  
In Pistoris autem dictis adeo firmum nasci af-  
firmant, vt si quis plus comederit, disrumpatur  
necesse sit. Hæcenus de tritici generibus  
Theophrastus. Cæterum Plinius Italicum  
nostrum omnibus prætulit libro x v i i i. ca-  
pite v i i. his verbis. Tritici genera plura,  
quæ fecere gentes. Ital. co nullum equidem  
comparauerim candore, ac pondere, quo ma-  
ximè decernitur. Montanis modò comparetur  
Italiæ agris exterum. Hæc fuisse senten-  
tiæ Alexandro magno regnante, cum claris-  
sima fuit Græciæ, atque in toto terrarum orbe  
potentissima: ita tamen, vt ante mortem  
eius anni ferè centum quadraginta quinque  
Sophocles poeta in fabula Triptolemo fru-  
mentum Italicum ante cuncta laudauerit, ad  
verbum translata sententia.

Et fortunatam Italiam frumento canere can-  
dido.

Quæ laus peculiaris hodie Italico est. Quo  
magis admiror, posteros Græcorum nullam  
mentionem huius fecisse frumenti, hæc Plin-  
ius. Nec sanè mirum videri debet, quòd  
Græcus ille Sophocles Italicum frumentum  
cæteris prætulerit. Quandoquidem natura Ita-  
los adeo præ cæteris adamauit, & moribus,  
ac legibus, omnique ornatu ad politicè (vt ita  
dicam) viuendum instituit, vt meritò etiam  
frumentum omnium præstantissimum in eor-  
um alimentum procrearet: quemadmodum &  
alia multa, quibus Italia plerisque supe-

*Triticum* rat gentes. Triticum autem, ex quo om-  
nium optimus fit panis, eligi debet fractu  
panis op-  
mi confi-  
sienti ra-  
tione.  
nium optimum fit panis, eligi debet fractu  
panis op-  
mi confi-  
sienti ra-  
tione. Nam ple-  
runque euenit (teste etiam Galeno libro primo  
de alimentorum facultatibus) vt quod  
foris sanum, densumque apparet triticum,  
intus rarum, laxum, albumque conspiciatur,  
quod vtrique plurimum furfuris habet. Quo fit,  
vt panes furfuracei inde confecti infirmum non  
modò præbeant alimentum, veràm etiam ven-  
triculum ipsum extremè repleant. Farina  
porro ea cæteris præstat, quæ non ad sum-  
mum molita, non noua, non longi temporis,  
& crassi furfuris fuerit. Nam quæ superflue  
molitur, furfuraceos facit panes: & quæ re-  
centior est, adstititiam mole caliditatem re-  
tinet: quæ vero iandiu molita fuit, puluere,  
siccitate, aut viroso aliquo odore labefacta-  
tur. Hæc deinde, dum fit panis, optimæ est  
affocianda aqua, cæque subigenda, quæ fluxerit  
è laudatissimis fontibus, pellucida sit, non pa-  
lustris, neque cœnum, aut limum redeat.  
Quin etiam fermentum admiscendum fuerit.

triticeum, non antiquum, mediocri quantita-  
tis, ne inde ipsius abundantia panis acorem  
contrahat. Incipiendum est & salis albi parum,  
vt panis sapidior efficiatur. Post hæc farina ita  
subacta, optimè manibus pinfitur: mox massa  
illa in panes mediocri magnitudinis digeritur,  
qui postquam abunde creuerint, & fermentati  
fuerint, in cibum prius æqualiter calefacti,  
dein à cineribus, & prunis expurgatum deco-  
quendi immittuntur. Sed furnus iustæ capaci-  
tatis sit oportet, ita vt quantitas panis propor-  
tione respondeat. Quippe quemadmodum  
modica panum quantitas in amplum cibum  
missa exiccat, ac comburitur: ita & magna  
in angusto simul compressitur, & decoqui  
nequit. Quamobrem panes (dicebat Gale-  
nus citato loco) ad concoctionem probatissi-  
mi sunt, qui plurimum fermentati, & probè  
elaborati in cibano igne moderato perco-  
quantur. Nam profusior ignis primo statim  
occurrit adurens, exteriorè superficiem in te-  
stæ modum indurat, crudis incoctis reman-  
entibus interioribus partibus. Vnde accidit,  
panem hunc visu iniucundum fieri, & duplici  
nomine prauum. quòd internè crudus sit, at-  
que illaboratus: externè verò siccus, & præ-  
satus. Qui autem longiore spatio vndiq; æqua-  
biliter præassatur, hic & probè in ventriculo  
concoquitur, atque ad actiones quæ coctionem  
consequuntur, accommodatissimas redditur.

Triticum in agris facillè degenerat in lolium:  
præsertim cum annus pluuus, frigidusque adue-  
nerit, vt in lolij mentione latius dicemus. Fit  
è tritici granis inter ferri laminas igne calefacti  
compressis oleum, quod ad vlcerum sinus com-  
mendant. Sunt etiam nympha, qui eo vtantur ad pe-  
dem, & menium rimas, quas frigoris excitaue-  
rit: item ad asperam cutem lauigandam. Meminit  
tritici Galenus libro v i i i. simplicium medi-  
camentorum, sic inquit. Triticum vt medi-  
camentum foris impositum, primi è ordinis  
exsiccantiū: non tamen nec reficere, nec  
refrigerare manifestò potest: habet verò etiam  
quiddam viscosum, & obstruens. Porro quod  
ex eo conficitur anylum, eo tum frigidius est,  
tum siccius. Quod verò ex pane fit cataplasma,  
vim habet magis digerentem, quàm quod ex tri-  
tico: nimirum cum & sale, & fermentum pan-  
is adiuncta habeat: quippe cum fermentum  
vim habeat attrahendi, digerendi ea, quæ in  
alto resident. Et primo de facultate alimen-  
torum: In cibum assumptum (inquit) agrè  
concoquitur, flammam excitat, laborem ventri-  
culi infert, & caput vaporibus tenet. Tri-  
ticum sic Latine dicitur: *trigois* Græcè: Hen-  
ta, Henca, siue Hancha Arabicè: Grano, Itali-  
cè: Vueyfen, Germanicè: Trigo, Hispanicè:  
Fournent, Gallicè.

*Oleum è  
tritico.*

*Tritici Vi-  
cer ex Ga-  
leno.*

*Nomina.*

H O R D E U M .  
CAP. LXXIX.

HORDEVM.



HORDEVM  
est candidum,  
purumque. Id  
minus, quam  
triticum alit.<sup>10</sup>  
Pisana tamen  
ob cremorem  
in decoctione  
redditum, plus  
alimenti præ-  
bet, quam po-  
lenta ex hordeo  
facta. contra a-  
crimonias, at-  
que gutturis sca-  
britias, exulce-  
rationesque pol-

let: quibus etiam triticea pisana præsi-  
dio est: sed plus alit, magisque urinam  
mouet. Lac abunde suppeditat, si cum  
foeniculi semine decocta forbeatur. Hor-  
deum absterget, urinam ciet, inflationem  
parit, stomacho aduersatur, tumores  
concoquit. Farina hordeacea decoqui-  
tur in multa aqua cum fico, vt inflam-  
mationes, collectionesque discutiat: du-  
ritias cum resina, & fimo columbarum  
concoquit: cum meliloto autem, & pa-  
paueris calyce dolores finit, qui latus  
excruciant: aduersus intestinorum in-  
flationes cum lini semine, fœnogræco,  
& ruta illini iuuat: strumas cum pice li-  
quida, cera, oleo, & impubis pueri urina,  
ad concoctionem perducit: & cum  
myrto, aut vino, aut malicorio, aut syl-  
uestribus pyris, aut rubo, alui profluuium  
sistit: podagricis inflammationibus cum  
cotoneis, aut aceto prodest: decocta in  
acri aceto, modo quo hordeaceum ca-  
taplasma, & calida imposta, lepris me-  
detur. Cremor verò farinæ ex aqua, at-  
que cū pice, & oleo decoctus, puri mo-  
uendo efficitur aceto subactus, itidem  
& cum pice contra articularum fluxio-  
nes prodest. Farina ex his aluum cohi-  
bet, inflammationesque mitigat.

NON minus Hordeum in Italia vulgaris no-  
titia est, quam triticum. Est autem (vt Theo-  
phrastus libro VIII. capite IIII. de planta-  
rum historia memoria prodidit) in hordei ge-  
nere differentia, quippe quod aliud binis ver-  
sibus, aliud ternis, quaternisque, cūque plu-  
rimū senis: est enim vel eiusmodi quoddam ge-  
nus. Quod verò pluribus constituitur versibus,  
hoc semper ferè spissius, postūque artius con-  
stat. Magnam & Indicum differentiam facit:  
quandoquidem ramis natum sit brachiari, vt  
proposui. Et spica verò aliis grandiores, rari-  
oresque consistit: aliis minores, frequentioresque:  
& aliis distantes à foliis, aliis proximiores,  
vt Achilleis cognomine. Et hordeorum ipsorum  
aliud rotundius, minusque: aliud oblongius, ma-  
iusque, atque in spica rarius. Item aliud candi-  
dum, aliud accedens ad purpuram, quod & fa-  
rinam reddere copiosius creditur: & contra hye-  
mem, & statum, & in totum contra cæli muta-  
tiones candido validius esse videtur. hæcenus  
Theophrastus. Oritur & in Gallia hordeum,  
quod cantherinum dici putauerim, quia folli-  
culo castratum enascitur. Galli qui ferunt, mun-  
dum vocant hordeum, quod sponte granum  
gluma cecidit, in reliquo autem nō nisi ægrè  
deglubitur. Hordeum magis, quam triticum,  
rubiginem sentit, minusque tolerat imbricium  
impetus. Siquidem infestis imbris, aut vli-  
ginosis locis, aut longiore pluuia dilutis satum  
in lolium degenerare affirmant. Hordei me-  
minit Galenus libro V. I. simplicium medi-  
camentorum, vbi ita scripsum reliquit. Hor-  
deum primi est ordinis in excicando, & refri-  
gerando: habet etiam paxillum absterfionis.  
Paulo etiam plus desiccatur, quam farina fabacea  
cui non insint cortices: cætera verò similia  
sunt foris venteribus. In cibo autem hoc fabis  
præstat, quod statuosam naturam exuat: fabis,  
quantumcunque coxeris, statuosam naturam rema-  
net: sunt enim crassioris essentia, quam hor-  
deum. quamobrem eo plus etiam alunt. Porro  
quoniam vtrumque paulum à medio recessit,  
multo sunt vsui. Nam talia medicamenta multis  
aliis miscentur, ceu materiam quædam: itaque  
etiam cera, & oleum, non paucis medicamentis  
coniunguntur. Aliphiton verò, hoc est polenta,  
multo plus hordeo desiccatur. Et primo de fa-  
cult. alimentorum sic inquit. Hoc item semen  
in vsu frequentius apud homines est, quod non  
eandem cum tritico habet facultatem. Siquidem  
illud palam calfacit, hoc verò non modò non  
calfacit (quo modo nonnulla, quæ in medio sunt  
calfacientium, & refrigerantium, vt amyllum,  
& elonus panis) sed quoquo modo ipso vtare,  
sue panes ex ipso feceris, sue piscinam coxeris,  
sue polentam paraueris, vim quadam refrige-  
randi habere cernitur. Dissidet præterea succi  
specie à tritici natura hordeum: nam ex succis,  
quos vtrumque semen gignere natum est,  
qui quidem est tritico in nobis progenit, cras-  
sus, & viscosus est: qui ab hordeo, tenuis, ac  
nonni

Hordei fa-  
cultates  
ex Gal.

nonnihil deteriorius. Nulla igitur apparandi ratione hordeum vnquam calcit: sed variè pro modo preparationis humectat, ac desiccatur. Etenim manifestè cernimus, polentam ex tosto hordeo factam siccare: pristinam contrà humectare, si quidem vt decet fuerit parata, hoc est, cum in coctione quam plurimum intumuerit, postea igne lento per multum otium in chylum fuerit redacta. hæc Galenus. Cæterum cū

recentiores medici Galeni pristinam non ritè, & ad vnguem parare nouerint, eius vice inter-

grum deglubitum hordeum accipiunt, & tantisper decoquunt, dum pulvis speciem referat: tunc duntique deinde, & tenui incerniculo percolant, modò faccharum, modò dulcium amygdalarum, modò melopeponum, ac papauerū feminis cremorem, pro morborum ratione addentes. Manardus verò Ferrariensis ætate nostra acutis morbis minimè competere antiquo rum pristinam, minùque recentiorum existi-

mat: quòd, vt ipse asserit, Itali huic cibo à tene-  
ris non assueuerint, quòdque nostri vsus hor-  
deum antiquorum hordeo facultate sit longè  
inferius. Cuius tamen sententiæ non vulgari  
ratione ducti medici Hippocraticam, Galeni-  
càmque doctrinam sequentes, minimè adstipu-  
latur. Porro hordeaceus panis præter id, quòd  
ventriculo laborem inferat, frigidus, lentosque  
succos generet, parum nutrit, stat usque gignit:

quanquam asserunt nonnulli podagricis hordeaceum panem peridoneum esse. Sed cum  
polenta speciatim ex hordei farina fiat, inter-  
ponaturque sæpius à Dioscoride simplicibus  
medicamentis, vt omnibus palam sit, quidnam  
existeret polenta apud antiquos, non alienum  
duximus hic de ea differere. Polentam veteres  
pluribus modis faciebant, vt Plinius est au-

ctor libro x v i i i. capite v i i. Græci  
enim perfusum aqua hordeum nocte vna sicca-  
bant, ac postero die frangebant: deinde molis  
frangebant. Erant & qui vehementius tostum  
rursus exigua aqua aspergerent, siccarèntque  
prius quam molirent. Alij verò virentibus  
spicis decussum hordeum recens purgabant,  
madidumque tundebant in pila, atque in cor-  
bibus eluebant: siccaturumque in sole rursus  
tundebant, & purgatum molebant. Quocun-  
que autem genere præparato vicenis hordei  
libris, cernas feminis lini, & coriandri felibras,  
salisq; acetabulo, torrentes ante omnia mi-  
sebant in mola. Itali verò sine perfusione  
hordeum tostum in subtiliorem formam mole-  
bant, iisdem additis, atque etiam milio. hæc ex  
Plinio. Cæterum altam rationè parandi polen-  
tam prodidit Galenus libro primo de alimèto-  
rum facultatibus. Vbi non ex alijs seminibus  
admixtis, vt Plinius tradit, sed ex hordeo tan-  
tum recenti, ac nouo mediocriter tosto lau-

darissimam fieri polentam scribit. Quare cre-  
diderim, iis medicamentis, quæ in Dioscori-  
dis, & Galeni scriptis polentam expetere in-  
ueniuntur, eam legitimè imponendam esse,

quæ ex recenti, & viridi adhuc hordeo mo-  
dicè tosto, & in farinam redactò parari debeat:  
quòd de hac vtunque intellexisse non dubi-  
tent. Hordeum quod Latinis, *orge* Græcis ap-  
pellatur: Arabibus, Xahaer, aut Shair: Italis, or-  
zo: Germanis, Gersten: Hispanis, Ceuada: Gal-  
lis, Orge.

*Nomina.*

ZYTHVM. CAP. LXXX.

EX HORDEO potus fit, cui Zytho nomen est. Is vrinam cit. renes, & ner-  
uos tentat: per membranis, præsertim ce-  
rebrum vesitibus, officit. Inflationem parit, vitiosum succum creat, ele-  
phantiasin gignit. Perfusum zytho e-  
bur, obsequiosum, & operi tractabi-  
le redditur.

CVRMI. CAP. LXXXI.

FIT ET ex hordeo potus, quem Curmi nominant. eoque sæpe potu  
pro vino vtuntur: verum dolore  
capitis mouet, malum succum gignit,  
neruis nocet. Consimilia etiam po-  
tus genera ex tritico fieri solent, in Ibe-  
ria, quæ occidentem spectat, & Bri-  
tannia.

ZYTHVM, quantum ex Dioscoride  
colligi potest, potus sine fuerit ex macerato  
hordeo, vel tritico paratus, illi maximè si-  
milis, qui aquilonaribus regionibus Ceruisia  
appellatur. Siquidem huius rei testis est Plinius  
libro x x i. capite vltimo, vbi sic  
inquit. Et frugum quidem hæc sunt in vsu  
medico. Ex iisdem sunt & potus: zythum in  
Aegypto: cælia, & ceria in Hispania: ceruisia,  
& plura genera in Gallia, aliisque provin-  
ciis. hæc Plinius. A zytho parum differt Cur-  
mi, quòd & ipsum paretur è frugibus, nimi-  
rum hordeo, triticoque in aqua maceratis, bi-  
baturque vini loco. Quamobrem credendum  
est, nil aliud zythum, & curmi fuisse anti-  
quis, quam Ceruisia, quam loco vini bibit  
hoc xuo vniuersa regio septentrionalis: nempe  
Germania, Bohemia, Polonia, Cimbria,  
Gallia, & alie agentes Europæ regiones. Nec  
aliam inter zythum, & curmi crediderim esse  
differentiam, quam in consueendi ratione,  
cum eorum vtunque fiat ex eadem fruge. Si-  
quidem consueendi ratio vno, vel altero mo-  
do adhibita, rerum facultates & auget, &  
imminuit, cum plus, vel minus coctura adhi-  
bent artifices, quemadmodum etiam hæc tem-  
pestate in Germania euenit. Nam est omnes

illi potus ex hordeo, vel erico parentur, diuersa tamen est apperandi ratio, cum saporibus inter se differant. Aliæ nanque dulces, gratæ; gustui sunt aliz verò amaræ, austeraq; habentur, quinetiam aliz turbidæ, aliz claræ pellucidæq; cernuntur. In Bawaria antequam potus suos conficiant, hordeum, & triticum macerant lupulorum decocto. Quo fit, vt non leui plectatur pœna, qui lupulos secuerit, vel deperderit. Serunt enim Bawari lupulos, coluntque hanc ob causam, vt nos vites, demetuntque eorum flores, & fructus statutis temporibus: quandoquidem eorum decocto macerata fruges, non modò fermentantur, sed & vini speciem induit. Quapropter potus inde confectus gustatu gravior euadit. Inebriat is largius sumptus, quemadmodum & vinum, perduratque eius temulentia longè diutius, quod crassior, concoctusque difficiolor sit, quam vinum. *zæ* sic Græcè, vt Zythum item Latine, & Italicè Zitho vocatur.

Nomina

ZEA. CAP. LXXXII.



**ZEA** duorum generum est. vna simplex: altera in geminis putaminibus grana bina iuncta gerit, ob id dicoccos appellatur. Plusquàm hordeum alit, ori grata. digeritur in panificia, minusquàm triticum alens.

Zea consideratio.

**N** 1 s 1 Zea, de qua hic differit Dioscorides, illud fuit frugis genus, quod Itali partim Spelta, partim Pirra vulgò dicunt, aliam quidem frugis speciem provenire in Italia non facile crediderim, quæ legitimâ referat zeam. Verum enimvero quòd zea, Italica sit spelta, facile ex Dioscoride coniectari potest, quòd scripserit duplicem esse zeam, quarum vna simplex, altera dicoccos appellatur, eo quòd in geminis putaminibus grana bina gerat. Nam & Spelta apud Italos duum est generum: vna spicas profert simplicibus granorum versibus: altera verò iis duplicibus constat, in quibus singulus folliculus duo concludit grana. Zeam hanc quidam, vt Foroiulenses, Pirra farrâ vulgò appellant, quòd ex ipsius deglobatis granis farris mo-

do halicam conficiant. Plinius præterea libro x v i i i. capite v i i i. zeam esse Italiz in Campania maximè, & semen vocari ait. Id quod manifestè ostendit, cum zeâ fuerit copiosa fruges in Italia, facile in hunc vsque diem eius perdurare prouentum. Quod cum ita esse certò credam, nil aliud antiquorum zeâ esse potest, quàm spelta nobis vocata. Hanc Hetrusci antiquos quidam tenus secuti appellant vulgò biada. Nam quemadmodum hoc nomen semen, omnibus feminibus est commune: ita biada, quæ idem est, quod seges, cunctis segetibus, & frugibus communiter aptari potest. Sunt & apud Insulres, qui Speltam, algam quasi alicam vocent, quod facile attestatur hanc esse zeam. Siquidem & veteres deglobitam zeam halicam appellauerunt. Zeam meminit Galenus libro v i. simplicium, medicamento- rum sic inquit. Zea vniuersa sua facultate quemadmodum in medio est tritici, & hordei. Itaque ex illis cognoscatur. Eius nomen Græcum *zæ*, Latinum, pariter & Italicum zeâ: Arabicum, Hais: Germanicum, Speltz, S. Peters korn, Kin: korn, & Dinkelkorn: Hispanicum, Spelta: Gallicum, Espeltra, & Espeautre.

Zea vini ex Galeno, Nomina.

CRIMNON. CAP. LXXXIII.

**CRIMNON** crassior est ex zeâ, triticòque farina, ex qua pultem faciunt. Abunde alit, † sed ægrè conficitur: alium vehementius adstringit, si zeâ, ex qua fit, prius torreatur.

**CRIMNON** crassior *zæ*, aut tritici farina exiit apud antiquos, quâ ad pultem conficiendam utebantur: quaque loco panis diutius victitauerunt, vt Plinius est auctor libro x v i i i. capite v i i i. *Crismnon* id Græci, quod etiam Latini Crimnon, & Hispani Farina atorcolada, aut Rolum vocant.

Crimni consideratio. Nomina.

† Neque Ruellum, neque communem, vulgaticamque Græcam lectionem hic secuti sumus: sed Marcellum, qui probatissimi codicis testimonio non *Crismnon*, quòd facile conficiatur, sed *Crismnon*, quòd ægrè concoquatur, legendum putat.

OLYRA. CAP. LXXXIII.

**E I D E M** *zæ* generi † olyra adscribitur, sed minus aliquantò nutrit. In panes, vt zeâ, cogitur. Fit quoque ex olyra crassior farina, quam Græci crimnon vocitant.

OLYRA

*Olyra com-  
sideratio.* OLYRAM zea esse speciem, Dioscoridis testimonio, ambigit nemo, tamen hac ætate nõ feratur in Italia. Ideoque Galenus isdem Olyram pollere facultatibus ait, quibus & zea: is enim utranque inter triticum, & hordeum medium tenere temperamentum asseruit. Adducitur autem Marcellus, ut ferè credat, olyram à secale vulgò vocato, è quo rustici alpium cultores panem conficiunt, minimè differre. Qua in re Plinium sibi alioqui familiarem oscitanter legisse demonstrat, cum non animadvertit seorsum, ac differenter scripsisse Plinium de olyra, & secale, quod speciatim farraginem appellavit libro x v i i i. Nam cap. x. ex arinca, quæ Græci olyram vocant, fieri dulcissimum panem scribit. At x v i. ex secale deterriumum, & tantum ad arcendum famem vilem. In eodem versatur errore Otho Brunfelsius eo compendio, in quo sibi omnia Dioscoridis simplicia medicamentà declarasse, nobis autem confudisse videtur. Siquidem is inter alias ineptias asserit olyram omnino esse secale. Ad hæc non possum non admirari Hermolaum, Manardum, & Ruellium alioqui doctissimos viros: quippe qui vno ore fateantur, olyram Plinio siliginem nuncupari, cum is speciatim de siligine, & olyra, tanquam de rebus inuicem discrepantibus scripsent libro x v i i i. capite octavo, nono, & decimo. Quandoquidem is pro Siligine intelligit quoddam præstantissimum frumenti genus, ex cuius farina veteres panem candidissimum, lenissimumque conficiebant pro Olyra autem aliam frugis speciem, ex qua dulcis fiebat panis, vocatq; hanc Arincam, sicuti etiam libro x x i i. capite vigesimo quinto, non (ut ij quidam asserunt) Siliginem. Horum sententiam refellit acutissimus Galenus libro primo de alimentorum facultatibus, ubi de pane agens, inquit. Panis quidem syncerissimus cum à Romanis, tum ab omnibus ferè, qui illorum subiacent imperio, siliginem vocitur. Nam siliginis, quæ Latina inflexione siligo dicitur, Græca vox non est, nec apud illos alia habetur. Quod minimè dixisset Galenus, si olyra, & siligo idem fuissent: cum olyra Græcè planè sit vox. Ex quibus colligi potest, quod si olyra, & siligo idem existissent, nequaquam affuisset Galenus, siliginem apud Græcos carere nomine. Hallucinantur itaque non solum qui putant veterum siliginem, & olyram esse idem, sed & qui existimant olyram esse secale, quam Plinius farraginem, nos verò vulgò Segala appellamus. Siquidem præter rationes, & auctoritates à nobis adductas, id etiam experimento falsum esse manifestè deprehenditur, quod panis siliginis Galeno purissimus, candidissimus, & omnium ad alendum apissimus reddatur. Apud nos verò impurissimus sit nigerri-mus, & ad alendum imbecillissimus, qui ex secale, vel farragine conficitur. Zea species *ayya* Græcis, Olyra similiter Latinis appella-

tur, quemadmodum & Italis: Germanis, Roken, & korn: Hispanis, Centeno blanco: Gal-lis, Seigle blanche.

† Ne quis frustra quærat Siliginis caput, lectorem admonitum volumus, hic nos minimè secutos esse Ruellium, qui *ayya* siliginem vertit: sed Græcam vocem retinuisse, quod olyram à siligine planè differre censamus, ut in commentario ostendimus.

ATHERA. CAP. LXXXV.

ATHERA ex zea fit tenuissimè molita. Est autem forbitio, quasi liquida pulcicula, infantibus conueniens, & cataplasmatis efficax.

C v m Dioscorides, satis superque declaraverit, quid sit Athera, necessarium quidem non duximus de ea plura scribere. Veruntamen illud ignorandum non est, quod nonnulli auctores sunt, qui Atheram etiam fieri asserant ex tritico, olyra, & amylo. Hæc Germanis vulgò Mofa nuncupatur: vtunturque ea plurimum non modò infantulorum lactetium cibis, quem admodum nos pane in aqua decocto, sed & quotidianis mensis, quam ex farina, lacte, & butyro parant, ut ij quidam norunt, qui diu in Germania vixi sunt. Quæ *adēya* Græcè, Athera item Latine, & Italicè nominatur: Germanicè, Muos: Hispanicè, Papas, Gallicè, Boulie.

TRAGOS. CAP. LXXXVI.

TRAGOS quandam halicæ frugis figuram gerit. Multò minus, quàm zea nutrit, quod multum aceris habeat: quare ægrius conficitur, aluimque magis emollit.

TRAGOS, quem aliqui halicam, nonnulli verò far notis referre asserunt, hac ætate, quod ego sciam, non prouenit in Italia. Acquoniam (ut Plinius inquit lib. x v i i i. cap. x.) ex oriè te peregrinus nobis inuectus erat, vnde nostro etiam ævo innumera deferuntur plantæ, mirū quidem non est, si tam longo temporis tractu, relicto Italico cultu, in proprium redierit solum, ex quo primum ad nos aduehi cæpit, ut in aliis quæ plurimis euensis comperimus. Nomen eius Græcum *τράγος*. Latini quoque Tragus: Arabicum, Sult: Germanicum, Hamelkorn: Gallicum, Double turguet.

AVENA. CAP. LXXXVII.

AVENA genicula quædam habet: folio, & stipula triticum imitatur: & in cacuminibus dependentes paruulas veluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, vile ad cataplasmata,



vti hordeum. Pulte huius alius fistitur.  
prodest tussientibus in forbitione fucus.

*Auena cō  
sideratio.*



*Auef-  
culas ex  
Gal.*

quam in Athera paulò superius retulimus. Bromos, id est, Auena (vt Galenus memoriæ prodi-  
dit libro v. i. simplicium medicamentorum)  
vnum est ex leguminibus: verum vt medicamē-  
tum similem hordeo vim obinet. Nam illitum  
desiccat, & digerit mediocriter, & sine morsu.  
Temperiem autem habet paulò frigidiorē.  
Nonnihil etiam adstrictiōis obinet, vt ventris  
profluvia iuuet. Et primo de alimentorum fa-  
cultatibus: Hoc semen (inquit) in Asia perfre-  
quens est, & potissimum in Mysia, quæ est supra  
Pergamum, vbi & typhae, & olyra vberimus  
est prouentus. Iumētorum autem est alimentū,  
non hominum: nisi vtrique aliquando extrema  
fame, ad panes ex eo quoque semine facien-  
dos compellantur. Citra famem autem coctum  
ex aqua effusum cum vino dulci, aut sapa, aut mi-  
so. Cæterum Auenæ farina (vt Plinius adnota-  
uit libr. x x i. cap. x x v.) decocta in aceto  
nzuos tollit. Seges hæc, quæ *βλαυα* Græcè,  
Auena Latine vocatur: Arabice, Cartamum,  
sive Churtal: Italice, Vena: Germanicè, Ha-  
bern: Hispanicè, Auena, & auea: Gallicè,  
Auoyne.

ORYZA. CAP. LXXXVIII.

ORYZA frugum generis est, in pa-  
lustribus, rigisque nascens. Mediocri-  
ter alit: sed alium supprimit.

*Oriza fa-  
cultas ex  
Gal.*

ORYZA adeò omnibus in cibis familiaris  
frequensque est, vt nulla prosus explanatione  
in ea describenda sit opus. Quin etiam de eius  
viribus nil aliud explicadum relinquatur, quàm  
quod literis mandauit Galenus, qui libr. v i i i.  
de simplicium medicamentorum facultate, sic

de ea paucis scribit. Oriza habet adstrictorium  
quippiam: quare mediocriter ventrem fistit.  
Et libro primo de alimentorum facultatibus:  
Semine hoc, inquit, omnes in sistenda alius vti-  
tur, ipsam eodem modo, quo halicam deco-  
quentes. Difficilis tamen quam halica confici-  
tur, & minus alit, ceu vtrique & in edendi sua-  
uitate ab ea quam plurimum deficit. Vt *apoc. Nomina.*  
Græcis, ita etiam Latinis oriza nominatur: Ara-  
bibus, Arz seu Arzi: Italis, Riso: Germanis,  
Reisz: Hispanis, Atroz: Gallis, Ris.

HALICA. CAP. LXXXIX.

ORYZA.



HALICA  
fit ex zea, quam  
dicoccon ap-  
pellauimus.  
Plus alit, quàm  
oryza: alium  
magis cohibet:  
stomacho lon-  
gè vtilior. De-  
cocta in aceto,  
illitæque lepras  
tollit: vnguis  
scabritias extri-  
cat: incipienti-  
bus ægyptius  
medetur. Deco-  
ctum dysenteri-

cis, quos excruciat dolor, infusum, ido-  
neum est.

HALICAM antiquitus parabant ex zea, Halica cō-  
cretam, & gypsum admiscentes. Huius rei au-  
ctor est Plinius libro x v i i i. capite x i. sic  
inquirens. Halica fit è zea, quam semen appel-  
lauimus. Tunditur granum eius in pila lignea:  
nam lapidis duritia conteritur. Nobilius, vt  
notum est, pilo vincitorum pœnalis opera. Pri-  
mori inest pyxis ferrea, excussis inde tunicis.  
Iterum iisdem armamentis nudata conciditur  
medulla. Ita fiunt halicæ tria genera, mini-  
mum, ac secundariū, grandissimum verò aphere-  
ma appellant. Nondum habent cāidorem suum,  
quo præcillant. Iam tamen Alexandrinæ præ-  
feruntur. Postea, mirum dictū, admiscetur cre-  
ta, quæ transit in corpus, colorémque, & teneri-  
tatem affert. Inuenitur hæc inter Puteolos, &  
Neapolim in colle Leucogeo appellato. Halica  
adulterina fit maximè è zea, quæ in Aphrica de-  
generat. Latiores eius spicæ, nigrioresque, &  
breui stipula, pennisunt cum arena, & sic quoque  
difficulus deterunt vtriculos. Posteaque gyps-  
pars quarta inspergitur, atque vt coheserit, fari-  
nario

nario cribro subcernunt. haftenus Plinius: Ex quo non satis admirari possum, quòd veteres & cretam, & gypsum in cibis simul cum Halica citra noxam esset, cum procul dubio compertum sit gypsum in corpus assumptum adeò spiritibus meatu obstruere, vt facile homines frangulerent. Nisi fortasse dixerimus, quòd quamquam aliqui cretam, alij verò gypsum halice commiscerent, vt candidior, & mollior euaderet: balutionibus tamen prius eam expurgabant, quam decoquantur traderent. Nanque & hoc tempore gingiberis radices fabrilis rubrica insciunt, vt illas à carie, & teredine vindicent: quæ tamen & abluunt, & dera-  
 10 duntur, & cribro excutitur, cum in ciborum condimentis, vel medicamentorum misturis ex-  
 peruntur. Hoc enim mihi visus est inuissse Galenus libro primo de alimentorum facultati-  
 bus, cum ait. Ceterum diligentissimè, dum ex halica elota forbitiones parantur, animadu-  
 20 uertere oportet. Quippe cum Halicam ad for-  
 bitiones parandas elui precipiat, id sanè face-  
 re videtur, vt repurgetur à creta, & gypso, qui-  
 bus inficiebatur. Quòd autem in cibum non  
 sumeretur Halica, quæ ab omni mangonio  
 non esset purgata, offendit idem Galenus lo-  
 30 co nuper citato, cum inquit. Halica ex gene-  
 re est tritici, quæ valenter nutrit, succumque  
 lentum habet, siue in aqua duntaxat coctam  
 cum melle, aut dulci vino, aut etiam ad-  
 stringente sumas, siue ex oleo, salique condi-  
 40 tam. Qui autem per sanitatem ob vemen-  
 tem ventris mordicationem, siue à biliosi hu-  
 moris copia, siue aliunde profectam, forbi-  
 tionem egent, his halicam afflatam coctam, quoad  
 teneram flacciditatem adepta colliquefecit, deinde  
 conditam, & colatam, vt pitinæ colato  
 cremori persimilis sit, forbendam exhibeto.  
 Hæc Galenus, qui ceterè tor laudibus hac in re  
 Halicam non commendasset, si creta, vel gypso  
 admixtam assumpsissent in cibum. Fiebat anti-  
 quitus Halica non modò ex zea, quæ dicoccos  
 dicitur, sed etiam ex tritico, & aliis frumen-  
 taceis, vt ex Galeno, Paulo, Aëtio, & aliis  
 intelligi facillè potest. Fit & hoc tempore in  
 vniuersa Italia, quauis eam non Halicam, sed  
 Far falsò appellent. Nanque Far ab halica lon-  
 ge diuersum putamus. Quòd autem Far à chon-  
 50 dro, siue halica differat, sitque per se frumen-  
 ti, vel tritici proprium genus, antiquis Ado-  
 reum vocatum, è quo Far ipsum paratur, id sanè  
 ex pluriù probatissimorum auctorum scri-  
 ptis apertissimè constat. Siquidem id primum  
 declarat plinius libro x v i i i. cap. v i i i. sic  
 inquit. Frumenti genera non eadem vbique,  
 neque vbi eadem, sunt iisdem nominibus.  
 Vulgarissimum Far, quòd Adoreum veteres  
 appellauerunt. Quin & eodem capite, vt for-  
 tasse palam faceret, aliud esse zeam, è qua fit  
 halica, aliud verò Far: Qui zea videntur, in-  
 quit, non habent Far. Item cap. v i i. eius-  
 dem libri: Populum Romanum, ait, farre

*Halica ex  
 Gal.*

*Farris, et  
 halice dif-  
 ferentia.*

tantum è frumento trecentis annis vsum Ver-  
 rius tradidit. Quo tempore Romanis nullus  
 fuit halicæ vsus, vt ipse testatur Plinius libro  
 x x i i. cap. x x v. cum inquit. Halica res  
 Romana est, non pridem excogitata, neque  
 arbitror Pompei magni ætate in vsu fuisse. His  
 accedit Aclepiadis, & Galeni auctoritas libro  
 v i i. de compositione medicamentorum: se-  
 cundum locos in quodam elegmate ad cruen-  
 10 ta sputa, vbi sic habet. Farris. Clusini appella-  
 ti sextarij dimidium, decocti marrubij virididis  
 sextarium vnum. Hæc in vas vitreum coniecta  
 per diem, & noctem macerari finito. Sequenti  
 die pharmacum mollior, quemadmodum ha-  
 licam maceramus. hæc Galenus. Quibus pal-  
 lam est à farre differre halicam. Galeno deinde  
 subscribit Aëtius libro i x. cap. x i v. vbi ex  
 Archigene hæc habet. Quòd verò Latine in  
 regionibus Romæ vicinis far appellant, hoc  
 modo paratur. Frumentum modico tempore  
 aqua mactafacto: indeque extractum, ac in  
 pilam coniectum, veluti prisanam, à cortice  
 repurgato. Vbi verò corticem egerit tollito,  
 atque in sole siccatò: deinde manibus tri-  
 tum, donec penitus à cortice fuerit munda-  
 tum, crassissimè molito, ita vt granum vnum  
 in quatuor, aut quinque partes redigatur, &  
 siccum asservato. Vfus autem tempore hali-  
 cæ modo coquitur, & à sanis in cibo sumitur.  
 30 Pro ægris verò variè apparatur, & epithema-  
 tis quoque admiscetur. Quidam spicas frum-  
 menti adhuc virides tollunt, ex ipsisque far  
 concinnant, quo modo & suauis, & iucun-  
 dus redditur. haftenus Aëtius. Ex cuius, &  
 supradictorum testimonio, illud planè omni-  
 bus patere arbitror, quòd far ab halica diffi-  
 deat. qua de re etiam plura, duce Deo, dicemus  
 in epistolis nostris. Quòd Græcis *χένον*,  
 40 *χένον*, Latinis pariter & Italis Halica nuncu-  
 patur: Arabibus, Chandaros.

*Nomina.*

MILIVM. CAP. XC.



tur, auxilio sit.

MILIVM  
 in panes coac-  
 tum, minus  
 ceteris frugi-  
 bus alit: sistit  
 pulte sua alu-  
 um, vrinam  
 cit. Torretur  
 milium, feru-  
 uensque in fac-  
 co ponitur, vt  
 torminibus, re-  
 liquisque dolo-  
 ribus, si fonea-

*Mili. Gires  
ex Gal.*

**MILIUM**, vt libro VII. simplicium medicamentorum prodidit Galenus, primo ordine refrigerat, exicat vero tertio exolut, aut certe secundo intenso. paululum etiam habet tenuitatis. Ex hac tum consistentia, tum temperatura inflat quidem eduli comestum, planè inter omnia frumentacea edulia minimum confert nutrimenti: sed & ventrem desecat. Porro foris impositum in faculis idoneum est fomentum his, quæ citra morsum exicari possunt: & cataplasmatibus modo illitum exicare potest. atamen admodum friabile est, proinde difficilis est eius in cataplasmatibus usus. Quibus omnibus ea prorsus adspiciuntur, quæ idem de Milio tradidit libro primo de alimentorum facultatibus, cum inquit. Milio item in pane nonnunquam vntur, vigente frugum penuria. Panis tamen ex eo exigui est alimentum, & refrigerans. Constat insuper præaridum, & inflat arenæ, aut cineris friabilem esse: nihil enim in se habet pinguitudinis, & lentoris. Iure ergo alium lumentem desecat. Agricola huius farina cocta, admisso adipe suillo, & oleo vescuntur. *κίχνη* Græcè, Milium Latine dicitur: Arabicè, Ieuers, Guguers, sue Gyaures: Italicè, Miglio; Germanicè, Hirz; Hispanicè, Milho, & miyo: Gallicè, Millet.

*Nomina.*

**PANICVM  
CAP. XCI.**

**PANICVM** frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile, eodemque modo in panes subigitur. Eodem habet vsum, minus tamen & nutrit, & stringit.

*Panici Gires  
ex Gal.  
kne.*



*Ruel. la-  
pina.*

Ruellius secundo de natura stirpium volumi-

**PANICVM**, vt scriptum reliquit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, ex le guminum genere est, milio specie simile, scilicet certe pauci nutrimentum, & exicatoria. Siste quoque non nihil ventris fluxus, cui ipsum etiã milium. Si vero foris illinatur, exicat, atque refrigerat. hæc Galenus. Ceterum scribit

ne, Panicum in Italia Melicam appellari. Quæ in re aperte hallucinatur: namque melica, quæ apud Infubres vulgò Melega nominatur, illud genus frugis est, quam nostrum vulgus in Hetruria Saggina vocat. Alij verò in Italia populi Sorgo appellant. Nec vsquam, quod sciam, in Italia panicum melica vocatur. **MELICA** autem (vt vtar hoc nomine) frugis est genus tam forma, quam proceritate arundinem referens, adeò vt campi, in quibus ad maturitatem vsque adoleuerit, arundineta repræsentare videantur. Eius tamen calamus non vt vulgarium arundinum, inanis est, sed sacchariferarum arundinum modo, alba factus medulla. Paniculæ, quas ad Cybelis pomorum magnitudinem summis proferunt culmis, quadam cum maturitatem senserint, in nigro rufescent: quadam verò nigredinem in vniuersum contrahunt, granis compluribus onustæ. Deperitur granum ad rusticis, moliturque in farinam, & inde in agrestem cogitur panem: etsi in Hetruria potius ad columbarum, gallinarumque feratur agnam, quam ad hominum alimentum. Hoc Plinio libro X v 112. cap. v 11. milium est indicum, quod tamen non animaduertit Ruellius aliqui maximus Plinij sedator. Plinius enim se habet. Milium intra hos decem annos ex India in Italiam inuectum est, nigrum colore, amplum grano, arundineum culmo. Adolefcit ad pedes altitudine septem, prægrandibus culmis, lobas vocant, omnium frugum fertilissimum. Quod inquit Græcis, Panicum Latinis appellatur: Arabibus, Dochon: Italis: Panico: Germanis, Pfenich, Heydel-pfenich pray, Fuchsschuantz: Hispanis, Panizo, & Paniso: Gallis, Panic.

*Melica G.  
sideratio.*

30

*Nomina.*

40

**SESAMVM.  
CAP. XCII.**

**SESAMVM** stomacho inutilis cibis. halius grauitatem facit, quoties inter mandendum, commissuris dentium inhaesit: neruorum crassitiem illitu discutit: medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerastæ moribus: capitis dolores, qui astutione concitantur, ex rosacco lenit. Eadem efficit herba decocta in vino: præsertim inflammationibus oculorum, doloribusque prodest. Ex ea fit oleum, quo Aegyptij vtuntur.

**TAM**

SESAMVM QVORVNDAM.

SESAMVM ALTIVM.

Sesami eo  
sideratio.

TAM ET SI Sesami semen, à quo copiosum exprimitur oleum, officinis notissimum sit: pauci tamen reperiuntur seplasiarij, qui Sesami plantas viderint vnaquam, cum nullum, vel rarissimum, quod agros steriles reddat, feratur in Italia. Siquidem quod in myropoliis habetur, ex Græcia, & Peloponneso ad nos conuehitur. Prouenit (vt Theophrastus est auctor) caule milio simili, crassiore tamen, ac altiore: folijs rubentibus: flore viridi, herbaceo: semine vasculis incluso, papaueris modo. Sesamum, teste Plinio, ab Indis primum aduectum est. Ibi enim copiosissimum feritur, cum oleum inde maximo prouentu faciant, non modò ad lucernarum usum: sed ad ciborum condimentum, quemadmodum nos ex oliuis. Non temere scripsisse videtur Ruellius, nihil ita, vt Sesamum, emacrare solum, vixit, cui crassior, & multiplicior arundo sit, quam milio, & radix quoque numerosior. Siquidem id legimus Theophrasto proditum esse libro V III. capite I X. de plantarum historia, vbi sic inquit. Omnium, quæ æstiuus sementibus ager recipit, Sesama terræ molestissima esse, plurimumque posse extenuare putatur, vixit, quæ multipliciori crassiorque calamo, & numerosiore constet radice, quam milium. hæc tamen Theophrastus. Cæterum duas diuersas imagines pro Sesamo exhibuimus, quod varia quoque sit hoc tempore herbariorum de eo sententia: alij enim hanc plantam, illam alij pro legitimo Sesamo demonstrant. Mihi quidem (vt ingenuè fatear) neutra placet, quod vtraque historice refragetur, quam de Sesamo Theophrastus & Plinius tradiderunt. Has tamen plantas hic depingi curauimus, ea saltem ratione, vt illud lectores admonerem, quod ex meo iudicio, notis veri Sesami non respondeant: quòdque in manifesto errore versentur, qui secus opinantur. Sesami meminit Galenus libro V I I I. simplicium medicamentorum, ita scribens. Sesamum non pa-



rum in se continet viscosum, & pingue: quare emplasticum est, & enollens, ac modicè calidum. Eiusdem facultatis est, quod ex eo conficitur oleum: & herbæ quoque decoctum similem vim obtinet. Et libro primo de alimentorum facultatibus: Sesami semen, inquit, pingue est, ideòque repositum celerimè sit oleosum: quamobrem & eos, qui ipso vescuntur, celeriter implet, & stomachum subuertit, tardè concoquitur, & pingue corpori prebet alimentum. Liqueat ergo quod ventris partibus vigorem, ac robur addere nequit, quemadmodum neque aliud quòdvis pingue. Est autem crassus succus, ideòque non celeriter peruat. *Sesamum* Græci, pariter & Latini Sesamum dicunt: Arabes, Semsem, aut Senfera: Itali, Sesamo: Hispani, Iorgilim, & Ategia: Galli, Ingulinæ.

Nemine.

LOLIUM.

CAP. XCIII.



LOLIUM, quod inter fegeres nascitur, molitum, nomas, putrescētia vlcera, gangrenasq; compestit cum raphanis, & sale illitum: & ex aceto, & sulphure viuo ferros lichenas, & lepras sanat: strumas quoque discutit, cum fimo columbino, & lini semine decoctum in vino: rumpit, quæ agrius ad coctionem perdu-

perducuntur. Decoctum ex aqua multa vilissimè ischiadicis illinitur: si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuvat.

*Lolij consideratio.*

**LOLIUM** omnibus notissimum est. Nasitur in aruis è tritico, & hordeo corruptis vligine seminibus, aut per hyemem imbre nimio madidis, vt superius quoque in tritici, & hordei commentatione dictum est. Verùm etsi non desint, qui Lolium vere tantum exoriri putent, prouenit tamè (vt Theophrastus memorat) pro didit lib. v. 11. cap. v. 11. de plantarum historia) hyeme ineunte, folio angusto, piloso & pingui, cuiusque peculiare pinguitudo notatur. Cre-

*Fuchij error.*

dit Leonardus Fuchius (vt declarauit in suis clarissimis de stirpium historia commentariis) Pseudomelanthium, quod inter fegetes frequens nascitur, legitimum esse Lolium. Id quod (pace sua dixerim) non modò communi doctissimorum viro-um, qui in stirpium doctrina diu versati sunt, sententiæ refragatur, sed & veterum scriptis, qui Lolium in spica, non calyce, non capitulis melanthij, vel papaueris modo inclusum, semen proferre tradiderunt. Et quauis Theophrasti auctoritate nitatur, vt sui Lolij effigiem repræsentet, plura tamen ex eo red didisse videtur, quam ipse vsquam in Theophrasto legerim. Qua in re mihi quandoque iocandi fuit occasio, vt dixerim Fuchium ideo in lolio tam manifestè lapsum fuisse, quòd forte eo tempore, quo hæc scribebat, contigerit ei lolium in pane comedisse. Quòd autè id legitimum sit Lolium, quod rei herbariæ peritis, agricolis etiam, & omnibus ferè vulgò cognitum est, testis est Dioscorides libro 1. 11. capite de phœnice, vbi phœnicem spicam lolio similem proferre prodidit. Ex quo palam sit, lolium in spica, non autem in capitulis pseudo-

*Lolij error.*

melanthij, & papaueris modo semen ferre. Ex vulgata quoque Lolij facultate Fuchij error deprehendi potest. Siquidem panis, in quo lolium fuerit, stupiditatem quandam, & veluti temulentiam estantibus parit cum inexpugnabili ferè somno. Quamobrem vbique locorum incerniculis à tritico, aliisque cerealibus ipsum Lolium, vt

*Lolij error.*

scripsit Galenus libro v. 1. simplicium medicamentorum, desiccatur, & excalcatur efficaciter, vt propinquum sit acribus, magis quam iris, sed non est perinde vt illa subtilis essentiae, verum multum in hoc deficit. Secundum hoc ponat ipsum quispiam in principio tertij ordinis excalcificationem, secundi verò extremè exiccationem. Eius nomen Græcum *ἀλυσ*: Latium, Lolium: Arabicum, Sceilem, seu Zeven: Italicum, Loglio, & Gioglio: Germanicum, Tuualch trespe, Rucueyssen, & Lulch: Hispanicum, Yoio: Gallicum, Yuraye.

*Nomina.*

**AMYLV.** CAP. XCIIII.

**AMYLV** ex eo appellatum est,

quòd sine mola fiat. Optimum ex trimestri, natione Creticum, aut Aegyptium. Ratio faciendi amyli hæc est. Purgatum trimestre triticum madescit quinquies die, & si fieri potest, nocte: cum emollitum fuerit, effunditur sensim sine agitatione aqua, quò minus cremor utilis vnà excludatur. vbi mollissimum esse videtur, mutata aqua, pedibus calcari oportet: rursus infusa, teri: tum demum enatantes ibi fursures incerniculo eximendi, reliquumque quallo sportisque siccatum tegulis nouis confestim torreatur flagrantissimo in sole: nanque si paulisper vdem maneat, acorem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cauæque vlcera efficax est: sanguinis reiectiones potu cohibet, exasperatas fauces lenit. Lacti, atque obsoniis admisceatur. Fit etiam amyllum ex zea, quæ maceratur, ac eluitur vno, aut altero die, & subacta farina modo manibus subigitur: pressaque feruentissimo in sole, vt antè retulimus, exiccatur. Nullus in medicina vsus, ad alia tamè cōueniens.

**AMYLV**, quod vulgò Amidum officinis vocatur, omnibus quidem notum est. Probatum autem, auctore Plinio libro x. v. 11. capite v. 11. leuitate, ac læuore, atque vt recens sit, & candidum. Ceterum etsi prætulerit Dioscorides Amylum, quod è Creta aduehitur, Plinius tamen longè magis Chium, cui insule (vt ipse scribit) Amyli inuentio debetur, præstare asserit. Amylum, vt memorat prodidit Galenus libro 1. de alimentorum facultatibus, ex tritico conficitur, læuigandè exasperatas partes vni leno.

obtinens: quæ communis est omnibus substantiis consistentia siccis, quæ neq; adstrictionem, neque acrimoniam, neque aliam quāuis facultatem habent insignem. Quas substantias iure *ἀλυσ*. Id est, qualitatis, quæ sensu deprehendi queat, expertes appellant: quāvis inter humidas substantias est aqua. Ceterum amyllum similem locis paucibus habet facultatem: nam, vt illi, minus quam panes non loti, corpori præbet alimentum, & non calcatur, cum ceteri panes calcantur. Quòd verò ad triticum in aqua elixum attinet, cum ea amyllum ne conferendum quidem est, cum palam id tum calcatur, tum valenter nutrit, si coctum fuerit: id quod facta (vt diximus) est difficile. Porro Amylon (vt Plinius tradit libro x. v. 11. capite x. v.) hebetat oculos, & gula inuitile, contra quam creditur

*Amyli consideratio.*

*Amyli error.*

tur. Item sifit aluum, epiphoras oculorum in-  
hibet, & vlcera sanat. Item pustulas, & flu-  
xiones sanguinis. genas duras emollit. Datur  
cum ouo his, qui sanguinem reiecerint in ve-  
sicæ verò dolore semuncia amyli cum ouo, &  
passis tribus, sufferueta à balneo. Quod  
Græci *ἄμυλον*, Latini similiter Amylum vocant:  
Mauritani, Nixæ: Itali, Amido: Germani,  
Amlung: Hispani, Amydon: Galli, Amydon.

*Nemina.*

FOENVM GRÆCYM.  
CAP. XCV.




FOENI Græci farinam ha-  
bet emolliendi,  
discutiendi que:  
in aqua mulsâ 20  
decoctâ aduer-  
sus tā internas,  
quàm externas  
inflammationes,  
efficaciter illini-  
tur: lienem cū  
aceto, & nitro  
trita extenuat. 30  
Succus decocti

eius foeminarum malis subuenit: siue  
tumor, siue præclusio sit vulvæ, fouetur,  
& insident. Fœni græci in aqua decocti  
cremor expressus, capillos, furfures, &  
manantia capitis vlcera purgat: locos  
dilatât, & emollit, si cum anserino  
adipe pefsi vice subiiciatur. Viride cum 40  
aceto vtilissimum imbecillibus locis,  
& vlcera sentientibus. Decoctum eius  
prodest aduersus tenesmos, foetidam-  
que dysentericorum proluiuē. Oleum,  
quod ex eo exprimitur, & myrto, ca-  
pillos, & genitalium cicatrices ab-  
sterget.

*Fœni Græci* FOENI Græci semen profert planta triflo-  
liæ similis, corniculis quibusdam inclusum:  
vnde illi Buceras nomen imposuit Theophras-  
tus. Huius meminit Galenus libro VII. I.  
simplicium medicamentorum, sic inquit.  
Fœnum Græcum calidum est secundū ordinis,  
desiccat primo: proinde seruentes phlegmo-  
nas irritat, acerbaturque, quas verò minus sunt  
calide, & magis duræ, eas digerendo curat.  
*Nemina.* Tāus, & *ἄμυλον* id Græcè dicitur, quod La-  
tinè Fœnum græcum: Arabicè, Olba, Helbe,  
seu Hebbe: Italicè, Fien græco: Germanicè,

Fenigrec, & Bockshorn: Hispanicè, Alfor-  
nas & Alhoias: Gallicè, Fenigrec, & Sene-  
gré.

LINVM. CAP. XCVI.



LINVM vul-  
gò notum est.  
cuius semē ead-  
em, quas fœ-  
num græcum,  
vires habet. Di-  
scutit, & emol-  
lit omnem in-  
tus, forisque in-  
flammationē,  
cū melle, oleo,  
exiguâque aqua  
decoctum, aut  
melle cocto ex-  
ceptum: vitia

cutis in facie, varosque crudum tol-  
lit: illitum cum nitro, & siculneo cine-  
re, parotidas, duritiâsque discutit: vl-  
cera, quæ serpunt, favosque cum vino  
decoctum expurgat: vngues scabros  
eximit, cum pari modo nasciturij, &  
mellis: vitia pectoris extrahit, si ex mel-  
le in eclegmatis vicem substituitur: tuf-  
sim lenit: venereum stimulat, si farina  
piperis, & melle exceptum, pro pla-  
centa largius adsumatur. Huius deco-  
ctum interaneorum, vulvæque erosio-  
nibus immittitur, alui excrementa euo-  
cat, ad vulvæ inflammationes in desef-  
sionibus perquam vtile.

CVM Linum, & eius semen sint non mo-  
dò medicis omnibus, sed etiam cæteris, &  
præsertim agricolis, vulgò notissima, superu-  
caneum quidem forer, pluribus eorum histo-  
riam persequi, cū seminis vits, & vires mini-  
mè silentio sint prætereunda. Exprimitur ex  
semine oleum, quod non solum medicis, &  
seplasiariis expetitur, sed etiam pictoribus, la-  
pideis, lignariis, cementariis, ac ferariis  
fabris. Præstat & ad lucernarum vsum, quòd  
diutius igni resistit, quam quod ex oliuis ex-  
primitur. In medico autem vtu nervorum  
consulsionibus peridoneum est. Quinetiam ad  
eorum emolliendas duritiâs, & ad ossium com-  
pagines explicandas mirificè prodest. Ferutile  
est omnibus sedis affectibus, nempe hæmor-  
rhoidibus, condylomatibus, rimis, ac dolori-  
bus: fœ

*Oleum &  
semine  
vires.*

bus: feminatum induratos locos mollit. Nymphaez, aut rosarum stillatitia aqua ablutum, ambullis auxiliatur. Sunt & qui hoc bibendum magno subsecusu iis exhibent, qui laterali dolore vexantur. verum recens sit oportet: quandoquidem inueteratum, contracto rancore non modò exalfacit, plus quam par sit, sed & nauseam commouet. Ceterum quoniam (vt Plinius inquit libro x i x. capite primo) x y l o x, siue Gossipium, quod nos vulgari sermone Bambagia, alij Cotone appellant, inter lini genera nonnulli annumerant, cum eius, quod sciam, nusquam meminerint Dioscorides, & Galenus, non dissimilandum duxi, quòd Xyli semen, quod tamen rancorem non senserit, tussi, & pectoris vitiiis opitulatur. quineriam exalfacit, & emollit, & figen augeat. Candidissima verò eius lanugo sanguinem è vulneribus manantem sistit, præsertim si prius paululum exuratur. Sed plura de Xylo dicemus libro sequenti in gnaphalij mentione, vbi eius quoque effigiem dabimus.

Lini feminis facilius memoriz prodidit Galenus libro v i i. simplicium medicamentorum, sic scribens. Lini semen cum statuolum est: etiam si frigitur: adeò sine excrementitia humiditate plenum est. Est verò etiam in primo ordine quoddammodo calidum, ac humiditatis, & siccitatis quoddammodo in medio est situm. Quod Græci λίνον, Latini item Linum appellant: Arabes, Bazrichichen, siue Bezercheran: Itali, Lino: Germani, Lein, & Flac: Hispani, Lino: Galli, Lin.

CICER. CAP. XCVII.



CICER fati-  
tut aluo ido-  
neum est, vri-  
nam ciet, infla-  
tionem parit,  
colorem com-  
mendat, men-  
ses ac partus ex-  
pellit, lac au-  
get. Cum eruo  
decoctum illi-  
nitur ad inflam-  
mationes tes-  
tium, verruco-  
fas informationes: ad scabiem, vlcera capitis manantia, impetiginisque, item contra carcinomata, & vlcera, quæ cacoethe vocantur, cum melle, & hordeo prodest. Alterum genus arietinum nominatur. Vtrumque cit vri-

nas, dato cum rore marino hydropicis, aut regio morbo laborantibus: eorum decocto. Lædunt ea exulceratam vescicam, & renes. In verrucarum formicantium, pensiliumque genere, prima luna singulis granis singulas tangunt. eaque grana linteolo deligata abiici post se præcipiunt, ita decidere eas arbitrantur. Sylvestre cicer, foliis satiuo simile est, odore acri, sed semine discrepat. Idem quod satium præstat.

IN CICERVm genere habetur cædium, *Ciceris cæ-*  
quod & Columbinum vocatur. Est & rubrum *sideratio,*  
Venericum dictum, quòd ad excitandam ven-  
erem misific præstat. Habetur item & nig-  
rum ceteris minus, quod Arietinum appel-  
lant. Horum meminit Galenus primo de ali-  
ment. facultatibus, sic inquit. Cicer non  
minus quam faba inflationes excitat, sed va-  
lentius nutrit. Venerem stimulat, creditumque  
est etiam simul semen generare: cuius gratia  
admissariis equis quidam ipsum exhibent. Inest  
præterea Ciceribus facultas abstergendi maior,  
quam fabis: adeò vt quædam ex ipsis contra-  
ctos in renibus calculos euidenter frangant, at-  
que comminuant. Nigra autem sunt ea, & exi-  
gua in Bithynia præcipuè nascens, Arietina-  
que vocata. Huius ex aqua decoctum potare  
præstiterit. Vescuntur & virentibus adhuc ci-  
ceribus homines ante adeptam maturitatem,  
quemadmodum & fabis, hætenus Galenus.  
Nigrum vocari Arietinum tradidit plinius,  
quòd arietum capita sua imagine repræsentet.  
Theophrasto quoque Cicerum plures sunt dis-  
ferentia libro v i i i. cap. v. de historia plan-  
tarum, vbi sic habet. Cicer & magnitudine, &  
sapore, & odore, & forma, plerasque differentias  
ostendit, vt arietinum, & columbinum. Candida  
inter omnia dulcedine præstant. Ciceris facul-  
tates recensuit etiamnum Aëtius, sic inquit. *Ciceris vi-*  
tates recensuit etiamnum Aëtius, sic inquit. *res ex Aë-*  
Cicer statuolum legumen, ac alimentosum, ven-  
tri accommodatum, vrinam, ac menses euocat,  
& lac, & sperma copiose generat. Huius deco-  
ctum, præsertimque nigri, calculos renum frangit.  
Alterum verò genus, quod Orobieum vocatur,  
attrahit, discutit, incidit, & abstergit. Ie-  
cur, sienem, & renes expurgat: scabiem, & im-  
petigines exterius parotidas, ac testiculorum du-  
rities discutit: affectus ad vlcera maligna præ-  
sidium non penitendum. hætenus Aëtius. Ceterum  
sylvestre omnibus ferè notum est. & si  
Plinio fides est adhibenda, ventrem subducit:  
sed flatum, & intestinorum dolores gignit.  
Græcis *κικέρη*, Latinis Cicer nominatur: I  
Arabibus, Chemps, Hamos, seu Alhamos:  
Italis, Ceci: Germanis, Kichern, Kichererbs,  
& Ziser erbs: Hispania, Grauanos: Galli,  
Chiches.

FABA. CAP. XCIII.



FABA inflationem excitat, agrè concoquitur, tum multuosa somnia facit, ut si confert, carne gignit, media calidi, frigidiq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice effi-

tata, dysenterias, & celiacorum profluvia sistit: contra vomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abiciatur. Viridis plūs negotij stomacho exhibet, maioremque flatum parit. Lomentum eius & per se, & cum polenta illitum, inflammationes, quas vulnus excitauit, mitigat: cicatrices concolores facit: turgentis grumoso lacte mammas, etiam si inflammatione tententur, adiuuat: lac restinguit: furunculos, sugillata, parotidasq; cum sœni græci farina, & melle discutit: cum rosa autem, thure, & oui candido, procidentibus oculos, tumores, vnaq;que reprimat: subactum vino, suffusiones, & ictus oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertendas fluxiones, fronti illinitur: decocta in vino testium collectiones sanat: quò tardius pubes erumpat, pueris imo ventri illinitur: vitiliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt, & minus alimenti capessunt: cum polenta, scisso alumine, & vetere oleo impositi cortices, strumas discutiunt. Decocto earum lanæ insciuntur. Faba dempto cortice in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirundine concitatis: nanque eas suppressit, si semisecta apprimatur.

FABAE omnibus notissimæ sunt, & vt mox Fabarum moriæ prodidit Galenus libr. v. i. i. simplicium confecta medicamentorum, in exiccando, & refrigerando secundum vtrumque ad medium temperamentum propinquissimè accedunt. Caro Fabæ lena, paulum quid abhærentis facultatis continet, sicut cortex nonnihil adstringentis. Idcirco medicorum nonnulli totam fabam cum oxycrato decoctam dysentericis, celiacis, & vomentibus, quos *ipsius* nominant, exhibuerunt. Porro vt edulium, statulenta est, ac coctū difficilis, si quid aliud: excreationibus ex thorace, & pulmone idonea. Vt medicamentum verò foris imposita, sine molestia desiccatur. In podagricis ea saepenumero vsi sumus ex aqua decocta, & deinde adipi suillo admista. Ad neruorum tum conuulsiones, tum vulnerationes, farinam eius cum oxymelite imposuimus. Ad eos, quos ex ictu iam phlegmone occupauerat, cum polenta. Sed & testium, & mammarum aptum est cataplasma. Nam hæ partes cum phlegmone tenentur, moderatè refrigerari amant, maxime cum uiam ex lacte ipsius concreto phlegmonem patiantur. Quin lac quoque ab eo cataplasmatè extinguitur, sicut puerorum pubes farina fabacea illita plurimo tempore glabra permanet. Et libro primo de aliment. facultatibus, sic inquit. In-

flar is cibus quocunque modo apparetur: nec per quāuis longam decoctionem id vix potest imitere, quod prisanæ minime negatum est: deponit enim per illam quicquid habet statulenti. Qui porro affectus singulos cibos sequi natos, animaduertere, & mente consequi uolet, quandam totius corporis tensionem, quasi ad statulentum spiritu perferentem, maxime: qui ad huiusmodi esculentum non fuerit assuescens, aut ipsum minus rectè coctum assumptum. Habent autem fabæ non densam, nec grauem, sed fungosam, leuēque substantiam: quæ tamen ipsa nonnihil absterforiæ possidet facultatis, similiter prisanæ. Etenim manifestè fabacea farina cutis sordes detergere conficitur. Quod intelligentes mangones, ac mulierculæ, in balneis quotidie hac vtuntur, velut alij nitro, atque aphronitro, & in vniuersum iis, quæ abstergent. Illinunt præterea & faciem hac, quemadmodum prisanæ: nam quæ in summa cute eminent lenes, exterit, & maculas velut ex sole contractas. Huius ergo facultatis nomine ne in alui quidem transitu diu cunctatur, sicut quæ glutinosa, & crassi succi sunt sine via abstergendi facultate, qualia halican, tragum, simlaginem, & anyium esse perhibuimus. Cum porro feruissimè ex fresa faba paratum, quod *ἰνὸν* Greci nuncupant, statibus non careat, multo amplius integræ fabæ inflabit cibus. quamquam fricta (nam hoc modo aliquando pro telariis sumunt) statum deponit, sed tum concoctū perdifficilis, tardèque descensu incommodior redditur, & crassi succi alimentum in corpus diffundit. Quod si viridis, immixtura, non dumque arefacta edatur, commune omnium fructuum



fructuum, quos ante perfectam maturitatem in  
gracius, rationem obtinens, corpori humidio-  
rem alimoniam exhibebit, ac proinde maiorem  
excrementorum vin non tantum in viis inte-  
stinorum, sed etiam per vniuersum corporis  
habitu producat. Merito igitur minus quoque  
nutrit, sed promptius deieciatur. Plerique au-  
tem hominum non crudas solas fabas com-  
edentes, vna eas cum suilla carne decoquunt,  
veluti olera consueuerunt: verò etiam cum  
caprina, & ouilla. Alij fabas inflare sentientes,  
cepas admiscunt, cum in ollis pulmento ex  
illis struunt. Sunt qui non simul exstas, sed  
cum pulmento cepas ingerant crudas. In omni-  
bus nanque dapibus quicquid statuosum con-  
tinetur, per caliditatem, & extenuantia corrigi  
comparatum est. *Kia* & sic Græci, Latini ve-  
rò Faba vocatur: Arabibus, Hachille, Haballe,  
sive Bachale: Italis, Fava: Germanis, Bonen:  
Gallis, Feue.

FABA AEGYPTIA.  
CAPUT XCIX.



**AEGYPTIA**  
Faba, quam ali-  
qui Ponticam  
vocant, in Ae-  
gypto pluri-  
ma prouenit,  
in Asia etiam,  
Ciliciæque lacu-  
bus inuenitur.

Folia habet  
ampla, etiam  
fi ad arborum  
frondes com-  
parentur: cau-  
lem cubitalem, digiti crassitudine: flo-  
rem roseum, dupla papaueris ampli-  
tudine: & vbi flore exiit, fert follicu-  
los vesparum fauis similes, in quibus  
faba supra operculum, bullantis am-  
pullæ modo, prominet. Ciborum, aut  
Cibotion, id est arculam, ideo nomi-  
nant, quoniam feratur ipsa, humenti  
glebæ mandata, & ita in aquam demis-  
sa. Radice firmatur arundine crassiore,  
quæ cruda coctæ estur. ei Colocasie  
nomen est. Faba virens manditur, &  
exiccata nigrescit: vulgarem magnitu-  
dine superat. Adstringendi facultatem  
obtinet, & stomacho vtilem, dysente-  
ricis, cæliacisque prodest, in parso po-  
lenta vice, lomento: datur quoque in

pulte. Cortices in vino mulso decocti,  
si terni inde cyathi bibantur, magis pro-  
ficient. Facit ad aurium dolorem, quod  
in earum medio viride spectatur, gustu  
amarum, si tritum, & cum rosacco co-  
ctum instilletur.

<sup>10</sup> S V N T qui Aegyptiam fabam suæ radicis  
appellatione Colocasiam nuncupent. Hanc pri-  
mum Tridenti anno 1538, ostendit mihi Odo-  
ardus Polonus, qui alias quoque plantas, & eas  
quidem raras, secum deferbat ex Syria & Ae-  
gypto. Caterum eos equidem in errore versa-  
ri crediderim, qui putant plantam illam ex Ae-  
gypto allatam, quæ ari speciem repræsentat,  
esse fabam Aegyptiam. liquidum illa florem  
non edit dupla papaueris magnitudine, non  
profert fabas, nec radicem habet, quæ cruda  
mandi possit ob vehementem eius acrimoniam.

<sup>20</sup> Huius tamen ari folia videntur esse fabæ Ae-  
gyptiæ. Et certè hanc adeo æmulantur, vt ali-  
quando exissimauerim eas stirpes nihil inter se  
differre. Sed postquam rem hanc diligentius  
examinaui, earum discrimen cognoui, atque il-  
los planè falli iudicaui, qui arum Aegyptium  
non distinguunt ab Aegyptia faba. Meminit hu-  
ius Theophrastus libro 1111. cap. x. de plan-  
tarum historia, vbi ita scribit. Faba Aegyptia in

<sup>30</sup> paludibus, stagnisque exit. Caulis eius, qui lon-  
gissimus, quaternæ cubita perficit: crassitudo  
digitalis est, similis calamo molli, non genicu-  
lato. Rimas intrinsecus habet tendentes per to-  
tum, lilij modo. Caput in cacumine orbicula-  
tum, vesparum fauo non ab simile. Inq; singulis  
cellis, singulæ fabæ continentur, paulo super id  
eminentes, multitudine plurimum tendent.

<sup>40</sup> Flos papauere duplo maior, colore roseus in  
plenum caput. Super aquam folia ad singulas  
fabas amplexa exeunt. Fabam quanque conte-  
renti amarum illud, ex quo pilula fit, inflexum  
patescit. Fructus ita se habet. Radix illi crassissi-  
ma, arundine plenior, rimas similiter atq; cau-  
lis habens: manditur & cruda, & elixa, & assa  
eoque cibo, qui incolunt paludes, vtuntur. Na-  
scitur itaque sponte vel plurima, caterum &  
feritur in limo paleis largè admixtis, vt descen-  
dat, incorruptaque maneat: sicq; fabeta faciunt.

<sup>50</sup> Si autem semel apprehenderit, perpetuò manet.  
Radix enim valida est, nec procul arundi-  
num stirpibus, verum spinis subhorrens. Quam  
obrem eam crocodilus refugit, ne occurrens  
oculo offenderat, quoniam acutè non videret.  
Nascitur hæc etiam in Syria, Ciliciæque. hæte-  
nus Theophrastus. Hanc amplissima emittere  
folia tradidit Plinius libro x x1. capite x v.  
vbi sic inquit. In Aegypto nobilissima est Co-  
locasia, quam cyamon vocant aliqui. Hanc à  
Nilo merunt: caule, cum coctus est, araneis in  
mandendo: thryso autem, qui inter folia eni-  
cat, spectabilis: foliis latissimis, etiam si ad arbo-  
res comparentur, ad similitudinem eorum, quæ  
perfo

*Aegyptia  
faba com-  
sideratio.*

*Colocasia  
ex Plinio.*

personata in nostris animibus vocamus. Adeoq; Nili sui dotibus gaudent, vt implexis Colocasiae foliis, in variam speciem vaforum potare gratissimum habeant. Seritur iam hæc in Italia. hæc Plinius. Aegyptia faba (vt Galenus auctor est libro primo de alimentis) sicuti nostratrem magnitudine longè præcellit, ita & naturam humidiores, magisq; excrementitiam sortita est. Planta, quæ *καραμυδάς* Græcè, Faba Aegyptia Latine dicitur, Italicè, Fava d'è gitro: Hispanicè, Inhame.

† Græci radices hoc loco habent *ἀνίσταται*, id est, instat galeri. Quæ autem horum loco affert Ruellius ex Plinio sumpsit loco citato. Vbi verbis, quæ illa sequuntur, rectius fortè hunc Dioscoridis locum interpretari videtur.

## L E N S. C A P. C.

L E N S frequenti cibo acciem oculorū obtudit, agrè concoquitur, stomachū male habet, eumque & intestina inflat: sed aluum cū cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facillimè coquitur, nihil atri



in maceratione reddens. Vim habet adstringendi: quæ ex causa aluum cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accuratè, primæque aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id decoctum ventrem resoluit.) Somnia tumultuosa excitat: capiti, neruis, ac pulmōni inutilis: melius suo fungetur munere contra alui fluxiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosas, aut mespilis, forbisve, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plâtagine, aut gallis integris, quæ post decoctionem abiciuntur, vel rhoë, quæ obsoniis inspargitur: verum acetum cum ea diligenter percoqui debet, aliàs aluum conturbat. Contra subuersionē

stomachi, triginta grana lentis delibata deuorari proderit. Decoctum cum posceta, & illita, podagras lenit: sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, vlcera purgat. Decocta in aceto duritias, & strumas discutit: cum cotoneo, aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisq; addito rosacco: sed in amplo sinu, aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosas, adiecto melle, decoquitur: nomis quæ in gangranâ euaserunt, adiuncta maris aqua: pustulis, & his quæ serpunt, igni sacro, pernionibusq; vt antea dictum est: cōtra mammas in quibus lac in grumos coit, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur.

L E N T E S, quemadmodum libro VIII. *Lentium simplicium medicamentorum scriptū reliquit Galenus, valenter adstringit in caliditate verò, & frigidityte medium tenent, deficcant tamen in secundo ordine. Ipsum itaque earum corpus deficcet, & sistit ventrem: cæterum decoctum prouocat: proinde etiam prior aqua abicitur, vbi retentionis causa adhibentur. Hætenus loco citato Galenus. Cæterum asserenti Dioscoridis Lentem aluum cohibere, si detracto antea cortice discoquantur accuratè, primæque aqua inter coquendum effundatur, omnino refragatur Galenus, qui libro primo de alimentorum facultatibus sic scribit. Ne ex lente quidem panē quis tentauerit: præarida enim sine pingui, & friabilis est. Cortex eius vehementer adstringit, carnea substantia tenuiter, quæ & crassi succi, & terrestris est. Succus porro lentis, sicut antè retulimus, adstringenti est cōtrarius. Quocirca si elixir in aqua fuscū sile, garo, oleoq; conditū bibatur, aluum deficiet. At quod ex his decocta lente ad eum modū, quem retulimus, seculum apparatur, contrariam succo vim obtinet. Nam quæ ventri obueniunt, fluxiones deficcant, os ventriculū, intestina, & totum denique ventrem corroborent. Quamobrem colicis, & dysentericis accommodatus est cibus. Lens verò decorticata, vt illam adstringendi vehementiam, cumq; hæc alia videlicet omnia, quæ consequuntur, amittit: ita alibilior, quam integra illa efficitur, crassum, prauumq; succū gignens, tardè cōmetans: alui tamen fluores haud deficcet, vti ea quæ cortice non est spoliata. Iure igitur qui modū in hoc edulio non seruât, elephantiasimam vocant, & cancerū incurrunt. Siquidem crassa, siccaq; cibaria facillè in melancholicos humores*

res vertuntur. Quare iis duntaxat, quibus vitiosa est habitudo ob aquā in carne diffusam, lens cibo vtiliter præbetur: ceu aridis, & squaleutibus admodum damnosē. Eandem ob causam visum integrum, & inculpatum hebetat, immoderate exicans. Ei verò, qui contrario modo se habet, humidiori videlicet, opitulatur. Menstruis purgationibus inepta est: crassū enim, & tardissimum sanguinem facit. At muliebri appellato profluuiō conuenientissima. Cū potè lens, & pitana contrarie inter se sint facultatis, ex amborum commissione præstantissimum edulium componitur, quod nos in Asia phacopisanam nuncupamus. Verū non æqua vtriusque portio esse debet: minus enī pitanae adiiciendum, vt quæ per decoctionem in cremorē latē diffunditur, & in magnam attollitur molem: lens autem cocta exiguum quandam tumorem afficit. Sed enī huius edulij eadem ac pitana est confectio, præterquam quod saturicia, & pulegio adiectis, iucundius & paratius cōcoctiō efficitur: eūm pitana illis minime gaudeat, sed solo anetho, porroq; sit contenta. Deteriora est lentis condicio, quam diutius coci sapia insciant: minime enī in crassantia sibi vult admisceri, sed liquida potius, & crassitudine incidentia. Cui verò sapia commiscetur, iecoris obstructions pignere nata est, & ipsius visceris, atq; vna lienis inflammationes inuagere, nisi addito melle corrigatur. Illud præterea non arbitror obsecrum, durescentes viscera vtriusq; affectus, quos scirrhus vocant, hoc epulo exacerbari. Quod si suillam simul libeat incoquere, pitana recentem, lenti sale asseruatam congruere deprehendes: ceu vtrique quæ inter has media est, quam vianā, id est, recentem salitam appellant, phacopisanæ percommode & ad suauitatem, & concoctionem immititur. Magis tamen lens cum salis carnibus existat, crassos humores augebit. Nam hæc quoq; sanguinem crassorem, & melancholicum magis generant. Quapropter neque istis assatim, sæpèq; vti expediet, præsertim cui corpus melancholico præcrasso, & omnino prauo humori obnoxium est. Hæc eadem & de regionibus, anni temporibus, & aëris constitutionibus in vnoquoq; edulio intelligere oportet. At autumnō quidem melancholicis, ac siccanibus cibis abstinendum: hyeme verò eis vitandum: vti siquē in aritate humectantibus, & refrigerantibus: in vere medijs temperamenti, medijsq; facultatis epulas offerendū. Est porro mediolum non vnā, nec simplex species: quædam enim huiusmodi sunt, quoniam cum extremis nihil habent commune: quædā ex duorum contrariorum aquo intervallo à medio distantium missione sunt mediocritatē adeptæ: vt si quis iuxta id, quod paulo antè dixi, pitnam lenti commiscet. Sic & teulophascen, quæ ex betæ, & lente nomen apud Græcos inuenit, Heraclides Tarentinus non sinis modo, verum etiam laborantibus exhibebat. Est enim

& hoc ex pugnantibus compositum edulium: quamobrem etiam tardius, quam betæ, citius verò, quam lens per aluum descendit. Est & illud perspicuum, huius succum in corpus dispersatum, ex amborum virtute, lentis videlicet, ac betæ, esse permixtum. hæcenus Galenus. Ex cuius verbis facili colligi potest, Lentres in frequenti ciborum vsu minime esse recipiendas, præterquam ab iis, quibus morbi alicuius ratione, vt medicamenta potius, quam vt cibus conueniant. *Phaci:* Græcis est, quæ Lens Latinis: Hades, Arabibus: Lentiscchia, Italici: Linsen, Germanis: Lenteyas, Hispanis: Lentile, Gallis.

Nomen.

## PHASIOLEI.

## CAP. CI.

PHASIOLEI infant, spiritus cient, ægrè coquuntur. Virides cibo aluum emolliunt: ad vomitiones idonei.

## PHASIOLEI.



PHASIOLEI sunt in Italia vulgares, & in Phaeocolis hortis, ac aruis frequentes. Diuersa eorum habentur genera, variis coloribus distincta: nam *siderata*, & candidi, & rubescentes, & melini, ac diuersis repleti maculis reperiuntur. Quos superiores quoq; etati cognitos fuisse putauerim, et si nonnulli eos nuper in Italia venisse existiment. Candidi, quibus granū ceteris minus est, ceterorum leguminum more, in aruis feruntur. At rubescentes, melini, ac varij seminantur in hortis alijsue locis, vbi vmbra æstiuā fuerit opus. Siquidem præterquam quod fructum suo tempore demetendum proferunt, suis etiam inuolucris, ac sequaci foliorū, clauicularumq; reptatu, testudines, attegias, mapalia, tuguria, cameras, pergulas, scenas, ac tabernacula è lignis cancellatim fabricata opacant, ac veluti topiario opere contexunt: foliatq; radios inhibent, non secus quam vitis, lupus salicarius, bryonia, colocynthis, clematis, periclymenum, & stipitium id genus, quæ arbores, & sepes scandunt, perperant, implicant, ac conuestiunt. Quò fit, vt crediderim ego, illos à veritate huiusmodi deficere, qui dixerint, hoc Phaeolorum genus horrensem esse similicem, hoc

hoc etiam libro à Dioscoride descriptum: quippe quod illi maximè respondeat, ut in sequenti bus dicitur. Quamobrem longè aberrasse vide tur Marcellus in carpendo Hermolho tanopere audius, cum dixerit sibi parum verisimile vide ri ad eam altitudinem, & foliorum copiam pos se legem aliquid augeri, ut scias, & taberna cula vestiens inumbret. Quandoquidem non modò huic refragatur Dioscorides, sed & ipsius similis numerosus plantarum proventus, quæ in quàm plurimis hortis, ac viridariis longis simos scandunt palos, & cancellata testa conue tiunt. Ceterum nec eos quidem hallucinari putauimus, qui pro certo asseruerint, Phasiolos supradictis coloribus infectos, quos equidem nihil ab hortenfi similitudine differre existimo, Do lichos esse, quorum meminit Theophrastus li bro v 111. cap. 111. de plantarum historia: & Galenus libro primo de facultate alimentorum & ipsam secutus Paulus. Quippe quoniam do lichis (ut adiuuante Deo infra in similibus horten sis mentione dicemus) non sunt illud piso rum genus, quod Ausonii vulgò dicitur Rouf glione, Tridentinis verò Arabæ, vt Manardo Ferrarienti placet. Quandoquidem hanc sub Ochri nomine, tam Galenus, quàm Paulus de scripsere, ut eo, quem modò citauimus, loco pa rebit. Porro in hoc præsentì capite Dioscori des de candidis tantum, ac vulgaribus phasio lis differuit, non de crullis Arabæia vulgò vo cata in sequentibus verò capite de hortenfi simi lace, eorum mentionem fecit, qui vel rubetes, vel lutei, vel vesiculosi enascuntur. Ita *græci* 200 Græcè, vt etiam Phasioli Latine dicuntur: Italice, Fagioli.

ERVVM. CAP. CII.

ERVVM paruus frutex omnibus co gnitus, angusto folio, tenuis, semina in valvulis habens: è quibus farina fit, no mine eruina, ad medendi vsus conue niens. Eruum capiti onerosum est: alium esu turbat: sanguinem per vrinam extrahit: elixo boues saginantur. Parâ dæ farinæ ratio hæc est. Vberiora grana candida quæ deliguntur, permiscendoque aqua resperguntur, donec sufficienter combibant: postea torrentur, vsque dum hians cortex disrumpatur: moli râque, farinario cribro incernuntur: po stremodò farina reconditur. Hæc aluo utilis est: vrinam ciet: meliorem colo rem efficit: sanguinem per vesicam, aut alium cum torminibus elicit, si largius in cibo, aut potu assumatur: vlcerâ cum melle purgat: lentigines, & vitia cutis in facie, & maculas, totumque corpus

emendat: nomas, gangranas, duritiâs que, serpere non patitur: mammarum durities emolliat: atra vlcera, quæ therio mata vocât, fa

ERVVM.



uôsque emar ginat: carbun culos rumpit: cû vino suba stâillitu mor sibus viperarû, canum, homi nûq; medetur: vrinæ difficul tates: tenesmos q; ex aceto mi tigt. Eruû ta bidis, qui alimè tû nò sentiunt tostû, & ad nu cis magnitudi nê melle exce

ptum, sumptumque conuenit. Eius cre mor perniones, & pruritus in toto cor pore, sanat fouendo.

ERVVM officinæ, Græcorum more, Oro Eruu confi dum appellatur. Ceterum quod ex Alexandria, Syriacè Venetias conuehitur, aliud nimirum semen representare censemus, quàm Eruu, quod frequentissimum in Hæturia nascitur, ac feri tur. Folia mittit Eruum, quod vulgò Mocho vocamus, lathyri, vel cicerculæ vulgò vocatæ æmula: florem pisorum modò, admodum tu fescens: siliquas forma teretes, & oblongas, in quibus semen, colore in aliquibus pallido, in nonnullis candido, in quibusdam verò ru fescens. Porro cum hoc ignoraret Brasauo lus, credidit Eruum, quæ Theophrasto, Ga ieno, ac Paulo ochros appellatur, legitimum esse Eruum, nominis vicinitate fortasse dece ptus. Quin et Fuchus quoque hallucina tus deprehenditur, quod suo de plantarum historia volumine Cicerculam vulgò vocatam, satiuum Eruum esse existimauerit: et si cicerculam omnes rei herbariæ periti Galeno lathy rum appellari non dubitent. In cicercula enim, vt periculum facientibus clarissimum est, haud quaquam ex reperitur facultates, quibus pol lere Eruum tradidit Dioscorides. Quando quidem: præter id, quod omni prorsus amari tudine vacat, largius citata nunquam sangui nem per vesicam, & alium cum torminibus elicit, vt de orobro fatetur Dioscorides, & Ga lenus. Ex quo planè constat tam Brasauolum, quàm Fuchum, vtriusque pace, hæc in re de ceptos esse. Sed ignorandum non est, quod et si Eruum

Marcellus  
error.Manar  
dus nota.  
tur.

Nomina.

Brasauo  
licet Fuch  
sy lapsus.

Eruum ab agricolis feratur, habetur tamen & inter sponte nascētia: nanque & per se inter segetes frequens oritur. Verum cum à paucis cognoscatur, illud inter viciæ species annuērant. Animaduertendum præterea est, quod quanquam ad Eruinam farinam conficiendam elegit Dioscorides candidus Eruī semen: Galenus tamen libro primo de facultate alimentorum, candidum pallidum, ac rufescente, longè minus præstare scribit. Quapropter Brasauolus<sup>10</sup> Galeni rationem minimè habuisse videtur, cum sibi ex Dioscoridis tantum sententia persuaserit, album eruī semen in medicamentorum vsu tam rutilum, quam pallidum viribus antecellere. Eruī vires prodidit Galenus lib. 7. 1. 1. simplicium medic. ita inquit. Orobus defecit quidem excessu secundo intento, calcacit verò primo. Porro quare nus amantudinis est particeps, eatenus incidit, extergia, atque obstructions expedit. Cæterum si sumatur copiose, sanguinem per vrinas euocat. Et libro 1. de alimentorum facu. tabus ait. Boues apud nos, vt apud alias plerasque gentes, Eruo in aqua edulcato pascuntur. Hominum cibis proflus hoc semen damnatur. est enim & insuauissimum, & prauī succi. Cæterum in magna fame nonnunquam, sicut Hippocrates quoque scripsit, necessitate coacti homines ad id etiam confugunt. Nos eruū insit lupini præparato ex melle vimur, vt medicamento crassos pulmonis, thoracisq; humore expurgante. Candidum minus est medicamentofum, quam id, quod ad flauum, aut pallidum colorem tendit. Eruum bis elixum, & in aqua idēdem condulcescitur, insuauitatem cerē deponit, sed vnā cum ea & abstergerendi, & incidendi vim, vt sola in eo relinquitur terrestris substantia. Itaque citra amantudinis intellectum desiccans fit esculentum. Id Græcis *ῥυβός*, quod Latine Eruū nominatur: Arabibus, Herbum, Keistene,<sup>40</sup> siue Kerfene: Italis, Eruo: Germanis, Eruen: Hispanis, Ieruos: Gallis, Eris.

## LUPINI. CAP. CIII.

**SATIVVS** Lupinus notus est. Cuius farina cum melle delinctu, aut potu, ventris animalia expellit. Ipsi quoque macerati, & cum sua amaritudine esitati, eadem efficiunt. Decoctum eorum idem munus præstat, cum ruta, & pipere potum: quare lienosis prodest. eodem vlcerata tetra, quæ theriomata vocāt, gangranas, incipientem scabiem eruptiones pustularum, vlcera in capite manantia, vitilignes, maculasque fouere vtilissimum: menses, & partus extrahit, cum myrrha, & melle subdi-

tum in vellere. Eorum farina cutem, liquoresque corrigit: inflammationes cum polenta, & aqua mitigat: tubercula, & coxendicum cruciatus, ex aceto

## LUPINI



lenit: strumas in aceto cocta, illitæque dissipat: carbunculos rumpit. De cocti celestiaqua, donec in cremorem lentescant, faciem abstergunt: medenter pecorū scabiei, cum radice nigri chamaeleontis, ita vt tepente decocto abluantur. Citrinarum radix cum aqua

cocta. Lupini triti, vbi maceratu dulce, scere coeperint, cum aceto poti, fastidiū detrahunt, & cibi auaritatem faciunt. Gignūt, & syluestres Lupini, satiuīs similes, sed omnino minores: qui eadem quæ satiuī possunt.

**SERVITUR** in Hetruria Lupini non modo ad alimentorum vsū, sed ad agros impinguandos. Cæterum præter satiuos Lupinos, syluestrium in Hetruria innumere exoritur plantæ, quæ maio mense in campetribus videntur, floribus roseo colore rufescentibus. Satiui dum corantur in Italia, ibique frequenter eduntur cum sale. Lupinus (vt scriptum reliquit Galenus lib. 1. de alimentorum facultatibus) multi vsus legumē censetur. Elixum enim, ac deinde in aqua dilui, donec omnem sibi ingentem exuat insuauitatem, commendatus, ita editur cum garo, ac oxygaro, vel sine his etiam, sale modico conditus: non velut hordeum, & alia multi farinam instructa. Lupini dura, ac terrestris substantia est. Quocirca necessariū conconditioni repugnat, & crassum gignit succum: ex quo non brobē inuenis confecto, crudus propriè appellatur succus aceruatur. Et lib. 1. simplicium medicamentorum. sic inquit. Lupinus editur coctus, multis antè diebus in maceratione in aqua amaritudine deponens: sicque nutrimentum succi crassi. Cæterum vt medicamentum ita præparatus ex genere est emplasticorū. At qui naturam amaritudinē habet, is etiam extergendi, digerendique vim obtinet. Interficiū

Lupinū  
conficiera-  
tio.

Lupinū  
facile. ex  
Gal.

lumbri

Eruū  
res ex  
Gal.  
lens.

Nomina.

Jumbricos tum illitus, tū addito melle linctus, tum ex posca epotus. Quin & decoctum eius lumbricos eicere potest. Tum etiā foris identidē persufum, vicilignes, achoras, pustulas, exanthemata Græci vocāt, pforas, gangrenas, vlcera maligna, quæ cacoethē vocant, iuuat, partim extergendo, partim citra mordacitatē digerendo, liccandoq; . Expurgat iecur, & lienem cū ruta, & pipere suauitatis gratia assumptum. Elicir menses, ac fœtum cum myrrha, & melle impostū. Porro Lupinorū farina sine mordicatione digerit: nec enim liuida tantum, sed & cheradas, & dura phymata curat: sed tunc in aceto, aut oxymelire, aut posca coquatur oportet, idq; pro laborantiū temperamento, & affectus diuersitate, quod ex vsu est eligendo. Sed non est presentis instituti talia distinguere. Digerit isē quæ liuida sunt. Ex quæcunque modō diximus præstare posse decoctū, eadem omnia efficit & farina. Sunt verō etiā qui eam ischia-  
dicis cataplasmatīs modo illinūt. Lupinus agrestis amarior est, & ad omnia valentior domestico, eiusdem genere cum ipso faculatis. Lupinus satius sic Latinis, Græcis *ῥάπυς* & *ῥάπυς* appellatur: Mauritanis, Tarinus, Arinus, seu Torinus: Italis, Lupino domestico: Germanis, Vuickbonen, Feigbonen, Vuolfsackbonen: Hispanis, Entramuces, & Entramocos: Gallis, Lupins. Lupin<sup>us</sup> verō agrestis Latinis, *ῥάπυς ἀγρῆς* Græcis, & Italis Lupino saluatico dicitur.

Nomina.

RAPVM. CAP. CIIII.



DECOCTA Rapi radix alit, inflationē parit, humentem ac fluxam carnem creat, venerē stimulat. Decocto podagræ, per-  
nionesq; fouēt: contritoq; rapo, atq; imposito iuuantur. Si excau-

tæ radici rosaceum ceratum adigatur, & seruenti cinere liquescat, exulceratis pernionibus proficiet. Cymæ eius decoctæ manduntur, & vrinam ciunt. Semē antidotis, & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferūt, anodyna vocāt, idoneū est: potum contra venena salutare est: venerē concitat. Rapū & uria conditū, minus alimētī sufficit:

sed multò magis appetentiā recreat. Syluestre rapū in aruis nascitur. Frutex est in cubiti altitudinem assurgens, ramosus, læuis in cacumine. Folia fert læuia, digitali latitudine, aut maiora: & fructū in siliquis calyculatis: cumq; eorū inuolucra aperiuntur, alia intus siliqua spectātur, quæ quandam capitis speciem præbet. in qua semina paruula concipiuntur. foris nigra, intus alba. Additur in medicamenta, quibus ad deregendam cutem in facie, totoq; corpore, vtimur: præsertim quæ ex lupini, aut erui, tritici, aut lolij farina, fieri solent.

RAPVM in Italia vulgò notissimum est, præsertim apud Insubres, vbi statim post mensem æstate, iunio, ac iulio mensibus, in aruis secundo seritur: deinde mense octobri, cum radix ad summū exuberauerit, & terra eruitur. Satiuum in triplici recensetur genere, scilicet, longum, & rotundum: tamen si literis mandauerit Plinius libro x v i i i . cap. x i i i . longum erraticum esse. Non omitendum naturæ miraculum, ex tam paruo semine tribus penē mensibus gignitur tam magna radix, vt ea aliquibus in locis plus quā centenas libras pendat. At librarum triginta pondere nos sæpius innumera rapa vidimus in Ananiensi agro, longa, & colore purpurea. Rapum, & radix (vt Theophrastus est auctor lib. v i i . cap. i i i i . de plantarum historia) gaudent frigoribus: & sic ea dulcescere putant, simulq; incrementum in radicem, non in folia verti. Austrinis, atque serenis temporibus celeriter caulescunt. Nurnis Plinio palma, quòd eo fortasse solo magnitudine, & dulcedine cæteris præstant. Alpīs, quibus rara seges, rapa viliā admodum, ac necessaria habentur, tam in hominum alimentum, quam iumentorum pabulum. Quæ æstate seruntur, vindicantur ab erucarum iniuria, quæ pierunq; tenella folia in vniuersum erodunt, cōmissa scionis tempore semini fuligine: aut maioris sedi succo per noctē macerato semine. Siquidem Columella rem hanc sibi experientia comprobaram asserit. Syluestribus rapis scætet vbique Hetruria, nullis reclamantibus notis. Quare in hoc cogor Fuchij sententiæ retragari, qui manifestò errore, in suis de stirpium historia doctissimis commentariis, putat Rapum syluestre esse Rapunculū vulgò dictum: quippe quòd illi minime respondet. Rapi vires recensuit Galenus libro v i . simplicium medicamentorum, ita inquit. Rapi semen venerem excitat, vtpote spiritum flatuosum procreans. Sic & radix cōcoctū difficilis est, inflatq; , & semen generat. Et libro

Rapi consideratio.

Fuchia. p. sus.

Rapi Si. res ex Galeno.

secundo de alimentorum facultatibus, inquit. Rapum siue *γερνικόν*, siue *βανίκον* appellare velis, quod eius extra terram est, oleraceū censetur. Radix, quæ terra continetur, ante elixationem & dura est, & cibo alienatim aqua autem decocta, mirum si aliqua ex congeneribus plantis minus nutriat. Hanc quoque ipsam multifariam homines parant: nam & in melle, & in aceto reponunt, quò in totum annum vsui esse possit. Succus ex ea in corpus digestus, temperato crassior est: deoq; si quis ultra modum efflauerit, & maxime si perfecte conficere eam nequeat, crudum succum in venis congeret. Ad alui deiectionem nec conferre quicquam, nec officere dixeris, potissimum quando bene fuerit percocta, ut quæ longam elixationem requirit, optimaq; sit bis decoctionem perpeffa, ad eam modum videlicet, quem antea in hac præparandi ratione docuimus. Sin crudior ingeratur, concoctu est difficilior, ac flatulenta, stomachoq; noxia: nonnunquam autem & ventrem mordicat. *Ραβδία* id Græcè vocatur, quod Latine Rapum: Arabicè, Seliem, Selgem, Selgiem, siue Alfegiem: Italicè, Rapo: Germanicè, Rueben: Hispanicè, Nabo: Gallicè, Raue, seu Naucau blanc de iardin.

† Quod in Græco hic legitur *δ'αυσ*, Ruelius vertit fruticosum. Quæ vox est potius ab eo ex Plinio lib. x. x. cap. 111. reposita, quod etiam alijs sæpenumero facit, quam Græcè Latina reddita. Nos fruticem vertimus, licet hac, ut alijs plerisque vocibus, Dioscoridè impropiè usum fuisse existimemus.

NAPVS.

CAP. CV.



**C O C T A**  
Napi radix inflat, modicum alit. Semen eius potum venenorum vires hebetat: antidotis admiscetur. Conditur faleradix.

**N A P I** in raporum genere recensentur. Plura Theophrasto, &

Plinio productur genera: quanquam hac tempestate duo tantum repererim, nempe album, & flauum. Flui tamen albos crassitudine superent, magisque colore placeant, sunt tamen insipidiore, & gustui ob id minus grati. In Aegypto frequentius feruntur, quò in ibi eorum semine copiosum exprimant oleum.

*Βανία* nomen Græcum est: Napus, Latinum: *Nomina*, Italicum, Napo: Germanicum, Steckrueben: Hispanicum, Nabicas: Gallicum, Nauet.

RAPHANVS.

CAP. CVI.

**R A D I X**, quæ Græcis raphanus dicitur, excalfacit, flatus gignit, ori suauis est: sed stomacho aduersatur, ructus ciet, vrinâ pellit, aluo aptior: summo tamen cibo sumi debet, quò magis eius distributionem adiunet: cum autem præsumitur, cibum suscipit: endit: quare vomituris commodissime datur ante cibum: sensum aciem excitat. Decocta contra veterem tussim, & piruitæ crassitiem in pectore, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius vomitiones mouet: hydropicis commodissime illinitur: lienosis vtilis: sugillata cum mellerapit, & nomas amolitur: contra viperarum ictus auxiliatur: alopecias ad pilum reducit: lentigines cum loliacea farina emendat: his qui fungis strangulatur, tam cibo, quam potu salutaris est: menses cit. Semen, vomitiones facit, vrinam mouet, lienem extenuat: cum aceto illitum gangrænas validissime emarginat: coctum cum aceto mulso, anginis perquâ vtiliter gargizatur: contra cerastis morsus, potum ex vino, auxilio est. Syluestris raphani, quam Romani armoraciam vocant, folia satiuo similia, sed magis lamplanam imitantur: radix gracilis, tenera subacris. Tam folium, quam radix in olera recipitur: sed hæc excalfacit, vrinam concitat, æstuosa est.

**R A P H A N V S** Græcis dictus, Latine Radix appellatur. In Hecreria, quòd Latinum nomen imitentur, Radice vulgò vocant: quemadmodum & Romani suam antiquâ Raphani syluestris appellationem retinent, qui ipsum primæ literæ metathesi Ramoraciâ appellant. Cæterum cum syluestris, satiuâ longè durior, acriorque deprehendatur, Dioscoridis codex hic, ut in alijs plerisque locis, mendis suspicionem non vacat, vt potè qui Armoraciæ radicem reddat tenerâ mollemve, & subacrem. Leonardus Euchsus, medicus ætatis nostræ clarissimus, Armoraciam eam esse stirpem putat, quam Raphanum rusticum nonnulli

*Raphani  
considera-  
tio.*

*Hecreria*

*Napum  
considera-  
tio.*

nulli vocare, foliis oxylapath maioribus, radicibus acerrimis, quibus vititur vniuersa Germania, & Pannonia ad carniū inctus. Quia in re eum, alioqui peritum, facile haec ucinatum crediderim, acerrimo fortasse illius plantæ sapore fretum. Quod si is vel Romam vnquam profectus esset, vel ceteras notas accuratius perpendisset, nunquam (vt arbitror) in eum errorem incidisset. Raphani Theophrasto libro v i i. capite i i i. de historia plantarum, plura sunt genera: nempe corinthium, cleoneū, liothalassium, bæotium. Adolefcit amplissimè Corinthium, quod vel radice confectū detecta. Hoc enim sursum versus proerudit, non vt cætera in terram ampliari folitum est. Liothalassium, quod Thracium vocant, validissimum aduersus frigora traditur. Bæotium dulcissimū est, & figura rotundum, nec vt Cleoneum prælongum. Quibus folia læui, dulciora, suauioraque sunt: quibus autem scabra, acriora. Genus præterea redditur, quod foliis cruce simile constat. Raphanus (vt libro v i i. simplicium medicamentorum scribit Galenus) excalcifici quidem excessu terro, desecat vero secundo: agrestis autem in utroque efficacior est. Quin & se-

Raphani  
vires ex  
Cali.

RAPHANVS.



men ipsam planta efficacius est. Facultas ei inest digerendi. Itaque ad sugillata, & alia id genus liuida ob talem facultatem accommodata existunt. Meminit item Galenus Raphani lib. i i. de alimentorum facultatibus, sic inquit. Radicula sola, crudamque urbane homines vt plurimum prima mensa ex garo sumunt, alii ducentæ gratia: pauci autem acetum admiscerent. Rustici verò frequenter cum pane esant, non secus ac alia, quæ nobis natura non ars parauit: obsonia: in quibus est origanum viride, nasturtium, thymum, satouria, pulegium, serpyllum, mentha, calaminta, pyrethrum, eruca. Quippe hæc omnia viridia, eduliorum sunt obsonia, vna cum illis sumpta, suntque herbacei generis plantæ. Radiculae caulis quoque, & folia non-

nanquam eduntur, sed necessitate magis, quam sponte. Radix in eorum numero est, quibus obsonij potius, quam nutrimenti nomine assidue vescimur. Vim extenuatoriam gerit, cum qua conspiciunt vna calfacit: acris enim in ea qualitas exuperat. Verno tempore caulem in altum asurgentem producere solet, ceu alia, quæ nata sunt excaulescere. Hic elixus estur ex oleo, garo, & aceto, vt rapæ caulis, sinapique, & lactuca: nutritque magis caulis iste, quam cruda radícula, vt qui acrimoniam in aqua depont: quanquam minimam sanè & ipse alendi potestatem habet. Quidam non solum caulem, sed vna ipsas radículas elixantes comedunt, raparum modo. Cæterum cum medicos, tum idiotas illos mirari subit, qui à cæna crudas eas edunt, concoctionis iuuande gratia. Ipsi quidem id se experientia abunde compertum habere dicunt, nullus tamen eos citra damnum potuit imitari. Radix, quæ Græcis *ραφανία*, Latinis itè Raphanus & radix appellatur: Arabibus, Fugel, siue Fegiel: Italici, Raphano, & Radice: Germanici, Retch: Hispanici, Rauano, & Rauanillo: Galli, Refort.

10

20

Nemina.

RAPHANVS VVEGARIS.



SISER CAP. CVII.

SISER vulgò cognitum. Cuius radix decocta origrata est, & stomacho vtilis: vrinam ciet, & appetentiam inuitat.

Non desunt, qui crediderint, album quoddam Carotarum vocatum genus, quæ naporum modo carniū iuri incoquantur, legitimum esse Siser. Cæterum eos hallucinari putauerim, Plinij testimonio ductus, qui libro x i x. capite v. hæc habet: Inest Siferibus longitudine neruus, qui decoctis extrahitur, amaritudinis tamen magna parte relicta. Id quod in hisce Carotarum radicibus haudquaquam reperire licet: quippe quæ nec neruum concludat, nec gustu amaritudinem relinquunt, sed dulcedinem

Siferis cum  
Siderasio.





*Siseri Ci-  
ris ex Ga-  
lena.*

*Si Si for  
pna.*

*Nomina.*

nem potius quamdam præ se ferant. Quòd præ-  
terea Siser sapore sic subamaro, facile ex Gale-  
ni sententia comprobari potest libro v i i i .  
simplicium medicamentorum , vbi sic scribit.  
Sisari radix cocta stomacho grata est, & vrinam  
mouet, secundo ordine exalfaciens, adiectam  
habens amaritudinem quamdam, cum leuicula  
adstrictione, hæc Galenus. Ex quibus facile col-  
ligi potest, Sifera ab hisce carotis plurimum re-  
cedere. Sciendum igitur est, quòd Siser in Ita-  
lia non feritur, tamen in Germania, Rheno præ-  
sertim fluminis accolæ, suis in hortis sifera tre-  
quentissima habent, quæ & ferunt, & colunt.  
Ideoque Maguntie venalia abunde reperiun-  
tur, à Tincao agro illucallata. Siser folio est  
olusatri, caule, & umbella pastinacæ simili, radi-  
cibus dodrantalibus, nervosam intus matricē  
continentibus, subamaris, & colore subercoceo,  
& quæ gustatu gratiam cum palato non modi-  
cam ineant. Quarum in cibis præstata affectus  
Tiberius Cæsar ( vt citato loco tradit Plinius )  
omnibus annis à Germania aduehi sifera cura-  
uit ex Gelduba castello Rheno imposito , vbi  
generositas præcipua. Quod Græci *σιςαρ*, La-  
tini quoque Siser vocant: Mauritanii, Culcas, Fi-  
larum, siue Seifaroni: Itali, Sifaro: Germani, Gier-  
lin, & Girelin: Hispani, Chiriuias: Galli,  
Cheruy, & Gyroles.

LAPATHVM, SIVE RVMEX.  
CAP. CVIII.

EX GENERIBVS rumicis, oxyla-  
pathum vocant, quod in acutum ten-  
dit, dura habens extrema, in palu-  
stribus nascens. Alius est satius, & illi  
disimilis. Tertium genus sylue<sup>re</sup>, par-  
uum, plantagini proximum, humile, &  
molle. Quartum est, quod alij oxalida,

alij anaxirida, aut lapathon vocant. Fo-  
lia eius sylvestri, ac exiguo rumici fimi-  
lia: caule non magno: semine subacuto,  
rubente, acri, in caule, & agnatis appen-  
dicibus, emicante. Omnium decocto  
olere alius emollietur. Crudi illitu, me-  
licerides, rosaceo, aut croco adiecto, di-  
scutiuntur. Sylvestris, & oxylapathi, &  
eius, quam oxalida nominant, semē ex  
aqua, aut vino vtiliter bibitur, contra  
dysenterias, & celiacorum affectus, flo-  
machi fastidia, scorpionum ictus. Quòd  
si quis in potu præsumat, nihil molesti  
exitu patietur. Radices ex aceto co-  
ctæ, aut illitæ crudæ, lepras, imperigi-  
nes, & scabrosos vngues perfricant: sed an-  
tea locus aceto, & nitro in sole perfricā-  
dus est. Pruritus corporis, decoctum ea-  
rum sedat, si foueatur, aut in foliis bal-  
nearum confricetur. Coctæ in vino, &  
instillatæ, aurium, dentiumq; dolorem  
mulcent: strumas: paroridæque discuti-  
unt: lienem cum aceto extenuant. Ali-  
qui amolendis strumis radicum gesta-  
mine vtuntur, eas collo appendentes.  
Tritæ, & admotæ sceminarum proflu-  
uia sistunt: cū vino autē potæ regio mor-  
bo medetur, calculos vesicæ cōminuit,  
menses cient, scorpionū ictibus auxiliā-  
tur. Hippolapathon olus est magnum,  
in paludibus nascens. Easdem habet vi-  
res, quas supradicta rumicis genera.

OXYLAPATHVM.



OXALIS ALTERA.



*Rumicis  
considera-  
tio.  
Oxylapa-  
thum.*

TAMETSI Rumex, qui & Lapathum, nomine à Græcis mutuato, appellatur, hodie in hortis non feratur, in iis tamen spõte frequentissimus nascitur, nullis deficientibus notis, quibus satius delineatur. Lapathum, quod in paludibus nascitur, Dioscoridi Oxylapathum vocatur, non quidè quod gustu acutum, seu acidum sentiat, ut oxalis, quam vulgus officinarum Acetosam appellat, sed quod foliis proueniat in acutum definitibus. Siquidem illi Græcorum appellatione, modò significat acutum saporis respectu, modò mucronatò respectu formæ. Ad quod non aduertentes Aui-cenna, paritèrque Serapio Lapathū omne nullo discrimine Acetosum nominant, perperam id ad saporem referentes, quod ad foliorum figuram retulit Dioscorides in primo lapathi genere. Flin. lib. x. x. cap. x. x. Oxylapathon nō nisi in palustribus nascēs, satius similius esse scribit, cum tamen alterū alteri dissimile faciat

OXALIS.



HIPPOLAPATHVM.



Dioscorides. Illud verò, quod ab acido succo dicitur Græcis dicitur (etsi id silentio inuoluit Dioscorides) duorum est generum, maius nimirum, & minus. Illi folia sunt hortensi similia: huic verò sagittarum figura, mollia, læuia, quibusdam veluti capillamentis subrubentibus inspersa, succosa, foliisq; maioris acidiora. Semen vtrique idem, præterquàm quod maiori maius, minori verò minus. Hippolapathū porò nō solum in palustribus prouenire videmus, sed etiam in montibus, iis præsertim in locis, vbi pecudes diutius stabulari solent, & vbi eorum fimo pinguescit solum, illi plantæ omnino respondens, quæ sub Rhabarbari nomē clatur, passim hodie in hortis, ac viridariis plantatur. Lapathi meminit Galenus lib. v. i. i. simpl. medic. sic inquit. Lapathum moderatè digerentem sortitum facultatem est, at oxylapathum mistam: nā simul cū eo quoddam digerit, nonnihil quoq; repercutit. Semen eorum manifestum

*Oxalidis  
considera-  
tio.*

*Hippola-  
pathum.*

*Lapathi  
Gires ex  
Galen.*

quandam etiam adstrictionem obtinet, adeò vt & dysenterias, & diarrhoeas, siue profluvia sanet, & maximè oxylapathi. Porro hippolapathum, quod in totum in paludibus prouenit, easdem dictis facultates obtinet, sed imbecilliores. Et libro secundo de alimentorum facultatibus: Rumicem, ait, vt antè diximus, syluestrem heram possit quis appellare, cum non gustu solùm, verùm etiam facultate hortensii betæ persimilis sit. Quoniam autem betæ incundior est rumice, idcirco ea magis homines vescuntur. Quare nec nos quoque prolixius hic de rumice scribere oportet, cum in betâ omnia ad rem facientia exposuerimus. Planta,

Nominâ.

quæ Græcis *ἀνράδιον*, Latinis etiam Lapathum & Rumex appellatur: Arabibus, Humadh, Humadh, seu Hamad: Italis, Rombice, & Lapazio: Germanis, Ampffer: Hispanis, Labaca: Gallis, Lampe. Quæ verò Græcè *ῥαῖς*, oxalis item Latine dicitur: Germanicè, Sauer ampffer: Hispanicè, Azederilla: Gallicè, Ozeille, Vinette, & Sallette.

† Nihil fortasse Plinius à Dioscoride dissentiet, si in hoc loco sequamur lectionem Orbasij lib. x. i. simplicium: qui habet *ἡ νάρκισσος ὅμοια τῇ ῥαῖς*, id est, non prorsus simile primo. Nam ex hac patere arbitror, non tantum priora lapathi genera inter se differre, quantum vulgata lectio innuere videtur.

## LAMPANA. CAP. CIX.

Lampana  
nâ eo vide  
ratur.

LAMPANA syluestre olus est. Plus alit, quàm rumex, & stomacho vtilius. Cuius folia, caulésque coquantur in cibo.

QUANVIS hic inter olera, quæ in alimentorum vsum venere, Lampana recensatur à Dioscoride, nullis tamen

notis ab ipso describitur, quèd fortasse suis in regionibus notissima haberetur. Id quod nobis Italis non euenit. Quamobrem dixerim vnâ cum Plin'o libro x. cap. i. x. inter syluestres brassicas lampanam esse, pedalis altitudinis, his-futis foliis, napi simillimis, nisi candidior esset flore. Nascitur hæc frequenissima in He-

truria, Apulia, ac plerisque Italæ locis, iis præsertim campis, qui aratrum eo anno minimè sensere: tamen nobis hac tempestate non fuerit, nisi forsan virgente annonæ penuria, in alimentorum vsum recepta. Meminit huius Galenus libro v. i. i. simplicium medicamento-  
*na Gires*  
rum, his paucis verbis. Lampana est succos ex Gal.  
prauos procreat. Cæterum illa abstergendi nonnullam, digerendique facultatem possidet. *Nomina.*

Olus hoc vt Græcis *ῥαῖς*, ita Latinis, & Italis Lampana nominatur.

## BLITVM. CAP. CX.

BLITVM estur oleris modo. alio vtile est: nullius in medicina vsus.

## BLITVM.



BLITVM *Bliti conf.*  
duorum est gene. *deratip.*  
rum, rubrum ni-  
mirum, & album.

Vtrunq; norum, in hortis, & campis nascens. Rubro caulis, & folia adèd rubescunt, vt cocineo colore infecta videantur, est temporis tractu tandem purpurefcent. Folia amarantum referunt, sicut etiâ caulis. Quin & radix sanguineo succo madet. Album

prouenit iisdem soliti, latioribus tamen, & colore subalbidis. Flores & semen racematum coherentes, tenuibus insident ramusculis, ex alarum cauis prodeuntibus, panicularum effigie syluestris panicis modo. Hoc olus Tridentina rura Biedone vulgò appellant, recipitq; nonnullis in cibum. Id namque aqua prius decoquunt, dein affuso oleo, vel baryro in sartagine frigunt, additis allio, & omphacis, vel aceto. Veruntamen cibus is nonnunquam (vt ego ex visu testari possum) vomitiones mouet, venterculi & intestinorum tormina facit, & alui fluxiones, ciet, exciata bile. Eaque propter Plinius libro x. cap. x. i. ita de eo scriptum reliquit. Blitum iners videtur, ac sine sapore, aut acrimonia vlla. Vnde conuiuium feminis apud Menandrum faciunt mariti. Stomacho inuile est. Ventrem adèd turbat, vt choleram faciat aliquibus. Dicitur tamen aduersus scorpiones potum, & vino prodesse, & clauis pedem illini. Item licibus.

lienibus, & temporum dolori ex oleo. Hippocrates menstrua fisti eo cibo putat. haecenus Plinius. Bliti meminit Galenus libro v. i. simplicium medicamentorum, his verbis. Blitum olus est esculentum, humidum, frigidum; temperaturae, in secundo maxime excessu à temperatis. Item secundo de alimentorum facultatibus: Qui porro, inquit, atriplicis, blitiq; gustabilem qualitatem intelligit, brassicæq; saporis commeminit, lactucam in brassicæ, ac horum olerum medio esse non diffitebitur: siquidem illa egregie desiccatur, hæc contra planè humida, aquosique sunt. Quapropter non ex solo oleo, garoque, sed addito aceto sæpius, meliusque assumuntur: alias namque stomacho infesta sunt. Diximus autem istiusmodi olera nonnihil ad laeuigandam aluum momēti asserre, maxime si cum humiditate glutinosam lubricitatem sortita sint, hæc Galenus. Quo fit, ut mirari liceat, si Plinius, & Galeni scripta perpendamus, quod dixerit Dioscorides, Blitum aluo utile esse, & nullius in medicina vtilis. Eius nomen Græcum est *βλίτιον*: Latinum, Blitum: Arabicum, Bachala iamenia, siue Bachale alienianie: Italicum, Blito: Germanicum, Mayer: Hispanicum, Bredos: Gallicum, Portee rouge.

*Bliti Cicer ex Galeno.*

*Nemina.*

MALVA.

CAP. CXI.



MALVA sativa esei longè aptior sylvestri. stomacho aduersatur: aluum iuuat, sed multò magis caules: interaneis, & vesicæ vtilis. Cruda folia cū salis exiguo manducata, ægilops ex melle sanant:

verum cum cicatricem trahere ceperint, eademum citra salem vtendum est. Contra aculeatos apium, vespærumque ictus, illita efficax est: eadem cruda cum oleo trita peruncti non feriuntur: vlcera manantia in capite, furfurisque cum vrina sanat. Sacris ignibus, & ambustis decocta folia, tritracta, vtilissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum vuluas infusione mollit: prodest erosioribus vesicæ, & intestinorum, vuluæ, sedisque, clystere infusum.

MALVA ARBOREA.



sica cruciatus lenit.

Ius decoctæ cū radice sua contra omnia venena auxiliatur, si continuo à bibentibus reuomatur. contra phalangiorum morfus remedio est. lac euocat. Semen in vino potum, addito loti sylvestris semine, ve-

MALVA vulgaris adeò notitiæ est, ut nulli ferè reperiantur, qui eam non nouerint. Plura eius genera: sed ea, quæ aliquibus locis in Italia arborescit, nil aliud est, quàm sacra cultorum mangonio in tantam magnitudinem assurgens, ut libro primo de plantarum historia capite v. prodidit Theophrastus, cum inquit. Quædam etiam comperita sunt ob culturam diuersa effici, atque à sua natura discedere, ut Malua in alcum se attollens, atque in arborem transiens. Quippe ita fit nec tempore longo, sed mensibus senis, aut septenis, ita ut longitudine, crassitudineque instar hastæ possit grandescere: quapropter commodè ad vsum baculi venit: Tempore verò longiore exacto, pro ratione magis quoque incrementa capessit. haecenus Theophrastus. Plinio libro x. i. capite 111. præter eam, quæ in Arabia septimo mense arborescit, & baculorum vsum præbet extemplo, est & Malua arbor in Mauritania Lixi oppidi æstuario, vbi Hesperidum horti nasci se produntur. Ipsa altitudinis pedum viginti, crassitudinis quam circūplecti nemo possit. In simili genere habetur & canabis. Maluam, quæ in arborem degenerauerat, vidi ego primum Grignani ad Benaci ripas in quodam monachorum cœnobio, vbi eorum orto, & cultu tantam sibi acquisierat amplitudinem. Est & ea inter maluarum genera recensenda, quæ in hortis ac viridariis folio exit magno, rotundo: cauile tricubitali: floribus totarum effigie rubentibus, candidis, vel subrubecis, nullo tamen odore fragrantibus. Nam si ve rosæ nares conciliarent, quemadmodum oculos hilari forma, ac coloris viuacitate alliciunt, nulli dubium est, quin de præstantia, ac pulchritudine cum ipsis rosis cæterate possissent. Malua meminit Galenus libro v. i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Malua agrestis quidem digerentis paulum, & emollientis leuiter est facultatis. Hortensis verò quanto plus habet aqueæ humiditatis

*Malua arborea. Malua arborea.*

*Malua arborea. Malua arborea.*

miditatis, tantò facultate imbecillior est. Fructus eius tantò validior est, quantò & siccior. Porro huius generis est & ea, quæ anadendromalache nūcupatur, sed efficacissima comprehensarum in digerendo. Appellatur etiam althea. Et libro 11. de alimentorum facultatibus: Est, inquit, ab hac hortensia alia quædam sylvestris malua, cœu à lactuca est *Epilachna*. id est lactuca sylvestris. Inter verò has congeneres plantas id est discriminis, nempe quòd sicciora sint sylvestria, fatius humidiora. Permissum quoque est malux succo aliquid glutinosum, quo lactuca caret. A refrigerandi facultate manifestè abest, ut etiam ante sumpcionem cernere licet, si ex amobus vicissim oleribus cataplasma ad ezelidum quempiam affectum, quale est erysipelas, componas: id quòd scititare homines consueverunt, molliuscula folia perquam diligenter tundentes, donec ad leuorem exactissimum redièta sint. Tum nanque cognosces lactucam manifestò refrigerare: maluam verò modicum, & quasi tepidum quandam calorem obtinere.

ATRIPLEX SATIVA.



*Atriplex*  
considera-  
tio.

ET SI in Hærticis hortis rara admodum sit Atriplex: frequentissima tamen apud Insulbes feritur, quòd ex ea præferim rura sibi quoddam placenta genus conficiunt hoc modo. Incidunt enim acutissimo cultello Atriplicis folia, & caseo in scobem attrito, buryro, ac ovis committent. & in fartaginibus foliosa pasta subitrata, decoquunt, comeduntque abunde, perunctis vndique labiis. Hæc inter olera ocyssimè affurginam & feritur, & manditur decimo quinto à factu die. Folia promit caule tenuis lora, in mucronem tamen desinentia, sagittarum instar, pinguis, succosa, colore ex viridi in luteum languescens. Caulis, qui illi rubet, multis vndiq; ad natis, ad quaror cubitorum mensuram adolefcit: semine pressis, tenuibùsq; foliiculis concluso. Præstat Atriplex in cibis vere tantum: quidem ut ocyssimè crecit, ita & ve-

Facilè hoc olus deorsum labitur, non tantum quia humidum est, sed etiam quia glutinosum, præcipuè cum oleum, garumque affatim vna hauritur. Ad concoctionem mediocriter se habet. Si horum trium olerum, succos inter se compares, tenuis & absterforius betæ, malux crassior glutinosiorque, lactuce in vtriusque medio statueretur. Herba, quæ *Malua* Græcè, malua Latine vocatur: Arabicè, Chubeze, seu Chabazi: Italicè, Malua: Germanicè, Pappel: Hispanicè, Maluas: Gallicè, Maluc.

*Nomina.*

## ATRIPLEX. CAP. CXII.

ATRIPLEX aliqui chrysolachanon vocant. cognitū olus est. Duo eius genera, sylvestre, & satium. Coctum estur, ut olus: alium mollit. Panos discutit, siue crudum, siue coctum illinatur. Semen cum aqua mulsā potum, regium morbum sanat.

ATRIPLEX SYLVESTRIS.



locissimè senescit, & deperditur. Credidere recentiorum quidam Atriplicem, & Spinaciam vulgò dictam, eiusdem esse generis. Verum ij, meo quidem iudicio, falluntur apertissimè, spinio re-  
quippe præter id, quòd Spinacia nouum in Ita-  
lia olus est, & foliorum, & caulis, & seminis forma, atque colore ab atriplice maxime differt, sicuti & sapore. Nanque suspicatur Manardus Ferrariensis, nescio tamen qua ratione ductus, Atriplicem, & Spinaciam chrysolachani speciem esse. Sed eius sententiam minimè probandam censeo: chrysolachanon enim Latinis aureum olus significat. quod tamen Atriplici competere possit, non tamen ob id Spinacie conuenire videtur, quæ foliis, caule, flore, ac semine perpetuè virefcit. Cæterum duo alia Atriplicis genera habentur, vnum sylvestre, alia generum maritimum. Illud in campellribus, atque ra-  
eriam.

SPINAGIA.

ATRIPLEX MARINA.



K A L I.



*Kali Mauri-  
tanicum  
mentis.*

etiam alibi sponte  
provenit. hortensi  
omnibus propè no-  
tis respondet, præ-  
ter quam foliis,  
que albidiora spe-  
ctantur, herba vul-  
go cognita est. A-  
triplex verò in ma-  
ritimis nascens, cu-  
ius nulla (quod  
equidem sciam) fa-  
cta est mentio à  
Dioscoride & Ga-  
leno, iis facile sese  
offeret, qui non  
grauantur, vt  
hanc & alias mari-  
timas herbas cognoscant, maris litora peragra-  
re. Eam nos copiosam inuenimus Tergesti ad  
salinas in maris litore, nimirum diuersam ab  
halimo olere maritimo, vt eius imago, quam  
hic damus, apertè declarat. Inibi quoque plan-  
tam illam nobis contigit videre, quæ K A L I.  
Mauritanis appellatur, cuius cinere vtuntur  
fabri vitriarij ad vitrum conficiendum: ex de-  
cocto autem eiusdem herbæ paratur sal illud,  
quod Alkali istidem dicitur. Hæc cum primum  
terra emergit, folium est tereti forma, minori  
sedo non ab simile: atque deinde crescens, cau-  
le erecta geniculato, non multo pòst tempore  
in digitalem fermè longitudinem attollitur.  
Cum verò amplius adoleuerit, è geniculis so-  
lia emittit pinguia ac crassa, in medio caua, &  
ex lata origine mucronata. Vbi denique plan-  
ta adulta senescit, folia in caulium cacumini-  
bus longè minora exiliiora conspiciuntur,  
colore rufo: ex quorum ortu pilula prodeunt  
rotundæ ac paruz: quibus exile semen inclu-  
ditur. Caules habet pingues & rufos. Sapor  
vniuersæ plantæ salus, veluti crithmo. Hanc



*Atriplicis  
Gires ex  
Gal.*

quidam alteram Dioscoridis Anthyllidem esse  
centent. Sed errant, meo quidem iudicio, vt  
latius dictum est in sequenti libro, tum etiam  
in ea Apologia, quam in Anatum illum Lusi-  
tanum scripsimus. Atriplex, vt memoriæ pro-  
didit Galenus lib. v. i. simplicium medicamen-  
torum, humida, & frigida temperie est, humi-  
da quidem secundi ordinis à mediis, frigida  
verò primi, quam vtique tepidam esse calidi-  
tatem posuimus, cuiusmodi rosis inest: non  
tamen adstrictionis est particeps, sed aquea est,  
& minimum terrena, similiter malua. Quin &  
ventrè celeriter permeat, vt illa, ob lubricitatē.  
Porro paululum omnino eius est, quod dige-  
rendi obtinet potentiam. Horrèscs autem atri-  
plex, & malua, quam agrestes tum humidiores  
sunt, tum frigidiores. Proinde phlegmonis, &  
phygethis incipientibus, gliscitibusq;, &  
mollibus etiamnum, ac velut feruentibus hor-  
tenses: vigentibus autem, & declinantibus, ac  
indurescentibus commodiores sunt agrestes.  
Semen eius abstergendi vim habet: itaque ad  
morbum regium ex pituita (rectius fortè hepa-  
tis legendum) infarctu progenerat vile est. hæc  
Galenus. Scribit Serapio rasim vidisse hominē  
quendam, qui ex Atriplicis semine duarum  
drachmarum pondere sumpto, crebris tum vo-  
mitionibus, tum alui delectionibus vexatus  
fuit, adeò vt ad extrinsecum virium imbecillita-  
tem deueniret. Quod mihi quidem mirum non  
est: quandoquidem noui ego pharmacopolam  
quendam, qui ad rusticos purgandos Atriplicis  
tantum semen exhibebat: quod is non sine mo-  
lestia magna aluum abunde ciebat, atque etiam  
simul crebros prouocabat vomitus. Quæ tamen  
facultas paucis, vt puto, hæcenus innotuit.  
Atriplex sic Latinis, Græcis ἀτρίπλαξ, & ἄτρι-  
πλος vocatur: Arabibus, Caraf, seu Carafi  
Italīs, Atriplice: Germanis, Molten & Mil-  
ten: Hispanis, Armoles: Gallis, Follete, &  
Femes.

*Nomina.*

BRASSICA CRISPA.



BRASSICA. CAP. CXIII.

BRASSICA sativa aluo idonea est, si modò leuiter seruetur edatur. nam percocta aluum sistit, sed multò magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur: stomachum autem malè habet. acrior est astiua. In Aegypto propter amaritudinem non estur. Cæcutientibus, & tremulis esse prodest. Summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini noxam relinquit. Mellior stomacho cyma, sed acrior, & ad ciendum vrinam validior. ea condita stomacho inimica est: aluum conturbat. Crudus succus cum nitro, & iri deuoratus, aluū emollit: cum vino quoq; epotus, viperarum moribus auxiliatur: cum sceni græci farina, & aceto, podagris, & articulorum vitis illinitur: prodest & sordidis viceribus, & vetusis illitis: caput purgat naribus infusus: menses extrahit, cum loliacea farina inditus. Folia per sese illita, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusq;: epinyctidas, ignem sacrū, leprasq; sanant. carbunculos ex sale rumpunt: fluentes capillos retinent. Cocta addito melle aduersus depascētia vlcera, gangranasq; valent. Lienosisq; ex aceto cruda profant. Māsa, deuorato succo, retusam vocē instaurant. Decoctū eius potu, aluū, & menses ciet. Flos post conceptionē in pectus subditus, partū abortu vitiat. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto

BRASSICA CAPITATA.



20 nascitur, potū tineas repellit. In antidotā theriaca additur: faciei cutē, lentiginēsq; expurgat. Virētes cauliculi cū radice cremati, & adipe porcivento excepti, diuturnos laterū dolores mitigant.

BRASSICA SYLVESTRIS.  
CAP. CXIIII.

30 SYLVESTRIS Brassica, maritimis præruptisque locis, magna ex parte gignitur: sativæ similis, sed candidior, hirsutiorque, amara. Cuius cyma in lixiuio cocta, ori non insuavis. Folia illitu vulnera conglutinant, & inflammationes, tumoresque discutiunt.

BRASSICA MARINA. CAP. CXV.

MARINA Brassica à sativa prorsus abhorret, quòd folia ferat rotunda aristolochiæ, longa: tenuia: singula à ramulis rubētib; exeūt, singulari, vt hederæ, pediculo. Albo succo prædita est, sed pau-



co, falso gultu, & aliquantum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris: vehementissimè aluum ciet in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.

*Brassica*  
*fatimaga-*  
*nera.* SATIVA Brassica, Theophrasto, & Plinio auctoribus, in multiplici recensetur genere. Id quod & horti in Italia attestantur: nam in iis multiplex, & varia crescit Brassica. Cato brassicæ tria fecit fastigia. Vnam grandibus, laisive foliis, caule magno, consili cymarum luxuria. Alteram crispo folio, quam ab apij similitudine apianam vocant. Terciam propriè vocatam crambem, minutis caulibus, tencioribus foliis, lævem, tencram, tenui succo, & ærerrimam quidem omnium, & magis medicamentosam. Verum Plinius libro x i x. capite v i i i. Brassicæ (vt diximus) complures enumeravit species. Inter quas eam Sabellicam appellari tradidit, quæ crispis admodum foliis, lactucæ modo in se concluditur, intus albicans, tenera, subdulcis, & quæ hac ætate omnium præstantissima habetur. At enim, Sabellicæ vsque in admirationem crispâ sunt folia, quorum crassitudo caulem extenuat, sed dulcissima pebbitur ex omnibus. Est & capitata conglomeratis vndiq; in orbem foliis, Plinio lacuturis appellata, qui loco citato sic inquit. Nuper subiere lacuturæ ex consuete Aricina, vbi quondam fuit lacus turrisque, quæ remanet, capite prægrandes, folio innumeri. Alij in orbem porrecti, alij in latitudinem torosi. Nec plus capitæ vllis post trititanum, cui pedale aliquando conspicitur: & cyma nullis ferior. Quæ omnia nostratibus brassicis capitatis, quæ vulgo Capucci dicuntur, pulchrè respondet. Est insuper ex iis, quæ nostris Italicæ hortis proveniunt, alia quædam, cuius caulis rapi in morem exuberat, quandocumque subinde medulla, pingui iure incocta rapum modo. Huius non reperio meminisse Plinium, nec eo vestriores alios, qui de horiorum sationibus scripserunt: sicut nec illius, quæ foliis admodum per ambitum laciniatis, minutimq; intercisissis assurgit. Pernicialia porro Brassicis omnibus cum vitibus odia feruantur. Vitæque viam oleris huius odore fugari Theophrastus, & Plinius affirmant: assistamq; ad olus diffugere Varro tradidit. Quo argumento vsus Androcles, Brassicam contra temulentiam polleere credidit. Sed cur crapulam sedet, id cause redditio in problematibus Aristoteles, quod scilicet dulcem nimirum succum, abstergentem quæ contineat. Sylvestris in maritimis nostris Semenibus Argentario promontorio, aliisque tum Tyrreni, tum Adriatici litioribus frequens nascitur. Hanc non longè à Terracina vrbē, via qua itur Neapolim, plurimam vidimus, foliis domesticæ similibus, sed hysocyami modo hirsutis, amaro ac insuavi gustu. Ex semine Brassicæ veteris (vt Plinius est auctor libro x i x. capite x.) rapæ sunt, æque inuicem. Brassica scitua, & esculenta, vt memorat prodidit Galenus libro v i i. simplicium medicamentorum, desiccandi vim habet tum esâ, tum foris imposita, non tamen etiam admodum acrem. Alioqui & vlcera glutinat, & maligna vlcera sanant præterea phlegmonas iam induratas, ac ægri-

solubiles, & id genus quoq; erysipelat. Eadem facultate epinyctidas, & herpes sanat. Habet quiddam etiam in se absterforium, quo lepras curat. Porro semen eius porum lumbricos interficet, maxime brassicæ Aegyptiæ, quæ ea scilicet tēperatura faciet. Est. Sanè amara qualitatē participes semē est, sicut videlicet omnia alia medicamenta, quæ ad lumbricos idonea sunt. Secundum eandem facultatem ephelidas, & lentes, & quæcumq; alia modicam absterfionem possunt, adiuvant. Caulis Brassicæ combusti, cineres efficiunt admodum desiccantes, vt videlicet iam adurentē vim participant. Hac ratione ei veterem adipem commiscientes, ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis, adhibent. Nam valenter digerēs medicamentum efficitur. Brassica verò agrestis quodammodo calidior, siccior, & domesticæ est, ceu alia propemodum omnia agrestia sui generis, domesticis secundum vtrunque hanc facultatem valentiora sunt. Quamobrem neque intra corpus citra noxam sumitur, vt quæ longius ab humana recessit temperatura. Eadem de causa & gustantibus amarior est, quam domesticæ: quamquam domesticæ quoque subama in quiddam, & acre contineatur vtrunque habet agrestis validam, quare etiam extergit, & digerit quàm domestica valentius. Marina autem brassica suprà quàm quod ventrem deiciat, vtpote subfusa, & subamara gustu, facit sanè etiam ad externos corporis vsus, & ad omnia ea, ad quæ tales qualitates accommodatur, idonea. Et libro i i. de aliment. facultate: Brassica quoque, inquit, à multis vt obsonium estur: medici autem, vt desiccante medicamento, ea vntur. Diximus de hac quædam cum de facultatibus medicamentorum ageremus, tum etiam in libro superiori: quæ nunc summarim perstringemus. Ergo brassicæ succus purgandi vim quandam obtinet: contra solidum eius corpus siccitatis ratione cohibere magis, quàm incitare deiectionem potest. Proinde cum expellere alui excrementa propositum erit, aheni, in quo elixivum cum aqua fuit, propius admoto, ipsam extimere confestim, vasculoque in quo paratur, osium cum garo iniicere oportebit: si sciam pro garo sumas, nihil refert. At humentem ahenum siccare volentes, cum mediocriter bullisse videbitur, priore aqua effusa repensē, aliam valentem iniciamus: ac ita rursus in ea discoquimus, vsque dum tenera staccidaque euaserit, quod non facimus, cum ventris subducendi gratia sumitur. hætenus Galenus. Cæterum licet Dioscorides prodiderit marinam brassicam folia ferre rotunda aristolochiæ, longa, ac tenuia, ea tamen non ab re ab omnibus esse censetur, quam vulgus officinarum Soldanellam appellat. Quippe quæ in maritimis nascitur, foliis lacteo succo mædat, ramulis consistit rubentibus, è quibus prodeunt ipsa folia, hederæ modo, quæ gustu sassa, & amara, & quadantenus acris sentiuntur. Quamobrem Dioscoridis codicem hoc

*Brassica*  
*agrestis de*  
*leioris.*

*Brassica*  
*sylvestris*  
*considera-*  
*tio.*

*Brassica*  
*viros ex*  
*Galeno.*

*Brassica*  
*marina. &*  
*sideratio.*



*Lacus Dio* hoc in loco, sicut & in aliis permultis, mendicor. *suspe* de suspitione non vacare putamus. Facile enim *etiam.* cuenisse crediderim libriorum incuria, ut

*Ruellij er*  
*ror.*

folia *manzà*, id est, longa, pro *manzà*, id est, parua, hoc loco successerint: & certè facilis fuit vnus literæ lapsus. Siquidem Soldanella vocata omnibus notis marinam brassicam repræsentat, exceptis foliis, quæ sunt aristolochiæ rotundæ minoræ. Ruellius vir doctissimus, etsi in hoc nobiscum cæterisque consentiat, quòd marina brassica hæc sit herba, quæ vulgò Soldana, & Soldanella dicitur, nulla etiam (vt inquit) reclamante nota, in eo tamen manifestè aberrasse deprehenditur, quòd Soldanæ folia

aristolochiæ longæ, atque etiam prælonga reddiderit. Errat præterea in hac planta Matthæus Syluaticus pandectarum auctor, quòd crediderit Arabum Chachile Soldanellam esse. Cuius *Synonymi error.* error apertè conuincitur ipsius Serapionis testimonio: quippe qui Cachile suum vnice simile fecerit, folioque non aristolochiam, sed nasturtium imitari tradiderit. Marinam brassicam in litoribus Venetiæ, Aquileiensibus, ac Tergestinis, vbi copiosa nascitur, nos sæpius *Nomina.* vidimus, ac legimus. *Karub* ita Græcis, Brallica Latinis appellatur: Mauritanis, Corumb, sive Karub: Italis, Cauolo, & Verza: Germanis, Koel: Hispanis, Colhes, & Couues: Gallis, Choux.

BETA NIGRA.



BETA.

CAP. CXVI.

BETA duorum generum est. E' quibus nigra coquitur cum lenticula, vt ventrem sistat: quod magis radice eius præstat. Candida aluo vtilis est. Vtraque tamen propter nitrosum humorem, quem habet in se, noxij succi est. Vnde succus earum, cum melle nariibus inditus, caput purgat: aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radicis, & foliorum, surfores, lendēsque deterget: perniones fotu mitigat. Crudis foliis vitiliginēs, nitro antea perfrictis: al' opæciarum inanitates, scalpello prius exasperatas: atque depaſcentia vlcera, illi prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambustisque cocta medetur.

*Beta com-*  
*sideratio.*

BETA tam candida, quàm nigra in Italiæ hortis frequentissima nascitur. In Germania tamen habetur & rufa, non modo foliis, sed etiam radice, quæ illi vaporum oblongorum magni-

BETA CANDIDA.



tudine extruberat: colore aded rufescente, vt eius succus viuum sanguinem referat. Hanc Germani hyeme cineribus calentibus obrutam coquunt, subinde corticibus exuunt, & in acetariis asperso pipere coccinant ad esum, carotæ vulgò vocatæ modo. Sed & illis dulcior est, & gustui gratior. Betæ facultates adnotauit Galenus lib. v. 1. 1. simplic. medicamentorū, sic inquit. Beta nitroſa facultatis particeps est, qua tum digerit, tum extergit, & per nares purgat. Ceterum cocta nit' ositatem omnem exuit, sitq; facultatis phlegmonis aduersæ, leuiter digerentis. Porro ad detergendum, digerendumque validior est beta alba. Nam nigra adhiñctū habet adstrictionis quippiam, & magis in radice, quàm aliis partibus. Et libro 1. 1. de alimentorum facultatibus inquit. Betæ absterſorius inesse succus conspicitur, aded vt alium ad excretionem extimulet, & nonnunquam stomachum demordeat, præsertim iis, quibus natura sensu exactiore præditus est: ob idq; largius communis, stomachum infestat. Huius, ceu aliorum olerum, exigua est alimentia. Iecoris obſtructionibus, quàm malua, aptius accommodatur: magis autem vbi eum sinapi estur, aut aceto. Lienosos item similiter manducati mirifice iuuat. Iure tñm quis ipsam medicamentum

*Beta fac-*  
*ultates*  
*Galeni.*

tum

tum potius, quàm alimentum dixerit, ubi hoc modo manditur. hætenus Galenus. Inueniri *Beta syl.* syluestrem Betam tradidit Plinius libro x x. *vestres Pl.* cap. v 111. eamq; vocari Limonium, quod describitur à Dioscoride libro 1111. à Galeno verò libro v 11. simplicium medicamentorū. Cuius sententiæ refragatur Galenus libro 11. de alimentorū facultatibus, cum inquit. Equidem non satiuam solam maluum, sed agrestem quandam etiā esse perhibuimus, quemadmodum & lactuam. At agrestis Beta nulla est, nisi utiq; quis lapathum ita nominare velit. Candida beta, Plinio loco nuper citato auctore, cocta, & cum alio crudo sumpta, alui tinea enecat. Succus à frebibus expurgatus (vt ipse scipius periculum feci) clysteribus infusus, ad indurata alui euocanda excrementa mirum in modum pollet, præsertimq; ubi leniticia clysmata nihil profecerint. Olus Græcè *Τόβη*, Latine Beta vocatur: Arabicè, Decca, & Celb: Italicè, Bietola: Germanicè, Mangole, & Piesfen: Hispanicè, Afelgas: Gallicè, Porree.

## PORTULACA. CAP. CXVII.



PORTULACAE vis adstringit. Capitis doloribus, inflammationibus oculorū, cæterisq; cum potenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igni, vesicæ dolorib; auxilio est: cōmāducata den-

tium stupores sedat: stomachi, & intestinorum astuationem, fluxionesque mulcet: renes, & vesicam adiuuat, etiā si erosionem sentiant: veneris impetus exoluit. Succus epotus simili effectū prodest, in febribus valens. Contra teretes ventris tinea, cruentam excretionem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & profluvia sanguinis, percocta efficax est: item contra sepius morsus. Ocularibus medicamentis vtilissimè cōmiscetur: interaneis fluxione laborantibus, atque vulnarum erosionibus, infunditur: contra dolores, quos

æstus excitauit, caput ex rosaceo, & oleo fouetur: eruptiones papularum in capite, cum vino emendat: vulneribus, quæ ad syderationem spectant, ex polenta illinitur.

PORTULACA omnibus vulgarissima est. Duo eius habentur genera. Vnum satiuum, cui folia insunt latiora, & caulis crassior in altum se attollens. Alterum verò syluestre humi repens, minoribus, tenuioribus, ac crebrioribus foliis. Portulacæ meminit Galenus libro v 1. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. Portulacæ frigida, & aquæ temperamento est, pauca cuiusdam particeis austeritatis. Proinde fluxiones repellit, & maximè biliosas, & calidas, cum eo, quod eas mutet, & in qualitate alteret, magnopere refrigerans. Et fuerit sanè in refrigerandi quidem facultate tertij excessus à temperatis, ac mediis in humectandi verò secundi. Hac ratione & assuantes, vt si quid aliud, adiuuat tum ventris osculo imposita, tum totis hypocondriis, potissimum in febribus hecticis. Præterea dentium stuporem sanat, nempe quæ ab acidorum succorum contactu, asperè exicata fuerant, leniens, atque replens, vt pote cum viscosum habeat humiditatem. Similiter verò & succus eius. Itaque non foris modo impositus, sed epotus quoq; refrigerat. Hoc sanè & toti herbarum comese accidit. Quoniam autem substringit, vtiliter dysentericis editur, & muliebri profluuiō, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hæc quidè multo est, quàm herba, succus ipsius effacior. Ex libro 1. de alimentorum facultatibus: Portulacæ (inquit) quidam vt cibo vtuntur: sed imbecillum præbet alimoniam, eamq; humidam, frigidam, & glutinosam. Vt medicamentū autem, dentium stupori medetur ob lentore suum morsus expertè. de ea diffusius in opere de facili parabilibus fumus locuti. Hæc ipsa, vt tradidit Plinius. li. & cap. x x. emplastri modo imponitur vmbilico prociūdo. Sanat & mammariū, & podagræ inflammationes, cum melle, aut cimolia creta. Prodest in vniuersum omnibus calidis affectibus. Huius herbarum nomen Græcum est *αἰδολύρα*: Latinum, Portulacæ: Arabicum, Bachelancha, seu Bachele alhanicha: Italicum, Portulacæ, Procacchia, & Porcellana: Germanicū, Burtzelkraut, & Portzelkraut: Hispanicum, Verdolagas, & Baldroegas: Gallicum, Pourpier. & Pourchaille.

## ASPARAGVS. CAP. CXVIII.

CORRIDA, siue sylvestris asparagus, vulgaris est notitiæ. Huius caliculi in cibo cocti, ventrem emolliunt, vrinam cient. Radicis decoctum cōtra

v. vrinæ

ASPARAGUS.



vrinæ difficul-  
tatem, regium  
morbum, re-  
nū vitia, & co-  
xendicum cru-  
ciatus, in potu  
proficit: cū vi-  
no autē, pha-  
langiorū mor-  
sibus auxilia-  
tur. Si decocti  
succus super  
dente cōtinea-  
tur, eius dolo-  
ri medetur. Se-

men potum ad eadem valet. Canes,  
vt aiunt, si decoctum bibant, emoriun-  
tur. Asparagum etiam nasci prodide-  
runt, arietis cornibus contusis, atque  
defossis. quod, quantum equidem sen-  
tio, planē a veritate abhorret. † Altis-  
is autem asparagus, multis ramis fruti-  
cat, foliis fœniculi, longis, numerosis:  
radice rotunda, grandi, spongiam ha-  
bente. Huius teneri cauliculi triti in  
vino albo, renū dolores sedant. Assus  
autem, coctusque, vrinæ stillicidium, dif-  
ficultatēque, ac dyenterias mitigat.  
Radix cum vino, aut aceto cocta, luxa-  
tos artus mulcet. Decocta cū ficis, aut  
ciceribus, sumpta, regium morbum  
sanat: coxendicis cruciatus, strangu-  
riamque leuat. Alligata radix, aut hau-  
stum eius decoctum, conceptum adi-  
mit, & sterilitatem adfert.

quantur, olerum asparagis magis alunt, nimi-  
rum quanto illis sunt sicciores. hæc Galenus.  
Asparagi in cibo sumpti, vt scribit Plinius lib.  
x x. capite x. oculis claritatem afferunt: pe-  
ctoris, & spinæ doloribus profant. Venerem  
stimulant, & ventrem leniter molliunt. Aspa-  
rago trito cum oleo perunctos, pungi ab api-  
bus negant. hæc Galenus Plinius. Ceterum vt  
memoriae prodidit Auicenna Fen vltima libri  
quarti, Asparagi in cibis suauī odore corpus  
totum commendant: verū vrinam, foetidam  
trahunt. Græcis *αράραγος*, Latinis asparagus  
nominatur: Mauritanis, Halion, siue Helium:  
Italis, Asparago: Germanis, Spargen: Hispanis,  
Esparagos: Gallis, Esparge.

† Licet in Græcis non planē constet, hic al-  
tilis, vel satini asparagi mentionem fieri: tamen  
non video, quomodo hæc ad syluestrem quo-  
que referri possint, vt aliqui referenda censent.  
Cum enim hunc notū esse antea dixisset Dio-  
scorides, non aliam, vt solet, eius subiecisset  
descriptionem. Quo fit, vt hæc potius ad sa-  
rium referenda putemus, vel saltē inendum  
subesse suspicemur.

PLANTAGO. CAP. CXIX.

D v o Plantaginis genera. Minor  
folia habet angustiora, minora, mol-  
liora, læuora, & tenuiora: cauliculo  
anguloso, in terram inclinato: floribus  
pallidis: semine fummis caulibus emi-  
cante. Altera maior, lætior, virentior-  
que, latis constans foliis, oleracci ge-  
neris: cuius caulis cubiti altitudinē pe-  
tit, angulosus, subruher, à medio ad ver-  
ticem tenui semine circumdatus: radi-  
cibus nititur teneris, hirsutis, candidis,  
digitum crassitudine æquantibus. Na-  
scitur in lacunosis, sepibus, & locis hu-  
midis. Multò vtilior magna est. Vim  
habent folia exicatoriam, constrin-  
gentem. quare omnibus malignis vlc-  
eribus, & fluxioni opportunis, atq; ele-  
phanticis, sordidisque illita profunt:  
profusua sanguinis, vlcera quæ serpūt,  
epinyctidas, carbunculos, nomasque  
cohibent: vetera vlcera, & inæqualia  
cicatricē obducunt: chironia sanant: si-  
nus conglutinant: morsibus canis, am-  
bustis igni, inflammationibus, panis  
parotidibus, strumis, agilopiis, illita cū  
sale profunt. Coctum cum aceto & sale  
olus,

Asparago  
rum vites  
ex Gale.

ASPARAGI tam satini, quàm sponte  
nascentes, in Italia notissimi sunt. Meminit  
horum Galenus libro v i. simplicium medi-  
cam. sic inquit. Asparagus petrus, aut mya-  
canthinus abstergeri vim habet, idq; citra  
manifestam aut caliditatem, aut frigiditatem.  
Hinc renes, ac iecur infarctū liberat, & maxi-  
mē herba ipsius radices, & semen, Quin &  
dentium dolores sanat siccitatis nomine, quam  
vel maximē dentes requirunt. Et libro i i.  
de aliment. facultatibus: Insuper (inquit) aspa-  
ragorum alius regius in hortis nascens, alius  
*lægus* id est, palustris appellatur, ceu alius ab  
iis, qui à bryonia oritur. Omnes autem sto-  
macho viles sunt, vrinam cient, & parum præ-  
bent nutrimenti. Si tamen ij probē conco-

Ex Pl-  
nio & A-  
uicenna.

Nomina.

olus, dyfentericis, cœliacisq; sumptum subuenit. Datur & in locum betæ cum lenticula coctum, & ad aquam intercutem, cui leucophlegmatæ nomen est, datur & herba decocta post aridas epulas, sic vt media antecedit. comitialibus, & suspiriosis data proficit. Foliorum succus, collata subinde oris vlcera, purgat, cum cimolia, aut cerusa igni sacro medetur: fistulis infusus prodest: lippitudinibus, & aurium doloribus idem succus instillatur. additur quoq; in obulorum collyria. gingiuis cruore suffusus, & sanguinis reiectionibus, po-

PLANTAGO MAIOR.



tu confert: clystere dyfentericis infunditur: contra tabem datur in potu: aduersus strangulationes vuluæ, in velle re subiicitur, etiam si vulua fluxione laboret. Semen ex vino potum alui fluxiones. & sanguinis excretionis sistit. Decocta radix, & manucatu, & colutione, dentium dolores sedat: eadem cum foliis, vlceribus renum, & vesicæ in passo datur. Ferūt tres radices, cum tribus vini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Sunt qui radices gestamine, discutendis strumis vtantur.

PLANTAGO MINOR.



*Plantaginis confideratio.* QVANTUM à Dioscoride, Plinio, Apuleio, alijsq; omnibus antiquis authoribus, duo tantum Plantaginis genera recensentur, maius nimirum, & minus, eam tamen, quæ vulgaris, quod lanceæ cuspidis formam referat, Lanceolam appellat, esse tertiam quandam Plantaginis speciem, nemo est qui ambigat. Hetruseis plantago Centinerbia vulgò vocatur, corrupto à Quinqueneruia vocabulo. Maior, eo quod eius folia, quæ latiora sunt, fibris septem tanquā nervis distinguuntur, Septineruia appellatur: Media, quoniam in eius foliis quinque apparēt costæ, Quinqueneruia dicitur. Minima verò, quod eius folia, quæ leuiter hirsuta sunt, tres tantum habeant nervos, Trineruia dici potest. Plantago, vt scriptum reliquit Galenus lib. v. r. simp. medic. iustitæ est tēperatura: habet enim quiddam aqueum frigidum: habet verò & austum quiddam, id quod terreum est, siccum, frigidum. Itaque refrigerat simul, & desiccatur, & in vtroque secundi excessus à medijs est. Porro medicamentaria, quæ cum hoc quod refrigerant, vna etiam sicca sunt, ea & ad vlcera rebellia omnia, & ad fluxiones, & putredines conueniunt, ac proinde & ad dyfenterias: nam & san-

guinis profluua sistant, & si quid aduratur, refrigerant: tum sinus quoque glutinant, & alia vlcera recentia simul & vetera. In omnibus ferè id genus medicamentis primas tenet, aut certe nulli secunda est plantago, id quod temperaturæ symmetria, & conuenientia. Nam siccitatem obtinet morsus expertam, & frigiditatem, quæ nondum obstupefaciat. Semen eius, & radix similibus sunt facultatis, nisi quod fecioris, & minus frigida. Sed semen etiam subtilius est partium: radices verò crassiorum. Ipsa autem herbæ folia exiccata tenuioris, & minus frigida facultatis sunt: nempe diffuso ex eo, ac digesto excremento aqueo. Hac ratione & radicibus vtuntur ad dentium dolores tum mandentes, tum collationibus ipso rum incoquentes. Præterea ad ictericis, & renū obstructions, nō has tantū adhibēt, sed folia quoque, & multo magis semina. Hæc enim quandā in se abstergerendi facultatē obtinent: quā & in herba viridi inesse satis conici potest, verū ab humiditatis copia vinci. Herba, quæ Græcis ἀπὸ πύων, Latinis Plantago vocat: Arabibus, Lifen, aut Lefin alhamel: Italics, Plantagine: Germanis, Vuergerich: Hispanis, Lhantem, Tamehagem: Gallis, Plantain.

SIUM, SEV LAVER.

CAP. CXX.

**S I O N** in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, foliis latis, olusatro similibus, sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda, coctâque esu, calculos rumpit, atque excernunt: vrinâs cient: menses & partus extrahunt: dysentericis in cibo auxiliantur. De sio Crateuas tradit, herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quàm mentha, nigra, & ad erucam accedentia.

*Sij confide  
ratin.*

S I U M .



**S I U M** in scatu ientiu fontium, quorûaque hyeme calêt, efflatæverò frigescit, plerumq; nascitur. Cæterum falluntur apertissimi, qui pro Sio herbam Crescione vulgò vocatâ, tam scilicet dulcem lactucæ similè, quàm acrem, ac subamarâ, cui nasciturij sapor, & erucæ folia insunt, in medicamentis surpant. Quippe quod ea non alia sit planta, quàm sismbrium aquaticum sequenti capite à Diosco-

ride descriptum, non legitimum Sium, quod nostratibus Senensibus vulgò vocatur Gorgolestro. Hoc enim à Dioscoridis Sio nullis prorsus dissidet notis: quandoquidem pinguis est planta, caule recto: foliis latis, in ambium serratis, olusatro similibus, sed minoribus, & odoratis: floribus candidis: semine corniculis incluso. Rari admodum sunt fontium rivuli, quibus aquaticum sismbrium innatet, qui Sium etiam non habeant. Plinius libro & capite x x i j. Sium cum aquatico sismbrio confudisse videtur: quod Sio sismbrij aqua

*Plinij la-  
p/ma.*

tici vires assignauerit, nominis fortasse communitate deceptus. Nam Dioscoridis testimonio, sismbrium hoc, quod aliqui cardaminâ vocant, nonnulli etiam sium appellant. Vnde quod fortè existimauerit Plinius Sium, & cardaminam vnam, & eandem plantam esse, vni tantum Sio vtriusque facultates reddidit: est prius libro x x. capite x x i j. speciatim de sylvestri sismbrio in riguis provenientis differuit. Serapio Sium Senacion vocat: Verum senecio Dioscoridi alia est planta, v. l. i. i. i. in eius mentione explicabitur. Sij meminit Galenus libro v i i j. simp. med. sic inquit. Sium quantum gustu odoratum est, tantum etiam exalfacientis facultatis est particeps. Digerit autem, & urinam mouet, & calculos renum frangit, & menses euocat. Quod Græci *σιον*, Latini quoque Sium vocant: Mauritanij, Ror eathalmi, & Inhamehanella, seu Hamchannella: Itali, Sio, & Gorgolestro: Germani, Vassfermerck: Hispani, Rabacas: Galli, Berle.

*Sij vires  
ex Gale.*

*Nomina.*

S I S Y M B R I U M . CAP. CXXI.

**S I S Y M B R I U M** (alij serpyllum sylvestre vocant) in solo inculto nascitur, mentha hortensis similitudine, odoratus, latiore folio. Inseritur coronis. Calfaciendi vim habet. contra stillicidia vrinæ, calculosque, semen ex vino bibitur: tormina, & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti, aut temporibus illinuntur. item contra vesparum, apumque ictus. Vomitiones potu cohibet. Alterum sismbrij genus, aliqui cardaminam, alij sion appellant. Ea herba riguis gaudet, & eisdem in locis, quibus sion, provenit: quæ ideo nonnullis cardamina nominatur, quod gustu cardamum, id est nasturtium præsentet. Folia primùm rotunda prodeunt, adula eruca modo finduntur. Id exalfacit, vrinâs mouet. crudum est. Purgat lentiginis, cutisque vitia in facie, noctibus impositum, matutinis quæ detractum.

T A M E T

SISYMBRIUM HORTENSE.

SISYMBRIUM AQUATICUM.



SISYMBR. AQU. ALTERUM.



*Sisymbrij  
considera-  
tio.*

TAMETSI prodiderit Dioscorides Sisymbrium in solo inculto nasci, Theophrastus tamen lib. v. l. cap. vi. de plantarum historia, & lib. v. cap. vii. de earum causis, satium erianum Sisymbrium in hortis reperiri posteritatis memoria commendauit. Quod sanè eam herbam esse crediderim, quæ hodie in omnibus ferè hortis provenit, quam nostrates officinæ Balsamitam, vulgus verò mentham Romanam, vel crispam appellat. Quippe quòd hæc proferat folia circinata, & vulgaris menthæ latiora. crispam tamen: caulem quadrangulum, rubentem, virentemq; : & odore, gustuq; mentha longè acrior sentitur. Cuius rei illud etiam, præter assignatas notas, manifestum indicium facit, quòd Balsamita hæc facillè in mentham degeneret, nisi diligens admodum adhibeatur cultura. Quod libro de plantarum causis paulò antè citato, aperit testatur Theophrastus his verbis. Sisymbrij mutatio in menthâ, velut prædictis opposita scilicet est, cum ex ne-

*Sisymbrij  
in menthâ  
mutatio.*



glectu eueniat. Fit enim cùm quis non excolit, neq; curam solitâ adhibet, vt radices amplius deducantur, quàm in partem vi tota conuersâ, debiliior pars superna cõsistit, odorisq; sui vehementiâ amittit; quâsi ex ambobus illis, germinè, atq; odore similitudo proveniat. Quippe acritudine exolescere, reliquus odor, quia molis quidâ, remissusq; est, proximè ad mentham accedit. Quamobrè transserre sæpè numero iu-  
30 bent, ne istud eueniat. Hæc Sisymbrij causa est. hætenus Theophrastus. Sed equidè non putauerim Dioscoridis Sisymbrij spon- te in incultis nascens, cum Theophrasti Sisymbrio cõuenire: quin potius alterû ab altero longè distingere crediderim. Sylvestre enim in Ananias agro in incultis natû compluribus locis vidimus, ac legimus, nullis deficientibus notis illi à Dioscoride tributis. quod mihi quidè satio effugie planè reclamare visum est. Huc alia accedit ratio, qua facillè probari potest, sylvestre Sisymbrium à satio plurimû differre. Quandoquidè si idem essent, cùm Sisymbrium cultura negligentiâ in mentham degeneret, fieri quidè non posset, vt sylvestre aliter vsquâ inueniretur, quàm in menthâ permutatum, cùm nulla hominû cultura nascatur. Quo postmodum fieret, vt locus, in quo Sisymbrij primò adoleuisset, breui temporis tractu vbiq; mentha scateret. quod tamen nusquâ hætenus factum reperi. Cæterû Brasauolus, cùm hæc fortasse non perpendisset, credidit Balsamitam, quam ipse Florentinâ menthâ appellat, tam satium, quàm sylvestre Sisymbria indifferenter explere posse. Qui præterea fatetur se vidisse (quòd potius cum oculis sefellisse putauerim) Balsamitâ descivisse in calaminthâ. Pliniû quidem, nò Theophrastû securus. Siquidè Theophrastus in menthâ, non in calaminthâ Sisymbrium deficere prodidit. Plinij verò codices nonnulli lib. x. l. x. cap. x. scriptû quidem habent, quòd Sisymbrij in calaminthâ degene-  
V 3 raz,

*Brasauoli  
error.*

rat, quam lectionē accepit Brasauolus: sed ea le-  
ctio deprauata cēsetur. Idcirco factū est, vt ij,  
qui Pliniū castigauerunt, eam restituerint, quod  
comptum habuerint Pliniū ex Theophrasto  
historia sumpsisse. Itaque iam eius loci vera, &  
legitima lectio est, vt in castigatis codicibus le-  
gitur, quod Sisymbriū in menthā desciscat, nō  
in calaminthā. Sisymbriū verō, quod (vt Dio-  
scorides inquit) aliqui Cardaminā, alij Sium  
appellāt, ea nimirū herba est, quā vulgō nostri  
Crescione appellāt, acri sapore prædita, de qua  
etiā diximus in præcedenti capite, de Sio dif-  
ferētes. Siquidē ea in fontij riuīs discurrēti-  
bus comite Sio nascitur, folijs primo exortu  
rotundis: eū verō adoleuerint, erucæ modo  
dissecis: odore, ac sapore satiuo nasturtio pro-  
ximis. Meminit huius Plinius libro x. cap.  
xii. quauis lib. xix. cap. viii. aliud  
Sisymbrij genus cōmemoret his verbis. Sisymbri-  
ū similī modo feritur. Iætiſsimū nascitur in  
puteorū parietibus, & circa piscinas, & stagna.  
Hinc quidā existimariūt, Pliniū de vulgari men-  
thastro, quod in aquosissimā prouenit, dis-

Sisy-  
mbrium a-  
quaticū.

seruisse. Sisymbrij vtriusq; mentionem fecit  
Galenus lib. vi. de simplicium medicamentorum  
facultate, sic inquit. Sisymbrij tenuium  
partium, digerētis, excalcācentis, & exiccātis fa-  
cultatis est, & tēperaturæ in tertio ordine. Sed  
& semen eius tenuiū partium est, & calidum.  
Quocirca ipsum quidā cum vino exhibent sin-  
gulentibus, & tormina parietibus. Sisymbrij  
verō, quod quidā Cardaminē vocant, quando-  
quidē cardamo, hoc est, nasturtio simile quid-  
dā gustū præfert, cū siccū est, tertij est ordinis  
excalcācentiū, & desiccantiū: cū humidū, & vi-  
ride, secūdi. Vt Græci *εὐρύσσιον*. ita etiā Latini  
Sisymbrij dicūt: Arabes, Sifnabaron, seu Sif-  
nabar: Itali, Sifembro, & Menta Romana: Ger-  
mani, Vuassermuntz, & Bachmuntz: Hispani,  
Hierua buena de agua: Galli, Mēthe aquatique.

Nomina.

Quod verō *εὐρύσσιον* Græcis, Sisy-  
mbrium alterū Latinis appellatur: Italis, Sifem-  
bro aquatico, & Crescione: Germanis, Brunk-  
ressen, & Vuasserkressen: Hispanis, Berros, &  
Agriois: Gallis, Crescon.

CRITHMVM.



CRITHMVM. CAP. CXXII.

CRITHMVM, seu, vt aliqui, Critha-  
mon, fruticosa, & vndique foliosa her-  
bula est, cubiti altitudinē ferē petens.  
Nascitur in maritimis, & petrosis: folijs  
pinguibus, numerosis, albicātibus, ve-  
luti portulacæ, latioribus, & longiori-  
bus, falso gustu: flores candidi sunt: &  
semen, cēu rosmarini, odoratum, mol-  
le, rotundum, quod siccātū rumpitur:  
habet intus tritici modo nucleum: ra-  
dices digiti crassitudine, tres, aut qua-  
tuor, grati odoris, & iucundi. Radix, se-  
men, & folia incocta vino, potu vrinæ  
difficultati, & regio morbo auxilian-

CRITHMI. MAR. SPECIES.



tur: menses cient. Estur crudum, co-  
ctū in oleo. seruatur etiā in muria.

NASCITVR Crithmum non modō in o-  
mnibus Tyrreni promōtoris, scopulis, ac ru-  
pibus, præsertim Argentario monte in mari-  
mis nostris Senensibus, & vniuerso circū Ita-  
liam litore, sed etiā in Adriatico sinu, vbi sco-  
pulosa, & prærupta superflant litora: quemad-  
modum nobis contigit videre cotractu per  
quem à Timauo fonte Tergestum nauigatur:  
nanque intibi illa scopulosa litora crithino re-  
ferta sunt. Crithmum Romæ, & in vniuersa  
ferē Hetruria Fœniculum marinū dicitur: etſi  
in alijs quā plurimis Italix locis, vbi à mari-  
timis in hortis, ac viridariis translātū vireſcit,  
herbā sancti Petri appelliret vulgus. Quo no-  
minis argumento non desunt, qui existimant  
plant

Crithmū  
considera-  
tio.

plantam hanc legitimum esse Empetron, libro 1111. à Dioscoride descriptum inter simplicia medicamenta, quæ deiectionia polleat facultate. Inter hos inuenio Pandulphum Collinurium in defensionibus Plinij contra Leoniceum, qui Empetron corrupto vocabulo Sampetram, herbam vocari putat, nulla habita facultatis, no tarinque ratione. Cuius sententia maximè re siagatur experientia, quòd Crithmum, quan-  
 10 quam abunde, copioseque ingessum, nec pituitam, nec bilem, nec aquam intercutem trahit, quemadmodum empetro reddidit Dioscorides, qui propterea illud inter ea, quæ alui deiciunt, medicamenta locauit. Quomodo autem Empetron quis idem cum herba sancti Petri re-  
 15 gè dixerit, si empetron nullis aliis à Dioscoride representatur notis, quam quòd nascatur in montibus, & maritimis, salso, & amaro sapore? Verum enimauro non modò putandum, sed etiam pro certo, meo quidem iudicio, affirman-  
 20 dum erit, herbam hanc Crithmum esse. Quippe quòd ea notis omnibus, quæ radicibus, foliis, caulibus, & feminibus, & vniuersæ denique plantæ tribuit Dioscorides, Crithmum planè re-  
 25 ferat. Crithami vires recensuit Galenus li. v. 1. simplicium medicamentorum, his verbis. Crithmum gustantibus salsum quodammodo est, cum paucula amaritate, quamobrem vis eius est exicatoria, & absterforia. Vtraque tamen imbe-  
 30 cillior in eo est, quàm in amaris. *Kaput* Græci, Crithmum item & Crithamum Latini vocant: Itali, Crithamo, *Fmocchio* marino, & herba di san Pietro Germani, Bacilen, & Meerfenchel: Hispani, Perexil de la mar, & Vnhas de angula yerua: Galli, Bacille, & Fenoil marin.

## CORONOPVS. CAP. CXXIII.



CORONOPVS oblonga herbula est, per terrâ strata, fissis foliis, coquitur in o-  
 35 lere. Radicem habet tenuè, adstringentem, quæ in cibo co-  
 40 liacis facit. Pro-  
 45 uenit in aggeribus, & locis inculcis, & se-  
 48 cuit vias.

VARIAS, ac diuersas reperio eorum fuisse sententias, qui non parum laboris, ac studij im-  
 50 gendunt, vt plantarum historiam à mendis

omnibus expurgatam pristinae, ac propriae red-  
 55 derent integritati, in inuestigando, quænam in ter-  
 60 tor plantas legitime Coronopus dici possit. Quo-  
 65 rum vnus exitit Nicolaus Leoniceus, vir quidem ingenio, & doctrina præclarus, qui longa-  
 70 verborum serie hac de re scripsit, conclusitque tandem, Coronopum eam herbam esse, quàm ipse vernacula sua lingua Capriola, nos verò  
 75 nostra Sanguinella appellamus, quòd eam pueri ætate naribus indant, vt inde sanguinem eliciant. Verum cum eius sententiam minimè  
 80 probandam existimaui, Manardus Ferrariensis, hac in re magis Dioscoridi addictus, quàm Plinij, ac Theophrasti placitis, qui Coronopum  
 85 inter aculeata recensent, his magis adimplendum esse iudicauit, qui volunt Coronopum Dioscoridi eam esse herbam, quæ vulgò dicitur  
 90 Herba stella, omnibus Italiae locis vulgaris, ac admodum frequens, quòd in acetariis passim vsurpetur, quàm is, qui Capriolam, suæ Sanguinellam dictam Coronopum esse censent. Quandoquidem hæc nuscquam, quod sciam, in  
 95 cibis sinitur, sed in brutorum tantum venit pabulum. Nec desunt præterea, qui sinerit asseuerent, quòd quæ inter plantas vulgò nonnullis Pes coruinus vocatur, aliquibus verò Pes gallinaceus, quæ vtuntur nonnumquam medici  
 100 ad exulcerandas corporis particulas, vbi id expellere necessitas, legitimum sit Coronopus. Inter quos non modò deprehensi sunt commentatores Auicennæ, quos nullam rei herbarie periciam habuisse constat, sed & recentiorum quidam, præsertim ex eorum numero, qui de stir-  
 105 pium historia, & facultatibus scribere committuntur. Nanque Orho ille Germanus cognomine Brunfelsius, tamen non ignoraret, eos à probatissimis viris refelli, qui in hanc venerunt  
 110 sententiam: tamen (quæ multorum est perniciacia) maluit cum rei herbarie imperitis errare, quàm cum doctis, & peritis rectè sentire. Quippe Pes coruinus vulgò vocatur (vt in sequentibus suo loco differemus) Coronopus non  
 115 est, sed proculdubio ranunculus, qui Græcis *Barbapappus* appellatur, cuius variegatæ Dioscoridi produntur species: inter quas vulgaris Pes coruinus suam retinet sedem. Quòd autem Leoniceus  
 120 Capriola coronopus sit Dioscoridis, ego quidem cum Manardo nunquam affirmauerim. Nam & si gerat hæc herba in sui culmi fastigio quinque veluti graciles spicas, quæ cum mani-  
 125 bus dilatantur, cornicis, vel alterius volucris formæ pedis representant, cum tamen (vt etiam Manardus inquit) in hominum cibum non expectatur, folio exeat nullis incisuris dissecto, nõ feratur in hortis, & arida tanquam fœnum assurgat, nullo pacto asserendum censeo Capriolam  
 130 esse Coronopum. Cæterum si modò quis in eo Plinium (qui velis, quòd dixerit li. x. 1. cap. x. 1. quod tamen ex Theophrasto sumptis) aculeatarum caules aliquarum per terram  
 135 perire, vt eius, quæ Coronopum vocat, frustula, meo

Itaque  
 dicitur ap-  
 pto dicitur  
 natus.

Leonice  
 ni opinio  
 reprobata.

Coronopij  
 consuetudo  
 sit.



Gramen  
aculeatū  
Plinij.

quidem iudicio, probare contender, Sanguinel  
lam, siue Capriolam esse Coronopū. quod eius  
caulis culmi modo geniculis intersectus, humi  
minimè repat, sed rectus in altum assurgat, &  
culmorum in morem spicas ferat. Verum eos  
non aberrare putauerim, qui dixerint Caprio-  
lam hanc aculeatum esse gramen, cuius memi-  
nit Plinius lib. x x i i i i . cap. x i x . his ver-  
bis. Sunt qui & aculeatū gramen vocant trium  
generum, cum in cacumine aculei sunt pluri-  
mum quini, dactylon vocant. Hos conuolutos  
naribus inferunt, extrahuntque sanguinis cien-  
di gratia. Neque vsquam, quod equidem lege-  
rim, expressit Plinius (vt Ruellius testari vide-  
tur) gramen hoc aculeatum esse coronopum. Il-  
lud præterea animaduertere oportet, quod Dio-  
scorides non scribit Coronopum aculeatū plan-  
tam esse, neque eum inter aculeatas libro ter-  
tio recensuit, sed hic inter olera, quæ in ciborū  
vsum veniunt. Quauis contrariū fecerit Theo-  
phrastus, quod fortasse ad foliorum formam al-  
luserit, qui laciniarum tenuitate coronopo acu-  
leata videntur, cum tamen pungere non valeant,  
vt cū acanthinis pariter lussit Dioscorides. Qua-  
re facile adducor, vt credam, Coronopum tam  
Theophrasto, quam Dioscoridi idē esse. Ideo-  
que Plinius libro x x i . Theophrastum secu-  
tus, Coronopum aculeatum facit. libro verò  
x x i i . Dioscoridem fortasse imitatus, aculeo

CORONOPVS SYL  
VESTRIS.



plantam Sclauī cornicis pedem appellant. Quo-  
fit, vt quā certō crediderim, quod Leoniceus  
ab iis fortasse doctus, putauerit hanc plātam esse  
Dioscoridis Coronopum. Qui cum Coronopum  
scribat spinis nullis rigere, serique in hor-  
tis in ciborum vsum, eos nūl falli existimaue-  
rim, qui nobiscum senserint eam plantam legiti-  
mum esse Coronopum, quæ vulgō nobis Her-  
ba stella vocatur. Nempe nullam hactenus plan-  
tam vidi, quæ perinde ac illa adamussim Coro-

nopum referat. Inuenitur hæc etiam sponte na-  
scens diluto extenuatque solo in comitatu Go-  
ritiensī, non longè à Sontij fluminis ripis, & in  
loco, qui dicitur in collibus. Eam inibi vulgō  
Serpentinam appellant, quod eius radix in vi-  
no porta viperarum, aliorumque venenosorum  
animalium moribus maximè aduerfetur, sitque  
præcipuum remedium, ita vt ipsa sola (quod  
equidem experientia comperit habeo) libe-  
ret de morosis. Coronopi vires paucis per-  
frinxit Galenus libro v i . simplicium, medi-  
camentorum, sic inquires. Coronopodis radix  
coeliaci prodesse creditur manducata. Eius no-  
men Græcum *napoviet*, item & Latinum Co-  
ronopus: Italicum, Coronopo, & herba stella:  
Germanicum, Kraenfuossli: Hispanicum, Guia-  
belha: Gallicum, Capriole.

Coronopi  
Sylvestris  
mentis, et  
vires.

Coronopi  
vires ex  
Gale.

Nomina.

SONCHVS. CAP. CX XIII.

SONCHI duo genera, Syluestrior  
quidam est, & magis spinis horret. Al-  
ter teneritate quadam mollescit, cibis  
expetitur. Caule cōstat anguloso, + in-  
ani, interdum rubente: foliis in ambi-  
tu per intervalla dissectis. Vtriufque vis  
refrigerat, modicè adstringit. vnde æ-  
stuantī stomacho, & inflammationibus  
illiti profunt. Succus eorum stomachi  
rosiones sorbitione mitigat: lac elicit,  
invellere appositus, sedis, ac vuluæ col-  
lectionibus opitulatur. Tam herba,  
quæ radix illita, vibratis à scorpione  
icibus subuenit. Alter sonchus tene-  
rior, arboris instar est, latis constans fo-  
liis: caulem in ramos exeuntem folia  
distingunt. sed ad eadem pollet.

SONCHVS in Hetruria, vbi Latinum  
nomen adhuc perdurat, Cicerbita vulgō voca-  
tur. Visuntur in hortis, campis, & vineis duo  
sonchi genera. Sed tertium illud genus, de quo  
in fine capituli disseruit Dioscorides, non solum  
non inuenitur in Italia, vbi non recordeo me  
hactenus vidisse plantam, quæ Sonchum arbo-  
rescentem referat, sed neque etiam de eo quic-  
quam, quod equidem legerim, memoriæ pro-  
diderunt Theophrastus, & Plinius. Soncho no-  
stri vñtur hyeme in acetariis, præsertimque eius  
radicibus, quæ cū teneræ sint, mansuæ, dulces,  
frequenter mensis expetuntur. Sonchi vires non  
bis descripsit Galenus lib. v i i i . simpl. medic.  
his verbis. Sonchus vbi adoleuerit, ex spinosis  
plantis est. Cæterum viridis etiamnum, & tene-  
rior estur, perinde vt cætera olera syluestria.  
Temperamentum eius quodammodo mistum  
est: constât enim ex aquæ, terreæque essentia,  
vtrique

Sonchi et  
sideratio.

Sonchi vi-  
res ex Ga.

utraque leuiter frigida, Nam & adstrictionis cuiusdam est particeps : & siue cataplasmatin in morem illinatur, siue edatur, manifestò refrigerat, postea verò quàm planè rescicatus fuerit, terrestre eius temperamentum redditur, modicam habens caliditatem. *Σίχων* sic Græcè, vt etiam Latine Sonchus appellatur. Italicè, Soncho, & Cicerbita : Germanicè. Vuilder hasen koel, Gens dystel : Hispanicè, Serraya, & Serralla: Gallicè, Laiteron, & Palais au heure.

† Hæc dictio *κῆν*, quæ vacuum, & inanem significat, hic non legitur in vulgatis Græcis. Sed tamen eam habent vetusti codices, quibus etiam adscriptulatur Oribasius. Ergo non erit, vt alij putant, ex Plinio duntaxat reposita.

SERIS, SIVE INTYBUS.  
CAP. CXXV.

SERIS duùm generum est. Altera sylvestris, quæ picris, & cichorion vocatur. Altera satina, latioribus foliis cō-

INTYBUS HORTENSIS.



INTYBUS SYL. SIVE CICHORIUM.



stat, stomacho quàm hortensis vtilior. Quæ iterum in duas species digeritur. vna folio latiore prodit, lactucarum simillima : altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraque refrigerat, & adstringit, stomacho vtilissima : aluum sistit cocta, si cum aceto adsumatur. <sup>10</sup> Sylvestres stomacho meliores : quando quidem æstuantem ipsum, & quem imbecillitas vexet, cibo leniunt. Cardiacis per se, aut cum polenta, vtiliter illinuntur : podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussis à scorpione subuenit : igni sacro cum polenta medetur. <sup>20</sup> Succus cū cerusa, & aceto, valet ad illitus eorum, quæ refrigerationem desiderant.

INTYBUS HORT. ALTER.



CICHORIUM SATIUM.





CYANVS MAIOR.



CYANVS MINOR.



bestatem caput & tempora cingunt. Sed quibus notis, quibuscumque rationibus inter Intybea annumerari possit, quid dicam, non habeo. Huic vires nullas antiquorum, quod scierim, scriptis mandauit, quanquam Placentinus, quod affirmauerint aliqui Cyanum pestilentibus morbis propria dote aduersari, suo de Cichorea serapio, quod ad pestilentes febres maximè com-

mendauit, Cyanum etiam inseruit. Intybi, & Cichorii vires recensuit Galenus libro v. 111. simplicium medicamentorum, sic inquit. Intybus olus est subamarum, & magis quod agreste est, quod ob id ipsum picrida, hoc est amarum, quidam nuncupant, quidam verò Cichorium appellant. Est autem ea sicca, frigidaque temperata, vt, quæ secundo excessu. Porro domestica magis etiam quam agrestis refrigerat. Sed & humiditatis multæ admixtio siccitatem extinguit: verum vtrique adstringentis qualitas est particeps, velut & chondrilla: nam & ipsa est seridis, seu intybi species. Et lib. v. 111. de compositione medicamentorum secundum locos: Cichorium, inquit, & Seris cibarii generis existunt: apud nos namque rurales ambo hæc edunt & cruda, & cocta. Facultas horum oleum subfrigida est, & subamara, ac moderatè adstringens: & propter has qualitates, optima pharmaca calidis intemperaturis ipsius hepatis existunt. Vltra hoc enim, quod moderatè refrigerant, amplius & robur visceri addunt per adstringentiam facultatem: insuperque commissuras oculorum venarum in sima videri parte ad eas, quæ in gibba sunt, extergunt. Neque verò frigidas intemperies magnopere ledunt, quemadmodum quæ frigidam humiditatem absque adstrictione, aut amaritudine possident, facere solent. Iuuare etiam viscus talium olerum substantia potest, etiam si citra ferofum, aut aliorum humorum vitiationem intemperies fiat per se, & cum humiditatis cuiuscunque complexu: ex mixtura enim mellis humiditatem per

vrinam educunt. Quapropter etiam si siccata tusa, quis potioni inspergat, iudem iuuat. Quia & decoctum decoctum potatū multum commodi affert. Si verò non calida aliqua intemperies infestet, aut si obturatio quædam sit circa viscus, magnopere auxiliatur ex vino albo tenui potata cum his, quæ vrinam ciunt. Vtilis autem non solum succus ipsorum est tum recens, tum exsiccat, sed & ipsa olera exsiccata, tusaque, ac trita porui inspergi, & eorum decoctum in potu acceptum, auxiliatur. Planta, quæ *olus* Græcis, Intybus satius Latinis dicitur: Mauritania, Dumbeye, Humber, seu Endeba: Italia, Endiua: Germanis, Endiuen: Hispanis, Endiua: Gallis, Endiue. Quæ verò *olus* *argyria* vocatur, & *argyria* Græcè, Cichorium Latine vocatur, Italice, Cichorea: Germanice, Vwegueiff, & Vweguartz: Hispanice, Almerones, & Cichoria: Gallice, Cichoree.

NOMINA.

## CHONDRILLA.

## CAPVT CXXVI.

CHONDRILLA, quam aliqui cichorion, alij serin appellant, caulem, flores, & folia habet cichorio similia. qua ex causa nonnulli syluestris intybi speciem esse pronunciant, verum tenuior tota est. In cuius ramulis, gummi masticæ simillimum, magnitudine fabæ inueniri solet: quod cum myrrha tritum, & linteo appositum, inстар oliuæ, sceminarum menses trahit. Tusa cum radicibus herba, adiecto melle, diuiditur in pastillos: qui nitro admissi vitiliginem emaculant. Gummi inordinatos pilos replicat. Quod item tenera

Intybi, &  
Cichorii  
res ex Ga  
lino.

40

50

radix efficit, si intincta succo acus, pilis admoveatur : contra viperas in vino pota proficit. Succus decoctus, in vino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur chondrillæ genus, folium ferens oblongum, circumrosum, humi

sparsum : caulem lacteo lacte madentem : radice tenui, rotunda, laui, vegeta, flavescente, succosa. Cuius caulis, & folia concoquendi vim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in lætis, & cultis.

CHONDRILLA PRIMA.



CHONDRILLA ALTERA.



*Chondrilla*  
*in Strinf-*  
*que consi-*  
*deratio.*

NIMIRYM sylvestris cichorii species Chondrilla est: gracilioribus tamen foliis, caule, floribus, ac semine. Frequentissima hæc non modo in Hetruria, sed etiam in vniuersa Italia in cultis locis, scrobium aggeribus, & secus vias virefcere, ac suo tempore florescere conspicitur: nec minus etiam, quam cichorium, in acetariis recipitur, quanuis amarior sit. Visitur & alterum genus huic non longè dissimile, foliis tamen non ita in ambitum laciniatis, nec adeo 40 in mucronem desinentibus. Hæc à lactis vberitate, quo in omni parte, præsertimque radice redundat, à nostris vulgò Lattaiola vocatur. Rura eam suis acetariis pro cichorio indifferenter admiscunt. Chondrillæ vires scripsit Galenus lib. v 111. simplicium medicamentorum, ubi simul de intybo, & cichorio differuit, nihilque ei peculiare reddidit, præterquam quòd intybi sit species. Veruntamen libro 11. de facultatibus alimentorum non sanè intybo, nec cichorio, sed lactuce Chondrillam similem fecit. Huic nomen Græcum *χονδρίλλα*: Latinum, pariter & Italicum Chondrilla: Arabicum, Candarel, Cadaron, seu Amiron: Hispanicum, Leirugas, & Lechugas dentre los planos: Gallicum, Letteron.

*Nomina.*

CVCVRBITA. CAP. CXXVII.

CVCVRBITA esui apta. Cruda, trita illitu tumores, & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capi-

CVCVRBITA.



tis ardorem, quam syriasin vocant, in fincipite illinuntur: oculorum inflammationes, podagræque refrigerant. Succus è ramentis tuis per se, aut cum rosaceo infusus aurium doloribus auxiliatur: adustiones cutis in ardenti febre illitu adiunat. Torius feruefactæ, & expressæ succus, cū melle exiguo, & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinū in cu

in cucurbitam recentem excavatam, infusum, si mistum sub diuo teneatur, potum alium laugabit.

*Cucurbita  
considera-  
tio.*

**CUCURBITA** sativa, quæ per ætatem in cibum frequentissime vario sumitur apparatus, in triplici censetur genere, nempe longa, rotunda, & sessilis. Sed quamquam Cucurbitæ inter se forma dissimiles habeantur, non tamen propterea viribus, & natura sibi inuicem repugnant. Siquidem (vt Columella tradit, & Plinius refert libro x i x .cap. v.) forma varia in cucurbitis arte, & mangonio fieri facile potest. Nam semina, quæ proxima collo fuerint, proceras pariunt: item ab imis, sed non comparadas supradictis: quæ in medio, rotundas: quæ in lateribus, crassas breuiiores, ac sessiles, aprissi-  
mus quidæ recipiendum tum vinu tum oleu, tum alios quoslibet liquores, vt ceotum, & ca-  
dorum vice. Si vero cordi sit, vt fiant corpore  
vassiores, de media cucurbitæ parte semen in-  
uerso feratur cacumine. Sed diligenter custo-  
diendum est, ne eò mulieres accedant: nanque  
earum contactu facile elanguescent incrementa  
virentium. tantoque magis, si eis fluxerint  
menses: tunc enim solo oculorum intuitu tenel-  
los enecant fetus. Quæ autem ad femina ser-  
uantur, è primo seligatur proeunt, pendeant  
que in sua vite ad hyemem vsque: deinde subla-  
tæ insolentur, aut ponantur in fumo, donec pe-  
nitius siccificent: aliter facile earum semina,  
ascia putredine, depereunt. Amant Cucurbitæ  
mirum in modum aquas: nam si propè in pa-  
tens vasculum aqua subficiatur, si quinq; vel sex  
digitorum intervallo, ante postmodum diem ad re-  
pentes cognoscuntur descendisse. Sine semine  
nascuntur, si per

**CUCURBITA INDICA.**



*Cucurbi-  
ta faculta-  
tes Ga-  
leni.*

cipuis condimentis saturantur. Cucurbitæ fa-  
cultates scriptas reliquit Galenus libro viii.  
simplicium medicamentorum his verbis. Cucur-

bita humida, frigida æque temperaturæ est, vtra-  
que qualitate secundi ordinis. Quocirca rasti-  
torum eius succus ad aurii dolores compheg-  
mone iunctos, cum rosaceo vrëbitus vtilis est.  
Sic tota quoque illita calidas phlegmonas me-  
diocriter refrigerat. Comesta autem humida est,  
& sicim propellens. Et libro xi. de alimentorum  
facultatibus: Cucurbita, inquit, crudi cibo  
insuavis est, stomacho perniciosâ & con-  
coctu planè inexpugnabilis: adeò vt si quis  
alterius cibi inopia ingerere eam compella-  
tur, ceu quidam iam ausus est, pondus cum al-  
gore ventriculo incumbere sit sensus, stomachum-  
que euertere, & ad vomitum concubare,  
quo solo ab vrgentibus symptomatibus pote-  
rit vindicari. Hanc igitur, aliæque ex fugacibus  
complura, aux mox quàm elixata est, aut frictâ  
in sartagine, aut assanti omnes homines esse con-  
fueverunt. Cucurbita verò de qua dicere corpi-  
mus, elixa nullam euidentem saporis qualitatē  
habet: nisi quis eum quoque saporem nominare  
velit, qui neque acris, neque salis est, nec  
acerbus, nec amarus, nec id genus quippiam ma-  
nifestè representat, veluti nec ipsa aqua. At hu-  
iusmodi cuncta communi nomine omnes ænæ  
id est qualitatē expertia vocitare solent (Latini  
satia, aut insipida dicūt) quo quo modo nos  
quoque clarioris doctrinæ gratia appellabimus.  
Talis ergo etiam sit cucurbita non immerito va-  
rios apparandi modos admittit, vt potest quæ in  
medio omnis excessus constituta est, ob id quæ  
quemuis excessum ex æquo duci potest. Proinde  
cucurbita, quantum in se est, humidâ, frigi-  
dumque corpori alimentu præberat id ipsum, ea  
de causa, exiguum. Sed facile per aliu subite-  
ob substantiæ suæ lubricitatem ob omnium  
humidoru ciborum ratione, qui scilicet circa ad  
strictionē tales sunt. Nec sanè infeliciter conco-  
quitur, modò non anteuertat corruptio. Nam  
ea illi solet non nunquam accidere, cum aut vi-  
tiosè fuerit præparata, aut prauos humores in  
ventriculo acerrimas offenderit. Est aliquando  
ob nimiam in eo moram: quod alijs quoque  
omnibus fugacibus, quæ humidâ sunt tempe-  
ramento, euenire solet. Nam in ventriculo cor-  
rumpuntur & ipsi, nisi celeri descensu illi mali ef-  
fugiant. Quemadmodum ergo cucurbita pura  
& vt in se ipsa est, succum in totum corpus alen-  
di gratia digestum, expertem qualitatē gustabi-  
lis obtinet: ita cum alicui vehementem habenti  
facultatem fuerit iuncta, & sic illi admitti-  
tur, vt si cū sinapi sumatur, succus ex vitro que  
in membra diffusus acris est, cietur cum man-  
ifesta caliditate. Eadē ratione, si cum scis quo-  
piam estiterit, ceu nonnulli in patinis cum sala-  
mento instruant, salum in corpore humorem  
generabit. Est porro sic apparatus cibis longè  
suauissimus, si salismentu ex ponticis illis fue-  
rit, quæ *σαλας* appellantur. Quòd si cum  
malis coroneis elixa, decenterque condita fue-  
rit, succum austerum in distributione habebit  
præpositentem. Assa autem, vel in sartagine fra-

cta, vt propriæ permulcum humiditatis deponit, ita reliqua eius pars nullam sibi valentem vim adfiscit, vti nec cum in iure simplici paratur. Cæterum ob aqueam qualitatē sibi innata nō immeritō origanō iungi gaudet. Quæcunque enim talia sunt, acerbis, aut acidis, austeris ve, aut salis permisceri saporibus postulant, si quis & cum voluptate ea sumere, & nau seam cupiat evitare. Cucurbita Latinis dicta. Græcis *κικυρίς* id est *κικυρίς* appellatur: Arabibus, Haraba, Hara seu Charha: Italis, Zucca: Germanis, Kurbis. Hispanis, Calabaca: Gallis, Vne cource.


Nomina.

CUCUMER SATI VVS.

CAP. CXXVIII.

SATI VVS Cucumis aluo, & stomacho perquam vilis habetur: refrigerat, qui corruptionem non sentit: vesicæ prodest: olfactu reuocat, quos animus liquerit. Semen modicè vri-

CUCUMERES.

CUCUMERES  
in conside  
ratis.

QUANQVAM Græci (vt Galenus est auctor libro 1. de alimentorum facultatibus) omnia tam Cucumerum, quam Melopeponum genera Pepona nominant: tamen *κικυρίς* nomine, quo præsens caput inscribitur a Dioscoride, id tantum omnes terè comprehendunt, quod Latinis cucumis appellatur. Verum non ob id plane decerni potest, an hic reddat Dioscorides nostratis Hetrusci Cucumeris vires, qui aliis Italicæ populis Anguria vulgò nuncupatur, an alterius, qui propriè insubribus, & Venetis Cucumis dicitur, Hetruscis verò Citulus, omnibus notissimus. Siquidem non ex Dioscoride modo, sed nec ex aliis veteribus hætenus quæquam reperi, qui

nam mouet: cum lacte, aut passo, vesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum vino folia, morsus canum sanant: & epinyctidas, cum melle. Peponis caro incibis, vrinam cit: inflammationes oculorum illita fedat. Ramenta eius contra aduersionem infantium, quam syriasim vocant, scincipiti imponuntur: fronti admota oculorum fluxiones auertunt. Succus cum semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgant, & nitorem afferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota, drachmæ pondere, vomitionem mouet. Si quisquam moderatè secundum cœnam vomere cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoque illita cum melle, vlcera concreta in modum faui, quæ ceria vocant.

MELONES.



Cucumis Græcis propriè *κικυρίς* appellatur, notis vllis repræsentet. Sed quòd Græci *κικυρίς* vocabulo nostratē Citrulum, & Insulubrium Cucumerem significet, facillè conici potest ex ipso Dioscoride. Quippe qui libro 1. 1. 1. Cucumerem syluestre afferat fructu solo, quem oblongis glandibus non dissimilè patet, a satiuo distidere, cum aliis foliis, floribus, ac framentis satiuū prorsus referat. Verum cū huic ille per omnia respōdeat, què nos citrulus, alij verò Cucumerè dicunt, nō possum nō libere pronūciare, Dioscoridē hic citruli nobis vocari, nō autē angurie vires descripsisse. Quamobrem hæc in historia apertè haliucnari Brasavolū putamus, quòd procul dubio existimauerit, veteres Græcos præter

Brasavolū  
is sapient.

ANGURIAE.



timque Dioscoridem, eiusque appellatione anguriam, vel Hetruscorum cucumim repræsentasse. Quandoquidem assignatis iam rationibus accedit & Plinii auctoritas, qui libro x. i. capite v. Cucumeres, ait, in Italia virides, & quam minimi: in prouinciis quæ maximæ, & citrini, aut nigri. Placent copiosissimi Aphricæ grâdissimi Mœ-

fix. Viuit hausti in stomacho in posterum diem. Quod proprium est citruli nobis vocati, non autem anguriae vulgò Insulubribus appellatae. Anguriae enim in Italia in magnam extuberant molem, & cum aquæ sint substantiæ, ac prædulces, quæ maturitatem sensere, ingestæ faciliè à ventriculo labuntur. Quod nostratibus citrulis, & Insulubrium cucumeribus non euenit. Nam cum glutinoso, frigidoque succo repleti sint, ob idque concocti perquam contumaces habeantur, non nisi post longum tempus à ventriculo descendunt. Ad hæc (vt citato loco subdit Plinius) Cucumeres, in fistula flore dimisso, mira longitudine crescunt. Atque iidem in tantum odere oleum, vt si è vite pendentibus vas olei subiciatur, adeo refugiant, vt in hamum curuantur, quod anguriis, quæ spherica formam referunt, minime euenire posse comperio. Videmus præterea Citrulos nostrates adhuc florentes in fistulis coniectos mira longitudine creuisse. E quorum semine qui postmodum orti sunt, eandem retinuerunt formam, adeo vt in vite pendent angulum modo contorti viderentur. Seruantur Cucumeres (vt Plinius auctor est) vsque ad alios pene proventus: & id quidem non solum auriâ fit, sed & serobe opaco in loco arena substrato, siccòque siccò operos, ac deinde terra obrutos: ita enim virides seruari tradunt. Quod autem veteribus fuerint, quidve nunc sit Pepones, ac Meloepones, non equidem faciliè ausim decernere: essi non desint, qui dicant Meloepones Galeno libro i. de alimentorum facultatibus, communes nostros Melones esse: Pepones verò, quos in eo genere Veneti corrupta inde voce vulgò Pipone vocant. Verum eniuero cum asserat Galenus, quod pars intima carni semen inclusum tangens, cum in Peponibus edendo non sit, in Meloepionibus passim ab hominibus manditur, mihi animum adeo dubium reddit, vt aliquid in hac re certi statuere nequeam, neque inuenire possim, quid Pepones, & Meloepones Galeno existerint. Quippe quoniam vtriusque

generis, tam scilicet Peponum, quam Meloeponum carnea pars semen continens estur, & nõ estur, prout fructus ij, plus, minusve maturitatis fuerint adepti: nam vtriusque, cum vltimam senserint maturitatem, id superfluum carnis vnà cum seminibus in medium suarum concidit. quod cum euaniidum, & insulse reperiatur, nusquam comeditur. Quod tamen vtriusque minus maturis, non euenit: eaque propter extractis prius seminibus estur tota eorum caro. Hæc igitur tamen si me (vt dixi) dubium reddant, inclinatur tamen animus ad credendum, per Meloepones Galenū nostros Melones intellexisse, si modò ipse eorum vnquam habuit notitiam. Sed quid per Pepones intellexerit, nihil prorsus (vt ingenuè fatear) quod perferam, hæcenus non habeo. Verum tamen cum illis mihi non faciliè conuenit, qui Venetas Peponas dictas Galeno Pepones esse existimant. Minus adhuc illis assentior, qui Pepones Angurias esse dicunt. Nanque Serapio cum primum ex Galeni auctoritate de Peponibus, & Meloeponibus differuisset, dein peculiare de Anguria caput fecit, quam Arabica lingua Dul-laha nuncupauit. In cuius reddendis viribus nullum assert Græcorum testimonium, sed tantum suæ generis auctoritatibus innititur. Hinc faciliè adducor, vt credam angurias veteribus Græcis penitus ignotas fuisse. Eas equidem nunquam vidi, vel non cognouisse demonstrat Fuchsius medicus clarissimus. quippe qui suis de stirpium historia commentariis non sine magno errore putat cucumeres, quos citrulos Hetrusci nominant, angurias esse. Nam essi Hetruria angurias vociter cucumeres, non tamen contra cucumeres vulgares vocat angurias, vt perperam, meo quidem iudicio, Fuchsius & intellexisse, & scriptis mandasse videtur. Cucumeris vires memorie prodidit Galenus lib. v. i. i. simplicium medicamentorum, his verbis. Cucumis esculentus maturus quidem tenuioris essentia est, qui verò immaturus est, crassior. Sed & abstergeri, & incidendi facultate participat. quare & vinum mouens, & corpus splendidum redditur: ac magis quoque si quis semine arefacto, contusique, atque cribrato, vice pulueris abstergeri vtar. Superat in eis humida, frigidaque temperies, non tamen magnopere, sed quasi in secundo censetur ordine. At tamen si quis aut semen, aut radicem arefactam, haud etiam humidæ fuerit naturæ, sed iam desiccantis, idque in primo quodammodo ordine, aut etiam in secundo incipiente. Est & in istis maior abstergerendi facultas, quam in fructus ipsius carne. Et libro i. de alimentorum facultatibus idem de Cucumeribus ita scribit. Vrinam quidem & ipsi, quemadmodum pepones, cient, sed minus quam illi, quod ipsorum substantia minus est humida: ideoque non faciliè, vt illi, in ventriculo corrumpantur. Ergo quibus cucumeres bene concoquere datum est, dum in hoc his,

Fuchsi et rer.

Cucumeris vires ex Gale.

Peponum,  
& melo-  
peponum co-  
fideratio.

50



intrepide, affarimque iis se expleat, longi temporis tractu, gelidum, & utcumque crassum humorem in venis acuari contingit, qui per eam, qua venæ funguntur, concoctionem, haud facile in probum sanguinem potest conuertere. Proinde omnibus prauis succi eduliis, quantum vis probè à nonnullis conficiantur, abstinere in totum consulerim. Clam enim sensimq; post longum tempus prauus in venis fucus ex ipsis suggeritur, atque accumulatur: qui vel lenicula putredinis arrepta occasione, febres seuissimas, & mirè contumaces excitabit. Et paulò antea de Peponibus scribens: Vniuersa (inquit) pepo natura frigidiore cum larga humiditate existit: habent & quandam abstergendi vim: idèoque urinam cient, & deorsum expeditius, quam cucurbita, & melopepones rapiuntur. Quod porro abstergeant, discere licet sordidam cutem defricando. Quamobrem etiam maculas calore solis factas, & lentes faciem occupantes, atq; in superficie alphas extergere possunt. Sed semen, quod in eorum veluti carne continetur, ad hoc efficacius, adeò ut renibus etiam calculo infestatis sit accommodatum. Gignit pepo in corpore vitiosum humorem, potissimum quando non probè concoctum fuerit. Tum verò morbum etiam, qui cholera di-

citur, inducere consuevit. Etenim priusquam ad corruptionem peruenit, vomitioni quoque idoneus est, argiusque ingestus, nisi quis aliquid eorum, quæ probi sunt succi, supermandat, omnino vomitum concitabit. Et de Melopeponibus agens: Melopepones (ait) & minus humidi quam pepones sunt, nec adeò prauis succi: minus item urinam prouocant, tardiusque deorsum descendunt. Ad vomitum verò excitandum non eandem vim peponibus obtinent, sicut nec celeriter adeò ut illi in ventriculo corruptuntur, cum prauus humor in eo collectus fuerit, aut alia quæpiam corruptionis causa ipsum prehenderit. Cæterum tamen in iuuando stomacho autumnalibus fructibus longe sunt inferiores, haudquaquam tamen ei, ut pepones, officiant. *Sunt quædam Græca voce, Cucumer satius Latina vocatur: Arabice, Chathe, seu Chetha: Italica, Cocomero, & Cedruolo: Germanica, Cucumeru: Hispanica, Cogombro: Gallica, Cocombre. At waxy Græcis, Pepon item Latinis appellatur: Mauritanis Batheca, seu Bathiech: Italis, Mellone: Germanis, Pfeben, & Melon: Hispanis, Melon: Gallis, Melons. Anguria ita & Latine, & Italicè nominatur: Arabice, Dullaha: Germanicè, Gurchen: Hispanicè, Cogombro: Gallicè, Cocombre.*

*M. lepeno-  
num facit  
inter ex  
Galeno.*

*Peponum  
Seres ex  
Galeno.*

LACTUCA CRISPA.



LACTUCA. CAP. CXXX.

LACTUCAE satiuæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho grata habentur, somnum conciliant, aluum emolliunt, laceuocant: verum decoctæ magis alunt. Stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno compescit, & veneri refragatur. Ipsa verò frequentiores in cibo, claritati oculo-

LACTUCA FLORIDA.



rum officiant: inflammationibus, & ignibus sacris opitulantur. Muria condiantur. Cum in caulem exierunt, vim quandam nanciscuntur succo, aut lacti sylvestris lactucæ similem.

LACTUCA SYLVESTRIS.  
CAPVT CXXX.

SYLVESTRIS Lactuca satiuæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiore. Amaro gustu

gustu est, & viribus aliquantum papaueri similis: unde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquâ per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos: argema, caliginemq; repurgat: contra adustiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierû. In summa somnum allicit, doloris leuamentum præstat, menses trahit: cõtra scorpionum, & phalangiorû ictus bibitur. Semen non aliter quàm satiuæ libidinum imaginationes in somno amolitur, ac venemur arceat. Succus ad eadem valet, sed viribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea, vt in aliis liquaminibus moris est, insolaturn.

## LACTUCA SYLVESTRIS.

Lactuca  
considera-  
tio.



Lactuca  
sylvestris.

LACTUCA satiuæ herbarû ferè omnium vulgò notissima est. Cuius est plura, ac diuersa in Italia reperiantur genera, vt in hortis, & oleariis foris æstate tota conspici potest, non ob id tamen existimandum est, quòd ea viribus, & facultatibus inter se differant: quamquam non negauerim ego, alteram alteri in cibus præstare. Eam siquidem, quæ conglobatis in orbem foliis crispâ, teneraque inuenitur, quis neget maiorè cum palato inire gratiam, quam quæ dura, parula, ac lactescens habetur? Sylvestris in campestribus nascentis, faciliè dignoscitur, quòd calce, floribus, semine, & folio satiuam iam flores, & semina proferentem æmuletur: verùm gustu amara est, & lacte copiosiore referta. Meminit huius Theophrastus libro v i. cap. v i. de plantarum historia, sic inquit. Sylvestris lactuca folio breuior, quàm satiuæ est, idq; consummatius aculeatur, & caule simili modo breuiore perficitur: succum acrem, ac medicatum habet. Nascentur in aru's. Lac eius extrahunt per messem trieci, & purgare aquam intercurrente dicunt, & caliginem arceat ab oculis, & argemam aufer-

re, cum lacte mulieris. Satiuæ (vt memorie scriptum reliquit Galenus libro v i. simplicium medicamentorum) humidum est, frigidumq; olus, non tamen extremè (siquidem edendo non foret) verùm maximè secundum aquæ, vt sic dicam, fontanæ frigiditatem: proinde ad calidas phlegmonas accommodum est, & ad parua, & leuia erysipelata: non tamen maioribus satisfacere idonea est. Est etiâ edulium sitim arcens. At semen potu genituræ profluum cohibet: quemobrem etiam iis, qui libidinosis somnis vexantur, datur. Sic & agrestis lactucæ semen. Cuius quoque colligitur succus, argema, & caliginem expurgans: ad adustiones etiam cum lacte mulierum inungitur. Et libro i i. de alimentorum facultatibus: Plerique medicorum (inquit) reliquis omnibus hoc olus, ceu ficus autumnalibus fructibus, prætulerunt. Nam inter ipsa aliud melioris succi non inuenias. Quod porò nonnulli vitio verterunt, id in præcipuum ei laudem cedit: & si ita se re vera haberet, nõ modò nulli olerum, sed ne optimi quidem succi, ac maximi nutrimenti edulius esset secundum, nempe sanguinem vult lactucam generare. Quidam non simpliciter sanguinem dicunt, sed multum addunt, multum sanguinem lactucam generare affirmantes. Verùm ij tamen prudentius obiciant, longius tamen aliis à vero absunt. quanquam hoc ipsum, puta multum sanguinem procreare, non est quod merito quis damnet. Constat enim huiusmodi edulium laudatissimi succi censendum esse, quòd plurimum quidem sanguinis, aliorum verò succorum nullam producere sit comparatum. Si verò, quia per multum de lactuca sanguinis congeratur, idcirco damnamus eam censeant, facillimè huic malo occurrì potest: quippe cum vescientibus, & liberalius exerceant, & ea parcius vti integrum est. Hæc ergo aduersus eos, qui olus hoc non rectè vituperant, dixisse sufficiat. Illud porò nouisse conuenit, omnibus aliis oleribus paucissimum sanguinem, & vitiosum generantibus, ex sola lactuca non multum quidem, nec vitiosum, haud tamen omni ex parte laudabile gigni. Vt plurimum quidem cruda ipsa vescitur. Aestate autem, cum in semen iam proruptura est, in aqua dulci præcoquentes, cum oleo, garo, & aceto assumunt, aut cum aliquo ex condimentis, oboniosis, præsterim iis, quæ casto constant. Plerique etiam antequam excalefacti, in aqua elixa vuntur: vt ego iam facio, ex quo dentes mihi deteriores esse cæperunt. Nam amicus quidam meus, cum olerè hoc à longo tempore me vt familiari cibo vsum fuisse sciret, videretque post mandati à me citra magnâ molestiam non posse, cocturæ rationem indicauit. Etenim in iuuentute, quoniam assiduò os ventriculi bile effervescebat, ælius moderandi gratia lactucis utebar. Cum autem ad

Lactuca  
vires ea  
Galenus.

profectam ætatem peruenissem, olus hoc contra quam in iuuentute, somnum iam studio, & industria accersenti mihi, auxilio fuit. Quippe qui etiamnum iuuenis iucubandi gratia vigiliis dedita opera me assuefeceram, declinante iam ætate, ipsa ex se infonni, grauius hoc incommodo molestar. Aduersus quod vnicuique mihi præsentissimum remedium lactuca vespere commandata semper fuit. Lactuca sic Latinis, *ῥῆτις* Græcis appellatur: Mauritania, Cherbas, seu Chas: Italica, Lattuca: Germanica, Lactuck: Hispanica, Lechuga, aut Al-fala: Gallis, Laictue.

Nomina.

## GINGIDIUM. CAP. CXXXI.

GINGIDIUM, aliqui lepidion, in Syria, & Cilicia plurimum nascitur. Herbula est sylvestris pastinacæ similis, tenuior, & amarior: radice parua, candicante, subamara. Olus hoc crudum, coctum, conditumve estur, magna stomachi utilitate: urinam cit. Decoctum ex vino potum vesicæ prodest.

## CHÆREFOLIUM.

HVIUSCE sententiæ esse cõperiunt Ruellius, & Fuchsius viri clarissimi (licet ille non planè adstipuleatur) necnon etiã recentiorum alij, qui stirpi cognitionem proficiunt, in hoc cõsentiant, quod Gingidium ea sit herba, quam nos vulgo Chærefolio vocamus, illi verò Chærefolium. Veruntamẽ cum hæc radice nitatur, que



nihil amara sentitur, sed potius acris, & odorata, quicquidmodum & folia, idcirco eorum opinionem non equidem (vt dicam quod sentio) probandam putauerim. Quinimodò crediderim vel Gingidium hæcenus in Italia non esse repertum, vel inibi facile non oriri: præsertim cum Dioscorides, & Plinius asserere videantur, peculiare olus esse Gingidium tam Syria, quàm Cilicia horris. Mementi Gingidij Galenus lib. v. simplicium medicamentorum his verbis. Gingidium sicut gustu amaritudinem, & adstrictionem præfert, sic temperamento quoque ipso caliditatem, & frigiditatem. Secundum verò vtrunque qualitatem desiccatorius est. Sed enim stomacho ami-

Gingidij  
cirsia  
111.Gingidij  
cirsia  
ex  
Galeo.

cum est, vtpote non paruam obtinens adstrictionem. Quamobrem non admodum conspicuum caliditatem possidet: secundo autem recessu deficiat. Et lib. 11. de alimentorum facultatibus, sic inquit. Plurimum in Syria Gingidium nascitur: esturque similiter ac scandix apud nos. Stomacho mirè vtile siue crudum, siue elixum libeat sumere: longioris autè decoctionis impariens est. Nonnulli ipsum cum oleo, & garo mandunt. Alij vinum etiam, aut acetum adiciunt, ac multo magis ita stomachum iuuat. Cum acetum sumptum fastidiosum ad cibum inuitat. Perspicuum verò est, quod hæc herba medicamentum potius est, quàm alimentum. Quippe quæ adstrictionis, & amaritudinis non obscuræ, nec exiguæ participes est. hæc Galenus. Ex quibus facile comprobari potest, Chærefolium non esse Gingidium, quod in ipso ex amaroris, & adstrictionis qualitates gustu haud manifestè apprehenduntur. Quod Græci *ῥῆτις*, Latini similiter Gingidium vocant: Itali, Gingidio: Germani, Kerffel, & Kerbelkraut: Galli, Cersucil.

Nomina.

## SCANDIX. CAP. CXXXII.

SCANDIX, sylvestre olus est, amarum, subacre: quod crudum, coctumve manditur: stomacho, & ventri vtile. Decoctum in potu, vesicæ, renibus, & iccinori confert.

QUANQVAM Scandix antiquis rei herbariæ scriptoribus stirps fuit notissima, vt quæ ab iis in frequenti ciborum vñ haberetur aliis admista oleribus, cum tamen hæcenus eorum repererim neminem, cui fides sit adhibenda, qui Scandicem notis aliquibus, vel lineamentis descripserit, nesciuerim profecto quonam pacto, quæue ratione affirmari possit & in Italia Scandicem nasci, & pariter dignosci à compluribus. Cæteram scribit Hermolaus vir doctissimus, & in stirpium historia omnium suæ ætatis facile primus, se vidisse Scandicem in exemplari Græco Dioscoridis apictam foliis feniculi proximis, floribus luteis, siue albis, corniculis caule summo emergentibus. Hanc ipsam nos quoque sæpius vidimus maio, & iunio mensibus inter segetes, præsertimque in agrorum marginibus. Sed quoniam tradiderit Hermolaus eam feniculi foliis effurgere, mihi tamen magis fumariam, & quadantenus anthemidem referre videtur, quàm feniculum. Flores gerit hæc chærefolio proximis, albicantesque, quibus tandem prodeant cornicula tenuia, longiuscula, recta, acuminata, acubus, quæ in geranio emicant, non dissimilia, quemadmodum & in chærefolio videntur, licet huic longè tenuiora, & fragiliora innascentur. Quo fit, vt rectè intuen-

Scandix  
considera  
tio.

tibus

eibus specie tantum, non autem genere differre hæc plantæ haud dubiè apparentid quod etiam indicat eorum sapor. Quamobrem qui chærefolium scripserunt esse gingidium, id non sine ratione fecerunt. Cum enim certò crederent, hanc, de qua in præsentia differimus, plantam legitimam esse Scandicem, faciliè etiam hinc per suaderi potuerunt, ut afferrent chærefolium esse gingidium, quoniam Dioscorides consuevit stirpes per cognationes describere. Quapropter in eorum sanè irem sententiam, hæc, quam Scandicem putant, tantum acrimoniæ, & amaroris gustantibus relinqueret, quantum in Scandice veteres inueniri prodiderunt. Verum cum eas non obscuras quidem qualitates, quas veteres veræ Scandici assignant, in hac, ut ita dicam, noua Scandice nunquam ego reperirè, sicuti nec in chærefolio, quæ veteribus gingidio tribuuntur, cogor omnino eorum sententiæ refragari, & ab ipsis dissentire. Quapropter nisi regionis, & climatis ratione, & locorum mutatione eueniat, ut hæc stirpes omnem tum acrimoniæ, tum amarorem exuerint, non facile quidem adduci potero, ut credam harum alteram gingidium, alteram verò scandicem esse. Neque ab hac mea me deterret opinio Hermolaus, quod viderit Scandicem hanc in Græco Dioscoridis codice appellatam: quippe cum inter omnes rei herbariæ scriptores nullus quod equidem sciam, reperiatur, qui per notas aliquas Scandicem descripserit, nesciuerim ego quinam historia, & ratione fretus aliquis unquam illam picturæ expresserit, nisi fortasse Dioscorides ipse manu propria eo in libro ipsam

PECTEN VERNERIS.

Scandice  
vires ex  
Galeo.

appinixerit. Plinius Scandicem anchrisco similem reddidit. Sed cum ignota per ignotius descripserit, nihil nobis luminis his in tenebris affert. Scandicem commeorat Galenus lib. 11. simp. medicamentorum his verbis. Scandix ex agrestium olerum genere est, subacre, & amara, adeo ut in siccatò, & ex calcassando secundo sit ordinis intensi. Vrinam valenter ciet, & viscera obstructione liberat, ex dictis quali-

tatibus constans. hæc Galenus. Ex quibus etià manifestè colligi potest, plantam, quam pro Scandice accepit Hermolaus, quàmque pro eadem plerique recentium herbariorum hodie ostendunt, nullo pacto legitimam esse Scandi-

cem. Quandoquidem et nò tantam acrimoniâ, nec amaritudinem gustui representat, ut dici possit primum caliditas, & siccitatis, gradum excedere. Ceterum si illa est planta, cui hæc comparari possit, eam adamussim mihi quidem referre videtur, quam plinius libro x x i i i. capite x i x. à pectinum similitudine, *V E N E R A* s pecten appellat. Siquidem hæc radice nititur candida, cauliculis semipedè maioribus foliis syuestris pastinacæ, vel ferè anthemidis, exilibus: floribus albis, tenuibus, emicantibus summatim ab eodem capitulo cupulæ acuminatis rostellis, inter se disinctis, quæ pectines planè referunt, quibus linum mulieres concinnant. Quæ certè omnia reperiuntur in hac vulgari Scandice. Quæ herba *enardis* Græcè, Latine Scandix similiter nominatur: Italicè, Scandice.

Nomin.

## CAVCALIS. CAP. CXXXIII.

## CAVCALIS



CAVCALIS, quam alij sylue stre daucum vocant, cauliculo est dodrâ tali, aut maiore, subhirsuto: foliis apio similibus, sceniculi modo per extremitatem multifidis, hispidiis: candida in cacumine umbellata, suauiter olente. Crudum coctumve ole-

rum modo estur: vrinam mouet.

*VISITVR* Cavcalis in Hetruriæ campis, inculo præsertim solo, ut & Ananienfi tractu in Tridentino agro, nullis reclamantibus notis. Rura nostra hæc Petrosello saluatico vulgò appellant. Quippe quòd folia, quæ per ima prope radicem exeunt, apium quadantenus effigie referant, quod vulgò Petrosello dicunt. Et si quæ superiore parte prodeunt, per ambitum sint sceniculi modo capillamentis dista. Causlem mirit pastinacæ: in cuius cacumine umbellam gerit floribus candicantem, odoratam, dauco non absimilem. Quapropter Galenus libro 11. simplicium

Cavcalis  
confusio  
deratio.

medicamentorum, ita de ea scriptum reliquit.  
*Caucalidis Vires ex Gale.* Caulalidem quidam daucum sylvestrem nuncupant: est enim ei adsimilis gustu simul ac viribus. Nam excalfacit vt ille, & desiccatur, vrinam ciet, & muria ad repositionem conditur. Vt Græcis καυκαλῖς, ita etiam Latinis Caulcalis appellatur: Italis, Caulalide: Gallis, Persil fauuage.

ERVCA. CAP. CXXXIII.

CRUDA ERVCA venerem largiore cibo concitat. Semen eius idem præstat, vrinam cit, Concoctioni prodest, aluo perquam accommodata. Semine ad condimenta vtuntur: quod, vti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum sylvestris eruca, maxime in Iberia, quæ occidentem spectat. Cuius semine pro sinapi incolæ vtuntur. Vrinam vehementius pellit, & multo satiuia acrior.

ERVCA SATIVA.



*Eruca con  
sideratio,  
& Sires.*

VULGARIS admodum planta est Eruca tam satiuia, quam sponte nascens, quod frequenter in cœnis acetariis inseratur. Excalfacit olus hoc (vt testatur Galenus lib. 1. de alimentorum facultatibus) perquam manifeste, adeo vt non facile solum absque iunctis lactucæ foliis edatur: nam ita immodico calori parvis admixtum excessum temperat. Quinetiam genitale semen augere creditur, & in venerem stimulos addere. Caput etiam magis dolore afficiet, si solum edatur. Semen (vt scribunt antiquorum nonnulli) muris aranei moribus medetur. Ventris tineas enecat, lienemque exte-

nuat. Tritum, & cum felle bubulo mistum, nigras vicerum cicatrices ad candorem reducit. Cum melle verò perunctum, vitia cutis in facie emendat, & lentiginines emaculat. Herba, quæ Græcis ἱερύμαρ, Latinis Eruca vocatur: Mauritanis, Iergir, Ergir, seu Giargir: Italis, Ruchetta, & Rucola: Germanis, Vveißt senff: Hispanis, Oruga, & Arugua: Gallis, Roquette.

10

ERVCA SYLVESTRIS.



OCIMUM. CAP. CXXXV.

OCIMUM vulgò cognitum. Id copiosiore cibo oculorum aciem hebetat alium mollit, spiritum mouet, vrinam pellit, lac euocat: ægrè tamen conficitur. Illitum cum polline polentæ, aceto, & rosaceo, pulmonum inflammatio nibus auxilio est. Draconis marini, & scorpionis ictibus per se prodest: & cum vino Chio, oculorum doloribus. Succus visus caliginem abstergit: distillationes exiccat. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili vrinæ, inflatque: naribus haustum, subinde mouet sternutamenta. quod idem herba efficit. Sed oculos premi necesse est, cum sternutamentum vrget. Sunt qui in cibis abdicandum censent: quandoquidem manducatum, & in sole positum vermiculos creat. Aphri autem adiciunt, si feriantur à scorpione, qui ocimum ederint, nullo consistari dolore.

OCIMUM

OCIMUM MAGNUM.

OCIMUM PARVUM.

Ocimi con-  
sideratio.

OCIMUM quemadmodum odoratissi-  
mum, ita & omnibus notissimum est. Nanque  
perraræ sunt ubiq; ædium fenestras, perrarq;  
cœnacula, ac viridaria, quæ Ocimo non redo-  
leant, vtpote quod frequens seratur, & fouea-  
tur in figulinis vasis. In Italia hoc xuo Ocimi  
tria habentur genera. Quorum primum foliis  
assurgit amaranto longè maioribus, latis, lon-  
gis, ac crassis, citreæ malo similibus, à quorum  
effigie ipsum faciliè vocarunt Arabes Ocimum  
citratum, quo modo ipsum Mestues nominat.  
Secundum foliis exir, ac ramulis, dicto longè  
minoribus. Tertium, quod foliis constet minu-  
tis atq; angustis, sitq; ceteris odore fragrantius,  
Italici vulgò appellatur Basilico gentile. Horum  
omnium meminit Serapio, vocatq; medium  
hic à Dioscoride descriptum, Ocimū non ga-  
ryophyllatum: garyophyllatum verò, quod cæ-  
teris tum minutius, tum odoratius habetur.  
Demum illud Citratum à foliorū similitudi-  
ne nuncupavit, quod citri foliis æmulum esse  
diximus, vt facile omnibus perspicuū esse po-  
test, qui Serapionis monumenta perlegerint  
de Ocimo differentis. Idcirco videant quæso  
patres illi reuerendi, qui in Meseum commen-  
tarios scripsere, quo iure, quæue ratione in ele-  
ctuario de geminis se iactent Ocimum garyo-  
phyllatum hac tempestate primos adinuēnisse,  
cum hoc Serapioni foliis exeat parvis, & caule  
quadranguli: monachis verò foliis melisso-  
phylo maioribus, per ambitū serratis, & caule  
minimè anguloso. Quain re eos, pace sua, a-  
perrè hallucinatos putauerim. Nec equidem  
credendum arbitror, quod de alio ocimi gene-  
re intellexerit Mestues, quàm de tertio illo ge-  
nere in deliciis habito, de quo diximus. Nam  
cum ceteris odoris fragrantia longè præstet,  
nulli dubium est, quin in roborandis cordis  
visu viribus ceteris sit longe aptius, atq; etiā  
præstantius, vt quod in electuario de geminis  
addatur ad cordis affectus. Scribit Brasæolus

Monacho-  
rum iactan-  
tia.Brasæolus  
lappus.

suo de simplicii examine Romæ primū ex-  
cuso libro, tantam de ocimi viribus inter Pli-  
nium, & Dioscoridem esse controuersiam, vt  
alterum ipsorum errasse dicendum sit. Quippe  
ex Aphris tradit Dioscorides, quod si à scor-  
pione feriantur, qui ocimū ederint, nullo do-  
lore afficiuntur. Contrā verò Plinius, qui libro  
xii. cap. x. si eo die inquit, feriatu quispi-  
am à scorpione, quo ederit ocimum, feruari  
non posse. Qua in re lectionis impatiens de-  
prehenditur Brasæolus: quandoquidem si eo  
loco Plinium de Ocimo differentem, patien-  
ter perlegisset, cognouisset vtique quàm rectè  
Plinius ipse hanc dirimat controuersiam, sitq;  
respondeat, qui ocimum accusant, cum inquit.  
Ocimum quoq; Chrysippus acriter increpuit,  
inutile esse dicens stomacho, vrinæ, & oculo-  
rum claritati. Præterea insaniam facere, & le-  
thargos, & iecinoris vitia. Ideoq; capras id a-  
spernari, hominibus quoque fugiendum cen-  
set. Adiciunt quidam tritum si operiatu lapi-  
de, scorpioneque gnignere. Commanducatum,  
& in sole positum vermes asserre. Aphri verò,  
si eo die feriatu quispiā à scorpione, quo e-  
derit ocimum, feruari non posse. Secuta ætas ala-  
criter ocimum defendit: nam id esse capras, nec  
minus, quàm mentham, & rutam scorpionum  
terrestrium icibus, marinorumq; venenis me-  
deri ex vino, addito aceto exiguo. Vsu quoque  
compertum deficientibus ex aceto odoratu sa-  
lutare esse. Item lethargicis, & inflammatis re-  
frigerationi. Illitum capitis doloribus cum ro-  
sacco, aut myrteo, aut aceto. Item oculorū epi-  
phoris, impositum ex vino: stomacho quoque  
esse vtile. hæc Plinius. Ex quibus clarissimè pa-  
tet, Plinium eorum placitis refragari, qui tam  
acriter ocimum damnarunt. Degenerat quan-  
doque Ocimum in serpyllum, vt auctor est  
Theophrastus libro v. capite v. si de plan-  
tatum causis, vbi sic inquit. Ocimum autem,  
quod loco soli exposito situm est, transit in

Ocimi de-  
generatio.

serpyllum, quia vehemēter siccatur. Folio nanque minus, odoreque vehementius redditur. Quippe cum alimentum quoque minus habeant, quæ siccæ sunt. Sed huiusmodi mutationes ita euenire putandum, vt aliquid similitudinis faciant, non vt omnino speciem expriment alienam. hæc enim Theophrastus. Cæterum Aucenna libro de viribus cordis à Diocoride diffentire videtur. Nam ocimum, scribit, sanguinem turbidum, & melancholicum generat, quoniam superflua humida, quæ est in ipso, parit inflationē in venis. Nec aliter videtur sensisse Galenus, qui lib. v. i. i. simplicium medicamentorum de ocimo ita scriptum reliquit. Ocimum ex secundo est ordine calfacientiū: habet autem recentem iā humiditatem: proinde nec commodum est, quod in corpus sumatur. Cæterum foris illitum, ad digerendum, & concoquendum vtile est. Item libro 1. de alimentorum facultatibus, cum inquit. Ocimo etiam plerique vt obsonio vtuntur, ex oleo, & garo esitantes. Viriosi autem est succi. Admentuntur ob hoc quidam dicentes, si tritū scitili nouo inditum operiatur, celerimē intra paucos dies scorpiones gignere, præsertim vbi quis quotidie ollam ad solē calfecerit. Sed hoc sanē à vero abest. Id porro verē de eo dixeris, olus esse prauū succi, stomacho noxium, & cōcoctū difficile. Sed illud in Ocimo non ignorandum

Ocimi ab ocimo diffentia.

puto, quod ocimum per y ab ocimo per i maxime differeprehenditur probatissimorum auctorum testimonio. Siquidē apud antiquos Ocimum erat pabuli generis dictum vel quod citō proveniret: vel primū inter cætera pabuli genera ē terra erumperet: vel quod iumentis citaret alium, sic appellatū ē ab Græca voce, quæ Latinis valet citō. Ocimū verō herba est illa odorata, de qua suprà disputauimus, sic nominatū ab ὄσμι verbo Græco, quod redolere significat. Vnde rectius fortē per z, quā per c scribendū esset. Cæterum ocimū antiquis quibuscum boum pabulū erat ex secta viridi segete, priusquā indurescerent culmi: vel ex seminibus pluribus simul in agro satis. Nepe ē fabarū modis decē, viciz duobus, & eruliz tantundē vna in iugero satis, & ante maturitatem recitis. Catoni tamē ē vicia, sceno græco, faba, eruoq; in vnum cōmixtis, & exinde satis ocimum est. Quo fit, vt putauerim ocimum antiquis, non modō herbaceam, viridēque fuisse segetē, ē pluribus seminibus vna in agro satis in primum iumentorum pabulū, sed etiam ex vno tantū cerealiz genere, nepe hordeo, aueua, vicia, eruo, alijsq; his cognatis, quod eiusmodi pabulo verno tēpore, non modō alantur boues, ac etiam equi, sed etiā repurgentur. Id quod nostra quoque ætate fit pluribus in locis in Italia, præsertim cum hordeo, eruo, & vicia. Nec placet eorū sententia, qui sibi nulla, vt arbitror, ratione, nec auctoritate persuadent, Ocimū plantā esse sui proprii generis. quod ē veteribus nullū hæcenus inuenierim (quantum

equidem vidi, & legi) qui ocymi herbæ historiam literis memoriæq; mandauerit: sed cōperi quidē, quod vocabulū hoc non magis vni, quā alteri conueniat. quandoquidē vnicuiq; pabuli generi, quod primo statim vere citō proveniat, accommodari potest. Quare planē explodenda videtur Adam: Loniceri opinio, quod non sine errore ridendo frumentū Turcicum, siue, vt aliis placet, Saracenicum, quod Tridentina rura vulgō appellat Formentone, & Foroiulensi à pullo feminis colore Saracino, ocimū esse firmiter existimet. Quinetiam est turpiter aberrasse deprehenditur, quod huic plantæ, quæ suum Ocimum est, omnes odorati ocimi facultates reddiderit. Nec alia ratione motus frumentum Saracenicū ocimum esse censet, quā quod satū tertia à satū die erumpat. Verum ocimū non ea de causa nomen hoc (quæ quidem sententia) sibi comparauit, sed quod citius cæteris pabulorum generibus vere primo adolescant: nam innumera essent ocymi genera, si id omne, quod statim ferē à satū oritur, ocimum vocari debeat. Quod hæc (vt antedictum est) Græci, ocimum item Latini appellant: Mauritan, Berendaros, & Bedarog: Itali, Basilico: Germani, Basilien, & Basilgram: Hispani, Albahaca: Galli, Basilic.

Adamianus opinio

Nemina.

#### OROBANCHE. CAP. CXXXVI.

OROBANCHE cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subrubet, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteū vergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosus. Hæc inter quædam legumina nasci constat, & ea strangulare: vnde orobanche sibi cognomentū vsurpauit. Estur, vt olus, cruda, & in patinis, asparagi modo decocta. Legumentis addita, concoctionem accelerare creditur.

OROBANCHEN, quæ omnibus notis legitimæ Diocoridis responderet, vidimus primum in Ananensis agro supra Tridentum, ac deinde vbique ferē in Italia nasci comperimus, in campis non modō inter omnia leguminum genera, sed & inter segetes, cannabim, linum, & in viis secus agrorum fepes. Cæterum etiā scriptis mandauerit Theophrastus libro v. i. i. de historia, & v. de causis plantarum, Orobanchem eruum necare amplexu, complexūque suo, ea tamen, quæ hic à Diocoride repræsentatur, & à Plinio libro x. x. i. capite vicino, nullo sanē complexu, sed sua tantum præsentia, legumina, segetes, cannabim, & linum interimit, quæ prope ipsam

Orobanchis conspiciatur.

ipsam oriuntur. Quam ob causam Ananienfes, quod vicinas stragules, ac deuoret plantas, Herba lupa vulgò orobanchem appellant. Proflit hęc (vt inquit Dioscorides) nullis vnquam foliis, sed vno tantum affurgit cauliculo, asparagi instar, colore subrubro, hirsuto, molli, pinguiq; & qui sesquipedalem non excedat longitudinē.



Flos ē quibuscumq; parefcit globulis in cacumine congestis, subalbidus. Radix digitali vifitur crassitudine, fungo fa, ac fragilis. Hęc planta nonnullis etiam vulgò Coda di leone appellatur, aliis verò Herba tora vocatur, quæ vacca ē deguſtata (vt pastores facio periculo teſtatur) ſtatim taurum ad-eant. Sunt & qui (vt loco citato ſcribit Plinius) cynomotion eam appel-

lent à ſimilitudine canini genitalis. Ex quibus omnibus non temerè dicendum exiſtimauerim, vel Theophrastum (pace ſua) hac in re deceptum eſſe, vel aliam à Dioscoride, & Plinio orobanchem concepiſſe. Orobanchem, vt Gale-nus eſt auctor libro v l i i . de facultate ſimpli-cium medicamentorum, eſt ſicca, frigidaq; tē-perature in primo ordine. Huius plantæ no-men Græcum eſt *ὀροβάνχη*, quemadmodum & Latinum Orobanchem, necnon Erui angina: Ita-licum, Orobanchem.

Orobanchem facul-tas.

Nomina.

BARBULA HIRCI. CA. CXXXVII. 40



BARBULA hirci, quæ ab aliis come vocatur, breui eſt caule: foliis croci: radice longa dulci: magno ſuper caulem calyce: ē cuius ſummo ſemen nigrum depen-det, vnde nomen inditum eſt. Herba eſui apta eſt.

Barbula hirci conſideratis.

HIRCI barbula, quam Hetruria vulgò ap-

pellat Saffefrica, vulgaris admodum eſt noti-tie. Radix q̄ guſtu dulcis, iucundaque ſit, eſtur hye-me frequenter in acetariis. Foliis exit hęc croci, latioribus tamē, ac longioribus: flore aureo, roſtro porcino vocato non abſimili, maiore ta-men, qui calyce continetur. Is ſereno celo ſatiſcit, nubiſolo verò contrahitur, occluditurque calyce, quemadmodum & chamaelonis echinus. E concluſo calycis vertice barba dependet inca-na, proluxaque. Vnde nomen accepit, vt Theophrastus prodidit lib. & ca. v l i . de plantarum hiſtoria. Sed certè neſciuerim ego, qua ratione ductus negauerit Hermolaus, hanc Theophrastus, & Dioscoridi legitimam Hirci barbula eſſe, cum illa pulchre huius notis reſponderet. Glu-tinat hęc recentia vulnera, ſi foliorum ſuccus, vel eius ſtillatitia aqua ſplenit, & attritis linteolis ſuperponatur. *Τρυγανθῶν* ita Græcis, Latinis verò Barbula hirci vocatur: Italici, Barba di becco, & Saffefrica: Germanici, Bocks bart, & Gauch brott: Hiſpanici, Barba de cabron.

Hermolaus error.

Nomina.

ORNITHOGALVM. CAP. CXXXVIII.

ORNITHOGALVM cauliculus eſt tener, candicans, tenuis, ſesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine molli-bus agnatis: à quibus flores prodeunt foris herbacei, & cum hiantes fe pan-dunt, lactei viſuntur: inter quos diſſe-ctum, cachrys modo, capitulum emi-cat. Coquitur cum pane, vt melanthium, Radix bulboſa, cruda, & cocta manditur.

ORNITHOGALVM adeo inter ſegetes frequens oritur, vt ſi maio mienſe in aruiſ re-gatis conſideratis.

Ruellius in Gallia ornithogalum copioſum naſci ſcribit, pueris non incognitum, qui propter aſtantes, cum ab agricolis aratro terra proſcindi-tur, aut in latiores porcas ſulcatur, ornithogali radices vomere erutas colligunt: & cum ſint caſtaneis ſuauioribus, iis & crudis, & in cineribus incoctis veſcuntur, odore iucandiſſimo, os mirum in modum commendante. Radices in orbem ſerè collectæ ſunt: cortice pullo: candi-diſſima intus carne, perquam odorata: vere, vel æſtate cum fronde viſent, hyeme vel autumnocum exarantur agri, radicibus velluntur. Diu ſeruari poſſunt, & ubi annonæ premit inopia, plebis ruſtice famem, & ieiunia caſtaneorum more ſeruant. Mirè ſubis expectantur, & harum capiti dul-



## ORNITHOGALVM.



TRASS.



*Trasferu  
mentis, et  
Vires.*

cedine, gregatim ad has eliciendas, radicibusque vellendas aduolant. Cæterum cum ornithogali radices suauitatis suæ præstantia, in mentem mihi reuocauerint illas, quæ in agro Veronensi, ubi tantum, neque alibi, quod sciam, nascuntur in Italia, vulgo vocantur TRASSI, fauoris dulcedine callaneis proximè accedentes, recentioribusque quibusdam in medicamentis eodem expectantur, eas hic recensere non ab re fore duximus. Sunt igitur Trasi radiculæ figura, ac forma persimiles fericinis erucis, quæ feruenti balneo elixæ contrahuntur, dum ferica stamina inde mulieres conglomerant. Harum cremore pectoris, & laterum vitia expurgantur, quo fit, ut tuissentibus opem non modicam præstent: tonduntur enim, maceanturque carni iure, deinde per linteolum exprimitur cremor, quem etiam venereis portionibus miscent recentiorum nonnulli. Sunt radices hæc, ut experientia compertum est, & ex dulcedine


coniici potest, in calefacientium, & humectantium genere, sed status quodammodo gignunt. Planta germinat vere, & æstate foliis farraginis similibus, cuius radicibus Trasi coherant. Has verò satis representare videntur radices illæ, quas DORONICOS vulgus officinarum nominat. Quas, quidem in primis commendauerunt Arabes, & præsertim Auicenna ad cordis affectus, contra venena, & deleteria medicamenta. Plantam, cuius hæc sunt radices, hætenus non vidimus: quanquam asserit Ruellius foliis esse ferè acuti rumicis. Alij verò ea leucio similia esse volunt. Doronicus Aëuario carnabadii dicitur. Afferitur ex Alexandria Aegypti, & ex Gargano Apuliæ, sed viribus longè infirmior. Quod *ἰπποβότανον* Græci, Latini pariter Ornithogalum nominant: Itali, Ornithogalo: Galli Churles.

*Doronicū  
cōsiderat.*

*Nomina.*

## 20 TYBERA. CAP. CXXXIX.

TYBERA rotundæ radices sunt, sine caule, sine foliis, flauescentes, vere fodiuntur. Cruda, & cocta eduntur.



TYBERA, quæ occulta quadam facultate terra in se parit, & conglobat, numerosa in Hetruria à rusticis effodiuntur, quod magnatibus maximè expectantur in conis. Duo eorum in Romano agro habentur genera. Quorum alteri candida, pulla verò alteri pulpa subest. Rimolus vtriusque cortex, ac niger. Est & tertium genus in Ananiensi, & Tridentino tractu prociens læui cortice, colore subrufo, cæteris longè minus, inspidum, & gustu iniucundo. Tuberum meminit Plinius libro x l x. capite 11. sic inquit. Et quoniam à miraculis rerum cœpimus, sequemur eorum ordinem, in quibus vel maximum est aliquid nasci, aut viuere sine villa radice. Tybera vocantur hæc, vndique terra circumdata, nullisque fibris nixa, aut saltem capillamentis, nec vtiq; extuberante loco, in quo gignuntur, aut rimas vigente, neque ipsa terræ coherere. Cortice etiam includuntur, ut planè nec terram esse possumus dicere, neque aliud, quàm terræ callum. Siccis hæc ferè, & sabulosis locis, fruterosisque nascuntur. Excedunt sæpe magnitudinem mali cotonei,

*Tuberon  
cōsiderat.*

etiam

etiam librali pondere. Duo eorum genera arenosa, dentibus inimica, & altera syncera. Distinguuntur & colore rufo, nigroque, & intus candido. Laudatissima quæ Aphricæ crescunt. An ne vitium id terræ? neque enim aliud intelligi potest: malum ne id ea procius globetur magnitudine, qua futurum est, & viuat ne, aut non, haud facile arbitror intelligi posse. Putrescendi enim ratio communis est iis cum ligno.

**Historia** Lartio Licinio prætorio viro iura reddenti in  
**ex Plinio.** Hispania Carthagine paucis his annis scimus accidisse, mordenti tuber, vt deprehensus intus denarius primos dentes inficeret. Quo manifestum erit terræ naturâ in se globari. Quod certum est ex iis, quæ nascuntur, & seri non possunt. Et libro eodem capite tertio: De tuberibus (inquit) hæc traduntur peculiariter. Cum fuerint imbres autumnales, ac tonitru crebra, tunc nasci, & maximè de tonitribus, nec vitra annum durare, tenerima autem verno esse. Quibusdam locis acceptantur riguis, & seruntur, sicut Mitylenis. Negant nasci, nisi exundatione fluminum inuecto semine ab Ilyris. Est autem is locus, in quo plurima nascuntur. Sunt & in fungorum genere à Græcis dicti pepicæ, qui sine radice, aut pediculo nascuntur. Hactenus de tuberibus Plinius. Tuberâ (vt memorie prodidit Galenus libro 11. de alimentorum facultate) radicibus, aut bulbis sunt annumeranda, vt quæ nullam evidentem habent qualitatem. Qui ergo his vtuntur, ad excipienda condimenta tanquam materiam habent, ceu alia qualitatis expertia, & innoxia, gustûque aquosa sunt. Quibus omnibus commune est, vt alimentum nulla insigni facultate constans, corpori præbeant, sed frigidiusculum duntaxat, crassitudinem tale, quale id ipsum est, quod ingestum fuerit: ex tuberibus quidem crassius, ex cucurbita liquidius & tenuius.

**Tuberis** **ex Ga.** In aliis eadem est proportio. Sed longè aliter de his scripsit Auicenna, cum inquit. Tuberâ terrena magis, quam aqua sunt, omniq; prorsus sapore expertia. Attribiliare, & crassos gi-gnunt humores, magis quam cætera ciborum genera. Quo fit, vt frequenter deuorati apoplexiam, & paralyfim concitent. Ad hæc concoctu contumacia sunt, & ventriculum aggranant. Quæ Græcè *βότρυς*, Tuberâ Latine dicuntur: Arabicè, Ramee, Alechamach, Tamer, & Kema: Italicè, Tartuffi: Germanicè, Hirtz brunft: Hispanicè, Turmas de tierra: Gallicè, Truffe.

SMILAX HORTENSIS.  
CAP. CXL.

**HORTENSIS** Smilax frutex est, cuius semen à nonnullis lobiâ vocatur. Folia habet hederæ, molliora tamen: tenues caules, & capreolos vicinis fruticibus circumuolutos: qui tantum

adolefcunt, vt topiarias scenas repræsentare videantur: siliquas fœni græci



proferit, longiores, torosiores: in quibus semina renem similia, sed inæqualicolore, recluduntur: quæ quadam ex parte fuluescunt. Siliqua costâ, cum semine in oleribus asparagi modo estur. Vrinâciat, & tumultuosa somnia facit.

**HORTENSIS** Smilax (vt supra nobis dictum est in Phaeolis, sub quorum appellatione falsò credidit Manardus de eruliâ scripsisse Dioscoridem) nil aliud, mea quidem sententia, esse potest, quam ea Phaeolorum genera, variis coloribus depicta, quæ vulgò Italis dicuntur Fagioli Turcheschi. Siquidem præter id, quod rubentes, versicolores, & (vt Dioscorides inquit) renem figura cernuntur, foliis exeunt hederaceis, caule tenui, è quo capreoli prodeunt, quorum reptatu non modò palos, & arbores scandunt, ac vinciunt, sed in hortis atregias, pergulas, testudines, scenas, & tentoria inuoluant, & opacant. Hos Galenus libro primo de alimentorum facultatibus, ex auctoritate Theophrasti dolichos appellat, sic inueniens. Dolichus adactò longo palo confurgit, & fructum gerit: sin hoc adminiculo careat, vitiosus fit, & rubigine tentatur. Quod quotidie visitur in hoc phaeolorum genere. quippe quod nullo sustentaculo in altum euecti, humi repunt, & contracto tractu temporis humore, situ, ac rubigine depereunt. At vbi longissimo inhæserint pedamento, breui temporis spatio, ad culmen vsq; illi se circumuoluunt. Quo fit, vt longè aberrasse Manardum existimem, quod asserit libro 1. epist. 111. Dolichos nil aliud esse Galeno, quam Eruliâ, quæ Itatorum nonnullis vulgò appellatur Rouigione, aliis verò Arabiâ, cum tamen Galenus itémque Paulus Eruliâ appellarent Ochrum. Nec nobis obstat, quod Eruliâ (vt ipse asserit) rubiginem contrahat, cum adminiculis caret, quibus à terra subleuetur, quòdque huiusce tantùm leguminis siliquæ vnâ cum semine comedantur, vt Galenus libri 11. de aliment. facult. præfatione, & Paulus Dolichos mandî testantur. Nam etsi aliquando Eruliæ secti arborum rami apponantur, vt illos

*Smilacis hortensis consideratio.*

*Manardi error.*

implicent, nunquam tamen longissimi adsignatur pili, quod ea minimè illos scandere valeat, versicolorum phasolorum modo. Ad hæc Erullia, quæ humi ferpat, rubigine minimè deperit, vt Tridentinus ager vbiq; testari potest. Quippe quodd ibi frequentissima feratur, dimittaturque nullo propè fixo pedamento humi accumbere. Nec obstat præterea (vt ipse Manardus scribit) quodd sola Erullia inter legumina cum siliquis comedatur. Nam quanuis decocta vnà cum siliquis mensis apponatur, nunquam tamen aliquem me vidisse fateri possum, qui siliquis simul cum granis deuorauerit: est enim erullia inuolucrum subius potius, quàm hominibus in cibum exhibendum. Vnde equidem omnes, quod viderim, Erulliam mandentes, semina dentibus extrahunt, & membranosis, exhaustisq; siliquis dentium attritui prorsus repugnantes, in patinis subius relinquunt. Secus autem cum huiusmodi phasolorum corniculis euenit: quandoquidè cum tenella adolefunt, anteaquam confenscant, aqua prius elixa, non modò in acetaribus integra, nullisq; abiectionibus putaminibus, assumuntur in cibum, sed butyro, vel oleo fixa addito gingibere, & omphacio, iucundissimè deuorantur. Hinc itaque fit, vt cerò potius credam, hoc phasolorum genus dolichos esse, quàm erulliam Manardo vocatam. Illud insuper hæc in re sentit Manardus, quodd Dioscorides phasolorum appellatione, de quibus supra mentionem fecit, non quidem communes, ac triuiales, sed Erulliam significauerit: Smilacis verò hortensis nomine, de qua hic sermo, vulgares illos phasolos representauerit. Qui (vt suam tueatur sententiam) consensaneum minimè videri inquit, quodd duobus diuersis capitibus eodem libro de phaeolis scripserit Dioscorides. Sed haudquaquam à ratione, & veritate cum alienum existimarem, qui responderit, primùm traxisse Dioscoridem de vulgaribus, & candidis phaeolis, qui passim in campis aliorum leguminum more seminantur, vbi de omni segete, leguminibus differuit. Deinde verò de versicoloribus, qui in hortis, viridariis ad opera topiaria explenda seruntur, inter ea, quæ in hortis, & viridariis coluntur. Quamobrem vt hortenses à campestribus secerneret, inquit: Hortensis Smilax frutex est, &c. Quod manifestè declarat, cum hic de hortensibus, illic verò de iis, quæ in campis proueniunt, intellexisse, atque eos ita seiuuixisse. Qua in re non porui non quandoq; admirari Manardum medicum aliquin ingenio, & doctrina insignem, quodd tam facile adductus esset, vt asseueraret dolichos esse erulliam, cum cum legisse existimandum sit, Galeno, & Paulo erulliam ochrum vocari. Placuit, quæ quidam uocant Græcis, Smilax hortensis Latinis appellatur: Arabibus, Lubia: Italis, Smilace de gli horti, & Faginolo Turchesco: Germanis, Vuelfsch bonen: Hispanis, Feyones: Gal-

lis, Fasseoles de couleur, vel, Poix à visage.

MEDICA. CAP. CXLI.

MEDICA, cum recenter prodiit, foliis, & caule trifolio pratenfi similis est: procedens verò folia contrahit, caules edens trifolij, & siliquas corniculorum modo intortas, in quibus semen lentis magnitudine dependet. Id siccatum, iucundi saporis gratia, conditaneo sali admiscetur. Viride, quibus refrigeratione opus est, illitu suffragatur. Herba tota pro gramine vtuntur, qui pecora alunt.

*Medica sic  
fiscerata.*

MEDICA inde nominationem inueni scertum est, quodd primùm. Plinio lib. x v i i i. cap. x v i. auctore, ex Media in Italiam aduecta fuerit. Verùm et si hæc quondam in vniuersa Italia sereretur ad pecorum pabulum, & omnibus ferè cognosceretur, nec tamen pauci sanè reperiuntur, qui Medicam viderint, ne dum serant: quanquam non desunt, qui eam se confectos existimant. Sed cum ab amicis hoc anno semen accepissem, illudq; magna cum diligentia terræ mandassem, accidit, solo forsitan repugnante, vt nulla exorta sit planta: vnde quid de ea iudicem non habeo. Hæc (vt Plinius tradit loco citato, & antiquorum plerique testantur) vno tantùm sætu plus tricenis annis perdurat. Eadem (vt quidam referunt) abundat Hispania, vbi magna admodum cura colitur ad iumentorum, & pecudum pabulum: eamq; Alfalfa vocant, nomine ab Arabicis corruptè mutato. Nani (vt lib. i. i. capite de Cot inquit Auicenna) vocatur etiãnum Aphris Alfaisat. Nascitur & in Gallia, si Ruellio credimus, ibique maius trifolium appellatur. Medica sic Latini, & Italis, vt Græcis *μυδική* nominatur: Mauritanis (vt modò dictum est) Cot, & Alfaisat: Hispanis, Alfalte, Eruaie, & Alfalfa: Gallis, saint Foin, vel, grand Trefle,

*Nomina.*

APHACA. CAP. CXLI.

APHACA in aruis nascitur, altior lente, tenuibus foliis: siliquas lenticula maiores fert, in quibus terna, quaternave semina nigra, lente minora, continentur. Quæ adstringendi vim habent. quare torrefacta, stomachi, aluique fluxiones sistunt, si fresca lentis more decoquantur.

Non

*Nomina.*

APHACA.



VICIA.



*Aphaca*  
*federatis.*

*Quorum*  
*dans la*  
*pluie.*

*Aphaca*  
*intybi ge-*  
*ner.*

NON solum in vniuersis Italiae locis Aphaca sponte nascitur, sed & multis in campis feritur leguminum, & erui modo ad columbarum saginam. Folio germinat viciae maiore, crassiorique, quadrangulari caule, flore subrubco, filiquis inde dependentibus pisorum instar, breuioribus tamen, sed lenticulae maioribus, in quibus includitur semen, viciae quadantenus maius. Goritienſi agro frequentissima nascitur inter segetes, & prope sepes. Quo fit, vt maxime aberrent, qui censent Aphacam nihil à vicia differre, quæ inter segetes vbique copiose provenit. Quippe quoddam hanc minori sit folio, tenuiori caule, flore in purpuram rubescente, filiquis longioribus, gracilioribus, ac rotundioribus. Eaque propter de Aphaca, & Vicia differens Galenus libro 1. de alimentorum facultatibus, ita scribit. Aphacæ, & viciae seminum figura non rotunda est, veluti fabarum, sed aliquantulum latiuscula, similiter lenti. Hæc quoque cum sua planta, & valvulis integra rustici reponunt, vt brutis pecudibus pabulo sint. Per famem tamen quosdam noui, qui hæc quoque comederint, potissimum vere, cum etiamnum virent, quemadmodum fabas, & cicera esitare consueverunt. Semina autem hæc non solum infuauia sunt, sed concoctu etiam difficilia, & aluum retinentia. Perspicuum ergo est, cum huiusmodi naturam obtineat, alimoniam quoque, quæ ex ipsis in corpus permanet, improbi, crassique succi esse, idoneam ad humoris melancholici generationem. hæcenus Galenus. Cæterum illud animaduertendum est, quod Theophrastus libro 11. capite 11. & 1. de plantarum historia Aphacam inter intybeeas, vel cichoriei generis connumerat. Quare mirandum non est, si etiam in aliis quibusdam à Dioscoride discrepet, quemadmodum in coronopo, orobanche, ac aliis nonnullis ostendimus. Nec mirum etiam Plinium hac in historia variasse: nam libr. x x. v 11. capite v. Dioscoridis Aphacam ad ver-

bum retulit: libro verò x x 1. Theophrastum secutus, eam inter cichoraceas reposuit. Quæ Græcis *ἀφάκα*. Latinis item Aphaca, & Aphace nuncupatur: Arabibus, Apaki, Afaki, siue Albikia: Italis, Aphaca: Germanis, Vuilde vuicken, & Vogels vuicken: Gallis, Vesse sauage.

PORRVM CAPITATVM.

PORRVM CAPITATVM.  
CAPVT XLIII.

CAPITATVM porrum inflationem facit, noxium succum creat, tumultuosum somnium parit, vrinam ciert, aluo accommodatur, extenuat, oculorum aciem hebetat, menses pellit: sed lædit exulceratam vesicam, renésque, cum pitfana verò coctum, estu pectoris vitia extrahit. Coma eius in aqua maris, & aceto cocta, in defefsionibus ad præclusiones vuluæ, & duri-

tias, utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & multò minus inflat. Semen acrius est, & quandam adstrictoriam vim habet. quare succus cum aceto, addito thure, aut manna, sanguinis profluuium sistit, maximè si naribus erumpat. Venerem stimulat: contra omnia thoracis vitia, tabemque, pro delinctu efficax est: arteriam esu purgat: sed si assiduè estur, visus obscuritatem inducit: stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morbus auxilium est. Ipsum quoque cum aceto aut thuris polline, lacte aut rosaceo, utiliter aurium doloribus, & sonitui instillatur. Varos tollunt folia illita cum rhoë, qua ad obfusum turtur: cepin scidi medentur: crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent, seminis drachma binæ, cum æquali baccarum myrti ponere potat.

Porri consideratio.

PORRUM, quod copiosum quadragesimalis nostri ieiunij tempore plerumque in foris olitorijs vna cum oleribus venale reperitur, omnibus notissimum est. Cæterum etsi magnopere labore hortorum cultores, vt eorum porri, longi, crassi, candidi, ac teneri euadant, nesciunt tamen eos capitatos efficere, ceparum instar: quauis ij apud vtres in frequentissimo usu fuissent, quod longis, qui propriè scitui appellantur, lapidiores, gustuique gratiores haberentur. De his igitur tanquam præstantioribus scripsit Dioscorides, non tamen quòd à scituis genere differrent, è quibus mangonio capitati sunt, regula in transplantatione supposita, incisils prius ante medullam folijs, ne adolenti facultas in sublimè feratur, nec ad radices, sed in ipso capite confideat: vel fasciculo conuellantur radices, vt delumbata alant, neque distrahant, vt scriptum reliquit Plinius libro x i x. cap. v i. Porri facultates recensuit Galenus libro i i. de alimentorum facultatibus, vbi simul etiam de Allio, & cepis agens, sic inquit. Harum plantarum radicibus percrebro videntur homines, rarius caule, folijsque, acri admodum facultate præditis pro radicum portione. Corpus excalescit, & crassos in eo humores extenuant, glutinososque incidunt. Bis tamen, aut ter in aqua decocta, acrimonia spoliatur: quanquam ne sic quidem vim perdunt extenuandi. Verùm facultatem quandam obscurissimam alendi corporis exinde acquirunt, cuius antea, quam decoquerentur, nihil prorsus

Porri facultates ex Galeno.

obtenebant. Cæterum allium non modò vt obfusum, verùm etiam vt medicamentum sanitati accommodum, quòd obstruicta soluere, & discutere possit, vsurpatur. Aliquantisper elixum, vsque dum acritudinem abiciat, viribus quidem suis imbecillius fit, sed succi prauitatem non amplius seruat, quemadmodum nec porri, nec cepæ, cum bis fuerint decocta. *ῥιζοσπινάριον* id vocant Græci, quod Latini Porrum capitatum: Arabes, Curat, seu Kurat: Itali, Porro capitato: Germani, Lauch: Hispani, Fuenro: Galli, Porreau.

AMPELOPRASVM.  
CAPVT CXLIIII.



AMPELOPRASVM stomacho magis, quam porri aduersatur: plus autem excalescit: vrinam, & menses vehementius ciet. Id contra serpentium morsus esse conuenit.

PROVENIT agreste porrum plerumque in vineis, vnde à nazalibus *ἀμπελοπράσον* quasi vineale porrum, Græcis appellatur. Nasitur hoc in vniuersa Hetruria non solum in vineis, sed etiam frequens admodum in agrorum marginibus, & in amœnis collium locis. Rura nostra ipsum vulgari sermone appellant Porrandello. Estur à rusticis, & agricolis in acetariis crudum, recensis alij vice: quanquam mansu dius sit, gustu acris, & concocta difficilis. Est præterea Ampeloprasum (vt libro v i. simplicium medicamentorum prodidit Galenus) acris, & siccus domesticus, sicut agrestia omnia reliqua domesticis: ac proinde stomacho, quam illud nocentius: sed & crassos, ac lentos humores potentius incidit, valentiusque infarctis organis obstructione liberat. Hac quoque ratione vrinas, & menses sepe prouocant, vbi à crassis, & lentis retinebantur humoribus. Ad eò verò est calidum, vt illitum cataplasmas modo exulceret. Dictum est autem antè, quòd quæ cum in modum sunt calida, extremi sint ordinis, hætenus Galenus. Cæterum illud silencio haud dissimulandum puto, quòd Galenus minus fortasse rectè id tribuerit Ampelopraso, quod nominis significationi reclamation, & potius scorodopraso competere videtur, cum loco citato inquit. Si inter allium, & porrum mediū quidam

dam concipias, facultatem ampeloprasii inuenis. Quandoquidem scorodoprasum, teste infra Dioscoride, vt alij, & porri vires. ita & nomen sibi vendicauit: ampeloprasum verò dictum est, quòd in vineris nascatur. Id quod ipsemet Galenus cõfirmat lib. v. 111. simp. medicamentorum his verbis. Scorodoprasum sicut gustu, & odore mediã alij, & porri qualitatem possidet, ita & vires. Et libro 11. de alimentorum facultatibus: Ampeloprasii (inquit) à porro tanta est differentia, quanta in aliis congeneribus plantis inter syluestria, & satia inuenitur. Sunt qui hoc in totum sequentem annum reponant, aceto condientes, haud aliter quàm cepas, eaque ex parte cibo commodius, & prauo minus succo obnoxii efficitur. Quod

*Nomina.* ἀμπελόπρασον Græci, Lacini Porrum agreste, & Ampeloprasum dicunt: Mauritani, Nabati: Itali, Porro saluatico, & Porrandello: Germani, Vuilid lauch: Hispani, Ayos, & Puerros de las vinhas: Galli, Porrée de chien.

CEPA. CAP. CXLV.



CEPA longa acrior est, quàm rotunda, itè flaua quàm candida, & sicca quàm viridis, & cruda quàm cocta, aut sale condita.

Omnes tamen mordent, flatu gignunt, appetentiam inuicant, sitim mouent, & extenuant, fastidium pariunt, & expurgant: alio viles sunt. Ex detractis purgamentis in oleum coniecta, hæmorrhoidas, reliquosque excretionum exitus referant, subdita pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, arum, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur: an

ginæ eodem perunguntur: suppressos menses pellit: caput purgat, naribus infusus: canis moribus cum aceto, ruta, & melle illinitur: cum aceto autem perunctas in sole vitiliginis sanat: & cum pari spodio, scabras lippitudines sedat: varos cum sale reprimat: contra

calceamentorum attritus. cum gallinaceo adipe vtilis est: citæ aluo prodest: in auribus sonitum, ac grauitatem emendat: ad purulentas aures, & eliciendam earundem aquam, valet: alopeciæ earum succo perfricantur, qui celerius quàm alcyonium pilos euocat. <sup>10</sup> Largiore cibo cepacapitis dolores ciet, coctaque vehementius vrinam pellit: eos lethargicos efficit, qui valetudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus æquo vescantur. elixa, & cum passis vuis, & fico illita tubercula concoquit, & celerimè rumpit.

CEPARVM plura Theophrasto notantur *Ceparum genera libro v. 11. cap. 111. de plantarum historia, vbi sic habet. Differunt & cepæ, & Theophrasto* *historia* *lib. v. cap. 111.* genera libro v. 11. cap. 111. de plantarum historia, vbi sic habet. Differunt & cepæ, & Theophrasto allia genere. Sed Ceparum genera plura, vt *lib. v. cap. 111.* quæ à locis nomina accipere: gardiæ, cnidiæ, samothraciæ, item setaniæ, & fissiles, & ascaloniæ, Ex his Setaniæ minimæ, sed largè dulces. Fissiles verò, & ascaloniæ, tum cultæ, tum natura inter se differunt. Fissilem etenim hyeme sua cum coma, inertem relinquunt, vere externa folia detrahunt, & reliqua columnæ detractis his folijs, altero germinant, simulque inferius finditur, vnde fissiles appellatæ sunt. Quidam vel omnibus detrahenda folia censent, vt vim suam imò continent, neque effusæ semineant. Ascaloniarum peculiaris quædam natura notata est: etenim solæ fissiles, & quasi steriles, ab radice consistunt, nec eas parte crescere, ac proficere possunt. Quamobrem non eas deponunt, sed semine ferunt: deinde circa ver, cum germinatum sit, transferunt. Perficiuntur adeo celeriter, vt cum cæteris, aut etiam prius euelli possint. Plus temporis dimissa in terra, putrescunt. Plantatæ canem edunt, semineque tantummodo fundunt: tum exaniuntur, æque inarescunt. Harum igitur talis natura est. Differunt & colore nonnullæ, etenim apud sum cætera quidem candidis similes constant, sed colore candidæ admodum proueniunt, Sardinisique similiter ferre affirmant. Cretensium peculiaris maximè natura notatur, sed Ascalonis quodammodo proxima, si fortè vel eadem dici debeat. Est enim in Creta genus quoddam, quod semine quidem satum in radice crassatur: depositum verò, in canem, semineque totum funditur: sine capite, saporeque dulce est. Id enim quasi è contrario cæteris habet: omnes namque depositæ melius, celeriusque perficiuntur. Omnes post æcturum proueniunt, tepido adhuc solo, vt depositas imbres occupent. Seruntur & toto capite, & circunciso, sed germinationes haud similes fieri solent. Parte namque inferiore cepe nascuntur

nascentur, superiore herba tantum erumpit: scilicet verò in rectum, germinare omnino nequeunt. Gethyum dictum sine capite est, & quia si longa ceruice consistens: ob id germinatio tota in fronde, sæpiusque retondetur, vt porrum. quia de causa femine feritur, id nec deponitur. Cepas hinc ferè differentis discernere licet. hæcenus Theophrastus. Nascentur Cæpe in vniuersa Italia frequentissimæ, quæ etiã inibi multiplici signantur genere, vt refert Plinius lib. x. 1. cap. v. 1. & vt nos quotidie videmus. Quãdoquidẽ forma aliæ maiores, aliæ minores, quædam longæ, quædam rotundæ, quædam verò sessiles proueniunt. Sicut colore rubentes, & subrubentes aliæ, quædam virides, & candidæ nonnullæ. Quin & sapore vel acerrimæ, vel mediocri acrimonia præditæ sunt, aut nihil penitus acres inueniuntur. Omnium maximæ sunt, quæ Caieta Romam importantur. Hæ tametsi ad summum rubescunt, ac crassioribus tunicis compactæ sint, leuioscula tamen acrimonia polient, manique tenerimæ comperiuntur: ob idque in cibis cæteras antecellunt. In Hæturia ex minus acres notantur, quæ magis rubent. Contrà verò albæ, quippe quæ omnium ibi acerrimæ proueniunt. Quam ob causam ad medicamenta potius, quàm ad cibos seruantur: quinquam secus fortasse in Græcia eueniat, quod flauas candidis acrioris esse memoret Dioscorides. Connumerantur etiãnum inter ceparum genera (vt locis supra citatis Theophrastus, & Plinius testantur) quæ Ascaloniæ ab Ascalone Iudææ oppido appellantur, & quæ his similes sunt Theophrasto scitiles nominatæ, nobis verò in Hæturia vulgò Cipollæ maligie. Cæpe (vt memorie prodidit Galenus libro v. 1. simplicium medicamentorum) ex quarto est ordine excofacientium: essentia autem eius potius crassiorum est partium. Vnde etiam hæmorrhoidas aperit tum apposita, tum cum aceto inuncta. In sole alphas abstergit, tum alopecis attrita pilos alyconio citius restituit. Porro si succum eius exprimamus, quod reliquum est, admodum terræ substantiæ est, eiusque calidæ: at succus aqueus, aeræque caliditatis. Hic igitur is, qui suffusi sunt, aut acriem oculorum obusum præ crassitudine humorum obtinent, inunctus prodest. Ex huius temperatura tota cæpe stæosa est manducata. Itaque quæ temperatura sunt sicciore, minus flatuum generant. hæc Galenus. Quod autem Cæpe corporibus præbeant alimentum, supra in porri mentione retulimus ex ipso Galeno, qui de his simul differit libro 1. 1. de alimentorum facultatibus. *κίπυμυ* Græcè, Cæpe & Cæpe Latinè vocatur: Arabicè, Basil, seu Basil: Italicè, Cipolla: Germanicè, Zuuihel: Hispanicè, Cebolla: Gallicè, Ciboule, & Oignon.



ALLIUM quoddam satiuum, atque horrense habetur, quod in Aegypto, singulari vt porrum capite cõstat, dulce, in purpureum vergens, paruum. Reliqua verò magna & candida, ex pluribus coagmèrantur nu-

cleis, quos aglitas, id est spicas, Græci nominant. Aliud est sylvestre, quod ophioscorodon, id est anguinum, vocant. Vis illis acris est: excofacit, mordet, excernit, aluum turbat, inflationes facit, stomachum exiccat, sitim gignit, flatum permouet, summam corporis cutem exulcerat: acriem oculorum esu hebetat. Eosdem effectus præbet anguinum, quod & elaphoscorodon dicitur: latas ventris tineas in cibo sumptum abigit vrinæ detrahit: contra viperarum ictus, & priuatim hæmorrhoides, prodest, ita vt non aliud magis, si cum vino iugiter assumatur, aut tritum in eodem ebibatur: contra rabiosorum morsus, & illitu, & cibo valet. Magnæ & alio vtilitates contra aquarum mutationes: vocem clarificat: veterem tussim crudum, coctumve lenit: potum autem cum origani decocto, pediculos, & lendes enecat: cremati cinis illitus sugillationibus cum melle, & alopecis cum nardino vngue, medetur: eruptiones papularum cum oleo, & sale sanat: viiliginēs, lichenēs, lentiginēs, vlcera capitis manantra, lepras, & furfures, cum melle eximit: cum thure, & teda decoctum, dentium dolorem lenat.

Ceparum  
Gires ex  
Gal.

Nomina.

leuat, si in ore contineatur: contra venenatos muris aranei morfus, cum ficulneis frondibus, & cumino illinitur. Feruescens comæ ius, sceminarum defesfionibus additum, menses, & secundos partus extrahit. Allium eiusdem gratia sufficit. Factum ex eo, & nigra oliua intritum, quod myrtoton vocant, esu cit vrinam, ora venarum patefacit, hydropicis vtile.

*Allij consideratio.*

ALLIUM vulgaris est notitiæ. Cæterum quanquam scribit Dioscorides Allium, quod non coherentibus nucleis, siue spicis, sed singulari, & folido capite constat in Aegypto nasci, eiusmodi tamen & in Heeruria, & in compluribus aliis Italiz locis provenit, ibique Allium mas appellatur. Allij meminit Theophrastus libro V. I. capite III. de plantarum historia, sic inquit. Allium ante solstitia, aut paulò post solstitia feritur nucleatum diuifum. Discrimen eorum, quòd aliud præcox, aliud ferotinum: est enim genus quoddam eiusmodi, ut sexaginta diebus perfici possit. Differunt præterea magnitudine singulari. Cyprium vocatum maximè tale est, quod non decoquunt, sed in myrtotis vntur: & cum rinditur, mirum quàm spuma increfcit. Quin & illud differentiam facit, quòd quædam non nucleis coagmenantur. Dulcedo autem, & odor, & crassitudo, eorundemque causa, tempore, cultuque penè videntur contingere, ut etiam aliorum. Perfici etiam semine potest, sed tardè: primo etenim ante caput accipit porri, sequente discerni in nucleos incipit, tertio redditur perfectum, nec quicquam deterius, sed etiam quidam vel depositio melius id existimant. Radices autem alij, aut cepæ haud similis ortus fole: alij namque cum nucleis extumuerit, tota intorquetur: & hinc aucta in nucleos rursus discernitur, atque ex vno plura efficiuntur, dum caput consummatur. At cepæ continuò ab radice aliud, atque aliud obducit, ut & bulbos, & scylla, & eiusmodi omnia. Etenim allia, & cepæ, si non euellantur, plura indies fiunt. Super fistula quoque, & allium capitari posse, & cepæ affirmant. hæc tamen Theophrastus de alio domestico. Sylvestre verò, quod Græci *ἀγροκόδοξ*, id est, anguinum allium vocant, ubique, in montibus præsertim, & collibus nascitur, nullis diuifum nucleis, satiuo longè minus, sed odore, & sapore illi persimile: foliis angustioribus, gracili caule: in cuius cacumine flos emicat, ex rubeo purpurascens, à quo nigrum gignitur semen. Hoc, cum aliquando in montibus legere vna cum aliis herbariis, nobis occasionem præbuit loquendi de errore detestando, in quo turpiter versati sunt Arabes, & eos secuti: quòd porri scordio herba, quæ trifraginem foliis æmulatur, de qua Andromachus, & Galenus intel-

tellerunt, allium sylvestre in pastillos theriacos addiderint, & in illius locum suffecerint, non minus vocabulorum vicinitate, quàm imperitia decepti, ut sequenti libro in scordij mentione (Deo fauente) latius explicabimus. Porro illud hic silentio non dissimulandum duxi, ne forte seplastariis imponat, quòd Brasauolus apertè falli deprehenditur libro suo de simplicium examine Romæ prius excuso, ubi sylvestre allium ampeloprasum, siue scorodoprasum à rei medicæ auctoribus appellari scribit. Quare in re non vno tantum, meo quidem iudicio, sed duplici, pace eius dixerim, notatur errore. Primum quòd existimauerit, allium sylvestre scorodoprasum, vel ampeloprasum esse. Deinde quòd certò crediderit, ampeloprasum, & scorodoprasum vnâ & eandem plantam esse. Hi Brasauoli errores manifestè redarguuntur Dioscoridis auctoritate. Siquidem is non solum eas plantas nominibus, sed etiam capitibus, & facultatibus distinguit: quem etiam secutus est Galenus, licet, ut in ampelopraso diximus, huic tribuerit, quòd scorodopraso tribuendum erat. In his igitur palàm fit, allium sylvestre ophiocorodum appellari: sylvestre porrum, quòd in vineis proveniat, ampeloprasum: tertium verò, quòd promiscuas alij, & porri facultates obtineat, scorodoprasum. Quare mirari subit Brasauolum virum alioqui doctissimum, quomodo is, qui simplicium medicamentorum examen conscripsit, hæc in Dioscoride, & Galeno non viderit, vel non animaduertit. *Ξηφύδος* Græci, Latini Allium dicunt: Arabes, Chaum, Cairin, & Thum: Itali, Aglio: Germani, Knoblauch: Hispani, Ayos: Galli, Ail, & Aux.

*Brasauoli error.*

*Nomina.*

SCORODOPRASVM.  
CAPVT CXLVII.



SCORODOPRASVM magnitudine porri æquat, qualitatibus porri, & alij participes. Vnde promiscuas sibi vires ex vtroque vendicauit, effectus alij, & porri præbens: inefficacius tamen. Coctum,

porri modo, dulcescit, & in olerum vicem transit.

QVONIAM antiquorum nullus, præter Dioscoridem, Galenum, & Paulum, Scorodoprasi meminit

*Allium sylvestre.*

*Archem lapsum.*



meminit, propterea existimat Marcellus arte, & cultorum mangonio ex allio, & porro in vnum sub terra colligatis, non autem natura, scorodoprasum provenire. Sed hac in re Marcellum, pace sua dixerim, errasse illud manifesto indicio est, quod compertum sit, legitimum Scorodoprasum natura, non mangonio factum, in compluribus Italiæ locis sponte sua nasci: ac inde postea translatum, in hortis, & viridariis depositum virefcere, ita vt inveniuntur legitimum se ostendat, & Marcelli errorem pro-

dat. Crescit id porraceis foliis, quæ digitis atrita ita allium, & porrum simul respiciunt, vt illorum etiam effectus præbent, quemadmodum rectè prodidit Dioscorides, & Galenus attestatur libro v 111. simplicium medicamentorum, his paucis. Scorodoprasum sicut gustu & odore mediam alij & porri qualitatem possidet, ita & vires. Id Græcè *σκολοδάσμος*, Latine similiter Scorodoprasum appellatur: Italicè, Scorodopraso: Germanicè, Aber knoblauch: Gallicè, Ail porreau.

SINAPI PRIMVM.



SINAPI TERTIVM.



SINAPI. CAP. CXLVIII.

SINAPI hortense, aliqui napi vocant. Eligi debet adustum, valde rufum, non magnopere siccum, sed quod fractum internè virefcatur, & veluti quodam succo madeat, cæsum colore: siquidem recens id genus, tempestivum

SINAPI SECVNDVM.



NASTVRTIVM.



habetur. Ad calfaciendum, extenuandum, extrahendum efficax est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur: cōtra præduros tonsillarum tumores, ac veterem, callosamque arteriæ scabritiem, succus ex aqua, & melle convenienter gargarizatur: sternutamenta





vulgò appellatur Formentone, caule tantùm ruber, non foliis, à nullòque pecude respicitur, sed ab omnibus auidissimè depascitur, nec vlla ex parte solum amulat. Porro sciendum est, Dioscoridis Erysimum non esse sylvestrem eru cam illam, quam nos nobilem appellamus, vt credit Hermolaus, icemque Ruellius ipsum secutus, sed stirpem esse, quæ passim in plateis, edificiorum areis, & ruderibus, & secus vias oritur, foliis erucæ. Floribus luteis, paruis: quibus cornicula prodeunt, tenuia, acuminatæque: semine nasturtij, minore tamen, & acri. Id Græcis *ἰσχυρὸν* dicitur, quod Latinis similiter Erysimum, & Irio: Italis, Erisimo, & Irione: Germanis, Hederich, & Vuilder seuß: Hispanis, Rinchaon: Gallis, Velar, ou de la tortelle.

*Nomina.*

PIPER. CAP. CLIII.

PIPER in India nasci, breui arbore traditur: quæ inter initia, prælogum fructum, veluti siliquam, promit, quod longum piper est: habet intus aliquid tenui milio simile, quod tandem in perfectum piper euadit. Id autem suis temporibus dehiscens, pandensque sese, racemos emittit, grana ferentes qualia videmus. Ea acerba candidum piper faciunt, aptum ocularibus remediis, antidotis, & medicaminibus, quæ contra venenata parantur, theriaca vocant. Longum verò vehementius mordet: & quoniam priusquam ematurescat, decerpitum est, subamarum relinquitur, antidotis, & theriacis medicaminibus expetitur. Nigrum verò, utpote quod tempestiua maturitate collectum sit, odoratum esse constat, candido suauius, acrius, & ori gratius, necnon ad condimenta vtilius. sed candidum, & adhuc in acerbū vergens, antedictis infirmius est. Eligi oportet grauissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens, ac minimè fursuosum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimento defecta, casta, inania, minimique poderis, quod vocant brasma. Vis omnium exalfacit, vrinam ciet, concoquit, extrahit, discutit, absterget caliginem, quæ oculis obuersatur. Piper febrium horroribus circuitu repetentibus, siue potu, siue illitu subuenit: serpentium moribus auxiliatur: partus extrahit: co-

ceptum adimere creditur, statim à concubitu suppositum: tussi, omnibusque pectoris vitiiis, siue eclegmate, siue potu succurrit: angina eo, & melle conuenienter perunguntur: potum cum recentibus lauri foliis, tormina discutit: cum vna passā manducatum pituitam à capite elicit: valetudinem tuetur, dolores finit, appetentiam mouet, concoctionem adiunat. ad intinctus esculentorum additum: strumas cum pice discutit: vitiliginis ex nigro emaculat. Fistili nouo, ¶ vt aiunt, motum torretur, Non est huius arboris radix gingiber, vt aliqui existimauere, sicuti paulò post ostendemus. Nanque piperis radix costo similis est, ora gustantium accendit, saluam ciet, Hæc lienem reprimat, cum aceto illita, aut pota: caput etiam purgat, manducata cum semine pedicularis herbæ, quam staphidem agriam vocant.

I. V S I T A N I nauigationibus suis hæc æuo *Piperis et pluræ tunc hysse.*

confectis per oceanum Atlanticum versus austrum primò, & hinc deinde in orientem ad Calicut, Taprobanam, aliisque Indici pelegi insulas: item Hispani liburnicis vesi ad occidentales Indias, Peru, atque alias complures regiones, quæ antiquos Geographos penitus latebant, non modò Piperis, & huiusmodi odoratis simplicibus vniuersam repleuerunt Europam, sed & stirpium historias, à quibus oriuntur, posteritatis memoriz proderunt. Quod postea fecit, vt nobis planè ignorasse videantur Theophrastus, Dioscorides, & Plinius, aut ob regionum distantiam (indigenam potius in hoc fidei fecuti, quam quòd fortè ea viderint, quæ de pipere scriptis tradiderit) aut ob aliā quāvis causam, plæræ illius formæ, ac notas, quæ piper in India gignit, ac quonā modo piperis plantæ suæ edat fructū, an scilicet racematum, an corymborū modo, an in siliquis inclusum, an baciferarum arborum more. Siquidem Plinius li. x i i. ca. v i i. ita scribit. Arbores quæ passim piper gignit, iuniperis nostris sunt similes. Quæquam in frõre Caucaus siliquis opposita gigni tantum eas aliqui tradidere. Semina à iunipero distant paruulis siliquis, quales in phasolis videmus. Hæc priusquam dehiscant, decerpant, tostæque sole, faciunt, quod vocatur piper longū. paulatim verò dehiscentes per maturitatē, ostendunt candidum piper, quod deinde tostum siliquis colore, rugisque mutatur. hæc Plinius. Quibus à Dioscoride nō longè dissidere videretur, nisi piperis plantam similem iunipero reddidisset, nam quæ Dioscorides nullis eā notis representauit, neque

*Plinij la- p/ur.*

CARYOPHYLLVM FLOS SYLVEST.

CARYOPHYLLVM FLOS AITILIS.



20

neque alicui similem fecit. Theophrastus præterea quanquā scriptum reliquit lib. 1 x. cap. x x i i. de plantarū historia, Piperis duo esse genera vnum rotundū, alterum oblongū, eius tamē arboris effigiem silentio præterit. At hi, qui suis liburnicis immensa traiecerunt maria, propriasq; perlostrarunt regiones, vbi piperis vniuersq; plantæ innumera virescunt, nigrum, ac rotundum gigni narrat à quibusdam Infrimis viticulis vicinas arbores altores complexu stendentibus, acutæ clematidi nō dissimilibus, folio tamen malum Assyrium æmulantibus. Quin & racematim profert vuarum labruscæ modo, confertius tamen, deinde mensē octobri per maturitatem decerpi, & sub feruenti sole tegetibus palmeis expansum torreri, quousque nigrescat, & rugosum euadat: quod tridui spatio plerunq; fit. Longum autē, vt iidem testantur, aliæ ferunt arbores, estq; velut nucamentum quoddam, exilibus granulis squamarum compactum, quod velut salus in pontica nuce, cui pulchre adspiculus, vermiculosa facie dependet, piperato gustu, nunquam tamen in album, vel nigrum piper coalescit. Galenus indigenam fidem, & Dioscoridē secutus, eandem plantam tam rotundum, quam longū piper edere credidit. Piperis fructum vidimus nos Neapoli, qui Lusitanorū descriptioni maximē respondere visus est, quod viticuloso caule effert, clematidis acutæ modo. Sed & aliā arbutulam piper racematim proferentem vidi Venetiis, quæ prorsus illius plantæ faciem exprimit, quam vulgus Ribē appellat. Viret hæc in horto clarissimi medici Maphæi à Maphæo, in quo plurima simplicita notatu digna visuntur. Quo fit, vt mirum non sit, si in piperis historia variant auctores. Quandoquidem cum variz in Italia piperiferæ habeatur arbutula,

Piperis  
plantæ in  
Italia.

Piperis fructus facile credendum est, varietatibus longē maioribus in India reperi. Piperis meminit Galenus lib. v i i i. simplicium medicamentorū, sic

inquiens. Piperis radix vires coslo similes potissimum obtinet. Porro fructus eius nuper quidem admodum germinantis, longum piper est: quare etiam maturo humidius est. humiditatis eius indicium est, quoddam facile repositum perforetur, ac non protinus mordicet, sed post paulo incipiat, verum pluscolum duret. Porro fructus, qui velut omphax est, piper album est, nigro quidem acrius. Nam illud iam quasi superassatum est, & superexiccatur. Verum utrunque valenter tum exalfacit, tum desiccatur. Ceterum quoniam Dioscorides inter simplicita de

CARYOPHYLLIS, quæ mihi piper in mentem redegit, nihil posteritatis memoria mandauit, cum ea ex eisdem asserantur regionibus, sintq; in præcipuo medicorum vsu, adeo præstantissimum, odoratissimumq; medicamentum, silentio non dissimulandum duxi. Prouenit igitur Caryophyllorum arbor in orientali plaga, quibusdam Indici pelagi insulis, nō longe à Badan. Huius caudex buxo similis est, eademq; materies. Folia verò cinnami vulgaris instar habet, sed rotundiora. Fructus est paruo, ex atro rufescente, in clauū modū capitato, exsertis in aduersum quatuor denticulis, sese stellatim decussantibus, prominulo apice, quadrati alucoli sinu medio umbilicatum prodeunte. Culiores arundinibus flagellant arborem, conftrato prius circumquaq; tegetibus palmeis solo. Caryophylli meminit Plineus lib. x i i. cap. v i i. his verbis. Est etiānnū in India piperis grani simile, quod vocāt Caryophyllon, grandius, fragiliusq;. Tradunt in Indico luco id gigni. Aduectum odoris gratia. Horum nusquam inuenio mentionem fecisse Galenū: rati metfi Serapio ex Galeni auctoritate plura de Caryophyllis tradiderit suo de simpliciū medicamentorum volumine. Quamobrem crediderim aut Galeni librum, in quo de Caryophyllis differunt, perisse, aut Pauli potius, quā Galeni testimonio de his scripsisse Serapionē.

Caryo-  
phylloris  
bist.

50

Nam de Caryophyllis prius Paulus iisdē, quibus postea Serapio, verbis tractauit, lib. v. i. i. ubi hæc habet. Caryophyllon, quasi dicas nucifolium, non eam habet substantiam, quæ nomine præteritur, sed ex India veluti flores cuiusdam arboris festuacei, & nigri sunt, longitudine ferè digitali, odorati, acres, subamari, calidi, & siccī in tertio propemodū ordine: qui multiplicis vsus sunt, tum ad obsonia, tum ad alia multa medicamenta. Caryophylli, vt scribit Serapio, iecinori, stomacho, & cordi auxiliantur. Concoctionem adiuuant, & alui fluxiones cohibent. Quinetiam eorum puluis quatuor drachmarū pondere cum lacte sumptus, venereas vires adauget. Exacuunt præterea, Auicenna auctore, oculorum visum, & eorum nubes, argemasq; exterunt. Atque hætenus de historia & viribus Caryophylli feminis aromaticis. Ceterū quoniam in Caryophylli nomen incidimus, hic non prorsus intactos relinquemus flores illos, qui ab odore similiter. CARYOPHYLLI, & Garofoli vulgo vocantur. Hi quidem non fuerunt, quod ego sciam, a veteribus cogniti, etsi nobis hodie sint adeo celebres, vulgares aq̃ue ac iuncti, vt superuacaneum putem & plantam, & flores eos describere. Quare satis fore duxi, si hoc loco eorum imagines duntaxat exhibuerim. Cū igitur duo sint eorum summa genera, nos primum Caryophyllum florem altileum seu sacrum, deinde slyestrem depingi curauimus, vt ex duplici effigie, quam damus, aperitè cognoscatur. Quod Græci *πινγκ*, id Piper Latini vocant: Mauritanis, Fulfel, seu Fulsul: Itali, Pepe: Germani, Pfeffer. Hispani, Pimienta: Galli, Poyure. Quod verò Græcis *αργύρεον* Latinis pariter Caryophyllum appellatur: Mauritanis, Carunfel, seu Charunfel: Barbaris, Garosulus: Italis, Garofano: Germanis, Naegel: Hispanis, Clauo de especia, sue Clauel: Gallis, Girofles.

† Ex Græcis vulgaris codicibus aliqui hoc in loco scriptum habent. *de piper*, quod sonat, vt dicunt: alij verò *de paxi*, id est, vt lenticula. Vnde etiam ex interpretibus alij hanc, alij illam secuti sunt lectionem. Oribasius verò nec hoc, nec illud legit: qui præterea alia multa & hic, & alibi non deferibit, quæ fortasse non temerè quis illegitima iudicare possit.

#### GINGIBER. CAP. CIIII.

GINGIBER sui generis planta est, in Troglodytica Arabia magna ex parte nascent. Quæ virente ad multa, perinde atq; nos ruta, vtuntur, & primis potibus, & eduliis admiscet. Multis radices, cyperi modo, parua sunt, can-

dicantes, & odorata, atque piper sapore imitantur. Eligi debent, quæ teredines non nouerunt. A multis tamen ob id condiuntur, quòd celeriter cariem sentiant: & fictilibus in Italiam aspottantur. Ginger cibo conueniens est, & cum condimento assumitur. Excalfactoriam vim, & excoquentem habet: aluum leniter emolli: stomacho utilis est: efficax aduersus ea, quæ oculis caliginem offundit, in antidota addi solet. In summa, piperis viribus respondet.

GINGIBER (vt referunt Lusitani, *Gingiber*, qui plurimum se vidisse fæcentur in India) *ra- ris hisse.* dix est, quæ geniculatis repit internodiis, foliis arundinaceis, quæ bis, terve in anno reuiuiscunt, ac reirescunt, sed quæ in cacumine falligiantur graminis amplitudinem non excedere aiunt, nec quicquam in ea regione frequentius inueniri. Subdunt nonnihil subesse discriminis in sapore cū præcox eruitur. Opportunum demerendi tempus, cū folia inauerint, alioquin & teredini obnoxium est, & carie tentatur. Eruiturque nonnunquam eius radix libræ pondo. sed non omnibus eadem est amplitudo. Plus in profundum non agitur, quam ad ternos, quaternosve palmos. Cū eruitur, radices internodium in serobe fossiores relinquunt, terræque illi aggerunt, ceu eius radices semen, proximo anno eruturi fructum, id est, regerminatas radices. Aduchitur ginger in Italiam copiosum ex Calecut magno Indiæ emporio, atque ex Troglodytica Arabia non solum tractu temporis exiccatum, sed & siccharo recentissimum asseruatum, vel quodam mellis genere, quod quibusdam è siliquis exprimit. Id sane longè magis Venetis præstat: cū hoc officinarum mangonio ex aridis fist radicibus longo tēporis tractu modò accerrimo lixiuio, calce, quernōque cinere parato, modò muria, modò dulci aqua mace-ratis, & edoniis, quibus non modò odor deperditur, ac euanciscit, sed & sapor, & acrimonia subtrahitur. Illud verò cū statim è terra effossum nulla ferè maceratione condia-tur, vires & facultates non exuit, sed eas seruat. Quamquam Brasuolus non rectè, meo quidem iudicio, velle videtur, quòd Venetis mangonizatum Ginger gustantibus plus acrimonia relinquit, quam illud, quod recentissimum in India siliquarum melle, aut siccharo conditum asseruatur, & cum aliis aromatum generibus ad nos conuehitur. Quod quantum à veritate, & ratione dissonet, iudicare poterunt, qui diu in myropolli ver-

*Brasauoli error.*

*Gingiber* facit, rem omnino exploratam habent. *Gingiberis* vires memoriam prodidit Galenus lib. v. i. simplicium medicamentorum, sic inquit. *Gingiberis* radix utilis est, quam vtrique ex Barbaria ad nos conuehunt. Excalcificat potenter, sed non primo statim occurſu, velut piper: unde sane & minus esse subtilium partium, quam piper, existimandum. siquidem in tenues solueretur partes, & celerissime actu vt illud fieret calidum. Apparet enim illaborata, & crassior adhuc quædam ei inesse substantia, nec ea secca, & terreſtris, sed humida potius atque aquea. Quo fit, vt facile perforetur, cum scilicet recrementitia inſit humiditas. Neque enim quicquam eorum, quæ aut planè secca sunt, aut humida, sed eleboratam, & familiarem continentia humiditatem, huic vicio obnoxia sunt. Idè viſu venit piperi logo. Atque hinc est, quòd diutius perseuerat, quæ proficiscitur à gingibere, aut piperi logo caliditas, quam quæ ab albo, aut nigro. Nā sicut ab aridis calamis flama simul celerissime accenditur, & vnde quasque dispergitur: eundè in modum, quæ à siccis potestate medicamentis editur caliditas. At quæ prodiit ab humidioribus, ceu ligna sunt viridia, & tardius accenditur, & durat diutius. Ex quo fit, vt vtriusque medicamenti diuersus fit viſus. Vtriusque vbi totum corpus celeriter excalcificare consiliū est, ea tunc exhibenda sunt, quæ & celeriter à coloris nostri contactu incalſcant, & celeriter quoque ferantur. Verum vbi partem quamuis refrigeratam recalcificare studemus, contrā agendum, nimirum quæ tardè caleſcentia plurimo tempore perdurent, ea offeruntur. Ceterum licet gingiber, & piper album hac ratione à nigro pipere differant, non magna tamen est differentia. At nasciturum, napi, thapsi, & agrestium columbarum stercore maiori tempore perfecte accenduntur, & plurimo tempore perdurant. hactenus Galenus. Faciem gingiberis repræſentat radix illa, quam Mauritan, & officinæ ZEDORIAM appellant, odoratum, odoratum tamen, amariſcula, neque adeò vt gingiber acris. Huius aſumam, quod ſciam, meminere veteres Græci, est recentiores ab Arabicis edocti, nempe Actius, & Actuarius eam ſuis medicamentorum compositionibus admiscant. Zedoaria (vt capite c l x x i i. testis est Serapio conuehitur è Sinarum regione vltra extremas Indiar oras. Excalcificat, & sic ordine ſecundo. Flatus diſcutit, & pinguedinem auget propria quadam facultate, non quidem elementari. Poſt ſumpta grauæ virus animæ, quod allium, cepa, vel vinum excitauit, abigit. venenosoꝝ animalium morſibus opulatur: alui fluxiones ſiſtit, vteri abſceſſus reſoluit, vomitiones reſtat, & coli cruciatus tollit, itemque ventriculi. Alui tineaſ quaſcunque enecat, & in antidotis additur. Ideoque dixit Auicenna, nihil eſſe ea preſtantius ad ebili-

*Gingiber*  
vires  
en Gal.

*Zedoaria*  
hister. &  
vires.

tum napellum. Non deſunt, qui crediderint, quòd ARNABO, de quo ſcribit Paulus, & Arnabo Mauritanorum zedoaria vnum, & idem referant medicamentum. Verum Serapionis teſtimonio capite. c l x x i. Arnabo apud Græcos nihil aliud designat, quam Zetumber apud Arabes: quippe quòd hoc loco de zetumber eadem ſcribat Serapio, quæ de arnabo ante ipſum adnotauit Paulus. Eſt autem Arnabo, vt ex Serapionis authoritate memoriam prodidit Iſach, arbor procera, in oriente proueniens: foliis longis, colore viridi, in luteum languenteſcente, ſaliſci modo, ſicuti & ramorum cortex. Infrugifera eſt, citreum odorem ſpirans. Quibus facile patet, arnabo non modò zedoariam non eſſe, ſed nec in Europam ad nos aduehi. Quo fit, vt Cordus aberrante deprehendatur: quippe qui zurumber zedoaria genus exiſtimet. Hunc forſſe ſecutus Fuchſius medicus doctiſſimus, in libro de compositione medicamentorum, quem locupletatum nuper edidit, non ſine magno errore putat zurumber & zedoariam idem eſſe. Qui non minus in Arnabo quoque erraſſe cognoviſcit, quòd velit Doronicum orientale id eſſe, quod Paulo Arnabo, atqui res hac aliter ſe habet, vt ex antè dictis ſatis colligi poteſt. Hallucinetur etiam hac in re Bruſſellius: quòd is ſcripſerit ſuo de medicis vocabulis onomaſtice, quòd arnabo vnguentem eſt odoriferum. Verum eius lapſus non aliam cauſam fuiſſe arbitror, quam quòd oſtenderent Paulum legerit: nam Paulus apertiffimè aſſerit, Arnabo vnguentis expeti, quòd ſuauius oleat, non autem vnguentum eſſe, vt Brunſellius ſomniſſe videtur. Id *zyſſipe*, *zyſſipe*, & *zyſſipe* Græcè, quod item Latine Zingiber, & Zingiber nominatur: Arabicè, Lègibel, ſeu Zingiber: Italicè, Gengenio: Germanicè, Ingber: Hiſpanicè, Gengiure: Gallicè, Gingimbre. Quod vero *ſeida*, *ſeida*, & *ſeida* poſterioribus Græcis, Zadura, & Zedoaria Latinis pariter & Italis appellatur: Germanis, Zituen: Gallis, Cretomart.

*Cordi*  
*Chy*  
*Brunſellius*  
*ſy error.*

*Nomina*

## HYDROPIPER.

## CAP. CIV.

HYDROPIPER apud aquas naſcitur, quæ ſtagnant, aut pigro lapſu reſunt. Caulẽ edit genicularum, ſolidum, multis aliſ concaum: folia mentha, maiora, molliora, candidioraque, guſtu piperis, acri, citra tamen vllam odoris gratiam: fructum acrem, in ſurculis paruis, prope folia racematim coherentem. Folia cum ſemine illa

lita tumores, veteresque durities dis-  
cutiunt, sugillata delent: quæ post-  
quam inaruerunt, tusa pro pipere in ob-  
soliis admiscuntur. Radix parua, nul-  
lius in medicina vsus.

*Hydropi-  
peris confi-  
deratio.*

## HYDROPIPER.



*Ruell. lag.*

*Ruellij la-  
psum.*

TAM ET SI pro-  
virili parte conten-  
dat Ruellius, vt nō  
minus doctis, quā  
elegantissimis ver-  
bis comprober, eā  
non spernendam  
suspem, quam vul-  
gus officinarum  
Eupatorium appel-  
lat, legitimum esse  
Hydropiperis tam-  
en hac in re aper-  
tē hallucinari de-  
prehenditur, quan-  
vis alioqui fuerit  
non modo in me-  
dici materia peri-  
tus, sed & Latinis,  
& Græcis literis  
apprime doctus. Si

quidem Dioscoridi Hydropiper folia edit men-  
tha maiora, molliora, candidioraque, gustu pi-  
peris, acris, citra tamen vllam odoris gratiam: nō  
autem amaro sapore, vt Ruellius ait, Dioscori-  
dis verba peruertens, quō facilius suam astruat  
sententiam. Vulgare verō Eupatorium foliis  
crescit cannabinis, duris, hirsutis, amaro gustu,  
non quidem acris, vt piperis: quin etiam adeo o-  
doratis, vt hac de causa herbam esse viribus in-  
signem, quanvis ab antiquis silentio prætermis-  
sam, semper existimauerim, cū tamen odoris  
fragrantiam in hydropipere reperiri neget Dio-  
scorides. Præterea hydropiperi caulis inest ge-  
niculatus, solidus, à foliorum, & adnatorum ex-  
ortu alis plurimiconcauim: semine etiamnum  
acris, in ramificalis prope folia racematim cohe-  
rente. Pseudo-eupatorio verō caulis est proce-  
rus, minimè geniculatus, in cuius ramis nullum  
apud frondes racematim coheret semen: sed  
in cacumine flores gerit subrubentes, qui diuisi  
muscarij facie, syluestris orisani modo, per ma-  
turitatem in papposeuantescentē quibus semen  
prodit amarum totius plantæ sapore, quicquam  
esse hoc acrimonia præditum non rectè Ruel-  
lius asseueret. Qui quoniam vulgare Eupatoriū  
plerumque in aquis oriri conspexerit, id om-  
nino legitimum esse Hydropiper pro certo as-  
serere non dubitauit, nulla prorsus habita ra-  
tione, an aliæ inter se responderent notæ. Quā-  
obrem, vt ex dictis rationibus clarissime pa-  
tet, Ruellius hac in re non ita maturè mihi vi-  
detur sensisse, vt eius clara doctrina, ingenique  
præstantia exposcere videbatur. Quandoqui-

dem cū vulgare hoc Eupatorium primo sta-  
tim occurssu gustui amorem relinquat haud-  
quaquam obscurum, facile hinc iudicium con-  
sequi potuisset, hoc non esse hydropiper, quo  
vnā cum sale in ciborum condimentis piperis  
vice prisca ætas utebatur: nam quæ amara sunt,  
præterquam quod piperis vicem explere mini-  
mè valent in cibis addita, ab omnibus respuun-  
tur tanquam naturæ inimica. Cæterum si in  
Italia Hydropiper nascitur, illa meo quidem  
iudicio est persicaria ( vt vocant ) species, quæ

## PERSICARIA.



*Quæ Per-  
saria sit  
Hydropi-  
per.*

hanc opinionem corroborat, quod prope ita-  
gnantes aquas hæc planta plerumque virefcet,  
vbi eam Dioscorides nasci testatur. Meminit  
Hydropiperis Galenus libr. v. 11. simplicium  
medicamentorum, sic inquit. Hydropiper  
à locis, in quibus nascitur, & à similitudine,  
quæ illi cum pipere in gustu est, nomen sortit-  
um est. Cæterum calidum est, sed non tan-  
tum, vt piper. Attamen herba ipsa etiamnum  
viridis cum semine, cataplastmati in modum im-  
posita, sugillata, & tumores induratos digerit.  
Herba, quæ Græcis à *Aperuimus*, Latinis similiter  
Hydropiper vocatur. Italis, Hidropepe, & Pe-  
pe aquatico: Germanis, Vasser pfeffer, & Mu-  
cken kraut: Hispanicè, Hierua pexiguera sin  
manchas, Gallicè, Curage.

*Hydropi-  
peris Gal-  
ex Gal.*

*Namini.*

## P T A R M I C A.

## CAP. CLVI.

P T A R M I C A exiguus frutex est, sur-  
culos habens paruos, multos, & rotun-  
dos, abrotonon non dissimiles: & circa  
eos folia olea, longa, multa: & in cacu-  
mine capitulum, vti anthemidis, par-  
uum, rotundum. quod suo acris odore  
sternutamentum excitat: vnde nomen  
accepit.



accepit. Folia cum floribus illita, suffragillationes rapiunt. Flores sternutamenta efficacissimè mouent. Nasctur in montibus, & petrosis.

*Parmica historia.*



**P**TARMICA in Hetruria frequentissima provenit. Nasctur in Tridentino, agro, præsertim Ananienſi tractu, furculis frequentibus, parvis, rotundis, abrotino non diffimilibus: è quibus plurima prodeunt folia incana, oleæ modo oblonga: unde & Oſiella à multis vulgò nominatur. Gerit in furculorū capitulis, chamæmel

li deflorentis, modo: cui quemadmodum & herbæ, vis quædam adeo acris ineſt, vt olfactu ſtatim ſternutamenta exciter. Rarè poſtea ex Parmica ſcopas, quibus pauimenta verruntur, conſciunt, nec in alium colligunt uſum. Huiusce meminit Galenus libro v. 1. 1. ſimplicium medicamentorum, in his verbis. Parmicæ flores ciendæ ſternutationis vim obtinent: eſt enim temperies eius calida, & ſicca, viridis etiãnum ordine ſecundo, ſiccata tertio. Eius nomen Græcum *αſαμιν*: Latinum item Parmica, & Sternutamentaria: Italicum, Parmica.

*Parmica vires ex Gal.*

*Nomina.*

RADICULA, SEV IANARIA.  
HERBA. CAP. CIVII.

**S**TRUTHIVM herba vulgò nota: qua purgandis lanis vtuntur, qui eas eluunt. Huius radix eſt acris, urinam ciet: prodeſt tuſſi, iocinerofis, orthopnœæ ex melle ſumpta, cochlearis manuſuræ: alium ſoluit. Eadem cum panace, & capparidis radice, calculos frangit, & cum urina exturbar: duriciam lienis abſumit: menſes impoſita trahit: partus efficaciter enecat. Cum polenta autem, & aceto illita, lepras tollit: tubercula diſcutit, cum farina hordeacea, & vino decocta. Miſcetur & mala-

gmatis, & ocularibus collyriis, claritatis cauſa. Sternutamenta mouet: per os purgat, trita cum melle, & naribus inuſa.

*Struthij conſid.*

**S**TRUTHION, ſeu Radicula, adeo olim vulgaris notitiæ fuit, quòd purgandis lanis ea vterentur, vt Dioscorides eam notis vliſ re præſentare ſuperuacaneum duxerit. Sed cum tractu tēporis huius exoluerit uſus, eius quocumque notitiæ ſimul abolita videatur. Quo ſic, vt arduum ſit nobis nūc diſiudicare, quēnam plantam Italij Struthion iure dici poſſit. Mauritanij, & officiis Condiſi ea nominatur, quam illi frequenter medicamentis admiſcent, quibus naribus inditis ſternutamenta ciunt. Nec propterea uſquam in officiis reperitur, quanuis medicorū compoſitionibus ſæpius inſertatur. Quamobrem aſſerere non auſim, an Struthion naſcatur in Italia: quippe quòd haſtenus ipſum non modò non viderim, ſed neminem, qui illud cognosceret, & offenderet, adinuenerim. Theo-phraſtus inter folio aculeatas ſtruthium habet libro v. 1. cap. 1. 1. de plantarum hiſtoria. Plinius libro x. 1. cap. 1. 1. his verbis ſtruthium deſcribit. At quæ vocatur Radicula, lauandis demum lanis ſuccum habet: mirum quantum conferens candori, inollitiæque. Aequè naſcitur ſæuia vbique, ſed ſponte præcipua in Aſia, Syriacæ ſaxoſis, & aſperis locis. Trans Euphratem tamen laudaiſſima, caule ſerulaceo, tenui, & ipſo cibus indigenarum expetito, & tingenti quicquid ſit, cum quo decoquat: folio oleæ, ſtruthion Græci vocant. Floret aſtate, grata aſpectu, verum ſine odore, ſp̄ noſa, & caule lanuginoso. Semen ei nullum. radix magna, quæ conciditur ad quem dictum eſt uſum. Struthij vires adnotauit Galenus libro v. 1. 1. ſimplicium medicamentorum, ſic in-

40

*Struthij vires ex Galeno.*

quens. Struthij radice poſſiſſimum vtimur, vt pote guſtu acris, & calida, ſiccaque tēperamento, ex quarto quodammodo ordine. Sed & aſtergiſcit, & irritat: proinde quoque ſternutatio-nem prouocat, cetera omnia, quæ calida ſunt temperie, & guſtu acris. Ex his omnibus palam ſit Fuchſium virum alioqui doctiſſimum, in hoc erraſſe, quòd in ſuis de ſtirpium hiſtoria clariffimis commentariis, plantam vulgò Saponariam vocatam legitimum Struthium eſſe ſe cenſeat, eamque pro Struthio deſignat. Hæc enim folio plantaginis exit, non oleæ, læui, non aculeato: caule geniculato, non lanuginoso: guſtu potius inſipido eſt quàm adeo acris, vt quartum excaſſicientium ordinem attingat. Quæ herba *αἰνόν* Græcè, Struthiū, Radicula, & Herba lanaria Latine dicitur: Arabice, Condes, Chundes, ſeu Kunder: Barbare, Condiſi: Italicè, Radicetta, & Herba lanaria, Gallicè, herbe aux Foulons.

*Fuch. lanaria.*

*Nomina.*

CYCLAMINVS.  
CAP. CLVIII.

CYCLAMINVS folia habet hederæ, purpurea, varia, in quibus supra infraque  
10 albicant maculæ: caule nudo, quaternos digitos æquante: floribus in eo purpureis, rosarum effigie: radice nigra, & aliquantum lata, utra-

pum videri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam, aquamque detrahit, menses potu, appositivè ciet. Tradunt, si pragnans radicem transfrediatur, abortum fieri, partum appèsa accelerat: contra venena, præsertim leporis marini, ex vino bibitur: illita contra serpentium ictus remedio est: immista vino inebriat: regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo, aut diluto mulsio. Sed oportet etiam qui ebibit, multis vestibus cinctum, loco calido, & a perfrictionibus tuto, recumbere, quod facilius exudet: eiectionem sudores sellei colore innuuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur: ad deiicienda quoque alui excrementa, in vellere fedti subicitur: illito umbilico, & imo ventris coxarum tenuis, alium emollit, & abortum efficit: suffusionibus, & rebus oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. medicamentis abortum inferentibus admiscetur. Succus cum ace to illitus, prociduum sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat, eruptiones papularum reprimat: vulneribus ex aceto per se, aut cum melle medetur, lienem absument, viria cutis in facie, & alopecias emendat, Eius decocto luxata, podagras, & capi-

tis ulcuscula, pernionesque foueri congruum est: ipsaq; in oleo vetere feruefacta, illito oleo ulcera cicatricem perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenicæ ceræ momento, ut strigmenti crassitudinem vuguentum contrahat, cum primis vtile pernionibus. Radix, scillæ modo, concisa reponitur. Narrat, ad amatoria assumi cotusam, & in pastillos diuisam, nascitur in vmbrosis, maxime sub arboribus.

ALTERA CYCLAMINVS.  
CAP. CLIX.

EST ET altera cyclaminus, quam cissanthemon, aut cyssop hyllon vocat: foliis hederæ, sed minoribus: geniculatiscanibus, crassisque, circa vicinas arbores, capreolorum modo se voluentibus: flore candido, odorato: acinis hederæ mollioribus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice super vacua. nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ vnus pondere poti, cum vini albi cyathis duobus, quadraginta diebus, lienem per vrinam, & alium absument: ad orthopnoceam bibitur: reliquias à partu purgat.

TAMETSÌ Cyclaminus prima quæ vulgo Panis porcinus dicitur, planta sit vulgaris notitiæ, secundam tamen hucusque mihi videre non licuit in Italia: quanquam asserit Ruellius, hanc illam esse stirpem, quam herbariorum, & officinarum vulgus Sigillum sanctæ Maræ vocat. Et cum plures sint herbe, quæ ab imperitis eo nomine appellantur, polygonatum scilicet, Serapionis fecalæ, & cetera, quæ hydroperipery similis est, harum Ruellius nullam esse Cyclaminum putat, sed aliam ab his longe diuersam, cuius facies, ut ipse delineat, nihil aliud representare videtur, quam vitem nigram à Dioscoride libro quarto descriptam, quam nos in Hetruria vulgò vocamus Tamaro. Hanc scribit ipse Sigilli sanctæ Maræ nomen sibi assignisse, quod cum Mauritanii Bothomarieni nominent. Quia in re Ruellius, eius pace dixerim, aperte tantur: quandoquidem tota Mauritanorum familia primum tantum genus, non autem alteram Cyclaminum Bothomarieni nuncupat. Cyclamini primi generis duæ (vt Mesues auctor est) reperiuntur species, maior, & minor. Hæc radice provenit parua, nucis auellanz, cicurumq; magnitudine. Illa verò magna constar radice, in rapi modum exuberante, pullo colore: quæ (vt diximus) vulgaris admodum est, & passim

Cyclami-  
ni conside-  
ratio.  
Ruell. la-  
pser.

Cyclami-  
ni genera.  
& Cret  
ex Mes.

& passim in syluis, & vmbrosis nascens. Minorē vidi ego in agro solum Tridēino in vallis Ananiæ montibus, vbi copiosa nascitur. Cyclaminus (vt idem Mesues memoriæ prodidit) tam hausta, quàm clystere infusa pituitam viscosam mirifice detrahit. Coli cruciatus tollit à pituita progenitis, aut ab induratis excrementis. Succus in erinis additur ad expurgandum cerebrum, quòd diuturnos finiat capitis dolores, frigidisque conueniat hemicranieis. Item resolutis opitulatur, ac omnibus cerebri, & nervorum affectibus à frigiditate proueniētib. Cyclamini meminit Galenus libro VII. simplicium

Cyclami  
vires  
ex Galeno.

DRACUNCVLVS MAIOR.

DRACUNCVLVS MAIOR.  
CAPVT CLX.

DRACUNCVLVS maior in vmbrosis circum septa gignitur. 40  
Caulē habet rectum, lauem, dūm cubitorum, baculi crassitudine, versicoloribus draconum maculis, purpureis tamen euincentibus: folia rumicis, sibi inuicem implicata. Fructum summo caule facit, racemofam, coloris primū cineracei, mox per maturitatem in crocum, & 50  
purpuram vergentis: radicē prāgrandem, rotundam, candidam, cortice tenui vestitam, Colligitur, dum maturefcit, & succus exprimitur, siccatūque in vmbra. Radix quoque messibus effoditur, elotāque particulatim conciditur, & funiculo transfixa siccatur in vmbra. Vis ei calfaciendi cum diluta vini potione. Crudam, coctāque cum melle delingi prodest contra ortho-

medicament. vbi ita scribit. Cyclaminus varias vires obteinet: nam & abstergit, & incidit, & ora venarum aperit, & aurahit, & digerit. Clarum verò id est ex particularibus operibus. Adeò vehemens eius facultas est, vt abdomine illto, ventrem subducāt, & foetum interimat. Kva. i. m. i. herba sic Græcis, Latinis quoque Cyclaminus, & Rapum terræ vocatur: Mauritania, Buchormarien, Buthermarien, seu Borthormaria: Barbaris, Cyclamen, Panis porcinus, & Arthamita: Italis, Ciclamino, & Pan porcino: Germanis, Schueinbro, Erdapfel: Hispanis, Pan de puero: Gallis, Pain de pourceau.

Nomina.

DRACUNCVLVS MINOR.



pnceas, rupta, conuulsa, tussim, & defillationes. pota cum vino venerem stimulat: vlcera, quæ cacoethe vocantur, atque phagedanica expurgat, præsertim cum vite alba. ex ea, & melle collyria ad fistulas, & partus euocādos componuntur. ad vitilignes cum melle, efficaciter illinitur: polypos, & carcinomata absūmit. Succus ad oculorum medicamenta, item contra nubes, caliginem, albuginēque effectum præbet. Herbarū, radicisque odor teneros conceptus abortu viriat. item si triginta grana eius in posca bibantur. Sunt, qui eius succum cum oleo, aurium doloribus infudere: quinetiam folia, vt-pote quæ adstringant, vulneribus recentibus imposuere, & cocta in vino pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicem exemerit, posse à vipera feriri insiciantur.

DRACUNCULVS MINOR.

CAPVT CLXI.

DRACUNCULVS minor folio confat hederaceo, magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali, versicolore, maculis resperso purpureis, ita vt anguem planè referat, baculi crassitudine: fructus fummo caule racematim cohaeret, colore primum herbaceo, & cum ematuruit, croceo, gustu feruens, mordaxque: radice aliquantulum rotunda, bulbosa, aro non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus vmbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat: naribus etiam ex lana impositus, poly-pum absumit: carcinomata illitu sistit: triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt. Odorem aiunt, postea quàm flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix excalfacit: orthopnoeas, ruptis, vulsis, tufis, defillationibus auxiliatur: humores pectoris excreatu faciles reddit, siue cocta, tostataque cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur. vrinam pellit, venenem excitat, cum vino pota: phagedanas vlcera, & quæ cacoethe vocantur, trita cum melle, & bryonia alba expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipsa ad fistulas, & eiiciendos partus fieri solent, qui radice sua manus perfricuerunt, à viperis feriri negantur: illica ex aceto vitilignes emaculat. Folia recentibus vulneribus linamentorum vice, conuenienter imponuntur: decocta in vino pernionibus apposuisse prodest. Cafens foliis inuolutus, à putredine defenditur. Succus radicis ad nabeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cocta, crudave, ad sanorum vsus, pro oleo recipitur. In Gymnæsio insulis, quæ Baleares vocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiuijs placentarum loco offerunt. Radix melsibus effoditur, lotaque frustatim concidi-

tur, & lino traiecta, siccatur in vmbra, & ita reconditur.

LICET in vetustis quibusdam Dioscoridis codicibus maioris, minorisque Dracunculi historia speciatim diuisis capitibus annotata reperitur: attamen cum altera ab altera parum diffidere videatur, cumque etiam Galenus, Paulus, & Serapio, qui in simplicium materia Dioscoridem ad vnguem secuti sunt, eiusque dicta bona fide retulerunt, vnus tantum Dracunculi meminerint, non ab re credide: e recentiorum nonnulli, horum alterum ex alterius auctoris officina prodisse, & altius curiositate hic historia Dioscoridis accreuisse. Quamobrem ego quoque cogor eisdem adductis rationibus, aliquatenus in eorum ire sententiam, quanquam ingenuè fateri possum, me vtrunque Dracunculum Tridenti, ac Venetiis vidisse. Alterum quidem, qui maior est, ar, siue rumicis foliis, sibi inuicem implicitis: caule bicubitali, baculi crassitudine, versicolore, maculis in purpuram nigricantibus resperso, adeo vt angui similis videatur. Alterum verò, qui & minor, & omnibus vulgaris est, foliis hederaceis, albis, quibusdam maculis confpersis: caule, ac fructu maiori similibus. Quippe quod longam ex se vaginam emittat externa parte herbaceam, interna verò nigricanti purpura infectam, è cuius medio corniculum profluit purpurascens, à quo demum racemosum oritur semen (vt Dioscorides inquit) cinereo primum colore, per maturitatem verò auro rufescente. Quineriam in cæteris totius plantæ notis, à maioris Dracunculi historia nihil ferè differe cõspicitur. Quapropter etsi prædictæ recentiorum sententiæ non ausim refragari, quod rationibus satis euidentibus nitatur, & doctissimorum consensu confirmetur, cum tamen sepius maiorem & minorem Dracunculum viderim, non proorsus alienum esse mecum quandoque cogitavi, si quis suspicetur duo vt sunt dracunculi genera, à Dioscoride fuisse duplici etiam historia representata. Hanc quoque illi suspicionem augere poterit Plinius, qui non tantum duas, sed quatuor enumerat Dracunculi species libro x x i i i . cap. x v i . si inquires. Id autem quod Græci Dracontion vocant, triplici effigie mihi demonstratum est, foliis betæ, non sine thyrso, flore purpureo. hoc est simile aro. Alij radice longa, veluti signata, articulosque monstrare, tribus omnino cauliculis. Tertia demonstratio fuit folio maiore, quàm cornus, radice arundinacea, totidem (vt affirmabant) geniculæa nodis, quot haberet annos, totidemque esse folia. Quartum verò generis memin'it ipse in sequentibus libro x x v . capite i . i . cum inquit. Eadem Lusitanæ prouinciæ cognoui in agro hospitis nuper ibi repertum dracunculum appellatum, caule pollicari crassitudine, versicoloribus purpurarum maculis, quem ferebant contra omniū morsus esse remedium. Alij sunt, quos in priori

*Dracunculi color con-sideratio.*

*Dracunculi species ex Plinio.*

volumine eiusdem nominis diximus: sed huic alia figura. Aliudq; miraculum exeuntis è terra ad primas serpentium vernationes bipedali ferè altitudine, rursusque cum iisdem in terram se condentis: nec omnino occultato coapparet serpens. hæc Plinius. Huc etiam accedat Theophrasti auctoritas, qui libro v. i. cap. x. i. de plantarum historia secundum dracunculi genus inter alia genera cõstituit, his verbis. Dracunculi autem radix (sunt enim qui genus quoddam ar. dracunculum appellant, quod eius caulis varietatem habeat quandam) cibo inepta penitus est, & medicis tantum comoda. Ex his igitur, & Plinij verbis perspicuum omnibus fieri puto, plura esse Dracontij, sive Dracunculi genera, ut etiam Venetiis oculata fide comprobari potest in horto clarissimi medici Maphæi à Maphæo, ubi præter Arum duo virent astate Dracunculi genera. Dracunculus, ut Galenus testatur reliquit libro v. i. simplicium medicamentorum, quiddam Aro persimile obtinet, tum foliis, tum radice, cete-


gare, non quòd deiciat, id agere intelligunt, sed quòd obstructions aperiat, crassam pituitam attenuet, & vasa detergat. Ab omnibus his forma maximè differt *HORTENSIS* *Dracunculus hortensis.* Dracunculus, quo in acetariis vescimur, vtmurque ad instinctus acerrimo gustu, folio oblongo radicibus humi repentibus, graminis modo. Sunt qui asserant hanc plantam cultorum mangonio factitiam esse, & non sui natura prouenire: eam siquidem nasci putant lini semine excavatis cepis imposito, ac deinde terra recondito. Sed hos falli crediderim, quòd factio periculo, operam quidam perdidissent. Huius nec Græci, nec etiam Mauritanij, quod sciam, meminere. Verùm perpenla eius acrimonia, qua maximè linguam vellicat, eorum esse medicamentorum, quæ valentissimè excalfaciunt, facile conici potest. Habetur præterea & alia herba, quam inter Dracunculi species, quidam recensent, quòd *LINGVA* Serpentina nonnullis dicatur, etsi non desint, qui Lucciolam, & Argentinam ipsam appellent. Nascitur hæc *glossa.*

*Dracunculus virens ex Gal.*

*Lingua serpentina, sine Ophio.*

DRACUNCULUS HORTENSIS.

OPHIOGLOSSON.



rùm illo tum acrius est, tum amarius: ac proinde calfactorium magis, & tenuioribus partibus. Habet etiam leuem quandam adstrictionem, quæ quandoquidem cum prædictis duabus qualitatibus, acris scilicet, & amara, coniuncta est, medicamentum factum est vtiq; maximè efficax. Nam radix viscera omnia expurgat, crassos potissimum, & lentos succos extenuans: optimūque remedium est contumacium vlcerum, quæ *kanthar* nuncupant. hæc Galenus. Cæterum de Dracunculo differens Mesues inter cætera simplicia medicamenta, quæ deiectionia vi pollent, scripsit, eo hausto deieci è corpore pituitam. Qua in re à Manarido acriter reprehenditur: quippe quòd vbi dixerit Galenus, ac etiam Paulus ipsum secutus, Dracunculum omnia corporis viscera expur-

in pratis, sed ocysimè deperditur. Proflit enim mense maio, sed cum terricina sit, paucò post tempore euania flaccescit, ac subinde nusquam apparere. Mixta vnum tantum folium, pingue, plantagini aquaticæ vocatæ haud dissimile, & cuius inferiore sinu cauliculus exit, pallidam serpentis ligulam in cacumine gerens: vnde Græcorum voce OphioGLOSSON nomen inuenit. Præstat hæc maximè ad recentia vulnera glutinanda. Quo fit, ut eam quidam mirifice extollant ad enterocelas. Maceratur in oleo, quo vtuntur chirurgici ad prædictam felici (vt aiunt) successu. *Δρακύντιον* quod Græci vocant, Latinis Dracunculus appellatur: Arabibus, Luf, & Alluf: Italis, Dragonæ: Germanis, Natter vurtz: Hispanis, Taragontia: Gallis: Serpentine.

*Namina.*

ARVM. CAP. CLXII



ARON, apud Syros luphavitatum, folia emittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: caulē sub purpureum, do drantalem, pistilli specie, à quo croceum semen exit, radicē dracunculi alba, quæ decocta

estur, utpote cum minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se, decocta manduntur. Radix, semen, & folia dracunculi vires habent. Priuatim radix ex fimo bubulo Podagris illinitur, & dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

*Ari conf. acratu.*

ARVM in Hetruria, item in agro Goricienti, frequentissimum provenit, in campetribus, in vineis, in serobium marginibus, & passim in semitis propter sepes, præsertimq; in maritimis nostris Senensibus, ubi vulgo ipsum vocant Gigaro ad farum alludens: quo modo officinarum corrupto vocabulo appellari solet. Nostrates mulieres ex Ari radicibus stillariciis aquas ad fucum parant, quas ad faciem erugandā, illustrandāq; magnis laudibus effert. Id quod etiam efficaciter præstat insolaris radicem succus, cerussæ speciem referens, quæ Gersa vulgo nominantur: siquidem mirum in modum carni splendorem, & candorem conciliat. Ari vires

*Ari Gires ex Gal.*

maximè prodidit Galenus lib. x. i. simp. med. ubi ita scribit. Arum terrena essentia cõstat, sed calida: proinde extergendi vim possidet, verum non valentem, sicut draconium. Est itaque in exiccando, & calefaciendo primi ordinis. Radices eius maximè sunt viles: siquidem comestæ crassitiam humorum medicriter incidunt, adeo ut & excretionibus ex pectore idoneæ fuisse magis tamen aptum est draconium. Et lib. 11. de aliment. facul. inquit. Ari radix rapi modo manditur. In quibusdam autem regionibus acrior quodammodo nascitur, ut draconio ferè similis sit. Dum rectè parare voles, prioris decoctionis aqua effusa, repente in alteram calidā inficere convenit. Cyrenis contra, quæ in nostra regione, Arum se habet, nam illic minimè medicamentosi, minimumq; acrimonie possidet, adeo ut vel rapi sit vilius. Idcirco radicē

quoque in Italiam comportant, ut quæ absque ut putrescat, aut regerminet, longo tempore perdurare possit. Herba, quæ Græci ἀρον, & Nominat Latini similiter Arum dicunt, Mauritanis Iarus & Sara vocatur: Barbaris, Aron, Barba aron, Dragontea minor, & Serpentina minor: Italis, Aro, & Gigaro: Germanis, Clein natter vurtz: Hispanis, Yaro: Gallis Vit de chien.

ARISARVM. CAP. CLXIII.



ARISARVM exigua herbula est: cuius radix oleæ magnitudinem implet, longè maioris quàm aron acrimonie. Unde illi nomas sifit. Funt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illi tu radicis, genitale animalis cuiuscunq; in perniciem agitur.

ARISARVM ALTERVM.



ARISARVM, Plinio libro x. x. 111. cap. xvi. auctore, in Aegypto nascitur, similis aro, minor tantum, minoribusq; foliis, & vtrique radice, quæ tamen oliuæ grandis magnitudinē implet. Huius duo hodie ab herbariis ostenduntur genera: quorū vtrunq; ad me primum misit Aleisius Angulicarius, nomen horri Patavini præfectus, diligentissimas rei herbarie inquisitor.

Qui præterea testatur est Arisarū plurimū nasci in agro, Romano, non longè ab vrbē. Hæc eadē Arisari genera postea ab aliis etiā acceptimus. Vtriusq; picturā exhibere libuit, non quod vtrunq; probemus (alterū enim non verè putamus) sed ut de iis aliis etiam sit iudiciū. Meminit Arisari Galenus lib. v. i. simplicium medicamentorum his paucis. Arisarum multo minus est aro. Radicem habet oliuæ magnitudinē. Est autem multo ipso acrius. Ut Græcis ἀρισάρον, ita etiam Arisarum Latinis, & Arisaro Italici nominantur.

*Arisari hystoria.*

*Arisari Gires ex Gal.*

*Nominat*

HASTVLA REGIA.

CAPVT CLXIII.



**HASTVLA**  
**REGIA** vulgaris  
notitia est:  
foliis maioris  
porri: caule læ-  
ui, ferente in ca-  
cumine florem  
quem antheri-  
con appellant:  
radices subia-  
cent oblongæ,  
rotundæ glandi-  
bus similes,  
gustu acres.

Quæ excafaciunt: vrinæ, & menses  
epotæ ciunt: lateris doloribus, ruptis,  
conuulsis, & tussibus, drachmæ pon-  
dere potæ ex vino medentur. Ea verò  
vomitiones adiuuat, ludicri tali magni-  
tudine commanducata: à serpente de-  
morsis datur aptissimè, trium drach-  
marum pondere, verum foliis, flori-  
bus, & radice ex vino morsus illinire  
oportet: item vlcera sordida, & depa-  
fcentia: mammæ quoq; & testium  
inflammationes, tubercula, furuncu-  
lôsque: decoctis in facie vini bulbis, re-  
centibus inflammationibus ex polêta  
auxiliatur. Radicis succus adiecto vete-  
re vino dulci, myrrha, & croco deco-  
quitur, sitq; perquam vtile oculis me-  
dicamentum: ad purulentas aures per-  
se, & cum thure, melle, vino, & myrrha  
tritum, prodest: in contrariam aurem  
infusus, dentium dolore mitigat. Ci-  
nis è radice illitus, alopecias ad pilum  
reducit. oleum in excauatæ radicibus  
igni decoctum, illitu exulceratis per-  
nitionibus, & ambustis igni, conducit: &  
surditati inflillatum in aurem auxilia-  
tur. Candidam vitiliginem, linteò an-  
tea perfrictam in sole, illita radix emen-  
dat. Semen, florêsq; in vino poti, sco-  
lopendræ, & scorpionum venenis, mi-  
rum in modum resistunt: aluum pur-  
gant.

**HASTVLA** regia, quæ Græcis dicitur *Asphodeli*  
*A'eqidæ*, planta est non ignota. Huius caulem *historia.*  
(vt Plinius est auctor lib. x. x. i. c. x. v. i. i.)  
Theophrastus, & ferè Græci omnes cubitalem,  
& sæpe duum cubitorum, anthericum vocaue-  
re: radicem verò, id est, bulbos, *asphodelon*. La-  
tini autem illud albucum, & *asphodelum* ha-  
stulam regiam dixerunt. Planta hæc speciatu mi-  
ra, & iucunda est, cum integra effoditur, ob in-  
gentem bulborum numerum, qui circumqua-  
que dependunt: quippe quòd aliquando eius  
aliquam viderim bulbis vltra centum radici co-  
hærentibus. quanquam loco citato tradit Pi-  
nius, *Asphodeli* radicem aliis numerosiore  
esse, vt quæ octoginta final acervatis sæpe bul-  
bis reperiatur. Vermes *Albucii* creat (vt Theo-  
phrastus ait) qui in volucres belliosas fosculo-  
rum specie degenerant: ij tandem cum flacce-  
scens inaruerit scapus, eroso conceptaculo pro-  
uolant. Mandebatur antiquitus, Hefodo teste,  
huiusce plantæ tum caulis in cinere tostus, tum  
bulbus cum semine, oleo, & sale addito: quin-  
etiam cum fici, nostra voluptate. Extulit magnis  
laudibus *Asphodeli* radices Nicander in suis  
theriacis, ad serpentium morsus, & scorpionum  
iūs. Meminit eorum quoque Galenus libro  
v. i. simplicium medicamentorum, sic inquit,  
*Asphodeli* radix vtilis est, sicut ar, arisari, & dra-  
contij, nempe extergentis, & discurrētis facul-  
tatis. Vltæ autem cinis calidior, & exiccantior,  
subtiliorque, ac digerere potentior efficitur, ac  
proinde & alopecias sanat. hæc Galenus. Exte-  
rius *asphodeli* radix mirificè commendatur.  
Aërio libro primo ad ciendos menses, his ver-  
bis. *Asphodeli* radix in vino albo vetere deco-  
cta, & vino calido meraco cyathi mensura hau-  
sto, menses suppressos celeritè ciet. Planta,  
quæ *Aspidæ*, Græcè, *Hastula* regia Latine voca-  
tur: Arabicè, Cheunce, Bhunte, Biruach, Abg,  
scu Axeras: Italicè, *Asphodelo*, *Amphodillo*, &  
*Hastula* regia: Germanicè, *Goldquartz*, & *Heid-  
nisch*: Hispanicè, *Gamonos*, *Gamonites*: Gallicè,  
Aïgodilles.

*Asphodeli*  
Græcè  
Galenus.

Nomina.

EVLVS ESCVLNTVS.

CAPVT CLXV.

**ESCVLENTVS** bulbus vulgò co-  
gnitus, à nobis estur. *Stomacho*, & aluo  
vtilis rufus, & qui ex *Aphrica* defertur.  
Amarus verò, & scillinus, stomacho  
aprior est, & concoctionem adiuuat.  
Bulbi omnes acrimoniam habent, ex-  
calfaciunt, venereum stimulant, linguâ,  
tonsillâsq; exasperant, multum ali-  
menti præbent, carnes creant, inflatio-  
nem pariunt. luxatis, fractis, articulo-  
rum doloribus efficaciter illinuntur:  
spicula extrahunt: gangrænas, & poda-  
gras

gras ex melle, aut per sese hydropicorum tumores, & canum morsus cum melle, & piperis polline illiti cohibent: sudores compescunt: stomachi dolores mitigant: furfures, & vlcera, quæ in capite manant, cum tosto nitro abstergunt. sugillata, varosque per se, aut ex oui luteo, & lentigines cum melle, vel aceto, emendant: fractis auriculis, vnguibusque, ex polenta medentur. Iidem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere è manarum capitibus, impositi. Cremati verò, & cum alcyonio misti, vitia cutis in facie, atrasque cicatrices, in sole illiti emaculant. faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant.

## BVLBVS VOMITORIÏ

## CAPVT CLXVI.

**BVLBVS**, quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multò, & longiora, quàm bulbus esculentus: radicem similem, cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctum eius potum, vesicæ malis medetur: vomitiones mouet.

*Bulborum  
considera-  
tio.*

**BVLBORVM** genera, esculentum, & vomitorium, antiquis vulgò notissima fuisse ex eo maximè constat, quòd eorum faciem non representauerit Dioscorides. Nobis verò Bulbi eam ob causam, vel quòd iandiu exoleuerint, hodie omnibus tum medicis, tum herbariis adeò incogniti sunt, vt neminem hæcenus inuenierim, qui eos legitimè demonstret. Veteribus autem fuerunt in frequentissimo ciborum vsu, his præsertim admisti, quæ veneris conciliande gratia parabantur, vt pote qui venerem stimulent. Quòd autem ad id expectiti, & commendati fuerint, Martialis apertè testatus est in Xenii suis, dum cecinit.

Cum sit anus coniunx, cum sint tibi mortua membra,

*Multorum  
error.*

Nil aliud bulbis quàm satur esse potes. Caterum non desuere, qui crediderint Bulbum esculentum esse Ascalonium cepe, aut fissile illud ceparum genus, quod Hieruscis vulgò vocatur Cipolla maligna. Sed horum error manifestè deprehenditur ex Theophrasto, qui Ascalonium, fissileque cepe inter ceparum genera libro v. capite 111. de plantarum historia recensuit, non autem inter Bulbos, de

quibus speciatim differuit libro v. capite 111. Bulborum meminit Galenus libro v. simplicium medicamentorum, sic scribens. Bulbus esculentus frigidior, & crassior est, lentumque succum procreat. Nam & coctum difficilis est, & flatuosus, & venerem prouocans. Attamen illitus ob amaritatem, simul & adstrictiōnem, abstergit, simul & glutinat, & mirum etiam exccat. Est enim ossensum, & amaritudinem in extergentibus esse substantiis, adstrictiōnem verò in glutinantibus. At siccitas veranque consequitur. Bulbus autem vomitorius multò est calidioris temperaturæ, quàm prædictus bulbus. Et libro 11. de alimentorum facultatibus, sic de bulbis scribit. Bulbi genere cum prædictis conueniunt. Nam horum quoque radix direptis foliis manditur: in vere interdum ipse etiam coliculus. Amaram, austèramque vim cui denter bulbi in se habent: quamobrem elanguescentis stomachi aliquatenus excitant auditatem. At verò neque iis aduersantur, quibus è thorace, atque pulmone pus conuenit expueri: quanquam crassiore, ac glutinosiore sunt corporis substantia. Etenim amaritudo crassitudini reluctatur, lenta, crassaque nata incidere, quem admodum in commentariis de medicamentis prodidimus. Quapropter bis elixi vberius quidem alent, sed excreare volentibus aduersantur, vt pote omni amaritudine exuti. Tum verò ex aceto, oleo, garòque mistis, estare satius fuerit: nam ita magis profectò oblectabunt, ac nutriant, minisque inflantur, ac facilius concoquantur. *Bulbi* qui Græcis *βύβανος*, Latinis Bulbus esculentus cognominatur: Mauritanis, Bafar alzir: Italis, Bulbo che si mangia. Qui verò Græcis *βύβανος*, Latinis Bulbus vomitorius dicitur: Mauritanis, Zir: Italis, Bulbo vomitorio.

*Bulborum  
Sires ex  
Galeno.*

*Nomina.*

## SCILLA

## CAP. CLXVII.



**SCILLA** vim acrem, atque feruentem habet: asaram ad multa vtiliorè esse còstat. Pol line ad crustà subacta, aut luto oblita, in clibanum conuicitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta fuerit: qua exempta, si non emollefcatur, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem



dem, quæ prius, fiunt: nam quæ ita non affatur, interaneis maximè noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnum demittatur. Sumi etiam solet quod maximè est mediū, direptis viuōtenus tunicis, quod frustatim confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinem, nec acrimoniam habeat: traiectaque lino frusta siccantur in vmbra, ita vt ne vlla quidem parte se contingant. His scillæ segminibus ad oleum, vinum, aut acetum scillinum vtimur. Ad rimas pedum, interna pars crude scillæ in oleo feruefacta, aut cum resina liquefacta, imponitur. decocta in aceto demorsis à vipera, cataplasma est. Ad singulas assæ partes adiectis octonis tosti salis, cochlear vnum, aut alterum damus ieiunus, ad emolliendam aluum: in potu autem, & odoratis medicaminibus, & quibus vrinam ciere volumus, hydropicisq; & stomachicis, quibus innatat cibus. Regio morbo, torminibus, in rufi vetere, suspiciosi, & ore reiicientibus, tres obolos in delinctu ex melle sumpsisse satis est. Coquitur cum melle, & estur eorundem gratia, maximè vt concoctionem adiuvet: strigmenta per aluum extrahit. Cocta, & simili sumpta modo, eodem præbet effectus: sed cauendus scillæ vsus his, qui intestinum sentiunt vlcus, ad pensiles verrucas, & perniones, tosta efficaciter illinitur. Tritum semen, & in carica, aut melle deuoratum, aluum emollit. Scilla tota in limine sanuæ suspensa, mali medicamenti noxam arceat.

PANCRATIUM. CAP.  
CLXVIII.

PANCRATIUM, quod aliqui scillam appellât, radice est magni bulbi, subrufo colore, aut subpurpureo, gustu amaro, ac feruente: foliis lilij, sed longioribus. Scillæ vires, & præparationem habet, eodémque pondere in morbis efficaciter assumitur: cui ta-

men mirior, quàm scillæ facultas inest. Radicis succus cum erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis, splenicisque cum hydromelite, commodissimè dantur.

SUPERIORIBVS annis credidimus, Scillas, quarum in Italia omnibus tum medicis, tum seplariis communis est vsus, legitimas esse: in hanc autem opinionem veneram pluribus coniecturis ac rationibus fretus. In primis enim Plinium inuenerà lib. x. i. capite v. Scillæ maiorem quàm cæteris bulbaceis radicibus amplitudinè reddidisse, quare cum sæpe vidissem ex iis Scillis, quibus passim vtitur, nonnullas ad tantam magnitudinem creuisse, vt ferè caput hominis æquant, non poteram non existimare illas esse veras. Deinde legeram apud Theophrastum libro v. i. capite x. i. de plantarum historia, Scillam prius caulem florèsq; gignere, quàm folia. Id quod in nostratibus cum manifestè deprehendatur, mihi quidem non videbatur esse discedendum à vulgari opinione. Adde quòd sæpenumero quasdam Scillas vidi paruas, pyro paulò maiores, has eisdem putabam Pancratium esse: illas verò communis vsus, Scillas. idq; eò magis, quòd Dioscorides tribuit Pancratio radicem magno bulbo similem: horum autem radix mediocris potius, quàm eximie crassitudinis censetur. Verum cum postea aliquantò accuratius harum plantarum historiam expendissem, inueni Aloes solum, Dioscoridis & Plinij testimonio, scillæ similitudinè habere. Quod nimirum refragatur Scillæ communis vsus, vt quæ folia ferat non aloë, sed lilio proxima: inter quæ non parua quidem intercedit differentia. Quinetiam legi in Theophrasto, & Plinio, quòd Scilla floret ter in anno. hoc item non euenit nostris vulgaribus Scillis. Hinc itaque iure quodà factum est, vt de Scilla non vterius vulgarem illam tenuerim, sed in dubiam venerim sententiam, an scilicet Scillæ cõmunis vsus legitimæ & sint, & dici mereantur: aut aliæ reperiantur, quæ soli s aloë similibus proueniât. Cæterum dum adhuc in hac re dubia versarer, à quibusdam medicis Hispanis accepi in Hispaniæ maritimis Scillas innumeras oriri nostratibus duplò maiores, foliis aloë emulaticibus, sed minus crassisque amplitudine, acrimonia, ac virium præstantia communes nostras Scillas longè vincunt. Tam ergo non dubitauerim asserere prædictas Hispaniæ Scillas, veras esse, nostrates verò legitimè esse Pancratii Dioscoridis. huic enim pulchrè respondent folia, quæ lilij sunt, verum longiora. Nec obstat, meo quidè iudicio, quòd Dioscorides scripserit, Pancratium radicem esse magno bulbo similem. nanque bulbis hoc loco genus, non speciem denotat. Arque adeò hinc

Scilla. &  
Pancratij  
considera-  
tio.

fortasse sit, vt Scilla: quorum est communis usus, non ea præstent efficaciter, quæ legitimæ pollicentur: quod Pancratio (vt Dioscorides testatur) mitior, quam Scilla: facultas insit.

*Scilla præparatio.*

Quidam ætatis nostræ medici in cerebri, & nervorum frigidis affectibus, Scillam crudam ab involucribus repurgatam minutim secant, & cum melle plurimo in vas vitreum coniiciunt, infolant, per æstatem, ardente præsertim siccio. Demum percolato melle vtuntur ad comitiales, & alias cerebri ægritudines, à frigidityte excitatas. Sed alia longè diuersa fuit Galeni ad hos usus scilla: parandæ ratio. Quippe qui coccinam Scillam nunquam melle commistam exposuit infolandam, sed vt ab ea succum sole colligatū in diebus canicularibus eximeret, in fictile, vel vitreum vas, in quo primum mel fuisset, dissectam scillam immittebat: deinde tantisper infolabat, donec solaribus radiis ipsa liqueceret. Ex quo palam fit, quod plerique à Galeni instituto proflus aberrant, vt qui scillanum mel conficiant scilla: liquorem vice. Scilla

*Scilla Si-  
rerex Ga-  
leno.*

(vt memorie scriptum reliquit Galenus libro v. i. i. simplicium medicamentorum) admodum incidentem facultatem obtinet, non tamen admodum calidam. Sed secundum hoc eam quispiam secundi ordinis censet exalciacientium. Præstat autem aut assam, aut elixam fumere: sic enim virium eius vehementia exolvitur. Nomen illi Græcum est *σκίλλα*, Latium item Scilla: Arabicum, Haspel, Hausel, Aschil, seu Alaschil: Italicum, Scilla: Germanicum, Meer zuibel: Hispanicum, Cebolla albatrana: Gallicum, Scipouille, Charpentaire, & Oignon marin.

*Nomina.*

#### CAPPARIS. CAP. CLXIX.



CAPPARIS aculeatus frutex est, qui in terrastratus magis in orbem cuagatur. Spinæ, vt rubus, habet in hami modum aduncas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructu oleæ similis, qui cum dehiscens panditur, florem candidum promit: quo excusso, nonnihil glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis puniceorum similia ostendit, par-

ua, rubicunda: radices lignosas spargit, grandes, numerosasq;. Tenui plerunque solo, asperisq; locis, in insulis, & iuxta rudera nascitur. Caulis, & fructus, cibi gratia condiuntur. aliu turbat, stomacho aduersatur, sitim gignit: cocta tamē stomacho, quam cruda utilior est. Fructus drachmis duabus in vino potus, quadraginta diebus, lienem absumit, & vrinam, cruentamque excrementum emittit: bibitur utilissimè in coxarum doloribus, & nervorum resolutione, item ruptis, & conuulsis: menses ciet, caput purgat. Denti dolorem sedat semen ex aceto decoctū, colluto inde ore. Aridus radicis cortex ad eadem proficit: vlcera omnia vetera, & sordida, & quæ occalluerunt, expurgat: lienosis cum farina hordei illinitur: dente demorsa, dolori eius auxiliatur: cum aceto trita, vitilignes albas absterget. Radix, foliaque intrita, strumas, ac duritias discutiunt. Auriū vermiculos infusus succus enecat. Aphrica, & præsertim Marmarica capparitis, vehementer inflat. Apula vomitus facit. & quæ à Lybico, & quæ Rubro mari, deferuntur, mirum in modum acris est: siquidem in ore pustulas excitat, gingiuasq; osse tenus exest. quare in cibis non ab re damnatur.

CAPPARIS frutex est in Italia vulgaris satis noticiæ. Floribus enim, & fructibus muria asseruatis frequentissimè in cibis vtuntur. Ex his suauiores, & qui cum palato miorem ineanat gratiam, sunt recētes acerrimo asseruati aceto, quod pleriq; faciunt in Hetruria. Præstantissimæ capparites ex Alexandria Aegypti Venetias aduehuntur. Est & in Apulia capparum proventus, vnde etiam plurimæ deferuntur, verū longè deteriores his, quæ ex Aegypto importantur. Vomitiones capparites haudquaquam cient, vt Dioscorides inquit: nisi fortasse hac facultate sint prædita, dum recētes, ac virides comeduntur, antequam muriam experiantur, & inde elixentur. Proueniunt etiā Romæ in collapsis ædificiorum parietibus, ruderbisq; que, præsertim circa Pacis templum, itémque Senis, quæ quidem Apulis saporis præstantia minimè cedunt. In cultis nasci capparites negat Theophrastus libro v. i. capite v. de plantarum historia. Seruntur tamen hac æstate, co-

*Capparis  
considera-  
tio.*

*Capparis  
satio.*

lantur

*Capparis sativ.* Iunturque perinde ac fegetes, & legumina, quemadmodum & Plinii tempore. qui ferendi rationem libr. x i x. cap. v i i i. his verbis explicavit. Quippe cum capparibus quoque feratur, ficis maxime, area in defossu cauta, ripis, vndique circumfusus lapide, alias euagatur per agros. & cogit solum sterilefcere. Floret æstate, viret vsque ad Vergiliarum occasum. Sabulosus familiarissimus. Capparis vires reddidit Galenus libro v i i. simplicium medicamentorum,

*Capparis vires ex Gallien.*

sic inquit. Capparis radice cortex vincente habet qualitatem amarum, proximam acrem, deinde acerbam. Ex quo liquet, quod diversis, pugnantiâque cõter facultatibus, quippe abstergere, purgare, incidere potest amaritudine: excalescere, incidere, digerere acrimonia: porro contrahere, densare, cõstringere acerbitate. Idcirco lienes induratos, si quid aliud, hoc medicamentum iuvare valet, tum foris idoneis illinen dis remediis admixtum, tum intro in corpus assumptum, siue decoctum in aceto, aut oxymeli re, & id genus, siue aridum contusum, illisque permixtum. Quippe cum aperte crassos, lentosque humores hoc pacto sumptum euacuet, nec eos tantum per urinas, sed & per ventrem: sipe etiam sanguinolentos desert, vnde & lienes aditus suut, & coxarum dolores. Quineriam menses promouet, & ex capite purgat, detrahique, auxiliaturque rupis, atque convulsis. Cæterum cuiam ipsum porioni in quoque affectuum misceri conveniat, non est præsentis instituti persequi. Porro radice eius cortex vlcibus malignis cataplasmatis modo impositus, non malum est remedium, vt qui illa extergere valeat, ne segniter desiccet. Præterea dentium labores prædictarum qualitatum ratione adiuvat, interim cum aceto coctus, interius cum vino, sæpe etiam solus dentibus manus, ac morsus. Ex dictis ergo clarum est, incidendi quandam ei facultatem inesse, itemque extergendi, digerendi, contrahendi. Vitiligines siquidem cum aceto detrahit, & chæradas, & duros tumores digerit, idoneis ad ea medicamentis mistis. Radice cortici, fructus proportionem virium respondet, nisi quod ad omnia fit imbecillior. Imò & folia, & caules eius, similem vim obtinent. meminque me foliis quandoque paucis diebus duritatem chæradis naturam referentem discussisse. Sed admiscemus scilicet illis quippiam, quod eorum virium obtundat vehementiam. Nec mirum est, quod aurum vermes succus amaritatem occidat sua. Porro capparibus, quæ in admodum feruentibus regionibus provenit, vt quam fert Arabia, multo est nostrate acrior, adeo vt plurimum etiam habeat facultatis aduicentis. Et lib. ii. de aliment. facultatibus, sic de Cappare scribit. In Cypro Capparis plurima provenit. Facultas eius tenuium admodum est partium: proinde minimum alimenti in corpus eorum, qui ipsa vescuntur, distribuit. quemadmodum & alia omnia, quæ tenuibus constant partibus. Utimur autem

fructu huius plantæ, vt medicamento, quam vt alimento. Importatur ad nos etiam sale conspersus, quia solus asservatus putrefcit. Clarum ergo est, quod capparibus adhuc viridis, antequam sale condatur, plus habet nutrimenti: nam ex salitura permulsum eius amittit, nique sal ablatur, prorsus haud quicquam nutrit: alium tamen subducet. Verum ablutus, & demaceratus donec omnem salis naturam exuat, vt minimi sanè alimenti cibus est, ita obfusum, & medicamentum, cum ad excitandum prostratum appetitum, tum ad deradendum, deiciendumque pituitam ventri adhaerescit tamen accommodatum erit, ac denique ad lienis, iecorisque amolendas obstructions. Verum in hos vsus cum oxymelite, aut oxelzo ante alias omnes dapes sumi oportet. Tenellis porro capparibus germinibus homines, vt terebinthi turionibus, vescuntur. cùmque adhuc virent, in oxalme, & aceto, non secus atque hos, reponunt. Planta, quæ *αἰνιστάρις* Græcè, capparibus similiter Latine dicitur: Arabice, Cappar & Kappar: Italicè, Capparo: Germanicè, Kappren: Hispanicè, Alcapparras: Gallicè, Cappelz.

*Nemina.*

# LEPIDIVM. CVP. CLXX.

LEPIDIVM, aliqui gingidium vocant, herbula vulgò nota. muria cum lacte seruatur. Vis solorum acris, & exulcerans. quapropter ischiadicis trita, præsentissimum est auxilium, si cum helenij radice, quarta parte horæ, illinatur, lienosis simili modo prodest: le prax eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

C v m satis superque a nobis ostensum sit, in primi libri calce, in Iberidis cõmentatione, Ibe ridem nihil à Lepidio differre, superuacaneum esset, hic ea repetere, quæ ad Lepidij historiam explicandam loco citato diffusius adduximus. Siquidam cõ quisque facillè accedere potest, qui ea, quæ ibi diximus, scire desiderat. Veruntamen illud silentio non inuoluendum duxi, quod Plinius in Lepidij historia prorsus à Dioscoride dissentire deprehenditur. Quippe qui stripserit libro x i x. capite v i i i. Lepidium cubitali longitudine asurgere, foliis laurinis, non autem nasturtij, vt Dioscorides inquit. Quod sanè nobis infinuare videret, Plinij Lepidium eum esse Iberidis speciem, quam scribit Paulus libro. i i i. de coxendicium dolore agens, folia lauri præferre. Hæc enim (vt libro superiore diximus) ea facillè fuerit, quam vulgus herbariorum ideo Piperitum nominat, quod acerrimo gustu linguam mirum in modum vellicet. Cæterum non possum non ad

*Lepidij cõ sideratio.*

*Lepidium Plinij.*

LEPIDIVM DIPSC.

LEPIDIVM PAULI, ET PLIN.



*Lapsus* mirari, quòd tam facilè crediderint Hermolaus, Manardus, ac Ruellius illos secutus, Lepidium eam plantam esse, quæ vulgò in Italia appellatur Raphano. Nam cum hæc foliis sit helenio paulò minoribus, & verbasco maioribus, nullo pacto Dioscoridis Lepidium referre potest, ut quod tenuis admodum sit herba. Nec item Plinio adscriptulari videntur, qui Lepidium prodidit laurinis foliis exire in cubi-<sup>30</sup> talem altitudinem: nisi fortasse ij clarissimi viri nostratem Piperitum, quæ proculdubio Plinianum refert Lepidium, Raphanum vocauerint. Quod *Maxidus* Græci, Lepidium quoque Latini vocant: Mauritan, Seietaragi, Hausab, Afceiraragi, seu Sitharegi: Itali, Lepidio: Germani, Gauchblum, & Vuider krefz: Galli, Pafserage, & Nafstort sauuge.

RANUNCVLVS QVINTVS.  
CAP. CLXXI.

COMPLVRA Ranunculi genera. vis tamen omnibus vna, acris, & vehemens exulcerans. Nam vnum coriandri foliis constat, latioribus, subalbidis,

pinguibus: flore luteo, interdum purpureo: caule gracili, cubitum alto: radice alba, exigua, amarâque, multis capillamentis, hellebori modo, fibrata. nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plurimum in Sardinia proueniens, quam acerrimum, quod syluestre apium appellant. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. Folia, flores, & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas non sine dolore gignunt. quare vngues scabros extricant, scabiem eximunt, stigmata delent:<sup>40</sup> formicantes verrucas, & pensiles, alopeciasque paulisper illita tollunt. Tepente decocto perniones fouentur. Sic ca radix, tritâque sternutamenta ciet, naribus admodum: dentium dólorem apensa leuat, ipsos tamen frangit.

RANVN

RANUNCVLVS PRIMVS.

RANUNCVLVS SECVNDVS.



RANUNCVLVS TERTIVS.

RANUNCVLVS QVARTVS.



40

*Ranunculi* RANUNCVLVM, qui Græcis *βαισάνιον* dicitur, vulgus herbariorum in Italia, & alibi etiam Pedem corui, & Pedem galli, quanuis perperam, vocant, vt superius quoque in coronopi mentione diximus. Planta est vulgò nota, pluribus tamen, & diuersis generibus distincta. Et quanuis quatuor tantum generum meminerit Dioscorides, nos tamen & quintum, & sextum genus sæpius vidimus. Ex his, quorum particularium non fecit mentionem Dioscorides, vni genus est, quod nobis quinto loco assignabitur, quod quidem foliis primo proximis prouenit, sed cui inter complures, quibus nititur, radices, tuberosa quædam pendeat radix nucis iuglandis magnitudine, rami modo albicans, acris tamen, & exulceras, quæ per hyemem, arefcentibus iam foliis, vtuntur quidam, vbi exulcerandi sit opus. Illud porro genus lanuginosius, vel, vt Plinius ait,

foliosius copiosissimum in Sardinia nascens pluribus foliorum incisuris, altiore caule, acerrimo gustu, plerique ideo Apium risus nominant, quod quibusdam memoriæ proditum sit, eos tanquam præ læticia ridentes interire, qui ipsum comederint. Sed rem se aliter habere crediderim, & aliis potius adstipulandum esse. Siquidem Pausanias auctor est, herbam hanc, si edulio fuerit, vescentibus nervos contrahere, rictuque ora diducere, ita vt qui mortem oppetunt, velut ridentium facie intereant. Quod & Salustius confirmat, qui huius venenatæ herbæ meminit, sic inquit. In Sardinia quædam herba nascitur, quæ Sardoia dicitur, agrestis apio similis. Hæc ora hominum, & rictus dolore contrahit, & quasi ridentes interimit. Idcoque Dioscorides libro 1. Sardoniam ranunculi genus esse testatur, quæ vescentibus mentem adimar, & quadam nervo-

## RANUNCULVS QVINTVS.



*Quorum-  
da error.*

*Ranunculi  
vires ex-  
Galeno.*

rum diffinitione de-  
hiscere in rictus  
ora cogat, ita vt  
imaginem rident-  
ium præbeat. Ob  
id Sardonius ris-  
sus in adagiū ces-  
sit. Cæterum quā  
magno in errore  
versetur, qui exi-  
miant Ranuncu-  
lum esse Coronop-  
um, superius in  
Coronopi comen-  
tatione latius  
explicauimus. Ra-  
nunculi meminit  
Galenus lib. v. 1.

simplicium medicamentorum, vbi ita scriptum  
reliquit. Batrachium, id est, Ranunculus, qua-  
tor habet speciem differentias. Omnia verò  
vehementer acrem facultatem possident, adeò  
vt cum dolore exulcerent. Hac itaq; ratione,  
si moderatè vtare, psoras, & lepras excoriant,  
& vngues leprosos diuellunt, & stigmata di-  
scutunt, & acrochordonas, & myrmecias de-  
trahunt. Quin & alopecias iuuant, paucò tem-  
pore admodum. Nam si diutius inhiæreant, non  
excoriatur solum ipsa cutis, sed & in crustam  
vritur. Atque igitur hæc omnia caulibus, & so-  
llorum sunt opera, si imponas virentia. Porro  
radix arefacta sternutatorium est medicamen-  
tum similiter aliis omnibus, quæ valenter de-  
ficcant. Sed & dentium dolores iuuat, vt &  
frangat eos valenti scilicet excoctioe. & vt se-  
mel dicam, calida, & secca valde est tum radix,  
tum vniuersa adeò herba. Batrachium ita Græcis,  
Latinis verò Ranunculus appellatur: Ita-  
lis, Ranuncolo, & Pie coruino: Germanis,  
Hanan fuoz: Hispanis, Hierua belida: Gallis,  
Bacins, vel Pye-pou.

*Nomina.*

## ANEMONE. CAP. CXXXII.

**D**e v. b. Anemones genera, vnū syl-  
uestre, alterum in cultis nascens. Cu-  
ius multa species: vna phœnicea flore-  
rem profert: altera candicantem, aut  
lacteum, aut purpureum. Harum folia  
coriandro similia, cæterū scissa tenuius  
in terram inclinantur: caules lanugi-  
nosi, tennes, in quibus flores, vt papa-  
ueris, & in medio capitula nigra, aut  
cærulea: radix oleæ magnitudine, aut  
amplius paulò grandescit, ac veluti ge-  
niculis quibusdam cingitur. Syluestri  
amplius proflus maior, latioraque  
folia, & duriora: oblongius caput: flore

punico: tenuibus, & multis radicū ca-  
pillamētis. Acrior est, quæ nigra habet  
folia. Vis vtriusq; acris. ea de causa suc-  
cus naribus infusus purgat caput. Cō-  
manducata radix pituitam trahit. de-  
cocta in passo, & illita, medetur oculo-  
rū inflammationibus: cicatrices corū-  
dē, & hebetudines emēdat: fordida vl-  
cera abstergit. Folia, & caules, si cū pti-  
sana decocti edantur, copiā lactis præ-  
bent: menstrua ciunt, vellere apposita:  
illita quoque lepras eximunt. Sunt qui  
errore ducti argemonē nominari eu-  
patoriū putēt: quoniā à syluestri Ane-  
mone, argemonem, & papauer, quod  
rheada appellant (de quo inter papa-  
ueris genera referemus) propter colo-  
rū cognationem in floribus distinguere  
nō possunt. Verū papauer, & argemo-  
ne colore minus saturato spectantur, &  
vtraq; tardius floret. Quinetiam argemo-  
ne croceū succum, gustu admodū  
acrem, reddit. rheas verò candidiorē,  
& acrem. Insuper anemone, & rheadī  
capitula syluestris papaueris similia  
insunt, sed in anemone supernē crassi-  
usculum, in rheadē subagustius. Ane-  
mones genera succum remittunt, nec  
calyces habent, sed quasi asparagi ca-  
cumen. In arnis illa sapius enascuntur.

10

30

40

50

Non desunt profecto, qui credant, Anemone, & syluestre papauer idē esse: in minus, scilicet eiusdē esse generis. Sed ij, mea quidē  
sententia, falluntur, & prorsus aberrāt à Diosco-  
ridis proposito. Quandoquidē si hoc idē sen-  
sisset Dioscorides, alterū ab altero diuersis ca-  
pitibus nō distinguisset, neq; vt legitur in huius  
capitis calce, disserre Anemone à syluestri pa-  
pauere tradidisset. Tamen exiistimet Brasauo-  
lus, Dioscoridis Anemone id omnino esse syl-  
uestris papaueris genus, quod flore prodit ex-  
ceteris rubentior: minime animaduertēs, quod si  
huius cauliculi frangantur, hanc lac ipsum di-  
stillant. Quin nec illud quidem animaduertisse  
videtur, quod hoc longa constet radice, nō autem  
olieu modo rotunda: capitulumque ferat  
papaueris, non asparagorū cacuminibus simile.  
Fuchsius præterea in eo libello, in quo tantum  
stirpiū imagines expressit, Anemones purpu-  
reæ loco, illam depingit herbam, quæ plerisq;  
PULSATILLA cognominatur, cū nullam  
quantū equidē sentio, habeat cum Anemone  
cognationem. Illa namque cum primum crum-  
pit, folia mittit: admodū hirsuta, minutimq;  
lacinata

*Anem-  
nes confid.*

*Brasauoli  
lapsus.*

*Fuchsiæ  
lapsus.*

*Pulsatilla  
hirsuta.*

ANEMONE.



ANEMONE ALTERA.



Ruell. l.  
p. 100.

laciniosa, quæ sipo  
re sunt perquam  
acri, adeo vt non  
minus exulcerent,  
quàm ranunculus,  
& flammula vulgò  
dicta. Flos, qui in  
stille modum, si-  
militer hirsutus, in-  
eunte vere dehi-  
scit, antequàm folia  
erumpant, nigri  
canti splendet pur-  
puræ cuius me-  
dio quidam aurei  
flosculi emicant  
eos admodum 20  
mulantes, qui rosis  
innascuntur: in quo-  
rum umbilico flo-  
cus quidam purpu-  
reus visitur, serici-  
um referens opus.  
Exteriori verò par-  
te in ipsius caulis  
cacumine circa flo-  
ris basim villosus  
alter circumquaq; 30  
se pandit floccus,  
colore cinereo, serici-  
no flammæ mol-  
litiæ, ac læuore mi-  
simè cedens. Semen  
capilloso, in-  
canoque capitulo,  
iuglandis ferè ma-  
gnitudine, cõtine-  
tur. Radix illi sub- 40

est pedali longitudine, exesa, nigri chamæleo-  
nis modo: cui sapor quidem subdulcis, non autè  
acris, veluti foliis, & caulibus. Sût qui hanc mi-  
ris laudibus effertant contra pestilentiam, & ad  
hausta venena, iteund; contra omnium veneno-  
rum tum morsus, tum ictus: quamobrem in  
antidotis additur. Cæterum legitimam vtriusq;  
generis Anemonem legitimam nos in Ananien-  
si agro, quæ, vt arbitror, Dioscoridis descriptioni  
nihil prorsus reclamant. Eas item postea vidi 50  
Venicis, in horto clarissimi medicæ Maphei à  
Mapheo. Scribit Ruellius Anemonem in Gal-  
lia copiosam nasci, eamq; esse plantam, quæ her-  
barij Herbà venti vocant. Verum si herba vèti  
helxine fuerit, vel solidago minor, vt Simon Ia-  
nensis interpretatur, aberrasse Ruellius mani-  
festèprehenditur: sin aliter, quid dicam ne-  
scio, cum me omnino lateat, quid Ruellius per  
herbam venti intelligere voluerit. Meminit A-  
nemonem Galenus libro v. i. simpliciū medi-  
camentorum, vbi ita scribit. Anemonæ omnes

acrem, extergendi, attrahendi, & ora vasorum  
referendi facultatem obtinent. Itaque radix  
commanscitrituitam euocat: & succus ex nari-  
bus purgat, & oculorum cicatrices



ARGEMONE. CAP. CLXXXIII.

ARGEMONE in totum sylvestri pa-  
paueri similis est. Folia habet anemo-  
nes, diuisa: florem puniceum: caput in  
cauliculo papaueris rheadidis, oblon-  
gius, & summis partibus latum: radi-  
cem rotundam: succum croci colore,  
acrem dimittit. Argema, & nubeculas  
expurgat. Folia illitu inflammationes  
compefcunt.

EXTANT nōnulli Dioscoridis codices, in  
quibus duo Argemones genera diuersis capiti-  
bus leguntur, nonnulli verò hoc tantum ha-  
bent, quod nos legitimum esse credimus, non  
dissentientes à compluribus doctissimis viris,  
qui alterum huc illegitimè accessisse censent:  
præsertim cum Galenus, & Paulus illius nusquā  
mémnerint. Veruntamen, vt satisfactum omni-  
bus sit, alterius quoque Argemones historiam  
hic adiiciendam duximus, quæ sic habet. Ar-  
gemone altera foliis sylvestri papaueri similis  
est. Vis ei inest, si recens trita imponatur,  
intercisiones sanare, & oculorum inflamma-  
tiones mitigare. Potà cum aqua dysentericis  
auxiliatur, vulnera conglutinat, & inflamma-  
tionibus vtilis est. Conuulsis, & vellicatibus  
imposita medetur: contra serpentium morsus  
vulser cum vino bibitur. Plinius libro x x v.  
capite v i i i. Argemones tria fieri genera me-  
morat, idque demum probari, cuius radix thus  
redolcat. Prouenit argemone frequentissima  
in Hetruria, præsertim in agro nostro Senensi:

Argemo-  
nes consi-  
deratio.

Caput Ar-  
gemones  
adultera-  
tum.

Veterum  
historiam  
etym.

sicut & in quibusdam locis vallis Ananiz Tridentini tractus, quæ nullis, quantum equidem iudico, notis Dioscoridis descriptioni refragatur. Quamobrem in maximo errore fuisse deprehenduntur veteres nostri tum medici, tum seplasiarij, quod Eupatorium Argemones vice ac ceperint, sub Agrimoniz nomine, de qua libro

ANAGALLIS MAS.



ANAGALLIS. CAP. CXXXIII.



DVO sunt Anagallidis genera, quæ tantum florent. 30  
tū flore distant. nam quæ serueo flore est, femina dicitur: mas quæ phœnico. Frutices sunt parui, in terra iacentes: 40  
foliis in quadrāgulo caule pusillis, subrotundis, ad helixin folia accedentibus: semine rotundo. Vtraque mitigandi vim habet, inflammationem arcet, ad ætos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus earum gargarizatus, capitis pituitam purgat: & naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam na rem iniiciatur: argema cum melle Attico emendatur: retusa oculorum aciei auxiliatur: contra viperarum morsus, ieci notis, & renum vitia, si ex vino bibatur prodest. Tradunt eam, quæ cæruleum edit florem, prociua sedem reprimere: quæ verò phœnicæ, illitu euocare.

quarto suo loco, Deo duce, latius differemus. Argemones vires sanè quàm paucis perstrinxit Galenus libro v i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Et huius herbæ facultas absterforia est, & digerens. Ea Græcè *Argemone* Argemone item Latine, atque Italice dicitur.

Argemones vires  
ex Gal.

ANAGALLIS FEMINA.



ANAGALLIS tam mas, quàm femina, 45  
quæ officinis vulgò Morsus gallinæ dicitur, notissima est. Cæterum planè, meo quidem iudicio, hallucinantur, qui Anagallidem eam esse plantam putant, quæ in Herbaria vernaculo nomine Centone vocatur, Insulubris verò Paurina. Nam hæc florem fert cæcidum, & caulem rotundum, Anagallidū verò alteri flos est cæruleus, alteri puniceus, & quadrangulus vtrisque caulis. Anagallidum vires recensuit Galenus libro v i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Anagallis vtraque tam ea, quæ cæruleum habet 50  
florem, quàm ea, quæ purpureum, admodum extergentis sunt facultatis. Habent verò quandam etiam calorem attractorium, ita vt & infixos corpori aculeos extrahant. Succus earum ex naribus purgat eadem de causa. In summa autem desiccandi vim habent citra mordicationem: quamobrem & vulnera glutināt, & putrida adiuuant. hæc Galenus. Verum cum Morsus gallinæ eam stirpem in mentem mihi reuocauerit, quam vulgus herbariorū MORSUM diaboli, alij Succifam appellat, cumq; putem me, quàm plurimis fortasse rem gratam facturū, si his notis commentariis ipsam quoque inseram, hic locus visus est, vbi commodè de ea aliquid dicam. Morsus igitur diaboli: herba est locis incul 55  
tis proueniens, salicibus, ac etiam interdum pratis, & dumetis. Foliis constat plantaginū, quam vulgò lanceolam vocant, similibus, lauioribus tamen, & quæ circa caules, qui ad binum cubitorum longitudinē assurgunt, exant breviora, angustiora, leniterq; per ambitū facinorata. Floret æstate, scabiosæ vocatæ modo. Multifidas habet radices, nigricantes, succifas, & circumfusas:

Anagallis  
du consti-  
deratio.

Anagallis  
dum viret  
ex Gale.

Morsus  
diaboli hi  
An. 26. G.  
res.



fas: unde superstitionum nomen inuenit. Siquidem scripserunt nonnulli superstitionibus dediti, quos credulum vulgus sequitur, cacodæmonia ob tantę efficacię radicę inuidere hominibus, atq; hac de causā, vbi succreuerit, statim eam vndiqueque denticibus succidere, & circum rodere: tanta est hominum superstitio. Herba hæc si viridis cruda, triticę carbunculis pestiferis imponatur, præsentaneo remedio (vt aiunt) eos sanāt, aut si vinum, in quo decocta fuerit bibatur. Radix per se estur, aut eius de-

cocti vinum vtiliter bibitur non modò ad vteri dolores, sed etiam ad pestilentem auram arcedandam. Gustu admodum amara est: ex quo perspicuum esse potest, eam esse calidā, & siccā facultatis. Siccatę puluerem præbent plerique ad alui tinas necandas, ac eadem sugillata illitu emendant. Herba, quę *hayan* Nomine. Græcè, Anagallis quoque Latine vocatur: Italicę, Anagallide: Germanicę, Gauch heyl: Hispanicę, Muruges: Gallicę, Morgelline, & Mouron.

HEDERA HELIX.



HEDERA. CAP. CLXXV.

HEDERA differentias multas in specie sortitur, summas autem genere tres. Nam quædam candida est, altera nigra, tertia helix. Cãdida fructum fert candidũ: nigra nigrum, aut croci æmulum, quam vulgus Dionysiam vocat. Helix fructum non gignit, sed tenues habet viticulas, & folia parua angulosa, & t̄ rubra. Hedera omnis acris est, & adstringens. neruos tētat. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in vino bis die potus: ambustis cum cerato tritus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta. aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum, & corymborum succus, cū irino vnguento, melle, aut nitro, naribus infunditur: & contra veteres capitis dolores, caput eo cū aceto, & rosaceo perfundi vtile est: purulentis auribus, aut dolentibus, cum oleo medetur. Nigrę hederę succus, aut e poti corymbi, corpus infirmant, mentēque turbant largius sumpti.

HEDERA ARBOREA.



Acini quinque triti, calfactique in punici mali cortice cum rosaceo, si inflantur à contraria aure, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in vino decocta illinuntur omniũ vlcerum generi etiam si cacoethe sint. vitia cutis in facie, & am busta sanant, vti autea diximus, decocta. Mouent menses triti, & subditi corymbi: iidem poti, post purgationes sceminarum, drachmę pondere, concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorum melle irrigatus, ac vuluæ inditus, menstrua, & partus extrahit. Insillatus succus putrida tædia narium, graueolentiãque emendat, & sanitati restituit. Lacryma hederę psilothrum est: illitu pediculos enecat. Succus radicum in aceto potus, contra phalangia prodest.

HEDERA, cuius hic tria tantũ summa Hederae genera fecit Dioscorides, et si plures eius in spe siteratis, cie differentias esse restetur, planta est vulgaris et genera notitiæ. Verũ si quis Hedera plura genera nolle

noſſe deſiderat, non fortaſſe Plinio contentus, licet de ipſis abunde diſſeruerit lib. x v i .cap. x x x i i i .legat Theophrastum li. i i i .cap. x v i i .de plantarum hiſtoria, vbi hederæ ſigillatim ſpecies diligentiffimè perſequitur, & de iſis copioſiſſimè pertractat: vel potius ipſum audiat, nã hæc quæ ſequuntur, ipſi ad verbũ accepta referimus, qui loco citato ſic habet. Hederæ quoq; multigena eſt: quædam enim humi repens, quædam ſe in excelſum attollens: & excellarum genera plura, ſed tria ſumma preſentent, candida, nigra, terciaq; helix, id eſt clauicula. Horum item ſpecies plures: quippe alia fructu tantũ candida, alia etiam foliis: turſus fructum candidum ferentium, alia maiuſculum, denſum, & velut in globum circumactum fructum proſert, quam corymbiam quidam vocarunt, Athenieſes acharnicam rigum eam appellãtia maiorem, ſparſioremq; modo nigra. Habet nigra differẽtias, ſed non hunc in modum conſpicuas. Sed helix differẽtias maximis diſcernitur: etenim foliis plurimũ diſtat, cum paruitate, tum quod angulata, concinnioraq; ſint: cum hederæ rotundiora, ſimplicioraq; habeat. Diſtant etiam internodiũ longitudine, atque etiam ſterilitate, quoniam fructum quẽdã non ferant: quod non in hederam tranſiguntur, vt quidam volunt: verò ſi omnes hederæ ſcant, vt aliis placeat, atatis, certè diſpoſitionisq; nõ generis erit diſcrimen, quẽ admodum pyri ad pyraſtrum. Tamen eius quoque folium multũ ab hederæ diſtat, verũ id rarum, & in paucis euenit, vt veſtuſſe permittetur, ceu in populo alba, & crotonc. Ergo helices plura genera, ſed quæ conſpectiora, ſummaq; occurrant, tria ſunt. Herbacea, quæ plurima eſt: ſecunda candida: tertia verſicolor. quam Thraciam quidam appellant. Et harum quæq; diſtare videtur, quippe herbacea: quæda folio tenuiori, oblongiori, atq; etiam denſiori: quædam minus hæc omnia habens. Et in verſicoloris genere, alia folio ampliori, alia minori, macularumq; habitu diuerſa: pari modo & magnitudine, coloreq; diſtat. Aucta perſicilis herbacea, inq; plurimũ venit. Maniſſe eſſe quæ hederæ ſcant, affirmat, non tantũ foliis, quæ maiora, latioraq; habet, verũ etiam germinibus: protinus enim erecta gerit, non inflexa gracilitate, & longitudine. Herbacea verò craſſiora, breuiorq; . Ac hederæ, vt ſemen proſerre incipit, germen ſublime, reſectumq; edit. Et quidem vniuerſa hederæ radice numeroſa, denſa, flexuoſa, ſiriculoſa, craſſa, nec nimis alba, ſed præcipue nigra, & inter cãdidæ, quæ aſperima, immiſſiſſimæq; habetur. quãmobrem elus amplexus arbores omnes inſeſtat, omnes enim necat, & exicat, abſtato alimẽto. Craſſatur hæc maiorem in modum, atq; arboreſcit intantum, vt per ſe ipſa hederæ arbor fiat. Attamẽ ex maiore parte ſem per ſuper aliud vitam degere ſolet, atq; (vt ita dixerim) amplexicaulis eſt, ita pro ſua natura, vel quiddam eiufmodi illico gerit. Nam è ger-

minibus radículas aſſiduè inter folia mittit, quibus arboribus, murisq; obrepit, quaſi de induſtria à natura exhibitus: atq; ita humorem auferens, exhauriensq; areſcit. Et ſi inferius ſuccidatur, nihilo minus viuere, durareq; poteſt. Habet vel aliud diſcrimen nõ mediocriter in fructu: nam alius dulcis, alius vehementer amarus, tam in cãdida, quàm in nigra. Indiciũ, quod alium aues mandunt, alium mĩmẽ attingunt. Hederæ ita ſe habet. Hactenus Theophrastus de hederæ generibus. Hederæ (vt auctor eſt Galenus *Hederaſe lib. v i i . ſimpl. med.*) ex contrariis compoſita cultates eſt facultatibus: habet enim quiddam adſtrigentis ſubſtantie, quam tẽrenam, & frigidam eſſe oſtendimus: habetq; etiam nonnihil acris, quam calidam eſſe vel guſtus comprobat. Nec deſt tertia: quænam nanq; ſubſtantiam quãdam repidam obtinet, certè ſi viridis ſit. Siquidem dum areſcit, hæc prima exhalat neceſſe eſt, manetq; quæ terra eſt, & frigida, adſtringens, & ea quæ calida, & acris Hederæ, quæ ita Latinis, Græcis *μαρτή* nominatur: Mauritanis, Cuſſus: Italici, Hederæ: Germanis, Mauer, Epheu bauum, Epheu: Hiſpanis, Era: Gallis, Lierre.

† Non ab re quidem ſuſpicandum eſt (vt doctiſſimè adnotauit Marcellus) huic loco in Dio ſcoride mendum ſubefſe, & quod nõ *ipſe*, hoc eſt, rubra, vt habent vulgari codices, legendum ſit, ſed *ipſe quædam*, id eſt, concinniora. Nam præter alias rationes, huic lectioni adſtipulatur Theophrastus, qui libro i i i . cap. x v i i . de plantarum hiſtoria eo nomine hederæ helices ſolia deſcribit.

CHELIDONIVM MAIUS.  
CAP. CXXXVI.



CHELIDONIVM maius, caule eſt gracili, cubitali, aut altiore, agnatis folioſis: foliis rariuſculi, mollioribus tamen, & colore caſiis: flore viola albæ, ſecundum ſingula folia prodeunte. In eo ſuccus cro-

ci, mordax, acris, & aliquantulum ſubamarus, grauiter olens. Radix ſuperne ſingularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratur. Siliqua, ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram longa: in qua ſemina papaueris ma-

ius recluditur. Succus in æreo vase, cum melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Foliis, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & siccat in vmbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso, & vino albo pota, medetur regio morbo, & vlcibus quæ serpunt: imposita cum vino, aut man-  
 10 ducata, dentium dolore sedat. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, quod aduentu hirundinum exoritur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirundines matres excæcatis pullis, admota herba, visum restituere.

## AQUILENA.

*Chelidonium  
maius  
sideratis.*



*Vanitas  
chymistæ  
rui.*

**CHELIDONIVM**, quod maius cognominatur, vulgò in Hetruria Celidonia dicitur. At imperiti, præsertim chymistæ, quæ multorum stultitia est, quod Græci nominis vim ignorent, nō Chelidonium, quod Latine nil aliud, quam hirundinaria significat, sed Cali donum appellat. Qui postea falsa nominis præstantia freti, ex  
 30

hæc herba quandam quintam essenciam fieri prædicant, non modò suis vanis alchymicis imaginationibus accommodatissimam, sed ad tuendam etiam hominum sanitatem, morbosque quam plurimos profigandos vilen. Provenit Chelidonium ubique in Italia propter sepes, in scrobium ripis, secus vias, inter rudera, & in ædificiorum ruinis, seu parietinis. Sunt, qui Chelidonium maius vocent herbam quam aliqui **AQUILENAM**, alij Aquilegiam nominant: foliis ferè chelidonii maioris, paulò tamen rotundioribus, ac mollioribus: caule cubitali, recto, tenuique: in cuius cacumine flos emicat purpureus, à quo quatuor exeunt cornicula, reflexa, ac intus vadique concava: semine atro, in capitulis recluso, melanthij modo. Sed quibus hæc viribus prædita sit, hæcenus neque mea, neque aliorum experientia comper-  
 40 tum habeo. Chelidonii maioris meminit Gale-nus lib. v 111. simplicium medicamentorum, ubi hæc scribit. Chelidonium maius extergentis admodum, & calidæ facultatis est. Sed & succus eius ad acuem vsum commodus est, utique in quibus crassum quiddam in pupillis

*Aquilina.*

*Chelidonium  
maius  
res. ex Gale-  
no.*

colligitur, digestionem, atque diffusionem indigens. Vñ sunt quiddam radice eius ad morbum regium à icteris obstructione proficiscens, in vino albo eam potui exhibentes cum aniso. Pari modo mansa dentium doloribus confert. Id *χελιδόνιον* Græci, quoddam Latini Chelidonium maius, vocant: Mauritan, Kaurouch, Chelidonium, Chilodomonoma, & Memirani: Itali, Chelidonia: Germani, Schelidutz, & Schelkraut: Hispani, Celiduenha, & yerua de las golundrinhas: Galli, Chelidoine, & Esclere.

*Nomina.*

**CHELIDONIVM MINVS.**  
CAPVT CLXXVII.



**CHELIDONIVM** minus, quod triticum sylvestre aliqui nuncupant, herbula pediculis ab radice pendens, sine caule: foliis hederæ, multò rotundioribus, & minoribus, teneris, & subpin-

guibus. radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in granorum tritici modum accuratim congestas: quarum tres, aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas, & lacus nascitur: vis ei acris, & anemones modo summam cutem exulcerat. pforas, & scabros vngues eximit. Succus radicibus expressus ad purgandum caput, naribus infunditur. Decoctum eius ex mellegargarizatum, magnificè id præstat: & omnia pectoris vitia extrahit.

**PLANTA**, quam omnes ferè rei herbarie periti Chelidonium minus appellant, omnibus  
 50 Italæ locis, verno dantaxat tempore, frequens sideratis, gignitur, vliginoso præsertim solo, & in scrobium, fossarumque marginibus: foliis hederæ minoribus, rotundioribus, ac subpinguibus, sine caule: flore luteo, cuius non meminit Dioscorides, tenui pediculo appenso. Radicibus nititur compluribus, ex eodem callo prodeuntibus, pusillis, in granorum tritici modum accuratim congestis, quarum nonnullæ tantum in longitudinem progrediuntur. Herba hæc breui deperditur: quippe quæ vere  
 nascitur

nascatur, & arescat. Sunt qui hanc Scrophulariam minorem appellant, à radicum similitudine, vt quæ multis granorum tritici grumulis, veluti strumis, quæ Græca imitatione scrophulæ vocantur, coaluisse videantur, quanquam alij ex hoc potius sic dictam putant, quod strumis, siue scrophulis (vnde quidam asserunt) imposita medeatur. Nostris tamen in Hetruria vulgo vocari Faustello putarim, quod fabarum modo folia subpinguia proferat. Nec ea aliunde sibi Chelidonij nomen vendicasse existimatur, auctore Theophrasto lib. v i i . c a p i . x i i i . de plant. histor. quam quod hircundinum adueniunt florem exciet, quemadmodum & chelidonium maius. Verum an hæc sit Chelidonium minus, cuius meminere Dioscorides, & Galenus, non parua videtur esse dubitatio: quod nullam prorsus nec foliis, nec radicibus præ se ferat acrimoniæ, cum tamen acerrima, & mordax esse deberet, longèque magis, quàm chelidonium maius: quandoquidem, Galeno teste, Chelidonium minus cutem exulcerat, & exal facit ordine quarto. Id quod satis manifestè ostendere posset, hanc non esse Chelidonium minus: nisi quis in hoc illud dixerit, quod de Aro scriptum reliquit Galenus libro i i . de alimentorum facultatibus. Nam facillè contingere potest, quod quemadmodum arum Cyrenis minimum medicamentosi, minimumque acrimoniæ possidet, adeo vt in cibis vel rapis vitilius habeatur, in Italia verò, ac minori Asia contra adeo acre, vt medicamentis duntaxat expectatur: ita & Chelidonium minus, quod in Italia nascitur, minimè acrimoniæ sortitur, quod verò in Græcia prouenit, acre admodum sentiat. Siquidem excepta acrimonia tantum, nostrati nihil præterea deesse videtur, quin legitimum Chelidonium minus dici queat. Ex quo facillè adductus sum, vt credam, quod quantum in Italico desideretur acrimonia, non tamen id esse Chelidonium minus distitendum est: tamen si inficiis ire non liceat, nostrum Chelidonium minus, quod omnino acrimoniæ sit expertus, in morbis haudquaquam conuenire posse, quibus illud conferre, quod in Græcia gignitur, tradiderunt Dioscorides, & Galenus. Nam hac deficiente qualitate, necesse quidem est, vt & vires, quæ illam consequuntur, deficiant, & pereant. Hinc igitur fit, vt non possim ego subscribere iudicio Fuchij viri alioquin eruditissimi, qui in libro de compositione medicamentorum, quem auctum secundò excudit, Chelidonium minus censet alteram Malacocitidis speciem. Quinimo eius opinio mihi resellenda videtur, quod planta illa nullis ferè notis aliquam mollem hederam referat. Ea quidem foliis hederam quodammodo æmulatur, sed quod magis attendendum erat viticulis non profert, quibus humi repat: id quod hederæ cuique natura tributum est. Minoris chelidonij vires memoriæ prodidit Galenus libro v i i i . simplicium medicamentorum, sic inquitens. Che-

lidonium minus, cum acrius sit maiore, celeriter illitum cutem exulcerat, vngueque scabros efficit. Succus eius per nares purgat, vt pote admodum acer. Itaque hæc herba quarti ordinis fuerit absoluti tam, idque tum in cassaciendo, tum in siccando. Herba hæc Græcis *χελιδονίον* dicitur: Latinis, Chelidonium minus: Mauritanis, Mamiren, & Chlodomon: Italis, Celidonia minore, & Faustello: Germanis, Feiguuartzen, Blanterkraut, Pfafenhoedlin, & Meienkraut: Hispanis, Serosularia menor: Galis, Couillons de prestres, vel, Petite Esclere.

## O T H O N N A .

## CAPVT CLXXVIII.

O T H O N N A aliqui maioris chelidonie succum esse aiunt: quidam glaucij: alij succum floribus corniculati papaueris expressum. Alij permistos caruleæ anagallidis, hyofcyami, & papaueris succos esse contendunt. Alij Troglodyticæ cuiusdam herbe succu, quæ othonna vocatur: nascique eam in eo Arabiæ tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna foliis erucæ, perforatis cribri modo, & veluti à tineæ drosif, squalore obstitis, paucis: flore croci, latifolio: quare quidam anemones speciem esse putauerunt. Extractus succus oculorum medicamentis adicitur, vbi expurgare est opus: mordet enim, & absterget omnem caliginem, quæ oculis offunditur. Tradunt humore quendam ex herba emanare, qui elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affirmant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, areo colore, gustu cum feruore quodam, & adstrictione, mordaci.

O T H O N N A Dioscoridi fuisse incognitam, illud nobis manifesto argumento esse potest, quod nihil ex se de ea cerui scribat, sed omnia aliis accepta referat, ex quorum tantum opinione sâmaque hæc de Othonna memoriæ prodidit. Quare mirari non licet, si nostra quoque grate Othonna minimè cognoscatur. Hanc cum admisceat Paulus suis medicamentis, afferit quibusdam in locis maioris chelidonij succum esse, eorum fortasse opinionem secutus, qui ita scripserunt, vt refert Dioscorides. Eius nomen Græcum *ὄθοννα*, Latinum item, & Italum Othonna:

Nemina.

Othonna  
considera-  
i

Nemina.

MYRICVLAMVRIS.

GLASTVM. CAP. CLXXX.

CAP. CXXXIX.



MYRIS auricula, quā myo-  
 sorida vocant, herba est cauli-  
 bus pluribus ab vna radice, a-  
 liquatenus ab imo rubētibus,  
 & concavis: foliis angustis, ob  
 longis, dorso acuto, elato,  
 nigricantibus, per intervalla  
 absidue gemina

tis, atque in mucronem desinentibus,  
 & tenuibus cauliculis ex alarum sinu  
 prodeuntibus: flosculo, vt anagallidis,  
 caruleo: radix digitali crassitudine,  
 multis capillamentis fibrata. Radix il-  
 lita ægiloplia sanat. Sunt qui alfinem,  
 muris auriculam vocitant.

Auricula  
 muris co-  
 deratio.

REPERIUNTUR quidam Dioscoridis  
 codices, qui hoc loco Alfinem habent, quæ  
 libro quarto post helxinem describitur, quod  
 & ipsa nonnullis Muris auricula appelletur.  
 Qua forsitan nominis cognatione adducti, pos-  
 teriorum quidam, ex quarto Dioscoridis vo-  
 lumine in hunc locum ipsam transfudere, vbi  
 sui generis, vel potius nominis alteram repræ-  
 sentauit Dioscorides. Sed quoniam ipsa Dio-  
 scoridis scribendi series clarissime demonstrat,  
 Alfinem statim post helxinem sequi debere,  
 quod ei adeo similis sit, vt tradat Dioscorides  
 eandem fuisse cum helxine, nisi humilior esset,  
 idcirco libro quarto de ea nobis dicendum erit,  
 quod inibi eius legitimam sedem esse existime-  
 mus. Cæterum hæc, de qua hic mentio est,  
 passim mense maio floribus ornata visitur,  
 nimirum in pratis, in campis, in hortis, secus  
 vias, & vbique ferè locorum. Huiusce vires  
 paucis perstrinxit Galenus libro v. i. simp.  
 med. sic inquit. Auricula muris desiccata or-  
 dine secundo: cæterum nullam euidentem sa-  
 linitatem possidet. Ea Græcè *αὐρίκη* vocatur

Nomina.

Latine, Auricula muris: Italice, Orecchia di  
 topo: Germanicè, Vualde mangolt mit blau-  
 uen bluomen: Hispanicè, oreja de raton  
 yerua: Gallicè, Oreille de Ratte.

SATIVVM Glastum, quo insectores  
 lanarum, vtuntur, folium habet plan-  
 tagini simile, verum pinguius, nigrius-  
 que: cuius caulis duum cubitorum al-  
 titudinem excedit. Illita folia tumores  
 omnes discutunt, cruenta vulnera glu-  
 tinant, sanguinis profluvia sustinent ignem  
 sacrum, phagedanas, putrescentia vice-  
 ra, & quæ serpunt, sanant. Syluestre  
 glastum satiuo simile est. Folia fert ma-  
 iora, lactucaceis proxima: caules te-  
 nuiores, multifidos, quadamtenus ru-  
 bentes: in quorum cacumine folliculi  
 multi dependent, quandam linguarum  
 effigiem referentes, in quibus semen  
 flore tenui, luteo. Eadem, quæ & su-  
 prædicta, præstat: potu, & illitu lenio-  
 sis auxiliatur.

ISATIS satiuæ, quam in Hetruria vulgò  
 Guado appellamus, tingendis lanis fullonibus,  
 & insectoribus maxime expetitur, quod lana-  
 rum insectus, quibus cum admiscetur, firmet,  
 & nunquam deperdi patiatur. Huiusce maxi-  
 mus habetur proventus in Vmbria circa No-  
 cceram, vbi oppidum est Guadum idem appella-  
 tum, quod ibi Isatis frequentissima seratur.  
 Glastum syluestre Plinio inter syluestres lactu-  
 cas recensetur lib. xx. cap. v. i. quippe quod  
 illi non sit ab simile. Fit ex Isatide caruleus ille  
 color pictoribus expetitus, quem Indicum vo-  
 cant, de quo diffusius lib. v. suo loco differemus.

Meminit vtriusque Isatidis Galenus lib. v. i.  
 simpl. medic. sic inquit. Hæc satiuæ, qua  
 vtuntur tinctoribus, facultatis est valenter exsic-  
 cantis. nondum tamen mordentis: est enim simul  
 amara, atque adstringens. At Isatis syluestris  
 manifestè iam acre quiddam tum gustu, tum  
 actione præfert. Proinde quàm satiuæ valentius  
 desiccans, valentius etiam humidis putredini-  
 bus obstitit. Planta Græcis *ισατίς*, Latine  
 Glastum satiuum nominatur: Italis, Guado  
 domestico. Quæ verò Græcis *ισατίς ἁγρία*,  
 Latinis Glastum syluestre, & Italis Guado sub-  
 uatico appellatur. Vtrumque Glastum vocant  
 Mauritanii Dili, Dileg. Vesine, Chare, Charis,  
 seu Alchar, Adlen, aut Adhlen, & Nil: Ger-  
 mani, Vuedic: Hispani, Pastel: Galli, Pastel  
 de Languedoc.

Nomina.

TELEPHIVM.  
 CAP. CLXXXI.

TELEPHIVM herba portulacæ si-

ISATIS SATIVA.



ISATIS SYLVESTRIS.



millis, & caule, & foliis: alas binas in singulis foliorum geniculis annexit: ramuli à radice feni, septenive prodeunt, foliis referti caruleis, crassis, lentis, carnofis: flore luteo, aut candido. Nascitur in cultis, & maximè inter vites tempore verno. Folia fenis horis illita albam vitiliginem sanant: sed postea hordeacea farina illini debet. perunctam ex aceto etiam in sole vitiliginem tollunt: sed vbi inaruerunt, absterguntur.

*Telephij  
considera-  
uo.*

QUANQVAM non defunt rei herbarie periti, qui existiment, Telephium eam esse stirpem, quam quidam Fabariam, alij Fabam

FABARIA.



*Telephij  
vires ex  
Gal.*

pingue seu crassam, quidam verò Fabam inuersionem appellant, cum tamè nulla reperiatur qualitate prædita, quæ absterforiæ, siccantisq; facultatis particeps dici possit, ut Galenus Telephium esse testatur, foliaque profertur portulacæ lōgè maiora, eorū sanè sententiæ planè aditū pulchrum non ausim: ita metū ea compluribus notis Telephij referre videatur. Telephij vires

memoriæ prodidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, vbi ita scribit. Telephium exiccandi, & detergendi facultate est, non tamen insigniter calida: verum in hoc forsitan quæspiam ipsiū primi esse ordinis censet. Desiccatur tamen secundo ordine intenso, aut certè principio tertij: proinde ad putrida vlcera conuenit, & leucas, & alioscuma aceto sanat. hæcenus Galenus. Ceterum illas quidam Telephij qualitates haud reperiens in Fabaria nostrate, etiam hæc (ut paulò antè diximus) notis pluribus proximè ad Telephij historiam accedat, ut eius pictura, quam hic damus, apertè satis demonstrat. At si facultates tantum obstant, quò minus ea plantata Telephium & esse, & dici mereatur, in hoc illa ratio non parum ponderis habitura est, qua superius ostendimus, verum Chelidonium minus herbam illam esse, quam in eas mentione depictam exhibuimus. Nam si Arum, teste Galeno, iis caret facultatibus in Italia, quibus in Græcia præditum est, nil mirum videri debet, quòd & alix plantæ cum solo vires mutauerint suas, ut illi plantæ, & huic Fabariæ dictæ facillè euenisse suspicandum est. Velim tamen in his, ut in aliis quoque dubiis plantis, suum cuique esse iudicium. Herba, quæ antiquè Græcè, Telephium item Latine dicitur.

*Nam...*

LIBRI SECVNDI  
FINIS

PETER

# PETRI ANDREAE MATTHIOLI MEDICI

Senensis Commentarii,

IN LIB. TERTIVM PED. DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICA

MATERIA.

\* \*



**S**UPERIORIBUS, charissime Aree, commentariis, tradidimus de aromatibus, vnguentis, oleis, arboribus, earum fructibus, & lacrymis: item de animalibus, cerealibus, oleraceis, & herbis acrimonia praeditis. In hoc autem tertio radices, succos, semina, herbas, & quae vernacula, & inter se cognata censeantur, quaeque pluribus sciantur remediis, prosequemur.

AGARICVM.

CAP. I.

AGARICVM radix fertur aserpitij similis, sed facie summa solutior, & rariore, fungosoque tota contextu. Duo eius genera: semina, quae praefertur, rectis intus venarum discursibus constat: mas rotundus est, & vndique compactior. Vtrique gustus in initio dulcis, mox ex distributione in amaritudinem transit. Gignitur in Sarmatiae regione, quae Agarica dicitur. Sunt qui radicem esse plantae affirmant: alij ut fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine. Gignitur in Galatia Asiae, & Cilicia in cedris, sed friabile, & infirmum. Astringendi, calfaciendique



naturam habet. efficax est contra tormina, cruditates, & rupta: prodest itidem coctus, & ab alto deuolutis. Datur duobus obolis in vino mulso febrim non sentientibus: febriculis vero in aqua

mulsa: arquatis quoque, suspiriosis, iocineris, renumque vitio laborantibus, dysentericis. Item si vrina aegre reddatur, si vulua strangulatus vrgeat, si pallor membra decoloret, drachma vna dari solet: si tabes infestat, ex passo: si lien negotium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio stomachi est, ita ut cibi tenax non sit, manditur, & sine vlla humoris sorbitione deuoratur: simili modo acida ructantibus propinatur. sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum, & articulorum dolores

dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur: menses ciet: sceminis, quas inflatio vulvæ vexat, vtiliter aquali modo datur: horrores soluit, datum ante febrium accessiones: alium purgat, drachma vna, aut altera, si cum aqua mulsa bibatur: venenorum antidotum est denarii instar, cum diluta potione sumptum: si serpentes ictum vibrarunt, morsumque subfixerunt, tribus obolis ex vino potum, mirè auxiliatur. In summa, internis omnibus vitiis conuenit, pro viribus, & etate datum, nunc ex aqua, nunc ex vino: iis ex aceto mulso, aliis ex aqua mulsa.

*Agarici*  
*considera-*  
*tio.* **AGARICUM** fungus est in arboribus nas-  
cens. Plura de eo diximus libro primo in lari-  
cis arboris historia. Præstantissimum habetur  
in Tridentinis montibus, ubi sepius pro-  
priis manibus illud diuulsimus, adacta securi-  
cula. Cæterum tamen Plinius libro xvi. ca-  
pite 111. omnes glandiferas arbores Agaricu-  
m vere tradat, in Tridentinis tamen syluis,  
ac etiam in reliquis Italiæ locis, quod equidem  
viderim, soli tantum latici inascitur. In cedro  
Agaricum gigni, tum in Asia Galatia, tum in  
Cilicia scribit Dioscorides, nulla eius mentio-  
ne facta, quod in lauce ipsa, ac glandiferis (vt  
Plinius inquit) arboribus provenit. Fuchsius  
medicus etate nostra celebris in libro de com-  
positione medicamentorum, quem nuper au-  
ctum excudit, Agaricum ex Sarmatia per Illy-  
riam Venetiæ afferri tradit, & ex Galatia & Ci-  
licia Alexandriam, & ab Alexandria Venetiæ.  
eo fortasse argumento ductus, quod Dioscori-  
des auctor sit agaricum nasci in Sarmatia re-  
gione, in Galatia Asia, & Cilicia. Verum iam-  
pridem desit ex illis locis importari, vt testan-  
tur mercatores & pharmacopæi. Equidem com-  
pertum habeo, omne ferè agaricum, quod Ven-  
etiis venditur, partim deseri ex Tridentinis  
montibus, in quibus sunt sylvæ laticis refer-  
tæ, partim ex Vulturenæ agro, & aliis finitimi-  
s locis, partim ex Norico tractu. Neque certè vn-  
quam, dum ego Venetiis agerem, intelligere po-  
tui, quod agaricum aliunde conueheretur. Qua  
re adducor, vt purem, Fuchsiū virum alio-  
quin eruditissimum, in hoc planè deceptum  
esse. Agarici meminit Galenus sub quodam ra-  
dicis genere libro vi. de simplicium medica-  
mentorum facultate, ubi sic inquit. Agarici ra-  
dix, hoc est, quæ trunco inascitur, primo qui-  
dem gustu dulcis, sed paulo post subamara ap-  
paret: & acrimoniæ quandam speciem tempo-  
ris spatio inducit, læuiculæque adstrictionis est  
& consuetitæ lava. Ex quibus omnibus mani-

festum est, si quidem quæ superioribus com-  
mentariis dicta sunt, meminerimus, quod me-  
dicamentum hoc compositum est ex substantia  
aërea, & terrea à caliditate extenuata: porro mi-  
nimum habet substantiæ aqueæ. Hac ratione,  
& digerendi, & calcificandi vim habet, & crassi-  
tudinem incidendi, tum insarctus viscerum ex-  
purgandi. Proinde regio morbo laborantes san-  
nat, eos vtrique, qui sic ab insarctu iecoris labo-  
rant. Iuuat & morbo comitiali obnoxios eadem  
facultate, tum rigores per circuitum recurrentes  
ex crassiss, aut viscosi humoribus natos san-  
nat. Iuuat & morsos à bestiis frigore lædenti-  
bus, aut compunctis, tum foris in affecta parte  
impositum, tum intro in corpus sumptum pon-  
dere drachinæ vnius cum vino diluto. Est &  
purgatorium. Et libro primo de antidosis idem  
Galenus inquit. Agaricum fraudem nullam ad-  
mittit. optimum est læuissimum: densum verò,  
& graue, & lignosum deterrimum. Quod au-  
tem inter hæc medium est, quantum signis, tan-  
tum & viribus ab vtriusque distabit. hætenus Ga-  
lenus. De viribus Agarici Mesues quoque scri-  
psit, sic inquit. Agaricum deicit vtranque bi-  
lem, ac etiam pruritum ipsam: crassos, lentos, pu-  
trescentesque humores expellit. Eius propria  
facultas est cerebrum, omniūque sensuum  
organa, ac musculos expurgare: excrementa,  
quæ spinali medullæ pariter & nervis inhæse-  
runt, educere: pulmonem, ac pectus à lentis, ac  
putrescentibus humoribus detergere: ac dein-  
de ventriculum, iecur, lienem, renes, & in mu-  
lieribus vterum mundare. Præter hæc soluit  
Agaricum compaginem omnium contumacem  
materiam. Quapropter non mirum videtur, vo-  
casse Democritum agaricum familiarem medi-  
cinum, cum ad omnes corporis partes conformi-  
tatem habeat. Nam non imbecilles possident  
vires ad plerosque tum capitis, tum cerebri, tum  
eiusdem membranarum morbos: nempe diu-  
turnum dolorem, comitalem morbum, apople-  
xiam, vertigines, maniam, atram bilem, & cere-  
bri inflammationes. Est etiam morborum om-  
nium, quorum causa fuit obstructio, medicina  
admodum singularis, quæ fit, vt regio morbo  
affectis, æqua intereunte laborantibus, ac liene  
vexatis leuamentum præstet. Vrinam quoque  
pellit, ac menses commodè ciet. Coloris nito-  
rem Agarici vultu corpori commendat. Ven-  
tris tinea tum necat, tum deicit. Coxendicum  
doloribus conuenit, & diuturnas febres discuti-  
tit. Quod Græci ἀγάρικον, Latini quoque Aga-  
ricum dicunt: Mauriani, Garicum, seu Gar-  
icum: Itali, Agarico: Germani, Dannen schu-  
uam: Hispani, Agarico: Galli, Agaric.

Ex Mesue.

Fuch. la-  
p. 100.Agarici  
Gires ex  
Gakne.

## RHAPONTICVM. CAP. II.

**RH A**, aliqui rheum, Latini rha-  
ponticum vocant, provenit in iis, quæ su-  
pra Bosphorum sunt, regionibus, ex  
quibus affertur. Radix nigra, centaurio

Nemina.



magno similis, sed minor, & rufior, fungosa, aliquantū laevis, sine odore. Optimum habetur, quod terebines non sentit, si gestatu cum remissa adstrictione lentescat, manducatumq; colorē reddat pallidum, aut ad crocum inclinantem. Id eorum facit ad insatiationes, stomachi imbecillitatem, & omne genus dolores, ad conuulsa, rupta, lienosos, hepaticos, tormina, & renum, vesicae, & pectoris vitia, aduersus intentā praecordia, & vuluæ mala, coxendicum dolores, sanguinis excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & coeliacorum affectus, contra febrium circuitus, & venenatorum morsus. Datur in singulis valetudinibus eodem, quo agarium pondere, & cum eisdem liquoribus: si febris careant in mulso: sin aliter ex aqua mulsa: si tabem experiuntur, ex passo: si lienis exercet, in aceto mulso: si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione vlla deoratur. Liuentia, lichenasque tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omnes veteres ex aqua oblitum dissipat. Summa eius vis adstringens, cum aliquanto calore.

*Rhapontici confectio de ratio.* RHAPONTICVM officina Rheuponticum vocant. Quod nomen sibi adscivisse videtur à Rha fluvio regionem quandam Ponto conterminam præterfluente, in cuius fluminis ripis numerosum nascitur. Cuius rei testis est Ammianus Marcellinus libro x l i. suarū historiarū, ubi sic scribit. Tanais, qui inter Caucasas oriens rupes per sinuosos labitur circumflexus, Asiamq; ab Europa differens, in stagnis Mæoticis delitescit. Huic Rha vicinus est amnis, in cuius superciliis vegetabilis quædam eiusdem nominis gignitur radix, ad multiplices medelarum usus proficiens. hæc Ammianus. Legitimū paucis abhinc annis ad nos aduehi coepit. Nam multo antea tempore Rhapontici vice maioris centaurei radix in medicinae usum irreperat. Quæ etiam nostra ætate non

*Quorumdam de ratio.* defunt, qui Rhapontici loco vrantur, recentiorum inuenta respuentes, cum hæcenus legitimū Rhapontici neq; nouerint, neq; viderint: tanta est quorundā pertinacia. Credidere ad hæc peritissimorum medicorū quidam, præterito nuper auro, Rhabarbarum à Rhapontico Dioscoridis nullo discrimine differre. Quippe quoniam eorū temporis curriculo legitimum Rhapontici Italia non viderat. Quod cum pau-

cos post annos ad nos esset allatū, non desuere qui priorū reuocauerint sententiam. Id quod maximè palā facit Manardus Ferrariensis in suis epistolis. Quandoquidē is lib. v l. epistola l i. firma hac, & stabili ducebat opinionē, vulgare nostri vsus Rhabarbarum, & Dioscoridis Rhaponticiū & idem esse, & nihil inter se cognitione differre. Veruntamen cum postea legitimum conspexisset Rhaponticiū ē Moschouia allatum, quod Dioscoridis historiam notis omnibus referres, nouam statim induit opinionem, & priore, quam habuit, reuocauit, vltima quinti libri epistola ad Leonicum scriptens. Rhaponticiū primum vidi ego Venetiis in officina ad medici insigniū ē Constantinopoli allatum, ac deinde aliis pluribus in locis etiā ex Alexandria conuectum. quod nullis reclamantibus notis, verum antiquorum Rhaponticum refert. Inuehitur Auerroes lib. v. suarū collectanearū tum in Galenum, tum in reliquos, qui dixerunt Rhabarbarum facultate tantum adstringenti pollere, quod purgatoriam, quæ illi inest, facultatem minimè compererincum tamen Auerroes ipse sit maximopere carpendus, quod neque Galenus, neq; ceteri seniores Rhabarbari nostri vsus vsuq; meminissent, nec quicquam de eo posteritatis memoria prodiderint, tamen de Rhapontico à Dioscoride descripto plura tradiderint, inter cuius facultates nulla penitus, quæ purgando sit, inueniri potest. Rhapontici meminere, sub Rhabarbari tamen titulo, nisi interpretis (vt ferè suspicor) sit lapsus, cum Serapio, tum etiam Auicenna. quandoquidem non plures suo Rhabarbaro assignauere facultates, quam qui eos præcesserunt, Rhapontico assignauerint. Quippe quod eorum neuter scripserit, suum Rhabarbarum deiectionia facultate pollere. Id quod verum indicium præbet scripsisse hos de Rhapontico, non autem de Rhabarbaro. Quo fit, vt non ab re putandum sit, id euenisse interpretū ignorantia Rhaponticum in Rhabarbarum permixtum. Cognouit tamen legitimū (si fallor) ætatis nostræ Rhabarbarum Paulus Aegineta, cum ipse meminisset libro v l i. cap. x l i. in quibusdam medicamentis aduersus podagras, quorum cognomina sunt discorallion, compositio Agapeti, & compositio arctos. Verum non propterea credidit ipse, Rhaponticum à Rhabarbaro differre. Cuius rei auctor is sident manifestum facit libro primo capite x l i l i. ubi scribit, quod deoratur terebinthina resina oliuæ quantitate dormituri alui leniter molli, & quod id præstat efficacius, si Rheipontici momentum admiscetur. Ex quibus patet fit, per Rhaponticum Paulo Rhabarbarū designari, quod fortasse inter hæc existimauerit nullam intercedere cognitionis differentiam. quemadmodum credidere recentiorum quidā, de quibus paulo ante diximus. Paulo enim si Rheipontici, & Rheibarbari aliqua interesset differentia, ubi peculiariter de simplicibus

Vana A-  
mentosa ca  
lumnia ē  
tja Gal.

*Rhap-  
tici, et rha-  
barbari de  
serimen.*

bus mediamenti agit, de vtrorumq; facultate speciatim scripsit. Sed cum ibi tantum Pontici meminerit, indicium haud dubium est, illi Barbari, & Pontici nullam fuisse differentiam. Ceterum Ruellius eos acriter reprehendit, qui inter Rhaponticum, & Rhabarbarum nostrum discrimen faciunt, cum sua ferat opinio, alterum ab altero minime dissidere: atque si qua differentia reperitur, eam non aliunde provenire, quam regionis, ubi gignitur, diversitate, clementia vel inclementia cæli. Neq; alia ratione asserit, Ponticū nullo odore cōmendari, quā aquilonariū regionū, in quibus oritur, immani frigiditate: cū tamē Pōtica regio nō vsq; adeo sit frigida, vt Ruellij sentētia admitti debeat, sed vt potius tanquam inanis reprobata videatur. Quandoquidem sequeretur, quod cætera stirpium genera, quæ tam in oriente, quā in meridie odoris fragrantia cōmandantur, in aquilonari plaga: & in ipsa Ponti regione penitus inodora reperirentur. Quod tamē falsum esse semper crediderim: nam quantum stirpes omnes, quæ in aquilonariis regionibus oriuntur (de his, quæ natura odoratiores habentur, intelligo) ex climatum, & aeris algore, sint odore, ac cæteris qualitatibus imbecilliores, non ob id tamen harum qualitatum adeo expertes deprehenduntur, vt discerni nequeant: quin & in quolibet vsu, ubi scilicet conferant, non recipiant suis in regionibus. Quippe si ob frigoris, ac regionum inclementiam suas innatas qualitates penitus exuerent, adeo vt sola tantum forma remaneret, propriam omnino peruerterent speciem. Quod tamen nulla ratione, nec auctoritate probatur. Siquidem compertum iam pridem apud nos est, quod quanquam Celtica nardus, quæ à quibusdam Carinthiæ, & Stiriz alpiibus nobis asseritur, à quibus penè quatuor, vel quinque totius anni mensibus, nix colloquata laboratur; itemque acori radix, quæ nostro xuo ex Sarmatia Europæ glaciē, & niuib; maiore anni parte semper obducta, aduehitur in calami odorati vsu, odore tam valido, narsesq; feriente fragrare non deprehenduntur, quemadmodum Celtica illa nardus, quæ ex Liguria, & Istria deferitur, & acorum, quod ex Ponto, Syria, & Aegypto peclitur, non tamen ob hoc euenit vnum, quin suis propriis ac naturalibus fragrant odoribus. Quo fit, vt infirma æmodum, quantum equidem consilio, sit Ruellij sententia. Quare hinc nobis concludere liceat, Rhaponticum odoris expertum non esse, aeris, soli, & regionis algore, sed quod alia à Rhabarbarico, vel Indico sit plantæ. Declarant præter hæc, Rhabarbarum à Rhapontico plurimum distare purgatoria vis, quam natura ipsa Rhabarbaro largita est, odor narses feriens, compacta simul substantia, satureus color, ariditas, amaritudo, quæ gustu percipiunt, & ponderis grauitas. Quandoquidem Rhaponticum nullo odore commendatur, mi-

nime deiectionē molitur, cū potius adstringat, non est anarum, sed subacre, non aridum, sed lentum, non compactum, sed rærum, non ponderosum, sed admodum leue. Quibus rationibus fretus non temere asserendum putauerim, Ruellium hac in re magnopere hallucinatum fuisse, præsertim quæ cū dicat, nullo alio discrimine Rhabarbarum à Rhapontico differre, quā odore tantum. Vanum quippe videtur argumentari, Rhabarbarum, & Rhaponticum vnam & eandem esse radicem, quod forma, colore, ac specie nihil inter se distare oculorum sensibus appareant, cū tam in facultatibus, quā qualitatibus, maximè inter se differant. In simili errore versantur etiam ij (sunt enim qui ita sentiant) qui sibi falsò persuadent, abietis lacrymam à larigna nihil dissidere, ac vnam & eandem lacrymam esse, eo quod in colore, in substantia, ac in cæteris notis, in quibus perpendendis oculi tantum iudices sunt, adeo persimiles videantur, vt visibiles facultate altera ab altera discerni non possit. Verum si quis rem cæteris sensibus experiri aggrediatur, discernimus certior fiet: namque olfactu odoris fragrantiam haud insuauē, gustu verò amarorem in abietis lacryma compertiet, quibus larigna caret. Et quāuis iuniperi resinam à lentiscina discerneret, nisi rei ipsius incorruptus iudex fuerit gustus? Quis à strobilina resina, & à quibusdā gummi globulis istius ipsam agnosceret, nisi adulterium tum igne, tum gustu deprehenderetur? Tanta præterea intercedit similitudo inter pistacium, & vnguentariam glandem, vt nisi hæc amaritudinem gustui relinqueret, illud verò dulcedinem, difficillimum sanè fuerit alterum ab altera distinguere. Quid porro inter se similis reperitur, quā cassia, & cinnamomū, etsi hæc omnino specie non conueniant? Hinc facile adductum sum, vt nullius momenti eorum argumenta semper existimauerim, qui res secundum quādam tantum qualitates diiudicant, quibus etiam sepe decipiuntur, vt ij, qui hac leui ratione ducti, Rhabarbarum, & Rhaponticum idem esse contendunt. Meminit Rhapontici Galenus libro v. i. i. simplicium inedicamentorum, ubi de eius viribus ita scriptū reliquit. Rheum, quidam ipsum Rha nuncupant: mistam habet tum temperatam, tum facultatem. Habet enim quiddam terrestris frigidum, ceu indicio est adstrictio, & adiuncta est quædam illi caliditas: si quidem si pusculum mandatur, subacre conspicietur. Quinetiam aeris cuiusdam subtilitatis subtilis est particeps, quod indicat tum laxitas, tum leuitas: verum non minime & opera. Ob id enim licet adstringens, tamen non tantum conuulsis, sed & ruptis, & orthopnoæ prodest. Sic quoque lientia, & lichenas sanæ cum aceto illitum. Porro quod adstrictionis opera haud instrenua sunt, hinc discere liceat, quod sanguinem expuentibus, coeliacis, & dysente

*Ruellij, et  
aliquorum  
error.*

*Rhapontici  
Galenus  
ex Gal.*

dysentericis conferat: nec enim relucatur terrestri frigido tenue aëreum, imò eo quòd deducatur, & in altum perducatur, valentior effectus causa existit. Et in libro de antidotis primo: In Rheo, inquit, quoque stans committitur: nam quibus in locis nascitur, simul atque euulsum est, ipsum elixant, quò succum remittant, ac tam succum. vt syncerum. & aquæ immixtum, quàm Rheum exiccatum, vt non elixum ad nos postea mittant. Idcirco scire oportet adulteratum dignoscere. quòd facillimè ab his deprehenditur, qui Rheum sua sponte nascens viderunt. hætenus Galenus. Ceterum adulterium, quòd in Rheo fieri prodidit Galenus, id ( vt paulò post dicturi sumus ) de Rhabarbaro tradidit Mesues. Cui rari Rhei conficiuntur genera, nempe Turcicum, Barbarum, & Indicum, quòd & Sceniticum vocat, omnia si regionibus, à quibus conuehantur, cognominata, vel in quibus proueniunt. Quippe Turcicum nil aliud illi designatur, quàm Ponticum, vel quòd è Ponto ad Turcas vicinos deferatur, vel quòd ab his saltuosius conuallibus, in quibus ultra Tannin fluium priores Turcæ, Pomponij Melæ, & Plinij testimonio, venationibus ferè vixere tantum, iam pridem in Pontum fuerit delatum. Si quidem ab his non longè distat Rha fluius, circa quem Rha, quòd Ponticum postiori vocauere, probatissimò auctorem testimonio oriri certò scimus, fluminis illius nomine pariter appellatur. Quo fit, vt hac in re non dubitauerim errasse etiam Mesium, quippe qui inter Rhei genera alium ducentia Ponticum admiscuerit, à cæteris tum specie, tum facultate diuersum, quauis fortasse rectius id Turcicum appellauerit, quàm Ponticum. Porro Indicum ab India dictum, vbi frequentissimum prouenit, nemo est qui ambigat. Sed quàm ratione Sceniticum, & Indicum idem esse dixerit Mesues, hætenus compertum non habeo: nisi fortasse Sinicum rectius legendum fuerit, quòd à Sinis extremæ Indiæ populis ( vt arbitror ) deferatur eum plura quoque aromatum genera ea regio mittat. Id quòd manifestè idem declarat Mesues: quippe qui Scenicum, vel Sceniticum Indum esse affirmat. Scenitæ enim ( vt infra dicemus ) Indiæ populi non sunt, sed potius Sinis, à quibus Sinicum, non Scenicum, vt vulgata habet lectio, mea quidem sententia, vocari debet. Sunt tamen qui velint Scenicum, nec Indicum esse, nec à Sinacum regione oriundum, quòd à Mauritanis non Sinicum, sed Scenicum dicatur. Quamobrem eorum quidam, vt Adamus Lonicerus, in Arabia hoc nasci censet, & à Scenitis illius regionis populis Scenicum, siue Scenicum vocari putat. Fuchsius verò Mesuis opinionem securus, nullam inter Indicum, & Scenicum facit differentiam, quippe qui scripsit libro primo de cõpositione medicamentorum, Rheum Indicum esse vocatum, quòd ex India, aut locis Indiæ proximis, nempe à Scenitis populis, vt auctor est Stephanus de vrbibus

Persidis, deferatur. Verùm cum Scenitæ deserte Arabiæ populi omni aromatum genere sint destituti, cūque alerat Mesues Sceniticum rheum, & Indicum idem esse, cadit, peritque Loniceri opinio. Velim tamen si possem Fuchsi sententiam probare. Verùm cum Scenitæ etiam Straboni populi sint à Parthorum collegio Aulæ, & Maryanæ montes incole, dissenteque ab Indiæ sinibus milliariis plòsquàm mille & quingentis, nescio profectò, quòzmodo modo Indicum rheum à Scenitis Parthorum populis Sceniticum dici possit. quo fit, vt etiam Fuchsi opinionem longius sustinere nequeam. Ad hæc de Barbarici nomenclatura varia admodum est recentiorum medicorum sententia. Quandoquidem sunt qui velint sic dictum à Barbaria Aphricæ prouincia, sic vulgariter appellata, vbi olim Carthago clarissima habuit sedem. Horum opinionem sequitur Fuchsius, quòd scripsit libro primo de cõpositione medicamentorum, id verum fuisse Rhabarbaricum, quòd superioribus annis secum adduxere milites, qui cum Carolo Imperatore Tunetum expugnauerunt. Alij Barbaricum vocari credunt, quòd à Barbari Indiæ ciuitate, quæ intra Indi fluij fauces est sita, deue hi censent, rati Indicum, & Barbaricum idem esse. Alij autem à Barbaria Erythræi pelagi insula, sic appellatum existimant, quòd Indiæ naues, ac liburnicæ aromata deferentes magnum suæ mercis ibi iam pridem habuerint emporium, à quo per Arabicum sinum, traiecto prius angustio mari de Mecha, aromatum omne genus in Aegyptum per alias deserebatur nationes. Sed aliter se habet opinio nostra: quippe quòd semper existimauerim Rhabarbarum ex Troglodytica Aethiopie regione ad nos deferri, & ibi etiam oriri, quòd ea regio Barbarica antiquis fuerit appellata. Si quidem inuenio Galenum scripsisse tum libro vi. de simplicium medicamentorum facultate, tum libro i. i. i. capite vi. de tuenda sanitate, gingiber ex Barbaria ad nos conuehi: quòd tamen Dioscorides superiore libro, & Plinius lib. x. i. cap. vi. i. à Troglodyti deferri, & iu eorum regione nasci tradunt. Quinetià reperio, glandem vnguentariam, quam Galenus ex Barbarica regione adferri scribit, Dioscoridem libro sequenti in Aethiopia, vbi est Troglodytica regio, & Plinium li. x. i. ca. x. i. Troglodytis nasci posteritatis memorie prodidisse. Ex quibus sine liquidò constare puto, Troglodyticam regionem, & Barbaricam antiquis vnam & eandem fuisse. Huc præterea accedit alia Plinij auctoritas, qui libro iam bis citato, ca. x. i. vbi raritatis cinnamomi causam reddit, id accidisse scribit, incensis syluis Barbarorum ira. Nam cum, ipso inibi teste, oriatur cinnamomum in Aethiopia Troglodytis connubio permixta, non alias vtiq; gentes Barbaras appellasse credimus, quàm Troglodytas. Quamobrem & myrrham Troglodyticam appellauit Barba-

Rhei Barbarici nomenclaturam.

Rhei Turcici nomenclatura.

Rhei Indici nomenclatura.

ram capere x v r. eiusdem voluminis. Nec ab re quidem Galeno, & Plinio Troglodytæ Barbari speciatim dicuntur, cum scripserit Pomponius Mela gravissimus auctor librò primo de situ orbis, eos magis stridere, quam loqui, specus tantum subire, & ali serpentum carnis. Que sane omnia ita in mea me firmant opinione, ut certò credam, Rheum illud verè esse Barbaricum, quod ex Troglodytica afferatur regione. Sententiam nostram magis adhuc confirmare videtur Strabo, quòd lib. x v. sive Geographicè apertè testetur, ea omnia in aromatum, & plantarum genere oriri in Arabia, & Aethiopia, quæ in India australi proveniunt, quòd hæ regiones sole persimiles sint. Non placet igitur, ut dicam liberè quòd sentio, Fuchsij opinio ob prædictas tunc rationes, tum auctoritates, tum etiam quoniam apud nullumvisquam legimus ex ea Aphricæ parte, quæ vulgò dicitur Barbaria, Rha aliquod afferri, quod ibi prouenerit. Quin nec aliorum sententias comprobauerim, quonià nec illud, quod à Barbari Indiæ ciuitate nec illud, quod à Barbaria Erythraei pelagi insula aduehitur, rectè Barbari dici potest, cum ex India vtrunque petatur, & quòd nullus extet auctor, qui à Barbari ciuitate Rhabarbarum ferbat suam duxisse originem. Quare illud legitimum esse Rhabarbarum mea deum firma sententia est, quod ex Troglodytica Aethiopie regione fuerit aduectum. Quod facillè fortasse Veneti, qui quotannis in Alexandria nauigant, seligere possent ab Indico: quod certò scia, multa aromatum genera præter Indica eò ex Aethiopia, & felici Arabia per carouanas (ut vocant) comportari. Cæterum, antequàm de Rha barbari viribus agamus, illud in primis ignorandum non est, quòd falsa, ac vana sit vulgare, & aliorum quorumlibet opinio, qui sibi firmiter persuadent, Rhabarbarum violentum admodum esse medicamentum, & quòd propterea à medicis non exhibetur, nisi in deploratis ferè morborum affectibus. Siquidem (ut inferius clarissimè patebit) illud haud dubiè tutò & pueris, & vtero gerentibus mulieribus omnipotens, & ætate exhiberi potest. Atqui in eiusmodi hominum mentibus inualuit hæc inanis opinio: quoniam elapsis temporibus tanta Barbaricæ huius radiis extitit penuria (æquali enim cum auro pondere vendebatur) ut ad pretij magnitudinem euitandam, eam tunc nõ dedissent medici, nisi vbi morbos vel mortis periculo, vel diuturnis languoribus non vacare, certis signis coniecissent. Quo factum fuit, ut passim hac reprobanda opinione ducerent homines ad credendum, quòd in morbis curandis valentissimum, imò violentissimū omnium medicamentorum esset Rhabarbarum. Huius vires cæteris diligentius, latiusq; descripsit Mesues, sic inquit. Rhabarbarum innocens, clemens, & excellens est medicamentum, multas doctes medicamento purgante maximè expectat complexum. Præclit in omni genere In-

dicum, quod recens sit, colore subnigro rufescente, ponderosum, quanuis sua substantia rarum, & quòd cum frangitur, rufo, & glauco colore alternatè spectatur: item quòd mansum croceo insitit colore. Adulteratur autem, quod omnino te animaduertere cautius oportet, hoc modo. Accipiant impositores Rhabarbari multum, totumq; aqua macerant quinque diebus, exemptum deinde siccant, substatq; vi, & quasi anima vendunt. Aquam verò, qua maduit, igne, vel sole similiter siccant, & in passillos conformant ad regales vsus. Fraus cognoscitur, quod syncerum non vehementer adstringat, substantia rarius sit, & colore croceo insitiat. Adulteratum verò contrà se habet, coloris interni varietatem amittit, & subnigrat. Calefacit, ac siccet secundo ordine, est nonnulli primo tantum dicant. Constat tum aqueis, tum terreis qualitatibus, quæ adstringentem ei facultatem tribuunt, & eius substantiam conseruant. Est & aeris raritatem substantiæ conferentibus particeps. Nec igneis quidem experts est, à quibus amaritudinem, concurrētibus etiam terreis qualitatibus, acquirit. Ac ipsa terrestris qualitas in imo delitescit: igne verò in sublime fertur. quo fit, ut eius diuidantur qualitates cum aqua, aut vino perfunditur. Operatur autem in obstruktionē affectibus igneis tantum facultatibus: terreis verò, vbi adstrictione sit opus. Omni penitus noxa vacat, daturq; omni tempore, & ætate, adeò ut pueris ætate tenellis, & prægnantibus facillè exhiberi possit. Auget Rhabarbari vires caprinum serum, vel si maceretur intubi, vel apij, aut plantaginis decocto. Nulli memoria excidat, quin semper Indicæ nardi cantillum ipsi commisceatur, cum maximopere conferat. Addendum etiam semper erit vini albi odorati modicum, præsertimque vbi ad obstrukciones referandas paratur. Illud præterea memoriæ retinendum est, quòd scilicet in adulterato nulla deiectionia reperitur facultas. Synceri macerati expressio probè conuenit, vbi tantum abstersione, deiectione, ac infarctus liberatione sit opus. Quòd si post hæc functiones, viscera adstrictione roborante egerint, ipsum quidem in puluerem contritum exhibendum fuerit. At illud, quod igne torrefcit, vehementer operatur, ac vehemētius quod comburitur. Purum, selectum, ac substantia compactum, absque iactura in tenuem puluerem conteri potest. Rarum verò, ac laxum minimè, quoniam ex vehemēti, ac longiori contritione facillè euanescit, ac perditur. Resoluitur ite eius vis, cum aqua, vel vino decoquitur. Deicit Rhabarbarum nõ modo bilem, sed etiam pituitā ipsam. Eiq; propria facultas inest cum abstersigendo, tum etiam roborandi tam ventriculum, quam iecur, & eorum compunctiones amouendi. Clarificat Rhabarbarum sanguinem, obstrukciones aperit, ac omnes pariter affectus sanat, quos generant obstrukciones: nempe aquam intercutem, regium morbum, lienis crassitiem, ac diuturnas febres

Opinio  
falsa.

Rhabar-  
bari vires  
descrip-  
sit.

Sanguine reicientibus, ac eius à qualibet parte manationibus qualitate, ac facultate subtilitatis prodest. Datur etiam ab alto deuolutis, ruptis, & tam internè, quàm externè fractis maximo iuuamento, præsertimq; si vino austero drachmæ pondere commisceatur, addito synceræ mumie momento, ac etiam erythrodani radicis tantundem. Singulicentibus opitulatur, dysenteriam cohibet, præsertim quod igne sit torrefactum, addito tamen adstringente vino, & plantaginis succo. Vindicatur a carie, &

teredine annis tribus, vel quatuor. Verù si cera oblinatur, vel in melle reponatur, vel psyllij semine, vel milio sepeliatur, diutius inegrum, & syncerù seruari poterit. In Italia quorũ Rhabarbarũ quoddam in hortis, & viridariis passim reperitur, à peregrino nõ ab simile. quod etiam (vt à medicis fide dignis mihi relatum est) blem deicit, quanuis peregrino sit longè infirmius. Radix, quæ pæ, & pæ Græcis, Rha-ponticum Latinis appellatur: Arabibus, Ra-ued, seu Rauend: Italis, Rhapontico.

Rhabar-  
barum  
italicum.  
Famina.

GENTIANA.



GENTIANA. CAP. III.

GENTIANÆ inuentio prima assignatur Gentio Illyriorum regi, à quo cognomen habuit. Foliis partim proximè radicè, iuglandi, plantaginive similibus, subrubris: partim à medio caule, & præsertim iuxta cacumè, paulum dissectis, caule cauo, & leui, digiti crassitudine, geniculato, & ex interual-<sup>49</sup>lis maioribus foliato, binum cubitorum altitudine. semine in calycibus lato, leui, glumoso, satis ad sphondilij semè accedente. radice longa aristolochiæ, longa, crassa, amara. Nascitur in sublimibus montium iugis, vmbrosis locis, aquosisq; Vis radicis excalesfactoria, & adstringens: contra morsus serpentium, duabus drachmis, cum pipere, ruta, & vino pota auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deturbatis, ruptis, & cõuulsis prodest: hepaticis, & stomachicis, pota cū aqua subuenit. Radix collyrij modo

GENTIANA MINOR.



subdita, partus eiicit: imposita, vt lycium, vulneraria est, & vlcerũ cuniculatum depascentium medela. Succus præcipuè eodè effectũ prodest: oculis inflammatione laborantibus illinitur: pro meconio collyriis acribus immiscetur. Radix vitiliginè absterget. Succũ extrahendi ratio hæc est. Cõfusa radix quinque diebus aqua maceratur: postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices: vbi refrixit aqua, linteo excolatur: mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, siccilq; reconditur.

GENTIANA planta est vulgaris notitiæ. Gentiana  
Frequentissima excellis Tridenonitis montibus considera-  
prouenit, præsertimq; in Apanis, in quorum  
50 cacuminibus sæpius eius effodi radices brachiali crassitudine, & bicubitali longitudine. Hanc à Gentio Illyriorum rege inuentã, vnde illi nomen, non modò Dioscorides, sed aliorũ etiam veterum monumenta testantur. Plinio lib. x. x v. cap. v. i. ea est omnium præstantissima, quæ in Illyrico nascitur, vbi fortasse primũ inuenta est. Gentianæ vires paucis admodum perstrinxit Galenus lib. v. i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Herbe Gentianæ

Gentiana  
Eires.

cianæ radix vnde efficax est, vbi extenuatione, purgatione, absterfione, obstruccionis liberatione opus sit. Nec mirum, si hæc possit, cum impense sit amara. Hæc (vt Auicenna ait) excaustis ordine tertio, siccatis; secundo. Vrinæ, & menses ciet, & aduersus scorpionum ictus cæteris antidotis præstat. Eius aqua, præsertim quæ vase duplici balnei vapore vitreis organis elicatur, febres (vt ego sæpius expertus sum) ab infarctu tum viscerum, tum vasorum exci-  
 10 natas mirificè pellit. Alui tinea necar, maculasq; in facie qualescunque derergit, si ea frequentius maculæ abluantur. Est præterea quædam vulgaris etiam planta, aliquibus *C R V C I A T A* dicta, quæ non parua cum Gentiana cognationem habere videtur: quandoquidè & notis, & facultatibus illi plurimū respondeat. Vnde eos non longè aberrare crediderim, qui hanc Gentianam vinorè appellauerint. Hæc in incultis præcipuè locis nascitur, caule rotundo, dodrantali, ac etiam maiore, in cacumine rufescente, paribus ferè interualis ab imo ad summum geniculis interfecto: è quorū singulis alis bina prodeunt folia suppinguia, longa, vulgaris dictæ Saponariæ æmula, & Gentianæ foliis in summitate erumpentibus similia. Flores, qui purpureo colore nitent, in summo circum caulem in orbè excurrunt. Radix illi alba, longa, amarissimo gultu, locis pluribus ab vitro

*Cruciata  
considera-  
tim.*

ARISTOLOCHIA. ROTUNDA.



ARISTOLOCHIA. CAP. IIII.

ARISTOLOCHIA nomē ex eo sibi adoptauit, quod existimetur optimè puerperis opitulari. Tria eius genera traduntur. Rotunda, quæ fœmina vocatur, foliis hederaceis, præstati odore cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab vna radice germinibus, prælongisq; palmitibus: floribus candidis,

que latere crucis instar perforata: vnde illi Cruciatæ nomen indiderunt. Sunt etiam in hoc genere duæ altæ plantæ: sed longè minores, tenuibus radicibus, & caule admodum paruo. Harū, & prædictæ radices recentioribus magnis laudibus effertur contra pestilentiam, & venenosorum animalium ictus. Cæterum ego quidem illud experientia comperit habeo, quod radice tusa, & ventri emplastri modo imposita, vermes, qui in intestinis fuerint, procul dubio necantur: & viceratæ strumæ sanantur, si iis eodè modo contusa, quæ nuper effossa sit, vel secca, & in puluerem contrita adhibeatur. In summa non desunt, qui asserant, has eamnia præstare posse, quæ Gentiana, quod ex prædictis faciliè probari potest. Ananienfis rura Cruciatam vulgò vocant Pettimborsā. Ex quo quis conticiat, si lubet, hanc illis indigenis, corrupta Italica voce Metti in borsā, idè Pettimborsā nominari, quod tot viribus commendetur, vt perinde ac gemma, crumenis asseruari mereatur: aut quod tantum viribus excellat, vt medici ea venter ingentem argenti, & auri copiam crumenis sint reposituri. *versjans* plantæ sic Græcis, Gentiana similiter Latinis vocatur: Mauritanis, Gentiana, Gentiana basiliæ, seu basitæca: Italijs, Gentiana: Germanis, Entzian, Bitter vurtz, siue Creutzvurtz: Hispanis, Gentiana: Gallis, Gentienne.

*Cruciata  
vires.*

*Nomina.*

ARISTOLOCHIA. LONGA.



50 pilei similitudine, in quibus quod rubrū est, grauiter olet. Longa mafcula appellatur, nonnullis dactylitis: Iōgiore quàm rotūda folio: tenuibus ramulis, dodrantalibus: flore purpureo, grauiter olente, qui marcescens in pyri similitudinē turbinatur. Radix rotundæ in orbè cōglobata, rapi modo: lōgæ verò digiti crassitudine, & dodrantis longitudinem

radinem implet, nonnunquam paulo maiorem. Ambæ colore intus buxo, gustu amaro, & graui. Est etiãnum tertia longa, quæ clematris vocatur, ramulos habens tenues, reſertos foliis ſubrotundis, minori ſemperuiuo ſimilibus: flores rutæ: radices longiores, tenues, craſſo cortice, odoratoque veſtitis. Priuatim vnguentorum ſpiſſamentis conuenientes. Rotunda cæteris venenis reſiſtit. Longa verò aduerſus angues, & venena, drachmæ pondere ex vino bibitur, & illinitur. Potã cum pipere, & myrrha menſes, partus, & omnia vuluarum onera efficit: eadem efficit ſubdita in peſſo. Rotunda ad eadem pollet: in ſuper ſingultibus, ſuſpiriis, horroribus, lienis conuulſis, laterum doloribus, potã cum aqua, ſingulariter auxiliatur. Aculeos, & ſpicula extrahit: oſſium ſquamas illitu adimit, vlcera putrida exeft, & ſordida expurgat: cana cum iri, & melle explet: gingiuas, & dentes extergit. Clematris ad eadem polere creditur: viribus tamẽ inferior eſt.

*Ariſtolo-*  
*chia con-*  
*ſideratio.* ARISTOLOCHIAE, quam officinæ Ariſtologiam vocant, tria ſtatuuntur genera, nempe rotunda, longa, & clematris. Hæc rara admodum, & paucis notariſſimæ: verò omnibus ſerẽ rei herbariæ ſtudioſis notiſſimæ. Quæ rotunda vocatur, eſt non vbiq; in Italia proueniat, in agro tamen Gordienſi plurima, pulcherrimâ quæ naſcitur, præſtanti odore. Vtraque flores edit, & fructus: qui in longa pyri imaginem reſerunt, ſimilique inglandibus longẽ maiores: in rotunda verò rotundiores, pauloque minores iſteſtantur. Quam re non poſui non maximẽ Plinij admirari, quod li. x. v. cap. v. 14 i.

*Plinij &*  
*Leoniceus*  
*hap/er.* Vtranque ſerre baculas paruas veluti capreaſ tradiderit, niſi quis illud dixerit, quod Plinio contigerit, Ariſtolochiæ vtriuſque fructus vidifſe, priuſquam ad ſummam adoleuiſſent. Sed cerẽ iſ eodem in loco excuſari, meo iudicio, non poteſt, quin maniſeſtè hallucinatus, & Greci fermonis non admodum peritus deprehendatur, cum Ariſtolochiæ nomen dediſſe grauidas tradat. Quandoquidem non ab vterõ gerentibus mulieribus, ſed à puerperis Ariſtolochia (vt Dioſcorides ſcribit) yd nominis ſibi comparauit. Cuius rei non modò indicij præbet nomen ipſum *ἡ γυναικία*, quod nil aliud denotat, quàm optima puerperis, non (vt Plinius inquit) grauidis, ſed etiã ipſius facultas, quæ ad remorãtes à partu ſecundas, menſeſque ciendos magno-

pere commendatur. Quapropter fuerit hæc prægnantibus proculdubio exiſtale potius, quã ſalubre medicamentum, cum ea ſanẽ omnia, quæ ſecundas, & menſes educunt, fortum etiã trahant, & quandoque interficiant, præſertim cum fuerint amara Ariſtolochiæ modo. Nec minus præterea Leonicenum virum alioqui noſtræ ætatis doctiſſimum, ſaris admirari poſſum, quod dum nimio fortasſe aliorum errata corrigendi ſtudio, vel auſtitate datus, de cyclamino, & ariſtolochiis Plinium accuſat, in eandem, in qua Plinius, foueam ceciderit, aſſerens cum Plinio Ariſtolochiã à prægnantibus ſibi nomen adinueniſſe. Quod ne ſine auctore pronunſiaſſe videretur, Dioſcoridem quidem adducit, ſed eius hiſtoriam, quantum equidem ſentio, corrumpit, ac peruertit. Sunt ẽ recentiores Cordus, Adamus Lonicerus, & monachi illi, qui in Meſſium commentaria edidere, qui ſibi cerẽ perſuadẽt, eam eſſe Dioſcoridi Ariſtolochiã clematrim, *ἡ ἁπλοῦς*, quæ officinis omnibus paſſim longa cognominatur, argumento quod hæc radices proſerat admodum longas, & ſarmentorum modo prætenues. Quin & vt ſuam tueantur, ac magis roborent ſententiam, hoc in loco Dioſcoridis codicem omnino deprauatum eſſe contendunt, & vbi vulgata lectio habet, *καλὰ ἔχουσα ῥαχίς, ῥάχιδας ὑπερμακρύνει, καλὴν μικρὴν ἰσχυρὴν*, hoc eſt ad verbum, ramulos habens tenues, folijs ſubrotundis, ſemperuiuo paruo ſimilibus, non *καλὴν μικρὴν, ſed καλὴν μικρὴν*, quod aſaro paruo ſimilia ſint folia, legendum eſſe cenſent. Horum ſanẽ ſententiam nunquam proba- & potui, neque probandum arbitror, pluribus cõ rationibus, cum auctoritatibus adductis. Quandoquidem Orbiſſij lectio aliter non habet, quàm communis hæc Dioſcoridis, nec aliter legunt Serapio, & Auicenna. Id quod maniſeſtè offendit, hoc in loco Dioſcoridi nullam ſuſſe mendam. Adde, quod cum vnum tantum Dioſcoridi ſit aſarum, nec minoris aſari ſis vſquam, quod legatur, meminerit, abſurdum ſanẽ videretur, quod minori aſaro Ariſtolochiã clematrim comparasſet. Accedit & alia ratio, quod cum vulgaris Ariſtolochia longa rutæ flores nõ edat, clematris eſſe non poteſt. Præterea ſi Dioſcoridis lectionem accuratius perpendamus, nil aliud eſſe videtur longa officinarum, quàm longa Dioſcoridis: aut fortasſis eius ſpecies, cuius nulla, quod extat, ab antiquis facta ſit mentio. Quippe quod proſerat hæc ſola longiora, ſarioraque, quàm rotunda: ramulos dôrãtantes: ſtorem grauiorẽ olentem, qui ſeuẽntur edat pyri modo turbinaum. Nam quod fructum ferat clematris, non ſcribit Dioſcorides: nec folia longa, lataq; vt vulgaris habet Ariſtolochia, ſed ſubrotunda, & minori ſemperuiuo ſimilia. Ad ſicõ trã dixerit quipiã, longam vulgarem Dioſcoridis longam non eſſe, quoniam hos illi purpureus non ſit, ſed melius, & radix non palmaris,

nec digiti crassitudine, sed longior admodum, & longè tenuior. Huic facile responderi poterit, id locorum regionumque varietate evenire posse, & quòd natura cum horum coloribus in quàm plurimis ludat: quòdque vidimus etià nos Aristolochiæ longè plantam à Calabris allatam, radice (vt in theriacis scribit Nicander) cubitali longitudine, pollicari crassitudine: cui folia erant, quæ à nostratè longa nullo discrimine differebant. Ad hæc Clematidis radix Dioscoridi, & Plinio crasso contegitur cortice: quod tamen in longa officinarum, nostratèque non visitur, cùm tenui cortice perpetuò vestitur, odorè potius graui, quàm odorato. Quamobrem inclinare nunquam potuit animus, vt crederem Aristolochiam longam, cuius hic effigiem proximam, esse clematidum. Sed potius è deductus sum, vt suspicarer hanc fortasse esse Pistolochiam sic Plinio vocatam, quòd & ipsa puerperis commendetur. Nam præterquàm quòd hæc illi quarto Aristolochiæ generi assignetur, tenuior est, quàm clematidis, densis radicis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Illud mihi suspiciòne auxit, quòd viderim hanc præter etià aliam, quæ radice palmari, & crassitudine digiti li. constabat: sed in omnibus aliis partibus alteri ad eòdè per similes, vt nullam inter eas intercedere differentiam compererim. Sunt præterea recentiorum quidam rei herbariæ & studiosi, & periti, quibus persuasum est, non tamen sine aliqua ratione, quòd Aristolochiæ longæ præter clematidum quòd habeant genera: quarum altera sit radice (vt Dioscorides inquit) digiti crassitudine, & dodrantis longitudine: altera vero tenui ac longiore, quæ (vt aiunt) ab Andromacho & Gal. li. 1. de antidotis ἀνδρομαχοῦ κατὰ, hoc est Aristolochia tenuis appellatur. quin & hanc affirmant eam longam esse, cuius hic imaginem exhibuimus, cuiusque passim est vsus. Quo fit, vt pro certo existime hanc esse eam Aristolochiam, quæ in Andromachi theriacam addi debeat, Andromachi iunioris, & Damocriti testimonio innixi, quòd ij in theriacis còpositione huiusce tenuis tantum meminerint. Id quòd (vt dicunt) præ se ferre videtur, alterum etiamnum ipsius Aristolochiæ longæ genus esse præter clematidum, radice constans tenuiore ac longiore. Hoc autem comprobatum fuisse putant à Galeno lib. antè citato, vbi docēs quomodo nonnulla, quæ ab Andromacho seniori obituè tradita sunt, explicari debeant, ita scribit. Si quid adhuc aliud superest, quod minus dilucidè sit ab Andromacho seniori elegiacis versibus dictum, planum fiet theriacam legentibus ab eius filio soluta oratione descripiã. Quod enim ille Cecropium mel obscurius appellat, hic Atticum apertè nominat. Centaurium ille nulla adhibita distinctione in carmine pronuntiat, hic verò in prosa tenue apponit, eo quòd aliud quoque centaurium extet crassum

appellatum. Idem & in aristolochia fecit, cùm præter tenuem aristolochiam, alia quoque reperiat, quæ crassam radicem habeat, & rursus tertia, quæ rotunda. hæc tenus Galenus. Quibus nimirum verbis illi credunt aliter satis firmasse sententiam. Sed ego quidem aliam sentio vt qui putem, Aristolochiam tenuem non aliud Andromacho & Galeno fuisse, quàm clematidum cognominatam. Erenim vt omittam, quòd Dioscorides & Galenus non plura, quantum inuenim, quàm tria Aristolochiæ genera commemorant, nempe rotundam, longam, & clematidum, clematidis priuatim à Dioscoride Aristolochiæ longæ subscibitur, & quodammodo eius species constituitur, ramulis tenuibus, radicibus etiam tenuibus ac longioribus. Vt hinc facile nobis liceat conicere, Andromachum & Galenum non aliud supradicto loco per tenuem Aristolochiam intellexisse, quàm clematidum. Adde quòd si ad omnium qualitates & facultates spectes, sanè clematidis dignior est, quæ in theriacâ recipiatur. Hæc enim radicem habet, Dioscoride teste, cortice odorato vestitam, vnguento-û spissamentis conuenientem. Plinius deinde lib. x x v. capite v i i i. clematidum cæteris prætulit iis verbis. Tertium longissimæ tenuitatis, vitis nouellæ, cui sit præcipua vis, quæ clematidis vocatur, ab aliis Cretica. Et paulò post idem ait. Odor omnium medicatus, sed ob longa radice tenuiorque, gravior. hæc ille. Quibus vique ad stipulam videtur etiam Galenus libro v i. simplicium medicamentorum, vbi de Aristolochiarum viribus differuit, vt infra patebit in earum commemoratione. Quare nò est, meo quidem iudicio, asserendum, quòd Aristolochiæ κατὰ Andromacho & Galeno sit aliud quod quartum Aristolochiæ genus ita vocatum quandoquidem κατὰ hic nullum facit per se genus: neque solum tenuem indicat, sed etiam minorem, atque certè in longarum genere huiusmodi est clematidis. Cæterum si Aristolochia κατὰ nominata esset aliud genus per se, necessariò statuendum foret esse tertium quoque centaurij genus præter magnum & minus, quod peculiariter Græcis κατὰ vocatur. Sed hoc dupliciter falsum esse conuincitur. Primò quòd apud Dioscoridem, Galenum, aliòsque antiquiores qui de plantarum historia ac viribus scripserunt, nusquam plura, quòd equidem legerim, quàm duò centaurij generà scripta reperiantur, scilicet maius & minus. Secundò quòd constat, Plinio lib. x x v. ca. v i. centaurium cognomine leptum nullum per se genus esse, sed ea appellatione illud tantum centaurium describi, quòd à Dioscoride & Galeno minus appellatur. quin etiam idem de huius centaurij viribus ea omnia tradidit, quæ illi centaurio minori reddiderunt. Sed quid tot verbis opus erat, quibus nostram tuemur, & aliorum refelleremus sententiam? cùm huic

Pistolochia.

Alio opinio refutatur.



difficultati satis ferè facere possint verba ipsius Dioscoridis, quibus Aristolochiæ clematitidis radices expressit in hunc modum. *ῥίζα μακροτέρα* (μακροτέρα, quod est, longissimus legit Oribasius) *αἰσῶς*. id est, radices longiores, tenues. Vt vel ex his intelligi possit, haud absurdum esse, quòd aliquis Aristolochiam clematitidem etiam tenuem nomen, quemadmodum ab Andromacho seniori, & iuniori vocatam fuisse existimamus. Ex his itaque omnibus colligendum esse arbitror, quòd Aristolochia tenuis dicta ab Andromacho, non sit genus distinctum ab aliis, sed eadem cum clematitide: & quòd sub Aristolochiæ tenuis nomine clematitidem intellexerint Andromachus, & Galenus. Erit igitur, mea quidem sententia, Aristolochia clematitidis, vapore tenuiori, odoratio, & præstantior, in theriaca compositionem addenda: non autem illa longa, quam hic depictam dedimus. Quæ tamen à nobis fortè, rectius, Plinij Pistolochia censetur, ut supra dictum est: aut certe aliud Aristolochiæ genus veteribus incognitum. Veruntamen Fuchsius medicus clarissimus, suis de plantarum historia commentariis, aliam plantam Pistolochiam putat: quæ tamen (eius pace dixerim) à Plinij Pistolochia procul abhorret. Est enim Pistolochia Fuchsi mollis in vniuersum planta, quæ vere primo vni cum chelidonio exoritur, & matro, vel ad summum iunio contabescit. Crescit hæc tenellis, subalbidisque foliis, coriandro, vel ranunculo primi generis proximis: radice tuberosa, inferiori parte fissili, superiori verò monticuli instar elata, intus vbi que concaua, nigro exteriori cortice, buxæ interiori pulpa, odore aristolochiæ, & gustu amara. Quapropter Germanis hæc, quòd vera Aristolochia rotunda sint destituit, eius vicem infelicitè expiet. Non tamen ob id censendum est hæc esse Pistolochiam, quæ à Plinio describitur. Siquidem hæc illi tuberosa, & inani radice non constat: sed clematitidis tenuior est, densis (ut dictum est) radicis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Sed rectius, veriusque quantum equidem sentio, dici posset, hæc plantam esse Plinio fumarie alterum genus, quod ab eo lib. x. v. cap. x. i. iis depingitur verbis. Alia est Capnos fruticosa, prætenera, foliis coriandri, cinerææ coloris, flore purpureo. Nascentur in hortis, & segetibus. De hæc etiam Aëtium locutum fuisse existima uerim lib. x. cap. i. i. in curatione obstructi iccinoris, vbi chelidonij Capni meminit, eo quòd (ut diximus) vna cum chelidonio primum erumpat hirundinum aduentu, ut libro quarto latius differemus, vbi consultò fumarie historia tractabitur. Porro quòd huius plantæ radix Aristolochiæ rotundæ vicem supplere possit, atque in huius penuria illa ut liceat, adnotatū reliquit Fuchsius in libro de componendis medicamentis, quem nuper locupletatum edidit, in theriaca dia tessaron. Attamen si Galenum

sequi volumus, pro Aristolochia rotunda longam substituemus. Aristolochiæ genera memorie prodidit Galenus lib. v. i. simp. medic. vbi eorum vires explicauit suis verbis. Aristolochiæ radix ad medicationes vtilissima est, amara, & subacris. Sed ex illis omnium subtilissima est rotunda, ad omnia efficacior. Aliarum verò duarum, quæ Clematitidis appellatur, fragrantior est. Itaque ea ad vnguentia vtuntur vnguentarij: sed ad sanationes infirmior. At longa minus quidem tenuitatis obtinet, quam rotunda, sed nec ipsa inefficax est: verum abstergendæ, atque exaltandi potentiam possidet, minus quidem quam rotunda abstergit, ac digerit, sed non minus calefacit, imò forsitan plus quoque. Itaque in quibus vltus est modice absterisionis, commodior est longa, puta in carniū exulcerationibus, & fomentationibus vteri. At in quibus crassum humorem validius extenuare oportet, illic vltus est rotunda, proinde dolores ab infarctu, aut crassitie crudorum flarum natos magis curat rotunda, & spicula extrahit, & putredines sanat, & sordida vlcera repurgat, ac dentes, gingiuasque candidas efficit. Auxilio est & althmaticis, singultientibus, comitialibus, podagricis, si cum aqua bibitorum ruptis, & conuulsis, ut si quod aliud medicamentum, idonea est. hæc enim Galenus. Aristolochiæ vim purgatiuam inesse (quod tamen silentio præterierunt Dioscorides, & Galenus) author est Mesues, qui ita scribit. Aristolochiæ radix pituitosos per infensa ducit humores, atque etiam, ut nonnulli asserunt, biliosos. Pulmonem, ac pectoris particulas ab humorum lentore, ac putredine efficaciter mundat, cuius rei indicium est, quòd asthmaticis maximum adferat iuuamentum. Quæ Græcè *ἀπρησγία*, Aristolochia quoque Latine dicitur: Arabicè, Zazaund, Masmocra, seu Zazaned: Italicè, Aristologia, Germanicè, Osterlutey: Hispanicè, Astronomia: Gallicè, Foterille, aut Saraine.

Nomen.

## DYLICIS RADIX. CAP. V.



lularum plantarum magnitudinis, asperio

DYLICIS RADIX plurima gignitur in Capadocia, & Ponto. Fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudinis, assurgentibus: foliis lentis, densis, pinguibus, tactuque gummosis: flore hyacinthi fructu

A 5 re, qui

re, qui siliquis lentium modo habet rufas, & paruas, radicibus longis, vt gentianæ, coloris buxci, subacerbis, & dulcibus: quæ denfantur in succum, lycij exemplo. Is in arteriæ scabritia efficac habetur: verum oportet, vt lingua subditus eliquescat: estuanti stomacho, thoraci, ac iocineri conuenit: sanat vesicæ scabiem, & renum dolores, cum passio potus: idem eliquatus sitim sedat: vulneribus illitus accommodatur: commanducatus stomacho prodest. Recentis radices decoctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygiis commodissime inspargitur.

*Planta*  
*dicta*  
*regalita*

**D**ULCIS radix, quam Græci Glycyrrhizam, & officina Græcum nomen corrupentes, vel potius Barbaros secutæ, Liquiritiam vocant, & Herrusci vulgò Regolita, planta est est panicis non cognita. Abundat hac Apulia, præsertim Gargano monte, vnde quotannis succus in pastillos condensatus ad nos conuehitur, & radicem quam plurimum. Vifitur etiamque in viridariis pluribus locis in Italia, non modò ad spectaculum fata, sed & ad medicamentorum vsum. Si quidem radix recenter effossa, sicca longè magis præstat, & ori gratior in medicamentis habetur. Sed non possum non valde admirari Plinium, quod Glycyrrhizam inter aculeatas numerauerit plantas libro x x i. cap. i x. inquit. Glycyrrhiza siue dubio inter aculeatas est, foliis echinatis, pinguibus, tactuque gummosis. Et libro x x i. cap. x v. dum catalogo quodam aculeatas commemorat stirpes: Spinosum, inquit, multa species. In totum spinosa est asparagus, scorpio, nullum enim folium habet. Quædam spinosa foliata, vt carduus, eryngion, glycyrrhiza, & vrtica. Is enim omnis foliis inest aculeata mordacitas. hæc ille. Quo fit, vt sine controuersia dici possit, Plinium Glycyrrhizam minime nouisse, cum ceterè nusquam gentium, quod equidem sciam, aculeatis foliis proueniat, sed (vt Dioscorides scribit) lentisci ætulis, densis pinguibus, tactuque gummosis. Cuius erroris causa illud facile esse potuit, quod sui potius Græci codicis fidem secutus fuerit, quam rei veritatem, in quo fortasse facili, lubricoque librario non aduertentium lapsu *lyris* pro *lyris* scriptum legebatur: vel quod Græca lingua non exactè peritus vocabulorum, vocumque similitudine deceptus (vt alibi quodamque demonstrauimus) Plinius in hoc errauerit. Nam huiusmodi opinio adeò firmiter veritati coheret, vt faciliè quoque deprehendi possint à veritate deficere, qui credunt Glycyrrhizam olim spinis fuisse

præditam, sed mangonio longi cultus edomito rigore spinarum aculeos amississe, & tandem mitigatam esse: cum ea etiam, quæ hoc ævo sponte per se nascitur, nullibi aculeata spectetur. Dulcis hæc radix à Theophrasto libro i x. cap. x i i. Scythica appellatur, eo quod Scythiæ hac contentæ absque alio alimentorum præsidio decem, duodecimque dies degant. Nam (vt idem testatur) circa Meotium palustrem diuina nascitur. Glycyrrhiza memoratur in libro v i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Huius fructus radicem in primis vtilis est, similiter vt etiam radices dulcis, cum leui quadam additione. Proinde asperitates lenire potest, nec modò in arteria, verum etiam vesica scabra, idque temperaturæ mediocritate. Quocirca fuerit sanè natum eius familiaris nostræ temperaturæ tantale monstratum esse esse id quod dulce est. Sed cum additione quædam adiuncta sit, vniuersum eius temperamentum, quantum ex caliditate, & additione est, tepida potissimum caliditatis fuerit, quam proximè accedens ad symmetrum, siue temperatum. Porro quoniam temperie quoque humidum est, quod modicè dulce est, iure sanè etiam sitim extinguens medicamentum est, nimirum modicè humidum, simul & humana natura frigidius. Refert Dioscorides, radicem siccam ad leuorem redactam, pterygiorum illius idoneum esse remedium. *ravonissa* sic Græcis dicta, Latinis Glycyrrhiza, & Dulcis radix appellatur: Arabibus, Sus: Italis . Regolita: Germanis, Leckritz, siue fueschholtz: Hispanis, Regaliza: Gallis, Reclisse, seu Regalisse.

*Glycyrrhiza*  
*et*  
*Viridis*  
*in Gal.*

*Nomina.*

CENTAVRIVM MAGNUM.

CAP. VII.



**C**ENTAVRIVM magnus folia habet iuglandis, oblonga, viridi brassicarum colore, serrata in ambitu: caulem, ceu rumicis, binum aut ternum cuminum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu panneram, in rotunditate oblonga. Flos carneus: semine cnicio simile, ceu laneis quibusdam innoturum, Radix crassa, gravis, solida, tripudalis, succo prægnans, cum adstri-

ctione.

tionē aliqua, & dulcedine acris, & rubescens. Amar solum pingue, & aprium, ac sylvas, & colles. Copiosissima est in Lycia, & Peloponneso, in Arcadia, Helide, & Messenia, pluribusque locis circa Pholoen, Lyciam, & Smyrnam. Radix continet ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, veteri tussi: sanguinem expuētibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua, ceteris in vino: item ad tormina, & vulu dolores. Ramenta eius in collyrii formam vulu subdita, menses, atque partus extrahunt. Succus eadem præstat. Vulneribus prodest: nam recens tusa, aut arida antè madefacta, ea glutinat, & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio vtuntur.

*Centaury magni consideratio.* CENTAURIUM magnum (vt in Rhapontico superius diximus) nil aliud, mea quidem sententia, est, quàm illa insignis admodum radix, quam præterita nuper Atlas Rhaponticum esse credidit: quàmque etiam hoc tempore eodem nomine quidam appellant, qui cum imperitis superioris ætatis errare malunt, quàm cum peritis recentioribus vera cognoscere simplicia medicamenta. Ceterum contendat licet Musa Ferrariensis medicus clarissimus, radicem, qua Rhapontico loco plerunque officina vtuntur, Centaurij magni radicem non esse, is tamen hac in re decipit (pace eius dixerim) inanis est deprehenditur, cum ea radix, quæ vulgaribus Rhapontici vicem explet, omnibus sanè notis Centaurium magnum representet. Quippe quod crassa sit, grauis, compacta, tripedalis, & rubeo succo pragnans, qui gustui non modo quantatenus sit acris, sed etiam cum aliqua adstrictione dulcis. Adde quod & folia, caulis, capitula, flores, & semina illi prorsus sint eadem, quibus constare Centaurium magnum Dioscorides, & Galenus memorizè prodiderunt. Ea, quæ hodie ad nos conuehiunt, Vargano præclarissimo Apulizæ monte numerosa nascuntur: quin & in aliis Italiz locis, nempe in Veronensi agro Baldo monte, quem Benaci aliiq. vnde, sed infirma radice, si ad Apuliam compar-

*Brasauli hysum.*

*Quorumdam halimatis.*

hæc planta flore sit rubro, & caule quadrangulari, quemadmodum & Centaurium minus. Sed quantum isti hallucinentur, quantæ in erroris caligine versentur, si quidem iudicent, qui in stirpium historia multum studij, & temporis consumperunt. Porro vtriusque Centaurij vno tantum capite mentionem facit Me-sues: sed adde alterum cum altero miscet, ad confundit, vt mirandum non sit, si à nouellis ætatis nostræ diligentissimis rei herbariz inquisitoribus acriter fuerit accusatus: quemadmodum & Auicenna, qui cùm illo pariter erraret, & cum vtriusque Serapio. Siquidem in scriptis ex auctoritate Aben Mesual, Centaurij magni radicem lentam trahere pituitam, simul & bilem, & coxendicum doloribus opitulari. Que tamen facultates Centaurij maioris non sunt, sed minoris, vt sequenti capite explicabimus. Ceterum neque Plinius ab errore vindicari potest, qui tamen in Centaurij magni historia libro x x v. capite v. i. in omnibus fere Dioscoridi subscribat, in facultatibus tamen errasse videtur, quod Centaurio maiori amaritudinem cum quadam dulcedine tribuerit: eum amaritudo non in maiori, sed in minori tantum deprehendatur. Centaurij magni meminit Galenus libro v. i. simplicium medicamentorum, de eius viribus is differens verbis. Centaurij magni radix sicut gustu contrarias qualitates, ita in vsu contrarios effectus demonstrat. Gustu itaque acris simul, adstringensque appareret cum leuicula quadam dulcedine. At in actionibus acrimonia quidem caliditatis opera ostendat, menses promouens, & factum mortuum euclens, viuumque corrumpens, atque eliciens. Adstrictio verò, opera crassæ, terrenzque frigida, cum vulnera glutinet, & sanguinem reicientibus prosit. Exhibentur autem eius drachmæ duæ, febrientibus quidem cum aqua, leuius verò liberis cum vino. Porro secundum omnium simul qualitarum actionem, ruptis, conuulsis, dyspnææ, siue spirandi difficultati, inueteratæ tussi conuenit. Nec enim in talibus euacuare solum quod præter naturam est, oportet, sed partem quoque euacuatam roborare, ac confirmare. Vacuationi itaque accommodata est acrimonia, vtrique cum non sola sit, ac pura, sed aut dulcedini iuncta, aut certe non prorsum amaritudini: siquidem vehementiam tunc, atque violentiam, missa illi temperata quadam substantia, cuiusmodi est dulcis, non obtinebit. Porro ad ea, quæ euacuata sunt, roboranda, contrahendaque, adstrictione est opus. Eadem quæ radix, & succus ipsius efficitur: vtriusque eo medicamento quidam vice Lycij. Græci *κενταυρίον* alij *αἶλα* id vocant, quod Latini Centaurium magnum: Mauritanij, Chanzurion kibir, Sacurion habre, seu Canthuriu: Itali, Centaurea maggiore: Germani, non sine errore, Reupontic: vt etiam Hispani, Ruipontico: & Galli, Rhepontic.

*Arabis hysum.*

*Plinij recepta.*

*Centaury magni Serapio ex Galieno.*

*Medicina.*

CENTAURIUM MINUS.

CAPUT VII.



CENTAURIUM minus, limnesion aliqui vocauerunt, quoniam rigua amet loca. Herbaorigano, aut hyperico similis, caule anguloso, palmum excedente: flore lychnidis, <sup>10</sup> è puniceo in purpuram vergen-

te: foliis rura, praelongis, & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, laui, & superuacua, quae gustanti amaritudinem adfert. Herba recens tusa suo illitu vulnera conglutinat: vetera vlcera purgat, & cicatrice obducit. Bilem, crassumque humores per alium exigit, si decocta deuoretur. Ius decocti ischiadicis conuenientissimè infunditur: trahit enim sanguinem, & dolorem leuat. Succus oculorum medicamentis perquam utilis: siquidem cum melle caliginem oculorum expurgat. in vellere appositus, <sup>40</sup> menses, & partus extrahit: epotus peculiariter neruorum vitii succurrit. Succum extrahendi ratio. Legitur herba semine pragnans, & diebus quinque madefacta, decoquitur, donec supereminet aqua: mox ubi refrixit, linteolo exprimitur, & ciecta herba, iterum decoquitur, usque dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentem, grauidamque contundunt, atque succum fictili non picato exprimunt, & in sole, lignea rude assidue mouentes, inspissant. quodd si quid concretum faucibus vasis adhareseat, deradunt, reliquodque humori permiscunt, noctu diligenter operiunt: namque ros nocturnus liquores coalescere non sinit. Quae autem siccis radicibus, aut herbis, li-

quamenta exprimuntur, decocta (vt in gentiana mentione retulimus) praeparantur. Sed quae ex corticibus humidis, aut confusis herbis faciliantur, in sole, vt antè dictum est, coguntur. Sic è thapsia, sic è mandragora, reliquisque similibus succus: sic ex acerbis vuis melligo elicitor. Lycium tamen, & absinthium, hypocistis, & consimilia, decocta, eo quo diximus modo, coguntur.

CENTAURIUM minus nullis ferè non cognitum, in Herbariis vulgo Biondella nuncupatur: quoniam abitergendis, & dealbandisque mulierum capillis ex lixiuio plurimum praestat. Quod passim in officinis habetur, verum, & legitimum Centaurium minus esse, omnibus, vt arbitror, exploratus est, quam vt à nobis ostendi debeat. Quippe quod nullis in vniuersum notis Centaurij minoris historiae refragetur. Galenus ob ingentes, mirasque eius facultates, de ipsius viribus integrum librum conscripsit, Papiaque dicauit. Detrahit hoc bilem, & pituitam, quae sine facultate Centaurium maius planè carereprehenditur. Quo fit, vt non parum aberrauerint inter Mauritianos Mesues, Auicenna, & Serapio, quod Centaurij minoris vires cum maiori turpiter confunderent. Galenus praeter ea, quae de Centaurio minori ad Papiam scripsit, eius quoque meminit libro <sup>10</sup> VII. simplicium medicamentorum, sic iniquens. Centaurij minoris radix prorsus inefficax est. Sed ramuli eius, & posissimum folia, quae illi inhaerent, & flores, vtilissima sunt. Vincit in eis qualitas amara, paululum habens & adstrictionis, atque ob eiusmodi temperamentum admodum exsiccatiorum est medicamentum, expers mordacitatis. Porro quod omnia talia vtiliora sint, supra communis, & nunc nihil fecius tamen nos repetere tempestiuum est, omnes eius particularum actiones memorantes. Vulnera itaque magna herbæ ipsius recentis illitu glutinantur: & venulae, quaeque zgre ad cicatricem perducere queunt vlcera, cicatrice eodem modo ventibus obducuntur. Arefacta verò glutinatoria, & desiccatoria misceatur facultatibus, iis videlicet, quae sinus, & fistulas sanare sunt natae, veteresque duritias emollire, tum vlcera maligna, quae caecothie vocantur, sanare. Misceatur etiam iis, quae rheumaticis affectibus medentur: in quibus ea medicamenta optima sunt, quae vehementer desiccantia, cum quadam adstrictione nullam habent mordacitatem. Decoctum herbæ quidam ischiadicis infundunt, cum biliosa, & crassa ducens: nam & talia purgat, quanquam cum adeo vehementer operabitur, vt cruenta euacuet, tunc plus proderit. Succus porro

*Centaurej minoris co sideratis.*

*Centaurej minoris vires ex Galeno.*

eius, cum ad similes sit facultatis, hoc est, exicatoriz, & absterforiz, & cætera iā dicta pulchrè efficere potest: & cū melle oculis illinitur, men-  
sesq; & foetū appositus euocat. Sunt qui ipsum præbeant & iis, quibus nervi affecti sunt, vt qui euacuet, & deficiet innoxie quæ impleta sunt. Quippe cum iecinoris quoque obstructions optime expediat, bonumq; sit lieni indurato

remedium, foris impositum, nec secus, si quis bibere sustineat. *Karavajon* simpliciter sic Græcè, Latine verò Centaurium minus dicitur: Arabicè, Chancurion sege, & segir, seu Katarion sages: Italicè, Centaurea minore: Germanicè, Taufent gulden kraut, Fieber kraut, Erdgall, seu Biber kraut: Hispanicè, Fel de tierra-Gallice, Centauree, aut Fiel de terre.

CHAMAELEON ALBUS.

10

CHAMAELEON NIGER.



CHAMAELEON ALBUS.

CAP. VIII.

CHAMAELEON albus, iuxta ideo aliquibus vocatur, quod quibusdam in locis viscum circa radices eius inueniatur: quo pro mastiche vtuntur mulieres. Folia habet silybo, aut scolymo similia, asperiora, acutiora, nigroque chamæleone validiora. Caulem non promittit, verum ex medio spinas, echini marini, aut cinaræ modo, erigit. Flores purpureos, veluti papporum lanugines emittit: semen cinico simile: radicem in latis collibus crassam, in montosis vero graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticā, graui odore, dulcem. Quæ porta acerabuli mensura, latis interaneorum tineas pellit: bibitur autem in vino austero cum origani feruifac-  
ti succo. Hydropicis commodissime drachma in vino datur: etenim eos extenuat. Contra difficultatem vri-  
næ decoctum propinatur. Hausta in vino, serpentium venenis resistit: occidit canes, & fues: mures item necat, subacta cum polenta, aut aqua, & oleo madefacta.



CHAMAELEON NIGER.

CAP. IX.

CHAMAELEON niger foliis scolymo similis esset, nisi minor, tenuioraque, ac rubro distincta viderentur. Caulem emittit dodrantalem, crassitudine digitali, subrubrum: & in umbella flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, ver-  
ficolores: radice crassa, nigra dēsa interdum exesa, quæ dissecta flauescit, & cōmanducata mordet. Prouenit in capestribus, siccis, & cliuosis tractibus, & maritimis. Radix trita, addito atramenti sutorij exiguo, cedrino oleo, & axūgia, scabiem abigit: eadē, cum sibi sulphur, & bitumen asciauit, & cocta in aceto illinitur, impetigines absterget. Decoctum collutione, dentiū dolorē mitigat. Cū pari pipere, & cera oblita radix, dolenti denti auxiliatur. Radice concisa, & in aceto decocta, dentes fouētur: eos quoque frangit, si scriptorio stylo feruens admoueat: vitia cutis in facie, vitiliginesq; cum sulphure emendat. erodentibus medicamentis admiscetur: phagedænas, tetraq; vlcera illitu sanat. Quare chamæleon vocetur, a varietate foliorum eue

rum euenit: mutant enim cū terra colorē: hic viridia, illic albicantia, alicubi cærulea, non nusquā rubra inueniuntur.

*Chamaeleon* CHAMAELÉON abustum ab Hetruscis, quā cæteris ferē Italia incolis vulgō Carlina vocatur, quod credat vulgus (vt facillē solet) herbam hanc magno olim Carolo regi ad sustinendam sui exercitus pestem ab angelo demonstratū fuisse, tanquam antidotum omnium praestantissimum. Quo argumento fecti vulgares quā plurimi, ad arcendam pestilentiam huiusce plantæ radices miris, magnisque laudibus commendant. Nec quidem ab eis: quādo enim pota radix (vt Dioscorides, & Galenus testantur) latas interaneorum tines interimat, & serpentium venenis resillat, mirum, vtique non fuerit, quod eadem in pestilentia opem ferre valeat. Falluntur nimirum, qui putant, stirpem illam perniti non ab similem (nostri cum Carciofo vulgō appellat) aculeis horrentem, cuius fore coagulū vice Hetruria vitru, album esse Chamaeleonem. Nam eorum error ex eo maximē diluitur, quod hæc contra Chamaeleonē albi descriptionem, in longo admodum caule echinatos suos proferat fructus. Porro Chamaeleonem album nunquam Fuchsum (pace viri aliqui eruditissimi dixerim) vidisse existimaui: quod libro suo de plantarum historia primū scribat, nullum hunc edere caulem, subinde huius fortē oblitus, eodem in loco eundem procerō satis caule depingat. Quin nec nigrum idem non fuisse videtur, cum depictus ab eo, quem tamen planē non probat, nullis notis legitimo, meo quidem iudicio, respondeat. Nascitur niger in Tridentino agro, Ananienbus admodum frequens tum montibus, tum collibus, nullis reclamantibus notis. Qua in re hallucinantur monachi reuerendi, qui

*Quoniam  
da error.*

*Chamaeleon* Meuseni commentati sunt, cum cerē sibi persuadeant, Carlinam (vt eorum vtrā distinctione) caulem proferentem, quam legitimū Chamaeleonem nigrum Dioscoridis semper existimauimus, eiusdem esse spinam albam, quam Graeci *αλευχον* dicunt, Mauritaniam verō Bedeguar: item Carlinam alteram caule viduam esse spinam Arabicam ab Aphris Suchaa vocatam. Quippe cum spina alba (vt Dioscorides est author) cubitali sit caule, ipsosque albicāte, unde fortasse nomen traxit, & inani, flore verō purpureo nitentē Carlina verō hæc caule sit de drante paulō maiore, pleno, non inani, subrubro, non albicante, floribus hyacinthi emulis, nulla ratione dici posse putauerim, Carlinam hanc esse spinam albam, sed potius rufam. Cum nec similiter monachi inquam probare possint, Carlinam alteram caule vacantem Arabicam esse spinam: quod nusquam Dioscoridem scripsisse inuenierim, spinam Arabicam caule vacare, sed spinā albam potius esse permixtā. Ex quo rectē (vt arbitror) cōcludi potest, quod cum spina alba procul dubio caulem edat, eundem

quoque Arabicam promat. Sunt etiam qui velint, Carlinam caulem gerentem nihili differre ab altera, quæ caulem non fert nisi sexu, neque quæ altera mas, altera verō femina fortasse fuerit: negantque omnino has plantas esse Chamaeleones, illarūque præsertim nigrum Chamaeleonem esse nolent, quæ caulem rufum gerit. Hocque argumentum nituntur, quod scripserit Galenus lib. 11. simp. medic. Chamaeleontis nigri radicem lethale quiddam obtinere: eamque ob causam in extrinsecis tantum venire medicamentis. Sed cum raphani vice a compluribus copiose cum acetiariis edatur nullo penitus incommodo, nec esse hanc nigrum Chamaeleonem, nec eius speciem probant. Quibus facillē respondi potest, quod fortasse hac in re (sit tamen cum venia tanti medici dictum) errauerit Galenus, cum omnibus in confesso sit, quod si in altero duorum aliqua deleteria vis inest, ea potius in albo, quam in nigro esse possit. Quādoquidem non modō scribit Dioscorides Ixiām lethale medicamentum in albo tantum Chamaeleonte nasci, sed quod eius radix canes, & fues, ac mures necet, si ab eis deuoratur. Quæ sane euidens argumentum faciunt, quod potius albus, quam niger, lethale quiddam obtineat, præsertim cum nigro nullam lethalem vim assignauerit Dioscorides. Verum enimvero, ne cui temeritatē nomine suspensus sim, quodā Galenus audeam dissentire, concedamus, non præter rationem id scripsisse Galenū, quod Ixiā etiam nū oriatur in nigri radice, vt Cretenses affirmant, qui ex vtriusque Chamaeleontis radicibus Ixiām colligunt ad pennas sagittis congruandas, quodque scriptum reliquerit Theophrastus, Chamaeleontis nigri radice canes pariter necari. Alia nobis fesse offert ratio, quæ rectius, vt puero, his respondere possumus. Siquidem facillē fieri potest, quod in Græcia, fortasse in Ponto, aliisque contemnis regionibus Chamaeleontis nigri radix sit venenosa, & in Italia salubris, exuta ob celsius clementiā lethali facultate, quemadmodum, & Persæ, quæ tametsi Persis semper fuerit lethifera, Aegyptis tamen innocua facta est, soli & cæli bonitate. In Ponto enim non modō nū venenosum est, sed & plantæ quamplurimæ lethiferae sunt: imō & animalium partes (quod scribat Strabo Ponticū castoreum venenosum esse) quæ tamē omnia nobis salubria sunt. Arū præterea Cyrenis adeo mitis est, vt rapi modo in ciborū vsum veniat, cum tamē in Græcia, & Italia adeo acerrimum sit, vt nec coctum, nec crudū edi possit. Quin & scorpiones in cōpluribus terrarum orbis partibus istos interficiunt, in aliquibus verō, vt in Tridentino tractu, nullū idū venenū relinquant: quo etiam in loco nigrum veratrū nulla deiectione vi poplet. Cæterū illud præter dicta me maximē ad credendum inducit, Carlinā caulem fundentē esse Chamaeleonem nigrum, quod hæc planta omnibus in vniuersum notis nigrū Chamaeleonem referat. Quādoquidē foliis cūctis scolyo

*Quoniam  
da opinio  
reprobata.*

minoribus, tenuioribusq; subrubra per mediū  
excurrente colla: caule itē dodrantali, crassitu-  
dine digitali, subrubro: floribus in umbella spi-  
niosis, versicoloribus. radice crassa, exterius ni-  
gra, densa, & aliquando corrofa, quæ fracta in-  
tus flauescit. In qua certē delineatione hæc plan-  
ta ita adamussim conueniunt, ut nemo, nisi sen-  
sibus & ingenio obtusus fuerit, Carlinam, quæ  
caulem mittit, Chameleone nigrum esse non  
videat, & perspicue intelligat. Id quod equi-  
dem certior ob diligentem inquisitionem fa-  
ctus, hoc tempore asserere non dubitauit, licet  
aliās aliter senserim. Hacq; in sententia perma-  
nere decreui, donec aliquis rei herbariæ dili-  
gētissimus aequē & doctissimus indagator alios  
a Carlinis Chameleones offēdat in Italia, qui  
rectius suis notis Dioscoridis historiā represen-  
tent: tunc enim in hoc, ut in aliis quoq; nō gra-  
uior mutare sententiā. Explodendi sunt Ara-  
bice factionis scriptores, ut qui non sine de-  
cedendo errore, Græcorū vocabulorū vicinitate  
decepti, Chameleem, quam sua lingua Me-  
zerion appellant, cum Chameleone confun-  
dant. Nam Auicenna de Mezerio differens li-  
bro & tractatu 2. cap. 462. circa finem, suum  
errorem prodidit iis verbis. Mezerion bibitur  
cum vino ad morsum vermium venenosorum;  
& est propriè nigrum, venenum mortiferum.  
Ita quando misceatur cum saue, & coniungitur  
cum aqua, & oleo, interficit mures, & canes,  
& porcos. hæc ille. In quibus duplici notatur er-  
rore: primò quod Mezerio eas tribuerit vires,  
quas albo Chameleoni reddidit Dioscorides:  
deinde quod nigrum non vtiq; album ea præ-  
stare crediderit contra Dioscoridis sententiā.  
Meminis vtriusq; Chameleonis Theophras-  
tus libro 1 x. capite x i i i. de plantarum hi-  
storia, vbi sic habet. Chameleoneum, vnus can-  
didus, alter niger. Vires autem radicū inter  
se distant, & ipse etiam radices specie differunt.  
Candidi enim candida est, & dulcis, & crassa,  
& grauius olens. Vtilis traditur ad fluxiones,  
cum confecta orbiculatim modo raphani de-  
cocta est, iuncto transfixa in seriem. Valet &  
ad interaneorum animalia lata, cum passa vna  
comesta acetabuli mensura ē vino bibitur austero.  
Occidit & canes, & fues: canes in farina hor-  
deacea subacta cum aqua, & oleo: fues cum bras-  
sica. Est hominem egrescentem experiri vo-  
lueris, an viuere possit, laudandum ea radice tri-  
duo iubent. Hoc enim si tolerauerit, moritu-  
rum nequaquam existimant. Nascentur aequē o-  
mnibus locis, folio scolymo simili, verūm am-  
pliori, & terræ proximo: capite magno, aca-  
no simili: vnde quidam acanem eum vocantur.  
Niger folio constat ad simili, præterquam quod  
minori, leuiorque. Tota autem herba umbracu-  
li speciem præsentat: radice crassa, & nigra  
extrinsecus, subflaua intrinsecus nititur. Loca  
gelida, humidāque amat. Leporam, & vitiligi-  
nam abolet trita cum aceto, & ramentis illita:  
necnon & canes occidere potest. hæc Theo-

phrastus. Illud insuper non ignorandum est, vi-  
scum scilicet, quod Ixiam appellant, in Cha-  
meleonis albi radice nascens, venenum esse  
mortiferum, cum tamen modica tantum quan-  
titate sumptum somnolentos vigilantes reddat.  
Quamobrem Cretenses mulieres suarum lū-  
cubrationum gratia, nec somnum ineant in ope-  
re, ex eo tantillum, aut modicum à cornu nū-  
lo incommodo assument. Huius plerisque lo-  
cis meminit Plinius, & de eo nusquam non in-  
tellexit, vbi contra sumptum viscum aliquod  
remedium protulit. *Χαμελεων λευκος* sic Græcè, *Nemida.*  
Latine verò Chameleon albus appellatur: Mau-  
ritanis, Chameleon leute, seu Chamaalum: Ita-  
lis, Carlina, & Chameleone bianco: Hispanis,  
Cardo pinto: Gallis, Carline. Ad planta, quæ  
*χαμελεων νιγρος* Græcis, Chameleon niger: La-  
tinis vocatur: Arabibus, Chameleon melamos:  
Italis, Chameleone nero: Germanis, Ebervertz:  
Hispanis, Cardo pinto: Gallis, Chardonette.

## CROCODILIVM.

## CAP. X.

CROCODILION chameleontis ni-  
gri figuram habet. Nascentur in syluosis,  
radice longa, leui, aliquantulum lata,  
odore, ut nascuntur, acuto. Feruescit in  
aqua, & pota radix, sanguinem copio-  
sum per nares pellit. datur lienosis, eos  
euidenter adiunans. Semen ei rotun-  
dum inest, duplex uti scutum: quod sua  
pte vi vrinam ciet.

S V N T qui velint, Carlinam vulgò voca-  
tam, eam inquam, quæ caulem proferit, legiti-  
mum esse Crocodilium. Sed eorum opinio mi-  
hi quidem nullo modo satisfacere potest. Si-  
quidem (ut præcedenti capite retulimus) Car-  
lina, quæ caulem emittit, adeo omnibus in vni-  
uersum notis chameleoneum nigrum represen-  
tat, ut vix vnquam persuaderi possim, eam esse  
Crocodilium: præsertim cum facto periculo iis  
sanè viribus careat, quibus Crocodilium præ-  
stare scribunt. nempe quod radices decoctum  
potum sanguinem per nares copiosum trahat.  
Adde quod Crocodilii radix sit longa, leuis ali-  
quantulum lata, & odore, ut nascuntur, acuto. Il-  
li verò Carlinæ generi crassa, nigra, densa, ex-  
siccata: mon autem lata, nec leuis, nec nascuntur  
odorem spirans. Non desunt alij, qui Eryngium  
marinum Crocodilium existimant. Verum cum  
illud in litoribus maris nascatur, chameleoni  
nigro sit ab simile, nec sanguinem è naribus eli-  
ciat, Crocodilium verò proveniat in syluosis,  
compluribus aliis reclamationibus notis, iis etiam  
haudquaquam adscriptari possum. O quàm ma-  
gnifacere medici Crocodilium, si in Italia na-  
scretur, vbi tamen hæctenus ipsum videre non  
licuit, cum eius radices decoctum tanta sit facul-  
tate

*Crocodilij  
considera-  
tio.  
Opinio ex  
plofa.*

*Alia opi-  
nio repre-  
bata.*

*Arabum  
turpis er-  
ror.*

*Chameleo-  
num histo-  
ria ex Theo-  
phraſto.*

tare præditum, ut potu tantum sanguinem copiosum per nares pellat. Crocodilum meminit Plinius libro x x vii. capite viii. non tamen plura tradidit, quam Dioscorides, à quo illa omnia accepisse videtur: quanquam in hoc ab eo dissentit, quòd Crocodilum in sabuleis nasci prodiderit, cum tamen in syluosis nasci scribat Dioscorides. Huius facultates lib. v l l. simplicium medicamentorum memorie prodidit Galenus, sic inquiriens. Crocodilij semen acre est, atque odoratum, vinam, mensèscue ciens. Itaque facultatem habuerit calidam, digerentem, & exiccantem. Succus tum caulis, tum seminis, ut quæ similes sint facultates, nephriticis adiuuant. Radix pectoris excretionibus valenter conducit, minus quidem quam semen aeris, non tamen minus amara. Trahit verò etiam per nares sanguinem. Quod *apud Græci, Latini quoque Crocodilium dicunt: Itali, Crocodilio.*

*Crocodilij  
Vires ex  
Galeno.*

*Nomina.*

DIPSACVS, SIVE LABRVM  
VENERIS. CAP. XI.

DIPSACVS aculeatarum generis est. Caulem habet altum, spinis horridum: foliis lactuca, spinosis, binis, genicula singula còplectentibus, prælògis, ceu quassdam bullas intus, & extra aculeatas, in cor si medio habentibus, concauo alarum sinu, in quo imber, aut ros asseruetur:

vnde dipsaci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine caulis, singula furculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis: quæ arefacta, candida spectantur, dissectaque medulla tenus, vermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis, fistulasque, si tusa, & decocta in vino radix, vsque dum sit crassitudo ceræ, immittatur. Medicamentum area pyxide recondendum. Aiunt formationibus, verrucisque pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati collo, aut brachio appensi, produnt quartanis febribus remedio esse.

VIRGA PASTORIS MINOR.



DIPSACVS, quem Latini Labrum Veneris vocant, in Italia vul-

*Dipsaci cò  
federatio.*

garis est planta, his præcipue locis, ubi lanificia exercentur. Siquidem echinato eius capitulo mangones rudem adhuc pannum pectunt, expoliunt, detractisque floccis concinunt. In Hetruria Dipsacum vulgò appellant Cardo da cardare, For-

julenses verò Garzo. Seritur in hodie in compluribus Italix locis, præsertimque in agro Bononiensi, singulari à cultoribus adhibita diligentia. Sed & syluestris quoque sponte in campestribus, in agrorum, & scrobium aggeribus, in viis iuxta sepes frequentissimus nascitur, nullis prorsus repugnantibus notis, quas illi reddidit Dioscorides. Inuenitur autumni tempore (ut experientia quæque docere potest) in eius capitulo iam exarefacto, medullitibusque dissecto vermiculus ille, quem collo adaligatum quartanis febribus remedio esse produnt, piscatoriibus hamo asfigendus maxime expetitus: et si Marcellus Dioscoridis interpres, & commentator, vermiculum hunc nunquam sibi comperit fuisse scribat. Dipsacus officinis, & herbis Virgæ pastoris vulgò Virga pastoris maior nominatur, form dant: quanquam non adeò striato caule, ac spinis horrido conflet, foliis item infirmioribus sit, & capitibus multo minoribus, ut quæ olim magnitudinem non excedant. Sunt autem huius capitula tenuibus capillis repleta, ita ut feracis viridi colore infectis floccis similia videantur. Cæterum animaduertendum est, neu rum Dipsaci genus, quod tum Serapioni, tum Aucennæ describitur, esse Virgæ pastoris. Quandoquidem his, quantum ex eorum scriptis colligere potui, Pastoris virgam nil aliud esse putauerim, quam polygonum, cuius tam formæ, quam maris historiam libro quarto tradidit Dioscorides. Quapropter illud mihi semper perisusum velim, quòd non à Mauritanis Dipsaco Virgæ pastoris nomen inditum sit, sed à seplasiaribus, qui suis potius pandectis, quam cæteris castigatissimis, & probatissimis scriptorum monumentis, fidem præstare consueverunt. Namque Marcus ille Sylvarius pandectarum auctor, Dipsacum Virgæ pastoris appellat: qui deinde in grauiorem errorem lapsus, Dipsacum ipsum cum polygono turpiter confundit, vtpote qui illud assequi non potuerit, quod Arabum Pastoris virgæ, esset Dioscoridis polygonum, non autem.

*Virga  
pastoris  
form dant.*

*Sylvarius  
hæreticus  
est.*



autem *Dipsacus*: qui quidem tantum à polygono differt, quantum lepores ab vrsis. *Dipsaci* meminit *Galenus* libro: v. i. simplicium medicamentorum, his paucis. *Dipsaci* spinæ radix secundo ordine exicatoria est, habetque nonnihil absterforium. Planta, quæ Græcis *Aslan*, Latinis *Labrum Veneris* nominatur: Mauritaniis, *Dibfacos*: Italis, *Cardo*, & *Difaco*: Germanis, *Kartendistel*, *Gardenkraut*, *Buobenstrel*, & *Vueber karten*: Hispanis, *Cardencha*, *Cardo penterador*: Gallis, *Cardon à carder*, & *Verge à bergier*.

## SPINA ALBA.

## CAP. XII.



*SPINA* alba nascitur in montibus, & syluosis. Folia fert albi chamæleonis, angustiora, candidiora, aliquantum hispida, & aculeata: caulē supra bina cubita altum, pollicari, aut ampliore crassitudine, albicantē, intus cauum: in cacumine capitulum inest spinosum echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen, ceu nucum, sed rotundius. Huius radix pota, cœliacis, stomachicis, & iis, qui cruenta extussiunt, efficax est: vinam citratoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen conuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur. Gestatum pro amuleto serpentes abigere traditur.

*Spina alba cœliacis utilis.*

*SPINAM* albam seplasarij Arabas (vt plerunq; solent) imitari, Bedegar appellant. Sed non parua inter hos, & medicos oritur cōtentio, quam in aculeatarum genere, quas plurimas genuit natura, *Spina* alba legitimè, notis omnibus adstipulantibus, appellari possit. Verū etsi tantam licet transigere nequeant, interim tamen pro *Spina* alba alij alias herbas ostendant, & quisq; suam veram existimat. Quandoquidem sunt eorum complures, qui sibi certò persuadent, *Spinam* albam eam aculeatā herbam esse, quam aliqui *Carduum benedictū* vocant, alij verò vulgò herba *Turca*. Sunt alij, qui

*Carlinam* vocatam, id est albam chamæleonem, *Spinam* albā esse contendunt. Inter quos inuenio monachos, qui in Mesuem scripserūt, quorum sententiam, superius in chamæleonis vtriusque mentione, vt falsam reprobaui. Sunt præterea, qui *Spinam* albam esse velint echinatam illam, ac spinis rigentem herbā, quæ *Hetrufcis* in lacte cogendo coaguli vicem explet. Non desunt insuper qui vnam, vel alterā syluestrem, ac spinis horrentem plantam, pro *Spina* alba nullo discrimine accipiant. Quo fit, vt omnes ij nullo veritatis lumine ducti, in huiusmodi tenebris oberrant. Errat, meo quidem iudicio, hac in re *Leonardus Fuchsius* ætatis nostræ medicus alioqui clarissimus: quippe qui vltimo suorum paradoxorum capite, *Spinam* albam eam aculeatam herbam appellat, quæ omnium in vniuersum aculeatarum plantarum generum amplissimis constat foliis, latè humi se spargentibus, ac crebris, absque seu lacteis tota conspersa maculis. Vnde apud quosdam *Lactaria* herbæ nomē adinuenit, etsi à quàm plurimis, præsertim mulierculis, *Carduus* diuæ Mariæ dicatur. *Hallucinator* inquā, pace eius dixerim, eo quòd non animaduertit, hanc foliis albi chamæleonis triplo, quadruploque maioribus in campetri planitie nasci, vt nostra testatur *Hetruria*, vbi passim ferè frequens nascitur, non autem in montibus, ac syluis, vbi *Spina* alba *Dioscoridis* testimonio prouenit. Ego verò, qui à *Dioscoridis* non latum quidem vnguem recedere soleo, in syluosis montium iugis *spinam* albam legitimam oriri, mihiq; inibi compertam fuisse existimo, foliis albi chamæleonis similibus, angustioribus tamen, ac candidioribus, subhirsutis, spinis rigentibus: caule verò bicubitali, pollicari, vel ampliore crassitudine, sub albo, & mani: in cuius cacumine echinus subalbidus insidet, sed minor, & oblongior, purpureis intus floribus, & semine cnico simili. Huic planè descriptioni, quæ etiam *Dioscoridis* est, adstipulantur frequentissimæ plantæ, quæ suis echinis, ac spinis rigentes, in excellioribus *Anaxie* vallis montibus *lariceis*, *abiegnis*, & *picetis* syluis referunt *Iulio* mense visantur. Quapropter, vt quæ ad eos pertinent, rectè æque seplasarij, videant, sciāq; non in planitie, & conuulsibus *Spinam* albam prouenire, sed in montibus: quorum si quandoque tum cacumina, tum sylvas adire non grauantur, procul dubio non magno etiam labore ipsam nanciscuntur, quemadmodum & ego inibi eam sepius reperi. Hæc enim non modò seplasaris maximè conducet, vt legitimam *Spinam* albam suis compositis medicamentis immisceant, verum & eorum errorem deprehendent (in hoc etiam *Ruellius* versatur) qui sibi persuadent, *Spinam* albam illud esse cardui genus, quod à *Tufcis*, eo quòd (vt paulò ante diximus) coaguli vicem præstet, vulgò vocatur *Presura*. Error autem iis facillè deprehendatur, si illud

*Fuchsius loquitur.*

*Quorum dæ error.*

si illud adnotare voluerint, quod aculeata hæc planta in hortis passim feratur, foliis albo chamæleonti longè maioribus : & capitula ferat, quæ marinum echinum non parum excedant. Commiscuit Mesues spinam albam, & ac etiam Arabicam, quorum alteram suo idiomate Bedeguar, alteram verò Suchaa appellauit, syrupo de eupatorio vocato, quem miris laudibus extulit ad diuturnas febres finiendas, ad eas præsertim, quibus naturalia viscera, nempe ventriculus, & iecur imbecilla sint reddita, & ubi à sua naturali temperie recesserint. Cuius tamen sententiæ non parè refragatur Musa

*Brasavoli  
celsissimi  
citra Me-  
sueum.*

Ferrariensis : quippe qui longo sermone contendat, nec Arabicam, nec albam spinam huic syrupo admiscendam esse, quòd veritate adstrictoria vi polleat, quæ (vt ipse ait) syrups huius intentionibus admodum repugnat, cum ad diuturnas obstructions tantè referandas, semper huius apud medicos fuerit vsus. Qua in re non solum ostendit Musæ auctoris mentem non percepisse, sed nec etiam in hoc (pace viri aliqui clarissimi dixerim) exactam curandorum morborum rationè calluisse. Nam cum Mesues syrupum hunc composuisset ad illas curandas febres, quibus naturalia viscera imbecilla sunt reddita, optima componendi methòdo tam Spinam albam, quam Arabicam illi iniecit, vt pote quæ adstrictoria vi, qua polleat, languida illa, ac infirma membra, plurimum roborarent, quibus incommòdis solent perire, ac docti medici iis medicamentis occurrere, quæ odore fragrantia adstrictoria facultate commendantur. Hinc itaque facillè intelligi posse crediderim, quam absurda, & explodendaque sit hæc Musæ sententia. Quin nec illud consilium eius seplastiis accipendum putauerim, quòd spinæ albæ, & Arabicæ loco, filicula radicum, & ac sabinæ folia huic syrupo substituere possint, & debeant, vt magis atq; magis tum vasa, tum viscera laxet. Quippe quòd si tantum laxandi, ac referandi facultate hoc medicamentum debuisset esse præditum, non modò harum spinarum radicibus carere debebat, sed etiam rosis, lentiscina resina, Indica nardo, & malabathro expoliari : cum tamen hæc omnia maturè, diligenterque examinata, non sine methòdo, vt quæ robur his visceribus altatura sint, ab ipso Mesue huic syrupo fuerint admixta, ne scilicet natura diuturna febre imbecillis facta, & à relaxantibus, ac admodum referantibus medicamentis vexata, totam humorum molem alui profluuiò ob concentricis facultatis amissum robur, tanquam viribus omnibus destituta ad mortem vsque demitteret. Meminit Spinæ albæ Galenus lib. v. i. simplicium medicamentorum, sic inquiriens. Spinæ albæ radix desiccatoria est, & modicè adstringens. Quamobrem & cæliacos, & stomachicos iuuat, & sanguinis reiectiones cohibet, & cedemata illita contrahit, ac dentibus dolentibus prodest, si decocto eius col-

*Spina al-  
ba videri  
et Gal.*

lantur. Semen tenuis essentia, & calidè facultatis est. Itaque potum iis, qui conuelluntur, conuenit. Quæ planta *Acacia Arabica* Græcè, Spina alba Latine dicitur : Arabicè, Bedeguar : Italicè, Spina bianca, Gallicè Espine blanche, vel, Artichault sauage.

*Nomina.*

SPINA ARABICA. CAP. XIII.

10 ARABICAM spinam natura albæ spinæ similem esse constat. Ipsa quidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensum abundantiam, cæterâsque fluxiones radix etiamnum valet. Prouenit in asperis.

ERRASSE eos nimirum crediderim, qui sibi persuaserunt, Arabicam spinam, cuius hic meminuit Dioscorides, eam aculeatam Arabiæ esse arborem, quam Acaciam vocant. Cuius erroris illud in primis indicium est, quòd nusquam confueuerit Dioscorides alicuius stirpis historiam diuersis capitibus repetere, nec etiam arbores herbis commiscere. Nam cum longa historia Acaciam arbore, quæ etiâ Aegyptia spina vocatur, primo libro inter arbores descripserit, absurdum quidè videretur, si eandè præter morè hic inter aculeatas herbas repeteret. Ad hoc indicium & illa ratio accedit, quòd si eorum harum plantarum historiam tradidit Dioscorides, diuersas quoque plantas esse necesse est. Quamobrem non parum Ruellius hallucinatus deprehendit, quòd non animaduertit, in sua huiusce Arabicæ spinæ mentione, Dioscoridè hoc loco aculeatam quandâ Arabicâ herbam albæ spinæ in vniuersum emulâ intellexisse, non autè (vt ipse putat) acaciâ nuncupatam. Quæ in re non satis viri hunc admirari possum, quippe qui nò modò & Græcis, & Latinis literis sit habitus peritissimus, ac inter eos, qui hac nostra ætate de stirpù historia scripserit, facile princeps, sed qui etiam Plinij historie fuerit studiosissimus, quem tamen si accuratius perlegisset, ac sequi voluisset, nunquàm irritor in eum errorè incidisset. Quandoquidè Plin. lib. x x i i i. cap. x i i. altera ab altera separauit. Et primò huius, de qua agimus, mentionem faciens, sic inquit. Spinæ Arabicæ laudes in odorù loco diximus & ipsa spissat, stringitq; distillationes omnes, & sanguinis excretiones, mensumq; abundantiam, etiamnù radice valentior. Quæ à Dioscoride verbò tenus transfuisse perspicui est. Mox meminit Arabicæ alterius spinæ, quæ in arborè assurgit, his verbis. Est & Acaciæ spina. Fit in Aegypto alba, nigraq; arbore, itè vidi, sed longè melior est priusor. Eiusdè meminit etiâ lib. x i i i. cap. x x. postquam Persæ arboris materiem miris laudibus eomendauit, ubi hæc habet. Nec minus Aegyptia spina celebratur in eadem gente, duntaxat

*Spina A.  
rabica con-  
sideratur.*

*Ruellius ha-  
lucinatus.*

nigra,

nigra, quoniam incorrupta etiam in aquis durat candida verò facili putrescit. Quibus ex locis palam est, non credidisse Plinium, vnam tantum Arabicam, vel Aegyptiam esse spinam, quāvis Ruellius non ita rem accepit. Qui item Galeni sententiam hanc in re non animaduertisse videtur: siquidem Galenus lib. v. 1. simplicium

*Spina A. Arabica. Cardui. Cardui.*

medicamentorum ita scribit. Spinæ Arabicæ radix prosumum muliebrem iuvat, & alia quæcunque, quibus auxilium est quæ apud nos nascitur spinæ: sed efficacius tamen omnia iuuant tum radix, tum fructus ipsius. Hic verò & columellæ prodest, & iis, quæ in sede inflata sunt: tum vlcera ad cicatricem ducit, medicorem habens, & non molestam adstrictionem. hæc Galenus. Qui vt has plantas diuersas habuit, ita etiam seorsum de earum viribus differuit. Planta hæc apud Græcos dicta, Spina Arabica Latinis pariter & Italis appellatur: Mauritanis, Suchaha.

CARDVVS. CAP. XIII.

CARDVVS, Græci scolymon vocant, folia chameleonis habet, & albæ spinæ nigriora, & crassiora: caulem longum edit, foliosum, capite spinoso: radice nigra, & crassa. Quæ illita graueolentiam alarum, totiusque corporis emendat: item si decocta in vino bibatur, copiosam autem vrinam, foetidamque expellit. Herba cum recens tenerescit in olea, asparagi modo, transir.

*Carduorum. Carduorum. Carduorum.*

ET SI vnus tantum Cardui breuiter etiam hoc loco meminerit Dioscorides, Theophrasto tamen, Plinio, ac aliis probatis auctoribus, plurima Cardui genera traduntur. Verum vt primum de his, qui natura cultrice sponte proueniunt, sermo fiat, scire sane conuenit, quod eorum diuersi sunt genera: quorum tamen nomina propria, quod sciam, non habentur. Atque Plinio lib. x. cap. x. duo tantum eorum genera produntur: vnum fruticosum statim à terra alterum verò vnicauale, & crassius. Satiuorum autem, qui tum in hortis, tum in agris feruntur, multiplex est genus. Horum principem locum tenent, qui Hærusis vulgò vocantur Cardoni. Nanque ij diligenti cultura admodò teneri, fragiles, albique cunctant, vt magno quidem apparatu, secundis censis pro te liris cum sale, & pipere extantur. Quo argumento ductus, equidem putauerim de his verba fecisse Theophrastum lib. v. 1. cap. 111. de plantarum historia, cum ita scribit. Quæ autem Cardus nuncupata est, in Sicilia tantum nascitur, Græciæ nulum habetur. Sui generis planta: hæc enim statim ab radice caules repentes in

terram mittit, folio lato, atque spinoso. Caudales hoc castos appellant. desquamari cibo idonei sunt, paulò amaricantes: & reseruare eos aqua salia conditos conseruerunt. hæc Theophrastus. Nostre, quibus vbique nunc Hærusi scatur, eò ex Neapoli allati fuerunt, Neapolim verò (vt audio) ex Sicilia. Quapropter nostri cum hoc Theophrasti genere maxime conuenire videntur, quod scripserit, Cardium Sicilia peculiare esse plantam. Continentur præterea in Carduorum genere etiam ij, quos in Italia Hæruscum vulgus appellat Cardiossi, aliis verò inibi Archichiochi dicuntur, quorum cum meminit Theophrastus eodem loco, cum subdit. Alium verò caulem erectum producit, quem pternicem vocant. Is quoque cibis aptus exerescit, sed reseruari non patitur. Fructus, in quo semen, echinata specie est. Verum exemptis lanuginosis seminibus, is quoque vesendum relinquitur, & cerebro palmas similis est, hæc Theophrastus. Qui pro palmæ cerebro illud, quantum equidem reor, intelligit, quod Galenus encephalon pluribus in locis appellari tradidit, & quod nunc corrupta voce Neapolitanis, & Siculis vulgò vocatur Cefaglione, de quo libro primo in Bdellij mentione abunde differimus. Carduorum autem, quos vulgò Cardiossi vocari diximus, nobis plura sunt genera, varia capituli forma distincta. Siquidem proferunt omnes echinata capitula, sed aliqui spinis fursum respicientibus cōstant, alij verò ad terram versis, nonnulli etiam aculeis vacant. Sunt præterea in hoc postremo genere, quibus echini in longum fastigiantur, quibus verò in globum extuberant, debilitantibus in altero squamatis spicis, in altero iisdem squamis, veluti corticosi vnguibz in vsum compactis, & coagmentatis, nucis pinæ instar. Ex quo facili in eam sententiam deductus sum, vt crediderim, hanc Cardui speciem postremam nucis pinæ æmulam, esse Cardium pineam Theophrasto vocatā, quod hic loco antè citato ita de ea scribat. Est Cardus pinea ab radice foliorum de media seminali acanuis, veluti malum extuberat. hæc ille. Cæterum Cardui aculeati genus & illud est, cuius echinatus capituli floribus Hærusci coaguli vice vtuntur, est Cardui striui omne genus idem suis floribus præstat. Spinis carebunt, vt hortorum cultores testantur, Carduorum capitula, si priusquā ferat semem, acuminata eius latera reundantur. Sine aculeis etiā nascuntur, si delibatis lactuce radicibus, & dissectis semina integra condantur. Vnde illud facili potuit factū esse, vt ij, qui aculeis non rigent, humano cultu miore cūserint, cum natura Carduorum omne genus spinis vacare nequeat. Cardui meminit Galenus lib. v. 1. 111. simplicium medicamentorum: nec tamen plura de eius viribus tradidit, quā fecerit Dioscorides. Sed de temperamento differens, et caliditatis secundæ ordinem completum, aut tertium

*Cardui Cardiossi.*

*Cardui Cardiossi.*

incipientem, siccitatis verò secundum assignauit. Et libro 11. de alimentorum facultatibus, Carduum Cinaram appellauit, ac alimentum, quod corpori præbet, meritò damnauit, quòd melancholicum succum generet. *Σαύρα* ea planta est Græcis, quæ Latinis Carduus, Cinara, & Strobilus nominat: Arabibus, Raxos, Harxos, siue Sacolomas: Italis, Cardo & Carcioffo: Germanis, Strobildorn: Hispanis, Cardo de comer, seu Cardos: Gallis, Artichault, & Cardon.

Nomina.

## POTERIUM. CAP. XV.

POTERIUM, Iones neurada vocant, largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, tragacanthæ proximis: foliis paruis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris: semine nullius visus, sed gustu acuto, & odorato. Nascitur in aquosis, & collibus. Radices demittit binum, ternumve cubitorum, neruosas, & firmas: quæ proximè terram rescia, dant succum gummi similem. Tusa, præcis nervis, & vulneribus glutinandis illinuntur. Decoctum quoque eius neruorum affectibus prodest.

Poterij cō  
sideratio.

EX REE. herbarie peritis hæcenus neminem reperi, qui Poterium in Italia nasci dixerit, atque ipsum ostenderit. Quamobrem facile crediderim, quòd illud non procreet Italia. Nam si inibi nasceretur, fieri quidem non potuisset, quin hæc ætas, quæ rerum cognitioni maxime dedita est, ipsum adinuenerit: præsertim cum Dioscorides, ceterique scriptores Poterij faciem clarè satis descriptam reliquerint.

Cornarij  
opinio fals  
a.

Sed hic subit nobis mirari Cornarium virum aliqui ætatis nostræ insignem, quòd prunum syluestrem putauerit verum Poterium esse. Quæ certe sententia vt est, meo iudicio, absurda, ita non immeritò à Fuchsio medico clarissimo refellitur. Ceterum etsi nobis hæcenus incertum est Poterium, non tamen omittenda sunt eius vires, de quibus sub titulo Neuradis Galenus disseruit lib. 111. simplicium medicamentorum, iis verbis. Neuras, quidam poterium vocant, desiccandi absque morfu facultatem possident, adeò vt & nervos incisus glutinare credatur. Radices eius potissimum sunt eiusmodi. quin & decoctum earum quidam exhibent iis, quibus affecti sunt nervi. Id! Græci *νευρίσιον*, quod item Poterium Latini vocant: Ita li, Poterio.

Nomina.

## ACANTHIUM. CAP. XVII.

ACANTHIUM albæ spinæ simile,

foliis aculeatis per extremitates, † & lanugine araneosa obductis. ex qua collecta, & neta, vestes bombicinis similes texunt. Folia, vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur.

Acanthij  
considera  
tio.

QVOD Acanthium, cuius hic inter aculeatas herbas meminit Dioscorides, in Italia nascatur, equidem affirmare non ausim. Quandoquidem hæcenus neminem inueni, qui folia alicuius aculeatæ herbæ mihi ostenderit, quæ adeò araneosa, ac subtili lanugine obducta spectarentur, vt ex ea neta vestes bombicinis similes texere quis potuisset, vt hic Dioscorides, & li. 11. ca. 111. testatur Plinius. Quamobrem ingenuè asserere non dubitauerim, eos magno in errore versari, qui pro Acanthio quædam Cardui montani speciem, echino lanugine quadam obducto, demonstrant. Nam præterquam quòd hæc folia habeat nulla lanugine velata, nullo pacto quæ echinatum capitulum circumuestit, depecti, vel neri potest, vt potè quæ tenuissima sit, sine villis, fragilis, ac omnis lentoris experta. Quod Græci *ἀκανθίον*, Latini similiter Acanthium, & Itali Acanthio dicunt.

Quorundam  
error.

† Verba illa de lanugine non leguntur in Græcis Dioscoridis exemplaribus: quæ tamen hic desiderari ostendit abruptus auctoris sermo. Vnde ea non temerè ex Plinio adiecerunt interpretes, eius tantum, vt puto, auctoritate freti. Nos verò eò audacius illa addenda putamus, quòd ea legantur in Orisassij codice manu scripto, in quo ex probatissimo Dioscoridis libro ita transcripta inueniuntur. *καθ' ἃ λανυγία* *ἀπὸ τῆς ἰσῆος*. quæ ad verbum sonant. Circa quæ araneosa est lanugo.

Nomina.

## ACANTHVS. CAP. XVII.



ACANTHVS, Romani pæderotam vocant, nascitur in hortis, petrosis, & riguis. Folia habet multolactu caceislatoria, & longiora, erucæ diuisura, nigricantia, pinguis, læuia: caulem binum cubitorum, digitali crassitudine, læuem, prope verticem ex intervallis circunda

50

cundatum foliolis, ceu nucamēta quædam oblonga referentibus, spinosis, è quibus flos prodit albus: semē oblongum, luteum: caput thyrſi specie: radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosiſ. Quæ vſtis igni, & luxatis artubus illitræ ſubueniunt: potæ vſinam ciunt, ſed alium cohibent: ruptis, conuulſis, tabem ſentientibus, mirè proſunt. Nascitur & ſylueſtris Acanthus, ſcolymo ſimilis, aculeatus, breuior quàm ſatiuus, & iſ qui in hortis prouenit. Cuius radix ad eadem ad quæ ſuperior efficax.

*Acanthis  
conſidera-  
tio.*

CREDVNT omnes ſerē huiſce temporis rei herbariæ ſtudioſi, Acanthum eam eſſe plantam, quæ nobis vulgò vocatur Branca orſina. Quorum ſententia nec proſus refragari, nec planè adſtipulari poſſum. Nam eſt in eorum opinionem multæ adducæ rationibus, non ſolum quòd iſ magnæ ſint apud me auctoritatis, ſed etiam quòd ipſe viderim hanc, quæ Branca vſina dicitur, foliis lactuca latioribus, longioribuſq; , erucæ modò laciniaſis, nigricantibus, ac molli quodam lauore pinguibuſ: caule item læui, bicubitali, pollicari craſtitudine, per intervallū ſub ipſum vſq; verticē folioſis quibuſdam oblongis, veluti nucamentis, circumdato: è quibus flos prodit candidus, & inde ſemen oblongum, luteumq; : atque etiam radice eadem conſteſ, quæ Acanthus, aliqua tamen relinquitur dubitatio, an Branca vſina legitimus ſit Acanthus, cūm foliola, quæ nucamenti inſtar illius caulem cingunt, nullis ſpinis horrida conſpiciantur, plantæque ipſi videatur topiariis operibus inepta: ad quæ Acanthus olim (vt Plinius libro & cap. x x i i. auctor eſt) conueniens habebatur: ac etiam ea hodie ab omnibuſ ſerē negligatur, & veluti ignobilis planta, in perpaucis tum hortis, tum viridariis ſeratur, cūm apud antiquoſ Acanthus celebris, & in magno honore habitus ſit, ac plurimis laudibus fuerit decantatus. Neque illud ſuſpicionem noſtram diluit, quòd dixerint aliqui Acanthina folia, quæ in quibuſdam Italiæ locis marmoreis columnis, præſertimq; Corinthiaſ imitantibus, inſculpta reperiuntur, nulla proſus linea à Brancæ vſinæ foliis diſſerre. Siquidem cōtrā iſ quiſpiam facile reſpondere poſſet, quòd eſt vtræque eandem retineant formam, non ob id tamen neceſſario vnam & eandem ſpeciem repræſentant. Quare quemadmodum dubium eſt afferere, Brancam vſinam ab Acantho non diſſerre, ita idem negare vritum eſſe videtur. Cæterum ad hanc tollendam dubitationem

illud non paſſi, meo iudicio, facit, quòd iſdem facultatibus Branca vſina prædita ſit, quibus pollere Acanthum Dioſcorides, & Galenus memoriæ prodiderunt. Illud inſuper addiderim, quòd eſt dicat Dioſcorides, oriri Acanthum caule folioſis ſpinofiſ, ceu nucamentis, prope verticem vſq; ex intervalliſ circumueſſito, poteſt tamen intelligi, quòd non re vera foliola illa aculeiſ horreant, ſed quòd adeò acuminata erumpant, vt ſanè ſpinis perſimilia videantur. Id quod facile credi poteſt, cū cæteris omnibuſ notis Branca vſina Acantho à Dioſcoride repræſentato adamuſſim reſpondeat. Neque impedit, quòd loco citato aſſerat Plinius, Acanthum in hortis crepidineſ marginum, aſurgentiūq; puluinorum toroſ veſſire. Quamvis enim neſci haud facile ex ſe valeat, tamen tum caulib; , tum folia ab eorū molliem, lentoremq; adeò ſelecti queunt, vt vimineo aliquo nexu topiario operi etiam non incommode aptari poſſint. Hiſ itaq; rationibuſ innixuſ, eoſ equidem non aberraviſſe exiſtimo, qui Acanthum, & Brancam vſinam, vnam & eandem plantam eſſe ſcriptiſ tradiderunt. Reperitur & ſylueſtiſ Acanthus carduo (vt Dioſcorides inquit) ſimiliſ, ſpinuſ, foliis tamen domeſtico anguſtioribuſ. Quocirca non ab re Plinius quoq; duo Acanthi genera conſtituit. Acanthi meminit Galenus libro v i. ſimpliſ: cūm medicamentoruſ, ſic inquit, Acanthoſ, alij quidem Melamphyllum nominant, alij verò Pæderora. Folia quidē mediocriter digerentem facultatē obtinent. Ad radicē exicatoria eſt, & leuiter inciuſoria, & tenuiſ partium. Planta, quæ Græcè *ἀνάθη*, Latine ſimiliter Acanthus nominatur: Italicè, Acantho, & Branca orſina: Germanicè, Berencklau: Hiſpanicè, Yerua gigante, & Branqua vſina: Gallicè, Bræque vſine. Quæ verò Græciſ *ἀνάθη* *ἀγρία*, Latinis Acanthus ſylueſtiſ vocatur: Italiſ, Acantho ſaluatico.

*Acanthis  
facultas  
ex Gale.*

*Nomina.*

#### ANONIS, SIVE ONONIS.

##### CAP. XVIII.

ANONIS, quam aliqui ononida appellant, ramos habet fruticofos, do-drantales, aut maiores, frequentibus geniculis cinctoſ, cauſ alarum multuſ, capitibuſ rotundiſ: foliis lenticula, tenuibuſ, puſilliſ, ad rutæ, aut pratenſiſ loti folia accedentibuſ, ſubhirſuſ, odoratiſ, non inuicundè olentibuſ. Muria conſtititur, antequàm ſpinuſa fiat, cibis gratiſſima. Rami acutior

tioribus spinis, & veluti spiculis firmioribus horrent. Radicem mittit candidam. Quæ excafcit, & extenuat. huius cortex ex vino potus vrinam ciet, calculos comminuit, margines vleram erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium collatione mitigat. Decoctum eius potu hamorrhoidas sanare creditur.

## ANONIS, SIVE ONONIS.

*Anonidis  
confidera  
tio.*



## NASCITUR

Anonis in pratis, cultis, atq; etiam in uulgis locis, arido præsertim solo: foliis tenuibus lentis modo, pusillis, quæ ad rurs, vel pratensis loti effigiem proximè accedunt, ac cæteras omnes notas refert, quibus à Dioscoride depingitur. Rusticis ob id norissima est, quod non modo suo ramorum, ac

radicū implexu, aratra iniuitis bubulcis in medijs agrorū sulcis sepius remoretur, unde Recta bonis compluribus nominatur, sed quod etiam messoribus, & fenissicis spinis suis acutis admodum sit infesta. Nam eisi prædura, callosa; sit eorum cutis, eam tamen suis perforat uulcis, quibus quasi spiculis, cum maturuerit, horrida confpicitur. Infubrens hanc vulgò Bonaga vocant. Cæterū quāuis floribus eius nihil meminerit Dioscorides, constat tamen flore plerunque purpureo subalbicante, interdū tamen aureo. Sed hæc quibuscūq; in locis aculeis vacat. Meminit Anonidis, ononidis nomine, Theophrastus libro v. i. capite v. de plantarum historia, sic scribens. Ononis ramis aculeigerum est, anno tantum perdurans, folio ruta similis, sed per totum caulem apposito, ut veluti coronam ex interuallis tota species repræsentet. Florem minutulum, & in siquis non vndique septum edit. Nasctur glutinoso, latroque solo, & præcipue in segetibus, atque cultis: quæ de causâ agricolis inimica exit. Viuax admodum est. Cum enim aliam nacta tellurem fuerit, protinus sua infirma pellit: & singulis annis, surculis in latus emissis, rursus postero anno deorsum versus peliere solita est. Ideoque effodiendâ totâ, extirpandâque penitus est. Incipit germinare æstate, perficiturq; autumnò, hæcenus Theo-

*Anonidis  
hisor. ex  
Theophras  
sto.*

phrastus. Huius quoque mentionem fecit Plinius libro x x i i. capite i i i. vbi sic inquit. Anonim, quidam ononida malunt vocare, ramosam, similem feno Græco, nisi fruticosior, hirsutiorque esset, odore iucundo: post ver spinosa. hæc Plinius. Qui tamen hac in re errasse deprehenditur: siquidem non post ver Anonis spinosa redditur, sed (ut Theophrastus author est) in autumnò. Id quod etiam experimèto comprobatur. Anonidis radix viam maximam præstat ad renum calculos comminuendos, expellendosque, obstructis præsertim vrinæ meatibus, quod multorum testimonio compertum est qui calculo affecti, vbi tantum radices corticum puluerem ex vino diutius bibissent, pristinam sanitatem recuperarunt. Noui ego quendam, qui huiusce radices puluere duntaxat pluribus mensibus sumpto, carnosum ramicem absumpsit, & sanatus est: licet à medicis nullo alio medicamento, quàm sola sectione, ystionèque hunc curari posse antea statutum esset. Anonidis vires descriptit Galenus libro v i i i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Ononis radicem habet tertio quadantenus ordine excafcientè. Cortex eius maximè est vtilis, habens quippiam & absterforium, & incisforium. Proinde non tantum vrinam prouocat, sed & lapides confringit. Eadem facultate & crustas cito detrahit. Vtuntur porrò ea quoque & ad dentium dolores, in oxycrato decoquentes, & collui decocto tubentes. Huic plantæ nomen Græcè est *ονονις*, & *ανωνις*: Latini huiusmodi, Anonis, & Ononis: Italicum, Anonide: Germanicum, Haunhechel, & Stalkraut: Hispanicum, Gatilhos, & Gathinos: Gallicum, Bugraues, & Bugrundes.

*Anonidis  
vires ex  
Galeno.*

*Nomina.*

## LEVCA CANTHA.

CLAD. XXX.



LEVCA CANTHA, prædita est radice cyperi, valida, & amara. Quæ manducata dolorè dentium sedat: veteri laterum dolori, atque ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex vino potò.

Eadem ruptis, & conuulsis medetur.

Radicis

Radiciſ epotus ſuccuſ eſodem præbet effectus.

*Leucacantha conſideratio.*

IN maniſeſto errore verſantur, qui ſentiunt, Leucacantham, hoc eſt, albam ſpinam, de cuiuſ hiſtoria, & viribuſ hoc capite tractatur, ab Acantha leuce, id eſt, ſpina alba, de qua paulò ſuperius diſſeruiſimus, nullo pacto diſſerre. Quam ſententia, vel potius errore, ſuere nonnulli ex recentioribuſ, alioqui rei herbariæ periti. In quoruſ etiam numero Ruelliuſ fuiſſe ex eo maxime deprehenditur, quòd cum debuſſet, more ſuo, poſt Anonidiſ tractationem, cuiuſ titulo ſpinam albam quoque adiunxerat, quoniam tamen albam ſpinam nominariſ rectuſ ſortè erat, ei uſ deni albæ ſpinæ hiſtoriam reſerre, ex industria eam ſilentio præterit. Nam cum exiſtiſmaſſet, alteram ab altera non diſtingui, non opuſ eſſe iudicauit, earum hiſtoriam in Alba ſpina repetere, quam antea in Spina albæ mentione traderat. Quo tamen in loco ab errore vindicari non poteſtiſ quippe quoniã poſtquã ſine albe, quã Mauritani Bedeguar appellat, meminert, alterã ei uſ nominis ſpinam ſubdidit, quæ cum in arbuſtum vndique aculeiſ armatum aſſurgat, ſepiſbiſ extruendiſ rutiſciſ noſtribuſ maxime expetitur. Non tamẽ ob id declarat ipſe hanc eſſe Leucacanthamiſſe lubrico quodam lapſa, quaſi ſui ipſi uſ, & cuiuſ ſpinæ albæ mentionem faceret, obliuſ, in capitiſ calce aculearũ illiuſ arbuſculæ radicibuſ, quæ (ni fallor) candida eſt Dioſcoridiſ rhamnuiſ, omneſ tribuit ſcaltateſ, quibuſ legitima ſpina alba à Dioſcoride commendatur. Qui quidem Ruelliuſ errat omnibuſ euidentiſ eſt, quam ut pluſibuſ reſelli poſſulet. Quòd autem diſſerant inter ſe Acantha leuce, & Leucacantha, non modò Dioſcoridiſ inter ceteroſ ſimpliciuſ medicamentoruſ ſcriptoreſ facile princepſ oſtendit, ſed Galenuſ etiam, & Pauſuſ, qui præterquam quòd alteram ab altera diuerſiſ capitibuſ diſtinxerunt, earum ſingulaſ diſſerentiſbuſ ſcaltariſbuſ præditaſ eſſe tradi derunt. Quoruſ ſententia ſubſcribit Pliniuſ: nam de Acantha leuce diſſerent lib. x. x. i. i. i. cap. x. i. i. ſic inquit. Spina albæ ſemen contra ſcorpioneſ auxiliatur. Corona ex ea impoſita capitiſ doloreſ minuit. Sed vires longè aliaſ ab hiſ Leucacanthæ idem retulit libro x. x. i. i. cap. x. v. i. ubi ſic habet. Leucacantham alij phyllon, alij iſchiada, alij polygonon appellant, radice cyperi, quæ commaneda catentium doloreſ ſedat. Item laterum, & lumboruſ (v. Nicceſiuſ tradit) ſemine potodactimiſ oſto, aut ſucco. Eadem ruptis, conuulſiſque medetur. hæc Pliniuſ. Quæ quidem viduiſſe debuerat Ruelliuſ, alioqui Pliniã hiſtoriæ ſtudioſiſſi uſ: aut certe Hermolao doctiſſimo viro credidiſſe, à quo (eſi nunquam iſtũ ei uſ ei uſ integra quandoque capita, imò (pace ſi uſ dixerim) integram ſerẽ ſurripuit opuſ, ita ut iſ omnibuſ illud ſuum ſeciſſe videatur. Siqui

dem Hermolauſ, cum in Leucacantha, tum aliã ſepenumero commonuit in ſuo Corollario, hanc acantha leuce diſſerre. Porro illud etiam nobiſ ſilentio non diſſimulandum, ut ingenuè quòd ſentimuiſ de ſimplicibuſ dicamuiſ, quòd Leucacantha herba eſt, non autem arbuſcula ſepiſbiſ conſcienſiſ idonea, v. falſo, mea quidem ſententia, Muſa Braſauioluſ ſuo de ſyrupis libello in eupatoriſ ſyrupò exiſtimat. Nam hoc loco de herbiſ tantum, & non de arbuſculiſ ſcribit Dioſcorideſ: qui nimirum in ſimpliciuſ hiſtoria peritiſſimuiſ, arbuſculum illam ſuſ præ libro primo inter Rhamnii genera deſcripſit, & ſub candido, ut puto, complexuſ eſt. Ceterum cum nec Dioſcoridiſ, nec Pliniuſ tradant, quibuſ ſoliſ, quo caule, flore, ac ſemine Leucacantha proneniat, diſſicile quidem fuit inter tot aculeataruſ ſimpliciuſ genera, vnam ſecernere, quæ verè Leucacantham repræſentet. tamenſi dammanduſ viſqueaque non eſſet, qui dixerit Leucacantham eſſe forſaſ aculeatum illuſ Carduũ, de quo in Acantha leuce diximuiſ, cuiuſ ſolia albiſ quibuſdam maculiſ depinguntur. Nam præterquam quòd conſectura quadam dici poſſet, eam à maculiſ illiſ albiſ canthiſ ſibi Leucacanthæ nomen adiuuenſſe, radicibꝫ etiam ipſuſ tum duriciſ, tum amariſſimo, eſt formã cyperinaſ non æmuletur, conſentire videtur. Sed hoc potuiſ diſcandũ, quã aſſerendi gratiã proponimuiſ: cum adhuc nihil ceri nobiſ comperit ſit. Leucacanthæ vires pauciſ perſtrinxit Galenuſ lib. v. i. i. ſimpliciuſ medicamentoruſ, ſic inquit. Leucacanthon, quidam autem polygonaron, alij iſchiada nuncupant. Huiuſ amara radix eſt, ac proinde incidit, & exiccat in tertio ordineſ caſſiando autem ex primo eſt ordine. Aduſta quæ Græciſ, Alba ſpina Latinuſ appellatur: Italiſ, Biaca ſpina: Galliſ, Chardon noſtre Dame.

*Leucacantha vires ex Gal.*

*Nomina.*

#### TRAGACANTHA. CAP. XX.

TRAGACANTHÆ radix lata, & lignoſa ſummo ceſpite nititur: vnde ſurculos humileſ, robuſtoſ, latiſſimè fundit: in quibuſ minuta ſolia, multa, non nunquã tenuia exoriuntur: quæ ſub ſe ſpinas albaſ, rectaſ, & firmas occultant. Eſt etiam nuſ tragacantha lacryma, quæ vulnerata radice manãſ, concreuit. Præſtat pellucenſ, graciliſ, læuiſ, ſyncera, & ſubdulciſ. Cutiſ ſpiracula, v. gummi, obſtruit. Huiuſ increbuit uſuſ ad oculoruſ medicamenta, ad tuſſim, exaſperataſ fauceſ, reſuſaſ voceſ, ceteraſque deſtillationeſ, cum melle in delictuſ: ſubdita quoq; linguæ liqueſcit. In paſſo ma

defacta, drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & vesicæ rosiones, misto cornu cerui vîto, & eloto, aut scissi aluminis momento.



*Tragacantha confideratio.*

TRAGACANTHAE plantam, à qua effigiem, quam hic exhibemus, deprompsimus, iam pridem ad nos misit quidam rei herbariæ studiosus, qui illam attulerat ex Apulia Gargano monte. Ea certe est, quæ nullis prorsus notis à Dioscoridis historia dissentiat, ut ex eius pictura omnibus liquidò constare potest. Cæterum lacryma è vulnerata radice manans, quam sepiâ fieri vulgò vocant Gomma draganti, passim in officinis concreta visitur, è Creta, Asia, & Græcia aduecta. At non modò hæc (ut Dioscorides inquit) è vulnerata prius radice manat, sed etiâ sponte (ut Theophrastus est author) ab ea scisso in latere cortice disillat. Sed hanc, quæ vitur,

*Monachus in hunc error.*

Monachi illi reuerendi, qui in Mèluem commèrarios ediderunt, veram esse Tragacanthæ lacrymam negant, quòd legitima linguæ subdita facilè, Dioscoridis testimonio, colliquefat: hæc verò nunquam, cum linguæ supposita adeò lenta, tenâque euadat, admissa salua, ut nullo ferè temporis tractu dissolui liquarique possit.

Qua quidem in re ij (pace eorum dixerim) toto cœlo aberrant, ut qui Dioscoridis sententiam perperam acceperint. Siquidem Dioscorides non de sola lacryma linguæ subdita, sed in eclegmate cum melle conformata, illud fieri scribit, cum inquit. Vîus eius ad oculorum medicamenta, ad tussiles, exasperatas fauces, retusas voces, cæterâque destillationes, cum melle in delinètu liquefitque subiecta linguæ. hæc Dioscorides. Ex quibus palàm est voluisse Dioscoridem Tragacanthæ lacrimam non solam & per se tantum, sed in eclegmate cum melle paratam linguæ esse subiiciendam, ut clarissimorum medicorum institutione fieri adsolet cum bechicis catapotis, & diatragacanthæ trochiscis, quibus ipsa commiscetur. Quippe cum oporteat medicamenta, quibus aspera arteria, pulmo, ac pectus vniuersum expurgari debent, quadam temporis diuturnitate ore retenta, vel linguæ subdita sensim, lenitèrque liquefcere, ut commodè in tracheam percolentur arteriam

voluit hic Dioscorides eclegmatis vsum recta methodo describere. Nam si huiusmodi medicamenta deuoraretur, nihil prorsus proficerent cum ita non in pectus & pulmones deferantur, sed in ventriculû. Huic & alia accedit ratio, quòd si intellexisset Dioscorides lacrymam per se tantum linguæ submitteendam, subiunxisset quidem, ut sui moris est, quibus in morbis id faciendum esset. quandoquidem planè absurdum videretur scribere, quòd aliquod gummi linguæ subiiciatur, paulatimque liquefcere cogatur, ac deinde silentio inuoluere, quibus in morbis id faciendum. His itaque rationibus non modò rectè, meo quidem iudicio, intelligi potest voluisse Dioscoridem, eclegma, quod Tragacanthæ lacrymam exceperit, linguæ subiiciendum esse, non ipsam tantum lacrymam, sed etiam Monachos in hoc, ut alias sæpe, deceptos esse. Tragacanthæ vires scriptas reliquit Galenus libro v i i i. simplicium medicamento- rum, his paucis verbis. Tragacantha similem gummi vim obtinet, emplasticam quandam, & acrimoniam hebetiorem (legunt aliqui, quæ acrimoniam obtundit.) Et sanè similiter illi desiccatur. *Tragacantha* sic Græcè, ut etiam Latine, & Italicè, Tragacantha vocatur: Arabicè, Chitira, Itica, Chateth, Alcutud, seu Alchathad: Germanicè, Dragant: Hispanicè, Alquetira.

*Tragacantha vires ex Gal.*

*Nomina.*

#### ERYNGIUM.



#### ERYNGIUM. CAP. XXI.

ERYNGION aculeatarum generis. Cuius folia in principio, sale condita, in cibos recipiuntur. Lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, gustu aromatica: sed ubi adoleuerunt, circa complures



ERYNGIUM MARINUM.



plures caulium eminentias in spinas aculeantur. in quorum summitatibus globosa capitula, durarum, acutissimarumque spinarum ambitu stellatim circumuallantur, quorum color aliis viridis, aliis albus,

interdum caeruleus inuenitur. Radix oblonga lata, foris nigra, interne candida, pollicis crassitudine, odorata. Nascitur in asperis, & campestribus. Vim habet calfactoriam. Potamenses, & vrinas pellit: tormina, inflationesque, discutit: contra iocinerum vitia, serpentium, morfus, & hausta venena, cum vino prodest: bibitur aduersus plurima, cum seminis pastinacæ drachma vna. appensa, illitæ, tubercula discutere proditur. Potam hydromelite radix, opisthotonicis, & comitialibus medetur.

*Eryngij sideratio.* LONGE quidem aberrant seplasiarj Senesces in Eryngij cognitione, vtpote qui pro Eryngij radicibus assumunt aculeatæ crinidæ stirpis radices, quam Cacatreppola vulgè vocant. Hinc error omnibus facile deprehenditur, quod nulla penitus illius plantæ nota eryngio respondeat. Legitimum Eryngium, quod, meo iudicio, Dioscoridis descriptioni nihil refragetur, frequens inuenitur prope Tridentina moenia, ac in Goritensi agro, quin & in compluribus Italiæ locis. Est & Eryngium maritimum, quo Veneta litora vndique referta spectantur. Assurgit hoc foliis altero latioribus, circinato ambitu spinosis: radicibus longioribus, mollioribusque, saccharo asseruandis longè magis idoneis, quam alterius. Huius tamen non meminerit Dioscorides, Plinius tamen lib. x x i. cap. v i i. vtriusque historiam tradidit. Quo fit, vt eorum sententiam minimè probauerim, qui Eryngium marinum Crocodilium esse existimant, vt in crocodilij mentione superius diximus. Sunt & qui credant,

Quorumdam  
damerro-  
res.

Eryngium Mauritanis à Secacul non differre. Veruntamen ij quoque hallucinantur: nam cum Serapio in capite de Secacul, neque Dioscoridem, neque Galenum citet, quos maximè in simplicium historia sequitur, quorumq; dicta bona fide refert, sed tantum suæ gentis auctoribus nititur, clarissimum præbet indicium, Secacul diuersum fuisse, & plantam Græcis incognitam. Siquidem si pro eryngio Secacul scripsisset Serapio, ei sanè non fuisset opus, piùò inferius de eryngio tractare ex Dioscoridis, & Galeni sententia, magno virum & notarium discrimine. Quamobrem non parum falluntur, qui Secacul ab eryngio fecernere nescientes, Eryngij radices cum saccharo, tum melle affluas veneris infelicer commissit auxillis, vt, qui ederint, fortiores, salacioresq; reddantur. Quippe hac facultate Eryngium præstare nusquam hæcenus apud Dioscoridem, & Galenum mihi reperire licuit, quatenus polere Secacul memoriæ prodiderunt Arabes. Cæterum animaduertendum est Serapiem Aflera Atticum, siue Bubonium cum eryngio confudisse, stellarum similitudine deceptum, quæ caeruleo colore se inuicem amulantur: et si quæ Bubonio insunt, nullis aculeis horreant. Meminit Eryngij Galenus libro v i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Eryngium caliditate quidem aut parum, aut nihil, quæ temperata sunt, superat. Siccitatem verò in tenui essentia consistentem non parum obtinet. Eius nomen Græcum ἐρύγγιον: Latinum item, Eryngium: Italicum, Eringio: & Iringo: Germanicum, Brachendistel, Manstreu, Hispanicum, Cardo corredor: Gallicum, Panicault.

*Eryngij  
res ex Ga-  
leno.  
Nomina.*

ALOE. CAP. XXII.



ALOE folium scillæ similitudine habet, crassum, pingue, modicè latum, rotundum, retrorsus pandum:

B 5 folia

folia gerit curta, quæ vtrinque ex obliquo longioribus intervallis striantur, & in spinulas desinunt. Caulis emittitur non dissimilis antherico: flos albus: fructus hastulæ regię cognatus: grauior est odore, & gustu amarissimus: radice vna, ceu palo, in terram depacta. Plurima, præpinguisque in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nascentur etiam in Asia, & Arabia in locis quibusdam maritimis: & in insulis (vt in Andro) non valde succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanè quàm utilis, si detrita illinatur. Duo succi genera: quoddam arenosum, quod sedimentum purissimè esse videtur: alterum ad iecinoris imaginem vergit. Eligi debet boni odoris, sincera, quæ nihil doli sensit, nitida, calculorum expers, rufi coloris, friabilis, ac iecinoris modo coacta, facili liquefscens, eximie amaritudinis. Improbatur nigra, & fractu contumax. Gummicam adulterant: quodprehenditur gustu, amaritudine, & valido odore: eoquæ argumento, quòd digitis friata non ad minima vsque frustra resoluitur. Nec desunt, qui acaciam immisceant. Natura eius est spissare, excicare, somnum allicere, & corpora densare, aluum resolvere. Stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua frigida, aut egelida pota: sanguinis reiectiones sistit: regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu: deuorata cum resina, aut cum aqua, vel melle cocto sumpta, aluum soluit: purgationis perfectæ causat: tribus drachmis sumitur. aliis purgatoriis medicaminibus admista, præstat, vt minus stomachum infestent: sicca glutinandis vulneribus inspargitur: vlcera ad cicatricem perducit, cohibetque. Eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur, & disructa puerorum præputia iungit: condylomata, rimasque sedis ex passo sanat: hæmorrhoidum abundantiam,

& sanguinis eruptiones sistit: pterygia ad cicatricem ducit: liuores, & insignita ex melle tollit. Priuatim scabras lipitadines, pruriginésque angulorum permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosafacco: capillum fluentem continet cum vino: tonsillis, gingiuis, & omnibus oris vlceribus, cum melle & vino proficit. Oculorum medicamentis torretur in munda, & candenti testa, pennaque subinde versatur, vt possit æqualiter torrerri. Lauatur, vt quod sit arenosissimum, tanquam inutile subsidat, & læue, ac pinguisissimum assumatur.

No n dubium est, quin ea legitima sit Aloë, *Aloë* cœn qua passim officinæ vtuntur. Nam electissima, ac purissima (adulterata enim quandoque etiam inuenitur) omnes præstat notas, tum vires, quæ syncerissimæ à Dioscoride assignantur. Aloë ætate nostra in quam plurimis Italiane locis vitæbære con-

## OPUNTIA.



spicitur, præsertim Rome, & Neapoli, vbi super adium fenestris, ac arboribus in scissilibus vasis terra plenis alicui, ac fouetur ad speculaculum potius, quàm ad medicamentum. Quemadmodum & hebra Plineo OPUNTIA dicta, folio Aloë longè crassiori, ac ampliori. Mirum quòd ex huius folio tantum plantato radices sunt, atque ea ita non secus nascitur, ac si tota planta fereretur. Illud etiam eam spectantibus permirum accidit, quòd temporis spatio fructus proferat fisis similes. vnde à plebilo: Ficus india nominatur. Inuehuntur acerrimè in Mesuëm Manardus Ferrariensis, & Fuchsius ipsum secutus, quòd affirmauerit ille, Aloë per os sumptam venarum oscula adeò reserare, vt inde postea sanguis facili exiliat, cum id (vt ipsi aiunt) tum Dioscoridis, tum Galeni placitis maxime repugnet. Verùm quàm longè ij, quorum pace dictū sit, à veritate desierint, non multo quidem

*Opuntia Plin.*

*M. succ. a caluicia. Cindica. 1000.*

*Aloës Si-  
res ex Ga-  
leno.*

dem labore demonstrare possem, ni præter in-  
stitutum nostrum id esse censerem, nique com-  
pertum haberem, illis prius rectè, meo iudicio,  
responsum fuisse à Jacobo Sylvio clarissimo  
ætatis nostræ medico in Mesium scribente, &  
à Gratianopolitano quodam. qui tam proba-  
tissimis rationibus Mesuem tuerentur, ve non am-  
plius Manaræ, ac Fuchsi hic eum lacerandi  
locum relictum esse putem. Aloës meminit  
Galenus libro v i. simplicium medicamentor-  
um, vbi sic habet. Hæc herba non admodum  
apud nos prouenit: & quæ nascitur in magna  
Syria aquosior est, & facultatis imbecillioris:  
attamen visque adeò desiccare potest, vt vulne-  
ra conglutinet. At in regionibus calidioribus,  
qualis est Cælesyria, & Arabia, multò est mel-  
lior. Optima autem India, cuius liquor est, id  
quod ad nos importatur, medicamentum Aloë  
cognominatum, ad plurimas res, propter siccita-  
tem mordicationis expertem, vtile. Est autem  
non simplicis nature, sed vt indicio est  
gustus, adstringit simul, & amara est: adstringit  
quidem mediocriter, sed vehementer amara  
est. Subducit & ventrem, vt puta ex numero  
medicamentorum, quæ Græci ab excernendo  
stercore vocant *διωκτικά*. Itaque ex dictis patet  
(si quidem memoria tenemus, quæ in quarto  
libro sunt demonstrata) quod, tertij sic or-  
dinis exiccantium, calascientium autem aut pri-  
mi intensi, aut secundi exoluti. Sed & ipsius  
facultatis misturam attestantur particularia eius  
opera: nam & vtile stomacho medicamen est,  
vt si quid aliud: & sinus glutinat. Sanat & vl-  
cera, quæ agrè ad cicatricem duci possunt, &  
maximè, quæ in ano sunt, & pudendo. Iuuat  
& eorum inflammationes aquasubacta, & vulne-  
ra eundem ad modum glutinat. Congruit si-  
militer videnti & ad inflammationes in ore, ac  
naribus, & oculis. In summa, repellere, & di-  
gerere simul potest, cum hoc, vt paulum ex-  
tergat, quantum videlicet viceribus puris non  
sit molestum. Præterea idem Galenus libro  
v i i. de compositione medicamentorum lo-  
cum in hierz mentione, de Aloë ita scriptum  
reliquit. Atqui ipsam aloën Andromachus qui-  
dem lotam, ex aliis autem aliqui etiam sic, ali-  
qui verò illotam adiciunt. Verum iam nosse  
operæ præcium est, ad ventris subductionem  
illotam aloën aptiorem esse, multum verò de  
medicamentaria vi deponere lotam, quam  
etiam febricitantibus dare aliquis audeat, si  
non vehemens, sed valde debilis sit febris.  
Quidam verò etiam ex illota aloë pharmacum  
multis sic febricitantibus exhibuerunt, deinde  
cùm nihil manifestè lessissent, in aliis rursus  
maximum experti sunt nocumentum. Infestis-  
sima est enim aloë, etiam lota, his qui citra vi-  
ciatos humores ex intemperie calida & sicca  
affliguntur. Proximam ab his læsionem perci-

piunt, qui siccam intemperiem habent, etiam  
cum frigidityte coniunctam: & in vniuersum  
qui ex sola qualitate particulum aliquam læ-  
sam habent. Etenim in humoribus intempera-  
tura, pharmacis ipsi euacuantibus egent, quæ  
verò absque his confluant, penitus in talem  
deueniunt ex pharmaci huius ex aloë constan-  
tis vsu. Itaque vbi humiditas viciata tunicas  
ventris perriget, ex aloë picra vtilis est, expur-  
gans humiditatem. Omnino autem sic affectus  
aceffus nauseæ plus aut minus adest. Euacua-  
tio igitur affluentis humoris per solam aloën  
contingit, quæ purgatoria vim non fortem  
habet, sed vt ea, quæ circa aluum sunt, quæ  
etiam contingit, purgare possit. Et si aliquando  
ampliori pondere exhibeatur, vsque ad locos  
circa hepar confendit, non tamen totius cor-  
poris purgatoria aloë exillit. Cæterum ex his  
quæ ei adascitur, mastiche vt stomacho com-  
moda & odora, & quæ medicamentariam aloës  
vim frangere queat, admiscetur. Cinnamo-  
mum verò eadem gratia, & præterea quod tenuis-  
simam partem est, vt aperire ventris  
meatus possit, extergereque ac attenuare, si  
quid viscosum aut crassum in humoribus ferat-  
ur. Crassos enim humores ob purgatoria fa-  
cultatis imbecillitatem, aloë trahere non po-  
test. Quapropter biliosorum ventris affectio-  
num optimum pharmacum est, adeò vt in vno  
die sæpe multos stomachicos credios persua-  
net. Iuuat autem & hos, & alios omnes affe-  
ctus ex vitiatis humoribus ortos, cinnamo-  
mum admixtum: vt pote quod alterantem ha-  
bet facultatem vitiosorum qualitatum in id  
quod secundum naturam habet. Hactenus de  
aloë ex Galeno locis citatis. Desicet Aloë ( vt  
Mesues auctor est ) non modo bilem: sed &  
pituitam ipsam. Caput, ventriculūque mun-  
dat, quorum etiam cruciatibus maxime succur-  
rit. Inflammato, assuauitque bilis redundan-  
tia ventriculo auxilio est. Quotidianus eius  
vsus à mortiferis morbis tuerit. Vindictā put-  
redine, addita myrrha, non modò viuientium,  
sed etiam desinctorum corpora. Cum draco-  
nis sanguine, & myrrha vlcera contumacia san-  
at, quod sine moritu aliquo exiccare possit.  
Sensus omnes, intellectūque acuit, secur ab  
infarctu purgat, & regio morbo medetur. Hæ-  
morrhoidibus tamen, ac cæteris sedis inflam-  
mationibus nocet: quamobrem iis ab eius as-  
sumptione abstinendum est, qui aliquam in il-  
lis partibus noxam patiuntur. hæc Mesues. Cæ-  
terum necæ Aloë ventris tinea ex lacte, vel  
melle sumpta: aut vmbilico tenus apposta, bu-  
ballo felle, & aceto subacta. Planta, quæ Græci  
*ἀνθε*, Latinis etiam Aloë vocatur: Mauritaniis, *Nomina*.  
Saber, Paber, siue Sabar: Italis, Aloë: Germa-  
nis, Aleparic, & Bitter aloes: Hispanis, Hierna  
babosa: Gallis, Aloës, seu Perroquet.

*Ex Me-  
sue.*

ABSINTHIUM.

CAPVT XXIII.



Absinthium, aliqui bathypicon, herba vulgò cognita. Præstantius in Ponto, & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi, & adstringendi. Bilem expurgat, quæ & stomacho, & ventri inhæsit: urinam cit, & crapulam præsumptum arceat. ad inflationes ventris, & stomachi dolores prodest, cum seseli, & nardo Gallico potum: fastidia discentit, & arquatos sanat madefacti diletum, aut decocti ius, quotidie tribus cyathis haustum: menses cit potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur: aduersatur ixiæ venenis cum vino: item cicuta, & muris aranei morsibus, & draconi marino. Anginæ eo cum melle, & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad fugillara, & oculorum caligines, ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies. Dentium, auriumque dolores decoctum vaporis suffitu compescit. Decoctum in passò dolentibus oculis oblinitur: item præcordiis, & iecinori, tritum cum cerato cyprino: stomacho quoque longa valitudine laboranti cum rosaceo: cum ficis autem, aceto, & loliacea farina, aquæ inter cutem, lienosisque subuenit. Vinum ex eo fit, quod absinthiten vocant, præsertim in Propontide, & Thracia, quo ad antè dicta vtuntur, cum febris carent: alioquin in æstate propinant, & acceptam

huic vino incolumitatem referunt. Insparsum arcis absinthium, vestes ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo perunctum abigit, & à corpore arceat: atramentum librarium diluto eius temperatum, literas à murium erosione tuetur. Existimatur liquamentum eisdem præstare effectus: attamen potionibus improbat, quoniam stomachum malè habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta amurca, liquamentum adulterant.

ABSINTHIUM MARINUM.

CAPVT XXIIII.



Absinthium marinum, quod aliqui Seriphium vocant, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam, & in Taphorisi Aegypti gignitur: quo Isiaci pro oliuæ ramo vtuntur. Herba est tenuis, abrotoni parui similitudine, repleta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. Ea grauiter olet, & cum quadam calfactione adstringit. Persefe, aut cum oryza cocta, interaneorum animalia, teretesque tineas, adiecto melle enecat. alium lauigar: cum edulio autem, vel lenticula decocta, eadem præstare potest. Pecora maxime pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus absinthio assignatur, quo Gallia alpinus finitima statet. Id patrio nomine Santonicum vocant, regionis, in qua nascitur, cognomento, absinthion non dissimile: verum subamarum est, non adeò seminis fecundum. Eadem quæ seriphium potest.

† puto legendum, centronicum, ab absinthio populus Alpibus finitima, quæ Galia vocant, Tarentum.

ABSINT

*Abſinthio  
rum confi-  
deratio.*

*Quorunda-  
rum error.*

ABſINTHII generatrix hic à Dioscori-  
de traduntur, nempe vulgare noſtrum, mari-  
num, quod Seriphium vocant, & Santonicum,  
quo Gallia alpinis finitima abundat. Abſin-  
thium, quod in Ponto naſcitur, cæteris præ-  
ſtare ad iccinoris, & ventriculi inflammationes  
libro vndecimo capite decimoſexto Methodi  
medendi prodidit Galenus, ſic ſcribens. Cum  
autem duplex in omni Abſinthio facultas, &  
qualitas ſit, veluti in libris de medicamentis  
eſt traditum, vtique in Pontico adſtringendi  
qualitas non parua eſt. In reliquis omnibus ama-  
ra quidem qualitas eſt vehementiſſima, adſtri-  
ctio verò (quam ſaltem guſtu agnoſcas) aut  
planè obſcura, aut proſus nulla ſentitur. Proin  
de Ponticum ad iccinoris, & ventris phlegmo-  
nas eligi præſtat. Porro id eſt tum folio, tum  
flore longè quàm cætera abſinthia minore.  
Odoꝝ quoque huic non modò non inſuauiſ,  
verùm etiam aromatum quid præferens: reli-  
quis omnibus eſt ſædus. Quare hæc fugere  
conueniet, & Pontico ſemper vti, hæc Gale-  
nus. Cuius auctoritate freti credere recen-  
tiorum nonnulli, Ponticum abſinthium à com-  
muni noſtræ ſpecie nò parum diſſerre, quem-  
admodum Seriphium, & Santonicum. Sed  
equidem nullo alio diſcrimine alterum ab al-  
tero diſſidere crediderim, quam quòd Ponti-  
cum ſic climatis illius temperie, & ſoliſ, &  
floribus noſtrate longè minoribus: quin & eam  
ob cauſam adſtriſtoria facultate, ac etiam odo-  
re præcellat. Quod abunde declarauit Galenus  
libro v. i. ſimplicium medic. vbi de Abrotono  
agit, cum inquit. Abrotoni duæ ſunt ſpecies,  
altera quam marem, altera quam ſeminam  
nucupant. quod iſtum deſinitum eſt, tum apud  
Dioſcoridem, tum apud Pamphilum, alioſque  
innumeros. At aliud eſt ab eo Abſinthium, cuius  
ruſſumetres ſtatueudæ ſunt ſpecies, quarum  
vnam eodem cum genere ipſo nomine appel-  
lant, cuiuſmodi potiſſimum eſt Ponticum, al-  
terum Seriphium, tertium Santonicum. hæc  
ille. Quocirca rectè quidem ſenſiſſe videtur  
Dioſcoridis, quòd in vulgaris Abſinthij gene-  
re Ponticum præ cæteris commendauerit. Ex  
hiſ igitur palam eſſe puto, ſpecie quidem à no-  
ſtrate longè, quàm commune noſtrum Abſinthii,  
minoribus. Saporem habet amariuſculum, cui  
non parua adſtringendi vis coniuncta eſt. Odo-  
rem etiam ſpirat (vt Galenus teſtatur) non in-  
ſuauem, ita vt odorati nò nihil reſpiciat. Meſues,  
vt Syluius doctiſſime adnotauit, neſcio tamen  
qua ratione ductus, Ponticum, Romanum  
appellat. Monachi verò, qui in Meſuem com-

mentarios ſcripſerunt, putant magno quidem  
errore, id Meſui Romanum abſinthium eſſe,  
quod non modò in agro Romano, ſed etiam in  
vniuerſa Italia provenit. Plinius lib. x. v. 11.  
cap. v. 11. Ponticum ſcribit multò Italico ama-  
rius eſſe. in quo ſanè Galeni ſententiæ & reſra-  
gatur, & errat. Ponticum abſinthium efficacem  
vim obtinet ad aquam intercutem, vt mihi ſanè  
ſæpius experimento compertum eſt. *Ex ſe-*  
quodam noui *hydro*picoſi quaſi deſuperant, *nota*  
qui ex longo eſu comarum eius, quæ ſaccharo  
adſeruatz fuerant, ſinitati reſtituti ſunt. Para-  
ndi ratio hæc eſt: Sumito comarum recentium  
abſinthij Pontici libram vnam: ſacchari albiſ-  
ſimi libras tres. Comas illas tundito in morta-  
rio lapideo: deinde iis opimè tuſis ſaccharum  
in puluerem trium additico. ruſus omnia ſi-  
mul tantisper tundito, donec in vnum corpus  
redigantur: mox ad uſum recondito. Ex abſin-  
thio ita ſaccharato ſemencia quotidie aſſumi-  
tur tribus horis ante cibum. Sunt porò qui pu-  
tent ſemen illud, quod officinæ ſaccharo con-  
gominant, quodque ſaccharo circumdatum  
conſectumq; necandis interaneorum vernibus  
præbent, Abſinthij marini eſſe ſemen. Atta-  
men, vt ſateatur rei herbariæ periti, qui ex  
Gargano Apuliz môte inter multa ſimplicium  
genera, ſemen hoc ad nos comportant, à plan-  
ta quadam proſertur Abſinthio noſtrati paulu-  
lum abſimili. Ex quo facile (vt mea fert opinio)  
coniici poteſt, id potius eſſe Santonici abſin-  
thij ſemen, quàm Seriphij: præſertim quòd San-  
ctum illud nomen non aliunde, quàm à Santo-  
nico deductum eſſe videatur. Cæterum procul  
dubio hallucinari deprehenduntur qui Cana-  
bel Serapionis ſemen ſanctum interpretantur,  
cum longè admodum hæc inter ſe diſſerant.  
Quippe Serapioni niſ aliud eſſe Canabel con-  
ſtat, quam terra tenuiſſimo fabulo perſimiliſ:  
quæ (vt ipſe ait) vna cum pluuiæ & calis deci-  
dit, cuius non modò apud Arabes ad intera-  
neorum tineaſ necandas, verum & ad ſicilia  
fracſa conglutinanda increbuit uſus. Abſinthii  
marinum, ſive Seriphium, in quàm plurimis *Fruct. la-*  
tam Tyrrheni, quàm Adriatici pelagi litoribus *plur.*  
provenit, præſertimq; Aquileienſibus, & Ter-  
geſtinis. Sed Fuchſium ſuſpicor illud non co-  
gnouiſſe: ſiquidè quod in ſuis clariffimis com-  
mentariis magno volumini apicium ſpectatur,  
abſinthium marinum non eſt. Quòd cum for-  
taſſe & ipſe animaduertiſſet, in paruo ſimplicii  
libello ſententiam mutauit. Veruntamen non  
prius ab hoc errore ſeſe vindicauit, quàm in  
alium incidere: quippe quòd eandem plantam  
pro ſylueſtri naſturtio perperam, meo iudicio,  
depinxerit. Marinum itaque abſinthium cum  
primùm eſt terra erumpit, folio eſt abſinthio ſi-  
mili, craſſiore tamen. Sed poſtquam adoleue-  
rit, & cauſes ediderit, mutatis in longum folio-  
lis, iſq; præſertim quæ vbiq; cauſem ambi-  
at, abrotonu æmulatur, non tamen foliſ eſt adeo  
paruiſ. Semen proſert exiguum, copioſumque,  
abroto

abrotoni modo inter folia erumpens; aque in  
summitate caulis ferè racemosum, vt hæc pi-  
stura eius demonstret, amari, & adstringentis  
gustus. Volunt patres illi reuerendi, qui Me-  
dicum commentati sunt, tantum superficietenus  
Abfinthium vulgare amarefcere, imis verò par-  
tibus dulcescere, ob idque gustui gratum esse.  
Vnde etiam aquam, quæ ab eo ignium vi di-  
stillat, dulcem potius, quam amarum sentiri  
contendunt. Quam in re ij parum rem natura-  
lem callere deprehenduntur. nam quod Abfin-  
thij stillatitia aqua fit dulcis, nõ ex eo fit (quan-  
tum equidem sentio) quod Abfinthium ipsum  
conficit extrema parte amarum, medullitus ve-  
rò dulce, sed quoniam cum exterioribus illæ par-  
tes, quibus amaror inest, admodum sint ten-  
ues, ac in vaporem faciliè resolutibiles, ignis  
calore tenuiores factæ, non inagno quidem la-  
bore resoluuntur: cunctiq; ob hoc, vi stillatit-  
ia, quæ inde fluit aqua, & omnis sit amaritudi-  
nis experta. Præterea dulcedo, quæ in ipsa in-  
uenitur, non ab intimis Abfinthij partibus  
emanat, sed eam tantum à plumbeis instrumen-  
tis, quibus conficitur (vt diuturna docet expe-  
rientia) prouenire comperimus. Nam ipius  
dulcedinis qualitas non modo in Abfinthij stil-  
latitia aqua sentitur, sed etiam in quavis alia,  
quæ ex herbis temperamento calidis extrahit-  
ur. Siquidem cum plumbeum instrumentum  
huiusmodi herbarum vaporibus tum actu,  
tum potentia exalfacientibus, terrena qua-  
dam substantia superficie tenus inficiatur, quæ  
actutum in dulcissimam veluti cerussam con-  
uertitur, non mirum quidem videtur, si aquæ  
inde manantes asciticia dulcedine imbutæ, gu-  
stu dulces percipiantur. Quod quidem is non  
euenit abfinthij stillatitiis aquis, quæ duplici  
vase vitreis organis, calentes aquæ balneo con-  
ficiuntur. nam hæc sufficienter amarefcere co-  
gnoscuntur, nec tantillum quidem dulcedinis  
gustantibus præbet. Euenit sane hoc, quoniam  
balneum suæ ipsius aquæ humiditate, partes te-  
nuiores illas retinet, conseruat, ac cohibet:  
Quo fit, vt non adeo in vaporem vertantur,  
quemadmodum cum illis fieri solet, quæ car-  
bonum, & lignorum violento igne in auram  
evanescere coguntur. Dulcedine præterea ca-  
rent, eo quod à vitreis organis, quibus eliciun-  
tur, nullam asciticiam qualitatem recipiāt. Qua-  
re facius, mea quidem sententiā, esset, vt otium,  
quod superest, consumerent monachi in re  
christiana, & medici in re medica, & singuli de  
arte sua bene mereri discerent: vel salte quisq;  
Abfinthij quam rectè instituit, vitam sequeretur. Abfin-  
thij meminit Galenus lib. v. 1. simplicium medi-  
camentorum, & si inueniens. Abfinthium ad-  
stringens, & amarum, & acrem simul quali-  
tatem possidet, exalfaciens pariter, & exten-  
gens, & roborans & desiccans. Proinde bilio-  
sos ventris humores per egestionem infernam  
propellit, ac per vrinas euacuat. Magis autem  
quod in venis est biliosum, per vrinas expur-

gat. Ob hæc contentam in ventre pituitam,  
oblatum nihil adiuuat. Sic neque si in thorace,  
aut pulmone contineatur: nam adstringens in  
eo faculas, quam amara, valentior est. Porro  
quod infit quoque acrimonia, ideo maiori  
portione calidum est, quam frigidum. At si opus  
est generatim comprehensum eius temperiem  
secundum primas circumscribere facultates  
(etsi anomomeres & dissimulare sit) calidum  
ipsum dixerim primi excessus, siccum tertij.  
Succus autem eius longè quam herba ipsa, ca-  
lidior est. Sed cum de Abfinthio marino, sive  
Seriphio ageret lib. v. 111. simplicium medi-  
camentorum: Seriphium, inquit, specie, & gu-  
stu abfinthio simile est. Id quod de Santonico  
scripsit Dioscorides, cum tradiderit magis cum  
abrotono conuenire Seriphium, quam cum  
abfinthio. Quamobrem relinquitur suspicio,  
quod aut Dioscoridis, aut Galeni scriptura sit  
hoc loco librarius incuria deprauata. Her-  
ba, quæ Græcis ἀβρίδιον, Latinis item Abfin-  
thium appellatur: Arabibus, Atfinthium: Ita-  
lis, Alsenzo: Germanis, Vuenmuor, Etiz: Hi-  
spanis, Alentios, Alofia: Galliis, Aluynne,  
& Abfinte.

## ABROTONYM MARS.



## ABROTONVM. CAP. XXV.

ABROTONVM duorum est gene-  
rum. Fœmina quadam arboris specie  
fruticans, candidat, circum ramulos fo-  
liis, seriphi modo, minutim incisiss: flori-  
bus referta est, comantibus in summo,  
fulgore auri, corymbis, quod per æstatē  
prodiit, suauiter olet, cum grauitate  
quadam, & amaro gustu. Id genus  
Siculum esse constat. Alterum mas  
vocat

## ABROTONVM FOEMINA.



vocatur, far-  
mētōsum, gra-  
cilibus ramu-  
lis vti absin-  
thium. Pluri-  
mum in Cap-  
padocia gigni-  
tur, & Galatia  
Asiatica, atque  
in Syria Hiera-  
poli. Vtriusq;  
semen crudum  
tritum, & fer-  
uefactum ex a-

qua, in potu auxiliatur orthopnoicis,  
conuulsis, ruptis, coxendicibus, vrinæ  
angustis, mensibus suppressis, aut re-  
morantibus. In vino potum extirpialium  
venenorum antidotum est: horribus  
ex oleo illinitur. Serpentes & substra-  
tu, & nidore fugat: contra ictus eorum  
cum vino potum prodest, priuatim ef-  
ficax contra scorpionum, & phalangio-  
rum venena. Oculorum inflammationi-  
bus commodè illinitur cum cotoneo  
cocto, aut pane, tritum cum farina hor-  
deacea, decoctumque tubercula discuti-  
tit. Irini compositionibus admiscetur.

*Abrotoni  
considera-  
tio.*

ABROTONVM mas planta est vulgaris  
notitia. Cuius duo obseruauimus genera, hor-  
tense, & per se in campestribus nascens, tenui-  
oribus foliis, & minore femine. Quod verò  
femineo generi adscribitur, non omnibus no-  
tum est: non ideo, quòd & ipsum frequentissi-  
mum non feratur in hortis, sed quòd à paucis  
pro Abrotono femina cognoscatur. Quando-  
quidem id alij Cypressum, alij Santolinam vul-  
gò appellant, alij verò marinum esse absinthium  
existimant. Sed ij profecto falluntur: quippe  
Santolina vulgò vocata, nil tale aliud est, quam  
Abrotonum foemina. Quod primum (vt Dio-  
scorides inquit) arboris speciem quandam re-  
presenter, vnde & à quam plurimis Cypressus  
vulgò dicta est. Deinde quòd candicantibus  
constet foliis, circum ramulos minucem inci-  
sis, floribus aureis, orbiculatis, caulem sum-  
mum, æstatis & autumnii tempore, corymbo-  
rum modo comantibus. Postremo quòd in vni-  
uersum suauiter oleat cum grauitate, quadam,  
& amaro gustu. Ex hac equidem delineatione  
adducit, vt decernere non dubitem, hanc plan-

*Quorundam  
dum ex-  
per.*

tam, quam vulgus Cypressum, siue Santoli-  
nam appellat, esse Abrotonum foeminum. Hinc  
itaque Fuchium alioqui rei herbariæ gnarum  
errasse crediderim, quòd pro foeminei generis  
Abrotono plantam subiecit ab eo longè di-  
uerfam. Qui est Santolinam floribus postea  
depinxit, non tamen eam Abrotoni feruare  
nomine agnouit, sed hebariorum, vt arbi-  
tror, vulgum secutus, eam Chamæcyparissum,  
hoc est, pumillam cypressum nuncupauit,  
eiusque nullam à Græcis factam fuisse mentio-  
nem falsò credidit. Cæterum quòd Gortien-  
ses Abrotonum marem Veronicam appellant,  
ea sanè planta mihi in mentem venit, quæ re-  
centiorum quibusdam VERONICA voca-  
tur, magis (vt aiunt) insignita viribus. Hæc  
duum est generum. Mas, quæ humi repit, cau-  
le est dodrante maiori, rubescente, lauginoso-  
sque: foliis oblongis, nigricantibus, hirsutis,  
& in ambitu serratis. Flores edit purpureos  
circa summum caulem emicantes, & semen in  
siliquis, loculi formam referentibus. Radice  
ninitur tenui, quæ in plures dinariatur par-  
tes. Femina caule exit lauginoso, foliis ro-  
tundioribus, minime laciniosis, subpinguibus.  
Flores profert in luteo purpureascentes: semen  
in vasculis rotundis inclusum: radicem verò  
maris æmulam. Nasitur in locis asperis, & in-  
cultis. Floret Iunio mense. Gustu quidem ad-  
stringens, & amara est: vnde concicere licet,  
eam esse cum excalcaciendi, tum siccandi vi  
præditam. Medetur cruentis vulneribus, ac  
etiam diuturnis vlceribus. Sunt, qui dicunt  
quendam Francorum regem elephantias labo-  
rantem à venatore suo hac tantum herba fuisse  
sanatam. Tumores præterea in vniuersum  
discutit, præcipue qui in ceruice emergunt.  
Nec desunt, qui illam summis laudibus effe-  
rant ad pestiferas febres, ad tabidos, & iocine-  
ris, & lenis infarctus. Sed vt nostrum sequa-  
mur institutum, iam Abrotono medicinæ red-  
dendæ sunt ex Galeno, qui libro v i. simplici-  
um medicamentorum, ita de eius viribus  
posteritatis memoria scriptum reliquit, Ab-  
rotonum calidum, & secum facultate, in ter-  
tio ordine seu recessu post media situm est.  
Inueniunt autem eius temperamentum non  
minimè quidem & ex gustu ducta coniecturæ  
vt pote cum sit admodum amarum. Porro sa-  
porem eiusmodi, cum terrenæ sit essentia, à  
largo calore extenuatum ostendimus. Itaque  
non infrenuè & excalcacit, & deseccat. Nam  
siue comam cum floribus (reliqua enim eius  
palea inutilis est) contrasum vlceri puro il-  
linas, mordax, & irritans videbitur: siue eo  
in oleo macerato, caput, aut ventrem per-  
fundere voles, admodum calefacere repe-  
ries. Quin & si qui per circuitum rigotibus va-  
piantur, eos ante inuasionem rigorum hoc vo-  
les conficcare, minus vrique rigore concutien-  
tur. Imò & sensus quidem protinus vbi admo-  
ti fuerit, ipsum calfacere percipit. Porro quod  
lambros

*Veronica  
considera-  
tio.*

*Abrotoni  
vires ex  
Galeno.*





Veruntamen si quis præstanti iudicio Dioscoridis verba accuratè perpenderit, illa sanè nihil eorum sententiæ resistari comperiet, qui Hyssopum, quo passim vitmur, legitimè esse contendunt. Siquidem in plantis coma, probatissimorum auctorum testimonio, non solum de floribus, & corymbis intelligitur, sed etiam de foliis, & ramusculis, dummodo hæc hilari quadam venustate plantam totam, vel summa eius exornent. Vnde rectè Plinius libro xii. cap. x v. balsamo folium proximè rutæ, perpetua coma reddidit. Item Virgilius lib. iiii. Georgicorum perpulchrè cecinit.

Ille comâ mollis iam tum tondebat acanthi. Ex his perspicuè fieri arbitror, Chrysocomen coma, hoc est foliis, & ramusculis hyssopo esse similem, non autem ipsis corymbis, quibus fortasse in vniuersum scater. Quamobrè hic nullus, quantum equeidem sentio, relinquatur amplius dubitandi locus. Sed quòd Hyssopum communis vsus, verum, legitimusq; sit, nobis manifestè demonstrat Symphytum petraeum à me (vt spero) proximis annis repertum, quòd folia vulgari hyssopo similia proferat. Nā cum scribat Dioscorides, Symphytum petraeum folio esse origani, Origanum verò folia habere hyssopi, clarissimum præbet argumētum, quòd hyssopum, quo passim vitmur, sit verū. Quintianus cum idem auctor tradiderit, Hyssopum duorum esse generum, nempe montanum, & hortense, & vtrumq; genus in nostrate passim habeatur omnibus notis simile, nō modò opinionem auget, hoc legitimum esse Hyssopum, sed omnem quoq; litrem dirimit. Huc præterea alia accedit ratio, quòd cum Dioscorides congeneres, vel similes plantas seriatim coniunctèq; describere conseruerit, statimq; post hyssopum stoechadem representauerit, quæ folio, & spicato flore hyssopum nostrum admodum æmulatur, ostendit quidem hallucinari eos, qui hyssopum hoc non legitimè esse hætenus iuerunt inficias. Adde etiam quòd idem (vt experientia comprobatur) his omnibus polleat viribus, quas illi reddidit Dioscorides. Hyssopum montanum in comitatu Goritiensi Saluatino monte frequentissimum nascitur, facie, floribus, & comæ hortensi non ab simile, radiore tamen folioz & gustu amariore, nec vsq; adeò acri. Mixte fit tamen, si transplantetur in hortis, fitq; hortensi simile, exuta sylvestri natura. Hyssopi paucis meminit Galenus libro viii. simpl. medicamento sic inquiriens. Hyssopum desiccatur, & exaltatur ordine tertio: sed & tertium est partium. Hyssopi quoque vires descripsit Mesues, ita ad sensum scribens. Hyssopum hortense pituitum facile deriscit, quando dixerint aliqui, quòd & atram bilem educit addito fossili sale, aut Indo. At ipsum pituitum purgare manifestò experimento constat, præsertim quæ in pectore, ac pulmone continetur. Facit hyssopum ad pituitosos tumores, tum neruorum affectus: quòd non modò

## GRATIOLO.



mundet, sed quòd etià roboret. Quin & pectus, & pulmonem detergit, præsertim senibus, quorū pectus lentum, crassūq; pituita refertum est: quo fit, vt asthmaticis, & cussibus opituletur. Discitur hyssopi vsus contumaces inflationes, cibi appetentiam inuitat, menses & vrinam ciet, & febrium horrores excutit: visum acuit. Melle com-

missum interaneorum cinas necat, nitri tamen addito momētō. Oleum, quod tum foliis, tum floribus paratur, neruos algore affectos inunctum sanat, & roborat. Potest eadem & montanum, atque etiam hæc omnia efficacius præstat. hætenus Mesues. Caterum nonnulli crediderunt herbam illam, quæ vulgò ab aliquibus GRATIOLO vocatur, ab aliis Gratia dei, à quibusdam etià, vt à Foronienensibus, Stanca cauallo, quòd equi eius pabulo mirè defatigentur, esse Hyssopum illud montanum, de quo Mesues in suis scriptis mentionem fecit. Sed ij, omnī fere iudicio, euidentius hallucinati sunt, quā vt pluribus demonstrare sit opus. Quoniam verò in Gratiolæ herbæ sic dictæ sermonem incidimus, hic locus postulat, vt de ea aliquid dicamus. Nasctur hæc in locis humidis; præcipuè in pratis vliginosis, provenit etiam in palustribus. Herba est, quæ dorantalem altitudinē excedit, caule quadrangulari, foliis hyssopi latioribus, & longioribus, florem fert in purpure albicantem, inter folia erumpentē quæ caulem ambiunt. Gustu herba hæc amarissima est, quò etiam quadantenus adstringens sentitur. Alium vehementer purgat, tam recens quā sicca sumpta bilē, pituitaq; trahit. Vulneribus celeriter medetur, trita & superposita. Herba varæ & Græcis dicta, Latinis Hyssopum appellatur: Arabibus, Cyse, Iusā, seu Iabes: Italis, Hissopo: Germanis, Firch hyssop, & Hoster hyssop: Hispanis, Hissopo hierua, & Hissopillo hierua: Gallis, Hissopo.

## STOECHAS. CAP. XXVII.

STOECHAS, iuxta Galliam in insulis eiusdē nominis è regione Massiliæ gignitur: vnde cognomen accepit. Herba tenuibus surculis, coma thymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquantū acris. Cuius decoctum, hyssopi

Gratiola  
hyster. Es  
vires.

Nomina.

Hyssopi Si  
res ex Gra-  
lens. Es  
Msc.

fopi modo, ad pectoris vitia efficax est. Antidotis vtiliter miscetur. Viscera omnia, & vniuersum animatis habitum extenuat, confirmat, & ab obstructionibus & sarctu liberat.

## STOECHAS.

*Stoechadis  
considera-  
tio.*



STOECHA-  
DEM officina-  
rum vulgus Sti-  
cados appellat.

Nascitur hæc non  
modo in Gallia  
(vt Dioscorides  
scribit) ex aduer-  
so Massiliæ in in-  
sulis illis, quas  
Stoechadas vocât,  
sed & in Arabia,  
vnde cū aliis mer-  
cimoniis, quæ ex  
Alexandria adue-  
huntur, Venetias  
cūportatur. Qua-  
propter tam à me

dicis, quàm à sepelariis, indito ab Arabia co-  
guomêto, hodie Arabica nuncupatur: et si Mas-  
siliensis pelagi Stœchas plerumque Arabicæ vi-  
cem expleat. Prouenit præterea in nonnullis  
Italice locis, verum ea cæteris in Italia præstat,  
quæ ex Gargano Apulie monte aduchitur,  
quanquam omnium probatissima est peregrina-  
na, quæ ex Arabia deferitur: hanc deinde se-  
quitur, quæ in Stœchadibus insulis nascitur, à  
quibus primùm nomen adinuenit. De Stœcha-  
de vires scripsit Galenus libro v i i i. simplici-  
cium medicamentorum, vbi sic inquit. Stœcha-  
dis gustu quidem qualitas amara est, & me-  
diocriter subadstringens. Cæterum temperies  
composita, nempe ex terrena essentia frigida  
exigua, vnde sanè adstringit: & ex attenuata  
altera terrena copiosiore, à qua vtiq; amara est.  
Ob vtrorunque verò conuenientiam & coi-  
tum, obstructione liberare, extenuare, exter-  
gere, roborareq; tum viscera omnia, tū totius  
corporis habitum est nata. Suprà naq; osten-  
sum est, quòd quæ ex eiusmodi essentis con-  
stât medicamina, distos effectus reddere pos-  
sint. Huius quoque meminist Mesues, ita de  
eius viribus differens. Stœchas deicit tum  
pituitam, tum atram bilem: cerebrum, nervos,  
ac sensum omnium organa mundat, ac robo-  
rat. Prodest cœtra frigidos morbos qualescun-  
que sūt, idcòque comitialibus conueniens re-  
medium habetur, addita scilla, aut eius aceto.  
Balneæ, fomêta, ac laconica, quæ ex ipsius tui-  
decocto, tum vapore sunt, oculos narium  
meatus aperit: nervorum, & compaginum  
cruciatu mitigant: ac interna viscera frigido  
humore affecta roborant. Abstinentum tamen  
ab ea biliosis est, præsertim si torum ventricu-

lus sit bile referens: nam eos maximè turbat,  
nauseam commouet, sitim accendit, & calore  
quodam molestissimo vniuersum afficit cor-  
pus. Quæ planta Græcè *στὴχάς*. Latine item  
Stœchas nominatur: Arabicè, Astochodos,  
Astuhorados, sive Astuchudos: Italicè, Stecha-  
de: Germanicè, Seichskraut: Hispanicè, Can-  
tuesso: Gallicè, Stechados.

*Nomina*

## ORIGANVM. CAP. XXVIII.

ORIGANVM Heracleoticū, quod  
& cunilam vocant, folium habet hyf-  
sopo non dissimile: umbellam autem  
non in rotæ speciem orbiculatam, sed  
veluti multifidam: semine in summis  
virgis haudquaquam denso. Excalfa-  
cit: vnde decoctum cum vino potum  
demorsis à serpente conuenit. qui au-  
tem cicutam, aut meconion hauserūt,  
iis ex passo: si verò gypsum, aut ephē-  
meron, ex aceto musso propinatur. ru-  
pris, cōuulsis, hydropicis cum fico esui  
datur. Aridum acerabuli mensura po-  
tum in aqua malsa, atros humores per  
alium extrahit: menses ciet, & tussi  
cum melle linctum medetur. Ad pru-  
riginem, pforas, regimūq; morbū, de-  
cocti ius in balneis prodest. Succus vi-  
rentis, tonsillas, vuam, & oris vlcera sa-  
nat, & per nares ex oleo irino infusum  
trahit. aurium dolores cum lacte mul-  
cet. Conficitur ex eo, & cepis, & rhoē,  
quo ad obsonia vtuntur, vomitorium  
medicamentum, his omnibus in cu-  
preo vase per dies bis videnos insola-  
tis, dum caniculæ sydus flagrat. Herbæ  
autem substratu serpentes fugantur.  
Quæ onitis appellatur, candidiore est  
folio, & hyssopo similior. Semen velu-  
ti coniunctos corymbos habet. Vis ei  
origani Heracleotici, sed multò ineffi-  
caciior. Syluestre origanum, aliqui pa-  
naces Heraclion, alij cunilam vocant,  
ex quibus est Nicander Colophonius.  
Foliis est origani: ramulis tenuibus,  
dodrantem altis: in quibus umbellæ  
anethi insunt, flores candidi: radix ten-  
nui, superuacua. Peculiariter percuf-  
sis à serpente, folia, & flores ex vino  
poti auxiliantur.

ORIG

*Stœchadis  
vires ex  
Galeno.*

*Ex Me-  
sue.*

ORIGANVM HERACLEOTICVM.

ORIGANVM ONITIS.



ORIGANVM SYLVESTRE.



TRAGORIGANVM.



TRAGORIGANVM. CAP. XXIX.



TRAGORIGANVM tenuis frutex est, sylvestri serpyllo, aut origano similis, folio, & ramulis. Quibusdam in locis latius, virentiusque innenitur, & latioribus foliis, satis glutinosum. Alterum exilibus furculis, ac tenuibus foliis, quod aliqui prasum vocauere. Optimum est Cilicium & Cretense, & Smyrneum, & in Chio, Cooque proueniens. Omnia excalfaciunt, vrinam cient, aluo accommodantur. Decocto pote bilem deiciunt: lienosis ex aceto bibere prodest: contra porta ixiæ venena in vino bibuntur: menses trahunt: peripneumonicis, tussientibus, ex melle in eclegmate datur. Grata, ac mitis eorum potio est:

quare cibum fastidientibus, & stomacho acida ructanti, imbecilloq; præbatur: ite si à maritima iactatione nausea, & æstus præcordiorum excitetur. Tumores verò cum polenta illita discutiant.

VARIA, ac confusa est apud antiquos rei herbariæ authores Origanii historia. Quandoquidem Theophrastus lib. vi. cap. 11. de planta Garra. rum historia duo tantum constituit Origanigena, nigrum sterile, & candidum fructuosum. Plinius verò libro x. capite xvi. post Onitidis origani, & Tragorigani mentionem, Heraclium origanum subiunxit, quod tria habere genera prodidit. Vnum nigrum, latioribus foliis, glutinosum. Alterum exilibus, mollioribus, sumpfucho non dissimile, quod aliqui prasum vocauere. Tertium inter hæc medium, minus quam cetera efficax. In quibus verbis Plinius deprehenditur non sine errore Tragoriganum cum Origanii generibus confu-

disse, quod Heraclij nomine, quod constat Ori-  
gani genus esse, duas illas Tragorigani species,  
quæ à Dioscoride redduntur, huius ferè imita-  
tione expresserit: licet tertium quoque addide-  
rit ex alio fortè auctore. nisi dixerimus, quod  
& hanc pro aliquo Origani genere sumpserit,  
& simul confuderit. Sed dimissis aliorum pla-  
citis, & Dioscoridem, quem nobis ducem, &  
auctorem proposuimus, duntaxat secuti, dici-  
mus tam Heracleoticum, quam Onitum appel-  
latum Origanum aut in Italia non oriri, aut  
inibi hæcenus, quod sciam, à nemine fuisse re-  
peritum. Etsi Brasanolus Ferrariensis medicus  
nostre ætatis clarissimus asserere videatur, Hera-  
cleoticum illud herbæ genus esse, quod in Ita-  
lia passim nascitur, quodque perperam Origa-  
num vulgò ab omnibus vocatur. Verùm huic  
(pace eius dixerim) nunquam assentiri potui:  
quin potius eam plantam sylvestris Origani ge-  
nus esse semper existimaui, quod sua sponte in  
campestribus, asperis, cliuosisque locis, & mon-  
tibus proueniat, purpurascens admodum um-  
bella. Nam quanuis à Dioscoride vna tantum  
sylvestris Origani species describatur, floribus  
candidis, nil tamen obstat, quin in aliis quoque  
à Græcia regionibus vna, vel altera eius species  
floribus differens pipni possit. Siccum origa-  
num, quod Venetias à Creta aduehunt, flore  
et albo, acerrimo gustu, fragrantique odore.  
Quo fit, ut hoc esse putem fidei Dioscori-  
dis origanum (quanquam apud plerisque Hera-  
cleoticis, vel alterius nomen sibi falsò vendicer)  
non solum quod floribus sit candidantibus, sed  
etiam quod gustatu linguam admodum velli-  
cet. Siquidem hinc facili conici potest, sylve-  
stem origanum cæteris (ut Galenus testatur)  
valentiorum esse. Heracleoticum origanum,  
itemque Onitum misit ad me hoc anno clarissi-  
mus medicus Lucas Ghinus (quæ mihi sunt  
eius non solum præstantis doctrinæ, sed etiam  
ingenui, ac liberalis animi certa ac firma indi-  
cia) verumque è Creta (ut ad me scripsit) alla-  
tum. Quæ duo Origani genera quod satis Dio-  
scoridis historiæ respondeant, hic pictura expri-  
menda duximus. Tragoriganum verò, cuius  
etiam plantam pictam exhibemus, frequens na-  
scitur in Foroliviensi agro, foliis serpylli æmul-  
lis, sed gustu pulegij. Vnde non ab re statim  
post ipsum pulegij meminit Dioscorides. De  
omni tam Origani, quam Tragorigani genere  
differens Galenus libro v. i. i. simpliciū me-  
dicamentorum, sic inquit. Origanus, Heracleo-  
tica quidem efficacior est ontide: sed agrestis,  
quam quidam panaces Heraculum, alij conylem  
cognominant, valentior utraque est. Omnes  
verò incidendi, extenuandi, calfaciendi que fa-  
cultatem possident: hæcque tertio excessu obti-  
nent. Porro ea, quam Tragoriganum appelli-  
tant, assumpfit etiam adstrictiois quippiam. Hæc  
Galenus. Ex cuius doctrina patet, rectè cum iis  
agere, qui sylvestre ex Creta petunt suis me-  
dicamentis inferunt. Planta Græcis ὀρίανον.

Brasanolus  
epimio re-  
sista.

Origani  
Cretæ ex  
Galenus.

Nomina.

Latinis pariter Origanum vocatur: Mauritanis,  
Fandenigi, Fudenegi seu Faudenegi Italici, Ori-  
gano: Germanis, Vuolgemuor, Rortdoften, &  
Costentz: Hispanis, Oreganos: Gallis, Origan,  
aut Mariolaine bastarde.

PVLEGIUM. CAP. XIX.



PVLEGIUM  
herba vulgaris  
notitiz. Exte-  
nuat, calfacit,  
decoquit: po-  
tum menstrua,  
secundas, ac par-  
tus eiicit. Pul-  
monis vitia ex  
melle, & aloë  
potù extrahit,  
& conuulsis au-  
xiliatur. nau-  
seas, stomachi-  
que erosiones

ex posca permulcet. atram bilem per al-  
uum exigit. Bibitur in vino vtilissimè  
contra serpentium morsus: defectos ani-  
mo recreat, cum aceto naribus obie-  
ctum: gingiuas arefactis cinere corrobora-  
tur. Illitum cum polenta inflammationes  
omnes sedat: podagris per se subue-  
nit, impositum vsque dum rubescat lo-  
cus: cum cerato varos extinguit: lieno-  
sis cum sale vtiliter illinitur. Decoctum  
eius ablutas prurigenas mitigat: conuer-  
sas vulvas corrigit: contra inflationes,  
duritiasque vulvæ in deflesiones conue-  
nienter adiicitur. Vocant aliqui blecho-  
na, quoniam dum floret gustatum à pe-  
coribus, balatum concitat.

ET SI dubitauerint recentiorum quidam,  
an vulgare Pulegium legitimum sit, quod ob  
eius vulgarem notitiam, nullis foliorum, flo-  
rumque notis eius faciem descripserit Diosco-  
rides, non desunt tamen rei herbarie periti, qui  
velint Pulegium vulgare vsus Dioscoridis, alio-  
rumque antiquorum esse pulegium. Hæcque ar-  
gumento nituntur, quod non modò experien-  
tia compertum sit, vulgare Pulegium omni-  
bus iis viribus esse præditum, quas suo tribuit  
Dioscorides, sed quod etiam Plinianæ historiæ  
maximè respondeat. Plinio siquidem lib. x.  
cap. xlii: duo Pulegij produuntur genera:

Pulegij  
fuleratio.

femina,

fœmina, cui purpureus flos, mas, cui albus. Horum vtrunq; fert solum Italicum, vtrunq; in Hecuria præstantissimum gignitur. Quapropter eos aperte hallucinari crediderim, qui Pulegium communis vsus vnam, vel alteram calaminthæ speciem esse contendunt. Quippe quoddam certo putem (vt infra suo loco dicitur) omnia calaminthæ genera, quorum meminit Dioscorides, à nobis iandiu fuisse reperta. Quin & illud Pulegium nostrum legitimum esse ostendit, quod folio sic Cretensi dictamno simile, cui folia pulegio similia reddidit Theophrastus, item Dioscorides, qui tamè illa maiora fecit. Germanicæ mulieres Pulegiū in hortis ferunt, ac etiam in figulinis vasis fouent diligenti admodum cultura, suis affectibus eo consulentes. Vbi lætius tota coma cōspicitur, est secun-

Quædam  
dæctor.

do calaminthæ generi (hanc enim illi assimilauit Dioscorides) folio simile, acerrimo gustu, quadantenus amaro. Quamobrem rectè quidem Galenus lib. v. 1. simplicium medicamentorū, de Pulegio differens, ita scriptū reliquit. Pulegium cum acre, & subamarū sit, valde tum excafcit, tum extenuat. Porro quoddam excafciat, abunde magnum est signum, quoddam illitum rubrificat, & quoddam si quis diutius toleret, exulcerat quoque. Quoddam verò extenuet, satis indicat, cum humida, crassa, & lenta ex thorace, & pulmone excreatu facilia faciat, mensesq; moueat. *raçyç* herba sic Græcis, Pulegium Latinis dicitur: Mauritanis, Alnam, Alnegen, seu Aluegen: Italis, Pulegio: Germanis, Poley, & Hertzapoley: Hispanis: Poleio: Gallis, Pulege, & Pouliot.

Pulegiū  
re ex Ga-  
leno.

Nomina.

D I C T A M N Y M .



D I C T A M N Y M . CAP. XXXI.

D I C T A M N Y M, aliquibus syluestre pulegium vocatur. Cretensis herba est, acris, læuis, pulegio similis, sed maioribus foliis, quæ tomento quodam, spissaq; lanugine pubescunt. † Florè nulum, aut semè profert. Præstat omnia, quæ satium pulegium, sed efficacius multo: nam non potum modò, sed appositu quoq; aut fustitum, defunctos partus eiicit. Produnt in Creta capras sagittis percussas, huius herbæ pascu eas excutere. Purgandi vim habet succus illitus, aut cū polenta tritus. Herba impactos pedibus, reliquove corpori aculeos, illitu resigit. ad lienis dolorè efficax habetur: siquidè ipsum imminuit. Merunt æstare, & autumnò. Radix eius gustu calfacit: partus acce-

P S E U D O D I C T A M N Y M .



lerat. Succus cū vino potus, contra serpentium morsus præsidio est. Tanta herbæ facultas est, vt olfacta abigat bestias, quæ venenato ictu sæuiat, appensaque contactu exanimet. Vulneribus ferro illatis, & venenatis moribus infusus succus, præsentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur.

P S E U D O D I C T A M N Y M .  
CAP. XXXII.

Q U O D Pseudodictamnium vocat, multis in terris nascitur, antè dicto simile: sed minus, quàm illud acre. Eosdè affectus præbet, sed inefficacius multo.

D I C T A M N Y M A L T E R Y M .  
CAP. XXXIII.

D E F E R T V R à Creta alterum dictamni genus, foliis sisymbrij, ramis maioribus: in quibus flores sylvestris

origani, nigri, molles. Odor foliorum inter silybrium, & saluam, iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit. Miscetur emplastris, & medicaminibus, quæ aduersus serpentium iniurias constringuntur, theriaca vocat.

*Dictamnii  
considera-  
tio.*

**DICTAMNUS** legitimum, ac probatissimum in Creta insula tantum gignitur; neque tamen inibi passim, sed in angusto loco duntaxat prouenit, ut auctor est Theophrastus. qui lib. 1. x. cap. x. v. 1. de plantarum historia Dictamnium posteritatis memorie prodidit, his verbis. Dictamnium Cretæ insule proprium est, vi mirabile, & ad plura perutile, sed ad partum mulierum potissimum pollet. Folio pulegio simile constat, nec sapore absimile est: ramulis tenuioribus conditur. Vfus foliorum, non ramorum, nec fructus esse valent enim ad multa, & præcipue ad difficiles partus mulierum, ut dictum est: aut enim facillè posse parere faciunt, aut certe dolores penitus sedant. Dantur bibenda ex aqua. Rara hæc herba: locus enim, qui fert, exiguus admodum est, eumque capræ depascunt capeſendæ causa volupcratis. Quod etiam de telis fertur, verum esse affirmant: capras enim sagitta transfixas dictamno deuorato telum euicere. Dictamnium tale est, viresque eiusmodi possidet. Falsum dictamnium folio quidem simile constat, sed ramulis minus, & viribus longe inferioribus, quanquam enim eisdem in rebus prosit, tamen multò deterius, atque debilius. Vis dictamni in ore percipi continuo potest: excalescit enim ex paulo vehementer. Manipulos in ferula, aut canna intercludere solent, ne expiret: est enim imbecillus, cum expirauerit. Non desunt, qui naturam Dictamni, & falsi Dictamni eandem esse existiment. Sed quod locis lætioribus exeat, degenerare, falsumque cognominari, sicuti etiam aliis pluribus euenit, ut viribus deterioribus ex loco reddantur. Dictamnium enim asperum solum vehementer amare inquit. Est etiam aliud Dictamnium veluti æquiuocè appellatum: nec enim speciem, nec vim habet eandem, quippe quod folio simili silymbrio constat, & ramis condatur maioribus. Vfus item, & vis non eisdem conueniunt. Hoc igitur (ut dictum est) mirum, simulque proprium Cretæ insule dicitur. hæc Theophrastus. Cæterum ut æquati quoque nostræ Dictamni rationem aliquam reddamus, ut in omnibus ferè plantis facere consueuimus, non diu quidem est, quod ex Cretæ insula Veneris legitimum Dictamnium adferri ceptum est. Siquidem Manardus Ferrariensis, vir non solum ingenio & doctrina celebris, sed etiam simplicium medicamentorum acerrimus indagator, lib. v. 1. epist. 111. inquit. Dictamnium, nisi eam rursus Venus ab Idæ sylua deponeret, omnino desicimus. Sed

certe (ut ingenuè fatear) nescio, qua auctoritate, vel ratione scripserit Dioscorides, Cretense Dictamnium nec florem, nec semen proferre, cum id, quod è Cretæ ad nos aduehitur, vnà cum floribus deferatur, nullis præterea deficientibus notis, quæ in legitimo requiruntur, nisi dicamus hunc locum deprauatum esse, ut ferme suspicor. Quod autem fructum ferat Cretense Dictamnium, & ex consequenti etiam florem, videtur suprà declarasse Theophrastus, cum dixit. Vfus est foliorum, non ramorum, nec fructus. Atqui id ipsum nõ obscure à Damocrate explicatur est, ut in Galeno legitur libro v. de compositione medicamentorum per genera, capite x. in emplastro ex dictamno, quod acceptum refert Damocrati. Hic nimirum dictamnium Cretico florem assignauit in illis Græcis versibus, quos solutus verbis sic vertimus. His quoque omnibus addito dictamni herbe læuis sicca florem habentis drachmas viginti. Hoc idem etiam credimus Virgilium carminibus expressisse libro x. 11. suæ Aeneidos, ubi ita cecinit.

Hic Venus indigno nati concussa dolore, Dictamnium genitrix Cretæ carpit ab Idæ, Puberibus caulem foliis, & flore comantem Purpureo: non illa feris incognita capris Gramina, cū tergo volucres hæſere sagittæ. Plinio Dictamnium non modò flore, & fructu caret, sed etiam caule. quod tamè experientia, & antè dictorum testimonio planè falsum esse deprehenditur. Pseudodictamnium porrò hodie paucis (ut arbitror) notum, Pisis hoc tempore ad me misit clarissimus medicus Lucas Ghinus, caule dodrantali, lanuginoso, albicantem: cui folia è caulibus erumpunt ex intervallis binæ, dictamni tomento pubescentia: è quorum omnium medio flores purpurei prodeunt, marubij, vel melyssophylli modo, sapore pulegij, minus tamè acri. Vulgare autè Dictamnium, album vulgò cognominatum, quod folio fraxineo, floribus odore fragrantibus, citreis æmulis, radice alba, hircinè virus oleste, & amara prouenit, nullis prorsus notis aliquod Cretæsis dictamni genus repræſentat. Viribus tamè quam plurimis, præsertimque antidotis conficiendis, summo opere cõmendatur. Quo fit, ut non satis admirari possim, quod veteres rei herbarig peritissimi, huius insignis plantæ nulum, quod sciam, meminerint. De eius historia, ac viribus libro primo latius differuimus. quare nunc ea repetere superuacaneum esse duximus. Dictamnium, ac falsi Dictamni vires tradidit Galen. lib. v. 1. simplicium medicamentorum, sic inquit. Dictamnium tenuiore essentia constat, quam pulegium: cætera illi simile. At quod vocat pseudodictamnium, ad omnia imbecillius dictamno est. Quæ herba Græcè *δικταμνός*, Latine quoque Dictamnū appellatur: Arabicè, Mescatremefir, Alinegem araba, suæ Bari: Italicè, Dittamio: Germanicè, Vuildenpooley: Hispanicè, Ditamo, & Ditamo real. Quod verò Græci

*Dictamnii  
feri flores.*

*Pseudodictamnii.*

*Vulgare dictamnium.*

*Dictamnii vires  
ex Galen.*

*Nomina.*

*quædam*

*Pseudodictamnus*, Latini item *Pseudodictamnus*, & falsum *Dictamnū* dicunt: Itali, Falso *Dictamo*.

† Hic locus illi prorsus est similis, qui in vulgatis *Dioscoridis* exemplaribus legitur libro primo in capite *Nardi montani*. Idcirco in hoc similiter, atque in illo adnotauimus, mēdum subesse arbitramur. Ergo communis quoque erit vtriusque loci ratio, quā vterque suæ, vt spero, integritati restitatur. Et quoniam supernacuum esset ea referre, quæ alibi à nobis dicta sunt, nunc dicam tantum quomodo hic legen-

dum censeam. *Vulgata* & ea quidem deprauata lectio, quam secuti sunt interpretes, habet, *ivm di dētō, iōm nāpīs gīa*. At illa, quam nos veram putamus, erit, *ivm di dētō, iōm nāpīs gīa*, quæ verba ita Latine reddemus. Neque verò flos, neque semen confert. Ex hac castigatione illud facile fiet, quòd *Dioscoridis* auctor grauius non solum erroris suspitione non condemnabitur, sed etiam maxime commendabitur, quòd ea scriptis tradiderit, quæ cum aliis veteribus conueniunt.

SALVIA MAIOR.



SALVIA MINOR.



SALVIA. CAP. XXXIII.

**SALVIA**, siue *eleisphacon*, frutex est ramosus, longus, virgas habens quadrangulas, & canas folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quæ sensim attritaram quasi vestium scabritiem referant, hirsuta, subalbida, perquam iucundo odore, sed grauius semen summis in caulibus syluestri hormino simile gerit. In asperis nascitur. Menses citi, & vrinæ decoctum foliorum, ramorumque potum, & partus extrahit, & passinacæ marinæ icibus auxiliatur. Capillos denigrat, vulnorum sanguinem cohibet, tetra vlcera purgat. Testium pruritus sedant rami foliaque, si eorum decocto cum vino foueantur.

*Salvia cōsideratio.*

**A D E O** est vulgaris notitiæ *Salvia hortensis*, vt nulli prorsus reperiantur horti, in quibus hodie frequens passim non spectetur. Est etiam præter hanc *Salvia sylvestris*, quæ in campestribus, asperis, incultis, & montibus prouenit foliis domesticæ similibus, candidioribus tamen,

& hirsutioribus. Quo fit, vt longè aberrant, qui pro syluestre *Salvia*, agreste *Scalaream* sic vocatam vsurpant, quam *seplasiari* Centrum galli, & *Galliticum* etiam appellant. Verum animaduertendum est, quòd illa, quam syluestrem appello, ea sanè non est, quæ in Hispaniæ campestribus, & asperis locis, ac in *Masiliensi* agro vnà cum nostrate *nardo*, & *lauandula* frequentissima nascitur. Quandoquidem hæc non syluestris *Salvia* est, sed ea ipsa, quam do mesticam vocant: nam quæ in hortis habetur alia non est, quàm campestris in hortos translata. Ideoque non scribit *Dioscorides*, *Salviam* in hortis nasci, sed in asperis tantum locis. Cæterum *Theophrasto* duæ *Salviæ* produntur genera li. v. l. cap. i. l. de plant. hist. vbi sic inquit. *Sphacelus*, & *salvia* inter sese distant, quæ si alterum vrbatum, alterum genus sylvestre dixeris. *Sphacelo* foliū læuius, contractius, minusque; squalens: *salviæ* scabrius hæc ille. Porro genera hæc *Salviæ*, quæ à *Theophrasto* redduntur, in Italia quoque in hortis quàm plurimis inueniuntur: in eaque sum sententia, vt existimem *sphaceli* maretu esse, *saluiam* verò feminam. In *Creta*, ac etiam in quibusdā *Apulig*, & *Calabrig* locis *Salvia* in cacumine gignit tubercula quædam, gallarū instar, subalbidæ quorum alias mihi copiam fecit *Ioannes Baptista Rhannus* illustriss. Senatus *Venetici* secretarius, vir moribus, ac

*ningi la-  
pina.  
Salvia Si-  
rex Ga-  
leno. &  
Aëtio.*

bus, ac doctrina præclarus enim (quæ sua est humanitas) cum ea ex Creta sibi allata essent, mihi videnda tradidit. Saluiam Græci eleliphacon vocant. Vnde factum esse puto, ut Plinius lib. x x i. capite x x v. vocabulorum cognatione deceptus, quod Græcis lens phacos appelletur, crediderit magno errore eleliphacon lentis speciem esse. Salvia, Galeno li. v i. simp. med. teste, temperamento est euidenter excafaciente, ac leuiter adstringente. De eius viribus copiosius differuit Aëtius, sic scribens. Salvia manifestè calefacit, & leniter adstringit. Tradunt quidam, suffitam saluiam mentes immoderate fluentes, & omnino muliebri profluuium compescere. Agrippa sacram herbam vocauit, quam prægnantes mulieres, si fluide, laxæ; fuerint, vtilissimè comedere prodidit: continet enim conceptum, vitalémque reddit. Et si succi huius heminam cum modico sale, quar-

to à secubitu die, mulier potauerit, deinde viro misceatur, proculdubio concipiet. Aiunt in Co-  
pro Aegypti post seuus pefilentias, ab his qui  
superfuerunt, ad eum succum bibendum mulie-  
res coactas fuisse, plurimisque inde productos  
foetus. Dato, inquit Orpheus, sanguinem expue-  
tibus succi saluæ cyathos duos, ieiunis cū mel-  
le bibendos, & sanguis illico cohibebitur. Tabi  
dis pilule in hunc modum parantur. Sumito spi-  
cæ nardi, gingiberis, sing. drachmas duas, femi-  
nis saluæ affati, triui, & cribrati drach. octo: pi-  
peris longi drach. duodecim, & cum succo sal-  
uæ pilulas cōficito, & mane ieiunis drachmam  
vnam exhibeto, eodémque modo in vespere,  
ac postea aquæ puræ quippiam propinato. Sal-  
uia Latinis dicta, Græcis *ἑλεσιγαν* nominatur:  
Mauritanis, Aeliascacos, seu Elisacos: Italis,  
Salvia: Germanis, Salbey: Hispanis, Salvia, &  
Salua: Gallis, Saulge.

*Nemina.*

MENTHA.



MENTHA. CAP. XXXV.

MENTHA cognita herba est. Calfa-  
ciendi, adstringendi, atque exiccandi  
vim habet. Sistit sanguinem, potio ex a-  
ceto succo: tineas in ventre teretes ene-  
cat: venerem stimulat. Singultus, vo-  
mitiones, cholerasque sedant terni ra-  
muli cum acidi granati succo poti. Sup-  
purationes discutit, si cum polenta illi-  
natur. Imposita fronti capitis dolores  
mulcet: mammas si tendantur, aut lacte  
turgeant, compescit: auri cum canum  
morsibus illinitur: aurium doloribus  
cum aqua mulsa subuenit: vuluæ ante  
coitum admota conceptioni resistit: lin-  
guæ scabritiem conficta laeuigat. Lac-

MENTHA ALTERA.



coire, densariq; in calcem non patitur,  
si folia potionibus lactis immergantur.  
In summa stomacho vtilis est, & in con-  
dimentis peculiarem gratiam habet.  
Syluestris mentha, Latini menthastrum  
vocant, hirsutius est folio, & prorsus  
maiore, quam silymbrij, grauiori odo-  
re. quare minus ad sanorum vsus expe-  
titur.

MENTHA cum hortensis, cum etiam sylue-  
stris, quam Hetrusci nostri Latine nomen re-  
tinentes vulgò Menthastrum appellat, adeo omni-  
bus vulgaris, notique est, ut sine vitio eius de-  
lineationem silentio prætermitti posse putave-  
rim. Et quannus plures, quam hic scribat Dio-  
scorides, in hortis sint menthæ species (vna  
enim breuioribus, & crispioribus constat folijs  
alia rubenti caule, & flore, alia verò albicante)  
huiusmodi tamen specierum differentie non  
sunt,

*Mentha  
federatio.*



sunt, meo iudicio, plurimi faciendæ. Viuax Mentha admodum est: nam in hortis semel tantum facta, tam restitibi fertilitate durat, ut vix in posterum extirpari possit, quin renascatur. Venereis voluptatibus Mentha cõmendata est: et si Plinius non sine errore libro x x. cap. x i i i. planè contrarium scripsit tradiderit. Huius menthæ facultatis causam scitè reddidit Galenus libro v. i. simplicium medicamen-

## MENTHASTRUM.

Mētha Si  
reica Gal.

torum, ubi de ea<sup>10</sup> iis differt verbis. Hediosmos, alij verò minthe odorata nuncupant. Est enim & alia quædam minthe non odorata, quam calaminthem vocant. Vtque gustu acris, & facultate calida est, ex tertio ordine excalcificationum. In firmior tamen est mentha odorata, quam calamintha, & minus excalcificat. Vt enim in vniuersum dicam, hæc ceu sylvestris quædam est, illa ceu domestica. Quæ obre<sup>30</sup>

sanè ob eam, quæ ex cultu accedit, humiditatem, mediocriter item ad venerem excitat. Id quod omnibus commune est, quæ humiditatem semicoctam, & flatuosam continent. Ob talem ipsius herbæ temperaturam in abscessibus ea quidam cum polenta mista vtuntur. Id quod in Calamintha facere nequeas, propterea quod valentius cum excalcificat, tum deficeret, quam id genus possint. Habet verò etiam quidam amarum in se, & acerbum, & amaro quidem lumbricos interficit, acerbitate verò si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis reiectiones reprimat. Substantia est, ut si qua alia herba, tenuum partium, hæc Galenus. Verum animaduertendum est, hoc loco Galenum per sylvestrem Mentham non intellexisse legitimam Calamintham, quod is de odorata Calamintha (ut sequenti capite dicturi sumus) initio septimi libri de simplicium medicamentorum facultatibus copiose tractauerit. Ex quo facile conicere licet Galenum in hoc non suam, & veram appellationem retulisse, sed aliorum, & fortè Græci vulgi, qui sylvestrem mentham calaminthæ nomine appellare consueverit: id quod etiam Galeni locutio confirmare videtur. Cæterum est & herba passim in hortis crescens, folio saluie longiore, latioreque, beconicæ amulo, in viridi albicante: caulibus cubitalibus, & aliquando maioribus, in quorum cacamine flores exeunt corymbacei, colore melino, ranaetaci modo. Planta in vniuersum amara est,

Mentha  
graca mē.  
tis.

subadstringens, & grauiter odorata. Gorticensibus hæc vulgò vocatur MENTHA GRÆCA: in Hetruria verò Saluia romana, quod potius foliis saluiam referat, quam mentham: quin & herbam diuæ Mariæ nominant. Sunt etiam, qui Lassulatam appellant: sed vnde apud hos id sibi nomen affuerit, nescio, ipsi dicant. Porro Valerius Cordus in suo dispensatorio, in vnguento Marciati magno, duas proferit Menthas, nempe cris-

## MENTHA GRÆCA.



spam, & Saracenicam: pro Saracenicam autem mentha hæc, de qua præsens mentio, imponendam esse cõser. Sed quoniã id nulla comprobatur auctoritate, vel ratio ne, eius quidem sententiæ ad stipularem non tutum esse arbitror: præsertim cum Nicolaus nuper à Fuchsio latinus factus, nullam huius Saracenicæ menthæ mentionem faciat. sed rubicæ, & agrestis tantum. Id quod facillè no-

bis indicat, ut libere dicamus, Cordi dispensatorium quam plurimis scateat mendis, quippe quod non omnes medicamentorum descriptiões ex bonorum auctorum fonte hauserit. Platanum hæc (ut ipse scribit) Germani vocant Vnser frauen muntz, id est, mentham sanctæ Mariæ. Verum Fuchsius aliam eodem nomine ab hac longè diuersam ostendit. Qui verò horum errauerit, in hoc Germanicæ lingue peritiores iudices erunt, quanquam si Hetruscis Germanicæ, vel Germanicis Hetrusci nomina respondent, Cordo potius (quantum ad vocabulum spectat) quam Fuchsius accesserim, quod, ut modo diximus, herbam diuæ Mariæ eam vocent in Hetruria. Huius epos succus alui cineas, & lumbricos enecatrigido viro subuenit. Ventriculum roborat, tamen haustus, quam illitus, & vomitiones compescit. Tota planta tam subtiliter, quam suffito serpentes fugat, & eorum venenis resistit. Quia & intestinis expedit, & capiti robur addit. Ea Græcis *ἀνίσχυρος*, Latinis, pariter & Italis mentha vocatur: Arabibus, Nahanah: Germanis, Muntz: Hispanis, Hieruabuena, & ortelana: Gallis, Menre.

Nemina.

## CALAMINTHA. CAP. XXXVI.

EX CALAMINTHÆ generibus quædam montibus familiaris, folia oculi mi habens, incana: furculos, & caules angulosos, purpureum florem. Altera C 5 pulegio

CALAMINTHA MONTANA.



viribus inefficacior. Omnium folia gustu impensè feruentia, & acris: radix superuacua. Nasctur in campestribus, asperis, & aquosis. Potu, aut illitu demorsis à serpente opitulatur. Decoctum potu menses, & urinas expellit: ruptis, conuulsis, orthopnoeae, torminibus, chole-  
 40 ris, horribusq; auxiliatur: regium morbum expurgat. Praesumpta in vino venenis resistit: tinea, ceteraq; intera-  
 50 neorum animalia cum sale, & melle po-  
 ta, enecat: nec secus cocta, crudave, si-  
 teratur. Elephanticos esirata adiuuat, si postea serum lactis cibatur. Folia detrita, si in vellere subiciantur, menses extrahunt, & partus enecant: accensa, aut substrata, serpentes fugant: nigris cicatricibus candore reddunt, in vino co-  
 cta, & illita: sugillata tollunt. Calamin-

pulegio similis est, sed maior: quam sylvestre pulegium ideo appellarunt, quod odore ipsum amuletur. Nepe-  
 30 tam Latini vo-  
 citant. Tertia menthastro co-  
 gnata est, foliis oblongioribus, caule & ramis maioribus, quam superiora, sed

CALAMINTHA ALTERA.



tha ischiadicis imponitur, vt ex alto hu-  
 mores euocet, summam cutem exurens.  
 Vermes necat: succus auribus infillatus.

HERBA GATTARIA. CALAMINTHA officinis Calamintha conf-  
 40 lamentum dicitur, deratior,  
 cuius tres númera-  
 tur species. Sed eius  
 frequentior est vsus,  
 quæ Latinis Nepe-  
 50 vocatur, secundo  
 loco hic à Diosco-  
 ride tradita. Nomen  
 hæc apud Hetruscos  
 in hunc vsque  
 diem retinet: siquid-  
 dem nostrates eam,  
 corruptio tamen no-  
 mine, vulgo appel-  
 lant Nipoteila. Ce-  
 60 terum hæc in re Bra-  
 sauiolus (pæce eius  
 dixerim) aperte hallucinari deprehenditur, quod  
 pro certo existimet Calamintham secundo loco  
 à Dioscoride descriptam illam herbam esse, quam,  
 eo quod cati magna eius capiantur voluptate,  
 Gattaria quidam vulgo nominant. Error hinc na-  
 misse proditur, quod GATTARIA, cuius hic  
 imaginem datus, sit herba foliis verticis, aut spira-  
 50 stro similibus, quæ quantum à pulegij foliis dis-  
 sident, non modo ceteris notis, verum etiam odo-  
 re, in quo Brasauolus nititur, ij diiudicent, qui  
 has differentias rectius norunt. Sunt tamen à vul-  
 garibus, qui Gattariam etiam Nepetam appellent,  
 quorum nomenclaturam magis fortasse secutus  
 Brasauolus, quam plura ipsius notas, hallucina-  
 tus deprehenditur. Nepeta itaq; Dioscoridi nil  
 aliud inquam, mea opinione, fuerit, quam vul-  
 garis calamintha, quæ officinae vntur, quamq;  
 nos vulgo vocamus Nipoteila. quâ doquidè vul-  
 garis vsus Calamintha, non modo foliis pulegij  
 60 amulatur, sed etiam sapore, & odoris fragran-  
 tia. Quo



Calamintha officinis Calamintha conf-  
 40 lamentum dicitur, deratior,  
 cuius tres númera-  
 tur species. Sed eius  
 frequentior est vsus,  
 quæ Latinis Nepe-  
 50 vocatur, secundo  
 loco hic à Diosco-  
 ride tradita. Nomen  
 hæc apud Hetruscos  
 in hunc vsque  
 diem retinet: siquid-  
 dem nostrates eam,  
 corruptio tamen no-  
 mine, vulgo appel-  
 lant Nipoteila. Ce-  
 60 terum hæc in re Bra-  
 sauiolus (pæce eius  
 dixerim) aperte hallucinari deprehenditur, quod  
 pro certo existimet Calamintham secundo loco  
 à Dioscoride descriptam illam herbam esse, quam,  
 eo quod cati magna eius capiantur voluptate,  
 Gattaria quidam vulgo nominant. Error hinc na-  
 misse proditur, quod GATTARIA, cuius hic  
 imaginem datus, sit herba foliis verticis, aut spira-  
 50 stro similibus, quæ quantum à pulegij foliis dis-  
 sident, non modo ceteris notis, verum etiam odo-  
 re, in quo Brasauolus nititur, ij diiudicent, qui  
 has differentias rectius norunt. Sunt tamen à vul-  
 garibus, qui Gattariam etiam Nepetam appellent,  
 quorum nomenclaturam magis fortasse secutus  
 Brasauolus, quam plura ipsius notas, hallucina-  
 tus deprehenditur. Nepeta itaq; Dioscoridi nil  
 aliud inquam, mea opinione, fuerit, quam vul-  
 garis calamintha, quæ officinae vntur, quamq;  
 nos vulgo vocamus Nipoteila. quâ doquidè vul-  
 garis vsus Calamintha, non modo foliis pulegij  
 60 amulatur, sed etiam sapore, & odoris fragran-  
 tia. Quo

tia. Quo fit, ut mirum non sit, si Dioscoridis testimonio, à quibusdam sylvestre pulegium vocata fuerit: non enim odore tantum (ut Brasauolus velle videtur) Nepeta pulegium imitatur, sed & foliis, & caule. Quamobrem dicamus licet, nullo pacto existimandum esse, Gattariam herbam esse Nepetam secundam Calaminthæ speciem. Neque etiam putandum, eandem tertiam esse, quemadmodum falsò

*Ruellij et Patum.* credidit Ruellius. Quippe quoniam fecerit hanc Dioscorides menthastro similem, non autem melissophyllo, aut vrticæ, quas (ut paulò antè diximus) Gattaria repræsentat. Quapropter non modò ea de causa eius sententiam explodendam putauerim, sed etiam quòd sepius ipse in locis aquosis repererim tertiam Calaminthæ speciem, menthastri æmulam, subalbidioribus tamen foliis, ac gustu acriori. Non secus & montana mihi frequens olim occurrebatur in excelsis vallibus Ananizæ montibus, foliis albicantibus, ocimo similibus, caule quadrangulo, & flore in purpura rufescente. Quanquam in hoc errore, mea quidem sententia, versantur Monachi illi reuerendi, qui in Melsuem commentarios ediderunt, ut asserere non dubitent, montanam hanc Calamintham legitimam esse Nepetam. Calaminthæ meminit Galenus libro x i. simplicium medicamentorum, sic de eius viribus differens. Calamintha essentia est tenui,

*Monachorum lapsus.*


*Calamintha esse virens ex Galeno.*

& calida, sicque temperie, ex tertio quodammodo ordine utraque qualitate. Horum manifestata sunt: in dextra, partim gustu apparentia, partim experientia cognita. Gustu siquidem acris, & etiam calida est, ac paulum omnino subamara habet. Periclitantibus autem, & corpori admomentibus extrinsecus imposita, primum quidem valde excafcit, & mordicat, cutemque laniat, postremò etiam vlcus efficit. In corpus autem intrò assumpta, tum ipsa per sese sicca, tum etiam cum melicrato, perspicuò calfacit, & sudores ciet, omnèque corpus tum digerit, tum exiccat. Ea ratione ducti quidam ipsam contra rigores per circuitum repetentes adhibuerunt, foris quidem oleo incoctum toti corpori inungentes cum frictione non segni, intrò verò assumentes, sicuti est dictum. Quinetiam & coxendicibus eam quidam in agnitudinibus ischiadicis, tanquam strenuum remedium illinunt. Ita hic enim quæ in profundo hærent ad superficiem externam, totumque adeò articulum excafcit, cutemque non obscure adurit, mensescque tum epota, tum apposta admodum efficaciter prouocat. Bonum etiam elephantiorum remedium, non eo tantum, quòd strenuè tenues humores digerit, verum etiam quia extenuet, & incidat valenter crassos, quales sunt qui hunc morbum procreant. Sic & cicatricibus aris candorem reddit, & fugillata digerit. Sed in talibus in vino coctum cataplasmatismis modo imponere viridem magis, quam siccam præstat. Quippe arefacta vehementior redditur, & ad vrendum proprior. Porro talis cum

fit ad venenatarum bestiarum morsus assumitur, velut etiam cauteria, & quæcunque medicamenta calida sunt, & acris, tenuiusque partium, quæq; facile ex alto ad sese circumiacentem omnem qualiteratem possunt attrahere. Ceterum quæ illi inest amaritas, planè exigua est: verum ad quædam ita efficaciter agit, ut quæ valentissima est, nimirum cum coniuncta sit vehementi calori cum tenui essentia. Quare & ascaridas, & lumbricos succus eius aut infusus, aut epotus enecat. Eadem ratione aurium vermes, aut si alicubi in corporis parte sinuosi, aut implicata, quæ putredine teneantur, talis prouenerit affectus. Sic & conceptum seu poia, seu admota interimit, & elicit. Igitur incidendi quidem ei vis adest, propter calorem eius, tenuitatem, & amaritudinem, abstergendi verò propter vnicam amaritudinem. Itaque asthmaicis ob omnia antè dicta prodest. Ictericis verò, siue regio morbo laborantibus potissimum ob amaritudinem, sicut alia ferè omnia amara, vapore abstergentia, & expurgantia in icterico prouenientes obstructions. Ad omnia iam dicta efficacior est montana. *Kakachia* herba sic Græcè, ut etiam Calamintha Latine dicitur: Arabicè, Calamentum: Italicè, Calamintha, & Calamentum: Germanicè, Vuilden poley: Hispanicè, la Neuada: Gallicè, Poulliot sauage.

*Nomina.*

# THYMVM. CAP. XXXVII.



THYMVM ab omnibus cognoscitur, surculosus frutex, exilibus foliis, multis, & angustis circumdatus: capitulis in cacumine, flore purpureo rufescente referent. Gracili folio, & petroso prouenit. Vim

habet hanc, ut cum sale, & aceto potum, pituitum per aluū detrahat. Decocti usque prodest orthopnoicis, & anhelatoribus: tinea ventris exigit: mentes, parus, & secundas pellit: vrinas ciet. Cum melle in eclegmate faciles facit excreationes: recentes tumores discutit, cum aceto illitum: concretum sanguinem dissoluit. verrucas thymi colorem reddentes, pensilisque tollit. Ischiadicis cum vino, & polæa imposi-

tum subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest. Perquam utile pro condimento, duntaxat ad vsus eorum, qui recte valent.

*Thymi hi  
floria.*

THYMYM duorum generum esse testatum reliquit Theophrastus libro v. i. capite 11. de plantarum historia, ubi de eo differit his verbis. Quin & thymum candidum, nigrumque reddunt. Serò id admodum floret: nam circa æstiuum solstitium incipit. Mel apes hinc capiunt, & hoc augurio, apiarum constare affirmant, an probè melleatur, nec ne. Etenim si aliter desloruerit, mellatio minus probè succedit. Desstruitur, pericq; flos, si imber inceaserit. Semen fecundum satietate, atque etiam magis organum manifestò sentitur: thymi verò nullum ostendi potest. sed floribus quodam permiscetur modo. Flores etenim serunt, itaq; oritur thymum. hæc enim Theophrastus. Cæterum nunc thymum in Italia notissimum est. Præstat autem quod ex Apulia fertur: quanquam laudatissimum est, quod è Creta insula, aliisq; nonnullis Græciæ locis aduehitur. Vnus tantum thymi, minoris videlicet, meminit hic Dioscorides. Verum cum is libro quarto in epithymi historia, epithymū florē esse scribat è thymo duriorē, satietate simili, haud dubie ostendit se nō fecus ac Theophrastum, duo Thymi genera obseruasse. Vnū, quod mittit furculos coplures exilibus foliis, angustis, & numerosis circūdatos: in quorū cacumine sunt capicula flore purpureo resecta. Alterum verò lignosus, fruticosus, ac durius, satietate simile. Thymo hoc duriorē passim ferè itacet Gortensis ager, eius præcipue colles: in eoque (vt libro quarto suo loco dicitur) leuissimum epithymum oritur. Thymi meminit Galenus libro v. i. simplicium medicamento- rum, ubi de eius viribus ita scribit. Thymum incidit, & calcit manifestè: ob id & vinam, & menses ciet, sætum euellit, & viscera potum expurgat: educendis ex thorace, & pulmone confert. Itaque in exsiccando, & exiccando in tertio ordine statuendum est. Præter has autem à Galeno descriptas, alias quoque Thymo vires reddidit Aëtius sermone primo, sic in- quiens. Hæc verò experimentis de Thymo com- perta sunt. Dato ieiunis articulati morbo laborantibus, Thymi aridi minutissimi drachmas quatuor cum oxymelitis cyatho. Bilem enim, reliquosque humores, atque acrem siniem eua- cuant, & ad vesica affectus. Ventre autem inflato, ubi scilicet intumescere coeperit, drachmam vnam dato ieiunis cum cochleari aqua- mulse. Ad lumborum coxendicūque dolo- rem, laterisque & thoracis, ac hypochondrio- rum suspensiones ac inflationes, pondere trium drachmarum cum oxymelite temperato men- sura cochlearij ieiuno exhibito. Similiter etiā & melancholicis, & mente turbatis, timoreque detentis drachmas tres cum oxymelitis tempe-

rati cochleari præbeto. Dato item ieiunis, & ante cenam aduersus lippitudinem, & vehemen- tem oculorum dolorem. Præterea contra podagram, etiam quæ motum omnino interce- perit, cum vino vtilissimè propinatur. Postremo ad tumefactos testes ieiunis trium drachma- rum pondere exhibeatur. Verum ab atro thymo abstinere oportet: corrumpit enim tempe- ramentum, bilemque gignit. Eligendum quod purpureo flore est, præstantius tamen quod al- bum illum habet. Planta, quæ Græcis *θυμὸν*. Nomina. Latinis item Thymus, & Thymum appellatur: Mauritanis, Hæse: Italis, Thimo: Germanis, Romischer quendel, & Vuelfcher quendel: Hi- spanis, Tomilho salsero: Gallis, Thym, seu Mar- iolaine d'Angleterre.

SATURRIA. CAP. XXXVIII.



SATURRIA triuialis noti- tia est. Gigni- tur in asperis locis, & tenui solo, thymo si- milis, minor ta- men, & tene- rior: desert spi- cam florū ple- nam, coloris herbacei. Ea- dē potest, quæ thymum, si mo-

do consimili sumptretur. Aptus sanis vsus. Est etiānum quædam satina, syl- uestri prorsus minor. quæ propter mi- tiorem acrimoniam commodius in ci- bos recepta est.

THYMBRA Græcis dicta, & Saturria, Thymbra Cunila Latinis, nobis in Hæmtria, coerru- consid- pro à Cunila nomine, vulgò vocatur Coniella. In aliis tamen plerisque Italix locis, quod à tior. Myrcia vocem corrumpere maluerint, appel- lacur vulgò Sauoreggia. Non desunt etiam in- ibi, qui ab acrimonia, quam piperis ferè modo gustu repræsentat, eam vulgò Peuerella, quasi Piperellam nominent. Thymbra duo inueni- tur genera, satium, & syluestre, quod & gustu acius, & odore fragrantius est, in campestri- bus, & sabulosis prouenit. Ideoque Colum- mella minime dammandus videtur, quod Thym- bram à Saturria discreuerit: quandoquidem is optimè nouerat hortensem, ac syluestrem Cun- nilam reperiri, quod & Plinius satis notasse de- prehēditur. Ex quo faciliè intelligi potest, Colu- mellā syluestre, thymbrā nuncupasse, hortensem verò

*Thymi hi  
rei ex Ga-  
leno 3  
dist.*

verò. Satureiam. Sed quæ sit Thymbra illa, quam Dioscorides sylvestri generi assignavit, & spicam ferre prodidit floribus plenam, coloris viridis, nondum satis mihi constat. neque enim hæc mihi contigit plantam sylvestrem aut sativam videre, quæ illi tamen responderet. Quamobrem non alterius imaginem exhibere potuimus, quam illius cunilæ, quæ passim in nostris hortis nascitur: & hæc est (ut equidem opinor) satureia, cuius à Columella sit mentio. Ceterum quòd in simplicium censu usquam Thymbra meminerit Galenus, nondum conperit habeo. Paulus verò eius mentionem fecit libro v. i. t. ubi de utraque specie iis paucis differt. Thymbra sylvestris eadem quæ thymum præstat. Hortensis autem altera quidem imbecillior est, sed ad ciborum usum gravior, & accommodatior. Quæ herba *δυσανθής* Græcè, Thymbra, Cunila, & Satureia Latine vocatur: Arabice, Sahater, seu Shatar: Italicè, Thymbra, Coniella, Sauoregia, & Peucerella: Germanicè, Kunel, Zuibel hyfop, & Saturey: Hispanicè, Segurella: Gallicè, Sauoree, Sarricete.

Thymbra  
Sires ex  
Paulo.

Nomina.

S E R P Y L L I V M .  
CAP. XXXIX.



SERPILLIVM <sup>30</sup> duorum generum est. Hortense odore samfuchum imitatur, atque in coronas addi solet. cui à serpente <sup>40</sup> nomen inditum est: quoniam si qua eius particula terrâ attingat, inibi radices demittet. Folia, & ramulos origani habet, sed candidiores.

in maceris multò procerius assurgit. <sup>50</sup> Sylvestre, zygis appellatum, non serpit, sed in altitudinem increfcit, ramulos edens tenues, furculosos, foliis refertos longioribus, quàm rutæ, & duribus, angustis. Flores incundè olent, gustanti acres. Radicis nullus usus. Nasctur in petris, satiuo efficacius, atque magis exsalfaciens, & ad medendi usum aptius. Menses trahit, & vrinam potu ciet: torminibus, ruptis, vulsis, &

iecinoris inflammationibus auxiliatur: & aduersus serpentes potu, illituvè prodest. capitis dolores mulcet coctum, adiecto rosaceo, & madefactum in aceto: maximè verò phreniticis, & lethargicis conuenit. Cruentos vomitus sedat succus, drachmis quatuor ex aceto <sup>10</sup> potus.

SERPILLIVM hortense in Hetruria haud *Serpylli* negligitur, sed in hortis seritur, & magna ad *Sideratio.* modum diligentia colitur, quod etiam inibi (ut Dioscorides inquit) in coronamenta additur. Sylvestre duorum est generum: vnum flore candido, odore citrei mali: alterum verò flore purpureo, gustu perquam acri, sapore simili. Vtrunq; copiosissimè nascitur apud Goritenses Saluatino monte, quo mihi hæcenus lætius nusquam videre contigit, nec item odoratus. Serpyllum à Theophrasto, cui hortense nil aliud esse censeo, quàm sylvestre in hortis satum, describitur libro v. i. cap. v. i. de plantarum historia, ubi de eo differit iis verbis. Serpylli sylvestre etiam genus est, quod deferentes ex montibus ferunt, vt apud Scyionem heri solet, atque etiam Athenis ex monte Hymetto: apud alios verò, vt in Thracia, montes, & plana omnia Serpyllo scætant. Peculiaris huic auctio germinum: quippe cum in quantumvis longitudinis procedere valeat, nasctum scilicet adminiculum, aut iuxta sepes aliquas fixum. Genera vrbana reddere non est, vt retulimus: ferocia esse affirmant. Hoc enim in montibus, tum satureiatum quoddam, atque vehementissimum: tum grarum odore, molliusque comperiri. Tempus ferendi plurimum autumnus: hoc enim primum ferere nimirum properant. hæcenus Theophrastus. Ex cuius etiam verbis satis perspicuè colligi potest, duo esse sylvestris Serpylli genera. Quare etiam palam vnus tantum generis mentionem fecerit Dioscorides, duorum tamen obscure meminisse potuit, cum inquit. Sylvestre, zygis appellatum, non serpit, sed in altitudinem assurgit. Nam si vnum tantum sylvestris Serpylli genus Dioscoridi notum fuisset, ei sine necessarium non erat addere zygis cognomen differentie causa. Satiuum radicibus quidem serpit, sed ramulis atcolitur, amaracè modo, quemadmodum sylvestris altera species, quæ malum citreum olet. Proinde scitè Plinius libro x. cap. x. i. ita de eo memorie prodidit. Serpyllum à serpendo putant dictum. quod in sylvestri euenit, in petris maximè. Satiuum non serpit, sed ad palmi altitudinem increfcit. Serpylli vires paucis perstrinxit Galenus lib. v. i. simplicium medicamentorum, sic inquitens. Serpyllum vsquæ ad eò exsalfacit, vt & menses, & vrinam moueat. Est autem & gustu admodum acre. Eius nomen Græcè, *σέρπυλλιον*: Latine, *Nomina* Serpyll

Serpylli  
Sires ex  
Galeno.

Serpyllum: Arabicum, Hemen: Italicum, Serpillo: Germanicum, Quendel, & Huenerkoel: Hispanicum, Serpollio, & Serpam: Gallicum, Sarpoulet.

SAMPSYCHVM. CAP. XL.



SAMPSYCHVM in Cypro, & Cyzico<sup>10</sup> pro laudatissimum. Secundū sibi locum vendicauit Aegyptium. Amaracum gēs Sicula, & Cyzicena appellat. Herba est<sup>20</sup> ramosa per terram repens: foliis eius calaminthæ, quæ tenui

folio constat, hirsutis, & rotundis. suauissimum odorem spirat: ideo corouis infertur. Vis eius exsiccans. Succus decocti potus, conuenit incipientibus<sup>30</sup> hydropicis, & iis quos vrinæ difficultas, aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia, fugillata tollunt: menses subditi in pēso trahunt: contra scorpionis ictum ex aceto, & sale illinuntur: luxatis, tumoribusque cerato excepta, imponuntur: aduersus oculorum inflammationes, cum polline<sup>40</sup> polentæ, illini prodest. Apocis, malagmatisque calfaciendi gratia commiscetur.

*Sampsychnus confide v. r. 110.*

CVM superius libro primo in Sampsfuchi- ni vnguenti commentatione, Sampsfucum, & Amaracum idem esse latius ostenderim. etsi Galenus, & Paulus diuersis capitibus Sampsfuchi, & Amaraci meminerint, eadem hic repetere superfluum duxi: quod ea huc facile transferre possint ij, qui rem hanc se aliter fortasse habere existimant. Sampsfucum in Italia Hetruscis vulgò appellatur Persa; quod fortè illis è Persia fuerit allatum: cæteris verò inibi Maiorana, nomine à Latinis mutato. Herba hæc tantam cura mulieribus inuit gratiam sui odoris fecunditate, vt nullæ ferè reperiantur, quæ suis in hortis, aut siccilibus vasis Amaracum non ferant, vel plantas non transferant, ac diligentia modum cultura foueant. Quo sit, vt

putauerim ego, ex eo Maioranz sibi nomen adinuenisse, quod maiori cura, ac diligentia feratur, colaturque, quam cæteræ plantæ. Neque id ea solum ratione, quod, vt paulò antè diximus, odore perquam iucundo commendetur, sed quodam perpetua vireat coma. Sampsfuchi meminit Galenus libro v. 111. simplicium medicamentorum, sic inquires. Sampsfuchum tenuium partū, & digerentis est facultatis: deficiat enim, & exsiccet ordine tertio. Id Græcis *σάμψυχνος*, & *ἀμαράκη*; Latinis quoque Sampsfuchum, Amaracus, & Maiorana vocatur: Arabibus, Merzenius, seu Morfangius: Italis, Maiorana, & Persa: Germanis, Meyeron. Maiorana, & Meyram: Hispanis, Maiorana: Gal- lis, Marone, & Mariolaïne.

*Sampsfuchi v. r. 110. ex Gal.*

*Nomina.*

MELILOTVS, SIVE SERTVLA CAMPANA. CAP. XLI.

SERTVLA campana laudatissima in Attica, & Cyzico, & Chalcedone nata: cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nola, colore in luteum languescente, odore infirmo. Vim habet adflictoriam. Inflammationem omnem remouet, præsertim quæ in oculis, vultu, sede, aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo afflato, aut feni græci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaueris, intybôve. Recentes meliceridas per se cum aqua, & vlcera manâria in capite illita cum creta Chia, vino, aut galla sanat: stomachi dolores, & cruda, & cocta cum aliquo ex antè dictis leuat: doloribus aurium mitigandis cruda ex passo instillatur: in aceto, aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

PROBATISSIMA, legitimaque Melilotus non modo in pluribus Campaniæ locis, sed etiam Gargano Apuliz monte provenit. Cuius semen in tenuibus cornicibus inclusum nuper Venetias afferri cepit. Quo factum est, vt iam cognouerint medici vulgaris vltus Melilotum illegitimum esse, potiusque lotum vrbana referre, cuius historiam libro quarto tradidit Dioscorides. Meliloti meminit Plinius libro x. x. 1. cap. 1. x. ubi ita scripsum reliquit. Ergo in coronamenta folio venere apistum, meliloton, quod Sertulum campanam vocamus. Est enim in Campania Italiz laudatissima: Græcis in Sunio, Mox Chalcedea, & Cretica, vbi- cunque verò aspera, & syluestribus nata, Corona

Coronas ex hac antiquitas facilitatis, indicio est nomen Sertulæ, quod occupauit. Odor eius croco vicinus est, & flos. Ipse cana placet, maxime foliis breuissimis, atque pinguisimis. Melilotum, vt Galenus memorie prodidit libro v. i. simplicium medicamentorum, misit facultatis esse habet enim quiddam adstringens, sed & digerit, & concoquit: copiosior enim in eo est substantia calida, quam frigida. haec tenus Galenus. Cæterum neminem inuenio è Græcis auctoribus, qui explicauerit, quæ Meliloti pars in vsum medicinz recipiatur, an folia, aut radices, aut caulis, an flores, aut cornicula, aut semen. Quod tamen docuerunt Mauritanii, præsertim Serapio, qui ex auctoritate Iliac Eben amram de Melilotro scribit in hunc sensum. Melilotus herba est, quæ folia fert rotunda, & viridia: ramulos emittit admodum exiles, in quibus folia rara. Semen gerit in siliquis tenebuis, ac rotundis: quæ grana includunt pauca, glauci coloris, rotunda, infra sinapis magnitudinem. Porro in melilotto vsum sibi vindicauerunt siliquæ, & semina, quæ in eis continentur. *Melilotus* ita Græcè dicitur, vt Latine Melilotus, & Sertulia campana: Arabice, Alchilelmelich: Italicè, Melilotto: Hispanicè, Corona de rei: Gallicè, Melilot.

MARVVM.

CAP. XIII.

MARVVM herba cognita vulgò, surculosa, flore origani, foliis multo candidioribus, flore odoratore. Vim habet silymbrio consimilem: substringit enim, & modicè calfacit. Quæ de causa illius serpentina viscera sistit, & in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiam, & Tralleis copiosissima gignitur.

*Mari mē-  
tis ex Ga-  
leno.*

ET SI Galenus inter simplicia medicamenta nusquam, quod equidem inuenerim, Mari mē-  
tiserit, libro tamen primo de antidotis in Hedychroi compositione eius mentionem fecit, cum ita scribit. Aliæ hedychroi descriptiones reperiuntur, quæ neque Amaracum, neque Marum prorsus habent: quædam alterum tantum continent. Neque enim duo hæc omnes noscunt vnguentarij, eo quod herbas solum è Creta aduectas emant vnâ cum seminibus, atque succis. Ego vero & easdem herbas scio in Asia nasci, ac in aliis quidem regionibus raras esse, in Cyzico autem frequentes. In Italia quoque vt & alias quasdam herbas, ita & Amaracum vidi, quæ odore multum à Maro superatur. Marum enim valde redolet, putaretque aliquis sola nominis appellatione ductus, vnguentum amaracinum, quod in Cyzico faciunt, amaraci plurimum capere, sicq; forsitan ab antiquis vnguentum conficiebatur, sed nunc solum marum imponunt. Hanc herbam aliquo-

ties cum ipse degustasset, ac eam amarum quidem plurimum, ærem verò parum deprehendisse, hortatus sum quendam eorum, qui Amaracinum conficere solent, vt amaraci tantum compositioni immitterent, quantum & mari. Ac mihi visum est id vnguentum minus quidem odoratum, nihil autem viribus inferius. hæc Galeni verba. Ex quibus palam est, Marum ab amaraco viribus, & facie parum admodum diffidere, esse tum amarici sit Marum, tum etiam odore fragrantius. Quapropter non planè eorum sententiam explodendum putarem, qui Marum amaracum illam esse arbitrantur, quæ maiorem spirat odorem, maioremque amaritudinem gustu præfert: quæq; foliis viret minusculis, candidioribus, & tenuioribus: vnde non immerito à nostris in Hetruria vulgò cognominatur Persa gentile. Sampiluchum enim, siue Amaracum, inibi Persa vulgò vocari superius indicauimus. Cuius illud genus, quod foliis constat pinguioribus, laciioribus, viridioribus, gurguque acrioribus, minus tamen amarum, legitima omnibus Amaracus esse censetur. Illorum inquam sententia, semè adimpleretur, nisi eadem aduersari Galenus inueniretur, quippe qui loco citato testatus sit, se in Italia amaracum vidisse, nulla quod inibi Marum viderit, facta mentione, sed tantum quod hoc in aliis ab Asia regionibus rarum oriatur. Hinc itaq; facile adducor, vt existimem Marum non nasci in Italia. Auget nobis opinionem Plinius, qui quasi Galeno subscriberet, Marum duxit esse rarum inuentum, & Italiae peregrinum. quare ipsum collocauit libro x x i i. capite x i i i i. inter ea duntaxat odoramentorum genera, quæ ab externis regionibus in Italiam conuehebantur, sic inquit. In Aegypto nascitur & Maron peius quam Lydium, maioribus foliis, ac varisilla breuiat, ac minuta, & odorata. hæc Plinius. Cæterum non ob id eos errare crediderim, qui graciliorem amaracum Mari loco substituant. Quandoquidem testatur Galenus, quod vnguentum illud, in quo Amaracum pro Maro admisceri iussit, esse minus quidem odoratum videretur, non tamen viribus inefficacius erat. Quod Græci μαργ. Latini pariter Marum nominant.

*Mari mē-  
tis Italia pe-  
regrina.*

*Nomina.*

ACINVS.

CAP. XLIII

ACINVS, aut acinos à Græcis dicitur, tenui, siccoque ramulo herba, ocimo similis, odorata, sed hirsutior: qua coronæ faciuntur. à nonnullis olitoribus colitur. Menses, & aluum pota sistit. Illita panos, ignemque facrum sanat.

QUANQVAM sunt aliqui, qui Acinum De Acino eam ocimi speciem esse existimant, quæ an- opinio que  
stioribus constat foliis, quæq; iucundum esset rursus  
odorem, cuius gratia, atq; etiam vmbra gratæ expla-  
virentis

virentis æstiuo tempore passim in figulinis vas-  
fis fouetur extra fenestras ædium, & in atrijs,  
quam nos ob eius facilitatem vulgò vocamus  
basilico gentile, horum tamen opinioni aper-  
tissime refragatur Plinius lib. x x i. capi. x v.  
vbi Acinum scribit nunquam florere. Id quod  
minori ocimo non euenit: siquidem hoc æsta-  
te, & autumnò floret, floribusque ornatur al-  
bis, à odoratis. Illud præterea illis etiam re-  
clamat, quod idem Plinius scripserit reliquit li-  
bro x x i. capite x x v i i. cum ait. Acinon &  
coronarum causa, & ciborum Aegyptij solum,  
eademque erat, quæ ocimum, nisi hirsutior ram-  
mis, ac folijs esset, & admodum odorata. Ex his  
Plinij verbis abundè palam fieri potest, Acinum  
non esse ocimum tenuifolium, cum hoc nec  
folia, nec caulem hirsuta proferat. Cæterum  
Manardus Ferrariensis, vir acri ingenio, & præ-  
stanti doctrina, nil aliud Acinum putauit esse,  
quam herbam quandam, quæ in incultis pro-  
uenit locis, sed præcipuè in agrorum, & vitarum  
aggeribus, ocimo hirsutior, ac satis suauiter  
olens. quæ quòd ocimum admodum æmule-  
tur, à quibusdam syluestre Ocimum appella-  
tur. Quibus sanè notis aliàs adductus sum, vt  
Manardo profus assentiendum putauerim. Sed  
cum postea animaduertir, herbam hanc flores  
emittere contra Plinij auctoritatem, nunc  
cogor mutare sententiam. Nec me pœnitet,  
quòd nostra, aut aliorum diligentia futurum  
sperem, vt de hac, & de alijs rebus dubijs quan-  
do certiora proferantur. Herba, quæ Græ-  
cis *ἄκινος*, Latinis item Acinus appellatur.

Manardi  
opinio non  
accepta.

Nomina.

BACCHARIS. CAP. XLIIII.

BACCHA-  
RIS herba fru-  
ticiosa, quæ in  
coronas addi-  
tur. cuius folia  
aspera sunt, me-  
dia violæ, & ver-  
basci magnitu-  
dine: caulis an-  
gulosus, cubiti  
altitudinē pe-  
tens, aliquantu-  
lum asper, non  
sine appendi-



cibus adnatis: flore purpureo, subalbi-  
cante, odorato: radicibus veratro nig-  
ro similibus, quibus odor inest cinna-  
momo proximus. Asperum, squali-  
dumque solum amat. Radix in aqua  
decocta ruptis, vulsis, ex alto præcipi-  
tatis, spirandi difficultati, salutaris: item

diuturnæ tussi, & vrinæ difficilis: menses  
pellit: contra serpentium morsus vti-  
lissimè datur in vino. Recens radix ap-  
posita partum extrahit. Puerperis eius  
decoctum in defensionibus prodest. In  
diapalsmata vtiliter inferitur iucundi  
odoris gratia. Folia, vtpote quæ ad-  
stringant, capitis doloribus illitu pro-  
sunt: oculorū inflammationibus, mam-  
mis tumentibus à partu, agilopijs inci-  
pientibus, ignibusque sacris auxiliantur.  
Odor somnum gignit.

DVM EAM de Bacchari sententiam, quam  
superioribus annis lingua Italica expresseram,  
tunc demum his nostris Latinis commentarijs  
reperitam, excudendam tradidissim, confessus  
ingenuè me nusquam hæcenus veram Baccha-  
rim reperisse, aut ab alijs reperitam vidisse, ac-  
cidit interea temporis, vt eam ad me Roma  
miserit Andreas Lacuna Scobienfis, medicus  
hæc nostra ætate clarissimus. Cuius literas hic  
referre libet, quòd eæ sint, quæ mihi maximum  
faciant argumentum humanitatis & beneuo-  
lentia: suæ, atque etiam rei fidem addant. Lite-  
ræ autem eius sunt ita ad me scriptæ. Etsi nos  
eidem, cui tu, negotio illustrandi, locupletan-  
dique Dioscoridem nauemus assiduam ope-  
ram, ob idque nobis ex vñ fit hanc ad rem ex-  
torquere facultates alienas potius, quàm dissi-  
pare nostras, volumus tamen tibi & amico,  
& de materia medica quàm optimè merito com-  
municare veram Dioscoridis Baccharim, quam  
haud ita pridem in hisce Romanis agris repe-  
rimus, quòd possis illam ad viuam formam ex-  
pressam, in vñ sum humanæ salutis inferere eius  
luculentissimis commentarijs, quos iam (vt sa-  
ma est) primum Latine scriptos edere instituis.  
Eam itaque chartæ alligatam ad te mitto, ad eò  
per omnia respondentem descriptioni Diosco-  
ridis, vt in ipsa nulla nota possit desiderari.  
Quippe folia eius sunt aspera, media violæ &  
verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti  
altitudinem petens, aliquantulum asper: radices  
nigro veratro similes, quæ odore, & sapore imi-  
tantur exquisitissimum cinnamomum. Porro  
flores, quos per inclementiam temporis nunc  
mittere ad te non licet, in nonnullis locis pur-  
purei, in alijs lutei videntur: ita vt huius stirpis  
etiam duæ species videantur, vel si meminerit  
vñus tantum Dioscorides. Postremo huius plan-  
tæ vires, & facultates sunt omnino egedem, quas  
suæ Bacchari diuus tribuit Dioscorides. Hic  
amicus literis suis finem inposuit. Sed certe il-  
lud mihi permirum accessit, quòd eadem die,  
& serè hora, qua Baccharim Roma accepi, ean-  
dem Arimino ad me misit Iulius Moderatus di-  
ligentissimus pharmacopola, herbarumque stu-  
diosus: id quod aperte testatur hortus eius apud  
herbaz

Baccha-  
ris conside-  
ratio.

And. La-  
cuna lita-  
ra.



herbarios Italix non vulgaris, vt qui sit variis ac nobilibus plantis refertus. Hanc sanè comperi nullis prorsus reclamantibus notis, Dioscoridis Baccharim representare. Nam præterquam quòd constaret, vt illa, foliis asperis, magnitudinem inter violam & verbascū referentibus, caule anguloso, cubitali altitudine, aliquantulum aspero, habebat etiam in caule sua adnata folia, non coliculos. Hinc obiter suspicari legendū esse *ωαπαρσάδας*, non *ωαπαρσάδας*, vt vulgari Græci codices habent, quandoquidem illi lectioni adtipulatur etiam Oribasij manu scriptus codex. Præterea flores, quibus illa carebat, huc in purpura candebant, odorati. Eius deniq; radices erant veratro nigro similes, & odore cinnamomo proximæ. Huius igitur plantæ delineatione, quæ ad a. m. s. s. h. i. o. r. i. d. i. s. respondet, vt eius quoq; effigies, quam pictam damus, asfabrè demonstrat, facile adducor, vt affirmare non dubitem, hanc esse veram, & legitimam Baccharim.

Leonice-  
m. & quæ  
runda spi.  
reproba-  
da.

Cæterū Leoniceus, & Brasauolus ipsum secutus, eam plantam magno errore putarunt Baccharim esse, quam quidam Sclarcam, non nulli verò Matrisalui appellat. Sed cum huius radices nō sint veratro nigro similes, neq; minimum quidem odore cinnamomum imitentur, planè eorum sententia improbanda videtur: præsertim quòd verā Baccharim eam esse censeamus, de qua superius differuimus. Non desuerunt etiam, qui crediderint, Baccharim Dioscoridi accreuisse, caputq; hoc adulterinū esse, eo fortasse argumento, quòd eam hæcenus inuenire non potuerint, quorum suspitionem augere potuit Galenus: quippe qui in simplicium censu de Bacchari quicquam, quod equidè legerim, memoriæ nō prodiderit. Vnde ij in eam sententiam deuenerunt, vt Baccharē eandem esse cum asaro certò putarent. Verū horum quoq; error iam omnibus euidentior factus est, quā vt hic à me explodi debeat. Neq; enim ea solū ratione proditur, quòd pridem legitima Baccharis reperta sit, sed etia quòd legitimi hoc Dioscoridis caput esse comprobet Oribasius, in quo illud ex Dioscoride trāsferri legitur. Quinetia idem confirmat Paulus Aegineta, qui Baccharis meminit lib. v. i. 1. atq; ea scribit, quæ faciliè, si cōserantur, Dioscoridi accepta ferrentur: sic enim inquit. Baccharis odorata est herba, odore cinnamomo proxima, coronaria, acris. Huius radices decoctū meatus obstructos aperit, vrinam, & menses citat. Folia ipsius, cum sint adstringentia, fluxionibus opitulatur. Huic herbæ nomen Græcū est *βάρχαρις*, Latinum quoque Baccharis.

Baccharis  
vires ex  
Paulo.

Nomina.

R. V. T. A. CAP. XLV.

R. V. T. A. montana, syluestrisq; satiuæ, & hortensi acrior est, & in cibis dammata: satiuæ verò, quæ sub ficu arbore



enascitur, magis in cibos ad mittitur. Vrra que vrit, calfacit, exulcerat, vrinā ciet, mēstrua pellit, aluum sistit potu, cibo. Lethalium medicamentorum antidotū est, si semen ex vino acetabuli mensura ebibatur.

Folia per se præsumpta, aut cum nucibus iuglandibus, aridisque ficis, inefficaces venenorum vires reddunt: contra serpentes simili modo sumere conueniunt. Genituram cibo, potuue extinguit: cum anetho siccò decocta, tormina sedat. Facit ad pectoris, laterumq; dolores, difficultatem spirandi, tussis, pulmonis inflammationem, coxendicum, articularumq; cruciatus, & horrores febrium circuitu repentes, pota, vt antè dictum est. Itē ad inflationes coli, vuluæ, rectiq; intestini cū oleo decocta, & infusa. Fœminas vuluæ strangulatu liberat, si ægentali fedetenus cum melle subiiciatur. Feruefacta ex oleo, & pota, ventris tineas excutit: articulariis doloribus ex melle, aquæ intercutem cum ficis illinitur: eisdē in potu auxiliatur, decocta in vino ad dimidias partes, & oblita. Cruda, cōditaq; cibo, visus aciem excitat: dolores oculorum illita cum polenta lenit: doloribus capitis cum rosaceo, & aceto illita, auxiliatur: profluentem naribus sanguinē sistit trita, & indita. Testiū inflammationibus cum laureis foliis imposita, & eruptionibus papularum cum myrto, & cerato prodest: cum pipere autem, vino, & nitro asfricta: albæ vitilgini medetur: cum eisdem illita fornicationes tollit, & verrucas, quæ thymi florem representant. contra impetigines cum alumine, & melle vitilgini.

mè imponitur. Succus in mali punici calyce calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur. Idem oculis, qui hebetudinem fenere, cum feniculi succo, ac melle inunctus, opitulatur. Ignè sacrum, vlcera quæ serpunt, aut in capite manant, cum aceto, rosaceo, & cerussa illitus per sanat. mansa aliorum, ceparumque acrimoniâ domat. Montana si copiosius estur, interficit. Dum florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum pruritu ac vehementi inflammatione. oportet itaque eam vinctis antea manibus, & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis insparsum, feles arcere. Adiciunt eam, quæ in Macedonia circa Haliacmon annem prodeat, comedentes interimere. Montosus autem is locus, viperis scateret. Semen eius potum contra intestina vitia efficax est. In antidota commodè additur. Contra incontinentiâ vrinæ costum semen septenis diebus potui datur. Radix huius montanum moly vocatur. Sylvestris ruta fatiæ similis est. Prodest comitialibus, & coxendicum doloribus: menstrua mouet, partus enecat. Acrior est viribus, quam hortensis, & validior. Sylvestris, utpote noxia, cibis abdicatur.

*Ruta com-  
sideratio.*

RYTA vtraque planta est vulgaris notitiæ, tam fatiæ inquam, quam sylvestris. Non tamen velim de illa sylvestri intelligas, de qua capite proximo differendum est, sed de ea tantum, cuius meminit Dioscorides in presenti capite, quamq; in eius calce fatiæ similem fecit: siquidem hæc ab illa plurimè differt. Nascitur hæc sylvestris Ruta in Goriticensi agro copiosissima, adeo vt qui circumstant montes, ea vbique scateant, præsertimque Seluatinus mons, qui eadem fernè vestitur. Facie hæc hortensæ perouian similis est, graciliori tamen folio, & gustu acriori, amariorque. Id quod Monachorum in Mesuem scribentium (pace tamen eorum dixerim) ineptis prorsus refragatur. quippe qui asserant nullam ferè esse differentiam inter hanc, & androssemum, siue hypericum, vt quæ in alterius locum substitui possint. Quæ in re manifestè deprehenditur magna eorum inscitia: quandoquidem hic (vt equidem arbitror) in triplici versantur erro-

*Monacho-  
rum bal-  
incantio.*

re. Primum quòd existimauerint, turpi nimis lapsu, sylvestrem Rutam ab androsæmo, & hyperico non diffidere. Deinde quòd putauerint hallucinati etiam, androssemum, & hypericum vnè & idem esse, cum tamen Dioscorides de his seorsum, tanquam de differentiis plantis tradiderit. Huc tertius accedit error, & is quidem, mea sententia, detestandus, quòd prodiderint, hanc sylvestris Rutæ historiam bis à Dioscoride descripiam reperiri, magnamq; habere cum hyperico cognitionem. Quod potius somniasse, quam libero sensum iudicio scripsisse videntur Monachi, cum non huius Rutæ caput sit illud, in cuius fronte in quibusdam codicibus, usq; non probatis, illa legantur, quæ doctissimorum testimonio hic ascripta, hyperici autem propria censentur, sed quod proximè sequitur, in quo alterius sylvestris Rutæ, quam alij Moly, alij Harmalam, alij verò Belsan appellatur, tractatur historia. Quare caueant pharmacopolæ, qui fortasse horum patrum scripta sequuntur, ne vnà cæcitescentes sepe ducantur in varios errorum labyrinthos. Seriatim Ruta (vt author est Plinius libro x i x. capite v i i i.) fauonio, & ab æquinoctio autumnii. Odit hyemem, & humorem, ac simum. Apricis gauget, & siccis, terræque maximè lateritiæ cinere vult nutrir, hic & semini miscetur, vt careat erucis. Sub fici vmbra libentius acquiescit, cuius rei causam suis in problematis reddidit Aristoteles. Multella cum serpente dimicatura, in murium venatu Rutam prius edendo se munit, gnara hanc contra venena polleat. Viuntur & ipsa hoc nostro tempore ad cacodæmones depellendos, fortasse quòd contra fascinationes eam commendauerit Aristoteles in problematis. Planta Rutæ mirabilis magnitudinis visa est (Flauo Iosepho auctore) Macherunt, quod olim sui munitionis Iudææ oppidum. Is enim lib. v i i. cap. x x. de bello Iudaico ita scriptum reliquit. Erat autem in ipsa regia Ruta mirabilis magnitudinis: nulla enim ficu vel celsitudine, vel magnitudine vineæbatur. Ferebant autè eæ ex Herodis temporibus perseuerasse: mansissetq; vltieris profecto, sed à Iudæis, qui locum ceperunt, excisa est. Rutæ sylvestris, & fatiæ meminit Galen. lib. v i i i. simplicium medicamentorum, sic inquires. Ruta agrestis ex quarto est ordine exalciacientium: domestica verò ex tertio. Est autem non solum gustu acris, sed & amaro. Ex quo etiam sanè digerere, atque incidere crassos, lentosque humores potest. Vbi eandem vim & vrinæ mouet. Quin & tenuis est partium, flatusque extinguit. Quare ad inflationes compertit, ac venteris appetitum cohibet: digeritq; atq; extirpat strenuè. Est enim eorum ex medicamentorum, quæ valenter defecant. Porò quod superius Moly, & Belsan nominari diximus, & ipsam vtrique fuerit ruta sylvestris. *Ruta* Græcis herba est, quæ Latinis, *Nemina* parit et

*Ruta vi-  
reux ex-  
lent.*

pariter & Italis Ruta nominatur: Mauritanis, Sa-  
deb, seu Sedab: Germanis, Raut, & Vucin raut:  
Hispanis, Arruda: Gallis, Rue.

## RUTA SYLVESTRIS.

## CAP. XLVI.

VOCANT etiānum sylvestrem  
Rutam, quod in Cappadocia, & Gala-  
tia Afic finitima moly dicitur. Frutex  
est, qui ab vna radice multos emittit  
cauliculos: foliis multò, quā alterius  
ruta longioribus, tenerioribusque, odo-  
re grauiore candido: capitulis in ca-  
cumine paulò maioribus, quā satiuæ  
ruta, quæ tribus maximè partibus con-  
stant: in quibus triangulò semen, sub ru-  
sum, gustu amarù recluditur. cuius est  
vſus. Semè autumno matureſcit. quod  
cū melle, vino, croco, & feniculi ſucco,  
ac gallinaceo felle, teritur contra retu-  
ſam oculorum acie. Sunt qui eā harma-  
lam vocent, Syri beſaſan: qui Cappado-  
ciam incolunt, moly, quoniam quandā  
cum moly feruet ſimilitudinem: radice  
nigra, flore candido. In collibus, & læ-  
to ſolo prouenit.

*Ruta Syl-  
vestris ul-  
terius con-  
ſideratio.*

INVENIUNTUR ex Græcis codicibus  
Dioscoridis, item ex Latinis illorum fidem ad  
vnguem ſecuti, qui vel maximo librariorum  
lapſu, vel potius eorum temeritate, qui nimis  
ſeioſi videri volunt, plura de hac altera ſylue-  
ſtri Ruta in capituli fronte ſcripta oſtendūt, quæ  
doctiſſimorū quorunq; conſenſu adieſticia ſunt,  
& hyperico legitimè debentur. Hæ deprava-  
ta, imò adieſticia leſione decepti quidā rerum,  
literarumq; perum gnari, turpiter aberrarunt,  
certò credentes ſylveſtrem hanc Rutā ab hype-  
rico nihil diſſerre. Quorum error ſimul depre-  
heſus eſt, atque Dioscoridis leſio reſtituta à  
peritiſſimis viris, qui rei diſcrimen exactiſſimè  
nouerunt, & vetuſtiſſima Græca exemplaria  
conſuluerunt: in quibus nihil tali oſſenderunt.  
quemadmodum neq; id teſe oſtendit leſitandum  
in Oribaſij codice manu ſcripto, herbarij deſ-  
criptiones Dioscoridi acceptas referente. Quo  
fit, vt nullus amplius ſuperſite ambigendi locus,  
quin ea aſciſticia ſint, & ex hyperico, cuius pro-  
pria ſunt, hic perperam reſpecta. Sed hæc iam  
miſſa faciamus, & conſtituamus duplicem eſſe  
ſylveſtrem Ruta ſpeciem: vnam domeſticā ſini-  
lem, de qua diximus in præcedenti capite: alte-  
ram verò, de qua nunc agimus, quam quidam  
Harmalam vocant. Hanc, vt ingenuè fatear, ha-

ſtenus non vidi: non deſunt tamē, qui eam de-  
monſtrare promittāt in Italia, ac etiā iam oſen-  
datur (vt audio) in publico horto Parauij. Quod  
non equidē negauerim, tameſi fuerit hæc pec-  
uliaris Cappadociæ, & Calatiæ planta. Aphri  
corrupta à Græcis appellatione Harmel pro Har-  
mala dicūt. Verū enīmuero grauiſſimo errore  
ducuntur ſeplaſarii, qui Luminis apothecario-  
rum ſcripta ſecuti, huius Rutæ, ſue Harmel  
loco, foetidis, & aggregatiſ diſtis catapotiſ,  
aliſq; compoſitiſ medicamentis cicuta ſemen  
admiſcent. Quod non ſolū ſuis tum qualita-  
tibus, tum facultatibus Harmalæ omnino re-  
pugnat, ſed etiā venenum lethale exiſtit. Er-  
randi cauſam præbuit Quirice Auguſtus Tor-  
tonenſis: quandoquidem is, vbi in conſciendiſ  
foetidis catapotiſ, quid ſit Harmel explanare cō-  
tendit, ait Syluatici Pandectarum authoris te-  
ſtimonio, quòd quotieſcunq; reperitur Har-  
mel cum aſpiratione nil aliud apud Arabes de-  
ſignat, quā ſemen cicutæ: ſine verò aſſatu, Ru-  
tæ ſylueſtris ſemen. Quod euidens, ac execran-  
dum eſt mendacium: ſiquidem Harmel tam aſ-  
ſatum, quam nudè ſcriptum Mauritanis perpe-  
tuò agreſtem Rutam ſignificat, vt Serapionis, &  
Auicennæ auctoritate facilè probari poteſt ſuis  
in libris, in quibus ſimplicium hiſtorias, & ſacul-  
tates poſteritatis memoriæ prouiderunt. Nam  
quæ illi de Harmel ſcripſerunt, Dioscoridi, &  
Galeno Rutam hanc deſcribentibus proſus ad-  
ſtipulantur. Cæterū Auicenna ipſius Harmel  
etiā meminit libro quarto ſui Canonis, vbi vi-  
perarum morſus curationem tradens, ſe inquit  
Ruta ſylueſtris (& non eſt alharmel, ſecundum  
quòd exiſtimauerunt quidam, imò eſt ſpecies ru-  
tæ ipſus) conſert morſibus viperarum. hæc ille.  
Sed ne fortè quid Auicennam non rectè intel-  
ligens, in his verbis decipiatur, vt ſuis in Parado-  
xis Fuchſium, virum alioqui expertiſſimum, in  
Auicennam acriter agentem, deceptum fuiſſe  
deprehendiſ, vt qui illum, vt puto, minus in-  
tellexerit, ſciendum proſectò eſt (quemadmodū  
etiā antea aliquoties reſulmiſ, & nunc, quon-  
iam ad rem faciat, idipſum repetere non alien-  
um erit) quòd non eiſdem repete generis eſt  
ſylueſtris Ruta, de qua vna cum domeſtica ſape-  
rius tradidit Dioscorides, & hæc, quam Græco-  
rum quidā Harmalam, Mauritanij verò Harmel,  
ſue Alharmel appellant. Ex hæc omnibus per-  
ſpicua Ruta ſylueſtris diſtinctione, quantū equi-  
dem reor, liquido patebit. Auicennam haud qua-  
quam erraſſe, vt errorem immerito illi iniungit  
Fuchſius. Quippe cum inquit Auicenna, Ruta  
ſylueſtris (& non eſt alharmel, ſecundum quòd  
exiſtimauerunt quidam, imò eſt ſpecies rutæ  
ipſus) conſert morſibus viperarum, iſis verbis  
deſignat ſe illam hic ſylueſtrem Rintam intel-  
ligere, quæ domeſtica emulatur: non autem  
illam, de qua hoc loco diſſerit Dioscorides,  
quāq; ſuæ Arabicæ familie anchores Har-  
mel, ſue Alharmel vocant. Iſus tamen loco  
citato, paulò antè meminerat, ſe inquit. Et al-

*Syl-  
vestris  
Ruta  
non eſt.*

*Fuchſia  
ſuis, &  
Auicenna  
deſenſio.*

harmel est de medicinis liberantibus. Vbi per Alharmel eam sanè Rutam syluestrem intelligit, de qua præsens sermo est. ob cuius differentiationem, postea alterius Rutæ syluestris mentionem faciens, subiungit illa verba, quæ iam bis citauimus. Vt hinc palam faceret, se non modò de alio syluestris Rutæ genere intellexisse, sed etiam occurrisse, ne quis, si sine distinctione locutus esset, se idem frustra repetisse calumnietur.

Quædam  
Auerrois  
resistent.

Porò non desunt qui sustinere contendunt, Harmel esse Cicutam, Auerroem in medium adducentes, quem libro v. suarum collectionum ita scriptum reliquisse volunt. Harmel, id est Cicutam, calida est, & sicca in tertio gradu, incidit crassos humores, & prouocat urinam, & menses, & valet dolori scapularum, & purgat phlegma. Hac isti nuntur auctoritate. Quibus ita facile responderi potest, quòd cum Cicutæ hoc loco eas Auerroes tribuat facultates, quas etiam Harmalæ, nomine tamen Moly,

Nomina.

MOLY. CAP. XLVII.

Moly folia habet graminis, latiora, humi sparsa: florem albæ violæ similem, sed minorem, magnitudine violæ purpureæ æmulū, lactei coloris: caulem candidum, quaternū cubitorum: in cuius cacumine nect aliquid, quod alij speciem referat. Radix parua, bulbosa, quæ mirum in modum valet ad vuluæ apertiones, si trita cum irino vnguento, in pello subijciatur.

Ruta syl-  
uestris al-  
terius Ge-  
neris Ga.

reddidit Galenus, manifestèprehenditur Auerrois codex librariorum incuria fuisse deprauatus. Neque difficilis lapsus fuit, quòd ij vocum similitudine decepti Cicutam pro Rutalegerint, ac scripserint. Adde etiam illud (hoc enim medicorum neminem latet) quòd tantum abest, vt Cicutam tertium caliditatis gradum obtineat, cui illam assignat deprauata Auerrois lectio, vt ne primum quidem attingat, cum Dioscoridis, & Galeni testimonio, in quarto frigiditatis ordine collocetur: ob idq; eam lethale venenum esse affirmant. Quapropter quàm pessime agatur ab iis, qui Cicutæ formidandū semen iis compositis medicamentis addunt, quorum vfus est ad deciciendos, incidendos, extenuandósque lentos humores, ij diuidentur, qui veritatis studio dediti huiusmodi cavillationes, quæ sepe hominibus perniciosè pariunt, tolerare non possunt. Rutam hanc syluestrem appellat Galenus Moly lib. v. 1. simplicium medicamentorum, vbi de ea differit his verbis. Moly, hoc quidam vocant peganon agrion, hoc est, Rutam syluestrem, nonnulli harmolan, Syri be sisan, sicut Cappadoces moly, quia radicem habeat nigram, & florem lacteum. Vis eius tenuium est partiu, & calida tertio abscessu: vnde crassos humores secat, ac digerit, & urinam mouet. Hæc Galenus de altero Rutæ syluestris genere. Cui constat & primum syluestris Rutæ genus perpulchrè respondere. Ex quo crediderim, quòd sine illo errore, si lapsarij alteram alterius loco subicere possint, quoties Arabum harmel in suis compositis medicamentis admiscendum reperiant. Est & alia Rutæ species, quæ recentioribus quibusdam CAPRARIA cognominatur, quibusdam verò Galega dicitur, nostrates eam vulgò appellant Lauanese. Passim hæc in serobium aggeribus, humentibusque locis provenit, sæno græco persimilis. Magnificiunt ipsam nonnulli suis experimentis nixi non modò aduersus pestilentiam, & lethalia medicamenta, verum etiam contra ferarum omnium,

Moly, vt scriptum reliquit Theophrastus libro 1. x. cap. x. v. de plantarum historia, apud Pheneum exit, atque apud Cyllenam esse (quem admodum Homerus dixit) affirmant: radice rotunda, non ab simili cepæ, folio scilicet. Vsum eius contra veneficia summa: non tamen effodi difficulter, vt ait Homerus. Moly quoque meminit Plinius li. x. v. cap. 1111. ita scribens. Laudissima herbarum est, Homero teste, quam vocari à diis putant Moly. Ast inuentionem eius Mercurio assignat, contraque summa veneficia demonstrat. Nasci eam hodie circa Pheneum, & in Cyllene Arcadiæ tradunt, specie illa Homerica, radice rotunda, nigraque, magnitudine cepæ, folio scilicet: effodi autem difficulter. Græci authores folium eius luteum pinxere, cum Homerus candidum scripserit. Inueni è peritis herbarum medicis, qui & in Italia nasci eam dicerent, asserique Campani mihi aliquot diebus effosam inter difficultates faxæ, radicis triginta pedes longæ, ac ne sic quidem libidæ, sed abruptæ, hæc Plinius. Ex cuius sanè verbis facile cognosci potest, Moly ab eo secundo loco redditum, quod in Campania effossum & sibi allatum scribit, ab illo plurimum didicere, quod Homerus, & Dioscorides notis non planè consentientibus repræsentarunt. Moly, cui Dioscoridis delineatio respondet, hæc nus in Italia reperire non potui, neque ab aliis inibi repertum, aut aliunde aduectum scio. Ceterum herbam Moly Dioscoridi appellatam, eandem nimirum esse putauerim cum illa, quæ Galeno libro v. 1. simplicium medicamentum.

Moly hi-  
storia ex  
Theophr.  
& Plinio.

Ruta ca-  
praria me-  
dicis & vi-  
res.

Moly Ge-  
neris Ga.

Myle

Mye vocatur, cum inquit. Myles radix paruo bulbo similis est, facultatis contrahentis. nam cu farina ærina, (hoc est loliij) apposita aper- tam vuluā sanare scribit Dioscorides. His ver- bis Galenus non solum quidem Mylen suam Dioscoridis Moly acceptam refert: sed etiam nos commonet mendii cuiusdam, quod hucus- que laruit in codicibus Græcis Dioscoridis. Quippe quod ubi in huius capituli calce legi- tur *μολύ ἰρινη, μολύς*, quod est, cum irino vnguen- to, Galeni testimonio, legendum sit *μολύ διόσκο- ρίδου*, id est, cum farina loliacea. Et certe in id vitium facile librarij quadam scripturarum vicinitate labi potuerunt. Sed addamus ratio- nem, qua vulgaris lectio deprauata manifestè apprehendetur. Nam si vnguentum irinum ef- ficaciter aperit, non video quid Moly radix cum eo prestare possit *τῷ ἰρίνῳ ἀπορροήσας*, hoc est, ad vuluæ apertiones. Sic enim ex Gre- co rectius reddendum puto, quam ad aperiend- as vuluas, vt venterunt Marcellus & Ruel- lius. qui tamen secus facere non poterant, si vnguenti irini rationem habere volebant.

*Dioscori-  
dis, locus  
castigat.*

*Nomina.*

Id *μολύ* Græci dicunt, quod Latini item Moly.

PANACES HERACLEVM.

CAP. XLVIII.



PANACES nonnullis He-  
racleū dicitur: ex quo opopa-  
nax colligi so-  
let. Plurimum in Bæotia, & in Phocidæ Arca-  
diæ nascitur: ibiq; compen-  
dij, & quæstus, qui ex eo liquo-  
re facitatur, gratia, studio-

se colitur. Folijs est asperis, in terra ia-  
centibus, herbacei coloris, multum ad  
fulnea accedētib; in ambitu quin-  
quepartitò diuisis: caule, vt ferula, 50  
altissimo, qui lanugine quadam inca-  
nescit, folijs etiam minationibus ob-  
situs: muscariis, ceu anethi, in cacu-  
mine: flore luteo, & semine odorato,  
feruentēque. Radices habet multas  
ab origine vna, candidas, graecolen-

tes, crassi corticis, & subamari gustus.  
Nascitur in Cyrene Libya, & Macedo-  
nia. Excipitur succis incisa radice, re-  
centicaulium pullulatu. Ea candidum  
succum emittit, qui siccatus in summa  
cute croceo colore contrahit. Ef-  
fluentem autem succum excipiunt, foli-  
is excavato solo stratis, quæ siccata  
tolluntur. Similimodo caule menses  
inciso, profluentem succum eximunt.  
Meliores ex radicibus, albæ, rigentes,  
distentæque, siccæ, quæ cariè non sen-  
tiant, aromatica, feruentes gustu. Fru-  
ctus ex media ferula cibo idoneus est:  
sed ex agnatis stolonibus, ab vsu ciba-  
rio abhorret. Maximè in hoc succi ge-  
nere probatur, quàm amarissimus, in-  
ternè albus, aut subfuluus, foris ad cro-  
ci colorem inclinans, læuis, pinguis,  
friabilis, tener, statim in aqua elique-  
scens, graui odore. Niger improbatur,  
ac mollis. Adulteratur ammoniacò,  
aut cera. Sed sinceri experimētum est,  
si digitis in aqua friatus resoluator, &  
lactescat. Excalfacit, mollit, extenuat:  
horroribus febrim, circuitibusq; vul-  
sis, ruptis, laterum dolori, torminibus,  
stillicidio vrinæ conuenit. Contra ve-  
sicæ scabiem ex aqua malsa, aut vino  
bibitur: menses trahit, foetum enecat.  
Inflationes, quæ vuluam malè habent,  
duritiâsque, ex melle dilutus, discutit:  
ischiadici illinitur. acopis, & capituli  
40 medicaminibus admiscetur: carbun-  
calos rumpit. Podagricis, cū vna pas-  
sa illitus subuenit: dolore dentium li-  
berat, cauis inditus: oculorum aciem  
illitu excitar. Ex eo, & pice optimum  
fit emplastrum cōtra bestiarum mor-  
sus, quæ in rabiem efferantur. Radix  
in ramenta confissa, vuluæ admōta,  
50 partus extrahit: ad vetera vlcera effi-  
cax est. nudata ossa corpore operit, si  
trita cum melle illinatur. Semen cum  
absinthio sumptū, menses pellit: cum  
aristolochia, prodest aduersus anima-  
lia, quæ venenum eiacularant: & con-  
tra vuluæ strangulatus in vino bibitur.

PANACES ASCLEPIUM.  
CAP. XLIX.

PANACES  
Asclepij caulē  
à solo emittit  
tenuem, cubi-  
talem, genicu-  
latū: circa quē  
folia fundūtur  
sceniculo simi-  
lia, maiora ta-  
men, & hirsu-  
tiora, & odora-  
ta: in cacumi-  
ne umbella,  
vbi flores emi-

cant aurei, acris gustus, & odorati. radix parua est, & tenuis. Auxiliare vim habent flores, & semina, contra vlcera, phagedanas, & tubercula, si trita cum melle imponantur. aduersus serpentes ex vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces syluestre origanum vocant, alij cunila, de qua in origani mentione diximus.

PANACES CHIRONIUM.  
CAP. L.

PANACES Chironium in Pelio monte maximè prouenit. folium eius amaraco simile: flos aureus: radix parua, quæ non altè demittitur, gustu acris. Pota radix serpentium veneno resistit. Illita coma, eadem præstat.

*Panaces*  
*confidera-*  
*tio.*  
PANACES Heracleum in Apulia frequens nascitur, quemadmodum in Appennini iugis, & in Argentario promontorio in nostris maritimis Senensibus. Habetur & in quam plurimis Italiæ viridariis, vbi summa diligentia colitur ab his, qui simplicium medicamentorum studio, ad suum aliorumq; cōmodum innumera plantarum genera suis in hortis, ac viridariis serunt, ac colunt. Verū non ob id affirmauerim, eius lacrymam, quam officinæ Opoponacum vocant, excipi in Italia. Nam quæ Venetiis venalis reperitur, ex Alexandria Aegypti conuehitur. Legitima non desit, etsi adulteratæ frequentior sit vsus apud eos, qui ex quavis herba manipulos colligunt. In Panacis historia apertissimè aberrauit Meseues: quippe qui initio capitis omnia eius genera confundat. Quod omnibus iam notus est, quāvis à nobis ostendi debeat. Panaces Asclepium

nuper vidimus, eiusq; effigiem hic appinximus. Sed Chironiū non prouenit, quod sciam, in Italia. Quanquam non desunt, qui pro Chironio panace ostendant plantā, quæ folium habet oblongum, hyssopi ferè modo: florem pentaphylli, sed maiorem, aureo tamē colore: surculos numerosos, tenues, lignososq;: radicem item lignosā, rufescentem, gustu adstringentem. Verū quod Dioscorides panaci Chironio tribuerit folia amaraco similia, & radicē gustu acré, non video quomodo ingenuè possim eorum sententiæ subscribere. Panacis genera ab inuentoribus cognominari tradunt, nempe Asclepium ab Asculapio, Chironiū à Chirone, & Heracleū ab Hercule: quare & Herculeum à plerisque est appellatū, cuius tantum lacryma hoc tempore officinæ vtuntur. Semen enim, ac radix, etsi in pluribus valeant affectibus, ad nos tamen, quod viderim, non adferuntur. In quorum defectu optimi chirurgi, cū denudata ossa carne explere volunt, radicē segmenta, quæ lacrymā compacta reperiūt, quæque illa sint, non paruo labore seligunt, & ad hunc vsum in puluerem redigunt. Panacis vires descripsit Galenus lib. v. 1. 1. simplicium medicamentorum, his verbis. Panaces Heracleum, inquit, ex hoc sit vocatus Opopanax, radicibus eius, & caulibus excisis. Porro opopanax ipse longè est ad plurimos vsus aptissimus, vt pote excauans, emolliens, & digerens: ponatque ipsum quispiam in calcaciendo tertij ordinis, in desiccando verò secūdi. Cortex radicis exicatoriū simul, & excalcatorium est medicamentū: sed minus quā succus, quā & nonnullam habet abstergens facultatē. Quare eo quoq; vtitur & ad ossa denudata, & ad vlcera maligna, & cōtumacia. Sufficiens enim talia carnem procreant, scilicet abstergendo simul, & desiccando, nec ita magnopere calcaciendo: quæ omnia ad carnem generandam necessaria sunt, velut in libris de curandi ratione ostendimus. Fructus calidus & ipse est, ac mensibus mouendis medicamen accommodū. Ceterū nescio, quo pacto nunc ferè omnes ex more non panaces, sed panaca herbam hanc vocent. Panaces autem Asclepiū minus est calidū suprā dicto panace: quam obrem eo, & floribus eius, & semine mellis mista ad vlcera, phymata, & phagedanas vtuntur. Panaces verò Chironiū & ipsum similem prædicto facultatem possidet, hæc Galenus. Porro deiecit Panacis lacryma (vt author est Mesues) à remoris corporis partibus, præsertimq; ab articulo compaginibus, lentam, crassā, contumacemq; pituitam. Cerebrum, & neruus expurgat, præcipuè cū frigidis torquentur morbis. *panacis hyladactyl sic* Græcis, vt etiam Latinis Panaces Heracleum, nominatur: Arabibus, Steufir, Ieusir, siue Glausir: Italis, Panace Heracleo. Huius gummi Græcis *innadactyl* dicitur: Latinis itē Opopanax: Italis, Opoponaco: Hispanis, Opopo-  
*Nomina*  
naque.

*Panacis*  
*vires ex*  
*Galeno, et*  
*Mesue.*

*25. flos in*  
*pina.*

aque. *panax* verò *πανακή* sic Græcè vocatur, vt Latine similiter Panaces Asclepium: Arabice, Panax Aschilibet: Italicè, Panace Asclepio. *panax* denique *παναξ* ita Græcis, Latinis pariter Panaces Chironium appellatur: Mauritanis Panax caromon: Italis, Panace Chironio.

LIGUSTICVM. CAP. LI.



LIGUSTICVM, quod alij panaceam, alij panaces vocant plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino Alpibusco termino: vnde nomen traxit. Panaces incolæ non abreappelant, quoniam & radice, & cau-

le Heracleotico panaci simile sit, & viribus eisdè præditi. Gignitur in altissimis, asperisque montibus, ac vmbrosis, maximè iuxta fluenta. Cauliculum fert anethi, geniculatum, tenue, & in circuitu folia fertula Campanæ, molliora, odorata, prope verticem graciliora, & longè magis dimissa: in cacumine muscarium, in quo semen dependet nigrum, solidum, & oblongum, fœniculo proximum, gustanti acre, & aroma olens: radix candida, Heracleotici panacis similis, odorata. Radicis, seminisq; vis excofactoria, concoquens. Prodest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones: itè ad inflationes, præsertim quibus stomachus urgeat: & contra serpentium ictus: vrinæ, & mens potu trahit. Eisdè præstat effectus appposita radix. Semen cum radice oxyporis, & medicamentis decoquetibus admiscetur. ori perquàm vtile: quare pro pipere trahitur eo indigenæ ad obsonia. Adulteratur semine quodā simili: quod facillè gustu discernitur: amarum enim est. Alij semen fœniculi, ad fœselis admix-

In Ligustico scentes, ligusticum dolo vitant. *quæritur* PALLIANTUR apertè, vt mea quidem fert damerror. opinio, qui herbam vulgò hodie Leuiticum no-

minatam, quam legitimum hippofelinum censemus, putant esse Ligusticum hic à Dioscoride representatū, quod Galenus vnius literæ mutatione Libysticum appellauit. Siquid hoc caule affurgit tenui, & foliis fertula Campanæ similibus. Illud verò caule profert altū, crassum, concavum, & geniculatū: folia spij palustris gmulæ, maiora tamen, ac etiā crassiora. Cæterum quauis legitimū, ac verum Ligusticum in Liguria, cuius Genua metropolis est, vnde etiam nomen inuenit, frequentissimum proveniat, sitq; insit adeò vulgaris notitia, vt eius semine passim videretur incolæ in ciborum condimentis, non ob id tamè per cætera Italiæ loca hæcenus, quod scia deferri coepit. Nascitur in Ananiensibus montibus, quin & in Goriensibus. Veneris etiā videri potest in horto Maphæi medici clarissimi. Galenus de Libystico differens li. v. 11. simp. medic. sic breuiter inquit. Libystici radix, & semē ex genere excofactoriū sunt, adeò vt menses cieiāt, & vrinæ prouocent, flatuq; discutiant. Quod Græci *λεγιστικόν*, Latini similiter Ligusticum, & Libysticum dicunt: Itali, Ligustico.

Libystici  
vires ex  
Galeno.

Nomina.

PASTINACA. CAP. LII.

PASTINACA syluestris folia gingidij habet, latiora, subamara: caulem rectum, scabrum: vmbellam similem anethi: in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam, ferme croceū. radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta māditur: Semen potum, vel impositū, mensi sua mouet. Iis conuenit in potione, quos vrinæ difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cutem subit: serpentium morsibus, ictibusque prodest præsumentes id, nulla affici iniuria à serpentibus traduntur: conceptus adiuuat. Radix vrinam pellit, venerem stimulat, partus apposita eiicit. Folia trita, & cum melle imposita, phagedænas vlcera purgant. Satiua ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo aptior.

VULGARES admodum sunt in Italia tam satina, quam syluestris Pastinacæ radices, vt quæ passim quadragesimalis ieiunij tempore non ingratis in ciborum vsum recipiantur. Cæterū quoniam fortassis in Gallia non feruntur in hortis, Ruellius manifestò errore putauit. Carotas nobis vulgò vocatas, quas coctas, sales, oleo, & aceto additis, hyeme vsurpamus in acetariis, fatuas esse Pastinacas. Vt hinc maxime admirari sibeat Ruellius, virum aliqui doctissimum. Siquid hæcenus nemini inueni ei rei

Pastinacæ  
considerat.

Ruellius  
erat.

PASTINACA SATIVA.



CAROTÆ.



car. manduntur. nanque ex in quadagesimo præsertim ieiunio cum farina, & oleo fringuntur & ita sepe, ubi defunt pisces, eorum vicem suppleant: licet pro ieiunantium instituto, essent potius eorum cibis abdicandæ: venerem enim nō obscurè stimulant. Falluntur præterea, qui Dau-  
ci loco, agrestis Pastinacæ semen accipiunt, illius scilicet, in cuius florentis umbellæ medio exiguum quid purpureæ emittat. Aliud enim est à Pastinaca erratica Daucus, ut paulò inferius suo loco dicetur, ubi eius tres species à Dioscoride redduntur. Nam quavis tam ex illius, quam Galeni sententia libris tum de simplicium medicamentorum, tum de alimentorum facultatibus, Daucus à sylvestri Pastinaca parum, vel potius nihil viribus differat, ob idq; alterum aliter vice in medicinæ vti capi possit, non tamen rectè dici potest, Daucum erraticam esse Pastinacam. Pastinacæ meminit Galenus libro y l i i. simplicium medicamentorum, sic in-

PASTINACA SYLVESTRIS.



quens. Pastinaca sativa imbecillior: agrestis ad omnia potentior est. Vrinæ mouet, & menses prouocat cum herba quidem tota, tum maxime semen, ac radix. Habet porro etiam absterforiū in se quippiam, quomobrem vlcera phagedæni ca quidam foliis eius viridibus cum melle, quò pura reddat, illinunt. Planta, quæ Græcè παρυσία, Latine, pariter & Italicè Pastinaca vocatur: Arabice, Iezar, Gezar, seu Giezar: Germanicè, Paltenei, & Pastnachen: Hispanicè, Canaria blanqua: Gallicè, Palténades.

SESELI. CAP. LIII.

SESELI Masiilienfe folia fœniculi habet, crassiora: caulem vegetiorè: umbellam anethi, in qua semen oblongum angulosum, degustanti statim acre: radix longa est, iucundi odoris. Semen, & radix exalfaciendi vim habent. Potu stranguriæ, & orthopnœæ medentur: suffocationibus mulierum, comitialibusque profunt: menses, & partus trahunt: ad omnia interna mala pollent: tussim veterè sanant. Semen cum vino potum, concoquit, & tormina discutit: epialis febribus vtile. cōtra pfriktiones in itineribus, cū pipere, & vino bibitur. Capris, cæterisque pecudibus datur in potu, quò facilis suos fœtus enitantur. Aethiopicum seseli, folia habet hederæ, minora, & ad periclymeni modum oblonga. frutex nigricat, palmitibus in binacubita extensis: ramis sesquipedalibus: capitulo anethi: semine in tritici morè denso, nigro, amaro, Masiilienfi odora



odoratiore, & acriore, multum suau-  
ui. Peloponnense folia habet cicuta,  
latiora, & crassiora : caulem supra  
Mafsiliensis magnitudinem\*, ferula-  
ceum : & lram in cacumine umbel-

SESELI MASSILIENSE.



ΚΕΡΥΑΙΟΝ ΣΕΣΕΛΙ.  
ΕΛΑ. ΑΙΤΤΕΙ.

SESELI PELOPONENSE.



TORDY-  
LIVM, quod  
aliqui Creticū  
seseli vocant, iu-  
xta Ciliciam in  
Amano monte  
nascitur, herbu-  
la furculosa, se-  
mine duplici,  
rotundo, scutu-  
lorum effigie,  
odorato, suba-  
cri. Contra vri-  
næ difficultatē  
bibitur : potu-

cit menses. Succo seminis, caulisque vi-  
rentis, ternis obolis ex passo decem die-  
bus hausto, renes sanantur. Efficax est  
radix ad ciendas pectoris excretaiones,  
in delinctum cum melle.

*Seseli co-  
sideratio.* SESELI Arabibus Sisileos dicitur. Offici-  
næ verò id Siler montanum appellant. Legiti-  
mum Sesele Massiliense in omnibus ferè Triden-  
tinis montibus legitur, Sed maxime animaduer-  
tendum est, quòd quamquam in quibusdam Ira-  
liæ pharmacopoliis, verum sit reperire Sesele,  
in quimplurimis tamen quoddam semen Sese-  
lis vicem explens venditur, quod nulli profus

lam, in qua semen latius, odoratum,  
& carnosius pèdet. Eisdem viribus præ-  
ditum est. Nascitur in asperis, riguis,  
& collibus. inuenitur etiamnum in  
insulis.

SESELI AETHIOPICVM.



Sesele à Dioscoride descripto respondet: quippe  
quod amaritudine tantum sit præditum, & olfa-  
ctui cimum fatorem repræsentet. Porro Se-  
seli Aethiopicum, ac Peloponnense, quæ prius  
in Italia non videram, hoc anno à me, ut spero,  
reperita sunt. Cæterum aliquando credidimus,  
Tordylium, siue Creticum Sesele in quodam  
nostro hortulo natum esse, quòd eius semen  
(ita enim aiebant) è Patavino simplicium viri-  
dario allatum, terræ commisitsem. Verum cum  
postea accuratius eius faciem contemplantus es-  
sem, itemq; saporem examinasset, id à legiti-  
mo longè admodum dissidere cognoui. Sesele  
monstratio prima assignatur ceruis fœminis.  
Siquidem tradit Amthorices lib. i x. cap. v. de  
historia animalium, ceruas statim à partu Seselem  
herbam petere, & cum eam ederint, ad prolem  
redire. Sesele omne genus in vniuersum memo-  
riz prodidit Galenus lib. vi i i. simp. med. ubi  
ita scribit. Sesele & radix, atq; etiam semen vsq;  
adeò exalciat, vt admodum vrinam mouere  
queat. Sed & medicamentum est tenuium par-  
tium, vt & comitali morbo, & orthonæ  
competat. Quæ herba Græcis ελεα, Latinis, vt  
etiam Italis Sesele nuncupatur: Arabibus, Sis-  
siliis : Barbaris, Sisileos : Germanis, Steinbrech:  
Gallis, Ser montain.

*Seseli Gi-  
ret ex Ga-  
leno.*

*Nomina.*

SISON. CAP. LV.

SISON exiguum semen est, in Syria  
natum, apiosimile, oblongum, nigrum,  
feruentis naturæ. Cōtra lienis vitia bi-  
bitur: vrinæ difficultatē potu emendat,  
remoratos mēses citat. Eo incondimē-  
tis, cū cucurbita, & aceto indigena vtū-  
tur. In cacumine granula multa gerit.

*Sison semen incognitum.* SISON, vt hic Dioscorides testatur reliquit, semen est in Syria proueniens, nobisque incognitum: quandoquidē plantam, quæ illud profert, apud vllum authorem suis notis deferiptam nō inuicim nec semen ipsum, quod equidem sciam, ad nosē Syria deferretur. Quapropter illius patrie gentibus relinquendam duximus, vbi eius notitia, & seminis vsus. Nam præterquam quod difficile sit, etiam periculosum iudico, de rebus peregrinis, quarum delineationes latent, aliquam proferre sententiam. Id *cleus* Græcè dicitur, quod Latine quæque Sison.

*Nomina.*

ANISVM. CAP. LVI.



ANISVM in summa exalfacit, exiccat. oris halitum incundiorē facit, doloris leuamentum præstat. Vrinam ciet, discutiedivim habet, hydropicis potum sitim extinguit. Animalium venenis aduersatur: valet ad inflationes: alium, & alba se-

minarum profluvia sistit: lac ad mammas elicit: vencrem stimulat: dolores capitis leuat, suffitum naribus, cum rosaceo tritum, instillatumque fractis auribus medetur. Melius semper recens, plenum, non furiosum, odore præstans. Inter prima laudatum est Creticum, proximo loco Aegyptium.

*Anisifera deratio, et quæ ex Galena.* ANISVM vulgaris omnibus ferè notitiæ planta est, nihilq; secius vulgò eius semen notū. Quamobrem longiori sermone eius historiam persequi non oportet præter duximus. Ceterum vt nostrum sequamur institutū, non sunt à nobis silentio prætereunda, quæ de eius viribus scripsit tradidit Galenus lib. v. i. simp. med. vbi sic inquit. Anisi semē maximè vile est, acre, subamarum, vt propè ad vrentium accedat caliditatem. Est autem & in siccando tertij ordinis, sicut & in calefaciendo. Proinde & vrinam ciet, & digerit, & arque etiam ventris inflationes sedat. Planta, quæ Græcis *ἀνισον*, Latinis itena Anisum appellatur: Mauritanis, Anesum, seu Anexissum: Italis, Aniso: Germanis, Anisz, & Enisz: Hispanis, Matzahua, & Yerva dulce: Gallis, Anis.

*Nomina.*

CARVM. CAP. LVII.



CARVM, semen est vulgaris notitiæ. Exalfacit: vrinam cicit, stomacho vtile, os comendat concoctionem adiunat. Vtiliter miscetur antidotis, & oxyporis. anisi vicem præbet. Radix cocta, pastinacæ modo, mādatur.

CARVM officinis vulgò Carui dicitur. semen omnibus notissimum. Plura nascitur in pratis, & collibus. Semen passim Germani panis suo subiungunt, ciborumq; condimentis indunt, quemadmodum nos anisum, & fœniculum. Sed maximè, meo quidem iudicio, redarguendū sunt Monachi illi, qui in Mesuem commentarios ediderunt: quippe qui non sine iagno, & aperto errore crediderint, Carum semen esse rubentis illius radicis, quæ vulgò Carota vocatur. Quandoquidem Carotarum semini nulla Carifqualitas inest: id enim adeo acre non est, vt tertio calfacientium, ac exiccantium ordini adferri bi possit. Quod tamen de Caro testatur Galenus lib. v. i. simp. medic. sic scribens. Cari semen exalfacit, & exiccat tertio quodammodo ordinē, moderatè acrem qualitatem possidens. Itaque & status extinguit, & vrinam ciet, non semen tantum, sed & planta. Cuius nomen Græcum est *καριον*: Latinum, Carum: Arabicum, Caruia, Karaui, seu Karui: Italicum, Caro: Germanicum, Markumich, & Kim: Hispanicum, Alcarauca: Gallicum, Carui.

*Cari confederatio.*

*Monacho. rñ error.*

*Carifvirtus ex Gal.*

*Nomina.*

ANETHVM. CAP. LVIII.

ARIDI Anethi comæ, seminisq; decoctum, potu lac euocat: inflationes, & tormina sedat: alium, vomitionesque sistit: vrinam ciet, singultus lenit. oculorum aciem hebetat, genituram resinguit, assidue potum. Decoctum eius seminis vuluæ malo opportunis, ad defersiones vtile. Condylomata illitus seminis cremati cinis tollit.

ANETHVM.

Anethi co  
sideratio,  
& vires  
ex Gale.

## ANETHVM.



missi. Excitantur verò ordinis est secundi incipientis, aut primi finientis. Itaque merico in

ANETHVM hortis omnibus frequentissimum, omni adeò ex parte feniculum amulatur, vt sepius colligentes fallat, nisi gustum consulant. Cæterum Anethum, vt author est Galenus libro v. 1. de simpliciū medicamentorum facultatibus, adeò excalfacit, vt habendum sit aut secundi ordinis intensi, aut tertij remissi. Excitantur verò ordinis est secundi incipientis, aut primi finientis. Itaque merico in

oleo decoctum digerit, dolorem sedat, somnum conciliat, & crudos, & incoctos humores concoquit. Fit enim ex eo oleum, cuius propinqua sit temperies pus mouentibus, & concoquentibus vocatis medicamentis: nisi quatenus paulò illis tum calidius, tum tenuiorum partium est, ac proinde digerendi facultate præditum. Vñ autem tertij ordinis tum excalfaciendum, tum deficiendum sit: & propterea vlcibus nimis humidis, mollibusque prodest, potissimum, lis, quæ in pudendis consistunt. At quæ in præputio sunt inueterata, ea probè cicatrice includit. Cæterum viride humidius est, & minus calidum: itaque magis quàm sicum concoquit, & somnum conciliat, sed minus digerit. Idcirco mihi videntur veteres in conuiuiis vñ esse coronis ex eo concinnatis. Planta, quæ Græcis *Nomina.* *Anethon*, Latinis item Anethum appellatur: Mauritanis, Xebet, Iebet, siue Sebet; Italis, Anetho; Germanis, Dylen, & Hochkraut; Hispanis, Eneldo; Gallis, Anet.

## CYMINVM SATIYVM.



## CYMINVM SATIYVM.

## CAPVT LIN.

CYMINVM satium origratum est, sed multò magis Aethiopicum, quod Hippocrates regium appellauit. Secundum locum tenet Aegyptium. reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisque aliis tractibus. Excalfacit, adstringit, exccat, ad tormina, inflationesque conuenit, coctum, & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in vino. testium collectionibus auxiliatur, inpositum cum vna passa, aut lolij farina, ceratove: mensium abundantiam

## CYMINVM SYL. ALTERVM.



## CYMINVM SYLVESTRE.

## CAPVT LX.

SYLVESTRE Cuminum, plurimum, efficaciusque in Lycia, & Galatia Asia, atque Carthagine Hispaniæ gignitur: frutice paruo, dodrantali caule, ac tenui: quaternis, aut quinis foliis, tenuibus, veluti serratis, & gingidij diuisara. In cacumine capitula quina, aut fena habet, mollia, rotunda: in quibus est semen acerosum, gustu satiuo acriore, nascitur in collibus. Bibitur semen

ex aqua

ex aqua, aduersus tormina, inflationesque: item contra venenatas bestias ex vino. Singultus ex aceto sedat: stomacho vtile, quem humor vexat. Sugillata tollit, si manducatum cum melle, & vna passa illinatur: testium inflammationibus, adiectis eisdem, illitum medetur. Est & aliud syluestris Cumini genus, satiuo non dissimile, quod à singulis floribus elata promit cornicula, in quibus semen est melanthio simile. Quod potum omnium serpentium moribus præsidio est. Calculosis, & iis, qui vrinæ stillicidio vexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur. sed apij semen feruefactum postea bibendum est.

Cumini cō  
sileratio.

SATI V M Cuminum omnibus notum est. Sed an syluestre, idque præsertim, quod primo generi à Dioscoride assignatur, in Italia proueniat, ego quidem affirmare non ausim: quod nec illud viderim, aut repperim vnquam, neque præterea ab aliis repertum, vel ex Lycia, Galatia, & Hispania allatum audiverim. Quod verò secundum ascribitur generi, si in Italia gignitur, id equidem cum Ruellio, & Gesnero, viris doctissimis, eam plantam esse putauerim, quam Germani vulgò Ritterstorn, hoc est, Equitis calcar, & Consolidam regalem vocant. Quandoquidem planta hæc nascitur in segetibus. Caulem proferit simplicem, ramulis multis, tenuibus, longis, diuisis, syluestris nigellæ modo. Flores edit purpureos, nigrae violæ æmulos: ex altera quorum parte prodeunt cornicula sursum spectantia, quæ veterum calcaris formam exprimere videntur: unde & illi nomen à Germanis inditum. Semen fert melanthio simile, in parvis corniculis conclusum. Vt ex hac descriptione existimem, vix aliam reperiri posse plantam, quæ magis, quam hæc, postremum Cumini genus referat. Ceterum Monachum illi reuerendi, qui in Meisum scripsere, flauo coloris Melanthium, quod officinæ Nigellam citrinam vocant, primum syluestris Cumini genus esse contendunt. Sed is, mea quidem sententia, in magno & aperto errore versatur. Nam, ut vnusquisque, sanæ mentis per se cognoscere potest, Nigella citrina sic sepius vocari, nil aliud vnquam fuerit, quam flauo coloris Melanthium: cum omnibus palam sit, non in alio Nigellam hanc, & Melanthium inter se specte differre, quam in seminis colore: cætera namque in forma, magnitudine, sapore, ac omni denique facultate illis maxime consentiunt. Sed quid multa? nonne hoc idem in papaueri semine quotidie comperimus? in quibus tamen variis seminis color non prohibet, quin omnia sine papauera. Id quod etiam perspicuum est, in hyoscyamo, lactuca, & aliis plu-

Monacho  
râ error.

ribus plantis: quarum semina etsi alba & nigra inueniantur, non tamen aliud ab illis plantæ genus constituunt. Hinc fit, ut in huiusce syluestris Cumini historia patres illi, & qui eos sequuntur, planè hallucinari deprehendantur. Quippe primi generis syluestris Cumini semen in capitulis mollibus, ac rotundis acerosum gignitur, fortasse (ut opinor) vulgaris pimpinellæ modo, non autem in capitulis melanthij instar, durum, solidum, fractuque contumax, quod in pimpinella vulgò vocata non visitur. Satiuū foliis fere feniculū repræsentat: vnico exit caule, pluribus adnatis ramusculis: floret in umbella, veluti feniculum, in qua copiosum profert semen: radix ei albicans est, summo cespite repens. Tractu gaudet calido, & putrescibili: quāobrem frequentissimum in maritimis nascitur. Cymini vires scriptas reliquit Galenus li. v. 11. simp. med. sic inquires. Cymini semine potissimum vitur, quemadmodum anisi, ligustici, cari, & petroselinii. Est autem & facultatis exaltantem, sicut illorum vnumquodque, tum vrinam mouentis, & fluxum discentis: ex tertio ordine exaltantium. *Κύμινον* quod Græcis, Cyminum & Cuminum satiuum Latinis dicitur: Italis, Cumino domestico: Arabibus, Canum, seu Kemum: Germanis, Kimmel: Hispanis, Comino: Gallis, Cumin. Quod verò Græci *κύμινον άγριον*, Latini Cuminum syluestre nominant: Itali, Cimino saluatico.

Cumini  
vires ex  
Galen.

Nomina.

AMMI.

CAP. LXI.



AMMI Aethiopicum cuminū appellant. Plerique hoc naturæ diuersum esse ab illo existimant. Vulgò notum est, semen exile, multò minus cumino, origanum resipiens. Eligendum est purū, minimè fursu-  
rosū. Vis ei exaltatoria, feruens, & exiccans. Facit ad tormina, vrinæ difficultatem, serpentium ictus, cum vino potum: menstrua ciet. Miscetur derodontibus cantharidum medicamentis, quæ eccloria vocant, ut inde exortis vrinæ difficultatibus resistat. Sugillata cum melle tollit. Colorem potu, aut illitu mutat in pallorem. Suffitum cum vna passa, aut resina, vulvas purgat.

O VAN.

*Amnios  
considera  
v.*

QUANQUAM varia, ac diuersa semina viderim, quæ legitimam Ammi mentuntur, nullum tamen ex his hæcenus mihi sese obculit, quod animi ad credendum alliceret, verum Ammi ex Alexandria Aegypti ad nos deferri. Quod Amicos nomine in officinis passim habetur, cum probatissimum, Plinio teste, cumino sit candidius, id nigricat, adeoque vulgaris petroselinii semen simulatur, ut visu ab eo dignosci minimè possit, sed in hoc gustum cõsulare oportet. Nam cum haud leuiter sit acre, facultatis discrimen gustu faciliè deprehenditur. Præterea cum hoc nullum origani saporem gustui repræsentet, quem tamen referre verum Ammi Dioscorides est auctor, adhuc clarius fit, id non esse legitimum. Veruntamen cõtrarium sensisse videtur Ruellius: quippe qui minus fortasse accurate ea examinauerit, quæ de Ammi, Hippocratis testimonio, scriptis tradidit Plinius, et alioqui familiarissimum, lib. xx. cap. xv. cum inquit. Est Cumino simillimum quod Græci vocant Ammi. Quidam verò Aethiopicum Cuminum id esse existimat. Hippocrates regium appellat, videlicet quia efficacius in Aegypto iudicauit. Plurique alterius naturæ in totum putant, quoniâ fit exilius, & candidius. Similis autem & huic vultus: nam & panibus Alexandrinis subigitur, & cum alimentis interponitur. hæc Plinius. Ceterum non equidem negauerim, Ammi in Italia nasci, etsi in officinis hæcenus verum non reperitur. Siquidem Aloisius Anguillarius Romanus in herbarum cognitione diu versatus, ex Parauo, vbi horti publici curam gerit, nuper ad me misit legitimum Ammi, nulla proflus reclamante nota. Verum eniuero huic sine illo non adscriptulari certum est, quo magno, ut arbitror, errore ducti Monachi illi, in Vltimum commentarios ediderunt, se fuisse assueuerant. nam præter rationes, error satis ex suis scriptis expoditur, utpote qui suum Ammi nullo origani sapore commendari fateantur. Herbe, quam vocant Ammi, semen, ut Galenus testatur reliquit libro v. i. simplicium medicamentorum, maximè est vile. Facultatis est exsiccatoris, & desiccatoris, tenuiusque partium: sed & gustu subamarum est, & acre. Et clarum est, quod & digerat, & vinam moueat. Fuerit autem in calfaciendo, desiccandoque ex ordine tertio intensio. Planta, quæ Græcè ἄμμι, Latine item Ammi vocatur: Arabicè, Nanocach, Anazuè, Nanachua, seu Nanachue: Italicè, Ammi, ut etiam Hispanicè Germanicè, Amey.

*Ruellius  
p. 10.*

*Monachi  
v. error.*

*Amnios  
Græc. ex  
Galeno.*

*Nomina.*

## CORIANDRVM. CAP. LXII.

CORIANDRVM, aut coriannu vulgaris est notitia: vim refrigeratorem habens. Quare illitum cum panis, aut polenta, ignibus sacris, & vlcibus,

quæ serpūt, medetur. Epinyctidas cum melle, vel vua passa, testium inflammationes: carbunculosque sanat: cum faba fresa, strumas, & tubercula discutit. Tineas interaneo rum expellit semen, cum passio modicè potum, & geniturâ adauget: largius tamen sumptu, mentem non sine periculo mouet. quare continuo, & copiosiore vsu abstinentum. Sucus cum cerussa, spumæ argenti, nec non aceto, & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.



cus cum cerussa, spumæ argenti, nec non aceto, & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

CORIANDRVM omnibus notissimum est. In cuius facultate indaganda Galenus productus est, ut longum sermonem faceret contra Dioscoridis sententiam libro v. i. simplicium medicamentorum, vbi ita scribit. Coriannon, siue Corion, aut vtrunque vocare lubet. Vetusculiores Græci Coriannon nominant: recentiores medici omnes Corion appellant, sicut & Dioscorides, refrigeratorem esse herbam dicentis, sed perperam. Siquidem ex contrariis facultatibus componitur, plurimum habens essentis amaræ, quam offensiuam esse tenuium partium, & terrenam. Nec parum etiam aqueæ humiditatis obinet, quæ tepentis est facultatis. Habet autem & adstrictiōnis pauxillum. Ex quibus omnibus variè quidem agit ea quæ scribit Dioscorides, & non tantum ex refrigeratione. Ceterum ego cuiusque particularum actionis causam enarrabo, tamen si propositum fuerit, mei vnus duntaxat hoc in libro sententiam expromere. Sed fortè nihil obstat: imò, si verum fatendum est, proderit non nihil, superiores methodos, quæ ad hunc modum in paucis medicamentis sunt dictæ, hic repetere. Primum ergo non Dioscorides tantum, sed & alij complures medicorum indeterminatè de morbis pronuntiant, sicut sine hac quoque tēpeltate non paucos inuenias medicos vel insignes, præter alia, hac in re maxime hallucinantes. Interdum enim atra, fluida, frigidaque reddita parte, quæ erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia poscente medicamenta, ceu antea, sed ea quæ infixum parti præter naturam

*Coriandrum  
ex Gal.*

50

naturam humorem euacuent, ij tamen refrigerare perseuerant. Aliquando autem ad digerentia quidem transeunt: ceterum erysipelas sanare dicunt. Et sanè scribunt, incipientibus etiam nati, & crescentibus erysipelatis, alia esse medicamenta, alia verò iam declinantibus, ac flacciscentibus. Sed ita res non habet. Neque enim erysipelas etiam vocari debet, posteaquam inflammatio eius, & seruo, ac biliosum illud abiecit: neque quæ facultate sunt frigida, neque quæ huiusmodi affectus sanant, remedium esse putandum est, sed velut si vel in initio protinus aut percussis, aut alia de causa quauis tumor in parte quapiam aut liuidus, aut niger extiterit, eum esse frigidum affectum existimabis, & quæ digerant excalescantque medicamenta postere. Ad eundem modum, si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio appellanda nomine: aut si displicet nominis mutatio, saltem sicut quidam alia scribunt principij, alia declinationis remedia, haud frigida esse autumantes declinationis remedia, concedendum sanè est, si cui ita placet, vt talis affectio etiam erysipelas vocetur: sed eam etiam calidam dicere, vbi iam refrigerata est, id verò neuticum concedendum. Iraque ne quod tunc ei auxilio est, refrigeratorium esse credamus, sicut Dioscorides Coriandrum, quod vt ipse inquit, cum pane aut posseta illitum, erysipelas curet. Nam quod exquisitum est erysipelas, quod vtique inflammatum est, & flauum, haud vnquam sanare poterit cum pane coriandrum, sed illud quod iam refrigeratum est. Proinde nos superioribus voluminibus, cum determinata, ac definita experientia, cuiusque medicamenti facultatem explorandum censuimus, quàm maxime fieri posset, simplicissimum eligi affectum consulimus. At plerique medici neque quòd vel plurimi morborum protinus ab initio compositi inuadant, norunt: neque quòd alius affectus sit erysipelas exactum, alius verò is, qui vocatur ab omnibus nobis vltate, vt à veteribus quoque, phlegmone: alij autem inter hos medij plurimi, partim, vt sic dicam, erysipelata phlegmonode, partim phlegmonæ erysipelatodes. Ac inuenias nonnunquam vbi neutrum vincat, sed ad vnumque paria sint. Quinetiam nonnunquam œdematosos esse erysipelas conspiciunt, sicut aliud febrilodes, vt compositorum morborum non paruum aceretur numerus. De quibus copiosius, cum alibi disseruimus, tum in libris de curandi ratione. Dicitur autem & nunc quòdam saltè eorū meminisse necesse est, quòd exactum erysipelas habet vnquam ab antè dicto cataplasmate curari possit. Voco autem exactum, cum à biliosa flexione pars impleta fuerit. Porò quòd longè à refrigeratione abest Coriandrum, vel ex ijs, quæ ipse scribit Dioscorides, discere licet. Nam strumas, inquit, cum lomento dissol-

uit. Quòd verò nullum refrigerantiū medicamentorum idoneum sit dissoluēdis strumis, vel ipsum Dioscoridem non dubitaturū arbitror: quippe qui sexcenta scripserit medicamentā strumas sanare potentia, quæ omnia tum temperie calida, tum actionibus digerentia esse confessus est. Hæc Galenus à Dioscoride in Coriandri facultate differtens. Porò verò ac in re Galeno maxime refragatur Auicenna, qui in ipsum aperit inuehitur lib. 11. cap. cxi. sic inquit. Scripsit Galenus Coriandrum esse compositum ex diuersis facultatibus, est terrea & faculta, culas in eo ceteris excellat, simul cum aqua ex aqua quadam tepida, & adstrictoria pauca. Verum, vt ego conicio, aqueitas, quæ in ipso reperitur, absque dubio frigida, non quidem tepida existit: nisi ei forsā admixteatur aliquid excalescentis substantiæ, quæ sui tenuitate velociter in aurā euaneat. Quapropter dixit Humaym, remouet Galenus frigiditatem à Coriandro, & Dioscoridi repugnat. At ego quidem aliter sentio, cum frigiditas eius substantiæ meminerint Archigenes, Rufus, & aliorum posteriorū nonnulli. Frigidum igitur est Coriandrum natura in fine primi, & vique ad principium secundū, & sicum in secundo. quāquam, sententia mea, & sicum est, & ad caliditatem aliquo modo vergit. Sed Galenus ipse sentit, Coriandrum esse ex omni parte calidum. Id quod fortasse euenisse putandum ex ea caliditatis particula, quæ dum bibitur, aut comeditur, ab ipso disperditur. Aliter nec necessariū foret, si homines sua frigiditate interficeret, vt in multa exhiberetur quantitate. Illud præterea subdidit Galenus, si Coriandrum strumas dissoluit, quoniam igitur passio frigidam erit? Cui facile responderi potest, id agere Coriandrum sua quadam occulta facultate, ac format: aut quòd reperitur in eo aliqua tenuis facultas, quæ in profundum penetrare possit, frigida substantia exterius relicta. Sed cum bibitur caliditas illa resoluitur, quo fit, vt sola frigida remaneat, & in corporibus agat. Hæc Auicenna in Coriandro Galenū dicta refellens. Quæ est aliquid in se rationis, ac veritatis habere videatur, tamē cum omnibus compertum puerum, Galeno neminē adhuc parum exitisse, qui diligentiū stirpium tum naturas, tum facultates inuestigaueris partim saporis gustu, partim odoris olfactu, partim substantia, & coloribus, partim denique ex longa experientia profundissimæ philosophiæ cōiuncta, operepretū est eius potius acquiescere sententiæ, quàm reliquorum omnium. Veruntamen Brasauolus in hoc maluit fortasse cum Auicenna errare, quàm cum Galeno rectè sentire. Qui præterea cum nesciuerit, Coriandrum in Petruia passim in pratis, & campestribus sua sponte nasci, afferit in suo simplicij volumine, scitum tantum reperiri Coriandrum. Ceterum quod in hoc capite Dioscorides auctor sit, Coriandrum.

drum sumptum mentem nō sine periculo commovere, quōdque alij tum ex Græcis, tum ex Mauritanis memoria prodiderunt, eiusdem suc cum potum interimere, ideo factum est, ut multi, quorum ego sententiam ante hac securus sum, coriandri vsum proflus damnauerint. Sed id nunc certe mihi videtur iniuste factum, siquidem Coriandrum mentem non commouet, nisi largius & immoderate sumatur. Quid quæso mirum erit de coriandro copiosius sumpro, si vinū etiā cuius tamē est vsus quotidianus, liberalius epotum, dolores, morbos graues, strangulatus, & mortem denique inferat? quod si moderate bibatur, præter alias utilitates, quas humano corpori præbet, ventriculum roborat, concoctiones adiuuat, excrementosa pellit, cor exhilarat, intellectum acuit, spiritus claros reddit & viuificat. Quare non equidem video, quid obstat, quō minus simili ratione credamus, tantum abesse, ut Coriandri semē nocet, ut etiam maxime proficit, si tamen parcē & modicē sumatur. Quippe ab eius vsu moderato non abhor-

ruisse Galenum puto: nam libro *viii. capite* *iiii.* de compositione medicamentorum secundum locos ex Archigene refert, ructu acido affectis coriandrum cochlearij mensura exhibendum esse. Galeno autem apertissime ad stipulatur ē recentioribus Græcis Symeon Sethi, vtpote qui in coriandri mentione scribat, id stomacho bonum esse, & eundem corroborare cibum in ventriculo retinere, donec probe concoquatur. Quæ auctorem hunc de temperato coriandri vsu tradidisse, nulli dubium est. Ex his igitur facile colligamus licet, quod non sit admittenda, sed potius expianda illorum recentiorum opinio, qui coriandri vsum omnino fugiendum esse censent. nos enim iam non omnem eius vsum, sed immoderatum tantum, ut nocuum, vitandum esse existimamus. Id Græcis *κίαν*, & *νεγιαν* appellatur: Latinis, Coriandrum: Mauritanis, Rusbor, Rasbera, Kuzbara, seu Kuzibara: Italis, Coriandro: Germanis, Coriander, & Coleander: Hispanis, Culantro, & Ciliandro, Gallis, Coriandre.

*Herminia.*

HIERACIUM MAIUS.



HIERACIUM. CAP. LXIII.

HIERACIUM magnum cantem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia ex internallis rariuscule diuisa, similia soncho per ambitum: luteos flores, in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modicē substringendi: vnde illitum, stomacho æstuanti, inflammationibusque prodest, Succus erosionem stomachi forbitione mitigat. Herba cum radice illita, vibratis à scorpione ictibus auxiliatur. Hieracium paruum, folia ex internallis habet, diuisa in ambitu: cauliculos te-

HIERACIUM MINUS.



neros, virentes: in quibus lutei flores orbem circinantes, emicant. Vini suam ad eadem, ad quæ superior impendit.

HIERACIUM tam maius, quàm minus frequentissimum vbiq; in Italia nascitur, soncho non admodum dissimile. Horum autem non reperio Galenum mentionem fecisse, nec etiam Paulum, in libris de simplicium medicamentorum facultatibus. Meminit tamen eorum Plinius libro *xx. capite. v. i.* inter lactucarum agrestium genera, sic inquit. Sunt, qui herbam Hieracium vocent, quoniam accipieres scalpendo eam, succoq; oculos tingendo, obsecuritatem cernere, discunt. Succus omnibus caudibus, viribus quoque papaueri similis. Carpitur per menses inciso caule. Cōditur in scitili nouo ad multa præclarus. Sanat omnia oculorū vitia cum

*Hieracij  
quantissimum vbiq; in Italia nascitur, soncho  
consideratio. 25  
res ex Pl.*

cum lacte mulierum. Arcet nubesulas, cicatrices, aduersionesque omnes, præcipuè caligines. Imponitur etiam oculis cum lana contra epiphoras. Idem succus aluum purgat, in posca potus ad duos obolos. Serpentinum ictibus medetur in vino potus. Et folia tosta, thyrsiq; triti ex aceto bibuntur. Vulneri illinuntur maximè contra scorpionis ictus. Verum cõtra phalangia commisso vino ex aceto. Aliis quoque venenis resiliant, exceptis quæ strangulando necant, aut his quæ vesicæ nocent, item plimythio excepto. Imponuntur & ventri ex melle, atque aceto ad detrahenda vitia alui. Vrinæ difficultates succus emendat. Crateuas cum & hydropicis obolis duobus in aceto, & cyatho vini dare iubet. Peculiares earum vires partim iam dictæ sunt, somnum faciendi, veneremque inhibendi, æstum refrigerandi, stomachum purgandi, sanguinem augendi. Nunc non pauca restant, quoniam inflationes discutiant, ructus lenes faciant, concoctiones adiuuant: cruditatem ipsæ nequaquam faciunt. Nec vlla res in cibis auiditatem incitat, inhibetque: eadem in causa alterutrinque modus est. Sic & aluum copiosiores soluant, modicæ sistant, lentitiam pitui-

tæ digerunt, atque, vt aliqui tradiderunt, sensus purgant. Stomachi dissoluti vtilissimè adiuuantur, in eo vsu, & oxypori obolis asperitatem addito dulci ad intinctum aceti temperantes. Si crassior pituita sit, stillite, aut vino absinthite: si & tussis sentiat, hyssopite admisto. Dantur celiaciis cum irubro erratico, & ad duritiam præcordiorum. Dantur & melancholicis candidæ copiosiores, & ad vesicæ vitia. Praxagoras & dysentericis dedit. Ambustus quoque profunt recentibus, prius quam pullulæ fiant cum sale illite. Vlcera etiam, quæ serpunt, coëscunt, initio cum aphronitro. mox in vino tritæ igni sacro illinuntur. Conuulsis, & luxata caulibus tritis, cum polenta ex aqua frigida leniunt: eruptiones papularum ex vino, & polenta. In cholera quoque coctas patellis dederunt: ad quod vtilissimæ, quàm maximè caule, sed amaræ. Quidam lacte indadunt. Deferuefacti ij caules & stomacho vtilissimi traduntur. Has omnes Plinius tam Hieracis, quàm sylvestribus Lactucis vires contribuit. Quod Græci *λεγέουσιν*. Latini similiter Hieracium vocant: Itali, Hieracio: Galli Herbe d'Esperuier, vel, Cicorée iauue.

Nomina

APIVM HORTENSE.



APIVM.

CAP. LXIII.

HORTENSIS Apij herba ad eadem, ad quæ coriandrum conuenit. Inflammationibus oculorum cum pane, aut polenta illinitur: æstuantem stomachum mulcet: mammarum duritiam ex lacte concreto cõtractam, reprimat. Vrinam ciet, siue crudum, siue coctum edatur. Decoctum eius, radicisque potum, venenorum noxæ resistit, cum vo-

APIVM PALVSTR.



mitiones excitat: aluum cohibet. Semen vehementius vrinam pellit: contra serpentium venena, aut epotam argenti spumam auxiliatur: inflationes discutit. Admiscetur medicamentis, quæ dolorum leuamenta præstant, theriacis quoque, ac tussis remediis. Eleoselinum in humidis nascitur, satiuo grandius, & ad eadem efficax. Orcoselinum caule est dodrantem alto, ab radice tenui exeunte: per cuius ambitum rami, & capitula cicutæ, multò tamen tenuiora

nuiora



HIPPOSELIVM.



nuiora: semine  
cumini oblon-  
go, acri, & odo-  
rato, tenui. Na-  
scitur in petro-  
sis, & monti-  
bus. Vrinam  
ciet, semine, ac  
radice in vino  
potis: menses  
trahit. antido-  
tis, nec non me-  
dicamentis vri-  
nam cientibus,  
& exsalfacto-  
riis, inseritur. Nec hallucinari nos o-  
portet, existimantes oreoselinum esse,  
quod in saxis provenit: aliud enim est  
petroselinum. Petroselinum in Mace-  
donia provenit, in præruptis locis, se-  
mine ammij, odoratiore, sapore acri,  
aroma olente. Vrinā cit, ac menstrua:  
contra stomachi, & coli inflationes, &  
termina prodest. Laterum, renum, &  
vesicæ doloribus, in potu subuenit.  
Admiscetur antidotis vrinā cientibus.  
Hipposelinum Latini olusatrū appel-  
lant, aliqui smyrnion, quanvis aliud  
sit, quod propriè smyrnion dicitur, vt  
paulò post referemus. Est autem ma-  
ius, & satius apio candidius: caule alto,  
cauo, molli, habente veluti lineas: foliis  
latioribus, in puniceum vergenti-  
bus: coma rorismarini, florum plena:  
dependentibus in cacumine corym-  
bis antequam desforescat. Ea semine  
turget nigro, oblongo, acri, solido,  
aromatico. Radix dimittitur tenuis,  
odorata, candida, quæ os commendat.  
In ymbrosis, & palustribus enascitur.  
olerum generis, vt apium. Radix cruda,  
coctave estur. Folia cum caulibus,  
decocta, manduntur, & per se aut cum  
piscibus præparantur, crudæque mu-  
ria condiuntur. Vim hanc habet, vt  
peto semine ex multo vino menses  
ciet: argentes calfacit potu, aut illi-  
tu: vrinæ stillicidio auxiliatur. Radix  
eodém præstat effectus.

PUTANT dubio procul omnes ferè tra-  
tis nostræ medicis, iūq; præsertim, qui diu ver-  
sati sunt in simplicium medicamentorum in-  
quisitione, quicq; multum laboris ac studij im-  
penderunt, vt hanc medicinx partem penè  
abolitam restituerent, nil aliud apud antiquos  
fuisse Apium, quàm vulgare nostrum  
Petroselinum, hodie hortis omnibus frequen-  
tissimum. Quorum equidem sententiam nun-  
quam ausim improbare: cùm nostrum hoc no-  
tis omnibus sit præditum, quibus constare A-  
pium veteres tradidere. Plinius liquidum lib.  
x. x. capite x. i. naturalis historiæ ita scribit.  
Apio gratia vulgò est: namq; rami largis portio-  
nibus per iura inarant, & in condimentis pec-  
culiarem gratiam habent. Hoc etiānum confir-  
mare videtur Galenus lib. 1. de alimento-  
rum facultatibus, cùm inquit. Apium inter cæ-  
tera familiarissimum est, & ori, stomachoq;ue  
gratissimum. Quæ sanè omnia in vulgari no-  
stro Petroselino cernuntur: quippe quod nobis  
omnium olerum familiarissimum in cibo-  
rum condimentis perpetuò habeatur. Cæte-  
rum quanvis id varios nostrarū mensarum ci-  
bos frequentissimè commendat, scripsere tamē  
tum Chrysippus, tum etiam Dionysius (vt  
Plinius author est) Apium ad cibos nō admit-  
tendum, imò omnino nefas: nam id defuncto-  
rum epulis feralibus dictum. Ipsius quoq; vi-  
sus claritati inimicum. Caule femine veru-  
culos gignit. Ideoq; eos, qui ederint, sterilesce-  
re mares, foeminasq;. In puerperis verò ab eo  
cibo comitiales fieri, qui vbera hauriunt. Inno-  
centiorem tamen esse marem. Eaque causa est,  
ne inter nefastos fructus damnetur. hæc Plinius.  
Quare mirum non fuerit, si recentiores  
quoque Apio comitilibus interdixerunt.  
Cùm igitur his tum rationibus, tum auctori-  
tatibus, notis præterea suffragantibus, constet  
vulgare Petroselinum legicimum esse Apium,  
putandum quidem fuerit, quin potius affir-  
mandum, id quod officinis omnibus fuit Apij  
vicem explet, nil aliud esse, quàm Paludapiū,  
sive Apium palustre, Eleoselinum Dioscoridi  
vocatū. Quandoquidem hoc in humentibus,  
& palustribus locis nascitur. caule, & foliis sa-  
pius maioribus, rarioribusq;. Eaque propter  
Theophrastus libro 1. capite 1. de plan-  
tarum historia, de eo disserit his verbis. Palu-  
dapium, quod apud aquæ ductus, & in palu-  
dibus provenit, folio raro, nec hirsuto consi-  
stit, sed simile quodammodo Apio est, odore,  
sapore, figuræ. Hinc itaque fit, vt Ruellio  
minimè adspiciendum censeam, qui plantam  
nobis Italæ Macerone vulgò appellatam, Palu-  
dapium esse putat. Quippe (vt paulò post, ut-  
que etiam in proxima smyrnion commen-  
tatione dicitur) non parva sanè inter vocatum  
Maceronem, Eleoselinum, & Hipposelinum  
intercedit differentia. Apij porò in montibus  
nascentis, quod ideo Græcis Oreoselinum di-  
citur, nulla à Dioscoride redditur foliorum  
deline

Apj hor-  
rentis con-  
sideratio.Eleoselini  
considera-  
tio.Ruellij a-  
pina, non  
accepta.Oreoselini  
considera-  
tio.

delineatio, nisi in eo scriptura fuerit deprauata, ut se-mè suspicor. Verùm Theophrastus, & Plinius Oroscelinum descriperunt foliis cicute, radice tenui, & semine vnus, alter verò caule anethi, minutiore tamen. Vnde factum est, ut nonnulli crediderint Theophrastum hoc in loco deprauatum esse, & quod vbi in Græcis codicibus legitur, *ἡ δὲ ῥίζα ἔχει πύκνους ῥυτίδας*, id est, folia habet cicute similia, legendum sit, *ἡ δὲ ῥίζα ἔχει πύκνους ῥυτίδας* hoc est, capitula habet papaueri similia. In quam opinionem hos faciliè posuit adduxisse vulgata Græca Dioscoridis lectio, in qua nimirum capitulorum papaueris, non autem foliorum cicute mentio est. Veruntamen ego potius (ut modò dixi) Dioscoridis lectionem vitiatam putauerim, quàm Theophrasti, licet contrà senserit Hermolaus. Nam præterquam quòd Theophrasto subscribit Plinius, est Oribasij codex, in quo nō *πυκνὰ ῥυτίδα*, sed *πυκνὰ* legitur. Præterea ipse sæpenu-m-o vidi Apium in montibus nascentis, quòd à Theophrasti, & Plinij pictura nullis prorsus notis diffidet. Provenit enim foliis cicute, radice tenui, & semine in umbella anethi modoque omnia. Apij generi maxime adhibulantur. Illud insuper addiderim, quòd Apij longè magis proprium est foliis consurgere cicute modo per ambitum laciniatis, semine in umbella anethi instar, quàm capitulis papaueri similibus inclusio. Sed an legitimum Petroselinum Macedonicum vocatum, in Italia proveniat, non equidem asserere a-sum, etsi Monachi illi, qui in Mesuem scripserunt, se in Romanis quibusdam montibus illud adinuensè resseantur. quod tamen (si vera referunt) Romanum quidem, non Macedonicum appellandum fuerit. Quod verò Hippocelinum vocatur, nil certè aliud esse opinor, quàm quod nonnulli hodie Leuisticum nominant, grandius planè inter omnia apiorum genera, adeò vt meritò Hippocelinum dicatur. Id sane notis omnibus refert Hippocelinum: licet Brasauolus Ferrariensis herbam Maceroneum vulgò vocatam falsò Hippocelinum existimet, à peruersa fortasse Marcelli interpretatione deceptus, qui præter Dioscoridis sententiam, Hippocelinum radicem intus candidam, foris verò nigram reddidit, cùm tamen in Græcis Dioscoridis exemplaribus nulla nigredinis fiat mentio. Quo quidem argumento Maceroneum Hippocelinum non esse, satis superque comprobatur, præsertim cùm hæc coloris radicem opposita qualitate inter se discrepent. Huius Marcelli lapsus illud causam fuisse arbitror, quòd legerit apud Theophrastum, nasci Hippocelinum foliis paludapio proximis : caule magno, ac hirsuto : radice raphani modo crassa, sed nigra : nigroque etiam semine, magnitudine eruo ampliore. Qua fortasse autoritate fretus Marcellus, nigram Hippocelinum radicem iussit addidit in Dioscoride. Sed animaduertendum est Theophrastum eo loco non de-

scripsisse Dioscoridis Hippocelinum, cùm alterum ab altero pluribus differat notis, sed Smyrniun potius. Id quod ex eo conici potest, quòd Dioscorides, itemque Galenus asserant, nonnullos inueniri qui Hippocelinum à Smyrnio non separent. Quibus verbis nil mirum inter eos, qui ita sentiant. Theophrastum quoque ab illis comperchensum fuisse. Cæterum hac in re etiam Fuchsius, cuius tamen pace dixerim, aptè hallucinatur : quippe qui legitimum Hippocelinum Leuisticum vulgò vocatum, smyrnij loco in suis clarissimis de stirpium historia commentariis depinxerit. Idem præterea errasseprehenditur in libro de compositione medicamentorum, quem nuper auctum edidit. Nam ecti primò rectè scribat, illud quod officinæ hodie pro apio horrenti vntur, non esse nisi eleoselinum, id est apium palustre, tamen postea perperam (meo quidem iudicio) scriptis tradidit, petroselinum semen seplasis apij semen vocari, atque in eius locum vsurpari. Etenim eleoselinum semine, non petroselinum, quod nobis hæctenus desiderari existimo, apij seminis loco vtuntur omnes ferè pharmacopœi, idq; etiam apij semen nuncupant. Apij meminit Galenus libro *viii*. simplicium medicamen. sic inquires. Apium vsque adeò calidum est, vt & vrinas, & menses cieat. Flatus quoque discutit, & magis semen, quàm herba ipsa. Sed & oreoselinum, & hippocelinum similis vis est : verum hippocelinum imbecillius est, oreoselinum valentius. Eodem quoque libro superius tamen, de Petroselinò differuit his verbis. Petroselinum semen maxime vsui est, cùm tota etiam herba vna cum radice similes, sed imbecilliores, facultatem fortiaur. Flatus quoque discutit. Fuerit itaque & ipsum tertij ordinis tum exaltescentium, tum desiccantium. Sed de Petroselinò Macedonico fassus differens libro primo de antidotis, ita scribit. Quod ad Petroselinum attinet, laudatissimum Macedonicum est omnibus cognitum, quod estreaticum etiam quidam appellant, à loco in quo nascitur, nomen imponentes. Verum exiguum est prorsus quod ibi prouenit, cùm & præruptus, & angustus is locus sit. Estreaticum itaque Macedonicum hoc, quod à Macedonibus in omnes gentes affertur, paucū & ipsum in Macedonum terra gignitur. Sed idè in petroselinò Macedonico accidit, quod in Attico melle, & vino Salerno contingit. Mercatores siquidem in omnem ferme orbis terram, vt mel Atticum, vinum Falernum, sic petroselinum Macedonicum aduehant, cùm tamen in Macedonia petroselinum tantum non oriatur, quantum gentibus omnibus satis esse queat. Verum in Epiro petroselinum plurimum gignitur, quemadmodum in Cycladibus insulis melatq; vt mel ex insulis Athenas

Petroselinum.

Hippocelinum confectio.

Marcelli, Es Brasauolus.

Fuchsius.

Apj generum virtus ex Gal.

affertur, sic petroselinum ex Epiro prius in Macedonia comportatur, plurimumq; & prope totum in Thessalonica inde verò tanquam Macedonicum exportatur. Idem in vino Falerno contingit. nam cum in exiguo quodam Italice agro Falernam proveniat, complura alia vina in Falerni specie à vini magistris concinnantur, quæ perinde atque Falernina, in omnes prouincias Romano imperio subiectas importantur.

Tibi verò si petroselinum Efstreaticum quandoque deerit, ne peiorem existimes theriacam futuram, si alium *inproposueris*. Non enim si morbis venenis, si venenatorum moribus aliud ab Efstreatico petroselinum minus congruit, propterea reliquis etiam morbis, ut torminibus, ventriculo debili, aquæ inter cutem, & id genus aliis, segntus opiculatur, quos in primis sanare theriaca non promittit. Ad hæc Efstreaticum petroselinū theriacam planè amariorem facit, præsertim cum recens adhuc imponitur. differt enim ab aliis petroselinis, quòd ut acer-

Nominat.

rumum, ita quoq; amarissimū est. *Σμύρνον* nuncupat id Græci, quod Latini Apium hortense, nominant: Mauritan, Charbis, Carbis, seu Chares: Itali, Apio domestico, & Petrosello: Germani, Peterfilien, & Peterlin: Hispani, Perexil: Galli, Persil de iardin. Id verò *Δυσέριον* Græci dicunt, quod Latini, Apium palustre, & Paludapium: Mauritan, Afalis: Itali, Apio palustre: Germani, Eppsch, & Eppich, Hispani, Perexil dago, & Apio: Galli, Persil de leau. Quod autem *Ἰπποσέλιον* Græci, Apium montanum Latini vocant: Mauritan, Acraselinum: Itali, Apio montano: Hispani, perexil montesino: Galli, Persil des montagnes. *Πετροσέλιον* deinde id Græcis dicitur, quod item Latinis Petroselinū, & Italis, Petroselino. Postremo *Ἰπποσέλιον* id Græcè vocatur, quod etiam Latinè Hipposelinum: Arabicè, Salis: Italicè, Hipposelinum: Germanicè, Liebstöckel: Gallicè, Ache, & Ache large.

#### SMYRNIUM. CAP. LXV.

SMYRNIUM, quod in Cilicia petroselinum vocant, plurimum in Amano monte gignitur. Canlem habet apij, & stolones multos: folia latoria, suppingula, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucunda, colore in luteum languescente: capitibus caulium orbicularis, ut anethi: semine brassicæ, rotundo, nigro, acri myrrhæ sapore, ita ut alterum alterius loco cedat. Radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. Cortex eius foris niger, intus viridis. aut subalbidus. Nasctur in sa-



xosis, & collibus, atque squallidis, & limitibus terrenis. Vis radices, herbæ, & seminis exsiccare. Folis muria maceratis ad obfonia vtuntur: alium sistunt. Râ dicem cõtra serpentium ictus bibere conuenit: tussis, & orthopnoeas mit-

tigat: vrinæ difficultati medetur. Illita recentes tumores, collectiones, duritiâsque discutit: vulnera ad cicatricem perducit. partus abortu vitiat, si seruesacta subiiciatur. Semen lienis, renum, & vesicæ vitis prodest: menses, & secundas pellit. commodè datur ischiadicis in vino: inflationes stomachi lenit: sudores dietic, & ructus. Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

SI SMYRNI singulæ notæ, quæ illi à Dioscoride tribuuntur rectè, diligenterq; expendantur, facillè quidem perspicitur poterit, Smyrniū ei herbæ simillimum esse, quæ à nostris in Hetruria vulgò vocatur Macerone. Siquidem hanc nasci clarum est caule apij, stolonibus multis referto: foliis latoribus, suppingibus, robustis, ad terram versis, odore medicato, cum quadam acrimonia iucundis, colore in luteum languescente. Præterea in caulium cacuminibus umbellâ gerit anethi modò: semine brassicæ maiore, oblongo tamen, nigro, acri, odore myrrham referente. Radice deniq; nititur odorata acri, succosa, ac molli, quæ exteriore cortice nigricat, interiore verò parte ex albo virescit. Quas quidem notas ferè omnes constat Smyrniō Dioscoridem reddidisse. Verum quispian, cui fortè hæc nostra sententia minus arideat, obtrudet nobis semen, ut quod Macerone nostro non inest rotundum, brassicæ modo. Hæc illud responsum volumus, quòd cum eæteræ in vniuersum notæ illi respondeant, facillè in seminis delineatione mendum subsesse potest. Vel quòd nō in rotunditate, sed in alio vni cū altero semine intercedat similitudo. Porro

Smyrni  
considera  
tio.

quamvis memoriz nō prodiderit Dioscorides, quod Smyrniū feratur in hortis, in quibus ho-  
die nostrum illud feritur, sed quod sponte in  
Amoan Ciliciæ monte gignatur, tum etiam in  
collibus, incultis, ac saxosis locis, Plinij tamen  
ætate passim in hortis serebatur. Id quod ipse  
Plinius manifestè demonstrat lib. x. l. i. cap. vi. l-  
timo, vbi Smyrniū inter hortensia referens,  
inquit. Et Smyrniū olus iisdem locis feritur,  
myrrhamq; radice respicit. Idem quoq; testatur  
Galenus, quod ipsum inter olera conumeret li-  
bro 11. de aliment. facultatibus, & de eo scribat  
in hunc modum. Smyrniū non est insuave.  
Ideoq; Romæ plurimum venit. Multo autem  
acrius est, & calidius, quā apium: quā & odo-  
rati quidpiam habet. Quapropter efficacius vri-  
nam ciet, quā apium, hippofelinū, & sison:  
& mulieribus menses mouet. Veris tempore  
caulem producit, qui crudus edendo est haud  
aliter quā folia, quæ sola per hyemem ine-  
rant plantæ, nondum caulem habenti, sicut ne-  
que tum apium habet. Postea verò caule acce-  
dente, tota planta iucundior redditur, siue  
quis crudam ipsam, siue coctam mandat, siue  
ex oleo, & garo, siue vinum, siue acetum ve-  
lit adiacere. Nonnulli cū aceto, & garo tantum  
edunt, veluti apium: alij verò paululum olei li-  
quidū addiunt, hæc Galenus. Ex cuius sanè verbis li-  
quidū apparet, Smyrniū veteribus etiam inter  
olera fuisse receptum. Galeno nimirum adhip-  
lantur ea, quæ de Smyrniō mihi retulerunt Si-  
culi. nanque ij affirmant, plantam Macerone-  
m appellatā passim colī in suis hortis, atque eam  
veris tempore (vt etiam Galenus perhibet) caule-  
m tenerimū emittere: qui non solum edendo  
sit, sed gratiam quoq; ineat cum ore, præsertim  
si cum sale & pipere cinaræ modo comedatur.  
His itaque fortasse, vel etiam validioribus ra-  
tionibus adductus Manardus Ferrariensis, vir  
quidem ingenio, & doctrina celebris, Smyr-  
niū esse nostrum dictum Macerone m constan-  
ter asseruit. Quo fit, vt minus dubitem Ruellij  
opinione improbandam esse, quod suspicetur  
(vt proxima commentatione diximus) Macero-  
nem esse Paludapium. Smyrniū verò eam esse  
stirpem certò putet, quā in Galliis vocant vul-  
gò Leueccia. Smyrniū tum historiam, tum fa-  
cultates descripsit Galenus lib. v. l. i. l. i. simpli-  
cium medicamentorum, sic inquit. Smyrniū  
quidam Hippofelinū agreste cognominant. Et  
ex eodem genere & ipsum cum apio est, & pe-  
trofelino: fueritq; apio quidem validius, pe-  
trofelino autem imbecillius. Menses itaque, &  
vrinas mouet, calidum, siccumq; tertio ordi-  
ne. Cilices petrofelinum nominant, quod in  
Amano monte nascitur. Est quidem & ipsum  
Smyrniū, minus verò petrofelino, & Smyr-  
nio acre. Proinde & vlcibus imponi potest,  
quia videlicet sine molestia desiccet. Sed & di-  
gerere, quæ indurata sunt, valet. Reliqua vis  
eius apio, & petrofelino similis est. Quocirca  
& semine eius vtitur ad menses, vrinas, &

## IMPERATORIA.



asthmata, siue an-  
helationes. hæste-  
nus Calenus. Cæ-  
terum non desunt  
ex recentioribus,  
qui hallucinantes  
contendant, plan-  
tam Imperatoriā  
vulgò vocatam le-  
gitimū esse Smyr-  
niū, argumen-  
to quod eius radice  
exterius nigre-  
scant, interius verò  
virescant. Ve-  
rim ij ex eo aper-  
te decepti prehen-  
duntur, quod non  
animaduertent  
int, an hæ plan-  
tæ cæteris inter se  
notis conueniant.

Quorum-  
dam hal-  
lucinatio.

Sed posteaquā de Imperatoria herba incidit  
mentio, ob sui nominis maiestatem, viridū-  
que præstantiam, prætereundum sanè non du-  
ximus, quin hic eius tum historiam, tum fa-  
cultates edisseramus. Præstantissima igitur I M-  
P E R A T O R I A in Ananiensibus montibus vsq; Imperatori-  
pra Tridentum frequentissima nascitur, folijs  
sphondyli minoribus, solo accubantibus, ro-  
bustis, hirsutis, ac asperis: caule bicubitali,  
purpurascēte, rotundo, hirsutoque: in cu-  
ius cacumine umbella floribus candidis orna-  
tur: è quibus postea semen prodit fessile mo-  
do acutum, pariterque odoratum. Radix in-  
est ei non longa, mediocriter crassa, rugo-  
sa, dura, lignosaque, quæ foris nigra est, in-  
tus verò subuiridis. Ea gustu admodum acris  
deprehenditur, ac mordax, subamara, & odo-  
rata. Ex quo non temerè aliqui coniicere po-  
tēst, Imperatoriæ radicem excalcācere tertio  
excessu completo, vel quarto inchoante: sic-  
care verò secundo. Discutit hæc mirificum  
ventriculi, tum intestinorum, tum etiam vte-  
ri status. Quapropter colicis cruciatibus ac  
ventriculī torminibus maximè vilis est. Cit  
item menses, atque vrinam. Fouentur eius  
decocto vtiliter in dolore dentes, præsertim  
si in vino austero radix decoquatur. Eadem  
ex vino pota vteri stragulationibus prodest.  
conceptum adiuuat, quem frigiditas inter-  
cipit: concoctionem roborat. Commansa est  
veluti præstantissimus apoplegmatisimus, vt  
quæ efficaciter cerebrī pituitam expurget. In  
puluerem contrita, vinoq; subinde pota, fri-  
gidis occurrit morbis. Quamobrem resolutis,  
comitialibus, conuulsis, auxilio est. Aiant non-  
nulli quartana eos sanari, qui pulueris cochlea-  
rij dimidiū hora vna ante accessionem, ex mero  
biberint. Oris halitum cōmendat, & omnes ro-  
borat sensus. Epidemiis morbis, venenis ferè  
omnibus, ac venenosorum animalium tum  
morfi

Imperatori-  
ria planta  
descriptio,  
et viret.

Ruellij o-  
pinio impro-  
banda.

Smyrniū  
vires ex  
Galenio.

morsibus, tum ictibus opem præstat. Asthmaticos, seu anhelosos iuuat, obstructions aperit, aqua intercute laborantes sanat, itemq; liene affectos. In summa exalcat vniuersas corporis partes, quas frigus occupat. Vt hinc palam fiat, herbam hanc non inmerito sibi Imperatoria nomen adiuuasse, cum tot tantisq; viribus prædita sit. *Scopius* id Græci, quod Latini item Smyrniun, & Olusatrum, nominant Mauritanii, Senirion: Itali, Smirnio, & Macerone: Hispani, Apio Macedonico.

Nemina.

## ELAPHOBOSCVM. CAP. LXVI.



ELAPHOBOSCVM fœniculaceus caulis est, aut rorimarino similis, geniculatus: foliis duâ digitorum latitudine, vt terebinthi, prælongis, aliquantum asperis, circâtrâctis. Adnata multa habet, ferentia umbellulas anethi similes, & semina eiusdem: florem subluteum: radice ternum digitorum longitudinis, & crassitudinis vnius, candida, dulci, esui apta. Caulis tener pro olerè manditur. Contra serpentium ictus, datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo ceruas serpentium morsibus resistere.

Elaphoboscvum  
scopii  
radice.

QUANQVAM aliqui profitentur, se Elaphoboscvum in Italia inuenisse, atq; etiam quibusdam in hortis ostendere, herba tamen, quâ pro eo demonstrâre, folia proferit incisuris multis diuisa, læuiasq;. Adde vt hinc perspicuè intelligi possit, eam à legitimo Elaphobosco plurimum dissidere, si Dioscoridi magis, quam Plinio fides est adhibenda. Plinius siquidem libro, & capite xxi. Elaphoboscvum foliis smyrnij, & semine corymbaceo depinxit his verbis. Elaphoboscvum ferulaceum est, geniculatum, digiti crassitudine: semine corymbis dependentibus, simili effigie, sed non amaris: foliis oblusteri. & hoc laudatum in cibis. hæc Plinius. In quibus verbis, quod ea planè à Dioscoride dissentiant, Marardus Ferrariensis Plinij codicem deprauatum esse existimat. Cæterum Ruellius tradit Elaphoboscvum legitimum paucis hodie cognosci, etsi frequens vique reperitur, illudque esse censet, quod vulgò officinis simul & herbariis Græcia dei

Ruellij  
pin. susp.  
ca.

nominatur, è qua sui nominis vnguentum conficiunt. Sed hanc Ruellij sententiam non admittendam, quin potius explodendam putauerim, si per Gratiam dei eam plantam intelligit, de qua nos superius differimus in hyssopi commentatione, & qua officinæ vntur. Quippe quod hæc caule, & foliis hyssopo sit persimilis, non autem fœniculo, ac terebintho. Quamobrem aut aliam in Gallia plantam esse eodem nomine appellatam, aut Ruellium omnino deceptum existimauerim. Ipse equidem herbam quandâ sæpius vidi, tum in Tridentino, tum in Goritensi agro, cuius etiam hic picturam attinus, quæ ita notis omnibus Elaphobosco respondet, vt non potuerit animus non inclinari ad credendum, hanc legitimum esse Elaphoboscvum. Paucis admodum Elaphobosci facultates perstrinxit Galenus lib. v. 1. simplicium medicamentorum, sic inquit. Elaphoboscvus facultatis est calidæ, & tenuium partium, ac proinde excoctior secundo maxime excessum ordine. Eius nomen Græcum est *ἑλαφόβος*: Latine similiter Elaphoboscvum, & Cerui ocellum: Italianè, Elaphobosco.

Elaphobosci  
facul.  
ex Gale.

Nemina.

## FœNICVLYM. CAP. LXVII.

FœNICVLYM, si herba edatur, aut semen cum ptisana bibatur, mammæ lacte replet. Comæ decoctum in renum doloribus subditum proficit, quippe quod vrinam excitet. Contra serpentium ictus in vino conuenienter bibitur: mensis ciet. In febribus nauſeam, & stomachi feruorem ex aqua frigida potum sedat. Contritæ radices, & cum melle illitæ, morsibus canum medentur. Succus caule, & foliis exprimitur, & in sole siccatus, in medicamenta adiicitur, quæ ad excitandam oculorum aciem commodè temperantur. Extrahitur succus ad eadem valens, etiam semine viridi, ramulisq;, & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia, quæ ad occidentem spectat, succum reddit gummi similem. Caulum medium, dum herba floret, rustici demetunt, igniq; admovent, quò facilius vi caloris exudans, gummi remittat: quod efficacius succo est, ad medicamentum oculorum.

## FœNICVLYM ERRATICVM.

## CAP. LXVIII.

EST & sylvestre fœniculum, magnum: fert autem semè cachryi simile.

E 3 Cuius

## FOENICULVM.



Cuius radix iucundè olet, potatque stranguaria medetur: menses imposta ciet. Ventrem sistit, radice, aut semine potot: contra serpentium morfus auxiliatur, calculos comminuit, regium morbum expurgat. Lactis abundantiam facit, decoctum foliorum haustum: foeminas à partu purgat. Traditur aliud hippomarathri genus, longo, exili, & angusto folio: semine coriandri, rotundo, acri, odorato. Excalcaciendi naturam habet, & viribus foeniculo respondet, sed ad omnia infirmius.

Foeniculi  
considera-  
tio.

FOENICVLVM tam erraticum, quam sativum omnibus in Hetruria notum est. Scribitur domesticum Februarie mense vere inuenire, locis apricis, & modicè saxosis. quippe quod non minus in ciborum condimentis gustui acuta quam dulcedine placeat, quam vile sit in medicamentis. Foeniculi meminit Plinius lib. x x. cap. x x i i i. sic inquit. Foeniculum nobilitare serpentes, gustatu senectà exuendo, oculorumq; aciem succo eius reficiendo. Vnde intellectum est, hominum quoque caliginè præcipue eo releuari. Colligitur hoc caule turgescente. In sole siccat, inungiturq; ex uelle. Vbiq; hoc est: laudatissimum tamen in Iberia è lacrymis fit, & ex semine: recenti. Fit etiam è radicibus prima germinatione incisis. Est & in hoc genere sylvestre, quod alij Hippomarathon, alij Myrsineum vocant, foliis maioribus, gustu acriore, procerius, brachiali crassitudine, radice candida. nascitur in calidis, sed saxosis. Diocles & aliud Hippomarathi genus tradit, longo, & angusto folio, semine coriandri. Hæc Plinius, qui ea ferè omnia à Dioscoride mutuatus esse videtur. Porro alterum sylvestris Foeniculi genus, cuius semen coriandri effigiem refert, à nemine hætenus, quod sciam, in Italia cognoscitur, & ostenditur. Foeniculum, vt memoris prodidit Galenus libro v i i. simplicium medicamentorum, tam valenter excalcacit, vt ex tertio ordine excalcaciendum censeri possit. Desiccatur non æquè, sed ipsum quispian in hoc pri-

Foeniculi  
Gires ex  
Galeno.

mi esse ordinis posuerit: proinde hac procreat, quod si admodum desiccaret, non sanè generaret. Suffusus eadem ratione auxiliatur. Vrinæ, mensesque ciet. Est & alterum Foeniculum sylvestre, quod præ magnitudine hippomarathri nuncupant, cuius radix ac semen amplius quàm domesticum, desiccandi vim obtinet, quocirca ventrem quoque eo nomine sistere videtur. Nec sanè manifesta illis inest adstrictio. Huius non radix modò, sed & multò magis semen cæchryi ad simile est: potestque & calculos frangere, & auriginosos sanare, mensesque mouere, & urinam excitare: non tamen hac congerere, sicut illud superius. Aliud est Hippomarathon, cuius semen rotundum est, & acre, simile semini coriandri, facultate quidem hippomarathro simile, sed debilius. Planta Græcis *μαραθρον*. Latinis Foeniculum appellatur: Arabibus, Raienigi: Italis, Finocchio: Germanis Fenchel: Hispanis, Hinoio, & Funcho: Gallis, Fenoil.

## DAUCVM. CAP. LXIX.

DAUCVM aliqui daucium vocant. Creticum foliis foeniculo simile, minoribus, & tenuioribus: caule dodrantali, umbella coriandri, flore albo: semine acri, candido, hirsuto, suauissimi odoris in mandendo. Radix digitali crassitudine, & dodrantis longitudine adulescit. In saxosis nascitur, & locis sole illustratis. Aliud eius genus, sylvestri apio simile, acre, odoratum, aroma olescentis, feruentis gustus. Probatissimum Creticum. Tertium assignatur genus foliis coriandri, floribus albis, capite, & semine anethi, muscario pastinacæ: semine oblongo, ceu cumini, acri. Omnium semè excalcacit. potum urinam, menses, & partus extrahit: torminibus liberat: veterem tussim mitigat, phalangiorum moribus potum in vino, auxiliatur: tumores illitu discutit. Seminis duntaxat in aliis generibus inualuit vsus: in Cretico etiam radice, quæ maximè contra venenatorum iniuriam in vino bibitur.

TAMETSÌ nonnulli inueniantur plantarum exploratores, qui Daucum ab erraticis pastinacæ nihil prorsus differre contendant, affirmantes, hoc idem sensisse Galenū, & post ipsum Paulum, ij tamen, quantum equidem sentio, manifestè falsi deprehenduntur. Nam etsi rectè dici possit, Daucum esse sylvestris pastinacæ genus, non ob id tamen illa, meo iudicio, fuerit, ynquam

Dauci cō-  
sideratio.

DAUCUM.

Daucum  
dam  
t.

vnquam syluestris  
pastinaca, cuius  
paulo superius me-  
nimit Dioscori-  
des. Quandoquid-  
em si vnam, &  
eamdem plantam  
esse Daucum, &  
agrestem pastina-  
cā credidisset Dio-  
scorides, de his fla-  
ne scorum nō dis-  
seruisset, neq; alte-  
rum ab altera pro-  
priis capitibus dis-  
iunxisset. Cete-  
rum cum non de-  
sine, quibus videat-  
ur Galenus inter

intas nullam facere differentiam, viden-  
t, an ita se res habeat. Mihi quidē inter-  
rimen fieri voluisse Galenum, illud ma-  
argumentum est, quod Dioscoridem se-  
& ipse varias vrisq; tribuerit vires, easq;  
locis descripsit. Dauci si quidem libro  
pastinacæ verò lib. v. i. i. mentionem fecit  
a simplicium censu. Hinc itaq; fit, vt aperte  
coniciam, Galenum inter illa discrimen nouis-  
se: atq; eos decipi, qui in hoc Marcellum, &  
Ruellum secuti, contrarium asserunt. Quorum  
præterea sententiam, ipsius Galeni testimonio,  
facile explodi posse putauerim, nec solum quē d  
diuersis capitibus vrisq; vires speciatim tra-  
ctauerit: sed quia libro v. i. simplicium medica-  
mentorum, Daucum non esse pastinacam claris-  
sime ostendit, cum inquit, Daucum, quem qui-  
dam staphylinum nominant, agrestis quidē do-  
mesticus minus est esui idoneus. In quibus sane  
verbis Galenus perspicue satis declarare videtur,  
Daucum non sibi, sed alii pastinacam agrestem  
appellari. Quamobrem cū Dioscoride non mo-  
do dixerim, sed etiam affirmauerim tria Dauci  
genera inueniri, quorū illud Italici frequentius  
est, quod syluestrem pastinacam æmulatur. Hoc  
enim in Senensi agro, præsertim in maritimis,  
frequentissimum nascitur. Creticum autem le-  
gitimum ex Creta tæcū afferri existimauerim.  
Porro Daucus, qui coriandri foliis prouenit, &  
semine cuminio simili, in quæ plurimis etiam  
Italici loci reperitur. Dauci vires tradidit Ga-  
lenus libro v. i. simplicium medicamentorum  
supra citato, vbi ita scribit. Daucus, quem qui-  
dam staphylinum nuncupant, agrestis quidem  
domesticus minus est esui idoneus, ceterum in  
omnibus vehementior. At domesticus contem-  
nibilis quidem, sed imbecillior. Acrem, & calefaci-  
entem facultatem obinet, ac prouide etiam ex-  
tenuandi. Certe radix præter iam comprehen-  
sū sicciosum quiddam obtinet, ac venereum.  
Semen autem domesticū quidem & ipsum quā-  
dam ad venereum stimulandi potentiam possi-

Dauci Ge-  
nera ex Ga-  
leno.

der. Agrestis verò planē statu caret, quod Ag-  
restes vocant: ac prouide vrinam, menslesq; ciet.  
Atque hæcenus de facultatibus dauci Galenus.  
Qui subinde de semine eiusdem scripsit, etiq;  
seorsum vires suas reddidit his verbis. Dauci  
herbæ semen exalfaciendi vehementer facul-  
tatem habet, vt inter prima efficax sit tum vri-  
næ mouendæ medicamen, tum mensibus pro-  
uocandis. Multum etiam digerere per halitum  
potest, foris impositum. Ipsa verò herba simi-  
lem quidem vim obtinet, tamen semine infir-  
miorem, nimirum ob aquæ humiditatis mis-  
turam. quanquam vtrique & ipsa calida sit tem-  
perie. Δαυκος ita Græcis vt etiam Daucus Lati-  
ni's appellatur: Mauritanis, Ducu, Gezar: seu  
Ciezar: Italici, Dauco: Germanis, Bernurtz:  
Hispanis, Dauco Cretico: Galici, Carotes sau-  
uages.

Nomen.

## DELPHINIUM. CAP. LXX.

DELPHINIUM surculos emittit à  
radice vna sesquipedales, aut maiores:  
à quibus folia exeunt parua, tenuia, di-  
uisa, prælonga, quæ delphinorum effi-  
giem præsentant: vnde tractum no-  
men est. Flos violæ albæ non dissimilis,  
purpureus: & semen in siliquis, milio  
proximum: quo non aliud vtilius bibi  
potest, ab scorpione percussis. Aiunt  
enim obiecta herba, scorpiones resolu-  
i, atque ignauos torpescere: semota verò  
ea, sese recolligere. Prouenit in asperis,  
& apricis. Alterum est delphinium, quod  
Romani buccinum vocant, superiori  
simile, sed foliis, & ramis longe graci-  
lius. Viribus eisdem pollet, sed non ita  
efficacibus.

QUANQVAM scribit Ruellius, herbam in  
Gallia nasci, cui rura nullum adhuc nomen in-  
posuerunt, quæ omnibus prorsus notis Delphi-  
nio respondet, in Italia tamen nemo hæcenus, quod  
sciam, legitimum ostendit. Ex quo tan-  
tum abest, vt putauerim vnquam, illud Ruellii  
verum ac legitimum fuisse Delphinium, vt  
etiam si in pierumque suspicatus. hoc Delphinii  
caput in Dioscoride spurium ac aseritum esse.  
Nec temere, vt arboris: nā suspicio inde ortū  
suum habuit, quod Delphinium nesciū, quā-  
tum equidem legerim, describat a Galeno,  
Oribasio, & Paulo: cum tamen horum alius  
historiam, alius vires plantarum ex Dioscori-  
de bona fide in suo quisque simplicium censu

Delphinij  
considera-  
tio.

varia  
vires  
probat

referat. Cæterum non defunt etiam qui velint, eam plantam Delphinium esse, quam Germani vulgò vocant Rittersporn, id est, Equitis calcar, herbariorum verò vulgus Còssolidam regalem: quam nos inter sylvestris Cumini genera superius retulimus. Verùm cum hæc vnum tantum emittat à radice caulem, non autem plures surculos, folia non ferat delphinorum effigie, nec flores albæ violæ æmulos, horum sententiam cur probem, non habeo. Fuchsius ætatis nostræ medicus præstanti eruditione & rerum peritiâ, antedictorum opinionem sequitur in libro de componendorum medicamentorum ratione, quem iam recens locupletatum excedit. Sed ipse quoque (si rectè sentio) vni cum illis in errore versatur, quandoquidem non solum (vt diximus) nulum, quod ego iuenerim, Delphinij mensinerit illi præstantissimi medicinæ auctores, quos nominavi, qui tamen simplicia ex Dioscoride transcribunt, & mutantur, sed neque etiam eius caput legitur in antiquissimo Dioscoridis codice Longobardis literis scripto, cuius sæpe fidem citat & probat Marcellus Virgilius, vt mihi licuit videre in eo, cuius copiam mihi fecit Viennæ clarissimus iuriconsultus Ioannes Albertus Vuidmanstadius Austriæ orientalis cancellarius.

Quod certè manifesto satis argumento esse potest, Delphinij historiam planè fabulosam esse, vel saltem Dioscoridi adscriptâ & illegitimam. Non desuere præterea, qui Senam Mauritaniam vocant, siliquarum conuexitate freti, & decepti, Delphinium esse crediderint. Quorum grauis error ita euident est, vt iam ab omnibus explodatur. Idq; non iniuria, quòd in Delphinio (demon eius caput legitimum esse) folia, non siliquæ, quæ delphinorum formam repræsentent, requirantur: foliaq; sint tenuia, longa, diuisa: flores verò purpurei: & tota denique Delphinij facies ea depingatur, quæ cum Sena quàm maximè pugnet, vt mox patebit. Nam quoniam Delphinij occasione in Senæ sermonem incidimus, cum huius nulum, quod iuenerim, meminere Dioscorides, Galenus, Paulus, & veterum Græcorum alij, sitq; in repurgandis humoribus non modò innoxium, sed etiam fumè vile medicamentum, hunc locum non transeundum duximus, quin de Sena disseramus, eiusq; historiam, & vires cum ea alius, tum ex eo quod nobis compertum est, describamus. Constat itaque SENA, Mauritiano nomine dicta, folijs glycyrrhizæ crassis, suppinguib; fabarum sapore: caule cubitali, à quo ramuli exeunt in lori modum flexiles. Flores ei emicant aurei, veluti brassicæ, purpureis intercurstantibus venulis quibus: succedunt folliculi falcati, adeoque natura compressi, vt superior membrana inferiori cohereat: in quibus semen continetur in nigro subuirescens, vuarum vinaceis vsqueadmodò simile, vt non facillè primo oculorum intuitu alterum ab altero

SENA.



discernatur. Folliculi è ramisculis prominent, tenui pediculo appendi, quo fit, vt maturiscentes, paruo ventorum flatu facillè decutiantur.

Planta est frigoris impatiens, ob idq; feri vult maio, nec vltra autumnum perdurat. Siquidem (vt pluries experitus sum) prius facta, facillè frigore deperditur, serius verò hyemem similiter non tolerat. Meminit Senæ Serapio in suo de simplicium medi-

camentorum volumine, vbi sic habet ex auctoritate Abohanisa. Sena asseruatur sicca, siliquis lunatas, & oblongas proferit: in quibus semina in ordinem digesta clauduntur. Siliquæ tenui pediculo pendunt: ob idq; facillè ventorum impetu decutiantur. Caducas optiones colligunt. hæc Serapio. Cuius postremis verbis fortasse deceptus Ruellius, Senam eam esse arborem existimauit, quam Theophrastus lib. 111. cap. x v11. de plantarum historia Coluteam appellat, quandoquidem hæc antiquis pastoribus fuit saginandis ouibus expetita. Vnde facillè Ruellius, qui nunquam forsitan in Hetruria fuit, vbi passim legitima Sena feritur, præsertim in Florentino agro, magno errore putauit, Senam non herbam esse, sed arborem Coluteam vocatam, ratus easdem plantas esse. Sed eius error hinc præterea aperitissimè diluitur, quòd Colutea siliquis proferat colore in purpuram primùm vergentes, mox albicantes, flatu turgent, quæ si premantur, crepitum magnum edunt: semine intus paruo, rotundo, lentis effigie. Sena verò siliquatur folliculis lunatis, qui nullo spiritu tumido distenduntur, quibus semen includitur vinacearum instar.

Adde etiam, quòd Colutea arbor sit multis perdurans annis, Sena verò non nisi paucis mensibus viuat. Quo fit, vt iam omnibus palàm sit, Ruellium hac in re manifestè cæcitiuissè, & inter Senam, & Coluteam non parum intercedere differentiam. Et quanuis asserat Fuchsius in suis de plantarum historia commentariis, hæc plantas facultate inter se minime differre, eum tamen in errore versari putauerim, quòd certò sciam Coluteæ semen non minus, quam genistæ vomitiones ciere. Colutea, et Colutea, vt de ea quoque hic aliquid Colutea dicamus, Theophrasto auctore loco paulò antè citato, Liparæ propria traditur. arbor magni

Ruellij  
hallucina-  
tio.

Sena del-  
scitio.

Colutea, et  
Colutea



magnitudine præstans, fructum in siliqua ferens, magnitudine lentis, quo oves miri in modum pinguescunt. Nascitur semine, & simo præcipue ouillo. Tempus serendi cum Arcturus occidit. Serendum semine præmadefacto, cum iam in aqua pullulare inceperit. Folium habet non abnile feno græco. Germinat primo vni caulis, triennio maximè: spargitur deinde in ramos, quartoque anno arborefcit. hæc Theophrastus. Ex quibus sanè verbis liquidò apparet, quàm maximè à Colutea differat Sena. Fuchsius & medicinæ, & Græci sermonis peritissimus, plantam hanc non Colyteam, sed Coluteam à suo se errore vindicans, appellandam censuit. Et rectè quidem, meo iudicio, nam Colytea longè alia est ab illa, Theophrasto teste loco modò citato: ubi eam iis depingit

## COLYTEA.



verbis. Arbor circa Idam proueniens, quam colyteam vocat, genus aliud est. Est autem fructuosa, ramosa, alofa, inuentu rara, non crebra: folio laurino, lauri latifoliz, sed rotundiori, amplioriq; ut vel vimeo simile appareat, oblongius tamen, colore parte altera herbido, tergo autem abido, neruosoque: cortice non læui, sed quasi vitigineo: radicibus per summa gracilibus, &

solis, verum vibratis, & admodum flauis. Fructu, floreque carere, putatur. Ex his Theophrasti verbis perspicuum est, Colyteam à Colutea plurimum differre. Quæ tamen etsi Theophrasti xuo Liparæ peculiaris fuerit, hoc tamen tempore pluribus in locis sponte natam vidimus præsertimque in Tridentino agro apud Ananios, ubi ego primum eam quam plurimis offendi. Sed vt eo, vnde digressa est, iam nostra

*Refusis, et* Redeat oratio, credidit Mesues Senæ folliculos in deliciâ aluo foliis longè præstantiores esse.

*Brasiliensis*

*Lepidus.*

Huc verò reclarat non solum Manardus Ferrariensis vir doctissimus, sed etiam diuturna medicorum experientia: etsi Brasiliensis, qui Mesuem tueri videtur, contrarium putet. Cæterum ne quis ex alterarumque confundatur, dicam ingenuè quid hac in re sentio, nec quicquam ab eo cecedam, quod experimento pluries cõprobaui. Sciendum igitur est, Senæ folliculos, qui siccati afferuntur, dum esse genere: alterum per se caducum, & in planta refectum, à quo semen eximunt, nigrum, & prorsus euanidum: alterum verò, quod ante matu-

ritatem demetitur, crassum, ponderosum, succo prægnans, & tegeribus expansum in vmbra ficitur, sed hoc venundatur rarum. Cui sanè, vt iam millies periculum fecimus, non minor deiectionis vis inest, quàm foliis. Primum verò genus, quo Venetis omnes ferè officinæ sciant, non modò minorem huiusmodi vim habet, sed propè nullam. Vt hinc planè colligere liceat, Mesuem hic non esse sine limitatõe dammandum: quandoquidem is, vt arbitror, de folliculis decerpitis intelligit, non autem de caducis, quibus tantum vtuntur ij, qui Mesui falsò reclamant. In quorum numero ego quoq; quandoque fui. verum cum postea integrum Senæ campum scissim, vt folliculos decerpitos virentes, & succo prægnantes, mox siccatos experire, rem aliter facto periculo se habere facillè comperi. Quare nostro exemplo, qui folliculis vt voluerint, Senam ferant, vt folliculos optimos habeant, vel saltem probatissimos erant, si tamen eiusmodi reperiri poterunt: sin minus foliis, & turis, & efficacius vtantur. Obest Sena (vt idem Mesues inquit) nonnihil ventriculo. quamobrem vt hæc tollatur noxa, & eius roboretur facultas, gingiber addendum præcipit: quin & ea, quæ cor, & ventriculum corroborant. Verum tamen non desunt, qui hanc reprobent sententiã: quòd degustatis Senæ foliis, aliquid adstrictionis, nonnihil siccitatis, atq; etiam tantillum amaritudinis perceperint, quæ omnia potius Senam roborare ventriculi indicant, quàm ipsum perturbare, ac imbecillum reddere. In quorũ sententiã ego quoq; pedibus eo: nam etsi quibosdam, præsertimq; mulieribus, quandoq; contingat, vt epoto Senæ diluto, eorũ intestina torminibus vexentur, id nunquam ex Senæ facultate provenire existimaui, sed ex crassis, pituitosisq; excrementis, ab hoc pharmaco eo impulsis, quæ sua crassitie intestinorum meas ad eò replent, vt in eis non paruat extensionem faciant, dum viam ad exitum querunt. Neque tamen me vnum aliquem inuenisse memini, qui diceret se epota Sena, ventriculi dolore laborasse. Proinde Actuarius, qui solus, quantum extras, inter Græcos Senæ vires descripsit, Senam circa noxam bilem, & pituitam deicere memoria mandauit. Id quod non sine erubescencia sile re cõgig quendã Philippum de Ser medicum, qui (ni fallor) vt suã potius tueretur sententiã, quàm veritatem, pharmacum quoddam inprobauerat ex Senæ diluto, rhabarbato, atq; agarico constati, quod cuidam Illustriss. ac Reuerendiss. Cardinalis, ac Principis Tridentini nepoti in quadam quotidiana febre dederat clarissimus medicus Andreas Gallus Tridentinus. Is autem pharmacũ illud dammandum esse censebat, quoniam Senæ dilutum, agaricumq; excipiebat, argumento quòd hæc duo (vt ipse asserat) maximè ventriculum læderent, immo, ne dicã ignis, quantum præstantiæ, ac virium agarico tribuunt an febribus diuturnis finidit, à pituite præ-

ferunt infarctū exhortis, Dioscorides, Galenus, & Mesues, quantisq; laudibus Senam extulerit Actuarius. Cæterum è Sena, ea magis præstat, quæ ex Alexandria Aegypti, vel ex Syria afferuntur, quamvis è nostrate adhuc in agro virente, & rosarum diluto ego quotannis Syrupum parare consueverim: qui tutò, largèq; omnes purgat humores. Daturq; commodè prægnatibus, & pueris, & cuiuscunque ætatis hominibus. Dilutum tamen magis præstat, quàm decoctum, quòd nulla ex parte exhæsticius viciæ quinque, vel sex alium modestissimè, & sine molestia solunt. Quòd tutò dari possit prægnantibus, & pueris, experientia docuit, cui subscribit Actuarius, qui Senam citra noxam purgare tradidit. Redditur medicamentum hoc in deicienda aluo præstantius, atque valentius, si cassia nigræ, aut mannæ, aut rhabarbaro, aut rosarum diluto, aut rhodopharmino, quòd officinarum Syrupum rosarum solutivum vocant, commisceatur, aut si maceretur Sena caprino fero. Præstantissimum dilutum hoc modo paratur. Sumuntur foliorum electissimè Senæ drachmæ sex, gingiberis, aut cinnamomi contriti drachma vna, florum buglossi drachmæ duæ: misceturq; omnia, & scissili vitro circumlito, siue flegneo vase angustis orificij excipiuntur, & assu si feruentis aquæ, aut feri caprini viciis decet, vas ostium adeò occluditur, vt nullus penitus spirandi pateat exitus. Hs peractis pulvinari plumis anserinis factò, igniq; calefacto vas inuoluitur, reponiturq; in arca, vbi pernoctare finitur. Sic enima conservato calore dilutum omnem facultatem in se recipit. Sunt præterea, qui vindemix tẽpore Senæ folia in mullum conciant, vini inde conferentis, quòd alui deiectionum vim obinet. Educti Sena per inferna (vt Mesius testatur) bilem tum arcam, tum flauam, & (vt Actuarius ait) non bilem tantum, sed etiam pituitam: quòd finè experientia comprobatur. Mundat Sena cerebrum, cor, iecur, lienem, pulmonem, & omnes corporis sensus, confertque omnibus eorum incommodis. Viscerum obstructiones aperit, auget iuuentutem, seniumque: etardat, & animi hilaritatem affert. Folia in capitis perfusionibus vtiliter decoquuntur, præsertim addita anthemide. Roborat enim hoc modo cerebrũ, nervos, oculorum aciem, & auditoriã facultatem. Opium de nunc in vniuersum est medicina morbis omnibus diuturnis, & melancholicis. Quamobrem Serapio, Sena, inquit, misceat prodest delirio, amemio, stissilis totius corporis, resolutioni neruorum, lithirias, cephalalgia, scabiei, pustulæ, pruritus, & epilepsia. Cor etiam roborat, si tamen his potissimum commisceatur medicamenta, quæ ipsum maxime confirmant, veluti viola. Planta, quæ Græcis *Ασπίνος*, Latinis quoque Delphinium appellatur: Italis, Delphinio. Quæ verò posterioribus Græcis *σείρα*, Latinis item Sena vocatur: Arabibus, *Senæ*: Italis, Sena: Germanis, *Seuct*: Hispanis,

Senæ de Alexandria, Gallis, Senæ de Leuantia

PYRETHRUM. CAP. LXXI.



PYRETHRUM  
Romanis saluam  
rem vocat. Fo-  
lia, caulèmq;  
emittit, vt dau-  
cum fluyestres,  
& feniculum:  
umbellamq; an-  
ethi, circinatæ  
rotunditatis. ra-  
dix longa est, pol-  
licis crassitudi-  
ne, gustu serui-  
dissimo, Pitui-  
tam elicit: ideo

in dolore dentium, decocta in aceto,  
colluto inde ore, auxiliatur: mansa pi-  
uitam extrahit. Sudores ciet, peruncto  
ex oleo corpore: diuturnis horroribus  
efficax. contra perfrictiones membro-  
rum, resolutionesque eximie cõducit.

PYRETHRI radix officinis omnibus est  
nota, in frequentique usu habetur, præsertim  
in dentium cruciatibus. Nasitur Pyrethrum  
in quibusdam quidem Italiæ montibus, sed  
non adeò arce, vt quod ex Orientalibus re-  
gionibus Venetias aduehitur. Huius plantas vi-  
di primũ ego in Bausano Tirolensium emporio  
in hortulo quodam Blasij Sbaicher medicĩ  
in simplicium facultate peritissimæ, quæ foliis,  
caule, radicèq; nullis discrepantibus notis  
Dioscoridis Pyrethrum referebant. Verumta-  
men non illis erant umbellæ anethi similes,  
quales Pyrethro reddidit Dioscorides, sed po-  
tius flores anthemidis modo spectabantur. id  
quod etiã testatur Ruellius de Pyrethro, quod  
in Gallia provenit. Ex quo facillè adductus sum,  
vt suspicandum putem, aut hoc in loco Dio-  
scoridis codicem librorumque negligentia de-  
prauatum esse, aut plura Pyrethri genera re-  
periri. Cæterum sunt ex rei herbaria pruden-  
tibus, qui nouum quoddam Pyrethrum osten-  
dant, passim ferè in pradis, ac incultis nascenti,  
foliis horrenti persilicæ proximis. Cuius radix  
etsi primo statim gustu aeris non tenetur, pos-  
tea tamen cùm diutius mādatur, tum linguam,  
tum fauces sua feruenti acrimonia mordet, ac  
quodammodo incendit. Sed tamen huius acri-  
monia non est (nisi fallatur gustus) cum leci-  
mi Pyre

Senæ,  
ex Mesue,  
& Serapio.

Dilutè præ-  
paratio.

Senæ vici-  
ex Mesue,  
& Serapio.

Comina.

mi Pyrethri sapore comparanda: quippe qui & amarior, & multò acrior, & feruentior percipiatur. Pyrethri meminit Galenus lib. v l l l. *Pyrethri vires ex simplicium medicamentorum, vbi eius vires iis descripsit verbis. Pyrethri radice potissimè vti- mür, causticam, vrentemve facultatem obtinen- te: quæ utique etiam dentium refrigeratorum*

dolores lenit: & ad rigores ante periodum cum oleo confricatur. Ad hæc stupidos quoque, quos *vigantes* vocant, & resolutos adiuuat. *radix pep sic* Græcè, Latine verò Pyrethrum, & Saluaris herba vocatur: Arabice, Macharchara, seu Hacharcharha: Italicè, Pirethro: Germanicè, Bertram: Hispanicè, Pelitre: Gallicè, Pyrethre.

Nomina.

ROSMARINVM.



ROSMARINVM.

CAPVT LXXII.

Dv o Rosmarini genera. Vnum fecundum, frugiferumque, cuius semen cachrys vocatur. Folia fœniculi haber, crassiora, & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, iucundè olentia: caulem cubitali altitudine, aut maiorem, multis concavum alis: in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylîo simile, rotundum, angulosum, acre, resinaceum, quod in mandendo linguam exurit. radix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum, vti sphondylion, odoratum, minime exurens: radice foris, nigra, intus si frangatur, alba. Verùm id quod sterile dicitur, illorum planè similitudinem refert: sed neque caulem, neque florem, neque semen promit. Nascitur in saxosis, & asperis. Trita omnium herba communiter hæmorrhoidum profluvia sistit: sedis inflammationes, & condylomata miti-

ROSMARINVM CORONARIVM.



gat: concoquit strumas, & abscessus, qui ad maturationem ægrè perducuntur. Siccæ radices cum melle vlcera purgant: torminibus medentur cum vino potæ, & contra serpentium morsus conueniunt: menses, & vrinas cient: veteres tumores illitu discutiunt. Tam radicis, quàm herbar succus, adiecto melle, illitus oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet: si comitialè malum sentiat, aut vetus pectoris vitium, auxilio est. regio morbo laborantibus cum vino, & pipere datur: sudores mouet, cum oleo perunctum: ruptis, & conuulsis prodest. podagris, cum liliacæ farina, & aceto tritum, illinitur: purgat vitiliginès, addito aceto quàm acerrimo. Semine in potio nibus vtendum, eius quidem quod cachryn non ferat: quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica nasci, foliis lactuca syluestris amara asperioris us, candidioribusque, radice breui, Theophrastus auctor est: potèque id ipsum alterutra parte purgare. Cachrys vim habet ex-

calaciendi

calfaciendi, & vehementer exiccandi. Quare abstergentibus medicamentis inferitur. cōtra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita vt tertio die solvatur.

## ROSMARINUM CORONARIUM.

CAPVT LXXIII.

ROSMARINUM, quo coronarij vtuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, supernè virentia, grauior odorata. Excalfactorij præditum est. Regium sanat morbum, si decoctum in aqua, ante exercitationes bibatur: & vbi laborans exercitatiōe se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis, glencinōque vnguento admisceri solet.

Rosmarini  
nomen cō-  
sideratio.

PRIMUM, ac summum Libanotis, siue Rosmarini genus, quod mas appellant, sub duplici differentia à Dioscoride representatum, aliquoties vidi Venetijs in horto amœnissimo Maphæi medici excellentissimi, nullis sine deficientibus notis, quas illi Dioscorides assignauit. Idem quoque frequens satis nascitur in agro Goriciensi Supra Salicanum in monte Gargaro, in via qua ad ædem diuæ Virginis sacram ascenditur. Verum alterum genus, quod feminam dicunt, hæcenus in Italia nusquam mihi videre licuit, tametsi id inibi nasci non negauerim. Sed certè Cordum in suo dispensatorio hallucinatum crediderim: quippe qui existimauerit syluestrem Angelicam esse Libanotim. Porro Rosmarinum, quo (vt Dioscorides inquit) coronarij vtuntur, nostras nimirum vulgare est, quod in hortis, ac viridarijs passim, & in vineis alicubi plantarum conspicitur. Id in frequentiori vsu est, notiusque omnibus, quam vt de eo plura dici debeant. Caterum variæ, mea quidem sententia, in Rosmarini descriptione Theophrastus, qui libro IX. cap. XII. de plantarum historia, de Rosmarinis hæc posteritatis memoriæ prodidit. Rosmarini genera, inquit, duo, alterum sterile, alterum fertile: & alterum tam fructu, quam folio vile, alterum tantum radice. Fructus cachrys vocatur. Fertile folium habet palustri apio simile, sed maiō maiuscaulem ac magnitudinem cubiti, aut maiorem radice magnam, crassam, candidam, & veluti thus redolentem: fructum candidum, scabrum, oblongum. Nascitur potissimum solo squalido, atque fixoso. Radix medicamento vlcero utilis, & mensibus pota in vino nigro austero. Fructus ad vrinæ stillicidia, & aures, & argemum, & ad oculorum mor-

bum lippitudinem nuncupatum, & lacris vbertatem mulieribus facit. Sterile illud folio lactuæ amaræ constat, sed scabriori, candidiorique radice breui. Nascitur id quoque prædicto solo (alijs, vt Hermolaus legendum censet, & hic à Dioscoride commonetur, vbi erica) lætissimum. Radix partim superius, partim inferius purgat. Quod enim germin versus consistit, superius purgat: quod terram versus, inferius. Prohibet & velsibus interposita vermiculos noxios. Colligitur per mensem tritici. hæc Theophrastus. Libanotis, siue Rosmarini tum historiam, tum facultates descripsit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Libanotides tres sunt, vna sterilis, due nuctum ferentes: omnes verò eundem facultatis, emollientis, & digerentis. Succus tum radice, tum herbe, mistus mellis obfusum oculorum aciem ab humorum crassitudine curat. Porro eius libanotidis, quæ ad coronas est utilis, quæ Romani rosmarinum nuncupant, decoctum, regio morbo laborantes potum adiuuat. Omnes enim libanotides abstergentis, & incidentis facultatis participes sunt. hæc Galenus. Caterum Cachrys non modò Rosmarini semen, significat, sed etiam quarundam arborum nomenclatura, vel potius excrementa, quod nec fructus, nec flores propriè dici possint: quæ, tamen ante fructus erumpunt, & decidunt, qualia videntur in corylo, cui sunt longo pipeti similia, item in nuce, ac quercu. Nisi inter hæc veteres Græcos auctores aliquam nouissè differentiam sit iudicandum, quod apud plerisque non cachrys, sed canchrys, pro Rosmarini semine scriptum reperitur. quæ tamen voces hæcenus à recentioribus confundi inuenio. Planta, quæ *αἰσάρης* Græcis, Libanotis & Rosmarinum Latinis dicitur: Mauritanis, Xaiër almeriem, Alpinaßach, & Cachola: Italis, Rosmarino. Quæ verò *αἰσάρης* regiarumque Græcè, Rosmarinum coronarium Latine vocatur: Arabicè, Elkiageber: Italicè, Rosmarino coronario: Germanicè, Rosmarin: Hispanicè, Romero: Gallicè, Rosmarin.

Rosmarini  
nomen cō-  
sideratio.

Cachrys  
quid.

Nomina.

SPHONDYLII.

CAPVT LXXIII.

SPHONDYLIIUM folia quadantenus platani, & panacis habet: caules fœniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes: in quorum cacumine semen duplex, seseli simile, sed latius, candidius, & magis paleaceum, grauis odoris: flores eius albi, aut pallescentes: radice raphani, candida. Nascitur in palustribus, & aquosis. Potum

semen.

SPHONDYLIV.



semen pituitā  
per aluum ex-  
trahit. mede-  
tur iocineris vi-  
tiis, regio mor-  
bo, comitali-  
bus, ortopnoi-  
cis, vuluarum  
stragulationi :  
veternosos suf-  
fitu reuocat.  
Cum oleo com-  
modè infundi-  
tur capitibus  
phreneticorū,  
& lethargico-  
rum, item capitis doloribus : cum ruta  
illitum, serpentina vlcera cohibet. Da-  
tur radix cōtra regium morbum, & io-  
cineris vitia: circumrasi eadem, & inie-  
cta callos fistularum derodit. Recentis  
floris succus exulceratis auribus, puru-  
lensisque accommodatur. qui cætero-  
rum succorum more exprimi, dein re-  
condi solet.

RARA admodum sunt prata, vligine ma-  
denta, quæ inter alias complures herbas, in-  
numeras quoq; Sphodilyj plātas non habeant:  
eāque præcipuè, quæ in montibus potius,  
quam in planitie virent. In his sanè Sphondy-  
lium copiosum nascitur, folio platani, aut pana-  
cis: caule fœniculi, cubitale longitudinem  
excedente: in cuius cacumine umbella insidet,  
albis floribus reſerta: è quibus semen prodit,  
sefeli nō abſimile, latius tamen, ac squamosum,  
sapore inuicundo, vt quod cimices fermè reſi-  
piat. Radicem profert albam, raphani æmulam,  
gusta non ingrato. Huius semine vruntur qui-  
dam sefelis vice, quod alterum alterius effectus  
præſtare exiſtunt. Porro Fuchſius non vide-  
tur ſatis Sphondylium nouiſſe, quod ipſum vnā  
cum Acantho depingat, vocetq; Acanthum  
Germanicam. Cui ſane impoſuerunt officinæ  
Germaniæ, quæ foliorum ſimilitudine dece-  
pit, pro Branca vrfina Sphondylium uſurpant.  
Sphondilyj facultates memoriæ prodidit Gale-  
nus libro VII. ſimplicium medicamentorū,  
ſic inſequens. Sphondilyj fructus acris, &  
ſecantis eſt facultatis. Itaque ad aſthma, & co-  
mitialium morbum aptum eſt medicamentum:  
prodeſt & regio morbo. Et radix nimirum ad-  
ſimilis facultatis, ad eadem accommodatur.  
Sed & inſuper fiſtularum callos tollit: cæterum

imponere eam oportet circumraſam. Porro  
floris etiam ſuccus ad diuturniora aurium vlce-  
ra conueniens reponitur. Quod Græci *αγορ-Ναρμα*.  
*Αδρυπ*, Latini ſimiliter Sphondylium vocant:  
Itali, Sphondilio.

FERULA. CAP. LXXV.



E VIRIDI  
Ferula medu-  
lla pota vilis  
eſt ad cruentas  
excreationes,  
cœliacosq; cō-  
tra viperarum  
morſus in vino  
datur: erumpē  
tē naribus ſan-  
guinem indita  
ſiſtit. Semē po-  
tum tormino-  
ſis auxiliatur:  
ſudores ciet,

vncto ex oleo corpore. Caules ſi edan-  
tur, capitis dolores faciunt: muria con-  
diuntur. Ferula itaque caulem profert  
ternū ſæpe cubitorum: folia fœnicu-  
li, longè aſperiora, & latiora. quæ ab  
imo caule vulnerata ſagapenū efficitur.

Sphodilyj  
confidera-  
tio.


Fuchſ.  
er.

Sphondy-  
lij virens  
Galen.

FERULA æſtuosis naſcitur locis: ideoque Ferula bi-  
nil mirum, quod Apulia Ferularum ſit maxi-  
mè ſerax. Quinetiam frequens prouenit in Ro-  
mano agro Tyrrheni maris contermino, præ-  
ſertim apud Centumcellas, & in vniuerſis He-  
turiz maritimis. E quibus prima tantum ge-  
minatione corculum quoddam paſtores exi-  
munt oui luteum induratum referēs, quod ſub  
cineribus aſſatum, prius tamen charta, aut ſin-  
teo madefactis conuolutum, mox pipere, & ſale  
conſperſum, non modò guſtui gratiſſimus eſt  
cibus, ſed etiam ad excitandum venerem va-  
lentiffimus. De Ferulis latius diſcriuit Theo-  
phraſtus libro V. cap. I. de plantarum hifto-  
ria, ubi ita ſcribit. Ferulaceum genus in plures  
ſpargitur ſpecies. Sed primū de eo, quod cō-  
mune omnium conſtat, dicendum eſt, ſcilicet  
de Ferula, atque Ferulagine: ſeu idem genus  
ambabus, diſſerens magnitudine tantū, ſeu etiā  
alterum ſit, vt nonnulli putarunt. Ergo natura  
earum, quæ conſpici poſſit, conſimilis cære  
ſentitur, præterquam ratione magnitudinis.  
Ferula enim grandis admodum ſurgit, Ferula-  
go autem humilis, ſed vnicaules ambæ, & ge-  
nuculatz

niculatæ sunt. Folia, & Cauliculi quidam, geniculis erumpunt, ac alternatim exeunt folia: alternatim inquam, quod non ex eadem parte geniculorum, sed permutatim, caulem magna ex parte amplexa, sicutiarundinea proueniunt: nisi quod deflexa hæc magis; mollior, magnitudinisque causa. Folium enim grædo, molle, multifidum, vt capillamenti modo fere inspicitur: maxima, quæ terræ proxima sunt, & reliqua subinde ad portionem. Flos melinus: semen obscurum, anetho simile, sed maius. Finditur cacumine, & in stipites quoddam haud magnos differtur: quibus flos, seménque insidet, nec flore, fructuque laterales caules carent, sed anethi modo seunt. Annuo caule constat, & germinatio in vere primū foliorum, tum caulis, vt etiam in cæteris fieri solet. Radice altè descendit, eadēque singulari innititur. Talis Ferula est, hæc Theophrastus. Porro Ferulæ (vt Plinius est author libro x x i i i .cap. primo) asinis græcissimæ sunt in pabulo, cæteris verò iumentis præsentaneo veneno, qua de causa id animal Libero patri assignatur, cui & ferula. Natura Ferularum (vt idem Plinius lib. x x .cap. x x i i i . testatur) muræis infestissima est: radice siquidem ea moriuntur. In insula quadam ex fortunacis nomine Morion, ferulas in arborum amplitudinem grandescere, scripsere quidam. Apuli lignorum vice, quibus maximè carent, ferulis ad ignem vtuntur. Ferulæ meminit Galenus lib. v i i i . simplicium medicamentorum, sic inquitens. Ferulæ semen excalfacit, & attenuat. Ad interna eius pars recentis adhuc, quod medullam vocant, adstringentem qualitatem participat. Cuius nomine sanguinem spuentibus, & coeliacis conuenit. Næq̃ Græcis ea planta vocatur, quæ Latinis Ferula: Italis, Ferola: Hispanis, Cananbeia.

PEVCE DANVM.  
CAP. LXVII.



cis. Tendra radix cultello conciditur,

PEVCE DANVM caulem emittit tenuē, gracilētum, fœniculo similem: comam habet statim ab terra copiosam, spissamque: flore luteo: radice nigra, crassa, graui odore, succo sa. gignitur in montibus opa-

profluensq̃: è plaga succus vmbre mandatur: in sole siquidem confestim euascescit. Colligitur capite prius, & nariibus rosaceo perfusus, ne capitis dolor premat, & vertigo sentiat. Assatione radix inutilis fit. Tam lac, quàm succus radice, & caulibus extrahi solet, sicuti è mandragora: verum inefficacior succo lacryma habetur, & velocius expirat. Interdum etiam concretæ inuenitur lacryma, thuris similitudine, caulibus, radicibusque adhærens. Præfertur succus è Sardinia, & Samothrace, colore rufò, odore graui, feruens gustu. Ex aceto, & rosaceo illitum Peucedanum prodest lethargicis, phreneticis, vertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis, omnibus, in vniuersum, vitiis neruorum, ex oleo, & aceto illitum, prodest. Eius olfactu respirant valvæ strangulatus, & veterinosi reuocantur. Incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur: cauernis dentium inditum, mitigat dolorem. contritusq̃ efficacissimè ex oeno assumitur: suspiriis, torminibus, & inflationibus subuenit. Ventrem leniter emollit, Menem absumit, difficiles partus mirè adiuuat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distentiones potum: vuluam aperit. Radix ad eadē utilis est, sed inefficacior: eius decoctum bibitur. Farina eius, sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit: squamas ossium extrahit. In cerata, & calfacientia malignata additur. Radix eligi debet recens, quæ cæciem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris amygdalis, aut ruta, aut pane calido, aut anetho resolutur.

QVONTIAM nullis prorsus foliorum, ac seminis, & paucis admodum floris notis Peucedanum representant Dioscorides, vixote plantam, quæ omnibus fortasse suo tempore notior erat, quàm vt longiorem descriptionem postula

Peucedani confectio.

postularer, idcirco nobis quidem perdifficile esse iudico, decernere quoddam genus herbarum hodie in medium afferri possit, quæ legitimum Peucedanum referat: præsertim cum Theophrastus, Plinius, Apuleius, ac antiquorum alij, qui simplicium historias descripserunt, plura, quod legerim, de Peucedano memorie non prodiderint. Veruntamen cum scribat Dioscorides, Peucedanum nasci comā statim à terra copiosā, ac spissā, hinc planè coniectandum videtur, Dioscoridem ipsum innuere, quòd Peucedanum constet multis foliis, capillaribus, tenuibus, ac longis, fœniculi, aut anethi effigie. Huic coniecturæ illud etiam accedit, quòd cum Peucedanum, Dioscoridis testimonio, florem proferat melinum, siue luteum, non temerè credendum arbitror, hunc non in alio, quam in umbella sustineri, cum omnes ferulaceæ stirpes, & quæ fœniculo, & anetho similes habentur, cuiusmodi sunt, quæ hoc in loco à Dioscoride recententur, umbellas in caulium cacuminibus gignere conspiciantur, & quibus semen prodit fœniculi modo. Quòd si ita se res habet (vt equidem exilissimo) asserere non dubitauerim, me sæpenumero Peucedanum vidisse in Ananionibus montibus, vbi huiusmodi plantæ frequenterissimæ proueniunt, quæ non solum prædictis notis Peucedano adhipulantur, sed etiam radice, quam habent nigram, crassam, succi plenam, grauiterque olentem. In hac itaque sententia persistam, vt hanc herbam, quam etiam pictam damus, verum Peucedanum putem, donec aliam nactus ero, quæ certioribus notis illud exprimat. Cæterum radices, quibus pro Peucedani radicibus vulgò officinæ vtuntur, legitimas ementuntur, nam præter id quòd ex teriore parte non nigrescat, nulla graueolentia, nullaq; acri facultate sunt præditæ. Cuius verò

plantæ hæc sint radices, ego quidem proferre non possum: eas siquidem hætenus non nisi siccas, & sine caule, ac foliis mihi videre licuit. Prætulit Dioscorides Sardonium peucedanum, quòd non magno quidem negotio ad nos aduehi posset, cum frequens, nec longa sit mercatoribus in Sardiniam nauigatio. Vnde seplasiaribus, si rerum legitimarum studio caperentur, facillè Peucedani radices conueherentur. Peucedani meminit Galenus libro v l i i. simplicium medicamentorum, vbi de eius radicibus disserit in modum, Peucedani radice quidem maxime, sed tamen etiam succo, & liquore vtitur. Sunt autem hæc omnia eiusdem specie facultatis: sed valentior succus, admodum excalescens, & digerens. Quare affectibus omnibus circa nervos consistentibus conuenire creditur, tum morbis in pulmone, & thorace ex crassitudine, & viscositate humorum prouenientibus. Atque inrò quidem in corpus sumptus, sed tamen etiam olfactu prodest. Porro quòd incidat, & extenuet, sæpe etiam dentium perforatorium dolores cauitati impositus protinus sedauit, quia videlicet tenuium est partium, & excaletorius. Quinetiam licnes induratos iuuat, nempe incidendo, digerendo, atque extenuando crassos humores. Sed & radice ad hæc vti licet: quæ & squamas celerrimè ab ossibus detrahit, quia videlicet valide desiccatur, minus tamen quam succus excalescens. Et viceribus malignis remedium est optimum arida illa: ipsa enim expurgat, carnem gignit, & ad cicatricem perducit. Excalescit quidem ordine secundo iam completo: desiccatur verò tertio iam incipiente. Planta, quæ vocatur Arabice, Peucedanum Latine dicitur: Arabicè, Græcè, Italice, Peucedano: Gallicè, Quenè de Porcean.

Peucedani  
radices ex  
Galenis.

Nomina.

MELANTHIUM SATIUM.

GITH, SEV MELANTHIUM.  
CAPVT LXXVIII.

GITH exilibus furculis fruticat, sæpe

MELANTHIUM SYLVESTRE.



binos dodrantes excedens: folijs, vt fenecionis minutis, sed multò tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo,

cca

ceu papaueris, oblongo, intercursantibus intus membranis: quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum fronti, subuenit, discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex irino, & infusum naribus: tollit lepras, lentigines, duritias, tumoréque vetustos, cum aceto illitum: circum scarificatos clauos excutit: cum vetere vrina impositum. Dentium doloribus, cum aceto, & teda decoctum, & collutum prodest. teretes ventris tineas expellit, peruncto ex aqua vmbilico. destillatione laborantes adiuvat, tritum in lincto, & olfactum. Vrinam, & menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit: difficultatem spirandi cum vino potum, leuat: phalangiorum moribus ex aqua, drachmæ pondere, haustum auxiliatur. Incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

*Melanthij  
consideratio.*

**GITH**, quod Græci Melanthium appellant, officinis Nigella vocatur. Legitimum foliis est minutim incisus, ramulis tenuibus, capitulis in summitate oblongis: in quibus semen includitur nigrum, intercursantibus membranis distinctum, acre, ac odoratum. Seritur in hortis, & viridariis, atque etiam in aliis locis satum prouenit. Quod cum ante nos probè animaduertissent Hermolaus, & Ruellius, asseruerunt omnino hallucinari eos, qui putant eam stirpem legitimum Melanthium esse, quæ inter segetes in arvis passim nascitur, foliis ferè porrice caule prælongo, hissutoque flore purpureo, rosæ parua effigie. Et rectè, in ea quidem sententia, iudicauerunt: siquidem herba illa cum Dioscoridis historia quam maximè pugnat, vapore quæ foliis, caule, ac floribus, nulla ex parte Melanthium refert, sicuti neque etiam semine, quod et si nigrum Melanthij modo gignatur, non tamen gustu aliud representat, quam amaritudinem humil & asperitatem. Hinc itaq; perspicuum esse potest, Brasauolum, aliquo medicum clarissimum, in suo simplicium volumine Romæ excuso manifestè cæcutiuisse, quippe qui affirmare non dubitauerit, illud verum, legitimumque esse Melanthium, quod in segetibus passim sua sponte nasci superius diximus, quodque vulgo Githone à Ferrariensibus appellari scribit. Cuius error non solum prædictis rationibus, sed ea quoque herbæ appellatione facillè deprehenditur, quod etiam ij, qui ita eam appellant, illegitimum esse Melanthium existimant. Quandoquidem nil aliud Italis hoc nomen Githone

denotare videatur, quam spurium Gith, quod ideo Githago, & pseudomelanthium vocari potest. quemadmodum & id, quod rura Tridentina appellant formentone, nil aliud significat, quam spuriam tritici speciem. Quod cum postea ipsè Brasauolus animaduerneret, nostris fortasse, aut aliorum commentariis admonitus, suam reuocauit sententiam. Quare posthac Brasauoli quoque sententia, ij damnandi erunt, qui in hac persisterent opinione. Iam igitur confutata nus licet, verum Gith in hortis, & viridariis satum prouenire, in quibus frequentissimum seritur in Germania. Cæterum est & syluestre Melanthium, quod in Hetruria reperitur, hortensi non admodum dissimile, capitibus tamen grandioribus, & semine minus odorato. Ex quo quidem planè colligere possumus,

*Melanthium syluestre.*

*Pseudomelanthium.*



**LANTHIUM** sponte inter segetes nascens, quod vocant vulgo Githone, cuius hic effigiem damus, nullo modo syluestre Melanthium esse. Sed longè minus id fuerit Lolium, vt apertissimè hallucinatus credidit Fuchsius, medicus, alioqui peritissimus: cuius error à nobis explosus est libro secundo in Lolij mentione. Porro &

illud semen odoratum, sububrūneque, quod aliqui pro minori Cardamomo perperam vsurpant. seplasarit Nigella citrina vocatum, Melanthij genus est. quippe ipsa seminis forma, odor, ac sapor nihil proflus à Melanthio differant. Verum si modò in aliquo dissident, color est. qui in altero niger, in altero verò subflauus conspicitur. Quo fit (quod etiam superius de Cumino differentes diximus) vt magno in errore versentur Monachi illi, qui in Mesuem commentarios edidere, quod præter rationem asserere sine ausu, Nigellam subflauam, nil aliud esse, quam Cuminum syluestre primo generi à Dioscoride assignatum. Melanthij meminisse Galenus libro vi i. simplicium medicamento. Viri ex his verbis. Melanthium exaltat, atque deficiat tertio ordine. Videtur etiam tenuium esse partium: vnde etiam destillationes suauis, calidum in lincto admotum, atque assidue olfactum. Quineciam si intrò in corpus sumatur, vel maximè flatus exunguit. Hinc constat essentia ipsam esse subtilis, & ad vnguem à caliditate elaborata. Propterea sanè etiam amarum est. Olfensum verò in quarto horum voluminum est, quod cum ad extremam tenuitatem, atque elaborationè terrena pertingit subtilitatem, amara proueniat

*Brasauoli  
li errat.*

*Melanthij  
Viri ex Galeno.*



proueniat qualitas. Itaque mirum non est, si  
lumbricos interminat non esum modò, sed etiã  
foris ventri impositum. Siquidem & id præsta-  
re posse saporem amarum monstratum est. Ne-  
que sanè etiam mirandù, si lepras, clauos, myr-  
mecias efficiat, ei præsertim, qui in superiori-  
bus libris comprehensorù haud est immemor.  
Sic verò etiam orthopneam iuuat, & menses  
prouocat, qui vtique ob crassiciem, aut visco-  
sitate[m] humorum recenti fuerint. In fumina,  
vbi incisione, extersione, desiccatione, exalta-  
tione est opus, præstantissimum id remedium  
est. *Mogobley* sic Græci, Melanthium quoque  
& *Gith* Latini dicunt: Mauritanii, Xamin, Sunis,  
seu Sunizi: Itali, Melathio: Germani, Schuapartz  
roemisch, & Schuuarz coriander: Hispani Ne-  
guillia, & Alipiure: Galli, Pourelle, & Nielle  
bastarde.

Nemina.

IASERPITIVM. C. A. P. LXXVIII. 10

IASERPITIVM in Syria, Armenia.  
Media, & Libya nascitur: caule ferula-  
ceo, quem maspetum vocant: foliis  
apio similibus: lato semine. Radix ex-  
calfacit, in cibis ægrè concoquitur, ve-  
sicæ noxia. Sugillatis illita cum oleo,  
& strumis, ac tuberculis cum cerato,  
medetur: ischiadicis conuenit cum iri-  
no, aut cyprino cerato: excrecentibus  
circa sedem tollendis illinitur, cù pu-  
tamine mali punici, & aceto decocta.  
Venenis pota resistit: os commendat,  
cibis, aut sali permista. Laser è radice,  
atque caule scarificatis colligitur. Præ-  
fertur autem rufum, translucens, myr-  
rhæ æmulû, non porraceum, odore va-  
lens, suauis gustu, quod dilutum facîle  
albescit. Cyrenaicum si quis degusta-  
uerit, humorè toto corpore ciet: blan-  
dissimo odore, adeò vt ne os quidem  
gustanti nisi paululum spiret. Medicû,  
& Syriacû minus viribus valent, & ma-  
gis virosûm reddunt odorem. Laser o-  
mne antequàm siccescat, adulteratur  
sagapenò, aut fabæ lomèto. quod ma-  
leficium deprehenditur gustu, odore,  
visu, & dilutione. Caule[m] aliqui sil-  
phion vocauerunt. Efficacissimû laser,  
mox folia, postremò caulis. Acrè vim  
habet, inflationes facit: perunctas cum  
aceto, pipere, & vino alopecias sanat.  
oculorù aciem exacuit: & incipientes

suffusiones, illitû cum melle, dissipat:  
cauernis dentiû in dolore inditur, aut  
cù thure in linteo circumligatur, aut cù  
hyssopo, & ficis coctis in posca, os col-  
lucitur. iis prodest, quos bestia in rabiè  
efferata momorderit, vulneribus im-  
missum. Valet aduersus venenâ telorù,  
& animalia omnia, quæ virus eiacular-  
tur, potû, aut illitum: scorpionû plagis  
oleo dilutum circumlinitur. gangrænis  
præcoercitis immittitur: & cù ruta, ni-  
tro, & melle, vel per se carbûculis. Cla-  
uos, callosq; prius circumrasos vellit,  
cerato, aut aridorù ficuum carne præ-  
mollitû. Recentes lichenas ex aceto sa-  
nat: & excrecentia in carne, polyposq;  
si aliquot diebus cum atramèto futo-  
rio, aut æruginè illinatur. extuberantia  
cum forfice extrahit. Veteribus fauciu  
scabritiis opitulatur: grauem, subitoq;  
irrarescentè vocem, dilutû aqua, sor-  
bitione confestim expedit: vnam illitû  
cum melle reprimat: anginis ex aqua  
mulsa vtilissimè gargarizatur. Vescen-  
tes latiore colore mægonizat: tussi cõ-  
modè in forbili ouo datur, & pleuriti-  
cis in sorbitionibus: in fellis suffusione,  
& aqua inter cutè, cù aridis ficis. Hor-  
rores discutit cù vino, pipere, & thure  
potû. neruorù cõtractionibus, opistho-  
tonicisq; datur oboli pondere deuorân-  
dum. hærentes gulæ hirudines, garga-  
rizatû cum aceto decutit. Ad lac intus  
coagularum bibitur: comitialibus ex  
aceto mulso proficit: menses ciet, cù pi-  
pere, & myrrha potum: cæliacos adiu-  
uat, in acino vuz sumptû: cù lixiuio au-  
tem potû datum, repentè cõuulsis, ru-  
ptisq; prodest. ad portiones resoluitur  
amygdalis amaris, aut ruta, aut calido  
pane. Foliorù succo eadè præstatûr, sed  
multò inefficacius. Cù aceto mulso mæ-  
ditur, ad expediendâ arteriâ, maxime  
cùm vox retûditur. Eo cù lactucis vtû-  
tur, exitque in vicem cruce. Fertur &  
altera magadaris in Libya nasci, ra-  
dix laserpitio similis, sed minus crassa,  
acris, & fungosa, ex qua non profluat  
succus: Eiusdè cù laserpitio facultatis.

*Laferpitij  
sem Lafe-  
rum confide-  
ratio.*

CREDIDIMYS iandudum Laferpitij lacrymam nihil aliud esse, quam illud iucundi ac suavis odoris gummi, quod pharmacopœis atq; vnguentariis Belzoinum nominatur. Neque cerè hætenus præter rationem in ea perstitimus opinione, nam cum id mihi deprehenderetur odoratum, rufum foris, intus candidum, transluens, & quod dilutum albesceret, non poteram non adduci, vt crederem hoc esse legitimum Lafer. Huc illud quoq; accedebat, quod complures erant viri docti & rei medicæ studiosi, qui idem mecum sentiebant. Verum cum postea cepissem Laferpitij ac Laferis historiâ diligentius examinare, atq; plura ex Strabone, Theophrasto, Dioscoride, Galeno, & Plinio collegissem, quæ priori nostræ opinioni aperte aduersari videbantur, facile in aliam deductus sum sententiâ. etenim sic animum induxi meum, vt malim veritati cedere, quam pertinaciter (quod multi faciunt) falsa tueri. Strabo itaq; lib. vltimo Geographiæ testatur, Silphij suo vsq; tempore Cyrenis defecisse, his verbis. Cyrenis finitima est regio, quæ Silphij gignit, & Cyrenaicum succum, quem Silphium posterius effert. Id propemodum defecit, cum aliquando barbari odio quodâ ingruissent, ac radices eius penè omnes eruisent. Fuerunt hi Nomades viri. hæc ille. At Plinius Cyrenaicæ succi defectum non in barbaros vt Strabo, sed in publicanos quosdam refert lib. x. 1. x. cap. 11. vbi de eo ita scribit. Ab his proximè dicitur auctoritate clarissimè Laferpitium, quod Greci silphion vocant, in Cyrenalæ prouincia repertum: cuius succum vocant Lafer, magnificum in vsu, medicamentisq; & ad pondus argentei denarii pensum. Multis iam annis in ea terra non inueniunt, quoniam publicani, qui pascua conducunt, minus ita lucrum sentientes depopulantur pecorum pabulo. Vnus autem caulis nostra repertus memoria, Neroni principi missus est. hætenus Plinius. Huic verò cum Theophrasto sermè conuenit, quod hic scribat pecus silphio purgari, pinguesterque vehementer, & carnes mirabiliter in modum firmes reddi. Cum igitur Strabonis & Plinii testimonio constet, Silphium, Cyrenis eorum vsque ætate defecisse, neque inibi inueniri, nil mirum videri debet, si nostra etiam tempestate defecere, atque nullum iam ad nos aduehatur, quod legitimum dici possit. Quare ita gummi, quod seplasia Belzoinum dicunt, meo quidem iudicio, verum silphij liquorem mentietur potius quam sit. Sed his illud quoque addamus, quod Strabo auctor est, Silphium adeo Cyrenensibus olim custodibus fuisse asseruatum, vt inde aliò deferri nō potuisset, nisi clam à mercatoribus, qui vinum asportabant. Plinius item Silphium ad pondus argenti pendi solitū tradidit, quin & tantū factū fuisse à Cæsare, vt illud inter aurum argentumq; protulerit ex ætario. Ex quibus omnibus haud infirmum argumentum sumi potest, quod Belzoinum nostrū non

sit Silphij liquor. quandoquidem id quotidie copiosum importatur nō solum in Italiam, sed in vniuersam ferè Europam. Ad hæc cum Dioscorides Cyrenaico succo vim acrem tribuat, atq; Galenus eundē & calidissimum, & maxime tenuium partium faciat, non equidem video, quomodo vulgare Belzoinum possit legitimum Lafer exprimere: quoniam illud nullam prorsus gustantibus acrimoniâ relinquit. Præterea validi cortices, qui plerumque Belzoino implicati reperiuntur, arguunt id arboris magis potius, quam ferulacæ plantæ lacrymam esse. Quod etiā nuper retulit mihi quiddā medicus Cyprius, qui Belzoinum nostrum in Cyprio ex arbore sitis procrea manare affirmavit: vbi tamē Silphium nasci quæ memorie prodiderit, hætenus inueni neminē, quemadmodū neq; in Ionia, neque in Peloponneso id gigni, sed prope Cyrenas tantum, literis mandauit Hippocrates. Atqui illud nobis obicit aliquis, quod Laferpitium non modò in Cyrenensium agro quondam prouenerit, sed etiam (vt scribit Theophrastus, Dioscorides, & Plinius) in Perside, Media, Syria, & Parnaso monte: & quod ob id ad nos aduehi possit. Nos huic ita facile respondebimus, quod Silphij illius liquor ad nos adferatur quidem, sed qui fortassis sit, virosiusq; odoris: atq; cum esse dixerim, quod officina medicorū Assam fortissimum vocant. Namq; Lafer (vt Dioscorides testatur) Medicum, & Syriacum minus viribus valet, & magis virosum reddit odoreni. quin etiam, eodem teste, Lafer omne antequam inciseat, adulteratur figapeno, aut fibæ lomento. id quod post ipsum scriptis tradidit Plinius libro superior citato. Quocirca mihi quidem videtur non temere colligendū esse, quod præstantissimum Lafer, quale Cyrenaicum habebatur, à nobis omnino desideretur. Cæterum quid veteribus fuerit gummi illud elegantissimum, quod Belzoinum appellant, mihi hætenus incumpertum est. In qua certè re non possum eorum opinioni subscribere, qui id putant esse probatissimam myrrham. Hæc siquidem, quæ optima sit (vt Dioscorides inquit) præter alias notas esse debet vndique cœoloris, quæ contrafacta venas vnguium modo cādidas & leues ostendat, minutis glebis, amara, & acris, quas tamē notas in Belzoino haudquaquam reperies. Nam etsi vndique maculis conspersatur, tamē fractas amygdalas repræsentat magis, quam vnguium quorumvis imaginem. Quin & maculæ ille tam interiores, quam exteriores partes obdicens, adeo vt Belzoinum gleba nihil aliud referat, quam delibatarum amygdalarum acerrimū, copioso melle exceptum. Adde insuper, quod nusquam, quantum equidè inuenierim, memorie proditum est, myrrham in Cyprio & Syria suis è plantis emanasse, sed in Arabia duntaxat (vt perhibent Theophrastus, Dioscorides, & Plinius) iis in syluis, in quibus thus etiā prouenit. quanquam Plinius myrrham quandam ex India

*Opinio  
quorundam  
explosa.*

*Laserpitij  
historia  
ex Theophrasto.*

India adferri tradit, quæ omnibus myrrhæ generibus deterior est. Sed quoniam non iniucundum, quamvis longam, de Laserpitio historiam tradidit Theophrastus lib. vi. cap. xiii. de plantarum historia, ideo eius verba hic subiiciam. De Laserpitio, inquit, nunc indicandum est. Laserpitio radix multa, crassaque: caulibus quantum ferulæ, & crassitudine ferè proximus: folium, quod maspetum vocant, apio simile est semen latum, foliaceum, quale quod folium 10 appellatur: caulibus annuus, sicut ferulæ. Ergo vere ineunte maspetum hoc exit, & pecus eo purgatur, pinguescitque vehementer, & carnes mirabilem in modum suaves redduntur. Posthac caulem edit hominum cibo idoneum omnibus modis, elixum, assumque corpora eo quoque purgari ferunt, quadraginta diebus. Succus capituli duplex, alter ex caule, alter ex radice: qua de causa alterum scaparium, alterum radicarium vocant. Radix nigro cortice tegitur, eundemque detrahere solent. Sunt veluti certæ mensuræ cadendæ radices, quibus quantum conferre putetur ad futuram celsuram reseruantur reliquum abscondunt: Nec enim deuiç, neque plus constituto cadere licet: corrumpitur enim, putrescitque, si diu mansit. Preparant id, consiciuntque in Pyreum portum aduectum hoc modo. Cum in vasis coniecerint, furinamque admiscuerint, quantum longo spatio temporis: hinc etiam colorem capessit, & conditum iam incorruptum perdurat. Preparatio, casurique ita se habet. Locum Aphricæ amplum occupat, ampliohem, quam quatuor stadiorum millia in hortis Hesperidum ferunt. Sed maiorem partem colligi apud Sytes. Peculiare huius culta fugere loca proditur, quomobrem, si colatur mitescatque solum, deuiçat, atque omnino degenerat: vapore natura culturæ aspernans, ferocitatisque constans vernaculum. Cyrenenses annis septem prius, quam ipsi verba habitarent, Laserpitium extitisse affirmant. Habitant verò annos maximè trecentos vsque ad Simonidæ Athenis magistratum. Illi sic referunt. Alij radicem Laserpitij cubitalem fieri tradunt, aut paulo maiorem. Hanc in medio extuberare in caput, quod sublimè penitus extat, ut ferè super terram esse appareat. Vnde primum quod hoc appellant, erumpit: dein caulibus affurgit, ex quo magydaris, & quod folium dicitur, exeunt. Folium id semen est, 20 quod cum auster ingenue post canicula flauerit, discutitur: atque ita Laserpitium nascitur, eodemque anno radix consummatur, & caulibus. Sed hoc haud quicquam peculiare notetur: nam alijs quoque idem tribuitur. ni dixeris, quod discussum id proinus nasci potest, ortum peculiarem fortiri, supradictique propterea diuersum accipi posse. Ad hæc circumsidendum id annum censent. Nam si reliquatur semen omnine, caulèque totum proferri, & deteriora nam hæc, quam radicem reddi existimant: de-

fossa autem fieri meliora, scilicet solo subacta, benèque gluto. Sed huius contrarium illi volunt, qui culta recursare id inquit. Mandi quoque radices in aceto recens decimas referunt. Folium colore aurum æmulatur. Contrarium etiam, quod pecora folio escato purgari minimè indicant. Nam & verè, & hyeme, pecus ad montem dimittit affirmantibus non solum hoc, sed etiam altero quodam abrototo simili administratur. Vim ambo calefactoriam sortiri planè videntur, & purgare quidem nequaquam valere: exsiccare autem, & concoquere vniçè posse. Quod si qua pecus ægrefcens, aut alias minus bene se habens ingressa sit, mox eam sanari, aut emori aiant, sed magna ex parte posse feruari. Hæc igitur vero tandem sine modo, quoque rendum. Quod verò Magydaram vocant, nimirum à Laserpitio differt: tenerius enim, minusque vehemens, & sine Lasere est. necnon & aspectu manifestè experto homini constat. Nascitur in Syriam: nam apud Cyrenam, & monte Parnaso largè provenire eandem affirmant. Sed quidam Laserpitium id appellant. An culea id quomque, modo Laserpitij fugiat, querendum. Quom & si quid simile, aut proximum habeat, ad folij, caulisque rationem, & si quam vilo pacto emittat lacrymam, id inuestigare. Ergo naturam ferulaceam, hinc contemplari oportet. hæc Theophrastus. Meminit Galenus Laserpitij libro vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Laserpitij succus calidissimus est. Verum enimvero & folijs, & caulibus, & radix sat strenuè exsiccant. Sed omnia statulentæ magis essentia sunt, ac proinde concoctu difficilia. Fortis tamè imposita corpori efficaciora, & omnium potissimum succus, admodum trahentem facultatem possidens. Attram & excrementas amolendi, & liquandi vim quandam propter prædictam eius temperiem obtinet. Laseris quoque mentionem fecit, idem Galenus libro citato, sed antea scorum, & sub absoluto *scor.* hoc est, succi titulo, ita scribens. Opus, siue succus Cyrenaicus quidem omnium & calidissimus, & maximè tenuium partium est: ac proinde omnium maximè differt. quam sanè & reliqui admodum calidi sunt, & spirituos: siquidem plurima eorum pars essentia æthere est, & ignea. Porro complures habentur succi: quavis namque radice incisa, aut caule, quod ex sectione crassum, ac lentum effluit, succus est. Cæterum specialius, & velut per excellentiam quandam Cyrenæicum ita nuncupant, & Medicum, & Syriacum. Planta, quæ Græcis *αἰσίοπ.* Latinis Laserpitium appellatur: Mauritanis, Silbon: Italis, Laserpitio. Eius caulibus *μαγυδαρ* Græcis dicitur: Arabibus, Mascasles. Folia verò quandoque *μαγυδαρ* Græcè dicuntur: Arabicè, Anuiden, & Mascaslen. Li- 30 quor seu lacryna Græcis *λακρυα*, Latinis Laser nominatur. Radix *μαγυδαρ* Græcis vocatur.

*Laserpitij  
vires ex  
Galen.*

*Nomina.*

## SAGAPENVM. CAP. LXXIX.

SAGAPENVM ferulacea herbæ succusest, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser, & galbanum redolens, gustu acri. Prodest laterum, & pectoris doloribus, tussibus vetustis, conuulsis, & ruptis. crassam pulmonis pituitam expurgat. Datur comitialibus, opisthoronicis, lienosis: item contra neruorum resolutionem, perfrictiones, & febrium circuitus in potu. In vnguenta probè admittitur. menses pellit, sed foetum exanimat, cum hydromelite potum. Prodest ex vino haustum, serpentinum istibus, olfactum ex aceto vuluarum strangulatus excitat: oculorum cicatrices, offusam caliginem, hebetudines suffusionesque detergit. Resoluitur vt laser, ruta, aqua, & amaris amygdalis, aut melle, aut calido pane.

SAGAPENVM officinæ interpolato vocabulo Serapinum appellante. Cæterum etsi eius adulterati frequentior, & communis ferè sit vsus: tamen Venetijs præstantissimum quoque venditur, idq; illi præcipuè comparant seplasiarij, qui honore diuinitis anteponunt. Feruliceas plantas, ex quibus Sagapeni laryma emanat, etiam in Apulia nasci auctor est Musa Ferrariensis. Id quod equidem hæcenus compertum nõ habeo. Ex orientalibus liquidem regionibus allatum, vt constat, cæteris præstat. Arabice familiæ auctores inter dieictoria medicamenta Sagapenum referunt: quamquam ea Sagapeni facultas, quantum extat, à Græcis silentio prætermissa est. Sagapenum itaq; (vt Mesues tradit) crassos, lentosq; humores deicit, crassamq; pituitam, & aquam intercutem educit. Porro facultate quidem propria cerebrum mundificat, ac neruos, crassaq; ab his excrementa detrahit. Conferit item eorum morbis frigidis, nempe doloribus capitis diuturnis, hemicticis, comitialibus, vertigini, paralyti, orisq; distentioni. Pectus valentissimè expurgat, eiusq; ac etiam lateris dolores tollit, præsertim si bibatur ex helenij, aut rutæ decocto. Foris emplastri modo impositum, aut intus assumptum tussi diuturna vexatis, ac difficulter spirantibus, operis maximam fert. Aqua intercute laborantibus singulare remedium est, si tamen flauis myrobalanis duplicato pondere additis exhibeatur. Discute compaginat duriciam emplastri modo impositum, addito aceto, & caprarum succo. Rutæ succo, & anium rapacium

felle diutius maceratum, & in collyrijs additum, oculorum caligines difficit, aquamq; in eos defluentem cohibet. Palpebrarum item hordeolos vocatos sanat, si cum aceto superponatur. Articulorum compagines quomodolibet admotum, dolores eorum mirificè sedat: quippe quoniam valentissimè humorum lentiores in his cruciatibus excitantes radicitus euellit, etiam si in coxendicum aliarumq; partium remotis, profundisq; locis ij delitescant. Potum, aut clysteribus inditum coli doloribus à frigiditate, ac flatibus prouenientibus maximè auxiliatur. Menses cit, sed foetum interficit, tam haustum, quam suppositum: contra vteri dolores, stragulatq; prodest. Ventriculo tamen officit: verum noxa corrigitur lentissima resina, & indicia nardo. Sagapeni meminit Galenus lib. v. i. i. simplicium medicamentorum, vbi de eius viribus differit ijs verbis. Sagapenum liquor est calidus, & tenuium partium, sicut & alij liquores. Sed & absterisionem quandam possidet, qua oculorum cicatrices expurgat, atque extenuat. Quin & suffusionibus, & hebetudinibus oculorum, quæ ob humorum proueniunt crassitiem, non malum est medicamentum. Porro planta ipsa, ex qua prouenit, ferula assimilis, imbecilla, & inuulsi est. Sanè ipsa primum Sagapenum appellatur. At liquor eius abusu hoc nomen obinet, etia alia quoque multa ex nominis defectu per abusum nuncupamus. Perfectius namq; foret ipsum cognominare non Sagapenum, sed Sagapeni succum. Id *σαγαπένου* Græcis dicitur, quod Latinis etiam Sagapenum: Arabibus, Sachabeni, siue Sechbengei: Seplasiarj, pariter & Hispanis, Serapino: Italis, Sagapeno.

## EUPHORBIVM. CAP. LXXX.

EUPHORBIVM Libyca arbore est, ferula: speciem habens, quæ in Tmolio iuxta Mauritaniam inuenitur. Ea acerrimo succo turget. Cuius eximium feruorem expauescentes incolæ, ouillos ventres clutos, arbori circumligant, & eminus caulem contis incidunt, confestimque è plaga, perinde atque vase quodam, in ventriculos copiosus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum, vulnus eiacularur. Duo succi genera: vnum orobi magnitudine, sarcocolla modo emicat: alterum in ventriculis concrefcit, atque vitreum spectatur. Eligendum est translucens, & acre. Euphorbium adulteratur sarcocollæ, & glutini mistione. Sed difficile quidem experimentum: quippe cum

*Sagapeni*  
*considera*  
110.

*Sagapeni*  
*Gires ex*  
*Mesue.*

*Sagapeni*  
*Gires ex*  
*Gale.*

*Nomina.*

40

Ieiunguſtu, os accenſum diu detineat, adeo vt quicquid ori obiciatur, planè euphorbium reſpiat. Eius inuentio tempore Iubæ regis Libyæ cognita exitit. Succus illitu ſuſſuſiones diſcutit. potus tota die exurit: quare melli, collyriisq; pro acrimoniæ ratione admiſceri debet. Coxarû doloribus prodeſt in odorifera potione hauſtus. ſqua mas oſſium eadem die eximit: verum eo vtentes, neceſſe eſt linamentis, aut ceratis communicare corpus, quo oſſa cõueſtiuntur. Aliqui memoriæ prodi-  
derunt, percuſſos à ſerpente nihil no-  
leſti paſſuros, ſi incuſa oſſe tenus capi-  
tis cute, intritus ſuccus infundatur, vul-  
nûsque poſtea conſuatur.

*Euphorbij  
conſidera-  
tio.*

NON equidem dubitandum cenſeo, quin illud legitimum ſit Euphorbium, quo paſſim officinæ vtuntur, cùm tam guſtu, quàm oſſactu acerrimum deprehendatur: ob cuius violentiſſimam acrimoniã nunquam, niſi inuito ani-  
mo, à ſeplariis tunditur. Quandoquidem ta-  
metſi ſibi nares, & os omni proſuſ ingenio goſ-  
ſipio, & linteis aqua roſarum madaſactis mu-  
niant, tanta tamen eſt acrimoniæ vis tenuiſſi-  
ma, vt omniſus vnâ cum aère penetratis mu-  
nimentis, in eorum tandè perueniat nares, vbi  
moleſtiſſimû excitat ardore, qui non facile tol-  
litur: quanquam etiam medicamentis admodû  
refrigeratibus ſuccurratur. Quo ſit, vt ſolertiſ-  
ſimi pharmacopolæ baiulis, ac aliis victû qua-  
rentibus hominibus id muneris obeundum  
tradant: interim tamen certò ſciunt, non abſq;  
conſuetis, & maledictis opus hoc ab illis peragi  
poſſe. Quamobrem mirum fanè non fuerit, ſi  
qui ab arbore recentem colligunt, eximium  
acrimoniæ feruorem expaueſcentes, è longin-  
quo corticem ſeriant. Hanc plantam (vt Plini-  
us quoque teſtis eſt) adinuenit primû Iuba  
Libyæ rex in monte Atlante vltra Herculis  
columnas, appellatiueq; Euphorbium medici  
ſui nomine, & ſarris Muſæ, à quo diuus Au-  
guſtus fuit conſeruatus. Euphorbio deiectoria  
ineſt facultas. cuius nuſquam, quod equidem  
inuenierim, meminere Dioſcorides, & Galenus:  
tameñ eam minimè ſilento inuoluierunt Actius,  
& Actuarius, qui concordēs de eo his ver-  
bis diſſeruerunt. Euphorbium non modò pi-  
tuitam trahit, ſed etiam aquam, hancque vali-  
dius educit. Eſt autem acerrimum omnium,  
quæ ego nouerim, ardentiffimûmq; propter-  
ea colicis, & ventrem frigidiorem habentibus  
datur. cæteros vehementer conturbat: ſitim  
maximè ciet. Nonnihil ex odoratis ſeminibus  
ei eſt commiſcendum. Modus triobolaris, ex

*Euphorbij  
vires ex  
Actio, &  
Althar.*

aqua muſſa. Præſtat tamen cum melle cocto  
ipſum in cataportia redigere. Id quod etiã Pau-  
lus annotauit libro ſeptimo, vbi inter ea Eu-  
phorbium recensuit, quæ aquam, & pituitam  
deiciunt. Verum in ſimplicium cenſu, Dioſco-  
ridem, Galenûq; ſecutus, de hac deiectoria  
facultate ipſe quoque nihil memoriæ prodi-  
dit. Cæterum inter Arabes Meſues ſuſius Eu-  
phorbij vires tradidit in ſolentium medicina-  
rum mentione, vbi ita, ad ſenſum ſaltem ſcri-  
bit. Euphorbium gummi eſt, quod vſque adeo  
excalfacit, extenuatq; vt in hoc cætera gum-  
mi genera præcellat. Excalfacit enim ordine  
quarto: quo ſit, vt exulceret, ruborem inflam-  
mationemq; inferat, penetreret, & violenter ab-  
ſtergat. Euphorbium noxiũ admodum eſt  
medicamentum, ita vt non ſine labore, animi  
deſectu, ac ſudore frigido alium deiciat. Iocineri  
ob id, ventriculogæ ſua ingenti acrimo-  
niã magnam inferit noxiã. Quapropter exhi-  
beri minimè debet, niſi prius iis commiſceatur  
medicamentis, quæ acerrimam eius vim retin-  
dere valeant. Extrahit potum à profundis cor-  
poris partibus tum craſſam, tum lentam pitui-  
tam, mundatq; compaginum cauitates à craſ-  
ſis contumaciſſis excrementis, quæ in re-  
omnium valentiſſimum eſt medicamentũ. Ner-  
uos expurgat ab infectis iandiu humoribus.  
Proſicit ad hæc reſolutis, conuulſis, ſtupidis,  
tremulis, oriſq; diſtentionibus, & cæteris ner-  
uoſi morbis à frigore obortis, ſi ex leucoſiolo  
læuigatum exterius innungatur. Iocineri, lieniq;  
innuctum, miſcific eorum dolores tollit à fri-  
gore, & ſtatu prouenientes. Sternum tamen va-  
lentiſſimè cit. Occipiti autem conſtrictũ, ve-  
tеноſos, obliuioloſq; iuuat. Aquam intercutè  
faciliſſimè extrahit duorũ obolorũ pondere po-  
tum. Sed drachmarũ trium pondere hauſtum  
(vt Serapio, & Auicenna ſcriptum reliquerũt)  
potenter interſcific, trium dierum ſpatio ero-  
ſis ab eo inteſtiniſ, & ventriculo. Euphorbium,  
teſte Meſue, quatuor edurat annis: neque eo  
prius vtendũ eſt, quàm annum integrũ conſe-  
nuerit. nanq; recens ob ingentem acrimoniã  
reprobatur. Seruatur commodè miſio, aut ſa-  
bis, aut lentibus ſepultum. Euphorbij facultas  
paucis perſtrinxit Galenus libro v. 11. ſim-  
plicium medicamentorũ, ſic iniquens. Euphor-  
bium cauſticæ, ſive vrentis, & tenuiſſimi partiũ  
facultat eſt, alijs ſuccis ſimiliter. Et lib. 11. de  
compoſitione medicamen. localium, cap. 111.  
tradens curam hemiceriariæ, idem de Euphor-  
bio ita ſcribit. Porro de euphorbij facultate  
tam mihi relati eſt, quod citò exoluitur. quare  
in euſmodi pharmaca non vetus conſicere o-  
porteret. Diſtũ etiam recens albidus eſſe: quod  
verò inueteratum eſt, ſauioris aut pallidioris  
coloris reddi. Planta, quæ Græciſ *gophylis*, Lati-  
nis itè Euphorbiũ nomen, quæ admodum  
ſuccus eius: Mauritanis, Euforſion, ſeu Farbiũ  
Italici, Euphorbio: Hiſpanis, Alforium, Alfor-  
ſon, & Euforſio: Gallis, Euphorbe.

*Euphorbij  
vires ex  
Meſue.*

*Ex Gale-  
no.*

*Nomen.*

GALBANVM succus est nascentis in Syria ferula, quod nonnulli metopium vocant. Maximè laudatur cartilaginofum, merum, thuris effigiè præbens, pingue, minimè lignosū, retinens nonnihil adiecti feminis, & ferula, graui odore, neq; valde humidū, neq; nimis aridū. Adulteratur faba fresa, resina, & ammoniaco. Galbanū exsiccatur, vr̃it, extrahit, discutit: mēses, ac par tus trahit appositū, vel suffitū. Lentigines aceto, & nitro perunctas tollit. Deuoratur ad tussim veterē, difficultatē spirandi, suspiria, rupta, conuulsa. Aduersatur toxicis, potum cum vino, & myrrha: simili modo sumptū mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus, & furunculis: comitiales, & vuluæ stragulatū, & vertiginosus olfactu suscitatur. Si vratur, fugat nidore serpentes, & perunctos feriri nō patitur. Serpentes cū oleo, & sphondylo circumpositi, necat: dentiū dolorē oblitū, aut cauernis inditū, mitigat. vrinæ difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad portiones amaris amygdalis, aqua, aut ruta, aut calido pane, mulsæve: aliās meconio, æreusto, aut felle liquido. Si purgare Galbanum voles, in feruentem aquam demittito. nanque cū liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt: quas hoc modo facili separabis. Mundo linteo, raroq; alligatū in fictili, aut area pyxide ita pendeat, vt imum vasis ne tangat: opertoque vase in fernidam aquam demittito: sic enim syncerum, veluti per colum eliquesceat, & lignosum in linteo remanebit.

Quāvis legitimū, optimūq; Galbanum in pluribus Italice locis, præsertimque Veneriis venale reperitur, id tamen, quo passim officinæ vtuntur, nihil, vel sinè parū Galbanum refert, quod in laudatissimi genere à Dioscoride representatur. Siquidem illud nō modò ab impostoribus adulteratū est, sed etiā lignorum ferularumq; ramentis, lapidibus, ac aliis compluribus recrementis vitiatum. Quærant itaque probi sepiassarij, quod optimū est: alij verò, qui parsimonie, ne dicā auaritiæ student magis, quàm honoris, vt qui probatissimū

vix nunquā assequi possint, id saltē, quod impurum est, purgare deberēt à Dioscoride edocti, quippe quoddā ea ratione, facili ab adiectiis sordibus expurgari possit. Galbani vires tradidit Galenus lib. v. 111. simplicij medicamentorum, sic inquires. Galbanū succus est plantæ ferulaceæ, molliendi, & digerendi vi. Fueritq; sanè ex tertio ordine exsiccamentum incipiente, aut secundo completo: in desiccando verò ex secundo incipiente. Id Græcè γάρβαρον, Latine Chalbānū, & Galbanum appellatur: Arabicè, Chene, & Bezar: Italice, pariter & Hispanicè, Galbano.

## AMMONIACVM. CAP. LXXXII.

AMMONIACVM ferula succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit: cuius fruticem cum radice agalysillim vocant. Probatur bene coloratū, ligni & calculorū expers, thuris similitudine, minutis glebis, desum, syncerū, nulla sorde spurcatū, castoreū odore imitans, gustu amarū. Hoc genus thrausma, id est, friaturā appellat: quod verò terram, & calculos collegit, Phyrāma. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succū stillante ferulaceæ arbore. Mollit, extrahit, calcasit: tubercula, duritiæq; discutit: potū alui soluit, partus extrahit: lienem consumit, drachmæ pondere haustu: articularorū, coxendicorū, doloribus liberat. Auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus: itē quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cū prisanæ succo sorbeatur. Cruentā vrinam pellit, albugines oculorū absterget, genarum scabritiam absumit, tritum autem cum aceto, & impositum, iocineris, lienisq; duritias sedat. discutit tophos, qui in artubus concalluerunt, cum melle, aut cum pice illitum. Lasitudines, & coxendicum dolores eo perungi vtile est, cum nitro, & cyprino oleo, vice acopi.

AMMONIACI lacrymam officinæ, mutata vna litera, Armoniacū vocant. Cuius tamen syncerissimæ parum ad nos conuehant, qui ex Alexandria Egypti cum mercimoniis Venetiæ redeunt. Quandoquidem rarissimū Armoniacū visitur, quod suis minutis glebis thus referat. Nam omne ferē, quo officinæ vtuntur, piceæ resinæ modo in massam compactam cernitur, impurum, ac quàm plurimis impostorum adulteris vitiatum. Vt hinc facile dici posse

Galbanū  
vires en  
Galeno.

Nomen.

Galbanū  
considera-  
tū.Armoni-  
aci com-  
sideratio.

posse putauerim, hoc vel illegitimum, vel saltem deterius esse, idq; fortasse, quod Dioscoridi phyrana nuncupatur. Cuius etiam meminisse Plinius lib. x i i. cap. x x i i. vbi de Ammonia eo ita scribit. Ergo Aethiopie subiecta Aphrica Ammoniaci lacrymam fillat in arenis suis. Inde etiam nomen ab Ammonis oraculo, iuxta quod gignitur arbor, quā Metopion vocat, resina modo, aut gummi. Genera eius duo, thraustion masculi thuris similitudine, quod maxime probatur: alterum pingue, & resinosum, quod phyrana appellant. hæc Plinius. Cæterū Ammoniacum vñ sunt antiqui (vt Paulus est author) in sacrificiorum odoramentis, ac suffimentis. In quem sane vñm illud ab his receptura fuisse conticiendum est, quod electissimum, & thuri persimile extitit. Huius rei illud maximo est argumentum, quod ab ipso Paulo, itemq; Aëtio in suis medicamentis Ammoniacū thymiam, hoc est, suffimentum cognominatur, quasi Ammoniacum præstantissimū ita intelligere voluerint. Ammoniaci meminisse Galenus lib. v i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Ammoniacum liquor est ferulæ cuiusdam. Hoc habet emolliendi facultatem incensam, adeo vt & articulorum topthos dissoluat, & sienes induratos sanet, & chærdas discutiat. Quod Græci *Ammoniacum*, Latini item Ammoniacū dicunt: Mauritanici, Raxach, siue Assach: Itali, Ammoniac & Armoniac: Hispani, Agaxaque, & Armoniaque: Galli, Armoniac.

## SARCOCOLLA. CAP. LXXXIII.

SARCOCOLLA lacryma est arboris in Perside nascentis, pollini thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnera glutinat, oculorum fluxiones inhibet. emplastris inseritur. Adulteratur admisto gummi.

*Sarcocolla consideranda.*

LACRYMAM hanc Sarcocollā dixere Græci, quoniam sicuti glutinum lignum, ita hæc faciatam, exulceratamve corporis carnem agglutinet. Quæ autem ad nos aduchitur, non omnis legitima est: quippe quod ea plerūq; (vt de aliis quoq; pluribus lacrymis, resinis, & liquoribus fieri superius diximus) gummi, & alterius generis lacrymis adulterata deferatur, & talis in officinis inueniatur. Verum frans gustu facileprehenditur. quandoquidē quæ amara non est, adulterum fecit. Plinius lib. x i i. cap. x i. albam cæteris prætulit, sic inquit. Fit & ex Sarcocolla (ita vocatur arbor) gummi vtilissimū pictoribus, ac medicis, simile pollini thuris: & ideo candidum, quā rufum melius. Et lib. x i i i. cap. x i i i. idem ita scribit. Sūt quæ & Sarcocollā spinæ lacrymam putent, pollini thuris similem, cum quadā acrimonia dulcem. Cum vino tusa sistit fluxiones: illinitur in-

fantibus. Vetustate & hæc maxime nigrescit. melior quo candidior, hæc Plinius. Qui tamen in Sarcocollæ historia à Dioscoride, & Galeno maxime dissentit, cum hi Sarcocollam guttibus amaritudinē relinquere afferant, ille vero contrā dulcedinem. Sarcocolla Mauritanis pituitosis cruditates, ac crassos, & glutinosos deiecit humores, præsertim qui in compaginum, & coxendicem cauitatibus delitescunt. Cerebrum mundat, item nervos, & pulmones: proinde cussentibus, & difficulter spirantibus auxiliatur. Est etiam ex medicamentis, quæ senes iuuant, præcipue pituitosos. Caloescit tamen, qui frequentius ea vtuntur. Præstat mirum in modum ad oculorum albugines, nabeculas, cicatrices, & id genus impedimenta, si in cratere vitreo asinino lacte maceretur quinq; diebus: interea tamen nouū lac quotidie est infundendum, priore effuso. Vulneraria præterea penicilla hydromelite prius madefacta, ac inde Sarcocollæ puluere circumlita auribus exulceratis vtiliter imponuntur. Cruentis vulneribus, ac diuturnis vlceribus mirifice medetur: quippe quæ proprio suo munere ea à sordibus mitter, carne repleat, cicatriceq; obducatur. Aluū tardè deiecit, perturbatq; eos, quorum ventriculi bile redundat: quare caendum est, ne exhibeatur. Roboratur eius deiectionia faculas, gin giberæ, & cardamomo additis. Hæc ex Arabibus depròpsimus. quæ finē tam antiquis, quā recentioribus incognita fuerunt, vtpote qui ea nusquam, quod equidē legerim, scriptis tradiderunt. Sarcocolla vires retulit Galenus lib. v i i. simplicium medicamentorum, vbi ita scriptū reliquit. Sarcocolla lacryma est arboris Persicæ. mistam vim habet ex emplasticā quadam substantia, & pauca amara. Itaq; citra morsum desecat, ac proinde glutinare vulnera valet. Lacryma, quæ ex Arabia Græcis, Sarcocolla item Latinis, & Italis appellatur: Arabibus, Anšarot, Anazarot, seu Anzurut: Hispanis, Lancarotes: Gallis, Sarcocolle.

## GLAUCIUM. CAP. LXXXIII.

GLAUCIUM succus est herbæ, quæ ad Hierapolim Syriæ nascitur, foliis ferè corniculati papaueris, pinguioribus tamen, in terram sparfis, odoris teretri, gustus amari. tota croceo succo madet. Folia in olla scitili semisfrigida clibanis calfaciunt indigenæ, vsque dum flaccescat: deinde contusis succū exprimunt. Cuius est vsus ad oculorū medicamentum, vtpote cum inter initia refrigeret,

GLAUCIUM medicorum, & officinarum vulgo, qui barbarorum, & Arabum nomina vñsare solet, Serapionis, & Auicennæ modo, Memitis dicitur. Id autem, quo passim seplasiarj vtuntur, meo quidem iudicio, verum

*Sarcocolla vires ex Arabibus.*

*Ex Galeno.*

*Nomina.*

*Glaucofiterio.*

syncerumq; Glaucium est. Quippe quod omnibus ferè notis, & facultatibus legitimo respondeat. Præter id enim, quòd factio periculo, oculorum vitiiis opitulatur; forinsecus rufescit, intus verò croceo colore spectatur, & gustu amaro sentitur cum quadam graueolentia. tamen si pharmacopolas nonnullos quandoq; deprehenderim, qui è maioris chelidonii succo Glaucium conficiunt. Sed animaduertendum est, quòd in Serapionis codice, præter proprium Memithæ caput, quod Dioscoridis est Glaucium, legitur etiam in capite de Curcuma (nisi fortasse interpretis fuerit lapsus) Chelidonium minus vocari Memithe. Quòd in Serapione vel interpretis, vel alterius culpa, mendum subest, inde mihi quiddè orta est suspicio maxima, quòd Dioscorides, cuius verba ad vnguem refert Serapio, Glaucij non meminere in Chelidoniis. Quo factum est, vt illi seplasiarj deprauata Serapionis lectione decepti, in hunc & alterum errorè inciderint: quòd nò solum ex chelidoniis suum Glaucium eliciant; sed etiam maius chelidonium minoris loco sumant, quandoquidem illud succum croceum mittat Glaucio similem. Glaucij facultates memorie prodidit Galenus libror. i. simplicium medicamentorum, si inquit, Glaucium adhibere cum quodam fastidio. Tū adeò manifestè refrigerat, vt solum sepe erysipelata, vtq; si valentia non fuerint, curare possit. Mixture eius composita est ex aquea terræq; substantia: vtraq; sanè frigida, verum non summe, sed cetū aqua fontana. *Traximus* sic Græcè, vt etiam Glaucium Latine dicitur: Arabicè, Memithe.

## GLUTINVM. CAP. LXXXV.

GLUTINVM, quod xylocollan, alij taurocollan vocant, præstantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis coriis conficitur. Id candidum est, & trāslucens. Nigrum verò minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines, leprasque cutis delet: ambustis igni ex aqua calida dilutum, illitumq; pustulas eripere non patitur. Vulneribus prodest melle, aut aceto madefactum.

## PISCIVM GLUTINVM. CAP.

## LXXXVI.

PISCIVM gluten, venter est piscis cetacci. Præstat cādicans, natione Ponticum, subasperum, minimè scabrum, & quod celerrimè liquefcit. Vtile emplastris capitis, & leprarum medicaminibus, & tetanothriss, quæ cutem faciei erugant, & extendunt.

NEMO est, qui taurinū, & pisciū Glutinum

non cognoscat: quare hæc in re non pluribus verbis opus est. Verum sciendum, quòd Glutinum taurinum hæc ætate non modò è taurinis coriis conficitur; sed ex omnium quadrupedum pellibus. Huius, neq; alterius non reperi meminisse Galenum in simplicium celsu. quāquam inibi libro VII. illius glutinis librarj mentionē fecerit, quòd ex polline farinæ, & muria paratur, sic scribens. Gluten, quod ad libros præparant ex similitudine, & garo, emplasticæ, concoloriæq; facultatis est, quibuscunq; ipsum partibus illinas. Cæterum illud gluten, quod è piscibus fit, inter cætera simplicia Paulus quiddè retulit, sed ea tantum ferè de eo scribit, quæ Dioscoridi accepta referri possunt. Id Græcis *νῆμα*, *νῆμα*, & *ταυρινῆμα* vocatur, quod Latinis Gluten & Glutinū: Italis, Colla di carniccio: Hispanis, Colla, & Grudel. Quæ verò Græcè *ἰσχυρῆμα*, Piscium glutinum Latine dicitur: Italicè, quemadmodum & Hispanicè, Colla di pesce. Arabicè vtrunq; gluten Zire, seu Gara nominatur: Germanicè, Leim: Gallicè, Colle de poisson.

## VISCVM. CAP. LXXXVII.

VISCVM optimum est recens, intus porraceum, extrā fulvum, quod asperi nihil, aut fursurosi conceperit. Fit taci-  
njs in quercu nascentibus, buxæ fruticis folio. Contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquant. Sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo, pyro, & plerisque aliis arboribus. quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollit, discutit, extrahit. parotidas, tubercula, cæterasque collectiones ad maturitatem perducit, cum resina & paricera mistum: epinyctidas in splenio sanat: vetera vlcera, abscessusque, quos cacoethes vocat, ex thure mollit. Lienè cū calce, gagate, aut Asio lapide coctū, & impositū absumit: cū sandaraca, aut auripigmēto illitū, vngues extrahit. mīstū cū calice, & vini facie suā vim intēdit.



VISCVM fit pluribus, ac diuersis modis. *Visci com- sideratio*  
Verum

*Glaucij Si-  
militudo*

*Nomina.*

*Glutini  
considera-  
tio.*

*Nomina.*

*Visci com- sideratio*



Verum omnium præstantissimum est, quod è granis in quercu nascentibus conficitur. Huius præter id, quod inualidum in pyris, malisque nascitur, ingens in Hetruria prouenit. Siquidem inibi non modo in quercu laudatissimum prouenit, sed etiam in cerro, ilice, & castanea, in nostris præsertim maritimis Senesibus, ubi vastissimæ asurgunt syluæ, quæ non paruo pretio is locantur, qui viscum efficiunt. Scandunt autem illi arbores immensas, non sine magno vitæ suo periculo, sæpiusque funibus adaligati id muneris in aëre pendentes obeunt. Grana, quæ legerunt, in aqua decoquunt, donec disframpantur: postea contundunt, & tandiu lauant in aqua, quousque furfuracea excrementa eximant. Refert Plinius, nasci Viscum in quercu tantum, robore, ilice, syluestri pruno, terebintho, pinu, & abiete. At in Hetruria gignitur etiam in castanea, quod optimum est malo, ac pyro, non tantum syluestri, sed etiam domestico, quanuis penitus inutile. Visci maxima Hetruscis utilitas est: nam præter eius usum in aucupis, quibus mirum in modum delectantur ob ingentem turdorum copiam, qui autumnii tempore, in syluis quibusdam ex iuniperis arte constructis, eo capiuntur, id etiam in primis utile est vitibus muniendis, ne prima germinatione ab erucis, quibus omnia sciant, gemmæ deuorentur. Siquidem agricolæ Viscum vites omnes circumdant, quo postea erodentes vermculi, qui tam præstantissimo latice insidiantur, è terra sursum petentes, merito implicantur. Quod cum perpexisset natura omnium rerum parens, visci multum Hetruriæ largita est, ne hanc ob pestem vino destitueretur. Visci fructu vescuntur turdi, præcipue magni, quos nostri vulgò turdellæ appellant. Quorum stercore visci semine pleno inficiuntur, & feruntur arbores, in quibus pernoctant, & victitant: è quo tãdem semine nascitur planta, quæ viscum creat. Vnde scitè à Plauto dictum est. Turdus exitium sibi cacat. Ceterum Viscum per se non est arbor, sed in arboribus uiuit, fronde plerunque perpetua. Id quod etiam testatur Virgilius libro v. I. Aeneidis, cum inquit.

Quale foler sylvis brumali frigore Viscum  
Fronde virere noua, quod non sua seminat arbos.

Proinde Plinius libro x v. i. cap. ultimo ita scriptum reliquit. Quædam enim in terra gigni non possunt, & in arboribus nascuntur. Nanque cum suam sedem non habeant, in aliena viuunt, sicut Viscum. Omnino enim factum nullo modo nascitur, nec nisi per alium auium redditum, maxime palumbis, & turdis. Hæc est natura, ut nisi maturatum in ventre auium non proueniat, hæc Plinius. Quæ ante ipsum memorauit prodidit Theophrastus libro i. i. cap. x x i. i. de plataru causis, unde illa mutuatus est Plinius. Porro id, quod in pinu, & abiete nascitur, quod (ut Plinius inquit) itelium Eubœa dicit, hippocar Arcadia, frequentissimum

in Tridectino agro in vallibus Ananix syluis conspicitur, ubi ingens turdellarum copia victitat. Sed hoc ad aucupia profusum inutile est: decoctum enim, & deinde elotum omnem amittit lentorem. Quod autem in pinu, abiete, amygdalo, malo, pyroque prouenit, perpetua fronde virescit. Id verò contrà, quod quercui, robori, & castaneæ innascitur, viret, cui appetente hyeme omnia folia decidunt. Huius rei causam reddere tentauit Theophrastus loco paulo antè citato, cum ita scribit. Viscum aliud folio esse perpetuo, aliud deciduo, haudquaquam absurdum est. Siquidem aliud virentibus semper arboribus, aliud frondem amittentibus insidet. fit enim, ut in his careat alimento, in illis habeat, quantum abunde sit. Causa enim perpetuæ, deciduæ frondis hæc est, quemadmodum diximus, hæcenus Theophrastus. Verum enimuero hæc Theophrasti sententia non omni ex parte probanda videtur, quippe quoniam vniuersum Viscum, quod in amygdalo, pyro, maloque in Italia prouenit, tam æstat, quam hyeme fronde perpetua virescit, cum tamen hæc arbores hyeme frondibus destituantur. Quid sit, ut aliunde et huius rei causam petendam existimem. Fit præterea Viscum auculis tantum capiendis commendatum, in Syria ex myxis, quæ Aphris Sebestena dicuntur, ut libro primo in prunorum mentione de iis differentis retulimus. Vtuntur hoc Insulares suis in aucupis, quod arboræo visco careant, illud è Venetis deferunt, quod primum ex Damasco Syriæ aduehitur: unde Damascenum vocatur. Sed id querno bonitate cedit. Fit quoque Viscum è quarundam arborum radicibus, agrifoli præsertim, & viburni, quarum etiam arborum historiam libro primo pasci, & rhois commentariis inseruimus. Qui autem ex huiusmodi arboribus viscum consiciunt, cortices radicum sumunt, effosque strobile inter: suarum arborum frondes humido solo sepeliunt, ibique tanto tempore dimitunt, quoad computrescant: mox eximunt, & tandiu in pila contundunt, donec lentorem concipiant: deinde aqua calida lauant, & manibus commiscunt. Hæc etiam ratione quibusdam in locis fit ex ibisi radicibus. Sunt qui querni visci lignum in tenuissimum puluerem redigant, & comitialibus hauriendum præbeant, quo tantum medicamento multos fuisse sanatos pro certo affirmant. Sed noui ego complures, morbi, & medicamenti prorsus ignaros, qui ligni loco Viscum ipsum in carapocis deuorandum dederunt. Visci meminit Galenus libro v. i. simplicium medicamentorum, ubi de eius viribus differitiis verbis. Viscum ex plurima aërea, & aquea calida, paucissima terrena subtilitate constat. Nam armonia in eo amritudinem excellit. Itaque etiam affectus subtilitæ respondet. Siquidem valenter ex alto humores extrahit, nec eos tantum tenues, sed & crassiores, eosque diffundit, ac digerit. Est autem ex eorum genere,

Visci  
Hetrurici  
truria.

Theophrasti  
sententia non ac-  
cepta.

Vici Gires  
ex Galena.

quæ non protinus post primam appositionem exalfaciunt, sed quæ tempus requirunt, velut thepsia. Sed & supra communimus, inesse calidis facultate medicamentis, vbi largum con-  
*Nomina.* creta humorem recrementitium. Nomen illi Græcum, ἰσὴς: Latinum, Viscum: Arabicum, Dabach, seu Dibach: Italicum, Visehio, & Pania: Germanicum, Vogel heim: Hispanicum, Visto: Galicum, Guy.

† Nulla hic in Græcis codicibus sit acino-  
 rum mentio, sed hæc tantum leguntur. *viscra*  
*in vobis nascitur nigropolis.* hoc est. Fit ex quodam  
 fructu rotundo. Cui etiam lesioni adscriptur  
 Serapio. Sed incerpres videtur fecutus Plinium,  
 qui libro x v l. cap. ultimo sic inquit. Viscum  
 fit ex acinis, qui colliguntur messium tempo-  
 re immaturi.

APARINE. CAT. LXXVIII.



APARINE  
 ramis multis, &  
 paruis fruticat,  
 asperis, quadrā  
 gulis, per inter-  
 ualla orbicula-  
 to foliorū am-  
 bitu, vt in ru-  
 bia: flos albus,  
 semen durum,  
 rotundum, con-  
 cauum, album,  
 vmbilicifigura,  
 asperitate vesti-  
 tum tenaci. Ea

paiores coli vice vtuntur ad eximen-  
 dos è lacte pilos. Seminis, caulium, ac  
 foliorum succus, potu contra vipera-  
 rum, phalagiorumque morsus auxilia-  
 tur: infusum aurium dolori medetur.  
 Herba cum axungia trita, strumas  
 discutit.

*Aparines  
 confidera-  
 tio.*

APARINE nusquam non prouenit, sed  
 præsertim (vt Theophrastus inquit) inter len-  
 tes. Itali hanc vulgò vocant Speronella, quod  
 folia circa caulem ad calcarium stimuli modum,  
 asserici instar proferat. Tactu hæc asperissima  
 est, quapropter cum adoleuerit, aringentium  
 vellibus pertinaciter hæret. Huius succum ma-  
 gnificiunt quidam ad recentia vulnera gluci-  
 nanda, & ad papillarum rimas. Aparines me-  
 minit Galenus libro. v l. simplicium medica-  
 metorum, vbi sic breuiter inquit. Aparine, qui-  
 dam philanthropon, alij omphacocarpum co-

*Aparines  
 vides et  
 Galeno.*

gnominant, modicè extergit, & desiccatur: ha-  
 betque nonnihil subtilium partium. Herba hæc  
 Græcis ἀμαρῖς vocatur: Latinis similiter Apa-  
 rine: Italys, Aparine & Speronella: Germa-  
 nis, Klebkraut: Hispanis, Prefera: Gallis, Gra-  
 teron.

ALYSSVM. CAP. LXXXIX.

ALYSSVM exiguus frutex est, vni-  
 caulis, subasper, rotundis foliis: fructu  
 duplicium scutorum effigie, in quo est  
 semen quadantenus latum. In monti-  
 bus, & asperis locis emicat. Eius deco-  
 ctum singultus sine febris potu discutit:  
 idem efficit, si quis eam aut teneat, aut  
 odoretur, cum melle trita vitia cutis in  
 facie, & lentiginis emendat. Contusa  
 in edulio rabiei canis mederi putatur.  
 domibus appensa salutaris esse credi-  
 tur, & hominibus, atque brutis fascini  
 amuletum. Purpureo linteo circumli-  
 gata, pecorum morbos abigit.

ALYSSVM varia est apud authores historia. *Alyssum com*  
 Nam si Plinio est adhibenda fides, Alyssum ea *sideratib.*  
 planè fuerit herba, quam Rubiam mi-  
 norem vocamus: quæ quidem, præterquam quod  
 folia ferat longè minora, proflus Rubiæ similis  
 constat. Quod autem Plinio hæc Alysson sit,  
 eius verba declarant libro x x l i l. cap. x i.  
 vbi de erythrodano ita scribit. Erythrodanus,  
 quam aliqui erythrodanum vocant, nos Ru-  
 biam, qua tinguntur lanæ, pellesque perfici-  
 untur, in medicina vrinam ciet. Morbum re-  
 gum sanat ex aqua multa: & lichenas, ex ace-  
 to illita: & ischiadicos, & paralyticos, ita vt  
 bibentes lauentur quotidie. Radix, semenque  
 trahunt menses, aluum solunt, & collectiones  
 discutunt. Contra serpentes rami cum foliis  
 imponuntur. Folia & capillum tingunt. Inue-  
 nio apud quosdam morbum regium sanari hoc  
 fructu, etiam si adalligatus spectetur tantum.  
 Distat ab eo, qui Alysson vocatur, foliis rotundis,  
 & ramis minoribus. Quippe nomen accepit,  
 quod à cane emorsus rabie sentire non paratur,  
 potus ex aceto, adalligatusque, hæcenus Plinius.  
 Quem facile quis suspicari posset, Dioscoridis  
 Alyssum reddidisse, eo ductus argumento, quod  
 is statim post aparinem, quam rubiæ similem  
 fecit, Alyssum descripsit: nisi omnibus serè  
 notis hoc à rubia minore differre perspicuum  
 esset. Siquidem Dioscoridi Alyssum foliis est  
 rotundis, fructu duplicium scutorum effigie,  
 in qua semen quadantenus latum, in montibus,  
 & asperis locis nascitur. Quæ sanè omnia in mi-  
 nori Rubia desiderantur. Quod præterea  
 Dioscoridi,

Dioscoridi, vt Plinio, Rubia minor non fit Alyf-  
 fum, ex eo apertè cognoscitur, quòd è infra de  
 maiori, & minori Rubia, eodem capite tracta-  
 uerit. Id quod minimè quidem fecisset, si nul-  
 lam iudicasset inter minorem rubiam, & Alyf-  
 sum intercedere differentiam. Quare vel Plini-  
 um hac in re hallucinatum, vel diuersum à  
 Dioscoride Alyssum accepisse crediderim. Por-  
 rò magis adhuc Alyssi historiam ea confunde-  
 re mihi videntur, quæ de eo posteritatis me-  
 moria prodidit Aëtius, cum inquit, 10  
 eam herbam esse aiunt, quam Heracleam sidi-  
 ritum vocant, quæ propter vias vbique nasci-  
 tur, purpureo flore, folijs crassioribus. Nomen  
 traxit, quòd à cane rabido emoritis mitum in  
 spodem opitaletur. His verbis Aëtius non solum  
 non refertur Dioscoridis Alyssum depre-  
 henditur, sed neque etiam satis exprimere,  
 quam sideritum pro Alyssio intelligat. Nam cum  
 tres sint siderites à Dioscoride monstratæ, qua-  
 rum dux, prima scilicet, & vltima, heracleæ  
 vocantur, non equidem scire possum, an pri-  
 mam, vel vltimam in suum Alyssum receperit  
 Aëtius. Florem squidem purpureum habet si-  
 deritis Dioscoridi postrema, in vineis, & ma-  
 ceris nascens, solum tamen non crassum, sed  
 tenuem, coriandri modo, in ambitu lacinia-  
 tum, vt eam planè referat plantam, quam vul-  
 gus herbariorum Raberum appellat. Huic  
 postremo, vt alijs quoq, non consentiunt quæ  
 de Alyssio testatur Galenus libro 1. de Antido-  
 zis, vbi nonnulla Asclepiadis medicamenta ad  
 rabidi canis morfus commemorat. Alyssum,  
 inquit, herba est marrubio adsimilis, asperior  
 tamen, & magis aculeata circa orbiculos: flo-  
 rem ad cæruleum vergentem profert. Hanc  
 sub canalicula astu colligere oportet: excicata  
 contundi, cribrari, & seruari debet, ne diffle-  
 tur. Ex his Galeni verbis palam est, Alyssum ab  
 eo ex Asclepiade descriptum, potius primam,  
 quam vltimam sideritum referre. Cum igitur  
 varia admodum sit de Alyssio authorum sen-  
 tentia, cumque eius historia tam varia, incertæ  
 que habeatur, difficile quidem fuerit asserere,  
 quamnam plantam Alyssum legitime vocari pos-  
 sit. Ruellius tamen eam plantam, quam herba-  
 rij (vt ipse ait) syluestrem cannabinam vocant,  
 putat esse Dioscoridis Alyssum, vel ad ipsum  
 propius accedere. Quod, ne semper aliorum  
 errata corrigere videar, iis diiudicandum re-  
 linquo, qui in simplicium historia etiam me-  
 diocriter versari, hæc & maiora diiudicare pos-  
 sunt. Ceterum Alyssum à Galeno ex Asclepia-  
 de repræsentatum, in Italia prouenire non  
 equidem inficiat, neque illud similiter, cuius  
 meminit Aëtius. Sed quod horum in vsu me-  
 dico probandum, vel reprobandum sit, non fa-  
 cile decernere auiam, quamquam à Galeno nun-  
 quam discendum putauerim. Qui præterea  
 Alyssi facultates tradidit libro 1. simplicium  
 medicamentorum, his verbis. Nuncupata est  
 hæc herba Alysson, quòd misceat iuuat demor-

fos à cane rabido. Sed & rabienti quoque da-  
 ta, sæpe in totum sanauit: atque hoc ex totius  
 substantiæ similitudine efficit. Dictumq, prius  
 est talem facultatem ex sola percipi experi-  
 entia, & planè nulla constare methodo. Quòd si  
 quis ad multa experitur, cognoscat facultatem  
 habere mediocriter siccificam, & digerentem,  
 cum hoc vt absterforium nonnihil etiam ob-  
 tineat. Hac ratione & vitiliginem, & maculas  
 faciei à sole prognatas expurgat. Herba, quæ  
 10 *ἄλυσος* Græcè, Alyssum quoque Latine dicitur: *Nominis*  
*Italice, Alisso.*

ASCLEPIAS.

CAP. XC.

ASCLEPIAS, ramos emittit lon-  
 gos: folia hederæ, longa: radices nume-  
 rosas, tenues, odoratas: floris virus gra-  
 ue: semen securidacæ. nascitur in mon-  
 tib. Radices ex vino potæ tormini-  
 bus auxiliantur, & contra serpentium  
 20 ietus. Folia aduersus vuluæ, mamma-  
 rumque vlcera, quæ cacoëthe vocant,  
 illinuntur.

FALLUNTUR, mea quidem sententia, qui  
 30 Asclepiadis vice, quam in montibus nasci tra-  
 didit Dioscorides, necnon etiam Plinius, eam  
 herbam accipiunt, quam vulgares quidam chi-  
 rurgici Hederam terrestrem nominant: quæ  
 plerumque secus vias nascitur, & perpetuo lu-  
 mi serpit folijs rotundis, aspersis, per ambitum  
 quadaatenus ferratis, longo tenuique funiculo  
 appendis: floribus exiguis, in purpura albican-  
 tibus: radicibus tenuissimis. Siquidem præter  
 quam quòd Dioscorides scriptum non reliquit  
 40 Asclepiadam in viis publicis nasci, nusquam etiam,  
 quod legerim, prodidit eandem tam longo re-  
 pere tractu, & folia rotunda proferre. Nec mi-  
 nus etiam, vt equidem arbitror, hallucinantur  
 ij (pace tamen Fuchij eruditissimi dixerim,  
 quem constat ex suis commentariis hanc ha-  
 buisse sententiam) qui putant Asclepiadam  
 esse plantam, quam vulgus herbariorum Vin-  
 cetoxticum vocat, quæ frequenter in saxosis,  
 & asperis locis prouenit, læui admodum cau-  
 50 solis lauro acutioribus: flore albo, muscoso: cor-  
 niculis tenuibus, oblongis: radicibus innume-  
 ris, albicanantibus. Quandoquidem huius cauli to-  
 lia, tum radices nullo odore commendantur:  
 flores virus aliquid non redolent: semen non  
 est securidacæ simile. Adde etiam, quòd ex Ori-  
 bafij lectione Asclepias non profert folia lon-  
 ga, cui subscripsit Marcellus interpretes, fretus  
 fortasse, vt solet, probatissimis exemplariis.  
 Præterea antiquissimus codex manu scriptus  
 de radicibus non legit *ῥωμῆς*, hoc est, multas,  
 sed tantum *ῥωμῆς*, *ῥωμῆς*, id est, tenues, odora-  
 tas. Sunt tamen qui Vincetoxticum hoc vene-  
 nis maximè aduersari scribant: quin & fractis, &  
 ab alto

*Asclepa-  
 dis confi-  
 deratio.*  
*Quorum-  
 dam la-  
 psum.*

*Fuch. er-  
 ror.*

*S'aria de  
 Alyssio sen-  
 tentia.*

*Ruellij er-  
 ror.*

*lyfi Gi-  
 ex Ga-  
 no.*

ab alto deuolutis auxiliari, si contritæ in puluerem radices ex vino fumantur. Has præterea laudibus efferrunt ad mammas à partu turgentibus, præsertim ubi lac in eis coierit, in quorum visu radices ipsas decoquant, quas deinde cum polenta mammas illinunt. Sed perperam, quod hoc Asclepiadis sit proprium. Cæterum non desunt, qui illam humi repentem herbam, de qua antea diximus, pluribus celebrant facultatibus, præsertim ad thoracis, & intestinorum vulnera, quamobrem portiones ex ea magna opinione faciunt, & succum eius in vnguentis ad mitterent, namque vulneraria est, & glutinatoria. Asclepiadis meminit quidem Galenus lib. v. i. simplicium medicamentorum, sed nihil de eius viribus differens, sic tantum inquit. In tertio Dioscorides de hac herba conscripsit. at nos eius nondum periculum fecimus. Ea Græcè *Asclepias*, ut etiam Latine Asclepias nominatur Italicè, Asclepiade.

Nominat.

#### ATRACYLIS. CAP. XCI.

**ATRACYLIS**, spina est cnico similis, folia multò longiora ferens in summis virgis, magna parte nuda, asperaque, qua femina pro suis vtuntur. capitula in cacumine spinis horrent: flos luteus, quibusdam in locis purpureus inuenitur: radix tenuis, superuacua. Coma, semen, & folia cum pipere, & vino teruntur vtilissimè contra scorpionum ictus. Percussos tradunt, quando ea teneant herba, nullum experiri dolorem, ipsumque deposita statim recrudescere.

*Atracylis* ERRANT haud dubiè, ut mea quidem fert opinio, Ruellius, & Hermolus: quippe qui existimauerint Atracylida esse Cnicum sylvestrem, cuius primo loco meminit Theophrastus libro v. i. capite 1111. de plantarum historia. Siquidem magnam ego inter sylvestrem Cnicum, & Atracylida inuenio apud Theophrastum esse differentiam. Quod ut omnibus perspicuum esse possit, his præsertim, qui aliter sentiunt, hic Theophrasti verba de Cnico, Acarna, & Atracylide subiiciam. Cnicum, inquit, sylvestris, vrbanoque discernitur. Sylvestris genera duo vocantur: alterum vrbano admodum simile, recticaulis tamen: quamobrem eo mulierum præscarum nonnullæ pro colu vtebantur. fructum nigrum, maiusculum, amarumque parit. Alterum genus densum constat, caulesque soncheos profert, quodammodo humicau le situm propter foliorum mollicitam declinatur, procumbitque ad arua. fructum amarum, frequentem, barbaque modo hirsutum gignit. Sunt ambo feminosæ, verum sylvestre copiosius fert. Eius peculiare præ aliis sylvestribus

est, quod illa duriora, spinosioraque: vrbans proveniunt: hoc autem mollis, ac lauius constat. Acarna quoad simpliciter ratione exprimi licet, aspectu cnico vrbano similis est, colore flauicans, succo pinguis. Fufus agrestis (sic enim Atracylida Latini nominant) his candidior est: habetque peculiare, quod in foliis euenit. decerpit enim, canique allata, succum sanguineum effundunt: qua de causa *gros*, id est, cruor à quibusdam spina hæc est nominata. grauis etiam odore, cruoremque representans. Serò perficit fructum, autumno enim, & quidem à totum (ut summatim proponam) vniuersa spinaceorum natura fructus ferotina existit. hæc Theophrastus. Ex quibus verbis facillè cognosci potest, in Atracylidis historia aperte aberrat Ruellium, cum in tertio suo de natura stirpium libro asserit, fufum agrestem, hoc est Atracylida, nil aliud esse Theophrastum, quam primum Cnici sylvestris genus, vt pote qui non animaduertit, quod Atracylis Theophrasto alia est à Cnico sylvestri planta: quamquam illi fortasse non abissimis, & cui ea tantum inest proprietas, ut è foliis succum sanguineum fundat: id quod nullo Cnici generi tribuitur. Errandi ei occasio nem, meo quidè iudicio, præbuit Plinius, quod lib. x. x. i. cap. x. v. sylvestrem Cnicum à quibusdam Atracylida vocari tradiderit. Vbi postquam commemorasset nonnullas spinosas plantas, quibus Aegyptij in cibis vtuntur, de Cnico tandem in hunc modum differuit. Multas præterea, inquit, ignobiles habent plantas. Sed maxime celebrant Cnicum Italicæ ignoram, ipsi autem oleo, non cibo gratam. Hoc faciunt ex semine eius. Differètia prima sylvestris, & sativæ. Sylvestrium duæ species, vna iucior est, simili caule, tamen rigido, exilis. Itaque & pro colu antiquæ mulieres vtebantur. quam quidam atracylida vocant. Semen eius candidum, & grande, amarum. Altera hirsutior, tosiore caule, & qui penè humi serpat, minuto semine. hæc Plinii verba. Quæ est quidem certam fidem faciunt, primum sylvestris Cnici genus à quibusdam Atracylida fuisse vocatum, non tamen propterea affirmant, Atracylim esse Cnicum sylvestrem. Atracylidis deinceps speciatim meminit ipse Plinius ca. x. v. i. eiusdem libri, cum inquit. Acarna colore tantum rufum (a scolymo scilicet) distinguitur, & pinguiore succo. Idè erat Atracylis quoque, nisi candidior esset, & nisi sanguineum succum funderet. qua de causa phonos vocatur à quibusdam. Odore etiam grauis, serò maturescente semine, nec ante autumnum. quamquam id de omnibus spinosis dici possit. hætenus Plinius. Ex his igitur omnibus merito colligendam esse putauerim, legitimam Atracylidem nullum esse sylvestris Cnici genus, sed aliam per se plantam, nempe illam, qua pro suis præferre vtebantur mulieres. Quod sane animaduertens Theodorus sui Græci idiomatis peritissimus in Theophrasti versione, Atracylida fufum agrestem interpretatur, non autem colum

*Atracylis*  
*dis consi-*  
*deratio.*  
*Ruell.*  
*Hermolus*  
*errant.*

colum, vt primum agrestis Cnici genus vertendo, ex antiquo ad colos vsu, id Colum agrestem rectè cognominari posse monstrauit. Quam in re is plane declarasse videtur, priscas mulieres agrestis Cnici coli uice fuisse vsas, fusorum verò loco ipsa tantum Atractylidis. Cæterum hactenus in Italia, vt ingenue fatear, Atractylida non inueni, neque eam ab aliquo repertam esse scio. quanuis non iuro inficias, quin ea possit etiam in Italia nasci. Equidem plures vidi plantas aculeis horrentes, quæ illius notis pulchrè respondebant: artamen ex iis nullam vnquam nactus sum, quæ foliis carni adhibitis sanguineum succum funderet. Creditur Ruellius alteram Cnici syluestris speciem eam nimirum esse stirpem, quam herbariorum vulgus Carduum benedictum, vel sanctum appella. Quam profecto opinionem haudquaquam improbandam puto. quandoquidem Carduus benedictus vocatus solo procumbit densa foliorum coma, & quodammodo huncaulis cernitur. quin etiam fructum gignit amarum, barbaq; modo hirsutum: & caules proferre sonchi modo rubentes. Vt ex iis notis accuratius expensis, quibus profus conuenit Carduo benedicto cum altero Cnici syluestris genere, nil mirum si cogor mutare sententiam, & hoc quod aliis negaueram, nunc plane altere non dubitem. Sed certe Ruellium mirari subit, quod tam facile asseruerit Carduum benedictum vocatum sanguinem ex se fundere. Nam etsi ego millies periculum fecerim, nunquam tamen euulso folio, vel ramulo sanguinem è vulnere profluere comperi. Præterea si concedamus, quod Ruellius vera referat, id maxime ipsius repugnabit sententia, cum tam Theophrasto, quam Plinio nullum Cnici genus sanguinem fundat: quoniam id Atractylidis est proprium. Hinc itaque palam fieri arbitror, Ruellium, alioqui doctissimum, turpiter confudisse Atractylidis historiam. Quippe si, vt suam tueretur sententiam, asserere voluisset, Atractylida esse primum syluestris Cnici genus, illud quidem succum fundere sanguinis instar scribere debuisset, non autem hoc, quod Carduum benedictum esse censens. Neque etiam mihi, vt libere liceat quod quisque sentit dicere, placeat Fuchij opinio. qui libro primo de compositione medicamentorum, & insuis de plantarum historia commentariis, Carduum benedictum vulgò nominatum Atractylidem hirsutiorem esse existimat. hirsutiorem dixi, quoniam is duas esse constituit Atractylidis species, nempe minorem alteram, alteram hirsutiorem: tamen eum Dioscorididum Theophrastum Atractylidis vnum duntaxat sit genus: quod, quantum reor, Carduus benedictus non est. Siquidem hic nec sanguineum succum fundit, nec in imis virgis vnquam visitur nudus: quinimò virgas non proferre, sed caules lentos, quibus humi serè reptat, vel potius solo procumbit. Sed postquam in hac nostra Atractylidis, & Cnicorum syluestrium disquisitione-

ne, sermo incidit de Carduo benedicto, non ab re hic de miris eius atque excellentibus dotibus nobis differendum est. Est igitur CARDUUS benedictus ita vulgò nuncupatus, planta nullis hoc

*Cardui benedicti vires.*

CARDUUS BENEDICTUS.



tempore non cognita. Scriitur primum in hortis, saporem admodum amaro, quod terreis coëst partibus calore quodam attenuatis. Magni nominis, magnæque existimationis planta est non modo apud Italos, sed etiam apud exteras nationes, præsertim contra pestilentiam: item ad uersus venena lethalia, tã interius sumpta, quàm venenosorum animalium ictibus, aut moribus imposita. Sanantur hac herba quartana laborantes, aut aliis febribus detenti quarum accessiones cum frigore adueniunt. Id enim præstatur hausto eius decocto, aut stillatili aqua, aut pulueris drachma pota. Præstant eadem comitialibus infantibus eodem modo bibita. Herba decoctum ex vino sumptum illum, & renum dolores mulcet, & cætera ventris tormina sedat: sudorem cit, alui tineas necat, & vteri vitia auxiliatur. Herba ipsa tam recens, quam secca & pota, & exterius admota, contumacia vlcera, & quæ cacoethe vocantur, sanat, cureque obducit. Quamobrem decoctis miscetur, quæ è ligno Guaiaco ex vino, & aqua iis parantur, quos lues Gallica corripuit. Planta, quæ Græcis ἀπὸ δυνάμεως, Latini irem Atractylis, & Fusus agrestis appellatur: Italici, Atractile.

*Nomina.*

POLYCNEUM.  
CAP. XCII.

POLYCNEUM, frutex est furens, foliis origani: caule, vt pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris, & acris. Vulneribus agglutinandis recens, aut aridum, cum aqua efficaciter illinitur: sed quinto die solui debet. ad vrinæ stillicidia, ruptaque cum vino bibitur.

*Ruellia.*

*Fuchij opinio reprobata.*

*Polycnemum  
non confide  
ratis.*

POLYCNEVM hæcenus, quòd ego quidẽ  
ipsum cognouerim, nõ reperi neq; vidi in Ita-  
lia. Cæterũ est inibi nõnulla inueniatur, atq;  
etiam à quibusdam pro eo ostenduntur plantæ,  
quæ aliquibus notis Polycnemum quadante-  
nus referre videntur, cum tamen plura etiam  
iis desint, quæ in Polycnemo requiruntur, quàm  
ut pro vero probari possint, non equidem quic-  
quam in hoc certi statere auserim. Vnde satis

ipsum inter alias ignotas plantas collocandum  
esse duxerim, donec aliud certius compertum  
fuerit. Sed si quis interim Polycnemi vires ex  
Galeno quoq; scire desiderat, is libro v t l i.  
simpl. medic. illas ita paucis retulit. Polycne-  
mon desiccatur, & exsiccatur secundo excessu. Ita-  
que & ob id vulnera glutinat. Hinc plantæ no-  
men Græcum, & ὑποκύννη: Latineum similiter  
Polycnemum: Italicum, Policnemo.

*Vires ex  
Galeno.*

*Nomina.*

## CLINOPODIUM.



CLINOPODIUM. CAP. XCIII.

CLINOPODION frutex est foliis  
serpyllo similis, furculosus, duũm do-  
drantum altitudine. Nascitur in petro-  
sis. Flores, marrubij modo, ex inter-  
uallis distincti speciem lecti pedum præ-  
bent. Bibitur herba, & succi eius de-  
coctum, ad conuulsa, rupta, stran-  
gurias, serpentium ictus: mensēs. &  
partus pellit: & peniles verrucas,  
quas acrochordonas vocant, eiicit, ali-  
quot diebus potum. Alium sistit deco-  
ctum ad tertias, potũque, si febri-  
sentiant, ex aqua, alioquin, ex vino.

*Clinopodium  
confid.*

CLINOPODION nil aliud nobis desig-  
nat, quàm lecticæ pedem, quòd circinata flo-  
rum figura, qui intereedentibus interstitiis  
causam circumplectuntur, basim lecticæ pe-  
dum referat. Nascitur vbique frequens, foliis  
non modò serpyllo proximis, sed etiam mon-  
tanæ calamintæ, quàm imaximè repræsentat.  
Huius meminit Galenus lib. v l i. simplicium

## CLINOPODIUM ALTERUM.



medicamentorum, sic inquit. Clinopodium  
exaltandi vim obtinet, sed nondum adu-  
rendi: est verò etiam essentia tenuium par-  
tium: ponatque ipsum quispiam in tercio or-  
dine tum exaltificetium, tum rescicantium.  
Κλινωδιον sic Græcè, ut Latine pariter Clinopodium  
vocatur: Italicè, Clinopodio.

*Nomina.*

## LEONTOPETALUM.

## CAP. XCIIII.

LEONTOPETALON causam  
emittit dodrantalem, aut altiore, & in cacumi-  
ne seminapara duo, aut tria, in sili-  
quis, ciceris modo: flores anemone  
similes, punicei coloris: folia brassicæ,  
sed papaueris diuisura: radicibus ni-  
gris, rapæ similibus, strumosis. Nasci-  
tur in aruis, & segetibus. Radix au-  
xiliatur serpentium ictibus, ex vino po-  
ta: nec alia res celerius dolorem finit.  
miscetur ischiadicorum clysteribus.

LEON

*Leontopetalum confideratio.*

LEONTOPETALVM,



LEONTOPE-  
TALVM, eiusq;  
nigram, extube-  
rantemque radi-  
cem, rapi inftar  
magnitudine, non  
modo Venetiis, &  
Parauis in quibus-  
dam hortis vidi-  
mus, verum etiam  
in Hetrurie aruis,  
aliisque Italiae lo-  
cis. Nafcitur fre-  
quens in Apulia.  
Leontopetali me-  
minit Plinius lib.  
x. xvi. capite  
x. vbi ipfum iis  
depingit verbis.

Leontopetalon, alij rhapecion vocant, folio bra-  
ficæ, caule femipedali, alæ multæ, fermen in ca-  
cumine in filiquis ciceris modo. radix rapæ fi-  
milis, grandis, nigra, nafcitur in aruis. Leonto-  
petali facultates paucis perfrinxit Galenus li-  
bro v. l. l. fimplicium medicamentorum, vbi  
fit inquit. Leontopetali radice maxime vtimur.  
Digerendi facultatem, & exiccandi, exalfacien-  
di que in tertio ordine poffidet. *Αλεψεντραριον*  
quod Græci, Leontopetalum quoque Latini  
dicunt: Leontopetalo, Itali, Galli autem, Patte  
de Lyon.

*Leontope-  
tali Gires  
ex Galeno.*

*Nomina.*

TEUCRIVM.

CAP. XCV.



TEUCRION,  
fiue, vt aliis pla-  
cet, teucriis, her-  
ba eft virgæ re-  
ferentæ figiem,  
triflaginis fimi-  
litudine, tenui-  
folio, non multū  
tūm à cicere a-  
lieno. Hæc in  
Cilicia iuxta  
Gentiadem, 50  
Ciffadæq; vber-  
tim prouenit.

Recens cum poſca, aut aridæ feruifa-  
tæ ius potu lienum potenter abſumit.  
Lienofis cum aceto, & ficis illinitur: itē  
ſerpentium morſibus ex aceto ſolo ſine  
ficis.

*Teucrij co-  
fideratio.* HERBA quædam nafcitur pluribus in lo-  
cis, folijs quidem ciceris, ſed caule, & facie tri-  
ſlagini adco ſimilis, vt ſæpe ex tempore viſu ocu-

los decipiat. Hanc eſſe verum Teucrium me-  
cum ſemper exiſtimaui, quòd ea mihi planè no-  
tis reſpondere videatur, quas Dioſcorides Teu-  
crio reddidit. Qui tamen ſcribat vbertim na-  
ſci Teucrium in Cilicia iuxta Gentiadem, &  
Ciffadem, id tamen nihil impedit, quin & in  
Italia prouenire queat. Plinio duo Teucrij pro-  
duntur genera libro x. v. capite v. vbi ita  
ſcriptum reliquit. Inuenit & Teucer eadem æta-  
te Teucrion, quam quidam hermion vocant,  
ſpargentem iuncos tenues, folia parua aſperis  
naſcentem, aſtero ſapore, nunquam flore-  
tem. Neq; ſemen gignit. Medetur lienibus. Con-  
ſtatque ſic inuentam. Cùm exta ſuper eam pro-  
iecta eſſent, fertur adhæſiſſe lieni, eumque exi-  
nanifſe. ob id à quibusdam ſplenion vocatur.  
Narrat ſues, qui radicem eius edunt, ſine ſple-  
ne inueniri. Quidam ramis hyſſopi plantam, ſur-  
culofam, folio fabæ, eodem nomine appellant.  
Et colligi florentem adhuc iubent, adeo flore-  
re, non dubitant, maximeque ex Cilicis, & Pi-  
ſidiz montibus laudant, hæc Plinius. Cæterum  
non deſunt, qui putent alterum Plinio Teu-  
crium eam eſſe plantam, quæ Italis vulgari ſer-  
mone vocatur Fava graſſa, quanquam hanc alij  
falſo, vt opinor, Telephium eſſe contendunt.  
Teucrij vires deſcripſit Galenus libro v. l. l.  
ſimplicium medicamentorum, ſic inquit. Teu-  
crium incidentis, & tenuium partium fa-  
cultatis eſt: quare lienes ſinat. Ponacque ipſum  
quiſpiam in tertio exiccantium, ſecundo vero  
exalfacientium ordine. Hanc herban Græci  
*τευκρίον*, Latini item Teucrium nominant: Ita-  
li, Teucrio.

*Teucrij vi-  
res ex Ga-  
leno.*

*Nomina.*

TRISSAGO.

CAP. XCVI.



CHAMAE-  
DRYS Græcis,  
aliis chamæ-  
drops, Latinis  
triſſago dici-  
tur. Sunt qui  
eā teucrion ap-  
pellauere, pro-  
pter eam quā  
cū teucrio ſer-  
uat ſimilitudi-  
nem. Nafcitur  
in petroſis, &  
aſperis. Frutex

eſt dodrantalis, folia habens exigua,  
amara, effigie & diuiſura quercus: flore  
paruo, penè purpureo. Carpitur ſeme-  
ne prægnans. Recens in aqua decocta,  
potu tuſſibus, indurato lieni, vrinæ diſ-  
ſicultati, incipientibus hydropicis, au-  
xilatur

xiliatur: cit menfes, partus extrahit: li-  
nem ex aceto pota confumit: aduerfus  
ferpentium venena ex vino, potu, illitū-  
que efficaciffima. Trita digeritur in pa-  
stillos, ad fupradicta purgat vetera vl-  
cera, cum melle: cum oleo illita, caligi-  
nem oculorum difcutit, natura eius eft  
calfacere.

*Chama-  
dryas com-  
sideratio.* CHAMAEDRYs herba eft vulgaris noti-  
tix. In Hetruria, Senenfibz præfertim, vulgò  
appellatur Querciuiola. Quo nomine Græcos  
imitati videntur, quibus nil aliud per Chamæ-  
dryn fignificatur, quàm humilis, & terreftreis  
quercus. Infubribz verò vulgò Calamandrina  
vocator. Aliis herba februm, vel Febrifuga di-  
citur, eo quòd epoto eius decocto diebus ali-  
quor tertianas fuget, & finiat. Magnificiūt Cha-  
mædryn Hetrufci, quòd (vt affirmant ij, qui rem  
hanc experimento comprobant) ieiunij ac-  
tarij modo fumpta, peftilentiam arceat, non mi-  
nus quàm feordium planta ei cognata. Cæte-  
rum quanvis Diofcorides, alique veteres vnius  
tantum, quòd extet, Chamædryos meminerint,  
tamen Fuchfus quatuor eius genera depinxit.  
De Chamædry, fiue Triffagine difseruit Theo-  
phraftus libro i. x. capite x. de plantarum hi-  
ftoria, vbi ita fcriptum reliquit. Triffaginis folia  
ad rupta, & vulnera, in oleo trita valent, & ad  
depaſcentia vlcera. Semen bilem extrahit, &  
oculis quoque beneficum eft. Folium ad albu-  
gines tritum, in oleo prodeft. Habet hæc herba  
folia quercus: & ftatura vix palmum excedit:  
& odorata, atque fuavis eft. Sed partes quidem om-  
nes herbæ eiusdem minimè ad idem viles  
fore, haud quicquam absurdum fortaffe appa-  
reat. Radicis verò eiusdem partem vnam fupè-  
rius, alteram inferius purgare mirabilis fit, vt  
thapſiæ, & ifchiadi, quam alij Apion appellant.  
hæc Theophrastus. Quibus mirum nulli eſſe  
debet, quòd Chamædrys tertiaria correptos li-  
beret: liquidem ea, Theophrasto auctore, bilem  
delicit. Triffaginis vires memorie prodidit Ga-  
lenus libro viii. ſimplicium medicamentor-  
um, ſic inquit. Chamædrys vincentem ha-  
bet qualitatem amaram, & eſt quodammodo  
acris. Quocirca merito ſinem coſſiquat, & vrin-  
as, ac menſes prouocat, craſſitudinem humo-  
rum incidit, & viſcerum obſtructiones expur-  
gat. Ponitque eam quiſpiam in tertio ordine  
excalfacientium, & deſiccantium: plus tamen  
deſiccet, quàm calſcit. Hæc planta *χamaedrys*  
Græcè vocatur: Latine, Chamædrys, & Triffa-  
go: Arabicè, Damederios, Chamadrius, ſeu Ke-  
madrius: Italicè, Chamedrio, & Querciuiola:  
Germanicè, Gamanderle, & Bathengele: Hispani-  
cè, Chamedreos: Gallicè, Germandecree.

LEVCAS. CAP. XCVII.

LEVCAS montana, latioribus quàm

vrbanæ folijs, ſemine acriore, amario-  
re, ori ingrato. efficacior tamen quàm  
ſatiua habetur. Vtraque ex vino con-  
tra animalium venena, præcipuè ma-  
rinorum, opitulatur.

TAMETSI Hermolaus, & Ruellius con-  
tendant ſcriptis teſtatur relinquare, herbam  
quandam in vineis naſcentem mercuriali con-  
generem, eſſe Leucada, ego tamen eam mercuri-  
ali conſimilem facere proſectò non auſim,  
cùm nullum hæcenus ex rei herbariæ authori-  
bus inuenerim, qui eius faciem repræſen-  
ter, pluratque de eius notis tradat, quàm fece-  
rit Dioſcorides: qui certè, quantum extat,  
nullis prorsus notis ipſam deſcripſit. Cæterum  
rectè, meo quidem iudicio, putat Marcellus Flo-  
rentinus huic Leucadis capiti decurtatum eſſe  
principium. Id quòd nobis iudicare videtur  
ipſius Dioſcoridis ſermo: nam cùm ſtatim ab  
ipſo capitis initio montanam Leucada vrbanæ  
comparauerit, nimirum oſtendit à ſe prius vr-  
banam fuiſſe deſcriptam. Neque hæc de cauſa  
tantum adducor, vt Marcell'o adſtipuler, ſed  
quia etiam ſe habuiſſe teſtatur Latinum Dio-  
ſcoridis codicem vetuſtiſſimum, in quo initium  
huius capitis ita legebatur. Leuca duo ſunt ge-  
nera, vna eſt montana, & altera hortia. Mon-  
tana latiore quàm ſatiua folio eſt &c. Quæ om-  
nia maximo ſunc argumento, quòd hoc in lo-  
co Dioſcoridis codices ſint deprauati, quòdque  
in iis plura adhuc deſiderentur, quæ faciunt ad  
perfectam huius plantæ hiſtoriam. *Atenæ* herba  
ſic Græcis, Leucas item Latinis appellatur.

LYCHNIS.

CAP. XCVIII.



LYCHNIS co-  
ronaria, flore  
eſt albæ violæ  
ſimilis, ſed pur-  
pureo: quo co-  
rollæ faciuntur.  
Cōtra ſcor-  
pionum icūs  
ſemen in vino  
potum auxilia-  
tur. Lychnis ſyl-  
ueſtris, omnia  
vrbanæ ſimilis.  
Bilem per aluū

detrakit, ſemine duabus drachmis po-  
to icūs à ſcorpione ſubuenit. Aiunt hu-  
ius herbæ appoſitu ſcorpiones torpe-  
ſcere, & inertes prorsus reddi.

QVAN



*Lychnide  
considera-  
tio.*

QUANQVAM nō facile est hac ætate plan-  
tas in Italia ostendere, quæ legitimè referant  
vtranq; Lychnidem, hortensem scilicet, & syl-  
vestrē, cum earū folia, & caules tam à Dio-  
scoride, quam ab aliis rei herbariæ scriptoribus,  
quod inuenerim, nullis profus repræsentetur  
notis, vtpote plantarū, quæ fortasse olim omni-  
bus erant notissimæ ob frequentē earum vsum  
tum ad lucernarū lumina, tum etiam ad coro-  
nas contendas, attamē in Tridestino, & Gori-  
tensī agro planta quædam in hortis, ac ficitilibus  
feritur, coronis necēdis accommodata, quam  
equidem non dubitauerim pro legitima Lych-  
nide in medium afferre. Siquidem flore exit  
purpureo, albæ violæ similis: foliis longis, tomē-  
tosis, albicantibusq;: caule lanuginoso, cubito  
maiore, in cuius cacumine flos emicat, vt dixi,  
purpureus, in odorus tamen. Quod præterea  
plāta hæc vera sit Lychnis coronaria, illud mihi  
fidē auget, facitq;: vt in hoc nihil ferē addubi-  
tem, quod altera eludē generis frequentissi-  
mam apud Ananienſes sylvestrē repperim, illi  
fatiux adeo per omnia similem, vt cum natalis  
dūtaxat dīserimē intercedat, hæc meritō Lych-  
nis sylvestris appellari, queat. His accedit to-  
mentosa earū folia, quæ ad lucernarum vsum  
pro elychnio cōmodē vsurpari possunt. Vnde  
apud veteres Lychnidis sibi nomē ascriuit, quip-  
pe lucerna Græcis *λύχνος* dicitur, quæ admodū  
& *δωδεκ* funiculus, qui ē gossipio nobis hoc  
æuo paratur, lucernisq; inseritur ad lemē edē-  
dum, flammamq; nutriendā. Quare cū gossipio,  
vt puto, carerent antiqui, tomentosis her-  
barū quarundā foliis ad hoc munus obeundū  
vtebantur, nempe lychnidis, verbasci, aliarūq;  
nonnullis. Illud denique addiderim, vt nostra  
melius firmeretur opinio, quod flos plantarum,  
quas Lychnides esse opinor, mirū in modū ru-  
ralibus, vrbansq; virginibus expetitur ad coro-  
nas faciendās: qua in re priscā imitatur æta-  
tem. Cæterū Plin. lib. x x i. cap. i i i i. Lych-  
nidē inter rosas reulit, sic inq;: Erit & rosā,  
quæ Græca appellatur à nostris, à Græcis verō  
Lychnis, non nisi in humidis locis proueniens,  
nec vnquā excedēs quinque; folia violæ magni-  
tudinē, odore nullo. Lychnidis coronariæ se-  
men, vt Galenus etiā auctor lib. v i i. simplici-  
um medicamentorum calidum est secundo  
quodammodo ordine, aut iam etiam tertio:  
siccum sanē eodem quoque modo. Quæ her-  
ba Græcis *λύχνος*. Lychnis quoque Latinis di-  
citur: Italīs, Lichnide.

*Lychnide  
facultas  
ex Gal.*

*Nomina.*

L I L I U M. CAP. XCIX.

L I L I A coronamentis se dedunt,  
Liria à quibusdam vocata. E quibus  
vnguentum temperatur, quod aliqui  
lirinum, alij susinū appellant, neruos,  
& priuatū vuluæ duritias emolliens.

Folia herbæ illita, contra serpentium  
ictus auxiliantur: seruesacta ambustis

L I L I U M.



proficiunt: ace-  
to condita vul-  
neribus opitu-  
lantur. Succus  
adiecto melle,  
aut aceto in æ-  
reo vase coquitur  
conuenienti  
medicamēto  
vetustatis vlce-  
rum, & ad recē-  
tia vulnera. In-  
assata radix, &  
ex rosaceo tri-  
ta, igniambu-

sta sanat, vuluam emollit, menses ciet,  
vlcera cicatrice obducit. Cū melle de-  
trita neruis præcisīs, luxatīsq; medetur:  
vitiligines, furfures, & lepras emen-  
dat: vlceratq; in capite manantia ex-  
purgat: abstergit faciem, & erugat. te-  
ritur in aceto cum hyoscyami foliis, &  
farina tritici mulcendis testīū inflam-  
mationibus. Semen porum moribus  
serpentium aduersatur. Ignibus sacris  
semen, & folia cum vino illinuntur.  
Tradunt & purpurea esse lilia. In Syria  
autem, & Pisidia Pamphiliæ efficacis-  
sima vnguentis nascuntur.

L I L I A Italīs notissima sunt, atque adeo  
omnibus, vt planē superuacaneum esse putem,  
exemplo Dioscoridis adductus, vel ex nobis  
eorum faciem repræsentare, vel alterius  
historiam referre. Sed tamen quoniam iis quan-  
doque mos gerendus est, qui semper hortis  
nouis ac variis floribus refertis delectantur, id-  
circo silentio præterire non potui, quin hic  
infererem, qua ratione, quove mangonio alba  
lilia (si tanta fides præstis rei herbariæ autho-  
ribus adhiberi potest) purpurea fieri possint.

*Liliorum  
considera-  
tio.*

Quod cum Plinius docuerit libro x x i. cap.  
v. vbi de Liliis latius diserit, ideo eius ver-  
ba subiiciemus. Liliū, inquit, rose nobili-  
tate proximum est, & quadam cognatione vn-  
guenti, oleique, quod lirinon appellatur. Et  
impositum etiam maximè rosas decet, medio  
prouentu earum incipiens. Nec vlli florum  
excellitas maior, interdum cubitorum trium,  
languido semper collo, & non sufficiente ca-  
pius oneri. Candor eius eximius, foliis foris

*Liliorum  
historia ex  
Plin.*

striatis, & ab angustis in latitudinem paulatim sese laxantibus, effigie calathi, resupinis per ambitum labris, tenuiq; filo, & semine flantibus in medio crocis. Ita odor, colorq; duplex, vt alius calycis, alius fluminis: differentia angustia. In vnguente verò, oleiq; vsu folia nō spernuntur. Est flos non dissimilis illi in herba, quam conuoluulū vocant, nascens per fruteta, nullo odore, nec crocis intus, candorem tantum referens, ac veluti naturæ rudimentum lilia facere condiscens. Albalilia iisdem omnibus modis feruntur, quibus rosa: & hoc amplius lacryma sua, vt hippofelinum. nihilque est fecundius, vna radice quinquagenos sæpe emittente bulbos. Est & rubens lilium, quod Græci crimon vocant. Alij florem eius cynorrhodon. Laudatissimum in Antiochia, & Laodicea Syria, mox in Phœniæ, quartum locum obtinet in Italia nascens. Sunt & purpurea lilia aliquando gemino caule, carnosiore tantum radice, maiorisque bulbi, sed vnius. Narcissum vocant. Huius alterum genus, flore candido, calyce purpureo. Differentia à liliis est & hæc, quod narcissi folia in radice sunt, probatissimis in Lyciæ montibus. Tercio generi cætera eadem. Calyx herbaceus. omnes ferotini: post arturum enim florent, ac per æquinoctium autumnum. Inuenta est & in his ratio inferendi, monstrificis hominum ingentis. Colliguntur namque mense Iulio scapi crescentes, liliæque suspenduntur in fumo. Dein mundantibus se nodulis, in facie nigri vini, vel Græci mense martio macerantur, vt colorem accipiant, aque ita in ferobulbis feruntur, hœminis fecis circumfusus. Sic sunt purpurea lilia, mirumque ita tingi aliquid, vt nascatur infectum, hæc Plinius. Lilia (vt Ananoliū testatū reliquit) totum annum viridia durabunt, si cum oclufa silent, necdum patencia dehiscunt, decrepta, nouis scissilibus non picatis indico diligenter operculo recondantur. sic enim clausa perpetuum annum vegeta manebunt. Sed vt intermedio tempore ad vsū promuntur, statim ad solem prodacta, cum fenserint eius calorem, aperta panduntur. Porroq; vt vicissim, & variis temporibus flores pariant lilia, bulbi ita feruntur, vt aliqui duodecim digitorum altitudine obruantur, alij octo tantū, alij quatuor duntaxat profunditate mergantur. sic diuersis diebus dabunt lilia: quod & in aliis floribus fieri pollicetur. Cæterū & illud inter lilia merito annumerari potest, quod MATYAGON chymistæ appellant. Hoc enim radice, etsi croceo colore infecta sit, à lilio candido non dissidet, sicut nec caule. Foliis vulgarem saponariam imitatur, quæ in stella, vel rose modum intercedente spatio caulem ambiunt: in cuius cacumine tenui pediculo appensi flores emittant liliorum effigie, minores tamen: quorum folia etiam reflexa cernuntur, colore purpureo, punctis quibusdā rubetibus repleta, &

MATYAGON.



vt i. simplicium medicamentorum, sic in-  
 10 quiens. Lili flos temperatam mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua vtrique in gustu amaritudinem habet, partim ex aqua, eaque temperata. Itaq; etiam quod ex eo conficitur oleum, & vnguentum, citra morsum digerendi, simulque emolliendi facultate obtinet. vnde fit, vt veteri duritiebus sit apissimum. Porro radix, foliaq; per se trita desiccant, & abstergent, & digerit moderate. Proinde quoque ambustis competunt: siquidem hæc quoque moderate desiccantem, extergentemq; facultatem possulant. Radicem ergo tostam, ac deinde cum rosaceo contritam ambustis, quoad obducatur cicatrix, imponunt, quippe cum aliqui & aliorum vicerum omnium bonum sit inducendæ cicatrici remedium. Quinetiam vteros emolliunt, mensesq; prouocat. Folia verò præcoquentes, & ipse ad obducendam vsque cicatricem imponunt, non in ambustionibus duntaxat, sed aliis quoque vulneribus. Sed sunt etiam, quicæto ea condientes ad vulnere suo tempore vtantur. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice, quam in foliis: quanquam tamen nec in ea ipsa multū inest, sicut prædiximus. nam primi ordinis abstergentium est medicaminum. Itaque cum aut virilgines, aut pſoram, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere volumus, commiscemus illi aliquid aliorum medicamentorum validius extergentium, cuiusmodi est mel. Cæterū si id moderate  
 20 illi, ac conuenienter admisceatur, & ad neruorum diuisiones competit, & ad alia vniuersa, quæ valenter exicari possulant absq; morsu. Impossimus verò etiam quancdoq; & foliorum succum cum aceto, & melle coctum. Quintuplus autem erat succus ad vtrunque: atque insignem medicamē fuit ad omnia ea, quæ exicari possulant absque morsu, seu vulnera omnia ingentia, & maxime quæ in capitibus muscularum eueniunt, & quæcunque vlcera humida flaccidaue, & diuturna sunt, quæq;   
 30

ipsi odorati sunt, aspectuq; iucundi. Liliū genus hoc in suis de stirpi historia commentariis Fuchsius, asphodelum semina putauerat esse, pro eoq; depinxerat. Sed quia sui erroris cōfessus fuit, hæc ipse sua mutauit sententiā, nō est cur iam nos eam pluribus refellamus. Liliorū facultates posteritatis memoriam prædidit Galenus lib.

Liliorum  
 vires ex  
 Galieno

Marta-  
 gon, &  
 non deli-  
 neatio.

ægred ad cicatricem perducuntur. Sed hæc iam ad medicamentorum componendorum institutum pertinent, à quo quantum licet abstinere in præsentia adnotor, cæterum rerum ipsarum naturam sæpenumero ut attingā adigit, celeriter vero relinquenda sunt, atque ad propositū reuertendum. Planta, quæ Græci *ἀνίστρος* & *ἀνίστρος*, dicunt, Liliū Latinis nominatur: Mauritaniis, Suseis, Italici, Giglio: Germanis, Lilgen, & Gilgen: Hispanis, Azucena, & Lirio blanco: Gallis, Lis. 10

Nomina.

BALLOTE.

CAP. C.



BALLOTEN nomine alio nigrum marrubium vocat. Caulis edit quadrangulos, nigros, 20 subhirsutos, complures ex vna radice: foliis maioribus, quam marrubij, hispida, per intervalla in caule dispositis, subrotundis, 63 graueolentibus, apiastro

proximis, vnde aliqui apiastrum eam vocauerunt. candidi flores vniuersi verticillato ambitu caulem coronant. Vis eius efficax aduersus canis morsus, foliis ex sale illitis. Feruenti cinere flaccescent folia, ut condylomata reprimat: purgant, & sordida vlcera cum melle. 40

Ballote consideratio.

BALLOTE, seu Marrubium nigrum, quod etiam ab odoris grauitatem à quibusdā Marrubium fortidū cognominatur, frequens in agrorum marginibus nascitur, & passim secus vias. Est autem hoc apiastro adeo simile quod facile legētes falleret, nisi nares confunderentur: ita enim sua graueolentia citò innotescit. In Italia nullis non cognitum est, appellaturque ab aliquibus Marrubiastrum, ab aliis Marrubium spurium. Huius meminit Paulus (et si vires eius silentio præterierit Galenus) lib. v. r. r. sic inquit. Ballote, quod alij marrubium nigrum dicunt, aeris est, & aduersus faculatas. eorum cum sale candidioribus medetur. Huic plantæ nomen Græcum, *βαλάνη* & *πύραυρος*: Latīnum, Marrubium nigrum, & Marrubiastrum: Italicum, Marrobiastro, & Marrobio ballardo: Germanicum, Schuartz andon: Hispanicum, Marrojo negro: Gallicum, Marrubin noir.

Nomina.

† In Orisalfi codice manu scripto hic interiectum legitur verbum *μύρανα*, quod folia quæque Ballote nigra reddit. Nec temere fortassis illud quis adiciendum putabit, quod puichre alteri eius nomini conueniat, quodque ipse meminert Plinius lib. x. v. 11. cap. v. 11. cum inquit. Ballote foliis est marrubij maioribus, & nigrioribus.

APIASTRYM. CAP. CI.

MELISSOPHYLLON, siue melitana, id est, apiastrum, id sibi nomen usurpauit, quoniam apes ipsa herba delectatur. Cauliculi, & folia ballote, de qua paulo antè diximus, similia essent, nisi maiora, tenuioraque, nec ita hirsuta spectarentur: citreū malum olent. Folia cum vino pota, aut illita profunt, contra ictus phalangiorū, scorpionumque: item aduersus canis morsum. Decocto eorūdem gratia, foueri prodest: defensionibus sceminarum ad ciendos menses conuenit: dentes eodem in dolore colluunt. dysentericis infunditur. Fungorū strangulationibus folia, addito nitro, potu auxiliantur: torminibus, & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale strumas discutiant, vlcera purgant: articulares dolores illita sedant.

APIASTRYM.

MELISSOPHYLLON, quod Latīnis Apiastrum, & Citrargo dicitur, Hetrasci ab odore citri vulgo vocant Cedionella, itemque Melissa, sicut etiam insabres. Herba est nigra, quæ notitizaturque odorata. Duo eius habentur genera, vnu fatiuum, alterum sylvestre. Fuchius tamen medicus clarissimus, Melyssophyllum in tria genera digessit libro illo de cōpositione medicamentorum, quæ nuper audiū excludit. Sed cur is duo prima genera, quæ (ut scribit) grauior odorata sunt, & cinices vtriusquæ citrū redolēt, inter melissophylli genera connumerauerit, ego nescio, ipse dicat. Mihi quidē (ut dicā ingenue quod sentio)



G 2 plant

planè absurdum videtur, quod melissophyllum odore suo aliud referat, quam citreum malum, cuius tantum odorem spirare Dioscorides memoriz prodidit. Melissophyllum, ad cuius facultates iam nostra progreditur oratio, in cordis affectibus Mauritanis miris laudibus effertur. tamen id Græci, quod extet, silentio præterierunt. Proinde hæc Serapio retulit. Melissophylli, inquit, proprium est animum hilare reddere: humenti, ac frigido ventriculo auxiliari, concoctionem adiuuare, cerebri obstructions referare, deficientem animum reuocare, cordis imbecillitatem roborare, eaq; præferim, quæ somnus frequentius nocte intercepti solet, quin & eius pulsus reprimere, animi sollicitudines fugare, ac sollicitas imaginationes tollere, quæ tum ab atra bile, tum ab exulta pituita gignuntur. His præterea facultatibus pollere Melissophyllum, comprobatur Auicennæ quoque testimonio, qui libro medicinis, quæ cordi conueniunt, dicto, ita de eo scribit. Melissophyllū exalcat, siccitat; ordine secūdo. Cor exultat, vitalesq; facultates roborat, odoris fragrantia, saporis austeritate, partiumq; tenuitate. Quibus facultatibus cæteris etiam visceribus competit. Vires deiectionis possidet, nec adeo imbecilles, quin atrabillarios vapores à spiritibus, & à sanguine, qui cordi, & arteriis inest, educere queat: quod in cæteris corporis partibus, ac etiā in toto corpore efficere nequit. Melissophylli meminit Galenus libro v. i. i. simplicium medicamentorum, his verbis. Melissophyllum marrubio simile est facultate, sed plurimum ab eo vincitur: quomobrem nec vitur eo quisquam. Superuacaneum siquidem foret præsentem marrubio, cuius tantus est vbique terrarum prouentus, velle vti melissophyllo. Cæterum si cui forte ad manum quandoq; marrubium non fuerit, illo vti licebit ad eadem, modo quāto ab hoc exuperetur, cognitum habuerit, hæc Galenus. Apiastrum, Plinio libro x. x. cap. x. i. auctore, in confessa datione est venenatum in Sardinia. Ea plāta Græcis *μαλισσόφυλλον* dicitur, quæ Latinis Melissophyllum, & Apiastrum: Arabibus, Bederangie, Bedarungi, Bederenzegum, Turungen, seu Trungian, & Marmacor: Italis, Melissa, & Cedronella: Germanis, Melissen, & Binenkraut: Hispanis, Torongil, & Hierua cidrera. Gallis, Melisse.

## MARRUBIVM. CAP. CII.

MARRUBIVM, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirtus, quadrangularibus ramis: folium pollicem equat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro: semen in caulibus, & ex interuallis: flores verticillato ambitu, asperi. Nascitur propter ædificia, ruinas, & rudera. Huius folia sicca cum

## MARRUBIVM.



femine decocta in aqua, aut viridium succus datur cum melle suspiriosis, tussibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam è pectore pituitam cum sicca Iri eiicit. mulieribus à partu purgatis datur, vt menstrua, & secundas extrahat: item in difficili partu, &

his qui venena hauserunt, aut à serpentibus demorsi sunt. vesicā, renesq; laedit. Folia cum melle illinitur sordidis vlceribus purgādis. pterygia, nomasq; sistunt. laterum dolores mitigant. Succus foliis contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet: cum vino, & melle illitus oculorum claritatem adiuuat: naribus regiū morbū expurgat. aurium doloribus conuenienter instillatur per se, aut cum rosacco.

MARRUBIVM vulgaris est planta, notiorq; omnibus in Italia, quam vti pluribus indicanda sit. Eius duo genera constituit Theophrastus lib. vi. cap. ii. de plantarum historia, vbi ita scribit. Sūt & Marrubij duo genera. Aliud enim folio herbido, serratori, incisurisq; profundioribus, & proinde conspectioribus discreto constat, quo vnguentarij vti ad nonnulla consueverunt. Alterum rotundius, squalesq; vehemēter, sicut sphaceli, incisuras habens obscuriores, minusq; serratum. hæc Theophrastus. Ex quibus utique constare potest, Theophrasto alterū marrubium non aliud esse, quā Dioscoridi balloiten. Marrubij vires tradidit Galenus lib. vi. i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Marrubium vti gustu amarum est, ita si quis vitæ, consentientem huic saporis actionem possidet, iecur, ac lienem obstructione liberans, & thoracem, pulmonemq; expurgās, ac menses promouens. Sed & illud deegerit, ac digerit. Ponatq; ipsum quispiā in caliditate quidem secundi ordinis iam completi: in siccitate verò tertij, medij, aut completi. Succo eius cum melle ad visus acumen vtuntur. Quinetiam & per nares morbum

Apiastrum  
Vires ex  
Arabis.

Ex Gale-  
no.

Nomina.

Marrubij  
confusio-  
tio.

Marrubij  
Vires ex  
Galeno.

morbum regium purgant, & ad aurium dolores inueteratos adhibent, in quibus sine obstructions difficere, meatumque ipsum, & ramos membranarum expurgare est visus. Id Græci *μαύρον*, quod Latini Marrubium nominant: Mauritan, Farasio, siue Frasilum: Itali, Marro-bio: Germani, Andorn, & Lungenkraut: Hispani, Marruio: Galli, Marrubin.

Nomina.

STACHYS. CAP. CIII.



STACHYS, frutex est marrubio similis, sed longior, folia ferens numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi: & complures virgas ab vna radice exeuntes, marrubio cãdiiores. Nascitur in mō

ribus, & asperis. Vim habet excafcctōriam, & acrem. Foliorū decoctum potu pellit menstrua, & secundas.

*Stachys* *considera-*  
*sio.* STACHYS frequentissima in Italia nascitur. affurgit enim virgis compluribus, angulosis, ab vna tantum radice exeuntibus, hirsutis, marrubio tum longioribus, tum candidioribus: foliis numerosis, incanis, hirsutis, oblōgis, præduris, odorisq; iucundi. Flores gerit in purpurea albicantes, qui per intervalla verticillato ambitu caulem circumdant marrubii modo. Ex quibus tanē notis satis constare arbitror, hanc herbā, quam pictam exhibemus, esse verā Stachyn. Quibus etiam accedit, quod ea (vt Galenus testatur) amara sit, & gustu acris. Plinius lib. x x i i i i . cap. x v. Stachyn porri similitudinē habere tradidit, Græcarum vocum affinitate deceptus, prason pro prason legens. Si quidē *μαύρον* porrum significat, *μαύρον* verò marrubium, cui Stachys est similis. Stachyos meminit Galenus lib. v i i i . *simplic. medic.* sic inueniens. Stachys frutex est marrubio similis, gustu acris, & amaro: terij est ordinis excafcctōrium. Quamobrem rationabiliter non solum menses mouet, sed & abortu affert, & secundas elicit. *σταχὺς* vt Græcē, ita etiam Stachys Latine vocatur: Italicē, Stachi: Gallicē, Saugē molle.

Plinij Lat.  
p. 100.Stachys  
vires ex  
Galeno.

Nomina.

PHYLITIS. CAP. CIIII.

PHYLITIS folia promit rumici

similia, longiora, & viridiora, sēna, aut septena, recta, quæ parte anteriore lœuia cernuntur, à tergo autem pensiles quasi vermiculos tenues ostendunt. In vmbrosis, & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbis. Neque caulem, neque florem, neque semen profert. Folia in vino pota serpentium morsibus aduersantur. quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dysenteria, aut resoluta aluus exercet, potui datur.

PHYLITIS.



QVI NOTAS omnes, quæ Phyllitis a Dioscoride tribuitur, diligētissimē expendere voluerit, haud difficile quidē fateri cogetur, Phyllitum esse eam herbam, quam aliqui Linguam ceruinam, nonnulli verò Scelopendriā perperam appellāt: Perperam dico, quod legitimum Scelopendrium (vt infra suo loco dicetur) illa nimirum

fit herba, quæ Græcis Asplenon, Mauritanis verò ceterach dicitur. Quod autem ita se res habeat, hinc in primis ad credendū impellor, quod vmbrosis, opacis, humetibusq; locis proveniat: quodq; foliis sit rumici maioribus, longioribus, ac viridioribus, rectis, anteriore parte læuibus, à tergo autem eminentibus quibuscumq; transversum per intervalla signatis, subrubentibus, quæ (vt Dioscorides inquit) pensiles vermiculos referunt. Opinionem deinde auget acerbis sapor, qui gustu percipitur. Huc positemō accedit, quod caule, flore, & semine vacet: tamēti non desint, qui credant, eius semen ē pensilibus illis vermiculis prodire. Neq; illud sententiæ nostræ quicquā obstat crediderim, quod huius herbæ cōplures reperiantur plantæ, quæ præter Dioscoridis auctoritatem vel quinquaginta emittant folia. Quippe (vt experientia compertum habeo) effodientibus nobis ē terra hanc herbam nunquam ab vna tantum radice tor folia erumpere visa sunt, sed à quam plurimis se simul tangenticibus, ita tamen vt vna ab altera separari possent. Vnde facile cognoui, quod si singulæ radices abinuicē distincte considerentur, non pluribus, quàm senis, aut septenis foliis referre inuenientur. His itaque rationibus, mea quidem sententiā, hac in re planē hallucinati deprehenduntur Manardus, Leon

Leonice.  
Ruellij. et  
Fuch. la-  
pau.

Leoniceus, Ruellius, & Fuchsius, omnes alio-  
qui clarissimi nominis viri, quod tā facile cre-  
derint, Linguam ceruinam vocatā, Phyllitim  
nequaquā referre, sed Hemionitim. Nam etsi  
Hemionitis caule, flore, & semine vidua sit, nō  
tamen foliis constat rumericis, sed dracunculi,  
curvis, nouæ lunæ instar. Illud insuper addide-  
rim, quod iam reperta sit Hemionitis, quæ o-  
mnibus prorsus notis legitimam refert. Sed iis  
fortasse errandi occasione præbuit vulgi opi-  
nio, qui Linguam ceruinam non migno quid-  
em negotio ad omnes lienis affectus assumere  
sualet. quod tamē Hemionitidis est proprium.  
Cuius fortē vulgi opinionem ij potius secuti,  
quā quod Phyllitidis lineamenta, notasq; di-  
ligentius perpenderit, in hunc facile lapsum  
inciderunt. Phyllitidis meminit Galenus lib.

Phylliti-  
dis vires  
ex Gal.

Nomina.

V I I I. simplicium medicamentis, sic inquit.  
Phyllitis cum qualitate sit acerbæ, nō absurdē  
diarrhœas, siue profluvia, & dysenterias pota-  
iuat. Planta, quæ *gumien* Græci, Phyllitis  
item Latinis appellatur: Italis, Philite: Ger-  
manis, Hirtzzungen: Hispanis, Lengoa cer-  
uina: Galliis, Langue de cerf.

#### PHALANGIUM. CAP. CV.

PHALANGIUM, à quibusdā pha-  
langites, ab aliis leucacantha vocatur.  
Ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresve,  
in diuersa tendētes: flos candidus, lilio  
similis, multas incisuras habēs: semine  
nigro, † lato, ad lenticulæ dimidiatæ  
figurā, multo tenuiore: radice parua,  
tenui, herbacei coloris, dū à terra erui-  
tur, provenit in collibus. Huius folia,  
semen, flos cum vino pota, auxiliantur  
contra scorpionum, phalangiorumq;  
ictus: tormina quoque discutunt.

Phalangij  
considera-  
tio.

E A D E M ferē, quæ hic de Phalangio posse-  
tatis memoria prædidit Dioscorides, rescribit  
Plinius li. x x v i i. cap. x i i. vbi ita scribit.  
Phalangites à quibusdā phalangion vocatur,  
ab aliis leucanthemon, vel, ut in quibusdā ex-  
emplaribus inuenio, leucacantha. Ramuli sunt  
ei nunquam pauciores duobus, in diuersa ten-  
dentes. Flos candidus, lilio rubro similis: semi-  
ne nigro, lato, ad lenticulæ dimidiatæ figuram,  
multo tenuiore: radice herbacei coloris. Huius  
folio, vel flore, vel semine auxiliantur contra  
scorpionū, phalangiorumq; & serpentū ictus:  
item contra tormina. Hæc Plinius: quæ omnia  
ferē, si conferantur, Dioscoridi accepta referri  
poterūt. Cæterū etsi non desint hodie herba-  
rij, qui in Phalangij, ut in plurimū aliarū quoque  
incognitarū plantarū locū herbas quaslibet qua-  
les quales sint, substituant, atq; rei herbariæ pa-  
uum gnaris pro legitimis sæpe ostendant, ipse

tamen hæcenus, ut ingenuè fatear, verum Pha-  
langium non vidi in Italia, neq; ab aliis inuen-  
tum scio. quanquam non equidem negauerim,  
ipsum inibi nasci. Phalangij vires tradidit Ga-  
lenus lib. v i i i. simplicium medicamentorū,  
sic inquit. Phalangites sic appellata est, quod  
morsus à phalangis auxilietur. Est autem facul-  
tatis tenuium partium, desiccantis, quamob-  
rem & tormina patientibus succurrit. Quod  
*παλαγγης* Græci, Phalangium quoque Latini  
dicunt: Phalangio, Itali.

Phalangij  
vires ex  
Galen.

Nomina.

† Siquis Græca Dioscoridis exemplaria cō-  
sular, hic nō *παλαγγης*, hoc est latius, sed *παλυσ*, quod  
est crassum, scriptum reperiet. Quod si præte-  
rea ea legat, quæ ex Plinio in cōmentario re-  
tulimus, deprehendet Ruellij in verendo se-  
curū fuisse Pliniū, ex eoq; vocē illā reddidisse.

#### TRIFOLIUM. CAP. CVI.

TRIFOLIUM, Græci triphyllon,  
alij oxytriphyllon, alij menyantes,  
alij asphaltion, vocat. Frutex supra cu-  
biti altitudinem attollitur, virgas ha-  
benstenues, iuncea, & nigra, vnde ra-  
mulares enascuntur appendiculæ, in  
quibus terna singulis germinationibus  
exerunt folia, loto herbæ similia. iis re-  
center enatis rutæ odor inest, vbi au-  
tem adoleuerunt, bitumen olent. Flo-  
rem edit purpureum: semen quadan-  
tenus latum, subhirsutū, ex altera ex-  
tremitate exertū, antennæ modo cor-  
niculū gerens. radix tenuis, longa, va-  
lida. Semē, & folia in aqua pota pleu-  
riticis, vrinæ distickulati, comitialibus,  
& iis qui aquæ inter cutē principia sen-  
tiunt, scæminis quoq; vuluæ vitiiis op-  
portunis, auxiliantur: menses ciunt. ter-  
næ drachmæ è semine dari debēt, è foliis  
verò quaternæ. Contra serpentinum  
ictus trita folia, & ex aceto mulso po-  
ta, præsidio sunt. Tradunt aliqui, totius  
fruticis, radice, foliorumq; deco-  
ctum fotu dolore eorum finire, quos  
serpentes percusserint. qua autē aqua  
sanatus quis fuerint, si ea quispiā alius  
foveatur, qui vlcus habuerit, perinde  
afficitur, ut à serpente demorsus. Qui-  
dam terna folia, aut semina in terti-  
nis, cum vino potui dedere: & in quar-  
tanis quaterna, ut quæ febriliū circuitus  
discutere. Radix antidotis inseritur.

## TRIFOLIUM ASPHALTITIS.



TRIFOL. PRAT. AXYRVM.



TAM ET SI. plura in Italia passim in pratis, ac viridariis Trifolij inueniantur genera omnibus planè nota, non tamen de his tradidit hoc capite Dioscorides, sed de eo tantum genere, quod à bituminis odore Asphaltitis dicitur, de quo etiam scribit Galenus. Verum nò ob id putandum. Trifolium pratense omne genus Dioscoridi fuisse ignotum: siquidè eius meminit libro quarto in syluestris loci capite, dum ita scribit. Syluestris lotus plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & sepe maiore, alis multis, foliis trifolijs pratensis. Ex quibus utiq; Dioscoridis verbis liquet, eos maximè hallucinari, qui recenter contendunt Trifolij pratense esse lotum sylvestre, vel vrbani, Plinius lib. x x i. cap. x. de tribus trifolij generibus differuit in hunc modum. Folio coronat & trifolij, Tri eius genera, meyanthes vocant Græci, alij asphaltum, maiore folio, quo vtuntur coronarij. Alterum acuto, oxytriphylon cognominat. Tertium ex omnibus minutissimum. hæc enus Plinius. Trifolij acuti meminit quoq; Scribonius Largus, qui ita scriptum reliquit. Trifolium acutum, quod oxytriphylon appellant, nascitur in Sicilia plu-

## TRIFOLIUM PRATENSE.



20 rimum. nam in Italiæ regionibus nusquàm eam vidi herbam, nisi in Lunæ portu, cum in Britanniâ peterem cum Claudio Cæsare. Est autè foliis, & specie còmani trifolio similis, nisi quòd pleniora sunt folia, & quasi lanuginem quandam super se habent, & in extrema parte velut eminètem aculeum. Sed frutex huius duum pedum, interdum altior conspicitur, & odorem grauem emittit, quorum nihil circa pratense trifolium inuenitur. hæc illæ. Est & aliud trifolij genus 30 pore acetoso, foliis subpallidis, tenuibus, cordis effigie quod à quibusdà Panis cuculus, ab alijs Trifolium ACETOXYM, & Alleluja vocatur. Plinius (vt quidam putant) hoc oxyn nominae libro x x v i i. cap. x i i. vbi sic inquit. Oxys folia terrea habet. Datur ad stomachum dissolutum. Edunt & qui enterocelen habent. Nec plura de hac herba Plinius.

Trifolium  
acetosum.

Forò huic illud quoq; Trifolij addere possumus, quod nonnulli Trifolium ODORATVM 40 ideo cognominant, quoniam eius tum folia, tum flores non inuicendum spirant odorem. Romanis ac Hetrusci pariter id vulgò vocant Tribulo: atq; stillantiam ex eo aquam eliciunt, odoris tantum gratia. Hanc plantam equi auidissimè in pabulum suum sequitur. vnde factum est, vt qui tam eam Trifolium equinum appellauerint. Planta est frutescens, quæ ad trium cubitorum altitudinem attollitur, folijs trifolij pratensis, caule lignoso, ramulis pluribus refofo. Florem edit mucosum, album, atq; etiam alicubi luteum. Radicibus nititur multis, albis, quæ per summam cespitem diuagantur. hæc de trifolio odorato, de quo etia aliquid dicemus libro sequenti in Cyusi còmentatione. Cæterù Trifolij pratense in Italia trium est generum. Primum folijs exit rotundis, & anplis: secundum longiusculis: tertium vt primum circinatis, sed breuioribus. Dissant & florum colore, quòd in vno flores albicant, in altero rubescant, in tertio lucei spectentur. Pratense trifolium tempestates prænuñciat. nam (vt Plinius est author) inhorrescit, & folia contra tempestatem subrigit. Habetur præterea herba, de

Trifolium  
odoratum.

Trifolij  
considera-  
tio.

TRIFOLIUM ACETOSVM.



TRINITAS.



Trinitatis  
herba mē-  
stru.

ba, de qua ideo haec inter a nonj genera differendum duximus, quod folio exeat triplici cornu diuiso: vnde etiam apud quosdam herbarios sibi Trinitatis nomen comparauit. Hæc itaque herba TRINITAS vulgò vocata, in locis p. ouenit vliginosis, & inter frutera: gaudet enim opacis. Folia fert triquetra, longis pediculis appensa, quæ auersa parte cyclamini modo subpurpurasunt, superiore verò sibi quibusdam maculis resperguntur. Caulem habet tenuem, in cuius cacumine primo statim vere flos emicat cæruleus. Radicibus nigris numerosis, tenuibus, subrubentibusq;. Huicse meminisse Græcos, nec pariter Mauros, hætenus comperit non habeo. Probat maxime recentioribus medicis ad vulnera glutinanda, tam exterius illita, quam interius sumpta. quinetia & ad enterocelas: in quem vsu puluerem dimidij cochlearis mensura ex vino austero propinant. Sed vt ad trifolium nostra redeat oratio, eos in apertissimo errore versari existimaui, qui Andacocam Aphris vocatam, ad quamuis trifolij speciem referunt. Quandoquidem Andacoca (vt testatur Serapio) nil aliud est, quam Dioscoridis Aegyptia lotus. E cuius semine, quod

Quoniam  
da error.

TRIFOLIUM ODORATVM.



20 papauerum modo capitibus quibusdam includitur, Arabes sibi olei conficiunt, quod miris laudibus esseunt in neruorū morbis, præsertimq; tremoribus illudq; oleum de Andacoca appellant. Id enim non desunt, qui credant è vulgari trifolij semine fieri, sed quam aperte decipiatur, vel ipsi videant, vel alij iudicent. Trifolium scriptis tradit Galenus lib. v. 1. 1. simplicium medicamentorum, sic inquit. Triphyllum, quidam asphaltion, quidam oxyphyllon, nonnulli minyanthes, sunt & qui encium vocitent. 30 Prima quidem tria ab accidentibus fructis, reliqua duo nomina haud scio vnde. Vis plâte est calida, & sicca vt bitumen, cui odore est similis, vtrique tertio ordine. Proinde pota laterū dolores ab obstructione natos iuuat, & vrinā, mensesq; prouocat. hæc Galenus. Sed animaduertendū est, an Galenus ipse in Trifolij facultatibus recte perceperit Dioscoridis sententiā. Quippe is in libro de theriaca ad Pisonē, vbi pluriū medicamentorū facit mentionē, quibus contrariæ insunt facultates, hæc de eo memoriae prodidit. Trifoliū herba, quæ hyacintho similis est, cum vere parturit, & semen agrestis enico persimile obtinet, decocta admodū, deinde morsibus aranei, vel viperæ quoq; ex aquæ forū adhibita ipsis medetur, & dolores statim sedat. Sin autē in alio nō cōmodo sanū locū eodem forū circūdederis, similē sensum, similesq; dolores sis, quos morsus inuehit, omnes efficit. Vt re vera miraculo dignū opus esse videatur, videlicet herbam & morsum sanare. & ferarum modo sanam partem prauè afficere, hætenus Galenus. Verū id, si Dioscoridis verba rectè expendantur, nullo miraculo fieri facile constabit, sed potius secundum ipsius naturæ ordinem. Siquidem (vt Dioscorides sribit) non omne trifolij decoctum illud efficere potest, sed tantū id, cuius forū quispiam à ferarum morsibus liber euaserit, si eo alterius locus vlcere effectus persudatur. Id quod aperte Dioscoridis verba declarant, cum inquit. Tradunt aliqui totius fructis, radicis, foliorūque decoctum forū dolores eorum finire, quos serpētes percusserint.

Trifolij  
nux ex  
Galen.

Galenus  
sententia  
da  
nata.



Qua autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui viciu habuerit, perinde afficitur, vt à serpente demorsus. Ex iis Dioscoridis verbis clarum fieri puto, hanc rem in se nihil admirationis habere. Nam cum Trifolij ipsius decoctum, quo demorsus fouentur, venenum à vulnere extrahat, eijs permisceatur, haud dubiè id venenosum redditur. Quam obrem minimè quidem mirum videri debet, si idem decoctum, quo quispiam non demorsus foueatur, vbi perfulse partes aliquo vlcere laborauerint, veneno per viceris poros ingrediēte, ac sanguini se commiscēte, ea omnia excitet mala, quibus demorsus vexantur. idem enim venenum cum sit, eisdem quoque præbeat effectus necesse est. Vnde liquidò colligi potest, quodd virus à Trifolij decocto euocatum, non autem Trifolium, sic illud, quod similem sensum, similesque dolores faciat. Quodd autem venenum exutum à ferarum moribus viceratis particulis contactum necem afferre possit, complures tam Græci, quam Arabes authores, manifestè deincepsant. Quandoquidem scribentes ore demorsos fugere præstantissimum esse

POLIUM.



POLIUM. CAP. CVII.

Dvo genera polij. Montanum, cui reuthrio nomen est, & cuius est vsus. re nui frutex est, candidus, dodrantalis, femine refertus: capitulo in cacumine quandam corymborum speciem præferente, paruo, cano hominis capillo simili, grauiter olente, non sine quadam suauitate. Alterum fruticosius, non vsque adeo valens odore, & viribus infirmius. Potum feruefactius auxiliatur serpentiu istibus, hydropicis, & morbo regio: & lienosis ex aceto: stomachum male habet; caput doloribus afficit: aluum, & menses ciet. sublatum, suffrutumve serpentes abigit: illitum vulnera conglutinat.

remedium, ferio nos admonent, ne id ore viceribus affecto fiat: quoniam si venenum illud vlcus inficeret, fugentem in mortis discrimen duceret. Hæc itaque sunt, quæ me maximè mouent, vt credam Galenum hæc in re Dioscoridis mentem non accepisse, atque etiam, si liceat dicere, excutiuisse. Ceterum non desunt, qui velint, vt Galenū tuerentur, librum de iheriaca ad Pisonem non esse legitimū, idque pluribus rationibus comprobāt. Quibus an assensendum sit, iudicent ij, qui Græcam Galeni phrasim proferunt quique eius volumini diutius euoluērunt. Ego cerre, vt dicam quod sentio, non possum non illis subscribere, qui librum illum spiritum esse censent. Inter quos hic mihi honoris gratia nominandus venit Iulius Alexandrinus Tridentinus vir quiddè singularis ingenij & eruditionis, ac propterea maximè existimationis medicus apud Sereasiff. Ferdinandū Rom. Regem. Huius ergo viri iudiciū, vt quodd multis & iis quiddè firmis argumētis nitatur, & laudamus libenter, & probamus. Trifolij id Græci vocāt, quod Latini Trifolium: Itali, Trifoglio: Germani, Vay-senklee: Hispani, Treuol, Galli, Triolet.

POLIUM ALTERNUM.



SEPTIASARIJ iui, qui pro Polio her-  
bam quandam vsurpant, quæ numerosos pro-  
fert cauliculos, cœnues, rectos, rotundo quodam  
femine vndique refertos, euidentius, meo qui-  
dem iudicio errant, quam vt eorum erratum  
explodi mereatur. quādoquidè herba hæc nul-  
lis prorsus notis Polij repræsentat. Porro verū  
que Polij genus, quod nulla reclamante nota i-  
gitimo respondeat, in pluribus Italice locis pro-  
uenit. Primum vulgus herbario. um Iuam mu-  
scatam appellat, a quo secundum effigie nō lōge  
distat, quanuis non adeo sit odoratum. Secun-  
di generis Polium, cuius etiam picturam adie-  
cimus, viret Venetiis in horto Maphæi excelē-  
rissimi medici. Polij meminere Plinius lib. x x i.  
cap. v i i. vbi inscriptum reliquit. Apud Græ-  
cos Polion herba in clyta Musæi, & Hesiodi lau-  
dibus, ad omnia vtilē prædicantū, superque ca-  
etera ad famā eisdè dignitatis: prorsusq; mirā, si  
modò (vt tradunt) folia eius mane cōditiō. ma-  
gicè purpurea, sole occidēte cœrulea & picea.

Plinij la-  
psum.

Polij virtus  
ex Galieno.

Nomina.

tur. Duo genera eius, cāpestre maius, sylvestre quod minus est: quiddā theuriū vocat. folia canis hominis similia, à radice protinus, nūquam palmo altiora. hæc Plinius, quorū plura à Theophrasto mutauit æt. Ceterū in iis Plinius aperit hallucinaatū deprehenditur, quod turpi ter Polij cum tripolis confuderit, cuius historiā libro quarto pertrahat Dioscorides. Siquidē Tripolij propriū est, non autem Polij, teste Dioscoride, vt colores ter in die mater: neq; id quidem à Dioscoride, vt à Plinio folijs, sed floribus adscribitur. Præterea capitulū Polio inesse cano hominis capillo simile scribit Dioscorides, non autē folia, vt ipse Plinius tradit. Polij vires memoriæ prodidit Galenus lib. v 111. simp. med. vbi sic inquit. Polij amarum est gustantibus, & modicē acre. Itaq; viscera omnia obstrucone liberat: vrinamq; & mēses ciet. Ac viride etiā num magna vulnera glutinat, maximē species eius fruticosa. Aridū cum fuerit maligna vlcera sanat illitum: & magis hoc præstat quod minus est. Polij minus, quo etiā vtimur ad antidota, & acrius, & amariū est, quā maius, adeo vt ex tertio sit ordine desiccantiū, ex secundo autem completo exsiccantiū. Planta Græcis *πόλις*, Latinis item Polium appellatur: Mauritanijs, Cahade, Tahade, seu Grade: Italis, Polio.

#### SCORDIVM. CAP. CVIII.



SCORDIVM in montibus, & palustribus nascitur, folijs trifraginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum aliaredolētibus, 40 gustu amaris, & adstringētibus: quadrāguliscaulibus: subrubro flore. Herba vim exsiccatoriam habet: vrinam ciet. Cocta recens, aridā cum vino, aduersus venenatos serpentium morsus bibitur, ad stomachi quoq; rosiones, dysenteriam, & vrinæ difficultatē, binis drahmis cum hydromelite: crassamē purulentum pectore expellit. Facit aridā farina ad veterem tussim rupta, cōulsā, si cum nasturtio, melle, & resina misceatur in eciegmate. Inflammata modicē præcordia, cerato excepta, recreat: cum aceto acri, aut aqua, podagris con-

uenienter illinitur: mēses imposita mouet, vulnera conglutinat, vetera vlcera purgat, & exmelle cicatricem perducit. Sicca excresecētijs in carne cohibet. Succus ad eadem vitia bibitur. Inter primas efficax Ponticum natione, Creticumq;.

SCORDIVM non ita pridem inueniri, & cognosci cœpit in Italia. Siquidem præterita nuper ætate omnes tum medicī, tum seplarij Mauritanorum monumentis decepi, sylvestri tātū alio, quod à Dioscoride ophioscorodon vocatur, pro legitimo Scordio vebantur. Neq; iis solū rerum imperitia, sed etiam vocabulorum vicinitas imposuerat, vt qui Scordium à Scorodo, quod Græcis vltimū significat, distinguere nesciuerint, pro vnoque acceperint. Sed illis possimū errandi occasionem dederat Auicenna, vel eius interpretes, quod in alteram theriacæ compositionem Scordium, in alteram verō sylvestre allium addiderit. Quod cum quidē superioris ætatis medicī nonnulli rei, & prioris vocis signari hanc ex altera exposuerunt, & Auicennam in hac re sui ipsius interpretem fecerunt. Vnde adducti sunt, vt certō crediderint sylvestre allium, & Scordium nihil inter se differre, & quā vnam & eandē plantam esse. Quopostmodum factum est, vt sylvestre allium apud omnes in Scordij locū illegitimē succederet. Verū enimvero in hunc nunquam fortasse incidissent errorem, si Dioscoridis, & Galeni scripta diligenter perlegissent. Porrō verum legitimumque Scordium, trifragini adeo simile, vt Trifrago palustris merito dici queat, humentibus ac palustribus locis proueniens, alij odore præditum, recetiorum diligentia iam omnibus magis innotuit, quā vt sit à nobis longiori historia representandum. Prætulit Galenus libro primo de antidotis Scordium, quod ex Creta aduehitur, iis verbis. Scordium optimum ex Creta deferretur: quanquam non sit improbandum quod in alijs quoque nationibus reperitur. Scriptum autem est à quibusdam viris grauissimis, cum in bello inter emptorum cadavera multos dies insepulta iacuisent, quæcunque supra scordium fortē fortuna ceciderant, multo minus alijs conputruisse, & præsertim ex parte, qua herbam conigerant. Ob quā rem sanē omnibus persuasum est, tam putrefactiōnis animalium venenis, quā medicamentorū deleteris Scordium aduersari. Præterea Scordij meminit idem Galenus lib. v 111. simp. med. vbi de eius viribus ita scribit. Scordij ex multo- 50 tioribus id tum saporibus, tum facultatibus constat. nam & amarum quid obinet, & acerbum, & acre, & maximē scorodo, hoc est, alio adsimilis eius est acrimonia: vnde sine, mea sententia, nomenclaturā sortitum est. Expurget igitur, simulq; exsiccet viscera, tum menses, vrinamq; mouet. Præterea conuulsi, ruptaq; & laterum dolores ab obstrucone, & frigore 60

Scordij ex  
sileratio.

Scordij ex  
res ex Galieno.

natos sanat epotum. Denique viride quidem illitum magna vulnera conglutinat: sed fordida purgat, & maligna ad cicatricem perducit, illitum aridum. haftenus Galenus. Cæterum herba quædam iuxta sepes, & in agrorum marginibus nascitur, quæ & odore, & sapore ita abunde allium refert, ut non temere vulgo

*Alliaria  
herba mi-  
pis.*

# ALLIARIA.



ALLIARIAE siue Alliaria vocetur. Huius folia eam præmum erumpunt, ferè rotunda spectantur violæ similitudine: postquam verò adoleverint, per ambitum in terræ modum laciniatam visuntur, ut quædamtenus mellissophylli effigiem representent, læviora tamen sunt, nec adeò rugosa, & prope caulem latiora: quæ digitorum attritu, gustuque alij odorem, & saporem reddunt. Caudem proferit bicubitalem, rotundamque: flores albos, & semen nigrum, minutumque, trionis modo tenuibus stiquis inclusum. Radix, quæ longiuscula est, eundem cum folijs odorem retinet. Vis plantæ huic calfactoria, & desiccatoria, verum non adeò vehemens est, ut in alio. Attamen hinc cerò colligi potest, quòd ea crassos humores extenuare, & lentos incidere valeat. Semen emplastrum modo impositum, vel utæque admodum, mulieres veri strangulem oppellat liberat, & excitat. Quæ planta œgypti Græcè, Scordium similiter, & Trisilago palustris Lardè vocatur: Arabicè, Scordeon, seu Scordeum. Italicè, Scordio: Germanicè, Vassfer haterig, & Knoblochs kraut: Hispanicè, Scordio: Gallicè, Chamaeaz.

*Femina.*

# TVSSILAGO.



le confestum exiit: inde nonnulli

# ALLIARIAE siue

Alliaria vocetur.

Huius folia eam

præmum erumpunt,

ferè rotunda spe-

ctantur violæ simi-

litudine: postquam

verò adoleverint,

per ambitum in

terræ modum laci-

niatam visuntur, ut

quædamtenus mel-

lissophylli effigiem

representent, læ-

uviora tamen sunt,

nec adeò rugosa, &

prope caulem la-

tiora: quæ digito-

rum attritu, gusta-

tuque alij odorem, &

saporem reddunt.

Caudem proferit

bicubitalem, rotunda-

que: flores

albos, & semen

nigrum, minutum-

que, trionis

modo tenuibus

stiquis inclusum.

Radix, quæ

longiuscula est,

eundem cum folijs

odorem retinet.

Vis plantæ huic

calfactoria, & desiccato-

ria, verum non adeò

vehemens est, ut

in alio.

Attamen hinc cerò

colligi potest, quòd

ea crassos

humores extenuare,

& lentos incidere

valeat.

Semen emplastrum

modo impositum,

vel utæque admo-

dum, mulieres veri

strangulem oppel-

lat liberat, & exci-

tat. Quæ planta

œgypti Græcè,

Scordium similiter,

& Trisilago palu-

stris Lardè vocatur:

Arabicè, Scordeon,

seu Scordeum.

Italicè, Scordio:

Germanicè, Vass-

fer haterig, & Knob-

blochs kraut: His-

panicè,

Scordio: Gallicè,

Chamaeaz.

his vacare existimarunt. Radix tenacis est, † & superuacua. nascitur in amœnis, & riguis. Folia ex melle trita igni sacro, & omnibus inflammationibus illitu medentur. Arida suffitu, ita ut fumus per infundibulum hianti ore rapiatur, hos sanat, qui sicca tussi, atque orthopnea infestantur: pectoris vomicas rumpunt. Eundem effectum præbet suffita radix. decocta in hydromelite, & pota, emortuus partus eiicit.

10

10

30

40

50

TVSSILAGO Hetruscis vulgò dicitur Farfara, & Farfarella, nomine à Romanis fortasse deducto: hanc enim ab iis Farfarium vocarum fuisse testantur nomina Dioscoridi falsò adscripta. Officinæ hos, vel illos secutæ eam Farfarium appellant, necnon etiam Vngulam caballinam. Herba est vulgaris notitia. Caudex, & flore exit adeò fugacissimis, vè Plinius, qui eorum tam subitum iacturam nò animaduertit, deceptus Tussilaginem sine caule, & sine flore nasci memoris prodiderit: cum tamen ea vere primo & caulem, & florem proferat, sed qui enati breui admodum tempore durent: quo non nisi etiam à peritis, vel ab iis, qui tunc sese fortè fortuna culerint obuiam, conspici possint, eoque magis, quòd iidem caulis, & flos prodeant, priusquam folia emicent. Quare scitè scripsit Dioscorides, Tussilaginem confestum exiit tum flore, tum caule, atque inde nonnullis his vacare existimasse. Sed certè vel hæc non legit, vel illa non observauit Plinius, quòd Tussilaginem aperto errore & caule, & flore viduum fecerit. Is Plinius error deprehenditur libro x x v i. capite v i. ubi ipse de Tussilagine differt iis verbis. Tussim sedat Bechion, quæ & Tussilago dicitur. Dux eius genera. Sylvestris ubi nascitur, subesse aquas credunt, & hoc habent signum aquileges. Folia sunt maiuscula, quam hederæ, quinque aut septem, subalbida à terra, supernè pallida: sine caule, sine flore, sine semine: radice tenui. Quidam tandem esse bechion, & alio nomine chamaeleucen putant. Huius arida cum radice fumus per arundinem haustus, aut deuoratus, veterem tussim sanare dicitur: sed in singulos haustus passim gustandum est. Altera à quibusdam salua appellatur, similibus verbis hæc Plinius. Verum altera Tussilago, cuius nulla fit mentio à Dioscoride, vepote qui vno tantum eius genere contentus fuerit, mihi hætenus incòperta est: nisi ea fortasse sit, quam aliqui herbariorum Centrum galli vocant. Porro nascitur in Tussilaginis radice quædam subalbida lanugo, quæ à radicem segmen-

*Tussilagi-  
na confes-  
ta.*

*Plinij la-  
psum.*

*Fomes  
ignis ex  
tussilag.*

statim primo tanquam chalybis concussu accen-

*Tussilagi-* datur. Tussilaginis facultates posteritatis memo-  
*ni* *Græc* rix tradidit Galenus li. vi. smi. med. sic in quies.  
*ex Galen.* Béchium ideo sic nuncupatum est, quod βέχμη.

hoc est, tussis, & orthopneas iuuare creditum sit, si quis videlicet folia arida tumentis, aut radicem in prunis accendens, ascendentem inde fumum inspirare arcehat. Est autem modicè aeris, vt sine molestia noxæ omnes thoracis abcessus credita sit rumpere. Sanè folia virentia partes cruda inflammatione obfessas illi extrinsecus adiuvant, propter aquæ humiditatis admissionem: quæ omnia viridia, teneraq; participant alia plus, alia minus. Nam sicca Béchij folia acriora sunt, quam vt partibus inflammatione laborantibus conueniant.

*Nomina.*

Quæ planta βέχμη Græcis, Tussilago Latinis vocatur: Officinis, Farfara, & Vngula equina: Italica, Farfara, Farfarella, & Vnghia di cavallo: Germanis, Rosshuob, & Brantlatich: Hispanis, Vnha de asno: Gallis, Pas de asne.

† Nulli dubium est, quin hoc loco in Dioscoride mendum subfist. Quomodo enim radicem Tussilaginis βέχμη, hoc est, inutilem rectè vocauerit Dioscorides, si paulò post ei nonnullos vsus tribuit? Errorem hunc à nemine interpretum, quod sciam, animaduersum, vidit Manardus, vidit item Fuchsius. sed vterque tamen locum inemendatum reliquit. Equidem, vt dicam quod sentio, verbum illud vt adscitum delendum esse puto, Oribasijs testimonio nixus, in cuius codice manu scripto illa dictio non legitur.

ARTEMISIA.

CAP. CX.



ARTEMISIA magna ex parte in maritimis nascitur, absinthij modo fruticosa, maioribus, & pinguioribus foliis, ramisque. Huius quidem generis duo. Vnum latius, habitiusque, foliis, virgisque latiori-

bus. Alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente. æstate floret. Sunt qui in mediterraneis vnicaulis nomine appellant tenuem herbulam, simplici caule, & minuto, floribus scartente tenuibus, flauo colore. hæc iucundior, quam præcedens effiat odorem. Vtraque excalfacit, extenuat, feruescacia conuenienter in muliebres

defessus adiiciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasque: item ad præclusiones vulvæ & eiusdem inflammationes: calculos comminuunt, remoraram vrinam cient. menses pellunt pubi illitæ. Succus vulvæ inditus ex myrrha eadem, quæ insensio trahit.  
 10 Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

ARTEMISIA TENUIFOLIA.  
CAPVT CXI.

ARTEMISIA tenuifolia in sepibus, & cultis iuxta aquarum ductus nascitur. Eius flores, & folia contrita sam-  
 20 pfuchi odorem reddunt. Si quis stomacho laborans, herbam cum amygdalino oleo bene contundat in malagmatis lentorem, & stomacho imponat, sanitati restituetur. Qui nervorum quoque dolore cruciatur, si succum eius cū oleo rosaceo miscēs illinat, sanatur.

TRIA à Dioscoride recententur Artemisiz genera. Verùm priora nullis inter se notis certant, nisi quòd in vniuersum altera maior est, altera verò minor. quæ priuatim florem gerit candidum, paruum, tenuem, ac grauitè olentem. Quæ autem tertio generi adscribitur, herbula est simplici, tenuiq; caule, floribus plurimis referto, flauo colore. Id quod etiam confirmat Plinius lib. x x v. cap. v i. sic inquit. Artemisia absinthij modo fruticosa est, maioribus foliis, pinguibusq; Ipsius duo genera: altera latioribus foliis, altera tenera, tenuioribus, & non nisi in maritimis æscens. Sunt qui in mediterraneis eodem nomine appellant herbam simplici caule, minimis foliis: flores copiosi erumpentes, cum vna maturefcit, odore non iniucundo, quam quidam botryn, alij ambrosiam vocant. Talis in Cappadocia nascitur: hæc Plinius. Qui tamen in prioribus Artemisiz generibus, nihil à Dioscoride dissentiat, dissidet tamen, & errat in tertio, quòd in eius locum ambrosiam sequenti capite ab ipso Dioscoride descriptam subiecerit, credideritque deceptus hic ambrosiam, & tertium Artemisiz genus, vnam & eandem esse plantam. Cæterum prima duo Artemisiz genera Hetruscis frequentissima sunt, neque in alto inter se distant, quam quòd in maiori omnes partes maiores spectentur, in minori verò minores: alius facie, & forma similia constant, quin etiam idem sapor, & odor, eademq; facultas vtrique inest. Quare equidem nescio, quæ ratione ductus Brasauus Ferrariensis in suo simplicium examine pro certo credidit, eam herbam minorem esse Artemisiam, quæ in Hetruria officinis Matricaria, & vulgò mulie-  
 30 ribus Amarella vocatur. Sed eò magis virum

Artemisia confusa ratio.

Plinius le-ssus.

hunc aliqui celebrem admirari subit, quod scriptis tradiderit duas alias esse Ferrariæ Artemisæ species nullis prioris notis distinctas, præterquam quod alteri vnus tantum sit ramus, alteri vero plures. Eius verba subiicere lubet. Non dubito, inquit, vt nonnulli fecere, eam quæ apud nos corrupto vocabulo Arcemise dicitur, ac si Artemisiam dictum sit, veram Artemisiam esse, quæ folia absinthio similia habet, vt Dioscorides inquit, & eius duo genera facit Monoclonon, & Polyclonon, id est, vnum ramum, & plures ramos habentem. Ambas species Ferrariensæ vulgus nouit, si aptè distinguere sciret, quoniam & ipsis indifferiminatim vtitur. Quam nos Matricariam, & Marellam vocamus, Artemisiam species est, illa scilicet, quæ male olet. Nec obstat, quod Ferrariæ duæ species Artemisiam sint per vnum, & plures ramos distinctæ, quoniam & hæc in specie est, quæ plures habet ramos. hæc Brasaulus. In quibus sanè verbis eius plura, meo iudicio, reprehenduntur errata. Quorum primum illud est, quod non scripserit Dioscorides, alteram primi generis Artemisiam multiplici constare caule: alteram verò simplicem tantum constargere, vt Brasaulus suo modo interpretari videtur. Sed author is duntaxat tradidit (vt etiam Plinius refert) quod aliqui reperiuntur, qui in mediterraneis vniculis nomine appellent tenuem herbulam, simplici caule, & minuto, floribus scatenis tenuibus, flauo colore. Verum hæc tertio Artemisiam generi assignantur, non autem secundo, vel primo, vt Brasaulus existimat. Altero deinde errore notatur, quod asserat Matricariam, sive Marellam, quam legitimum Dioscoridis parthenium censuimus, esse graecolentem Artemisiam. Quandoquidem minor illa, quæ Dioscoridi secundo loco redditur, grauius olens, non quidem florem profert in medio luteum, & per ambitum albis foliolis cinctum Matricariæ, vel Amarellæ modis: sed candidum, paruum, ac tennem. Tertius his accedit error, quod non assentire videatur, duo illa Artemisiam genera, quæ Ferrariæ persimiles habentur, ea esse, quæ à Dioscoride primo loco representata sunt, magnitudine tantum, ac paruitate differentia. Sed cum porro seipsam hac in re deceptum deprehendisset Brasaulus (vt legi in suo vltimo volumine Venetiis impresso) dum longa oratione contēdit Amarellam, seu Matricariam inter Artemisiam genera reponendam esse, Corulam verò fecundam Ferrariensibus Brusciaculo vulgo vocatam esse legitimum parthenium, adeo seipsam (pace eius dixerim) & sua scripta confundit, vt nullo pacto (dicam libere quod sentio, aliis tamen iudicandum relinquo) quid istandem decernat, percipi possit. Nam cum assensu Amarellæ, sive Matricariæ succum vnicarum quatuor ponderè haustum vtranque bilem, ac pituitam deicere, aptè quidem fateatur hanc esse Parthenium, cui priuatim ea vis inest. At-

tamen paulò post eorum fortè oblitus, argumentis quibusdam satis, mea quidem sententia, leuibus contrà asseuerat, nil aliud esse Parthenium, quam suum Brusciaculum. Ruellius hæc terea quauis in primis Artemisiam generibus lucinat. plane Dioscoridi subscribat, in tertio tamen hallucinatus deprehenditur, quod tertij generis Artemisiam eam esse putet, quam alij Athanasiam, alij Tanacetum appellant. Siquidem Tanacetum nostrum foliolibus compluribus ab vna tantum radice proflit, crassius, altius, ac firmis: foliis longis, amplis, crebris diutius dissectis: floribus incisis, in caulium cacumine gregatim emicantibus. Porro Artemisia, quæ tertio adscribitur generi, tenuis herbula est, vno duntaxat caule, ipsòque minuto conflurgens. Hanc equidem (vt ingenue fatear) hætenus in Italia non inueni neque ab aliquo inuentum vidi. Quin potius eam inuentu difficillimam duxerim, quippe cum tam Dioscorides, quam Plinius satis obscurè, perplexèque, de ea scripserint, & caulibus, foliorum, florum, seminis, & radicis notas silentio inuoluerint, non modo difficillimum videtur, sed vix etiam fieri posse putauerim, vt quis nunquam hanc Artemisiam legitimè demonstraret. Neque tamen in hoc audiendus est Plinius, qui (vt supra diximus) hanc esse Ambrosiam falsò memoria prodidit. Nam præterquam quod rationi consentaneum non est, quod Dioscorides duobus tam propinquis capitibus vnus & eiusdem plantæ historiam trahauerit, euidentissimum est, Ambrosiam sequenti capite descripiam huius tertie Artemisiam descriptioni haudquaquā respondere. Adhuc non in minori, quam Brasaulus, & Ruellius, versantur errore Monachi illi reuerendi, qui Mestem commentati sunt, quippe qui & hunc, & illum secuti duplici hallucinatione scriptis tradiderint, Matricariam vulgo vocatam omnino esse minorem Artemisiam, Tanacetum verò eam, quæ vniculis dicitur. In horum denique opinionibus, vel potius erroribus ipse quoque Fuchsius implicatur, vt aliqui ingenio, & eruditione præclarus, adeo vt etiam nemini dubitan. dum esse censent in suis de stirpium historia commentariis, quin Matricaria sit alterum Artemisiam genus, Tanacetum verò tertium. qua in re is fortasse fuit, qui maluerit cum aliis errare, quam solus rectè sentire. Cæterum facile credere nonnulli diligentissimi simplicium medicamentorum inquiriores, ac etiam Dioscoridis studiosi, qui sanè nulli vnquam labori pepercerunt, vt hanc medicinæ partem superiori ætati obscuram nostræ illustrem redderent, tertium Artemisiam genus in Dioscoride asciscitur esse. Quod in huius capituli initio non erit, sed duo tantum esse Artemisiam genera scribat Dioscorides. Quod præterea reperiatur huius auctoris codices antiquissimi, in quibus illa de tertio Artemisiam genere non legitur, quemadmodum etiam in nostro ex impressis libro, in quem caligationes ex vetustis

plura Brasauli errata.

Monachi-  
ru et Fuch-  
si error.

rum exemplarium manu scriptorum Dioscoridis, & Orisabij collatione excerptas collegimus, quas acceptas refero Gabrieli Fallopio Martinesi medico clarissimo, nunc Patavij summa cum omnium laude, & admiratione, corporis humani, & rei medicæ materiam profertenti. Cui certe ob eius singularem in me amorem ac liberalitatem, atq; etiam in omnes humanitatem, me plus debere scio, quàm aut re, aut verbis respondere possum. Cum itaque (ut ego redeam, vnde obiter digressus fuim) in Dioscoride suspecta sit tertia Artemisia, nil mirum videri debet, si in eius historia cæciterit Plinius. Neque item mirandum est, si eius non meminerint Galenus, & Paulus: qui tamen aliqui in simplicium censu Dioscoridis scripta bona fide referre solent. Non defunt insuper doctissimi viri, & in plantarum historia diuicius versati, qui Artemisiam tenuissile caput Dioscoridi accreuisse, atq; adulterinum esse censent, hoc ducti argumento, quòd cum superiore capite de omni Artemisij genere differuisset Dioscorides, absurdum quippe esset, quòd seorsum Artemisij genus aliud subiungeret. Addeunt etiam, quòd huius Artemisij inter simplicia nusquam meminerint Paulus, Orisabius, & Serapio: qui tamen (ut paulò antè dixi) illa ex Dioscoride transcribunt. Horum sententiam etsi planè probandum exstitem, cum tamen vulgari Græci codices hoc loco Artemisiam tenuissile caput habeant, illudquæ à quibusdam reddatur, nobis quoque adiciendum, eiusquæ aliquam saltem mentionem faciendam duxi: præsertim quòd non desint, qui id Artemisij genus inueniri tradant. Siquidem Ruellius est auctor, ipsum in Gallia nasci circa riuulos, aggregatq; item in frumentaceis agris, atq; inibi vulgò diu Iohannis herbam nominari. Verùm cum difficillimum esse patem, ut hæc planta ab aliquo cognoscatur, & legitime demonstretur, quòd nullis profus nonis depingatur, nescio equidem quomodo Ruellio viro aliqui diu digno in hoc quis rectè addipendi debeat. aut

fus, triu palmorū altitudine: foliis ru-



ta, circaimūcau  
lē exiguis cauli-  
culi seminibus,  
perindequasi ra-  
cemulis graui-  
di, qui nunquā  
florem pariunt,  
odore vinofo,  
suau: radice te-  
nui, sefq; peda-  
li. Coronantur  
ea Cappadoces.  
Vis ejus reprimere, ac repelle-  
re, & illitu ad-  
fringere humo-  
rem incumbunt.

Et si in nostris illis commentariis, quos  
 primum superiorem annis Italica lingua con-  
 scriptos dederant, ingenuè confessus essem, ne  
 nunquam vidisse Ambrosium in Italia, postea  
 tamen ea variis in locis se mihi obtrusè inspi-  
 cienda, præsertim, fecus memoria arcis Vipaci  
 (locus enim ibi distat à Gorizia circiter viginti  
 milia passuum) inter durissimos lapides orta.  
 Cui cum inibi ex tēpore obuiam factus essem,  
 eamq; confpexissem, botryos modo, racemoso  
 semine referam, statim inclinavit animus, vt  
 certo duceret hanc esse Ambrosiam. Ea quanius  
 à Diofcoride, & Galeno non aliis representetur  
 viribus, quàm vt reprimere, repellere, & illitu  
 adstringere valeat humores, tunc in aliquâ partē  
 decumbunt, dixere tamen nō poëta solum, sed  
 plantarum quoq; scriptores non contempnendū,  
 nulla alia de causâ præstare simiam hanc plantam  
 à veteribus Ambrosiam fuisse vocatam, quàm  
 quod suo in cibis vsu longæuos faciat homines,  
 quemadmodum Ambrosiam illam, quæ Deo-  
 rum fertur cibus, Deos immortales, perpetuo-  
 sque conservare fabulamur. Ambrosiæ me-  
 minit Plinius lib. x. x. v. cap. 111. vbi eam  
 iis verbis depinxit. Ambrosia vagi nominis, est  
 & circa alios herbas fluctans, fruticem vñ ha-  
 bens densum, ramosum, tenuem, trium ferè pal-  
 morum, tertia parte radicē breviorē, foliis ruti-  
 circa imum caulem. In ramulis semen est vuis  
 dependentibus, odore viroso, quæ de causâ bot-  
 tryis à quibusdam vocatur, ab aliis artemisia.  
 Coronatur illa Cappadoces. Vfus eius ad ea,  
 quæ discuti opus sit, hæc Plinius. Ambrosiæ  
 quoque facultates, sed quàm breuissimè, tradi-  
 dit Galenus lib. v. 1. simp. medic. sic inquit.  
 Ambrosia cataplasmatē imposita vim habet ad-  
 stringentem, ac repellentem. Ea vt Græcè λέ-  
 βρωσις, ita etiam Latine, & Italicè Ambrosia  
 nominatur.

Artemi-  
sa Vires.  
ex Guileno.

*Artemisa.* Herba, quæ *ἀρtemīsia* Græcis, *Artemisa* item Latinis, pariter & *Italis* dicitur: Germanis, *Beysnoffz*, & *Sant Johans gurtel*: Hispanis, *Artemisa*: Gallis, *Armoise*.

AMBROSIA. CAP. CXII.

AMBROSIA pusillus frutex est, ramo

*Ambrasia*  
*considerans*  
p. 10.

Ambrosia  
Vires ex  
Galea.

No opinion.

BOTRYS.

CAP. CXIII.



BOTRYS fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa: semen circa totos ramulos prouenit: folia cichorio similia. tota suauem odorem spirat, quare uelut in terponitur. Inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopneas ualcat. Hanc Cappadoces ambrosiam uocant, alij artemisiam.

Botrys  
confidera-  
tio.

LEGITIMA, & uera Botrys fabulosis, & aridis gaudet, quin & glareosis fluuiorum aluicis. Ideoque Tridenci frequentissima nascitur

secus Fersnam, & Lauisum rapidissimos torrentes, & in aliis quam plurimis locis. Goritæ mulieres Botryn in hortis ferunt, quod eam ueri affectibus opitulari existiment. Fruticat hæc foliis cichorii, laciniatis, sinuosisque quercuum foliorum similitudine: ramis numerosis, tenuibus, semine copiosissimo, racemosoque refertis. Planta tota succo quodam resinoso madet, adeo ut comprehensa resine modo manibus hæreat. Odorem quidem acrem spirat, & qui nares quodammodo feriat, sed tamen is suauitatem retinet. Plinius uidetur ex Dioscoride Botryn reddidisse libro x x vii. cap. viii. ubi eam in hunc modum descripsit. Botrys fruticosa herba est, luteis ramulis: semen circa totam nascitur: folia cichorio similia. Inuenitur in torrentium ripis. Medetur orthopnoicis, hætenus Plinius. Ceterum huius herbe, quod equidem legerim, non meminit Galenus in simplicium medicamentorum censu. Eius tamen facultates ex Dioscoride retulit Paulus libro vii. ubi sic inquit. Botrys, quam aliqui ambrosiam, alij artemisiam uocant, planta est admodum odorata. Hæc cum uino pota non nisi recta ceruicæ spirantibus, quos orthopnoicos appellant, auxiliatur. Ea Græcis *βότρυν*. Latine item Botrys dicitur: Italici, Botri: Germani, Trabenkraut, & Krottenkraut: Gallis, Piment, vel Mûllegraine.

Botrys  
Gres ex  
Paulo.

Nomina.

GERANIUM PRIMUM.



GERANIUM.  
CAPUT CXIII.

GERANIUM foliis anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in uino pota uulnæ inflationes discutit. Geranium alterum caulibus minutis, & pilosis, sesquipedalibus: foliis maluæ, in summis alis sursum spectan-

GERANIUM ALTERUM.



tia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina usus.

Dvo tantum Geranii genera à Dioscoride traduntur. Verum Latini, Plinio auctore, tertium genus addere uidentur, quod alterum quidem eorum à Græcorum descriptione differat. Id quod ipse Plinius aperte testatur libro x x i. capite x i. ubi de Geraniis differit iis uerbis

Geranii  
confidera-  
tio.

bis

GERANIUM TERT.



in cacuminibus capitula sunt gruum. Alterum genus foliis anemones, diuisuris longioribus radice mali modo rotunda, dulci. hæc Plinius, ex quibus facile colligi potest, tria esse Geranij genera. Romanis vnum, Græcis verò duo. Quæ omnia hodie passim ferè videntur in campetribus, secus vias, & iuxta sepes. Porro non desunt, qui putent eam herbam, quam scribit Plinius Geranium à Latinis vocari, à Dioscoridis myrrhæ non differre. Ipse tamen non dubitandum existimo, quin hæc illa sit herba, quam quidam Rostrum, tum gruis, tum ciconia appellant, quidam verò Acum muscatam, eo quod (vt Plinius inquit) odorem iucundum spiraret. Nanque assurgit hæc foliis cicuta, minoribus tamen diuisuris: caule breui, ac rotundo semine gruum capitulis contento, à quibus Geranij nomen omnibus inditum est. Cæterum Geranium, quod Dioscoridis secundo loco proditur, caulibus minutis, pilosis, sesquipedalibus, foliis malux, in summis alis gruum capitula gerehns fursum spectantia cum suis rostris, nunquam dubitauerim eam esse herbam, quæ Pes columbinus vulgò nominatur, quod nullis prorsus recedantibus notis hæc illi respondeat. Alterum verò, primo scilicet loco descriptum, & in Ananie vallis agro, & vbiq; ferè locorum passim provenit, foliis anemones modo laciniatis: floribus in purpura albicantibus, è quibus gruum capitula prodeunt: radice alba, ferè rotunda, ac dulci. Quapropter Ruellium hallucinatum crediderim, quod Acum muscatam dictam, quam ipse herbaris etiam Acum pastoris appellat ait, primi generis Geranij Dioscoridis esse opinetur. Quandoquidem Acus muscata radice non nititur rotunda, sed dulci, nec foliis videntur anemones æmulis: sed eam planè representat, quam Plinius testimonio, Latinis Geranium vocant. Præterea aduersus Hermolaum eos reprobendit Ruellius, qui putant secundum Dioscoridis Geranium eam esse herbam, quam quidam à rubro foliorum colore Rubertam appellant. Sed ipse mihi magis reprehendendus vi-

detur, quod crediderit Rubertam esse legitimam Myrrhim. De Ruberta autem, vt dicam quod sentio, eam quidem illius Geranij genus esse arbitror, quod Plinius ad Latinos reulit, cum ipsa tota illi sit similis, odorem iucundum æddat, flores proferat subpurpureos, & gruinis capitulis scateat, reliquorum Geraniorum more. Verum hanc non ita Myrrhidem referre comperio, vt Ruellius existimat. Siquidem Myrrhim foliis admodum rubentibus, & gruiro capite nasci, nec Dioscorides, nec alij, quod legimus, memoriam prouiderunt. Myrrhis enim foliis est cicuta: radice rotunda, molli, cibis non insuauit. At his omnibus Ruberta caret, vt libro quarto clarius patebit. Porro tamen Hermolaus ab errore, quantum reor, vindicari non potest, quod scripserit, Geranium id esse Latinis, quod Dioscoridis myrrhis, Plinij fortasse lectione deceptus, qui loco supra citato Latinis vocatum Geranium à quibusdam Myrrhim appellari scriptum reliquit: quanquam legitima Myrrhidis historiam tradidit libro x x 1111. cap. x v i. Nec sanè mirum est, Plinium scripsisse Geranium aliquibus vocari Myrrhim, cum etiam è Græcis fuerint, qui Geranium, quod secundo generi adscribitur, Myrrhim appellauerint, vt videre est in iis Dioscoridis exemplaribus, in quibus cuiusque capituli initio innumera plantarum nomina leguntur. Fallitur quoque hæc in historia Brasauolus, asserens nullo modo iis esse adscriptulandum, qui Pedem columbinum vocatum Geranium esse contendunt, quod Geranium foliis exeat maioribus anemones incisuris. Sed is, meo quidem iudicio, ignorasse videtur, quod secundum Geranij genus, non autem primo generi à Dioscoride assignatum, est illud, quod Pes columbinus censetur. Vel fortasse dum hæc scriberet, alterum Geranij genus non animaduertit in Dioscoride, quod tunc lectionis impatientis, totum illius caput non perlegerit. Aliam ab his Geranij plantam vidimus in pluribus hortis, æ viridariis satam, foliis rotundis, secundi Geranij modo per ambitum laciniatis, malum magnitudine æquantibus, fructu gruinis capitulis sumis. Hæc herbariorum nonnulli Momordicam nuncupant, quemadmodum & Balsaminam alij eodem nomine vocant: eamque cæteris præferunt in potionibus ad interna vulnera glutinam. Hæc, mea quidem sententia, magis respondet alteri Dioscoridis Geranio, vt quæ foliis ad malum propius accedat. Quare & hanc magis eandem esse cum illo putauerim. Verum tamen haud eam inficias, quin Pes columbinus dictus idem sit Geranium sed eum quis rectius fortè Geranium minus dixerit. Primi Geranij radix (vt Plinius est author) resicentibus se ab imbecillitate vtilissima est. Bibitur contra phthisim drachma in vini cyathis tribus bis die, item contra inflationes, quæ & cruda idem præstat. Succus radicis auribus medetur. Opisthotonicis semen drachmis quatuor cum pipere, & myrrha potum.

Secundum

Hermolaus  
Lap. 160.Brasauolus  
error.Momordica  
dicta.Ruellij  
et  
vulgaris.



Secundum verò Geranium et si nullius esse in medicina vñs scriptis tradiderit Dioscorides, non desunt tamen hodie herbarij, qui in internis vulneribus glutinandis, & fistulis sanandis ipsum in portuibus sumpunt, misceat commendent. Sed equidem vereor, ne & hic decipiantur. Serapionis interpretem secuti, qui Amomum Pedem columbini appellavit, quippe quoniam propria sit Amomi facultas internis corporum vulneribus mederi. Geranii non reperio meminisse Galenum in simpliciu medicamentorũ libris. Eius quidẽ meminuit Paulus, sed ea tantũ de Geranii posteritatis memoria madsuit, quæ ex ipso Dioscoride sumpsit.

*Nemina.*

Quod Græci *γεράνιον*, Latini similiter Geranium vocant: Itali, Geranio: Germani, Storcken senkel: Hispani, Pico de ciguena: Galli, Bec de Gruet, vel, Bec de Cigoigne, aut Herbe Robert.

GNAPHALIVM. CAP. CXV. 20

GNAPHALII folijs albis, molli-  
busq; aliqui pro tomento vtuntur. Bi-  
buntur efficaciter folia in vino austero  
ad dysenteriam.

GNAPHALII historiam adeo paucis per-  
strinxit Dioscorides, vt nobis non modo diffi-  
cile, sed etiam impossibile videatur, vt quicquid  
conoscere, ac decernere possit, quænam planta  
sit, quæ verum Gnaphalium representet: præ-  
sertim cùm antiquorum hæcenus repperim  
neminem, qui Gnaphalii faciem longiori histo-  
ria expresserit. Etenim Plinius eadẽ, quæ Dio-  
scorides, breuiter vsus, Gnaphalii notas red-  
didit libro x x v i i. cap. x. Fuchsius tamen  
in suis clarissimis de stirpium historia comen-  
tariis herbam quandam pro Gnaphalio osten-  
dit, quam ideo fortasse Gnaphalium existima-  
uit, quod incana, tomentosaque conspiciatur.  
Sed mihi planè eam Fuchsius pro Gnapha-  
lio depinxisse videtur, quam Plin. lib. x x i i i.  
capite x i x. Herbam impiam vocari tradit:  
quæ merito i m p i a Plinij dici posset, quod  
eius è veteribus nemo, quantũ equidem lege-  
rim, præter ipsum meminere. De qua is disse-  
rens loco modo citato, eam iis notis, & viribus  
descripsit. Herba impia vocatur incana, roris  
marini aspectu, thyrsi modo vestita, atq; capi-  
tata. Inde alij ramuli assurgunt, sua capitella  
gerentes. Ob id incaniam appellauere, quoniam  
liberi super parentem excellant. Alij potius ita  
appellatam, quod nullum animal eam attingat,  
existimauere. Hæc inter duos lapides trita fer-  
uet, præcipuo aduersus anginas succo, lacte &  
vino admisso. Mirumq; traditur, nunquam ab  
eo morbo tentari, qui gustauerint. Itaque &  
sibus dari, quæq; id medicamentum nolue-  
rint haurire, eo morbo interire. Sunt qui & in  
autum nidiis inferi aliquid ex ea puteat, acque

*Impia her-  
ba Plinij.*

ita non strangulari pullos avidius deuorantes.  
hæcenus de Impia Plinius. Cæterum quoniam  
Gnaphalium ob eius tomentũ, illud candidif-  
simũ vellus, quod vulgò nos appellamus Bam-  
bagia, & alij Cotone, Latini verò x y l o n, &  
Gossipium, mihi in mentem redegit, à  
veteribus Græcis nusquã, quod scĩã,  
descriptum, ideo hic de eius histo-  
ria, ac viribus lac-  
tius differendũ du-  
xi, quam fecerim in  
huius mentione, vbi  
etiam quoq; memi-  
ni. De hoc itaque  
Plinius lib. x i x.  
cap. i i. sic loqui-  
tur. Superior, in-  
quit, pars Aegypti  
in Arabia vergens  
pignit fructicẽ, quẽ  
aliqui Gossipio vo-  
cant, plures Xylon, & ideo lina inde facta xylina. Paruulus est, similemq; barbatæ nuci desert  
fructum: cuius ex interiore bombice lanugo  
netur. Nec vlla sunt ei in candore, molliatve  
præferenda. Vestes inde sacerdotibus Aegypti  
gratissimæ: hæc Plinius. Hac ætate Xylon feri-  
tur etiam in Cypro, Creta, & Sicilia insulis,  
vbi copiosissimum prouenit: quĩ & in Apulia,  
alijsq; regionibus nascitur. Huius lanugo man-  
ifestè exalfacit, ac siccatur. quæ si comburatur,  
mirum in modum manentem è vulneribus san-  
guinem sistit. Seminũ medulla iussu, & diffi-  
culter spirantibus auxiliatur: genitale semen  
procreant, proinde venerem stimulat. Oleum  
ex ea exprimitur, quo tum lentigines in facie,  
tum etiam cæteræ cutis maculæ optime delentur.  
Sed vt iam Gnaphalio suas ex Galeno  
reddamus vires, eas ipse libro v i. simplicium  
medicamentorum, his verbis retulit. Gnapha-  
lium ideo sic nominatum est, quod folijs eius  
molliibus ærĩ *γναφάλιον*. hoc est, pro tomentis  
vtantur. Sunt autem candida, & mediocriter  
adstringunt: ac proinde quidam id exhibent, ex  
austeriorum vinorum quopiam, dysentericis.  
Herba Græcis *γναφάλιον*, Latinis etiam Gna-  
phalium appellatur.



TYPHA. CAP. CXVI. 20

TYPHA folium edit cyperidi si-  
mile: caulem album, læuem, æquabi-  
lem: flore in cacumine ambiente,  
densum, qui in pappos soluitur, quod  
paniculam aliqui nominant. Huius  
herbæ flos suillo adipe eloro exceptus,  
H ambu



*Oenanthes  
confiliter.*

FILIPENDULA.



OENANTHEN, cuius hic Dioscorides meminit, Theophrastus libro vi. cap. vii. de plantarum historia, & Plinius lib. xxi. cap. xxi. non equidem hactenus reperi, ac vidi in Italia, etsi in ea indaganda non parū laboris infuserim. Fuchsius, & recentiorum herbariorum plerique Oenanthen eā esse herbam existimant, quæ hodie FILIPENDULA vocatur. Quorū certē sententiæ, quanvis virorū magnæ apud me auctoritatis, nunquam potui subscribere. quod Filipendula hæc magna nusquam, quod inuenierim, radice nitatur, quæ rotundis exuberet capitibus: quod semen nō ferat atriplicis: quod denique non in pratis, & lato vbi que solo proveniat. Quibus finē rationibus nō potui non adduci, ut apud Dioscoridem alioquin omnino à Filipendula Oenanthen semper crediderim. Oenantes vires, quas describit Galeus in simplicium censu, non sicut in hi reperi. Ceterum Filipendula non virgatis pollere viribus, testantur recentiores. Ea enim vineæ remoratur, eiusque stillicidio auxiliari vitæ renum tum calulis, tum doloribus: Eadem stomachi inflationes discutit. Medetur suspicioso, & anhelantibus, omnibusque in universum morbis, quos causa frigida excitaerit. Prodest comitialibus inaspero cibis radicum pulvere. Planta, quæ Græcis *οιανθεν*, Latinis etiam Oenanthe appellatur: Italis, Enanthe.

*Filipendula  
Gris.**Namini.*

CONYZA. CAP. CXIX.

CONYZÆ duo genera. quæ parua vocatur, odore præstantior est: maior verò frutice altior, & foliis latioribus, graui odore. Vtriusque folia oliuæ similia, hirsuta, pingua. in maiore caulis binum cubitorum altitudine atrolitur, in minore pedem aequat. flos fragilis, lutei coloris, qui in pappum abit. radices superuacua. Suffitu, substratūque frutex totus serpentes fugat, culices abigit, & pulices necat. Folia con-

CONYZA MAIOR.



CONYZA MINOR.



CONYZA MEDIA.



uenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac vulneribus. Flores, & folia cum vino ad menses, partusque efficiendos bibuntur: item contra viræ stillicidia, atque quatum morbum, & tormina: comitiales pota ex aceto adiuuant. Decoctum in defensionibus medetur vulnæ malis. Impositus succus abortum facit. Herba ex oleo efficaciter horribus oblinitur. Capitis dolores tenuis iijura sanat. Est & tertium conyzæ genus, caule crassiore, ac molliore: foliis mediæ inter maiorem, & minorem amplitudinis: minime pinguis, multo tamen grauioris odoris, & iniucundioris, sed inefficacior. Prouenit locis humantibus.

*Conyza* omne genus non in Hetruria  
*considera-* solum, sed alibi quoq; passim ferè prouenit, nul-  
*tio.* lis prorsus reclamantibus notis, quæ earum sin-  
 gulis à Dioscoride tribuuntur. Conyza maior  
 vulgò Pulicaria dicitur, quia substrata (vt Dio-  
 scorides inquit) pulices necat. Quæ fortasse ra-  
 tione adductus Theophrastus in Theophrasto Co-  
 nyzam Pulicariam interpretatur. Meminit autè  
 Conyze Theophrastus lib. vi. cap. 11. de planta-  
 rum historia, vbi de eius generibus differit his 10  
 verbis. Conyza mascula, & femina constar. Di-  
 stant quemadmodum cetera, quæ sic discerni de-  
 siderant. Femina enim tenuiori vestitur folio, &  
 compressior est, atq; in totum minor. Mas am-  
 plior, crassiorq; caule, atque ramosior, & foliū  
 amplius, pinguiusq; habens: necnon & flore  
 splendidior est. Ambo fructiferi sunt, in totum  
 serotina germinant, floreq; constant: quippe cum  
 cieca arcturum, & post arcturum incipiant. Ma-  
 ri grauior odor: feminae acrior, ideoq; cōtra be- 10  
 stiarum morsus commodior est. hæc Theopha-  
 stus de duplici tantum Conyze genere. Ceterū  
 tertia eius species, cuius à Dioscoride sit  
 mentio, inter marem, & feminā media est. Na-  
 scitur hæc in Ananix vallis agro, & in Goritiensi  
 comitatu copiosissima, humentibus præsertim  
 locis, & secus vias, vbi ex agrorum marginibus  
 aqueus humor stillicidio quodam in proximos  
 defluit canales. Conyze vires posteritatis me-  
 morie prodidit Galenus libro vi. i. simplicium 30  
 medicamentorū, sic inquit. Conyza & maior, &  
 minor adsimilis sunt tum temperaturæ, tum fa-  
 cultatis: gustui amara, & acres apparent. Excal-  
 faciuntq; admodum luculenter, siue quis folia  
 læuigata cum teneris ramulis (est enim frutico-  
 sa planta) parti cuiuspiam illinat, siue vbi in oleo  
 coxerit, eo vtatur. Siquidem concussionis, siue  
 rigores per circuitum redeuntes, tale sanare  
 oleum videtur. Flores quoque eorum adsimilis  
 sunt facultatis. Itaque quidam, & ipsos cum so- 40  
 lis tritos in vino bibendos exhibent ad men-  
 ses foriter ducendos, ciendūq; sætum. Est &  
 tertium Conyze genus, in locis humidioribus  
 proueniens, vtriusq; filis tum grauculentius, tum  
 imbecillius. Sed primæ memoratæ tertij sunt  
 ordinis in exalaciendo, & exiccando. *Urysa* sic  
 Græcè, vt etiam Conyza Latine dicitur: Italicè,  
 Coniza, & Pulicaria: Germanicè, Geelle muntz,  
 & Durreurtz: Hispanicè, Attadegua, Gallicè,  
 & de aux Puces.

HEMEROCALLIS. CAP. CXX.

HEMEROCALLIS folium, & cau-  
 lem habet lilij, herbacei coloris vt  
 porrum: flores in caule per singulos  
 exortus, terni aut quaterni erumpunt,  
 lilij diuisura, quoties dehiscere cœpe-  
 runt, colore perquam pallido: radix

HEMEROCALLIS.

HEMEROCALLIS  
ALTERA.

magna est, atq;  
 bulbosa. Quæ  
 pora, aut cum  
 melle, & lana  
 in pello apposi-  
 ta, aquam edu-  
 cit, & sanguinè.  
 Folia trita mā-  
 marum inflam-  
 mationes à par-  
 tu contractas,  
 oculorūq; col-  
 lectiones miti-  
 gant. Radix, &  
 folia igniambu-  
 stis vtilissimè  
 illinuntur.  
 HEMEROCAL-  
 LIS nusquam nō  
 prouenit in Italia,  
 quandoquidem cir-  
 ca messem in aruis  
 inter segetes, in  
 pratis, in montibus,  
 & in vallibus au-  
 reo colore emicat.  
 Vulgus Lilium syl-  
 uestris nominat. Ra-  
 dice nitiur bulbo-  
 sa, hortensii lilio per-  
 simili, sed colore  
 diuersa. Flores, cū  
 suo tempore dehi-  
 scent, colore per-  
 quam pallido (vt  
 Dioscorides ait)  
 conspicitur, adeo  
 vt fulgentis auri  
 modo rutilent. He-  
 merocallis genus & illud esse nō difficeat, quod  
 ego inueni in montibus Lapidæ. id nanq; facie  
 alterum æmulatur, sed radicem habet, quæ plu-  
 ribus & paruis coagmentatur bulbis: quinetiam  
 flores profert aliam fortiss diuisuram, vt eius  
 effigies, quam hic adiecimus, aperte demonstrat.  
 Hinc itaq; eorum error, vt arbitror, euidentis-  
 simè deprehenditur, qui Lilium conuallij vul-  
 gò dictum Hemerocallim esse existimāt. Nanq;  
 illud folijs constar ferè plantaginīs, tenuioribus  
 tamē, minusq; striatis, cauliculis inuicem, tenui-  
 bus, ac mollibus: in quibus cacumen velius plu-  
 res prodeunt flores albicantes baluisti, & arbuti  
 effigie, odore perquam iucundo. Radices demit-  
 tit laxas, longas, fibris, capillamentisq; repletas,  
 nullis adiacentibus bulbis. Hemerocallis verò,  
 Dioscoride teste, folia, & caulē pro fert lilio simi-  
 lia. flores colore admodum pallido: radicem  
 mag nam,

Hemero-  
callis com-  
sideratio.Quorundam  
error.

## LILIVM CONVALLIVM.



magnam, bulbosamq. Quæ sine, notæ, si diligenter conferantur, manifestissime indicant, eos hallucinari, qui Liliū convallivm Hemerocallidū esse contendunt. Liliū convallivm magnus apud Germanos in medicamentis est usus (abūdat enim eo maximè Germania) ad varios corporis morbos.

Aiunt eo roborari

cor, cerebrum, & omnes principes facultates. Idcirco resolutis, comitialibus, convulsis, vertiginosis, animi deliquio correptis, & cordis pulsatione concussis, ipsum exhibent. Quin & istis, seu commotis à venosis animalibus præbent. Item ægrè parturientibus, oculo- rumq; inflammationibus maximo esse auxilio prædicant. Conficiunt autem ex floribus per æstatem siccatis vinum vindemiaarum tempore, ipsos calcatis vis admittentes, quo postea vuntur ad prædicta. Sunt & qui recentes flores vetere vino macerant, & in vitreo vase diu insolent, admittis lauendulæ vocatæ, & roris marini floribus, additisq; odoramentis nonnullis: deinde ex iis stillatitiam aquam in calentis aquæ balneo vitreis organis eliciunt, eamq; aureis, argenteisque vasculis reponunt. Hanc aquam auream appellant: qua vuntur ad omnes prædictos corporis affectus. Quinimò eam iamiam animam expirantis ori inferunt, rati ex eius assumptione homines morietes in vita retineri posse per pluresculum temporis spatium. Sed quia vana isti ferantur opinione, nihil quidem sæpenumero experimento deprehensum est. Quod est illis quoque irritum comperitur, ea tamen est huiusce aquæ apud omnes auctoritas, ut plerique ab eius exhibitione abstinere nequeant, etiam in morbis calidissimis. Cæterū non sine errore Fuchsius, vir aliquo doctissimus, putat Liliū convallivm esse Ephemerū, de quo Dioscorides agit libro sequenti. Sed quia est aperte decipitur, nos suo loco dicemus. Hemerocallis meminit Galenus lib. v. i. simplicium medicament. sic inquitens.

*Hemerocallis Græcæ ex Gale.*

Hemerocallis radicē habet liliū radici similem, nō figurā tantum, sed & viribus. Prodest nō siccis atq; illa, igni ambustis quippe quæ leviter digerentem facultatem habeat, & cum hoc repulsiū quiddam. Quæ Græcis *hyspania* dicit, Latinis quoq; Hemerocallis, & Liliū sylvæ vocatur: Italis, Hemerocalle, & Giglio salvatico: Germanis, Heydnischliffen: Hispanis, Lirio amarillo: Gallis, Lis jaune.

## LEVCOIVM, SIVE ALBA VIOLA.

CAP. CXXI.



LEVCOION vulgaris est fiorita, sed in floribus differentia quadam: nunc aut cærulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inveniuntur. Luteū verò præcipui in medicina vsus.

Huius aridi flores feruēfacti in defensionibus, valent contra vulgæ inflammationes, & menstrua expellunt: sanant oris vlcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis. Semen duū drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle inditum, menses, secundas, & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienem reprimunt, & podagricos iuvant.

LEVCOION est Latine alba tantum violam ipso nomine significat: tamē à rei consideratione. herbaria auctoribus, pro cæteris violarum generibus, luteo scilicet, purpureo, cæruleoq; colore distinctis, sæpe vsurpari solet. Id hodie officinis, atq; etiam medicis istis, qui Arabum factionem sequuntur, horum voce Chelri nuncupatur. Leucoium omne ferè genus in Italia in hortis, ac viridariis, in adium fenestris, parietibusq; frequentissimè visitur: ubi illud in sigulinis, ac ligneis vasis mulieres fluitosè colit, ac fouent. Namq; eius flores cum coloris varietate, tum odoris suauitate tantum cum oculis, & naribus ineunt gratiam, ut in coronamentis frequentissimè addantur. Porro non temerè omne ferè genus Leucoij in Italia nasci modò diximus. quòd quidem cæruleum inibi, quod suspensum sciam, non provenit. Quamobrem Marcello Dioscoridis interpreti subscribendum puto, qui Leucoium cæruleum hoc loco accevisse suspicatur, vultissimè Latini Dioscoridis Longobardi literis scripti testimonio nixus, in quo nullum planè de cæruleo Leucoij colore verbum legebatur. Suspicionem hanc augēt, itaq; esse comprobant Oribasius, & Serapio, quos item id verbum hoc loco non habere conperio in simplicium censu, cum alioquin reliqua Dioscoridis referant. Cæterum ex Leucoio,

*Dioscoridis locus suspectus.*

sue ex albis violæ floribus, vapore qui cæteris odore præcellant, Persæ odoratum illud vnguentum parant, quod Iasminū appellant, vt primo libro in ipsius Iasmini vnguenti mentione offendimus, vbi eorum sententiam refutauimus, qui è floribus Gelsimini vulgò vocati id fieri contendunt. Leucoij vires tradidit Galenus libro v. i. simplicium medicamentorum, sic inquit, Leucoij frutex vniuersis extergentem facultatem possidet, ac tenuium partium est: plus tamen flores, & inter hos qui sunt sicciore, magis etiam quam virides, aded vt & oculorum cicatrices crassas extenuent. Tum menses quoque decoctum eorum mouet, & secundas, secundumque emortuum elicit: & si bibatur, socum viuum perimena, & abigens est medicamentum: est enim id, vt si quod aliud, amarum. Quod si quis virium eius vehementia multa aqua admixta rerundat, ac mitiget, aut certe id genus aliquo, habebit & ad phlegmonem bonum medicamentum. Sic decoctum eius si non merum fuerit, vteri phlegmonas identidem persusum sanat, potissimum quæ diuino tempore ad scirrhū modum induruerit. Sic cum cerato vlcera ægrè ad cicatricem peruenientia curat. Sunt verò etiam, qui cum melle ad oris vlcera adhibeant. Semen cum eiusdem sit facultatis, apertissimum est duarum drachmarū mensura potum: tum mensibus ciendis appositum cum melle, conuenire credetur, scilicet tuncque viucentem interficere, ac mortuum eicere. Radices similes quoque facultatis, nisi quatenus crassioris sunt essentia, & magis terrena, cum aceto lienes induratos sanant. Nonnulli verò & phlegmonas in articularis induratas his curant. Id adonchp Græcis dicitur, quod Latinis Viola alba, (quoniam eo nomine Græci & Iuream, & purpuream violam comprehendunt) Mauritanis, Keiri, Cheiri, siue Alcheiri: Italis Viola bianca: Germanis, Gelb violen, & Vuyß veil: Hispanis, Violetas amarillas, & Violetas blancas: Gallis, Violiers.

## CRATAEOGONVM. CAP. CXXII.

CRATAEOGONVM, siue, vt aliis placet, cratænon, foliis melampyro simile est, multis calamis ex vna radice emicantibus, multorumq; geniculorū: semine milij. Nascitur in opacis, & frutetosis parte plurima: supramopere acre. Traditum est à quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore, ter die post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus, & vir modo consimili, totidem diebus ante coitū hauriat, virilis sexus partum futurum.

QV ANVIS putent nonnulli Cratægonum esse quandam Persicaria vocatæ speciem: ego tamen eorum sententiæ non ausim subscribere, quod Persicaria nullis ferè notis Cratægonum æmulari mihi videatur. Neq; verò aliam herbam, quæ Cratægoni effigiem repræsentaret, hæcenus reperi, aut repetitū vidi in Italia: vbi tamen ipsum nasci non negauerim. Sed certe id inuenit difficile suspicor, quoniam eius descriptio, quemadmodum, & sequentis, ab omnibus, qui extant, rei herbariæ authoribus obscure satis, & confusa traditur. *Kratægonos* sic Græcè, vt Cratægonum item Latine vocatur: Cratægono, Italicè.

## PHYLLON. CAP. CXXIII.

PHYLLVM, quod elæophyllon vocatur, in saxosis nascitur. diuū generum est. Quod autem thelygonum appellant, provenit musci modo, folio oleæ, sed colore magis herbaceo: caule tenui, breui: radice exili. florem album profert: semen papaueris, maiusculū. Sed arrhenogonum cætera huic simile, solo fructu distat: habet enim racemosum quiddam deflorentibus oleis non dissimile. Arrhenogonon potu, masculi sexus facere partus, vt thelygonon foeminei, prodit. Horū Cratæonas author est. Sed huiusmodi historiætenus mihi produxisse visum est.

LEGITIMVM Phyllum nendū hac ætate, quod sciam, in Italia compertum est: quanquā videatur Ruellius existimasse, Persicariā, quam maiorem cognominant, esse Phyllon. Quæ in ætate, meo quidem iudicio, speret fallitur: siquidem Persicaria illa humilibus, ac vlginis locis provenit: Phyllum verò in saxosis nascitur, vt Dioscorides testatur. Qui tamē, si eius verba accuratè expenduntur, nullā huius herbar cognitionem habuisse deprehenditur, nisi eam, quam ex Cratæus herbarij historia habere potuit, unde fortè ea omnia sumpsit. Qgo sit, vt mirari non liceat, si nobis quoq; Phyllum cognitū sit difficile. De quo nihil à Galeno, & Paulo proditum inuenio: id quod haud dubiam fidē facere potest, non secus illis, ac nobis Phyllū fuisse incognitum. Cæterum nō desunt qui velint Phyllum à Ligonotti, hoc est, Mercuriali nō differre, quod pluribus tum notis, tum factis sibi iunctè respondeant. Verū quod cū his non possum liberè cōsentire, hæc me maxime animo suspensum detinent, quoniam Mercurialis folia habet ocini, helxinæ cognata, non autem olivæ: florem herbaceum.

baceum, non album. quod præterea Mercurialis nascatur passim in hortis, & vineis, non in saxosis tantum. quod de his denique seorsum diversisque capitibus scripserint Dioscorides, & Plineus, utpote de rebus inter se differentibus. Equidem hoc anno plantam inveni inter saxa in Saluatino monte non longe à Goritia, folio mercuriali crassiore, breviori, aliquantum in ambitu serrata: semine iam desorentis oliuæ simili. Quibus utique notis ea mihi visa est satis Arrhenogono suffragari. Sed an verum fuerit Arrhenogonum pro certo affirmare non audeo. Phylli meminit Theophrastus libro x i. cap. x i x. de plantarum historia, ubi ita scriptum reliquit. Quædam ad procreandum marem, aut foeminam valere traduntur. Quamobrem Phyllon tum arrhenogonon, hoc est, masculicum, tum thelygonon, id est, foeminicum vocant. Ambo inter se similia sunt, & ocimi speciem referunt. Fructus thely-

*Phyllimon  
non Theo  
phrastus.*

goni modo musci oleaginei, verum pallidiori: arrhenogoni verò sicut oliuæ, cum primum ex muscoso flore emergit geminus modo testiculi hominis. hæc Theophrastus. Ex cuius nimirum verbis colligi potest, Dioscoridis codicem hoc in loco deprauatum esse. quandoquidem Theophrasto thelygonum non nascitur musci modo, neque solum habet oleæ viridius, ut in Dioscoride scriptum legitur sed fructum quidem ferre in modum musci oleæ, pallidiorum tamen. Quæ certe thelygoni notarum diuersitas facit, ut planè suspicer in Dioscoridis potius, quam in Theophrasti verbis mendam aliquod subesse. Acque adeò sit, ut quasi iam non dubitem asserere eam plantam, quam ego reperi (ut antè dixi) in saluatino monte, verum Arrhenogonum esse: non solum quòd descriptioni pulchrè respondent, sed etiam quòd in notis ferè non dissentiant auctores illi grauissimi. Herba, quæ Græcis *gynæce*, Latinis & Phyllis, & foliis appellatur: Italis, Phillo, & Folio.

## TESTICVLII SPECIES.



## TESTICVLVS. CAP. CXXIIII.

TESTICVLVS, quem Græci cyno-forchin vocant, foliis circa caulem, & ima eius parte in terra stratis, oleæ molli similibus, longioribus, angustioribus, lauibus: caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore, quæ mollior: ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbi. Ex quibus si maiorem edant viri, mares generari dicuntur: si minorem foemine, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad sti-

## TESTICVLII SPECIES.



mulandos coitus: aridam verò ad inhibendos. & alterum alterius potu resoluui. Nascitur in petrosis, & sabuletis.

## TESTICVLVS ALTER.

## CAP. CXXV.

TESTICVLVS alter alio nomine serapias, Andreas auctore vocatur: quoniam radix multa utilis sit. Foliis est porri, latioribus, oblongis, pinguius, ex alterum sinu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis: radice testiculis simili. Quæ illita tumores discutit, vlcera purgat, & serpente

## TESTICVLVS.

SATYRIUM. CAP. CXXVI.  
TESTICVLVS  
ALTER.

dam, gustanti dulcem, & ori non ingrati. Quam in vino nigro austero bibere conuenit, contra opisthoronum. Vtendum ea dum concubendi inces sit cupiditas: siquidem ea priores ad venerem fieri affirmant.

SATYRIUM ERYTHRONIUM.  
CAP. CXXVII.

EST ET alterum Satyrium erythronium, siue erythraicon, id est rubrum, femine lini, maiore, duro, leui, splendente. quod fertur non secus atque scincus, libidine excitare. Cortice radice gracili, rufo. intus autem album includitur, sapore dulci, non ingrato ori. In mon-

eadem non patitur: abolet fistulas, & illitu inflammationes lenit. Arida radices nomas in hibernant: sanantque putredines, & oris vlcera cacoethe: aluum sistunt è vino potat. De hac, eadem quæ de testiculo canis, produntur.

SATYRIUM aliqui trifoliū vocant, quoniam tria fert folia, ad terrā infracta, rumici, aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cu biralem, nudū: flor. m. lilij effigie, candidum: radicē bulbosam, māli magnitudine, fuluam, intus vt ouum candi-

tosus, & apricis enascitur. Venerem, vt pōt, si omnino manu teneatur radix stimulat: eoq; magis, si bibatur in vino.

Satyrii,  
Et Testiculi confusio  
deratio.  
Maltorum  
error.

## PALMA CHRISTI.



ERRANT, meæ quidem sententia, omnes ferè huius ætatis medici, ac seplafarii: quippe quod Canis testiculo legitimi Satyrii vice passim in medicamentis vtatur. Nam hæ plantæ (si Dioscoridi credimus) notis, ac facie maximè inter se distant, quanuis viribus, & facultate non longè sint dissimiles. Testiculo enim radices, præter id quod animaliam testes repræsentant, ob-

longæ sunt, binæ. vtrinq; pendentes: superior tamen altera, quæ plenior est: inferior altera, quæ mollior, & rugosior. Satyrii verò radix bulbosa, molliq; modo exuberans describitur, colore exterius fulua, interius vt ouum candida, gustati dulcis, & ori non ingrata. Cæterum verum Satyrium, vt iugenuè fatear, hæcenus in Italia videre mihi non licuit. Testiculorum porro in Ananiensibus montibus, aliisq; compluribus locis non modò duo inueniuntur genera: sed alia quoq; longè plura. quibus & illud addendum esse existimaui, cuius radix humanæ manus similitudinem refert. Vulgus à prædictæ radice figura id palmam CHRISTI appellat. Auicenna hæc radices Digitos citrinos nuncupat. etsi eas Digitos citrinos esse perperam, nullaq; quod in libro suo legerim, ratione ducti negent Monachi illi, qui in Mesuem commentarios ediderunt. Huius duo in Anania valis montibus habentur genera. Vnum maius, quod folia ferè lilij habet, læuia, parula, maculis quiquisdam nigris respersa: caulem rotundū, læuem: florem spicatum, varium, in purpura albicantem, odore non ingrato: radices duas, quæ sanè testiculos caninos referrent, nisi ramis quibusdam quasi digitis, humanam manum exprimeret viderentur. Alterum minus, quod foliis constaret: croci: caule dodrantali, iunceo, læuiq; in cuius cacumine flos emicat purpureus, amaranthi æmulus, qui recens odore quam suauissimum reddit. Huius exiccata puluis ex aqua ignitum chalybè experta, epotus (vt perhibet ij, qui ita esse experimento cōprobarunt) dysentericis maximè prodest. Idem aquam præstare aiunt, quæ per vitrea organa ex iis elicitor. Radices hæc similes, sed quæ alteri magnitudine cedunt. Excelsi sunt vtræq; (vt author est Auicenna)

Palma  
Christi  
vera.



na) siccatq; secundo refectū. Crassa corporis ex-  
cremēta pellūt, faciēq; detergūt. Dantur mania-  
cis magno iuuamento: quin & in nervorū affe-  
ctibus. Seminis pulvis drachmæ pondere ex  
vino potus, comitialibus subuenit. Item radi-  
cis decoctum vino dulcius committunt, quod  
bibendum paratur tam in prandio, quam in coe-  
na. Radices, Nicolai Florentini testimonio, febre  
quartanam fugant: namque earum tantum  
vſu Biliotum quendam curatum reſultit.  
Fuchſius Palmam Chriſti non rectē, pace eius  
dicitur, inter Satyrj generā depinxit: ſiquidem  
ea potius, meo iudicio, inter Canis testi-  
culos erat representanda. Quinetiam in eo mihi  
planē erraſſe videtur, quod Satyrium tri-  
phyllon, perinde acque canis teſticuloſus, cum  
duabus radicibus pictura expreſſerit cōtra Dio-  
ſcoridis delineationem, qui vnam tantum ra-  
dicem Satyrio mali magnitudine reddidit. Niſi  
fortaſſe iſt potius fuerit pictoris lapſus. Hallu-  
cinatur præterea vnā cum Meſue Patres illi  
euerendi, qui eius antidotarium commentati  
ſunt, quippe qui male ſibi perſuaſerint, tot eſſe  
ſatyrio radices, quod Canis teſticuli. Verū  
Dioſcoridem conſulante, & hinc quam apte  
ecipiuntur, intelligit. Sed hiſ ſacile erran-  
ti occaſionem porciſit deſiſſe Plinius, quem lib.  
x. v. cap. x. Orchin, id eſt, teſticulum, cum  
ſatyrio turpiter conſuſiſſe conſtat. Ceterū  
non tam legitimum Satyrio deſiciuſ, officinæ,  
medici eius vice Teſticuli radices ſuppedi-  
unt, inſelici tamen, nec pari ſuccellu. Nam eſt  
iſ prolem gignendā teſticuli radiceſ præſtule-  
re Dioſcorides, quod maior à viro deuo-  
aſculum gignat, minor verò à femina ſemi-  
um: deſurſuq; mollis ſeminiſ bibenda in la-  
cte caprino ad ſtimulandum venerem, arida  
verò ad inhibendum. non tamen ob id vnquam  
comperi quenquam, qui ex earum largiore eſu  
reſerret, ſe magis ad venerem fuiſſe excitatum,  
quam eſſet, priuſquam eaſ comediſſet. Sed id  
forſe fortuna illiſ accidit, quod verſaq; ſimul  
radiceſ ederint medicorum imperitia. quo ſac-  
tum ſit, vt altera alterius vim deſtruxerit, cum  
alteri viſ inſit, vt venerem ſtimulet, alteri ve-  
rò vt eadē inhibeat. Id quod fortaſſe iſ non  
eueniret, ſi legitimum haberemus Satyrium: vel  
ſi herba illa inueniri poſſet, quæ homineſ ſalu-  
ciſſimoſ reddit. Cuiuſ Theophrastuſ meminit  
libro i. x. cap. x. de plantarum hiſtoriā, vbi  
ita ſcribit. Ad rem autem venerem mīrum in  
modum herba pollebat, quam Induſ attule-  
rat. Non enim ſolūm edentibuſ, ſed etiam tan-  
gentibuſ tantū genitalibuſ vim dixere vehe-  
mentem adeo fieri, vt quotieſ vellunt, coire  
valerent. Et quidem qui vſi fuerunt, duode-  
cies egreſſe dixerunt. Indum autem ipſum, qui  
vel magno, atque robuſto corpore erat, ſep-  
tuageſ aliquando coſuiſſe fatentem ſcitur audire.  
verū emiſſionem ſeminis guttariū fuiſſe,  
denūq; in ſanguinem deueniſſe. Mulieribuſ  
verò vehementiſſe etiam citari libidinem, cum

eo medicamine vſe fuerint, dicebatur. haſtenuſ  
Theophrastuſ. Canini teſticuli vires poſſer-  
tatiſ memorie mandauit Galeuſ libro v. i. i. i.  
ſimplicium medicamentorum, ſic inquiens.  
Orchiſ, nuncupatur & Cynoſ. *Canis te-  
ſticuli vi-  
res ex Ga-  
leno.*  
herba. Radiciſ eius bulbōſe, & argenteæ ſunt  
ineſt humida, & calida, acguſtantibuſ dulcor  
apparet. Ceterū maior radix multam videri  
habere humiditatem excrementitiā, &  
ſtatuoſam quapropter epoca venerem excitar.  
Altera verò, minor videlicet, contrā admo-  
dum elaborata eſt, ita vt eius temperamentum  
ad calidiuſ, & ſiccioſuſ vergat. Vnde hæc radix  
non modò non ſtimulat ad coitum, ſed etiam  
planē contrā cohibet, ac reſtrimit. Eduntur to-  
ſte bulborum more. Orchis verò, quem & Se-  
rapiada nuncupant, ſiccioſiorem ſciculatē ob-  
tinet, quā vt primi ordinis haberi mereatur:  
quocirca ad venerem non ſimiliter accommo-  
dus eſt. Oedemata illiſ diſcurit, & vlcera  
ſordidā purgat, & herpes ſanat. Siccatoſ mul-  
tò etiam magis deſecat, adeo vt & putreſcen-  
tia, contumaciāq; vlcera ſanet. Habet etiam  
quidpiam ſubadſtingens, ac proinde ventrem  
ex vino potuſ ſiſtit. Meminit item Satyrj Ga-  
lenuſ eodem libro. Satyrium, inquit, aut Tri-  
phyllum humidum, & calidum temperatura  
eſt: quā nobreſ guluſ quoque apparer dulce.  
Attamen recrementitiā, & ſtatuoſam humi-  
ditatem poſſidet: quocirca ad venerem inci-  
tat. Hæc verò & herbæ ipſiuſ radix præſtare  
poſteſt. Porro, vt quidā ſcribunt, ex vino nigro  
aſtero potum ſanat opſiſthoron. Planta, quæ  
Græciſ *ἑρμαῖ*, & *κυνόβαλον*, Latinis Teſticuloſus & te-  
ſticuloſ canis nomen inuenerunt: Arabibuſ, Chafi alcheb,  
ſeu Chafi alcheleb: Italiſ, Teſticolo di cane:  
Germaniſ, Kuxben kraut: Hiſpaniſ, Coyoſ  
de perro: Galliſ, Couillon de Chieſe. Quæ  
verò planta *satyrj* Græciſ, Satyrium quoque  
Latinè dicitur: Arabiç, Gaſſi alcheleb, Chafi  
altraleb, ſue Tatarich: Italiç, Satyrio, &  
Satyrione: Germanicè, Stendel wurz: Hiſpa-  
nicè, Satyrion, & Supinoſ de Rapoſa: Galli-  
cè, Satyſion.

HORMINVM. CAP. CXXVIII.

HORMINVM ſatyrum herba eſt fo-  
liiſ marrubio ſimiliſ: caule ſemicubi-  
tali, quadrangulo, circa quem emi-  
nentiaſ ſiliquiſ ſimileſ prodeunt, quæ  
ad radicem ſpectant, in quibuſ diuer-  
ſum ſemen recluditur. Siquidem in ſyl-  
ueſtri rotundum, ſcuſumq; inueni-  
tur: in altero nigrum, & oblongum, cu-  
iuſ eſt vſuſ. Ad venerem ſtimulandā,  
cum vino bibi volunt. Purgat cum mel-  
le argemas, albugineſque: illitum ex  
aqua tumoreſ diſcurit: eo etiam extra-  
hūtur aculei ex corpore. Idem effectus



*Plinij La.* Plinius similitudine vocabulorum deceptus libro x viii. capite x vii. Securidaca lentem complexu strangulati scribit. In eo autem error deprehenditur, quod phacon pro aphace legerit, & verterit nam Græcis lens *gandē*, vocatur, non *ἀγία*, quæ vicia genus est. Sed re quoque Plinio refragatur Theophrastus, qui loco citato aracum, non autem securidacam lentem innasci, & inimicari tradit. Hedyfari meminit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, sic inquitens. Hedyfarum, aut pelecinus. Huius fructus semen colore rufum est, vtrinque anceps, vti securēs. Amarum, & subacerbum apparet. quamobrem potum gratum est stomacho, & viscerum obstructions expurgat. Idem præstant totius fructus ramuli. Plantæ, quæ Græcis *ἡδύφαρον*, Latinis Hedyfarum, & Securidaca nominatur: Italis similiter Hedyfaro, & Securidaca.

*Hedyfari  
Vires ex  
Galeno.*

*Nomina.*

ONOSMA. CAP. CXXX.



ONOSMA oblonga folia habet, ad similitudinem anchusæ, longitudine quatuor digitorum, & vnius latitudine, mollia, in terra iacentia, sine caule, sine semine, sine flore: radice nititur oblonga, te

nui, infirma, rubescens, gignitur in asperis. Folia in vino pota, partus extrahunt. Prægnans, si eam supergrediatur, abortum facere dicitur.

*Onosma  
sua conf.  
deratio.*

PLANTA quædam ex collibus, quos variiis herbis refertos circa Goricam natura collocavit, in asperis nata iam pridem ad me allata est, quæ folia habet minoris anchusæ: radices verò eius ita rubescunt, vt quasi rubiæ videantur. Ex iis notis, quæ quidem pulchrè Onosmæ respondent, non potui non adduci, vt eam verum Onosma putarem. Vnde etiam eius picturam addendam diligenter curavi, vt de ea aliorum quoque sit iudicium. Sed certè, vt verum facerem, mihi adhuc incomptum est, an hæc caulem, flores, & semen proferat: siquidem eam hæcenus non nisi caule, & reliquis viduum videre mihi licuit. Onosmatis vires tradidit Galenus libro viii. simplicium medicamentorum, sic inquitens. Onosma, vel osinas, vel philo

*Onosma  
sua conf.  
deratio.*

nitis, vel ononis, ex acti, & amara constat substantia: proinde quoque creditur fortis necare, & eitere, foliis eius in vino potis. Vt Græcè *ὄνοςμα*, ita etiam Latine, pariter & Italicè, Onosma vocatur.

*Nomina.*

N Y M P H A E A.  
CAPVT CXXXII.

10 N Y M P H A E A nascitur in paludibus, & stagnantibus aquis, foliis fabæ Aegyptiæ, minoribus, & longioribus, aliis in summa aqua, aliis demersis, pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente. cum desoruerit, vt rotundum malum, aut papaueris caput, extuberat: nigro semine, denso, & lato, lentigustus. Caulis est lauis, niger, minimè crassus, Aegyptiæ fabæ cognatus: radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ autumno secatur. Sicca cum vino pota coeliaci, dysentericique auxiliatur, & lienem absumit. Radix stomachi, ac vesicæ doloribus illinitur: vitiliginex ex aqua emendat: imposita cum pice, alopecii medetur. eadem contra veneris infomnia bibitur: siquidem ea prorsus adimit. pota assidue aliquot diebus, genitale infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphææ nomen sibi vendicasse videtur, quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Elide, in Anygro amne, & in Bæotia Aliarto.



N Y M P H A E A A L T E R A.  
CAPVT CXXXIII.

EST ET altera nymphæa, cuius flos blephara dicitur, foliis antedictæ: radice alba, scabra: flore luteo, nitente, rose simili. Huius semen, & radix contra scemina: um

minarum profluvia efficaciter ex vino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia, amne Peneo.

*Nymphaea  
considera-  
tio.*

*Fuch. opi-  
nia repro-  
bata.*

NYMPHAEA vtraque seplafariis Mauri-  
tano nomine Nennuphar appellatur. Nascitur  
vbiq; frequentissima in paludibus, lacubus, &  
aquis stagnantibus. Vnde non mirum, si ea sit  
vulgaris admodum planta, & omnibus notior,  
quam vt indicari debeat. Veruntamen Fuchsius  
medicus ætatis nostræ clarissimus in libro illo  
de compositione medicamentorum, quem nu-  
per auctum edidit, putat alias esse Græcorum  
Nymphæas, alias Arabum, vt eius verba, quæ  
hic subiecimus, aperte satis declarat. Nymphææ,  
inquit, seplasis Nennutharis. Facultatis tamen  
florum eius Dioscorides & Galenus non me-  
muerunt. De illorum itaque sententia semine  
potius & radice medicis vendum erit, quæ, vt  
iisdem testantur, refrigerandi & exiccandi po-  
testatem obtinent. Arabes contrâ floribus esse  
vendum præcipiunt, illisque refrigerandi in  
tertio, in secundo autem humectandi vim tri-  
buunt. Atque hos quidem flores quarta species  
Nennutharis producit, quandoquidem illi præ-  
ter binas, quas Greci commemorant, duas alias  
rescunt. Vt hinc constet, eam Nymphæam,  
cuius flores humectare Arabes memoratæ pro-  
di derunt, hodie esse omnibus incognitam. Quæ  
propter toto cælo errant nostri temporis me-  
dici, quod suis Nymphæis, quæ sunt Græco-  
rum, humectandi etiam facultatem assignant.  
Ita Arabum scripta sæpenumero errandi occa-  
sionem medicis præbent. Et mirum planè est,  
Serapionem etiam inter Nymphæas numera-  
re, quam calidam esse & tenuium partium scri-  
bit. Ad eò nihil est in vniuersa Arabum doctri-  
na certum ac solidum, hætenus Fuchsius. Huius  
equidem viri aliqui eruditi iudicio tantum  
abest vt hac in re scribere velim, vt potius co-  
arg ipsum resellere, atque Arabum doctrinam  
tueri: vt potius qui Græcorum scripta bona fide  
referant, atque iis etiam addant si quid boni ha-  
beat sua industria & experientia compertum.  
Id quod vel hic fieri perspicuum omnibus, qui  
æquo animo rem iudicabunt. Quod igitur Ara-  
bum nymphææ, cæsi eas humectare tradant, vbi  
de earum floribus mentionem faciunt, eadem  
sint cum nymphæis Græco-um, qui vim illam  
intactam reliquerunt, facile probari potest Se-  
rapionis, ac Aucennæ testimonio. Hi namque,  
vt omittam quòd omnia ferè ex Dioscoride  
transcribunt, non solum vtuntur floribus, vbi  
humectandum sit, sed etiam semine & radice,  
vbi adstringere & refrigerare sit opus. Neq; mi-  
rum cæse, quòd Arabes suis nymphæis frigidū  
& humidum temperamentum adscribant, quan-  
do sic illis, vt etiam nobis, experimento com-  
pertum est, illarum flores humectare & refrige-  
rare. Atque adeò hoc mihi non videtur Græco-  
rum sententiæ aduersari, quippe Græci scribunt  
nymphæas exiccandi quidem & refrigerandi

vim habere, sed de semine & radice intelligunt.  
Arabes verò nymphæis humectandi & refrige-  
randi facultatem tribuunt, quam tamen flores  
fortioris esse volunt, vt clarissimè scribit Au-  
cenna. Illud addam, quòd nihil prorsus sit alien-  
um à ratione, vt vna eademque planta suum  
variet temperamentum pro diuersa vniuersi  
que partis natura. Huius rei Galenus testis esse  
potest in mandragoræ mentione, vbi scriptum  
reliquit eam radice refrigerare & exiccare, fru-  
ctū verò refrigerare & humectare. Quare, meo  
quidem iudicio, Arabes erunt in hoc laudandi  
potius, quàm odiosæ (quod videtur facere Fuch-  
sius) exprobrandi: vt qui non sine magna mor-  
taliū vtilitate Nymphææ flores in vsum me-  
dicum afferuerint, quòd à veteribus Græcis,  
quantum nobis constat, prætermisum est. Por-  
rò verisimile non est, quòd Arabes ignorau-  
erint, quæ in nymphæis fuerint seminis & ra-  
dicis facultates. Nam si Aucenna existimasset ea-  
rum semen & radicem eiusdem esse cum flori-  
bus temperamenti, illis vtiq; non fuisset vltus  
ad dysentericos, ad veneris infomnia, ad mulie-  
bre profluium, & ad alios morbos, qui frigida  
sicque requirunt medicamenta. Sed illud no-  
bis obicietur, vt contendat non eas esse Ara-  
bum, quæ Græcorum nymphæas, quòd Serapio  
ex auctoritate Albasaris inter nymphæas recen-  
seat plantam, quæ tenuium partium sit, & calidam  
naturam habeat. Nos id nihil esse dicimus,  
neque hoc nobis ita vt Fuchsius mirum videtur.  
Ve autem non miremur Arabibus traditam esse  
nymphæam, cui vis inest calida, facit tertijs sem-  
per vlti exemplum in Dioscoride, etenim is ter-  
tium sedi genus depinxit, eique vim exalisco-  
riam, acrem & exulcerantem reddidit: tamen si  
reliqua duo sedi genera eidem Dioscoridi re-  
frigerent, atque isdem Galenus tertium refri-  
gerandi sedem assignet. Ceterum in quibusdam  
Bohemæ lacubus Nymphæa parua nascitur, folio  
quidem nymphææ, sed braccia marina paulo  
maiores, flores candidi: capitibus exiguis, vt  
in cappari: semine intus papaueris magnitudi-  
ne. Hanc tamen plantam hætenus, quòd memi-  
nerim, mihi non licuit alibi videre, quam in  
Bohemia. Nymphææ facultates resellit Galeanus  
libro v. i. i. simplicium medicamentorum, his  
verbis. Nymphææ tum radix, tum semen desic-  
candi vim habet citra morsum. Itaque ventris  
profluvia cohibet, semenq; sue per infamia,  
siue alio pacto immo dicè produens retinet. Tu-  
nat porro etiam dysentericos. Ceterum Nym-  
phææ, quæ candidam radicem habet, potentio-  
ris est facultatis, vt & muliebri profluium me-  
deatur. Verum & hæc, & ea quoque, quæ arant  
habet radicem, ex vino nigro austero bibitur.  
Porro nonnullum etiam abstringendi vim obti-  
nent, ita vt & alphas fœnent, & alopecias. Ad al-  
phos verò macerantur aqua, ad alopecias pice  
liquida. Sed ad hæc aprior est ea, cuius radix ni-  
gra est, sicut ad alia, cuius alba. Nymphæa Græcis,  
Nymphæa item Latinis appellatur: Mauritanis,  
Nilofar

*Pires ex  
Galeano.*

*Nomina.*

Nilophar, Ninofan, seu Nilufar: Italis, Nimpheis: Germanis, Gelb, Vucifz scebluomen, & Haruurtz: Hispanis, Escudetes del rio, & Higos del rio: Gallis, Blanc de eau, Jaunet de eau, & Lis d'estang.

ANDROSACES.  
CAP. CXXXIII.

ANDROSACES herba est amara,<sup>10</sup>  
† tenues spargens iuncos, sine foliis, foli-  
culos in capitulis habens, in quibus  
femen continetur. Gignitur in Syriæ  
maritimis. Ea drachmis duabus in vi-  
no pota, copiosam hydropicis vrinam  
ciet. Idem effectus est semini potio,  
& herbæ decocto: podagris vtiliter  
illinitur.



*Androsaces* ex Syria, quod sciam,  
non defertur in Italiam. Verum, quia eam her-  
bam inibi etiam nasci posse nihil prohibeat,  
quoddam plantæ genus nuper inuentum est in

Hecuriz maritimis, cuius hic picturam ideò  
exhibere libuit, quòd id à quibusdā Andro-  
saces existimetur. Idipsum ad me misit hoc an-  
no Pista Lucas Ghinus medicus clarissimus, &  
rei herbariæ peritissimus: à quo (si is illi opi-  
nioni subscriberet, & Androsaces in Italia na-  
scereretur) non mihi ex eo dissentendum esset,  
quòd præter alias notas hæc planta (vt Oriba-  
sius ex Dioscoride transcribens habet) tota can-  
dida spectatur. Androsaces meminisse Galenus  
libro v. i. simplicium medicamentorum, vbi sic  
inquit. Androsaces humida, & acris herba est.  
Potest autem ressecata, exhibitæque tum ipsa,  
tum fructus eius magnopere vrinam mouere,  
& nimium discutere, & desiccare. Hæc planta  
vt Græcis *Androsaces*, ita Latinis Androsaces  
dicitur: Italis, Androsace.

*Androsaces* ex Gal.

*Nomina.*

† In vulgari exemplaribus hoc loco scri-  
ptum reperitur *Andros*, hoc est tenuisquam vo-  
cem, vt superuacaneam, omisit Ruellius. In  
Oribasio verò *Andros*, id est alba legitur: & hanc  
ex aliquo fortè antiquo codice vertit Marcel-  
lus. Cæterum non defunt, qui vbi paulò post

*Andros*, hoc est, sine foliis legitur, *Andros*,  
hoc est, cum foliis legendum putent.

ASPLENVM. CAP. CXXXIII.



ASPLENVM  
aliquiscolopen-  
driò vocat, alij  
splenion, alijhe-  
mioniù: foliis  
est multis, sco-  
lopendræ ani-  
mali similibus,  
ab radice vna  
prodeuntibus.  
Nascitur in pa-  
rietibus, faxisq;  
filiceis, & opa-  
ris: neccaulem,  
nec florem, nec

femen habet. Folia polypodij modo  
diuiduntur, subter flauescentia hirsu-  
tâque, supernè viridia. Vim hanc ha-  
bent folia in aceto seruata, vt per  
dies quadraginta pota lienem absu-  
mant: in quibus etiam contritis lienem  
ex vino illini oportet. Stranguriæ, & re-  
gio morbo prodest, singulorum fedat,  
calculos in vesica comminuit. Concep-  
tû adimere creditur, per sese, aut cum  
mulî liene appensa. Tradunt noctu, si-  
lète luna, huius rei gratia effodiendam.

ASPLENVM, siue Scolopendrium tam à  
medicis, quàm pharmacopolis, qui planè Mau-  
ritanorum scripta sequuntur, Cetrach barbara  
voce vocatur. Nec diu est, quòd nonere rei  
herbariæ periti Arabum Ceterach esse legiti-  
mum Scolopendrium. Quandoquidem antea  
vniuersa herbariorû schola Aspleni loco phyl-  
litum quàm etiam vulgò Linguam ceruinam ap-  
pellant, suis immiscebant medicamentis. Ve-  
rum enimvero quāquam hoc adeò clarum est,  
vt nullus amplius dubitandi locus relinquatur,  
adhuc tamen inueniuntur è veteribus nostris  
sepiariis, qui vt suam potius pertinaciam,  
quàm veritatem ipsam teneantur, nullo pacto  
sibi persuasum esse volunt, phyllitum non esse  
legitimum Scolopendrium: eo tantum argu-  
mento pertinaciter innixi, quòd sui maiores  
phyllitum Scolopendrii appellauerint, quòdque  
eam spleni semper maximè profuisse experi-  
mento

*Aspleni  
considera-  
tio.*

mento cognouerim. Qua tamen in re prorsus aberrant, vt ex Asplenij notis facile ab omnibus intelligi potest: ex quibus aperissimè cognoscitur, nil aliud esse Asplenium, quam ipsum Cetrach vocatum. Nec desunt præterea, qui obinde contendunt, Cetrach non esse Asplenium, quòd scripserit Dioscorides nasci Asplenium foliis polipodij, siue filiculae, quibustamen ipsius Cetrach folia non vndequeque respondent videntur. Verum si ij, qui ita obiciunt, eam vidisset filiculam, quæ in montibus præsent in iunere, quo Gortia per montes in Carniolam itur, foliis angustioribus, & admodum virentibus, illis in posterum, quantum credem reor, omnis dubitandi occasio sublata esset. Siquidem filicula hæc folio exit Cetrachæ perquam simili, quanquam paulò ampliore. Tantæque est similitudo, vt mihi primum hanc herbam inspiciendi ea semè vñ sit verum Asplenium: quæ tamen effusa radice statim pro filicula agnoscitur. Præstantissimum asplenom in Creta nascitur, vbi repperit Vitruuius affirmat circa Potereum anem, qui duas vrbes Gnoson, & Cortynam interlabitur: parte quæ ad Cortinam spectat, pectoribus sine liene inuentis, quia herbam hanc roderent: altera verò parte, quæ ad Gnoson est, liemem habentibus, quia ibi herba illa non appareat. Aspleni vires paucis pertrinxit Galenus lib. v. i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Asplenom tenuium quidem parium, non tamen calida herba est. Hac vtique resectione & lapides frangit, & lienes liquat. hæc Galenus. Cæterum sunt qui existimant Asplenium, & Scolopendrium Græcis non idem: sed diuersis omnino plantis res præsentare, Galeni auctoritate freti. Quippe qui libro v. cap. x. i. simplicium medicamentorum de his differens, quæ obstructo lieni conferunt, Scolopendrium ab Aspleno segregasse manifestè videatur, cum inquit. Maiores lienis obstructiones vehementiora desiderant medicamenta, nempe caparis corticem, tamaricis radices, scolopendrium, & scillam, & eam, quæ idipsum nomine representat asplenom appellata. Hæc certè verba differentiam fieri aperte declarant. Sed, meo quidem iudicio, credendum esse suspicor, quòd in loco præter Galeni sententiam accreuerit Scolopendrium, deprauatque in eo sit scriptura vel liberrimum incuria, vel nimia alicuius scilicet diligentia: quòd in frequentibus libris, in quibus de simplicium omnium, quorum cognitionem habuit, facultatibus sigillatim differit Galenus, nusquam, quòd inuenierim, Scolopendrij meminit, sed tantum Aspleni, cuius etiam vires (vt supra tetulimus) sine quàm paucis pertrinxerit. Aut rectius fortè crediderim, quòd eo in loco per Scolopendrium, vel per Asplenium hemionitid intelligerit Galenus, de qua in sequenti commentatione dicemus, quandoquidem hemionitidis (vt ipse Galenus scribit libro i. x. cap. i. de comp. medic. se-

cundum locos, vbi ea pharmaca ab Andromacho conscripta recensent, quæ epota splenis siue lienosis opem ferunt) ab aliquibus ex antiquis Asplenium, ab aliis Scolopendrium appellata est. Quare non esset mirum, si loco prædicto Galenus accepisset asplenium pro hemionitide: præsertim quòd hæc herba quoque eam vim sortita est, quæ lienem absorbere potest. Illa planta, quæ Græcis *hemionitis*, Latinis quoque Asplenium, & Scolopendrium appellatur: Mauritanis, Scolofendion, Seu Scolufendion: officinis, Cetrach: Italis, Aspleno, Scolopendria, & Herba indorata: Hispanis, Doradilha: Gallis, Cetrach.

## HEMIONITIS. CAP. CXXXV.



HEMIONITIS, quam aliqui splenion vocant, solum emittit dracuncul, lunatum: radicibus cohaeret multis, tenuibus: nunquàm flores, neque semina, neque caulem gignit: in petrosis nascitur, austero sapore.

Ea ex aceto pota lienem absorbit.

FALLUNTUR proculdubio (vt in Phyl-Hemionitidis commentatione superius diximus) Leoniceus, Ruellius, & Manardus: quippe qui sibi certò persuasuerint, Hemionitida eam esse plantam, quam sephasiorum vulgus Linguam ceruinem, perperamque Scolopendriam nominat. Sed quoniam in prædicto loco hos viros alicui doctissimos, & Fachsum pariter eos secutus errare euidentissimis, vt puto, argumentis ostendimus, idcirco superuacuum esse duximus hic eadem repetere, præsertim quòd neminem iueuerim, qui eam esse consensere grauetur, si cupiat nostras contra viros tam celebres rationes audire. Porro non modò iam nobis comperit esse veram Hemionitid, quæ à Dioscoridis historia nihil prorsus dissidet, Romæ nasci in quibusdam rudibus, ædificatorumque ruinis prope magnâ Amphitheatrum, vnde quidam rei herbariæ Rudist eam in suos transfulerit hortos, sed nos quoque hoc anno eâ acipimus ab Aloyio Anguillario Romano rei herbariæ peritissimo, qui Hemionitidis plantam,

Asplenium  
vbi in Gortia


Galenus lo-  
cum suspicor

plantam, cuius picturam damus, ad nos Patavio misit. Equidem credidimus iam dudum vñ cum Hermolao, & Ruellio teucricum, & hemioniticum vñam tantum Plinio plantam esse, & deprauatis eius exemplaribus decepti, quæ libro x. x. v. capite v. ita scriptum habebant. Inuenit & Teu- cer eadem ætate teucricum, quam quidam hemionion vocant. Veruntamen cum postea tractu temporis Plinii codex mendis quam plurimis expurgatus ad manus esset, non hemionion legendum fuisse comperi, sed hermion. Quo factum est, vt omnino fuerim coactus in hoc mutare sententiam, contraq; asserere teucricum à Plinio descriptum à Dioscoridis teucricum nullis notis differre. Cæterum inter hemionium, & asplenium Plinio nulla intercedit differentia, quod scripserit lib. x. x. v. i. capite v. Asplenium sunt, qui hemionion vocant. Sed equidem vereor, ne & ipse in errore versetur. quandoquidem Dioscorides non modo vtriusque historiam diuersis capitibus descriptit, sed etiam asplenium nusquam, quod sciam, hemionitum appellari ait: tametsi contra Hemionitum non asplenium, sed splenion à quibusdam vocari tradiderit. Sed postea quàm Hemionitidis lunata folia mihi ad memoriam reuocarunt herbam illam, quæ à chymicis LVNARIA minor, &

*Lunaria minor de scripto et veteri.*

lis, cubito longioribus, clematidi illi similibus, quæ Vinca peruinca vulgò vocatur, in quibus à radice ad summum ex utroque latere breuibus interstitiis folia exerunt crassiuscula, rotunda, paruorum numerorum speciem referentia: vnde à nonnullis Nummularia dicta est. Sunt qui existiment, hanc esse Elacinen. Verùm quia Nummularia dictæ folia pilosa non sunt, sed læuia: quia præterea non nascitur in fegitibus & cultis, sed in scrobium aggeribus & vligino-

LVNARIA MINOR.



30 ra stenosis auxilio est. Ea vt Graecis *Λαυανίς*, ita etiam Hemionitis Latinis, & Hemionite Italice vocatur.

ANTHYLLIS. CAP. CXXXVI.

ANTHYLLIS duplex est, quædam enim lenti similissima, foliis mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine: radice parua, tenui. Nascitur in salis terris, & à sole illustratis, non insulso gustu. Altera est foliis, ramulisque auge similis, hirsutioribus tamen, breuioribus, & asperioribus: flore purpureo, odoris admodum grauis: radice cichorij. Pota drachmis quatuor, vrinæ difficultati, renibûsque plurimum prodest. Tritæ, valæ pituitas emolliunt, cum rosaceo, & lacte impostæ, vulneribus medentur. Quæ autem auge similitudinem refert, præter alia pota cum aceto mulso, comitiales sanat.

PRIMA, aut alteram Anthyllida: quæ Dioscoridis historix respondeat, non equidem hægen in Italia reperit, aut repertum viliquaquam non negauerim, quin ea inibi proveniat. Ruellius hanc posteritati Salsolam vocatam fuisse tradit, quod ex ea Salem fieri memorat prodiu-

*Anthyllidis conside ratio.*

*Lunaria minor a. Ga.*

*Fuchsi  
apud Galen.  
Nath.*

proditum sit. Fuchsius verò in libro illo de com-  
ponendis medicamentis, quem locupletatum  
ruper excudit, putat eam herbam, quæ Cali  
Mauritanis dicitur, de qua nos differimus li-  
bro superiore in Atroplicis commentatione,  
Anthyllidem esse. nam ubi Aluminium genera  
expendit in fine feruè se inquit. Alumen, quod  
Catina appellatur, ex herba combusta confici-  
tur, Cali Mauritanis dicta, Græcis Anthyllide  
& Trago. Sed, meo quidem iudicio, in hoc aper-  
tè hallucinator Fuchsius vna cum Amaro Lusi-  
tano, à quo illum hanc vanam opinionem ac-  
cessisse facile suspicor. In primis nanque non  
video ego, quomodo fieri possit, vt Cali Mau-  
ritanorum duas possit legitimè Græcorum plan-  
tas representare, Anthyllida & Tragum. quæ  
quidem genere, forma, notis ac viribus inter se  
maximè differunt, vt in ea Apologia, quam in  
filium Lusitanum scripsimus, latius offendimus.  
Deinde nobis placet subitè mirari Fuchsi-  
um, virum alioqui doctissimum & in re medica adeo  
clarum, vt primis ferat in Germania, quòd Lu-  
sitani illius inepcias tam religiosè sit securus,  
vt hic contentus prouoluisse Anthyllidem esse  
herbam Cali, neglexerit præterea Anthyllidis  
genera, quæ Dioscoridi duo sunt, exhibere:  
atque genus explicare, quòd Cali esse putabat.  
At re vera Cali (quantum ego sentio) nec pri-  
mam, nec alteram Anthyllidem exprimit, ne-  
que etiam Tragum. Etenim hoc sine foliis na-  
scitur, sed eorum vicem explent aculei, adeò vt  
tota planta spinis horrida spectetur. Illa verò  
Anthyllis, quam primo generi adscribit Dio-  
scorides, lentè simillima est. Porro alterum eius  
genus (scilicet Dioscoride) foliis ramulisque aia-  
gam æmulatur, his furcioribus tamen, breuiori-  
bus & asperioribus: flore purpureo, odoris ad-  
modum grauis. Quæ nimirum notæ in herba  
Cali, gaudenti fassa, prorsus desiderantur. Vtri-  
usque Anthyllidis meminit Galenus libro v. i.  
simplicium medicamentorum, sic inquit. Anth-  
yllis duplex est, sed vtraque modicè desiccatur,  
vt & vlcera glutinet. Cæterum altera, ea scilicet  
quæ chamæpityi adsimilis est, quadatenus  
subtiliorum est partium, quam altera, adeò vt  
& comitialibus competat. Quin & ipsa magis  
quam altera extergere potest. Quæ herba Græ-  
cè Anthyllis, Anthyllis item Latine, & Anthillide  
Italice nominatur.

*Vires ex  
Galeno.*

*Nomina.*

#### ANTHEMIS. CAP. CXXXVII.

ANTHEMIDIS genera tria, tantum  
flore distantia: rami dodrantes, fruti-  
cosi, alis multis concaui: tenuibus so-  
liolis, paruis, numerosis: rotundis capi-  
tulis: floribus in medio aureis, forinsecus  
orbiculato ambitu candidis, meli-  
nis, aut purpureis, magnitudine folio-  
rum rutæ. Nascitur in asperis, & iuxta

#### ANTHEMIS.



femitas. colliguntur vere. Vm  
habēt radices, flores, & herba  
exaltandi, extenuandi.  
Potu, & infes-  
sione, peiunt  
menstrua, par-  
tus, vrinam, cal-  
culosq; aduersus  
inflationes,  
& ilei tormen-  
ta bibuntur: bi-  
lem suffusam

expurgant: iocinerum vitia sanant. De-  
cocto earum vesicæ fouentur. Ex om-  
nibus his generibus ad calculos effica-  
cissima est, quæ florem purpureum ha-  
bet, cuius amplitudo maiuscula est.  
Hanc propriè heranthemon vocant.  
Ea cui leucanthemo nomen est, item  
quæ chrysanthemon dicitur, vehemen-  
tius vrinam ciunt. Aegilopsis illa me-  
dentur: commanducata vlcera eru-  
ptiones in ore sanant. Nonnulli in cly-  
steribus ex oleo vtuntur, terunturque  
in farinam, ad abigendos febrium cir-  
cuitus. Flores, & folia recondi debent,  
& priuatim tusa, in pillos digeriri:  
dix quoque ficcari, dumque ingruit ne-  
cessitas, binæ partes herbæ dari, modò  
floris aut radices pars vna, modò con-  
trà floris partes duæ, & herbæ vna, per-  
mutatim duplicato pondere, alternis  
diebus, bibere autem oportet in vino  
mulsò diluto.

ANTHEMIS, quæ & Chamæmelon ab  
odore mali Græcis dicta est, officinis, & vulgo  
corrupta voce Camomilla vocatur. Verum  
quantis tres Anthemidis species florum colo-  
re tantum differentes, memoriæ prodiderit  
Dioscorides, eamque cæteris ad calculos præ-  
stare tradiderit, cui flores in medio aurei, per  
ambitum verò purpurei bubonis modo insunt,  
pharmacopœe tamen in Italia illam duntaxat  
sibi comparant, quæ floribus conflatis: au-  
reis, foris foliis albicantibus. circumsepitis: quod  
hæc exteris frequenter, copiosiorque inter se-  
getes in campis proueniat, oleatque suauiter.  
Quandoquidem cætera eius genera, à paucis  
sanè cognita, in raris Italix locis reperiuntur.  
Vidimus.

*Anthemi-  
dis consi-  
deratio.*



*Anthemidis  
du Sires  
ex Galen.*

Vidimus tamen nos vtrasque pluries in Italia. Anthemidis meminisse Galenus libro 111. simplicium medicamentorum, sic scribens. Chamamelum tenuitate quidē rosā persimile est, calore verō ad olei facultates magis accedens, animali tum familiares, tum temperatas. Quapropter lassitudinibus, ut si quid aliud confert, doloresq; sedat, mitigatq;. Præterea tensa remittit, & laxat, quæq; mediocriter dura sunt emollit, quæq; consolidata rarefacit. Ad hæc febres, quæ citra visceris alicuius inflammationes insistant, discutit, ac dissolvit, ac præsertim quæ ex humoribus biliosis, aut cutis densitate proveniunt. Qua de re & ab Aegyptiorum sapientibus soli consecratum est, febriumque omnium remedium putatur. Verum hæc quidem in re à veritate aberrant: solas enim, quas dixi febres sanare potest, easq; quæ iam concoctæ sunt. Iuvat tamē pulchre reliquas etiā omnes, quæ melancholicæ sunt, aut pituitosæ, aut ex viscerum inflammatione prognatæ. Nam & harum remedium chamamelū vel strenuissimum est, ubi iam concoctis adhibetur: quapropter & hypochondriis, ut si quid aliud, gratum existit. Meminit etiam in libro v. 1. eorumdem simplicium medicamentorum, sic inquit. Dictum quidem in tertio libro de hac herba copiosius est, diciturq; nunc summam, quod ea lesacit, & defecit in primo ordine. Est & tenuium partium, ac proinde digerendi, rarefaciendi, & laxandi facultatem obtinet. Planta, quæ Græcis ἀνθεμίδης, & χαμαιανέρας, Latinis pariter Anthemis, & Chamamelum appellatur: Arabibus, Debonigi, seu Babunegi: Italis, Camamilla: Germanis, Camillen: Hispanis, Manzanilla: Gallis, Camomille.

*Nomina.*

PARTHENIVM. CAP. CXXXVIII.



non secus atque epithymum, & bilem, & pituitā deerrahit: suppuriosis prodest, & melancholicis. Herba sine flore à

PARTHE-  
NIVM, aliqui  
amaracon vo-  
cant, foliis est  
coriandri, te-  
nibus: flore  
per ambitum  
albo, intus me-  
lino, odore  
subuiroso, sa-  
pore amaro.  
Siccatur, cum  
aceto mulso,  
aut sale portū,  
non secus atque epithymum, & bilem,  
& pituitā deerrahit: suppuriosis prodest,  
& melancholicis. Herba sine flore à

calculosis, & anhelatoribus magnavtilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia vulvarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni, & collectionibus cum flore.

SCRITVR Parthenium in Italia in hortis ferē omnibus, neque modō in iis satum, sed in aliis quoque locis sponte provenit. Folio est coriandri, amaro sapore, odore graui: floribus per ambitum albis, intus melinis. Hetrusci Matricariam, & ab amaro sapore, Amarellam vocant. Cæterum hallucinantur, mea quidem sententia, in Parthenij historia Brasuolus, & Fuchsius, viri aliqui doctissimi quinquē & Monachi illi reuerendi, qui in Mese commentarios ediderunt, quod cōcordes sibi persuaserint (ut superius in Artemisij commentario, eorum errorem explodendo, diximus) Matricariam, siue Amarellam vulgō vocatam esse illud Artemisij genus, quod secūdo loco à Dioscoride representatur: utpote qui nō rectē expenderint hanc esse legitimam Parthenium. Porro contendunt Brasuolus, & Fuchsius eam omnino plantam verum referre Parthenium, quam herbariorum vulgus Cotulam foetidam appellat. Sed quā istī clarissimi medici magno in errore versentur, iudicent ij, qui probē sciunt Cotulam foetidam folio esse foeniculi, aut anthemidis potius, quā coriandri: neque sapore vsque adeo amaro, ut in Parthenio requiritur. Sunt præterea antiquiorum nonnulli, qui Helxinem quoq; Partheniū vocauere, illam scilicet, quæ in parietibus nascitur detergendis vitreis vasīs apertissima, ut Galenus ipse testatur libro v. 1. simplicium medicamentorum, & Plinius lib. xxi. cap. xvii. naturalis historia. Nec desunt etiā, qui velint mas Partheniū appellare Athanasiam, quam &

TANACETVM. TANACETVM vocant sepalsarii, cū etiam superius de Artemisia differentes mentionem fecimus, & hic modō effigiem damus. Quorum equidē sententiam magis probandam censere, quā eorum, qui tertium Artemisij genus Tanacetū esse cōtendunt. Vtuntur Tanaceto recētiōres ad ventriculū, & alui fluxus discutiendi, itē ad li-

bricos ex ventre pellendos. Vtuntur & ad frangendos renū calculos, & ad ciendū vrinam.

*Tanacetū,  
Es eius  
medicina.*

Sed id viris magis, quàm mulieribus commendatur: contrà verò Matricariam dictam feminis tantum exhibendam præcipiunt. Parthenij in simplicium medicamentorum censu Galenum meminisse non reperio. Eius nomen Græcum est *παρθένιον*, Latinum similiter Parthenium: Arabicum, Achuen, Vchuen, Achuan, sive Alachua: Italian, Parthenio, Matricaria, & Amarella: Germanici, Muotter kraut, & Mettram: Gallicum, Matricaire. & Maronne.

*Namina.*

BYPHTHALMUM.

CAP. CXXXIX.



**BYPHTHALMON**, quidam cachiam vocat, caules emittit tenues, mollisque: folia foeniculi: luteum florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, unde nomen traxit. Circa op<sup>30</sup> pida nascitur, & in campestri

bus. Flores cum cerato triti, tumores, duritiæque discutunt. Aiunt epotam post exitum à balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

*Bupthalamum conf. decrat.*

**N**on parum profectò inter se variant de Bupthalamo recentiorum sententiæ, ut herbam, quæ ipsum legitime repræsentet, decernant, & ostendant. Nam aliqui putant, herbam quandam cubito altiore, in pratis & agrorum marginibus nascentem, quæ (ut equidem opinor) Bellis maior est, folio nonnihil in ambitu serrato, flore intus melino, extrà verò candidissimis foliolis vndique circumdato, anthemide maiore, esse legitimum Bupthalamum. Alij verò, quibus aditipulatur Fuchsius, aliam ab hac herbam verum Bupthalamum esse contendunt, vulgaris anthemidis cognatam, quam officinæ Corulam non fortidam vocant. Sed cur horum sententias comprehendam, sanè non habeo, quippe quannis Corula non fortida dicta foliorum facie quadammodo Bupthalamum referat, flores tamen in medio melini, & in ambitu anthemidis modo candidi, Dioscoridis picturæ non vtrique respondent. Quæ admodum & hinc perspicuum est alterà plan-

tam, cuius primo loco meminimus, non esse Bupthalamum. Siquidem cum diligentissime scripserit Dioscorides vulgaris anthemidis, tum etiam parthenij flores intus aureo micare colore, per ambitum verò candido, dubitandum quidem non est, quin & eadem fuerit vsus diligentia in describendo Bupthalamo flore, quem tamen luteum in vniuersum facit, non autem in ambitu candidum, qualis in vulgari parthenio conspiciatur. Cum itaque Bupthalamum luteo planè flore præditum esse debeat, haud dubiè errant, meo quidem iudicio, qui pro Bupthalamo prædictas, aut similes plantas accipiunt. Ceterùm legitimum, ni fallor, Bupthalamum ad me attulit hoc anno Patauio Ioannes Odorici Melchiorius Tridentinus, iuuenis spectatæ in philosophia, ac medicina eruditionis, mihi quæ perinde ac filius charissimus, quod in nullis profus notis à Dioscoridis descriptione discedit, ut eius effigies, quàm hic damus, abunde demonstrat. Bupthalamum vires retulit Galenus libro v. 1. *Bupthalamum vires* simplicium medicamentorum iis verbis. *Bupthalamum*, inquit, sic appellatum est à floribus, qui figura quidem bovis oculis videantur adsimiles, colore autem anthemidis floribus similissimi sunt, sed multò illis tum maiores, tum acriores. Proinde & vehementius discutunt, adeò ut duritias sanent cerato misti. hæc Galenus. Vbi, ne quid nobis obster, animaduertendum est, quod Galenus, qui Bupthalamum flores anthemidis floribus similimos reddit, de ea tantum anthemide intelligit, quæ luteos flores profert. Sed quoniam de Bupthalamo

**BELLIS.**

**mi flore different**

mibi **BELLIS** Bellidichi sic à Plinio vocata *Bellis* *floris*, *et* *vires*. *et* *vires*.



occurrit, cuius etiam initio commentarij memini, non alienum esse duxi, hoc in loco eius historiam, & vires recensere. Bellis *bellis* in Italia *bellis* est generum. *Primum* in hortis *scitur*: cætera in pratis, & campis *tribus* nascuntur. *Hortense* herbula est foliis longiusculis, in cacumine *subrotundis*, solo procumbentibus, & in rore modum radiantibus, crassiusculis, per ambitum minutim serratis: è quorum medio cauliculi prodeunt villosi, flexibilesque: in quorum cacuminibus anno ferè toto flores emicant, centròtenus auri, per ambitum verò foliolis duplicibus in purpurâ rubentibus circumdati, coronis textendis apertissimi. Alterum in pratis plerumque nascentis, foliis, & cauliculis *confiat*

subrotundis, solo procumbentibus, & in rore modum radiantibus, crassiusculis, per ambitum minutim serratis: è quorum medio cauliculi prodeunt villosi, flexibilesque: in quorum cacuminibus anno ferè toto flores emicant, centròtenus auri, per ambitum verò foliolis duplicibus in purpurâ rubentibus circumdati, coronis textendis apertissimi. Alterum in pratis plerumque nascentis, foliis, & cauliculis

conflat horrentis similibus, in fuscis tamen: sed flore intus melino, circum verò candido, anche midis modo. Hoc, quod primo statim vere floreat, Heruſci appellant vulgò Primo flore, & Fiore di primavera. Tertium cæteris maius affurgit, flore prædicto non dissimili, sed maiore: foliis etiam maioribus, magis; ferratis, caulis lignosis, interdum cubito altioribus, nō nisi ætate florentibus. Faculas omnibus eadem: nam (vt recentiores perhibent) valēt in strumis, & capitis fracturis: quinetiā in vulneribus thoracis, quæ in pectoris cavitatem vsq; penetrarunt, in quem vsū Bellum potioribus inseruit. Sunt & qui Bellidis genera laudent ad ischiada, & paralyſin. *ἡσπῆλαιος* sic Græcè, Latine verò Buphthalmum, & Oculus bovis dicitur: Arabicè, Bihar: Italicè, Buphthalmio, & Occhio di bue: Gallicè, beil de beuf.

*Nomina.*

PAEONIA. CAP. CXL.

PAEONIA, sue glycyſide, Græcis aliquibus pentoboron dicitur: sunt qui Idzoz dactylos radicem pæoniam vocant. Caulis altitudine ſeq̃uipedis adoleſcit, comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera: mas folia inglandis habet: in fœmina verò ſmyrni more diuiditur. Summo caule ſiliquas emittit amygdalis ſimiles: in quibus, cum dehiscunt, multa grana, exigua, rubra, acinis puniceorum ſimilia inueniuntur, & in medio nigra, purpurea quinque aut ſex. Radix maris digitali craſſitudine, & palmi longitudine, guſtu adſtringens. alba. fœmina radicibus ceu glandes circiter ſeptem aut octo inhaerent, vt in haſtula regia. Fœminis à partu nō purgatis ſicca radix datur: ciet menſes amygdalæ magnitudine pota: ventris doloribus cum vino pota auxiliatur. valet contra regium morbum, & renem, ac veſicæ dolores. decocta in vino aluum ſiſtit. Rubra grana rubentes menſes ſiſtunt, decem vel duodecim pota in vino auſtero, & nigro: ſtomachicis, & eroſionibus ea eſſe prodeſt: à pueris pota initia calculorum eximūt. Grana nigra auxiliatur ſuppreſſionibus nocturnis, vuluæ ſtrangulationibus, & matri-cis doloribus, quindecim numero pota, in aqua muſta, aut vino. Naſcitur in altiffimis montibus, & præruptis.

PAEONIA.



PAEONIA fœmina planta eſt vulgaris notitiæ: mas verò contrā, quod paucis in Italia locis proueniat. Hæc Piſis ad me Goritiæ miſit hoc anno Lucas Ghinus Forocornetiſis, vir & doctri-na, & rei medicæ cognitione præclarus. Sed & eam antea è Germania allaſtam vidi *Vires ex Galeno.* Pæoniæ viſtes poſteritatis me moriæ tradidit Galenus lib. v. r. ſimp. med. vbi ita ſcriptū reliquit. Glycyſide,

quam pentorobon, & præſtiam nuncupant, radicem habet læuiter adſtringentem cum quadam dulcedine: eſſi puſculum dentibus mandas, acrimoniaſi item quampiam ſubamarum ſubefſe percipies. Proinde menſes ciet ex melicrato amygdalæ pota quantitate. Sanè tundere eam oportet, ac cribrare, & ſic inſpergere. Expurgat porrò etiam iecur obſtrictum, & renes. Sed hæc efficeret naſta eſt, quā acris, & ſubamara eſt: quā verò quiddam etiam adſtrictorium obtinet, ventris fluxiones ſiſtere poteſt. Verū eam tunc in auſterorum vinorum quopiam decoctam bibere conuenit. Eſt autem facultate omnino reſecicatoria vehementer, ita vt non deſperauerim eam etiam adaligatam, quod merito credendum eſt, puerorum epilepſias ſanare. Equidem vidi puel-lum quandoque octo totis menſibus morbo comitali liberum, ex eo quo geſtabat radicem tempore: vbi verò forte fortuna quod à collo ſuſpenſum erat decidieſſet, protinus morbo correptus eſt. ruſuſq; ſuſpenſo in locum illius alio, inculpatè poſtea ſe habuit. Porrò viſum eſt mihi ſatius eſſe denud id collo detrudere certioris experientie gratia. Id eum feciſſem, ac puer iterum eſſet conuulſus, magnam recentis radicis partem ex collo eius ſuſpēdimus: ac deinceps proſum ſanus effectus eſt puer, nec poſtea conuulſus eſt. Rationab le itaq; erat aut partes quaſpiam à radice deſtuentes, ac deinde per inſpirationem attritas, ita affectos locos curare, aut aerem à radice aſſidue mutari, & alterari. Nam hoc paſto ſuccus Cyrenaicus colu-mellam phlegmone affectam iuuat, & melan-choliam frigidam palam deſtillationes, & grauedines deſiccat, ſi quis id in calidum linteum ra-tum liget, aſſidueq; calorem ex eo per inſpirationem, quæ per nares fit, attrahat. Quinetiam ſi compluribus linis, & maxime marina purpureæ, collo viperæ inſectis, illis viperam præſoces: eaq; poſtea cuſpiſſimam collo abuin-cias

*Pæonia c. fœderatio.*

*Galeni hi ſcribit.*

obuincias, mirificè profuerit tum tonsillis, tum omnibus iis, quæ in collo expullulant. Sed de talibus priuatim aliquando fortè conscribam. Nunc verò sciendum est Pœoniæ temperamentum tenuium esse partium, & exiccatorium, haud tamen insigniter calidum,

sed aut symmetrum, aut paulò calidius. Hæc planta Græcis *ῥουαρίδα*, & *μαρία*, Latinis *Nomina* item Pœonia nuncupatur: Arabibus, Feonia: Italis, Peonia: Germanis, Peonien: Hispanis, Rosa del monte, & Rosa albardeira: Gallis, Piuoyne.

LITHOSPERMYM MAIUS.



LITHOSPERMYM. CAP. CXII.

LITHOSPERMON à feminis duritia nomen accepit. Foliis est oleæ longioribus, & latioribus, mollioribus, iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iūci, lignosis: in quorum cacumine bifidi exortus cauliculorum speciem exhibent: foliis longis, inter quæ parum semen, rotundū, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis, & editis locis. Vim hanc habet, vt femine cum vino albo potò calculos frangat, pellatque vrinam.

PHALARIS. CAP. CXLII.

PHALARIS cauliculos emittit zæ culmis similes, à minutis, ac nullius vrus radicibus, multos, duū palmorum geniculis cinctos, graciliores tamen, ac dulces: semen candidum, oblongum, milij magnitudine. Tunditur, & in aqua aut vino succus ad vesicæ cruciatus vtilissimè bibitur. Semē cochlearis mensura potū, ad eadem efficax est.

LITHOSPERMYM MINUS.



LITHOSPERMON hodie seplasiarij, & *Lithospermi confid.* omnes ferè medici Barbaros secuti Milii solis nominant. Licet rectius fortasse Mauritanorum quoq; imitatione ab illis Milii Soler vocaretur. Quàdoquidè hæc planta (vt scribit Serapio testi monio Aben Iuliel) frequèsnascitur in mōtibz Soler: vnde illi aptius fortè à loco, quàm à sole cognomentū imponeretur. Huius milij, viciūq; cognominetur, duo ostenduntur genera. maius, quod legitimum est Lithospermum, quove Hertraria satis referta est. minus, quod longè frequētius vbiq; in Italia gignitur. Hoc vtiq; nō temere existimauere nonnulli esse Phalarida, quodd semen proferat milio persimile, subcandidum, & oblongū. Quibus faciliè subscribi posset, si planta hæc culmis genicularis, ac etiā foliis zæ similis spectaretur, quodd Oribasii Phalaris non modò culmos fundat zæ similes, sed etiā folia. Ex iis equidè notis, quæ planè in Milio solis minore desiderantur, cogor illis nō ad stipulari. Quin potius adducor, vt certò credam Phalarim esse plantā ab illa diuersam: eamq; fortasse, cuius aliquando picturā dabimus, quæ in syluestriū frugum genere, à quibusdam recensetur, adeo vt non desint etiā qui hanc appellent Syuestre milii. Est enim culmo, & folio zæ, & semine candido & oblongo, milij ferè magnitudine. Ceterum Fuchsum, virū aliqui doctissimum, Lithospermū Dioscoridis omnibus propè nunc compertum, non cognouisse arbitror, quodd in suis clarissimis de stirpiū historia commentariis pro verò Lithospermo, illud quod officinis Milium solis minus appellatur, depinxerit.

Fuch. et  
ror.

xerit. Idem nihil minus deinde mihi quidem videtur errasse in libro de compositione medicamentorum, quem nuper auctum edidit: vbi scriptis tradidit Lithospermum genus esse plantam illam harundinaceam, ex cuius seminibus, quæ nos Lacrymas vocamus, sunt orbiculi, quibus filo traiectis vtuntur mulieres ad suas preces numerandas. Hanc autem opinionem quoniã confutauimus in Apologia, quã aduersus Amatam Lusitanã, quem fortè secutus est Fuchsius, scripsimus, hic vt satis alibi explosam relinquimus. Lithospermon, vt herbã summa admiratione dignã, eleganter descripsit Plinius lib. x x v i i. cap. x i. cuius hic verba subiiciam. Inter omnes herbas, inquit, Lithospermo nihil est mirabilius. Aliqui egonychon vocant, alij diospyron, alij heracleon. Herba quincuncialis fere, foliis duplo maioribus, quam ruta, ramulis furculosis, crassitudine iunci. Gerit iuxta folia singulas, veluti barbulas, & earum in cacuminibus lapillos candore, & rotunditate margaritarũ, magnitudine cicercis, duritia verò


lapidea. Ipsi, qua pediculis adhæreant, cauernas habent, & intus semen. Nasçitur & in Italia, sed laudatissimum in Creta. Nec quicquam inter herbas maiore quidem miraculo conspexi. Tantis est decor, velut aurificũ arte alternis inter folia candicantibus margaritis, tam exquisita difficultas lapidis ex herba nascentis. Iacere, atq; humi serpere auctores tradunt. Ego vlsam, non hærentẽ vidi. hætenus Plinius. Lithospermum in simplicium medicamentorum libris, Galenum meminisse non inuenio. Verum Phalaridis, quam phalerium nuncupat, vires reddidit lib. v i i i. eorundem, sic inquit. Phaleridis herba tum succus, tum semen, tum folia potu auxiliari creduntur vesicæ doloribus, ceu in sese habeant quidpiam tenuium partium, & calidum. Quod Græci *αλιανθου*, Latini quoque Lithospermum vocant: Mauritani, Kulb, Culb, Calc, seu Calab: Itali, Lithospermo, & Milium folis: Germani, Meerhürz, & Stenifömen: Galli, Gremil, & Herbe aux perles.

*Phalaridis vires ex Gal.*

*Nomina.*

*Lithospermum histor. ex Plin.*

ERYTHRA SATIVA.



ERYTHRA SYLVESTRIS.



ERYTHRA. CAP. CXLI.

ERYTHRODANVM radix rubra est, qua tinguntur lana. Vna sponte provenit: altera feritur, vt in Thebana Galliæ, & Rauenna Italiæ: in Cariã inter oleas, vt in aruis, solo creditur. Hanc non sine quaestu ferunt: nanque maximum ex ea sentiunt prouentum. Aspericaules, & quadrãguli, lãgi, aparinæ nõ dissimiles, robustiores, & multo prorsus maiores: foliis per interval- la circum articulos, steliatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia viride, mox rubrum, postea cum ema-

turuit, nigrũ: radix tenuis, longa, rubra. Vrinam ciet: quã de causã regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsã: item ischiadicis, & resolutis. Crassã, copiosãq; vrinã pellit, nonnunquam & sanguinẽ: bibentes tamen quotidie lauari oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare. Aduersus serpentium morsus, ramulos cum foliis vino bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienem absumit. Imposita radix trahit partus, menses, secundasq; alba vitiliginis illita ex aceto medetur.

Rubia cū  
Jdratto.

RUBIA, quam Græci Erythrodanū dicunt, Hetruscis nullis non cognita neq; medicis fo-  
lām, ac sepiatariis cognoscitur: sed etiā mulier-  
culis, ac rusticis, his præsertim, qui in locis ha-  
bitant, vbi lanificio opera impeditur. quando-  
quidem inficiendis tingendisq; lanis aptissima  
est. Quapropter rustici, & agrestes mulieres,  
quod lanarū infectores Rubiæ quotannis plu-  
rimū emant, huius radices efodiūt, & vendūt,  
vnde tantū quæstus faciunt, vt sibi suisq; victū  
suppediēt. Mitit hanc abunde Hetruria, præ-  
cipuè Senensis ager. Expetuntur folia nostratibus  
mulieribus, quod asperima sint, ad sta-  
gnea vasa detergenda: siquid mirū dictū quā  
pulcherrimè niteant, quæ Rubiā fuerint ex-  
perta. Rubiæ meminit Galenus lib. 7. 1. simpl.  
medicamen. vbi sic scribit. Est autē Rubia tin-  
ctorū radix acerba, & gustu amara. Itaq; quæ-  
quant agere dictū est, coxendicum doloribus  
afflictis, & resolutis, in potu cum melicrato ex-  
hibeant. Id *Isid. Avar.* Græcè dicitur, quod  
Erythrodanum, & Rubia Latine: Paue, Fue al-  
fabagin, Arabicè: Erithrodano, & Rubbia, Ita-  
licè: Ferber roet, Germanicè: Ruuia, Hispa-  
nicè: Garance, Gallicè.

Rubia Gi-  
res ex Ga-  
ieno.

Nomina.

# LONGCHITIS. CAP. CXLI.



LONGCHITIS folia habet por-  
ri, latoria, rubē-  
ria, plurima, ad  
radicē circun-  
tracta, veluti in  
terram procū-  
bētia, pauca in  
caulem quo flo-  
res, ceu galeri-  
culi, hiantibus  
comicis perso-  
nis similes, ni-  
gri, & è rictu al-  
bam exerentes velut linguam, quæ ad  
labrum inferius spectet. semen inuo-  
lucris clausum lanceæ simile, triangū-  
lum: vnde sibi cognomen trōrogauit.  
radix dauci. Nascitur in siccantibus, &  
asperis. Radix ex vino pota vrinā ciet.

40

## LONGCHITIS ALTERA. CAP. CXLV.

ALTERA est Longchitis, quam ali-  
qui asperam longchitin dicit: folia sco-  
lopendrij emittit, sed asperiora, maio-  
raque, ac multo magis diuisa. Vulne-  
ribus mirum in modū prodest, in eisq;  
inflammationes excitari non patitur.  
10 Potā ex aceto lienem absumit.

Er s i in complariis Italia, ac Germania motibus, aliisq; asperis, & aridis locis diu mul-  
tumq; perquisierim primū Lōchitidis genus:  
ipsum tamē hæcenus mihi nō licuit reperire,  
neq; etiā ab aliis inuentū videre. Ceterū Lon-  
chitīm alterā iam pridē vidimus studio, ac libe-  
ralitate Luca Ghini medici clarissimi, qui eam  
Pisis ad nos misit. Hæc folia habet scolopend-  
rij, asperiora, maiora, magisq; diuisa, vt eius  
pictura, quā exhibemus, probè ostēdit. De pri-  
mā Lōchitide differuit Plin. li. x x v. ca. x i.  
vbi sic inquit. Lōchitis nō, vt pleriq; existima-  
uerunt, eadē est, quæ xiphio, aut phasganion,  
quāquā cuspidi similis semine. Habet enim fo-  
lia porri rubētia ad radicē, & plura quā in cau-  
le, capitula personis comicis similia, parua ex-  
erētibus linguā, radicibus prælongis. nascitur in  
siccantibus. Hæcenus Plinius, qui horū pleraq; à  
Dioscoride mutuatus est. Longchitidis vtriusq;  
meminet Galen. lib. 7. 1. 1. simpl. medic. vbi de  
earū viribus ita scribit. Longchitis, eius videli-  
cet, quæ semē habet triangulare, figura lanceæ  
simile, radix potissimum quodammodo similis  
est radici dauci: proinde vrinā ciet. Porro eius,  
quæ scolopendrij similia habet folia, ea ad  
glutinanda vulnera idonea sunt viridia: sic-  
ca cum aceto pota, lienes induratos sanant.  
Arytus vt Græcis, ita etiam Longchitis Lati-  
nis, & Longchite Italīs vocatur.

Longchit-  
dis consi-  
deratio.

Longchit-  
dis Gires  
ex Gale.

Nomina.

## ALTHAEA. CAP. CXLVI.



ALTHAEA, quam alij Ibi-  
scum vocant, in  
syluestriū mal-  
uarum genere  
est, cui folia vt  
cyclamino ro-  
tunda, lanugi-  
ne canescunt:  
flore rosaceo:  
bicubitali cau-  
le: radice len-  
ta, intus alba.  
Althæa appel-  
latur, quod inter primas sit vtilis, &  
plurib

40

pluribus polleat remediis. Decocta enim in vino aut aqua malsa, & per se cum imponitur tusa, efficax est contra vulnera: item ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, fracta sedis, inflationes, neruorum rigores. siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit.<sup>10</sup> Cocta, vt dictum est adiecto suillo adipe, aut asnerino, terebinthinave, vt malagmatis lentor fiat, facit ad vuluæ inflammationes, præclusionesque, in pelsis subdita. Decoctum eodem fungitur munere: onera vuluæ, reliquisque à parte extrahit. Decocta radice succus ex vino potus, succurrit<sup>10</sup> vrinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis. dentium muleter dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen siccumque tritum, vitilignes in sole cum aceto perunctas emendat. Eodem cum oleo & aceto peruncti, à venenatis non feriuntur.<sup>30</sup> valet contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluique profluvium. In posca, aut vino decoctum bibitur, contra omnes vesparum, apum, similibumque, aculeatoris ius. Folia cum olei momento, moribus, & igni ambutis illinuntur. Constat aquam, trita radice addita, sub diuo addensari.<sup>40</sup>

*Althæa  
considera  
tio.*

ALTHÆA à Latinis posset Medica simplicitate dici, quoniam ab *ἀλθαία*, quod Græcis mederi significat, etymò habere videtur. Quæ circa meritò scriptum reliquit Dioscorides, Althæam id nomen traxisse à multitudine remedium, & frequenti eius vfu. Ea vulgaris herba est, nullisq; non cognita. Latini hanc Ibisum nominant. Italis verò, corrupta à Latinis appellatione, & præposita malua, quod cum ea quandam habeat cognationem, composuo nomine Maluauisco, vulgo vocatur. Althæam memorie prodidit Theophrastus lib. 1. c. cap. xix. de plantarum historia, vbi de ea differit iis verbis. Et radice Ibisici aquam posse ad densare aiunt, si tritam inieceris, sub diuoque humorem postheris. Constat Ibisus folio maluæ maiori, pilosioriq; caule mollis flore luteo: radice neruosa, alba: fructu maluæ, caulis quoque gustu maluam reddit. Vfus eius ad rupta, & tussis è vino dulci, & ad vlcera in oleo.

Aliam quandam si carnibus concoquas, in idem aggregare, ac veluti conglutinare posse affirmant: alias vim attractoriam possidere, modo magnetis lapidis, aque succini. hæc in inaninatis. hæcenus Theophrastus. Meminit Ibisici Galenus libro 1. simplicium medicamentorum, vbi eius vires ita descripsit. Ebisus, siue althæa (est autem malua agrestis) facultatem habet digerendi, laxandi, phlegmone leuandi, mitigandi, concoquendi difficilia coctu tubercula. Radix porro eius, & semen cætera quidem similiter agunt, vt herba viridis, sed tenuiorum partium, magisque exicatoriam, ad hæc magis exterioriam quam illa facultatem ostendunt, vt: & vitilignes detergant, & semen renum calculos fringant. Radicis verò decoctum dysentericæ, alui profluvio, & sanguinis reiectioni vtile est, nempe cum adstringentem quandam facultatem possideat. Planta, quæ Græcis *ἀλθαία*, *ἰβίσκος*, & *ἰβίσκος*, Latinis Althæa, Ibisus, seu Ebisus nominatur: Mauritanis, Chitini, Charchmi, siue Charchmie, & Rosi zaueni: Italis, Maluauisco: Germanis, Ibisch, & Heylurtz: Hispanis, Hierua canuamera, & Marmæ: Gallis, Guimaues.

*Althæa  
vires ex  
Galeno.*

*Nomina.*

# ALCEA. CAP. CXLVII.



ALCEA syluestrium maluarum generi assignatur. folia habet diuisa, verbenacæ proxima: caules tres aut quatuor, cortice cannabino vestitos: florem rose, paruum: radices albas, laticas, quinque aut sex, cum plurimum cubitales.

Quæ cum vino, aut aqua potæ, dysentericis, ruptisque medentur.

ALCEAM hodie passim ferè in Italia aliqui Bisinula: m, alij Maluam syluestre, nonnulli etiam Maluauiscum agreste nominant. Herba est caule, floribus, ac semine hortensii maluæ perquam similis, sed foliis longioribus incisura laciniatis, rannunculi modo. Nasctur in incultis, campestribus, & agrorum, serotiniisque marginibus, iuxta sepes, vias, ac semitas. Alceæ radices non desunt, qui althææ loco videntur, cum huius copia non habeant, ad tumores tum soluendos, tum emolliendos. Porro Alceæ pe-

*Alcea con-  
sideratio.*





ANAGYSIS.



ANAGYSIS. CAP. CXLIX.

**ANAGYSIS** frutex est arboris instar, perquam grauis odore: foliis viticis, virgisque: flore brassicæ: semen in corniculis non breuibz gignit, subrotundum, firmum, versicolori facie, simile renibus, quod durefcit vna maturefcence. Tenera folia trita tumores illitu reprimunt: si partus hæreat, & secundæ, mensesque morentur, drachmæ pondere bibuntur in passo: sic & suspiriosis dantur, & contra capitis dolores in vino: difficulter parientibus adaligantur, ita vt à partu statim auferatur. Radicis cortex concoquendis, discutien disque adhibetur. Semen commanducatum vomitiones vehementer ciet.

Anagysis  
considera  
tio.

**Q**UANTIS veteres vnius tantum Anagysis meminerint, duo tamen in Italia videntur genera. Maius in Apulia frequentissimum nascitur, & eo Campaniæ tractu, quo Terracina itur Fundum ad Tyrrheni litus: foliis vitici proximis: flore brassicæ racemoso: fructu hortensi similaci simili, amplioribus tamen, & breuioribus paulo siliquis incluso, colore purpurascence, vique adeo duro, vt aqua macerato, sua in pertinaci duritie consistat. Minus, quod rura Tridentina vulgò vocant Eghelo, maio & iunio mensibus grato in montibus spectaculo floret. Micat enim aureo flore, alteri omnino simili, odore tamen ingrato. Hinc cornicula prodeunt genitæ æmulæ in quibus semen continetur eiusdem genitæ magnitudine, sed oblongâ, phascoli modo, colore subnigro. Quod comedentes quandoque ignari pastores veluti

ANAGYSIS ALTERA.




legumina, crebris adeo vomitionibus afficiuntur, vt nonnunquam viderim ego quosdam, qui sanguinem vsque euomuerunt. Materies ligni durissima, quæ guaiaci modo exterius lutea est, interius verò nigra. Incori upta diu durat: proinde vinitores ex Anagysis palos faciunt sustinendis vitibus apuissimos, hosque cæteris præferunt ex aliis arboribus factis. Quin & sagittarij ex ea validissimos arcus conficiunt. Hac planta scæter vallis Anania, ac vniuersus Tridentinus ager. Cæterum nō desunt et recentioribus herbarijs haud obsecuti nominis (quorum opinione tuetur Conradus Gesnerus Tigurinus vir magnæ lectionis in suo libro animilibus dicato) qui putant, ac potius pro certo affirmant, alterum Anagysis genus, quod in montibus Tridentinis vulgari sermone Eghelo appellari supra diximus, eam sine controversia arborem esse, quam Plinius libro x v i. cap. x v i i i. Laburnū vocat, vbi ita scribit. Aqvas odore cupressi, iuglandes, castaneæ, laburnum. Alpina & hæc arbor, nec vulgò nota: dura ac candida materie: cutis florem cubitalem longitudine apes non attingunt. Ex iis Plinii verbis abunde, ni fallor, cognoscitur, quòd vt falsa, reprobanda sit illorum opinio. Siquidem Laburni materies à Plinio, candida describitur: non contramedullitis, nigra, cortice tenuis lutea, in modum Guaiaci, qualis Egheli vocatæ materies planè cernitur. Præterea eghelus arbor est omnibus ferè cognita, quòd frequentissima in sylvis reperitur: non ea quidem vulgò incognita, vt de Laburno refert Plinius. Ad hæc Egheli flores, qui in arbore racemorum instar pendunt, palmi longitudinem non excedunt: quos tamen Laburni Plinius cubitales reddidit. Illud insuper experientia conpertum habeo (etsi contrarium afferat Gesnerus) quòd apes Egheli flores attingunt, nec eos aspernantur. Hæc nimirum sunt, quæ meo quidem iudicio, retragantur tum Gesnero, tum

Opiniore  
probata.

omnibus iis, qui cum eo, hac in re sentiunt. quinetiam ostendunt, quàm magna sit differentia inter Laburnum & Eghelum. Hanc tamen plantam idem Gesnerius montani cythi genus esse censet, argumento quòd folia ferat terna veluti cythi, quodq; cythi modo sit apibus ingrata. Sed is (pace viri erudit dixerim) in hoc maxime hallucinatus deprehenditur, Marci Varonis, Columellæ, & Plinij testimonio: vt qui inter cetera seri iubet iuxta Aluearia cythium, quòd huius flore magnopere delectentur & alliciantur apes. Hoc similiter testatur Galenus libro primo de ant. dotis, vbi cythi historiam & vires describit. Et miror certè, Gesnerum illa non vidisse, quæ tamen debuerat, si omnes, qui extant in Europa, libros perlegit, vt perlegisse conficitur ex Bibliotheca, quam edidit. Quare equidem non possum non in ea perstare sententia, quam iam pridem habui de planta Eghelovizata, cum nulla sit firma ratio, quæ me cogat illorum subscribere iudicio, qui eam Laburnum Plinij esse existimant. Quantum igitur ego sentio, Eghelus erit Anagryis minor, aut Anagryis montana, si ita nobis liceat eam nominare. Namque non solum foliis, floribus, coniculis, semine, & omnibus denique notis Anagryim prorsus æmulatur, vt eius effigies, quam hic damus, pulchrè demonstrat, sed etiam viribus & odore, vtpote qui in tota planta & grauis admodum sentiatur. Anagryis vires memoria prodidit Galenus libro v. i. simplicium medicamentorum, his verbis. Anagryis frutex est grauiter olens, & acris, digerentis, excofacientisq; facultatis. Sed folia etiamnum virentia, cum propter humiditatis admixtionem minus sint acris, idcirco tumentia reprimunt. At siccata incidentis sunt exiccantisque valenter facultatis. Similem ferè facultatem habet radiceis eius cortex. Semen autem magis subtilium est partium: sed & vomitum prouocat. Planti, quæ à *ὀνύχους* Graecis, Anagryis etiam Latinis dicitur: Anagryi, Italis, Gallis, Boys puant.

CEPÆA. CAP. CL.



cantho, hoc est, corruda vocat bibatur.

CEPÆAM, quam antea in nostris commentariis Italica lingua conseripsi, ingenue confessus eram me nondum comperisse, aut ab aliis compertam vidisse. hoc tempore Venetis ad me misit Ioannes Odoricus Melchiorius Tridentinus medicus pro ætate sua non imperitus, reiq; herbariæ non ignarus, mei adeò studiosus, vt si aliud non esset, hoc nomine tantum mihi plurimum diligendus sit, atque etiam in filium habendus. Ad Cepæam hanc redeo. Ea sanè mihi visa est ita adamsillim Diofcoridis descriptioni respondere (id quod eius pictura, quàm hic damus, graphice ostendit) vt non dubitandum putem, quin hæc sit vera ac legitima Cepæa. Huius, quod equidem legerim, Galenus non meminit in simplicium censu. Veruntamen Paulus eius mentionem fecit libro v. i. i. inter simplicia, vbi eam recitit his verbis. Cepæa portulacæ similis est. Folia ipsius contra vesicæ stabies vtiliter bibuntur. Radix cum asparago, quem myacanthinum, hoc est, corrudam appellant, pora, vrinæ stillicidia, quæ ex obstructione sunt, abigit.

xenale vt Graecis, ita Cepæa Latinis, & Cepæa Italica appellatur.

ALISMA. CAP. CLT.



ALISMA, alijs Damasonio appellant: folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, traciniosa, conuexaque in terram: caule simplici, tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido, pallescente: radicibus tenuibus, vt ve-

ratri nigri, acribus, odoratis, modicè pinguibus, aquosos amar tractus. Radix, si drachma vna, aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum denorant, aut a rubetis ranis de morbi sunt, aut opium hauserunt: torminibus, atque dysenteria, per se, aut cum pari modo feminis dauci, potui datur. conuulsis, & contra vitia vuluæ prodest. Herba sistit alium, menstrua pellit, tumores illita mitigat.

Q. V. A. N.

*Alifina-  
ria confi-  
derato.*

QUANQVAM affirmat Ruellius, cui etiam Fuchius subscribere videtur, Alifina sibi cognitum esse, vocarique à nonnullis Pastoralem fistulam, à quibusdam verò Plantaginem aquaticam, tamen plantago hæc, quam etiam aliqui Barbam sylvanam appellant, nullis notis cum Alifimate convenire deprehenditur. Siquidem Alifina folia fert plantagini similia, sed angustiora, & in terram reflexa: caulem mittit simplicem, ac tenuem. Plantago autem aquatica foliis prodit plantagine minoribus, lancearum cuspidum instar acuminatis, sursumque spectantibus: multiplex caule, adnatis pluribus referto. Cum itaque ex iis notis collatis conslet, Alifina, & Barbam sylvanam inter se plurimum differre, non temere facere videor, quòd illorum sententia non ausim adimplari. Porro plantam, quam hic pro Alifimate depingi curavimus, mihi primum Pragæ ostendit Adamus Leonorus, inuenis spectatæ doctrinæ, & rei herbariæ studiosus. Quòd enim hæc omnibus, ni fallor, notis Alifina repræsentet, meritò fit, ut iam non dubitem affirmare eam esse legitimam Alifina: aut saltem eius effigiem exhibere, ut aliorum quoque de ea sit iudicium. Cæterum duo Alifimatis genera Plinius constituit libro x x v. cap. x. ubi de utroque differit his verbis. Alifima, inquit, alijs damafonion, alijs hyron appellant. folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, & magis laciniosi, connexaque in terram, alias etiam venosa similiter: caule simplici, & tenui, cubitali: capite thyrsi: radicibus densis, tenuibus, ut veratry nigri, acrisbus, odoratis, pinquibus nascitur in aquis. Alterum genus eiusdem in sylvis, nigrius, maioribus foliis, hæc Plinius. Alifina memoria prodiit Galenus libro v. l. simplicium medicamentorum, sic de eius viribus discreta. Damafonion, aut Alifina. De hæc herba in tertio libro tradit Dioscorides, quòd radix eius epota dysenterias sanat, & alvum sitat, atque edemata mitiget. Sed nos ea quidem experti non sumus. Quòd autem constituto in renibus calculos aqua, in qua decoctus fuerit, pota comminuat, casu experti sumus. Ex quo liquet, quòd absterforiam quandam facultatem obtinet. Huius herbar nomen Græcum *Ἐλισμα*: Latinum, pariter & Italicè, Alifina. † Hæc vox non legitur in Græcis codicibus, neque ab Orisano refertur, neque etiam à Marcello vertitur. Vnde planè suspicor, quòd Ruellius ita verbum hoc ex Plinio adiecit, ut reliqua etiam ex eodem reddidit.

*Alifina-  
ria Viri-  
es Galen.*

*Rumina.*

#### ONOBRYCHIS. CAPVT CLII.

ONOBRYCHIS folia habet lentis, longiora paulò: caulem dodrantalem: florem puniceum radicem parvam. nascitur in vlginosis, & incultis. Herba suapte vi, si trita illinatur, tubercula

dissipat: cum vino pota, strangurias sanat: illita ex oleo, sudores mouet.

NA SCITVR Onobrychis, Plinio libro x x i i i. capite x v i. authore, circa fontes. *Onobry-  
chia confi-  
derato.* Folia habet lentis, paulò longiora: florem rubentem: radicem exiguum, & gracilem. Sunc qui Onobrychin velint eam esse herbam, quam aliqui Rutam caprarum, alijs Galegam vocant: nos verò vulgò Lauanase. Verum hæc notis, quæ Onobrychi tribuuntur, haudquaquam respondere deprehenditur. quippe quæ folia ferat lentis quadruplo maiora, caulem plerumque bicubitali, flores purpureos, & radicem non parvam. Vt hinc mihi planè videatur, quòd illorum opinioni nemo rectè possitque debeat adimplari. Onobrychidis vires tradidit Galenus libro v i i i. simpli. medicamentorum, sic inquit. Onobrychis rarefaciendi, digerendique vim obtinet: proinde folia eius virentis etiamnum illita ad morem cataplasinis tubercula discutiant: ætactæ verò, si cum vino bibantur, strangurias sanant. Quinetiam sudores elicit cum oleo inuncta. *Viris ex  
Galen.* Quæ *ἰνολύχης* Græcè, Onobrychis item Latine, & Onobrychi Italicè vocatur. *Rumina.*

#### HYPERICVM. CAPVT CLIII.



HYPERICVM alijs androsamon, alijs corion, alijs chamæpityn appellant, quoniam semen odore resinam imitatur: surculaceo frutice, dodrantali, rubescente: folio ruta: flore luteo, † leucoio simili.

qui digitis attritus sanguineo succum remittit, qua ex causa androsamon cognominatur: subhirsuta siliqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi odoris. gignitur in locis cultis, & asperis. Vrinam cit, menstrua pellit appositum: tertianis, quartanisque cum vino potum liberat. Semen quadraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, ambusta sanant.

ASCYR



CORIS



ASCYRON.

CAP. CUIII

ASCYRON, siue ascyroides, hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habens ramos, surculosiores, rubentresque: folia tenuia: flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non abfimilem: cuius attritu digiti ferè cruentantur, quade causa androsæmon vocauere. Vfus feminis ad ischiadicis, potum in hydromelitis sextario: nam biliosa récrementa amplissime detrahit. sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur. Illinitur & ambustis efficaciter.

ANDROSAEMVM.



ANDROSAEMON.

CAPVT CLV.

ANDROSAEMON ab hyperico, ascyroque differt, quòd fruticet ramulis furculosis, ac tenuibus: rubentibus virgis, & foliis rutæ, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita vinofo succo manant. complures alas habet in cacumine, vtrinque expansas, pinnarâsq: circa quas flores pusilli, lutei: & in calyculis semen papaueris nigri, insigne lineis. Huius comæ tritæ resinofum odorem reddunt. Semen tritum drachmis duabus potum, biliosa alui excrementa pellit. ischiadicis maxime medetur: sed à purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur, & sanguinem cohibet.

CORIS.

CAP. CLVI.

CORIS, quod aliqui hypericon vocant, frutex est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Potum semen menses trahit, & vrinas: contra phalangiorum morsus, ischiadicis, & opisthotonicos ex vino potum auxilio est: horroribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissime illinitur. Radix vino decocta potaq; defectis opem ferre.

ferre creditur: sed laborantem inter potandum quam optime cooperiri licet: siquidem corpus totum desudabit, ex qua re pristinam agilitatem recuperabit.

*Hyperici.* HYPERICUM, Ascyrum, & Andros-  
*conge-* mum, eiusdem plani generis plantæ (vt Dio-  
*merii com-* scorides inquit) esse videntur. Verum in earum  
*sideratio.* caulibus, & foliis aliqua notatur differentia: nam hæc folia habet rubentiora, illa viridiora, vni maiora insunt, alteri minora. Similis discriminis ratio in caulibus. Omnes hæc congeneres plantæ hodie ab omnibus vulgò cognoscuntur: ex nanque iunio, & iulio mensibus, diuersis in locis aureis floribus ornata conspiciuntur, illa admodum distincta ac præditæ notis, quæ singulis à Dioscoride tribuuntur. Cæterum quæ Coris vocatur, non ita Hypericum refert, quæ admodum Androsænum, & Ascyrum. quippe quæ non altior dodrantali altitudine assurgat: foliis ericæ, minoribus tamen, & subpinguib: caulibus rufescentibus, odore suauis, ac grato. Hæc ad me pluries allata est à nostris herbariis. Nascitur frequentissima in Italia. Hypericum à perforatis foliis à nostris vulgò Perforata vocatur: folia enim innumeris scætant foraminibus, usq; adeo minutis, vt visum effugiant, nisi ipsa folia sole obiecta inspiciantur. id quod silentio videtur inuoluisse Dioscorides: quinetiâ Plinius, alioqui rerum omnium diligentissimus indagator. Qui tamen hac in historia haud dubiè falli deprehenditur, quod scripserit libro x xvi. cap. v. Hypericum nasci semine in siliqua, nigro, maturefcente cum hordeo. Siquidem Dioscorides non tradit Hypericum cum hordeo maturefcere, sed contineri eius nigrum semen siliqua subhisuta, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine. Constat præterea annua experientia maturefcere hordeum plerumque abeunte maio: verum Hyperici semen non perficitur, nisi iulio, & augusto mensibus. In hac quoque Hyperici historia errat Brasauolus medicus licet clarissimus, quod velit Hypericum ex Dioscoridis auctoritate florem album habere: eamq; ob causam, id quod circumfertur, cum flore sit melino, illegitimum esse putat, imò non aliud, quam Rutam syluestrem, pro qua pharmacopolan secum colloquentem, id ipsum alteruere admonet. Neque in his vno tantum, sed quantum sentio, duplici notatur errore. Primum quod Hypericum non album, sed luteum florem ferre scribat Dioscorides contra Brasauoli sententiam, cum sic in eo legatur *ἡδὲ ὡς ῥοδάκνῃ*, hoc est, florem habens luteum: non autem album inquit, vt perperam Marcellus Florentinus interpretatur, cuius fortasse falsa interpretatio. Brasauolus seductus est. Deinde quod legitimum Hypericum pro syluestri ruta seruandum censuerit, cum tamen in calce ferè sui voluminis

prioris sententiæ oblitus, dum olei ex Hyperico parandi seniori myropolæ rationem explicat, communis vsus Hypericum Ascyrum esse declarat. Nec secus quam Brasauolus hallucinatur, pace eorum dixerim, Monachi illi reuerendi, qui in Mæsum commentarios ediderunt, quod non rectè cum illo sentiant, Hypericum, quo vtimur, primum esse syluestris rutæ genus. Quorum sententia cum fuerit à nobis superius in rutæ mentione rationibus & auctoritatibus abunde explosa, & improbatâ, superuacuum esset: idem nunc repetere: eò enim accedet, qui plura horum errata cognoscere vult. Hyperici vires memoris prodiit: Galenus lib. v. simplicium medicamentorum, sic inquit. Hypericum calefacit, & desiccatur, tenuisq; substantiæ est, adeo vt & menses, & vrinas prouocet. Sed ad hæc totus sumendus est fructus, non tantum semen. Porro cum foliis illius viridis ac cicatricem ducit cum alia, tum etiam ambusta. Cæterum si sicca còtusa inspergas, sanabis humida, & putredinosa vlcera. Sunt & qui ischiadici bibendum exhibeant. Idem lib. v. de Androsæmo ita scribit. Androsæmum planta fruticosa, natura duplex: vnum enim Ascyron, & Ascyroides nuncupatum est, species hyperici. Alterum vt à quibusdam Dionysias appellatur. Est autem semen eorum purgatorium. Foliorum verò facultas modicè extergens & desiccans, vt & ambusta sanare credantur. Cæterum in vino austro decocta, vinum ipsum magnorum vulnerum glutinatorium efficiunt. Sed quod de Cori mentionem fecerit Galenus in simplicium medicamentorum censu, mihi incompertum est. Planta, quæ Græcis *ἡδὲ ὡς ῥοδάκνῃ*, Latinis similiter Hypericum nominatur: Mauritaniis, Reiofricon, seu Reiofaricon: Italis, Hiperico, & Perforata: Germanis, Sant Iohannis kraut: Hispanis, Coraion cillo: Gallis, Mille pertuis, & Trucheram. Quam verò Græci *ῥοδάκνῃ*, Latini quoque Ascyrum dicunt: Arabes, Asbirach: Itali, Asciro. Quæ deinde Græcis *ἡδὲ ὡς ῥοδάκνῃ*, Androsæmon item Latinis appellatur: Arabibus, Androsæman, Androsion, siue Androsagion: Italis, Androsæmo. Quæ deniq; *ἡδὲ ὡς ῥοδάκνῃ*, Coris etiam Latine, & Cori Italicè vocatur.

† Quoniam hoc loco in vulgaris exemplaribus Græcis nulla fit alba vires mentio, ideo sunt qui illorum testimonio freti, verbum illud auferant ex interpretibus. Sed quomodo id rectè factum sit, non video: siquidem in Oribasio legitur, *ἡδὲ ὡς ῥοδάκνῃ*, hoc est, florem habens luteum leucio similis. Adde etiam, quod Hypericum ita admodum floribus colore luteam violam repræsentat, vt nihil melius. Nos autem vi sumus voce Græca, ne ex albo, quod fortè Marcello imposuit, aliqua possit oriri difficultas.

† Quæ hic sequuntur, in Græcis ædificibus impressis non hoc loco, sed in fine inter notha, & Dioscoridi falsò adscripta leguntur, vt quæ

*Monacho rum hallu cinatio.*

*Hyperici vires ex Galeno.*

*Nomina.*

*Plinij lapsus.*

*Brasauoli error.*

adsciticia sint habita. Nos verò illa hac admittimus Ruellij, ut facimus, interpretationem secuti: necnon etiam fidem codicis manu scripti.

AIUGA. CAP. CLVII.

AIUGA herba in terra repens, subcrura: foliis semperuiui minoris, multò tenuioribus, hirsutis, & pinguiori-<sup>10</sup>bus, circum ramos frequentibus, odore pinus: flore tenui, luteo, vel candido: radicibus eichorij. Folia septem diebus in vino pota regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicos sanant. Dantur peculiariter vrinæ difficultatibus, iecinoris, & renū vitii: torminosi profunt. Ea apud<sup>20</sup> Heracleam Ponticam, perinde atq; antidoto, contra aconitum vtuntur, bi-

CAMAEPTYS PRIMA.



*Ailuga. 3.  
Sylvestris.* AIUGAM, quam Græci Chamæpitryn vocant, quoniam foliis, & odore pinum refert, herbariorum vulgus Iuam arthriticam appellat, quod ischiadicis, & aliis articularum doloribus opem ferat non obstatum. Vulgaris est notitiæ Ailuga, quæ primo generi adscribitur. Verum postremo, quæ sæpius etiam vidimus, nõ adeò omnibus est nota, quemadmodum nec media,<sup>50</sup> quam hætenus mihi quidem videre non licuit.

*Cuiusdæ  
Germani  
error.* Caterùm in aperto errore versabatur Germanus ille pharmacopola, qui Brasæolum docuit Ailugam Germanicè lingua vocari Vergiss mein nicht. Quandoquidem herba huius nominis mihi cū Germanis iadiu versanti notissima est: quæ tamen nulla prorsus ex parte quàmuis Ailuga representat. Chamæpitryos meminit Galenus lib. v. 111. simp. med. vbi de eius virtutibus ita scriptum reliquit. Chamæpitrys gullu quidem amarum saporem acri validiorem obtinet, effectū verò expurgat, abstergitq; viscera plus.

bentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum polenta iure decoctæ subacta. Trita in farinam, & cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit: excepta melle, cum aris squama, & resina deicit: appositæ ex melle, vuluæ vitia extrahit: mammarum durities discutit, vulnera glutinat: vlcera quæ serpunt, cum melle illita, cohibet. Alterum est genus aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, præternubus: coma supradictæ, flore candido, semine nigro. hæc etiam pinum redolet. Tertia mas nominatur, parvula, foliis exilibus, albis, scabris: caule aspero, candido: luteis flosculis, semine iuxta alas. respicit & hæc pinum. Hæc duæ vim superioris obtinet, sed non vsque adeò efficacem.

CAMAEPTYS ALTERA.



quàm calacit. Proinde regio morbo laborantibus, & omnino quibus faciliè iecer obstatum, bonum est medicamentum. Quin & menses ducit tum pota, tum appositæ cum melle. Sed & vrinæ mouendæ aptum est medicamentum. Sunt autem qui etiam eam exhibent decoctam in melicrato iis, qui coxendicis doloribus torquentur. Herba Porro ipsa viridis vulnera magna conglutinat, & vlcera putrescentia sanat. Præterea mammarum durities discutit. Est enim in secundo ordinis tertij, in calfaciendo verò secundæ. Quæ herba Græcis *χρυσάριον*, Latine Chamæpitrys, Ailuga, & Abiga nuncupatur: Mauritanicè, Hamesthecos, seu Chamasthius: Italis, Chamæpitrio, & Iua: Germanicè, Yelenger ye sieber, Hispanicè, Piniho, & Yua arctica: Gallicè, Hie muscæ aut arthetique.

*Nomina*

LIBRI TERTII.

E I N I S.

PTES

# PETRI ANDREAE MATTHIOLI MEDICI

Senensis Commentarii,

IN LIB. QVARTVM PED. DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICA

MATERIA.

\*\*\*



**I**RIBVS ANTE libris, amantissime Arec, tradidimus odoramenta, olca, arbores, vnguenta, animalia, frumenta, olera, radices, succos, herbas, feminæque. In hoc autem quarto differemus de radicibus, & eis, quæ restant, herbis.

BETONICA.

CAP. I.



**C**ESTRON psychotropho vocatur, quoniam frigidis locis inueniatur. Latini Betonicam appellant. Herba est caulem ferens tenuem, cubiti altitudine, aut maiorem, quadratum: folia quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicem maiora: in summis caulibus semen, veluti saturciæ, spi-

catum est. Decerpta huius folia siccantur, plurimos ad vsus. Radicibus nititur, vt veratri, tenuibus, quæ ex hydromelite in potu, pituitosam vomitionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieribus vuluæ malo opportunis, & ad laxandos vteri strangulatus, denarij pondere cum hydromelite: tres in vini sextario drachmæ contra serpentium morsus ebibuntur. Herba magna vtilitate illatis à serpente vlnis illinitur. aduersus etiam venena drachma ex vino pota cõuenit: præsumpta ea, si venenum hauriatur, nihil nocebit. vrinam ciet, aluum subducit. Medetur comitialibus, & infans pota ex aqua: & iecinoris, lienisque vitilis drachmæ pondere in aceto mulso. concoctionem adiuvat, si quis fabæ magnitudine secundum cœnam cum melle cocto deuorauerit: modo consimili aciduræ tantibus propinatur. stomachicis eam manducare, & succum deuorare proderit, si postea dilutum vinum sorbeat. Datur sanguinem excreantibus, tribus obolis cum diluti vini cyathis: ischiadicis, renum, & vesicæ doloribus ex aqua. aquæ inter cutem binis drachmis ex hydromelite, si febricitat:

*Eu aliter*

fin aliter ex mulso. regio morbo laborantes recreat. menses pellit drachmæ pondere cum vino pota. alium purgant drachmæ quatuor pota in hydro melitis decem cyathis. facit cum melle ad tabem, & purulentam excreationem. Folia sicca, tritâque fictili vase reconduntur.

Betonica  
considera-  
tio.

Vires ex  
Antonio  
Mufca.

BETONICA herba est nullis non cognita, & innumeris prædita viribus. Vnde Itali, cum aliquem laudibus familiariter extollere volunt, vulgari prouerbio dicunt. Tu hai piu virtù, che non ha la Betonica, id est, Tu pluribus præditus es virtutibus, quàm Betonica. Scripsit de Betonice viribus proprium libellum Antonius Musa clarissimus Augusti Cæsaris medicus, in quo hæc de ea memoriæ prodidit. Herba Betonica nascitur in pratis, & montibus mundis, & opacis, circa frutices. Animas hominum, & corpora custodit: & nocturnas ambulationes à maleficiis, & periculis. Loca quinetiam sacra, & busta à visibus metuendis tuetur, ac defendit: & in omni denique res sancta est. Cestron vocatur, & synchotrophon: siquidem frigidis reperitur in locis, radicibus tenuibus, thyrsi pariter tenui, cubiti altitudinem excedente, quadrangulo. Folia profert querqus, odorata: semen in summitate thyrsi spicato, thymbræ modo. Pollent vniuersa planta dotibus fere innumeris, quandoquidem tusa capitisque vulneribus illita, ea mira celeritate conglutinat. Præstat id tamen efficacius, si tertio quoque die iterum, atque iterum imponatur. Aiunt præterea tam va lentioris esse facultatis, vt ossa quoque fracta ex trahat. Radicum ex aqua decoctum ad tertias fori oculorum doloribus medetur, quod item præstant contrita folia, & fronti superimposita. Succus à foliis per se tritis expressus, aut prius aqua maceratis, aurium dolores mulcet, si tamen addito rosaceo in aures egelidus instilletur. Idem drachmæ pondere haustus in aquæ calidæ cyathis quatuor, sanguinem illum per inferna trahit, cuius redundantia caligines oculis offundit, quo fit, vt etiam visum acuant comæda folia. Eadem cum salis momento contusa, naribusque immissa sanguinem inde fluentem sistit. Betonice decoctum ex vetere vino, aut ex aceto dentium dolores finit, si eo os sepius colluatur. Herba ipsa ex tepenti aqua pota suspensiosis, & anhelosis maxime proficit. Folia melle excepta tabidos iuuat, præsertim qui purulenta exulsiunt. Eadem tribus continuis diebus deuorata drachmarum quatuor pondere, aut ex frigida aquæ cyathis quatuor ebibita, ventriculi dolores mulcet: ictericis verò, si ex calida hauriatur. Ex vino decocta lienis vitis medetur. Sanat & renum vitia ex mulso bibita, duarum drachmarum pondere: ex vino autem veteri trium drachmarum pondere, addi-

tis piperis granis septem & viginti, ad lateris, lumborumque dolores vtilissimè bibitur. In duobus aquæ calidæ cyathis sumpta, alui & intestinorum tormina remouet, si tamen à crudis non fiant succis. Foliorum quatuor drachmis in aquæ mulse cyathis octo epotis, commodè citatur aluus: sananturque iis ex vino sumptis colli inflammatione vexati. Betonica in elegemate ex melle sumpta nouem diebus, tussim sedat.

10 Potâ in aquæ calidæ cyathis quatuor duarum drachmarum pondere, addita plantaginis drachma, febres quotidianas expellit, quod tamen in accessionibus tantum fieri debet. Idem præstat etiam in tertianis, si cum pari pulegio assumatur. Sanat ipsò quoque ordine etiam quartanas in tribus aquæ calidæ cyathis hausta, triû drachmarum pondere, addita mellis vncia: calculi franguntur. Betonica ex tepenti aqua feliciter bibitur hypodipicis. Pariendi celeritatem affert, vterique cruciatus à frigiditate conceptos mulcet, si ex calida aqua, aut mulso duarum drachmarum pondere propinetur. Contrita folia & illita, præcisos glutinant neruos, & resolutos iuuant. Eadem trium drachmarum pondere ex caprillo lacte sumpta tribus diebus, sanguinem ore reiectum cohibent: & ex pari vini veteris mensura, medetur ruptis, & ab alto deuolutis. Præsumpta ebrietatem arceat. Ex vino frequenter hausta, ictericos sanat: & fluilo

30 adipe admista, carbunculos curat. Potu ex aceto mulso vnus drachmæ pondere, viatoribus longo itinere defatigatis vires mirificè reficit. Fastidia abstergit, & stomachicos recreat. Aduer fatur venenis, & serpentium, & venenosorum rabidorumque: quorumcumque animalium moribus non modo intus sumpta, sed etiam extrâ emplastri modo imposita. Cuniculosa, sinuosaque sanat vlcera cum sale indita. Ex vino hausta menses ciet. Potu dolores podagricos lenit, præsertim radicum decoctum potum. idemque præstant contrita folia imposita. Betonice vires memoriæ prodidit Galenus lib. v. 1. simplici medicamentorum, sic inquit. Cestron, aut Psychotrophon, Romanè verò Betonica, vim habet incidendi, vt gustus indicat. Amari enim est, & subacris ipsa herba: id quod & particulatim edita actio offendit. Nam consistentes in renibus calculos diuidit, & pulmonem, & thoracem, & iecur expurgat, abstergitque: menses quoque ciet, & comitialibus prodest: tum rupta, conuulsæque curat, & omnibus bestiarum moribus vlceri illita auxiliatur. Postremo acidum ructantibus, & ischiadicis bibita, auxilio est. Planta, quæ *κλερρις*, & *κλερρις* Græcis, Betonica, & Vetonica Latinis dicitur: Arabibus, Chastara: Italis, Betonica: Germanis, Betonen: Hispanis, Bretonica: Gallis, Betoesne, & Betoine.

Betonica  
vires ex  
Galeno.

Nomina.

BRITANICA. CAP. II.

BRITANICA, aut Vetonica, folia habet sylvestris lapathi, sed nigriora, & pilosiora



pilosiora, gustu adstringentia: radicem tenuem, & breuem caulem paruum emittit. Folii exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, priuatim depascentibus oris, & tonsillarum vlcerebus accommodatam. Valet etiā ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

Britanica  
considera-  
tio.

QUANQVAM tradit Ruellius Britannicam esse plantam Italiae cognitam, atque ibi vulgò appellari *Piazamano*, mihi tamen haecenus non solum nomen illud incompertum est, sed nulum etiam inuenire obtigit, qui Britannicam ostenderet. Hanc autem scripsit celebravit Plinius libro x v. cap. i i i. hisce verbis. In Germania trans Renum castris à Germanico Caesare promotis, maritimo tractu fons erat aquae dulcis solus, qua pota dentes intra biennium deciderent, compagesq; in genibus soluerentur. Stomacem medici vocabant, & sceletyben ea mala. Reperta auxilio est herba, quae vocatur Britanica, non neruis modò & oris malis salutaris, sed contra anginas quoque, & serpentes. Folia habet oblonga, nigra: radicem etiam nigram. Flos est, qui (ut certò proditur) collectus priusquam tonitrua audiantur, & deoratus securis in totum redit homines. Frisij, quā castra erant, nostris demonstrare illam. haec Plinius. Ceterum non desunt, qui Britannicam censent eam esse stirpem, quam herbariorū vulgus ideo *Bis-*

Bistorta  
mentio.



tis modo cōtracta, & intorta, calore rubro, nō (ut Plinius inquit) nigro. Sed praeterea non desunt etiā, qui *Tormētilla* sic officinis, & vulgò vocatā Bistortae generi adscribāt, quod non facie, sed fortasse viribus illi respondeat. Quae quoniam hic nobis occurrit, & quam plurimis effertur laudibus, ideo hic locus exposcere visus est, ut de ea aliquid differamus. Est itaque

TORMENTILLA folio pentaphylli minor, septenis incisuris diuiso: radice breui, nodo-  
sa, compacta, rubeo colore, sapore adstringen-  
tia, & vi-  
res.



inentiam supprimunt, cum succo plantaginis pota: sistunt menses, si in earū decocto ad vmbilicū vsq; cōsederint foeminae. Idem prestant (de radicibus tamen intelligi) si tritae, & ex melle atq; spica subacta, ventri ac pubi illantur. Sanguine est vulneribus manantē cohibent, super asperis earum puluere. Qui item potus biliosos coëcet vomitiones, si ouorū albo exceptus super fistilā tegula inassetur, mox comedatur. Aqua, quae ex his duplici organo elicatur, siue est radicibus decoctū, venenis omnibus remediū est. Ex quo tantū apud nōnullos *Tormētilla* inualuit, vsus, ut ex eius radicibus etiam medicamenta componāt aduersus pestilentiam. Vtrāq; dysentericos sanant, & vulnera glutinant, praesertim quae in intestinis, & vlcibus fuerint illata, non modò ipsis vulneribus illata, sed & in potionibus haulta. Rebel-  
lia, contumaciāque vlcera curant, & ea sistunt, quae serpendo corpora erodūt. Sed ut iam ad

Britanica  
vires ex  
Galeno.

Britanicae herbae folia adstringentia sunt, & vulnerum glutinatoria, similia folijs sylvestriū lapathorum, nisi quatenus atriora sunt, & magis; hirta. Sed & expressus ex illis succus perinde natus est adstringere. itaq; costum quidam respondent, tanquā inter stomatica medicamēta efficacissimum. Videtur enim sanare iam etiam putrescentia. haecenus Galenus. Ceterum non est silentio praeterendum, quod Dioscoridis codices inueniuntur, in quibus post Britannicam alterū per se de Beticana caput legitur. Quod quoniam pluribus indicis in Dioscoride additum esse constat, atq; in hunc auctorem ex libello Antonij Musae Augusti Caesaris medici fuisse translātū, ideo nos illud abdicauimus, neque alia commentatione idem dignum censuimus. Quae planta Graecè *βίστορα*, Britanica Latine, pariter & Italice appellatur.

LYSIMACHIA.

LYSIMACHIA ALTA.



LYSIMACHIA. CAP. III.

LYSIMACHIA, quā aliqui lytron appellant, caules emittit cubitales, altiorésve, fruticosos, tenues: prodeuntibus geniculatim, foliis tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus: flore rufo, aut auro. gignitur in aquis, & palustribus. Foliorum succus adstringēte sua vi, sanguinis reiectionem suppressit: dysentericis potui datur, aut infunditur: mensium abundantia sistit, in pesto. sanguinis profluvio subuenit, si nares ea herba obturentur: vulnere cruento cohibet. Acerrimum nidorem suffita reddit: quae de causa serpentes fugat, & muscas interficat.

*Lysimachia confederatio.*

LYSIMACHIA à Lysimacho rege inuentore nomen accepit, ut Plinius est atheno libro x x v. cap. vii. vbi de ea ita scriptum reliquit. Inuenit Lysimachus herbam Lysimachiam, quae ab eo nomen retinet, celebrata Erasistrato. Folia habet salicis, viridia: florem purpureum: fruticosa est, ramulis erectis, odore graui. gignitur in aquis. Vis eius tanta est, ut iumentis discordantibus iugo imposita asperitatem cohibeat. haec Plinius. Ruellius Lysimachiam eam herbam putat esse, cuius est usus apud infensores ad insensios viridi colore pannos: vbi enim hos glasto tinxere, eam superinduentes viridem colorem efficiunt. Hanc Hetrusci, qui lanificio dant operam, vulgo appellant Cerretta, siue Braglia. Forosilienses verò Cosaria. Sed hac in re Ruellius

*Ruellius et Valsura.*

20

30

40

50

lius, meo quidem iudicio, aperte fallitur: quidem Cerretta, quam ipse rusticus Corneolam vocari ait, caules profert, & folia lino maiora, non autem salicis: florem luteum, semen foliiculis genistae effigie inclusum: nascitur in pratis, nullaque, est, quod gustu perceiverim, adstrictione praedita. Non desunt praeterea alij, qui pro Lysimachia aliam plantam ostendant, quae quadrato exit caule, foliis salicis, flore in purpuram rubescente, spicato. verum in hac quoque nihil adstringens gustu deprehenditur. Lysimachiam legitimam, si fallor, Romae ad me Goritiam misit Vincētius Cantonus eius meus, medicus eruditus, & rei herbariae studiosus: quae mihi plane singulis notis, quas Dioscorides Lysimachiae tribuit, videtur adimpleri. Nascitur haec in Romano, & Senensi agro. Ceterum quauis Ruellius in mentione Lysimachiae exillimauerit (ut supra diximus) Corneolam esse veram Lysimachiam, in fine tamen eiusdem capituli quandam aliam herbam à rusticis sibi demonstratam fuisse testatur, ad fugandam pestilentiae efficacissimam, buboni tantum adalligatam, quam etiam pro Lysimachia asseruit. Ex quo palam est, Ruellium duas pro Lysimachia plantas designasse, ea fortasse ratione adductus, quod Dioscorides flore rufo, aut auro constare Lysimachiam memorie tradiderit. Lysimachiae meminit Galenus libro v x l. simplicium medicamentorum, vbi de eius viribus in hunc modum disseruit. Lysimachios superantem habet qualitatem adstrictoriam: per quam & vulnera glutinat, crumprēmque ex naribus sanguinem emplastri modo illita compescit: quin & reliquos sanguinis eruptiones sistere potest cum ipsa, tum succus eius multo magis. Pota dysenterias, sanguinis reiectiones, ac muliebres profluvium faciat. Huic herbae nomen Graeco est *αυσιμαχια*. Latium, & Italicum Lysimachia.

*Ruellius et Lysimachia.*

*Lysimachia ex Gale.*

POLYGONVM MAS.

POLYGONVM FEMINA.

SANGVINARIA  
CAP. IIII.

POLYGONVM mas ramos habet teneros, & exiles, copiosos, geniculis cinctos, qui per terram, vt gramen repūt: folia rutæ, sed † molliora, longioraque: femine sub omnibus foliis turge-<sup>30</sup> scente, vnde marem appellari volunt: flos ei candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare. prodest cruentæ excretioni, cholera, alui fluxionibus, & vrinæ stillicidio: nam vrinam apertè ciet. Cum vino potus, contra serpentium morsus auxiliatur: datur in febris per horam ante signi-<sup>40</sup> ficationes. fæminarum profluuiâ impositu sistit. Idem succus aurium doloribus, iisdemque purulentis instillatur. Facit eximie ad genitalium vlcera, cum vino adiecto melle decoctus. Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, vlceribus quæ serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus<sup>50</sup> vulneribus folia illinuntur. Sanguinaria fæmina fruticat vno caule, arundini teneræ simili, densis geniculis, & in fetubarum modo factis: articulos in orbem cingunt apices, foliosis picæ similes: radices nullus vsus. nascitur in riguis. Huic quoque spissandi, refrigerandi; natura: ad eadem valens, sed inefficacior.

POLYGONON mas, quod ab Italīs vulgò *Polygoni* vocatur Coreggiola, & Centinodia, in campis, *considera- tio.*

que nascitur. Fæmina verò, quæ non adeò frequens est, & copiosa, in riguis humentibusq; locis inuenitur. Mari polygono Proserpinacæ nomen tribuit Apuleius, quod humi cauliculis repat. Polygoni meminit Galenus libro v IIII. *Polygoni* simplicium medicamentorum, vbi eius vires reddidit his verbis. Polygonum, inquit, vti ad-<sup>Galeno.</sup> strictionem quandam obtinet, ita sanè vincit in eo aqueum frigidum, vt videlicet secundi sit ordinis medicaminum refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertij. Proinde sanè quibus stomachus seruè æstu, foris frigidum illitum prodest: velut etiam erysipelata, & calidas phlegmonas iuuat. Porro tale cum sit, & fluxiones repercatit, & hac ratione videtur esse excitatorium. Quare cum herpetum, tum vlcerum, aliorumq; bonum est remedium: efficacissimum autem inflammationes, & fluxione laborantium partium. Est & cruentorum vulnerum glutinatorium. Sed & aurium vlceribus prodest: & si vel plurimū in sit: pus, hoc tamē etiā desiccatur. Easde ob facultates & profluuium muliebre sistit, & dysenteriam, & sanguinis reiectiones, & vndeunque aliunde immoderatio impercus.<sup>50</sup> Refert Dioscorides, quod & vrinam prouocet exhibitum stillicidio seu stranguria affectis. non tamen affectū exactè discriminat, in quo ipsum dari expediat. Porro mas ad omnia dicta, quam fæmina, validioris est effectus. Herba, quæ Græcis *μαῖον* ἴσπιν, Latinis Polygonū mas vocatur: Arabibus, Basalrahagi: Italīs, Polygonum masehio. & Corregiola: Germanis, Vueggfraz: Hispanis, Corriola: Gallis, Corregiole. Quæ verò Græcè *μαῖον* θῆν, Latine Polygonum fæmina dicitur: Italīs, Polygono fæmina: Germanis, Kantten kraut: Gallis, Corrigiole. vel, Renouée.

Nemica.

† Impressi codices Græci tum Venetiis, tum Babilæ hac malè habent *ἐπιμανήστρα*, hoc est, mitiora, cum legendum sit *ἐπιμανήστρα*, id est, longiora. Hoc præterea loco in iis addendum est *μαλακώστρα*, hoc est, molliora. Huic, & alteri lectioni adspulatur Oribasius, quem secuti videntur interpretes.

## POLYGONATUM. CAP. V.



POLYGONATUM nascitur in montibus, frutice cubito altiore, foliis lauri, latioribus, & laurioribus, sapore mali cotongi, aut punici, cum quadam adstrictione. Flores per singulos foliorum exortus promittit, candidos, foliis numerosiores, incepta à radice supputatione. Radicem habet albam, mollem, longam, crebrè geniculatam, densam, graucolentem, digitum crassitudine æquantem. Quæ vulneribus efficaciter illinitur, quinetiam maculas in facie delet.

POLYGONATUM Hetruscis vulgò Frassinella nominatur. Alij vè ò Italiae populi quasi à Græcis docti. id Ginochietto vulgari sermone appellare, didicerunt, ac si geniculatam radicem dicerent. Mulieres à Polygonati radicibus aquam stillatitiam studiosè conficiunt, quæ ad faciem detergendam, poliendamq; profuocum videntur. Sunt præterea, qui Polygonatum sigillum sanctæ Mariæ, & qui sigillum Salomonis vocitent: verùm ipse quidem harum nomenclationum causam adhuc assequi non posui. Nec desunt etiam, qui asserant, veluti Manardus Ferrariensis, eam plantam Polygonatum esse, quam nomine Secacul describunt Mauritanii. Sed ij haud dubie, meo iudicio, falluntur: siquidem perspicuum est, Serapionem fidelem Dioscoridis interpretem, nullis suis Secacul repræsentare notis, quæ à Dioscoride polygonato tribuuntur. Huic accedit, quòd Serapio eo in loco nunquam Dioscoridè citat,

ut sui moris est in aliis simplicibus medicamentis, quæ ipsi Dioscoridi refert accepta. Illud insuper, si particulatim libeat percurrere, Manardi errorem manifestè deprehendet, quòd Serapio non folia lauri suo reddidit Secacul, sed pisum instat. Neque Polygonatum, & Secacul eisdem viribus polere constat inter authores: quandoquidem illud Græci commendat ad vulnera, & ad maculas in facie delendas. Hoc autem Arabibus laudatur ad proflici feminis vberitatem, & ad venerem conciliandam. Quæ in re nonnulli falsa Manardi opinione ducti, se delusos inuenerunt, qui Polygonati radices saccharo conditas ad venerem excitandam auidissimè deorant, nullo tamen rei successu. De Polygonati viribus differuit Galenus libro v. 1. 11. simplicium medicamentorum, hunc in modum. Polygonatum missam habet tum facultatem, tum qualitatem: habet enim adstrictionis pariter & acrimonie, & amaritudinis quippiam, & indicibilis cuiusdam insuauitatis. Quocirca nec admodum est vsui, sed tantum quòd radicem eius quidam vulneribus illinunt. Sunt etiam qui novos maculasq; in facie illo detergunt. Hæc planta ut Græcè *ἀνδρογύνη*, ita etiam Latine polygonatum nominatur: Italicè, Frassinella, & Ginochietto: Germanicè, Vucifz vurtz: Hispanicè, Frassinella: Gallicè, Genoillet, vel Genoilliere.

Polygonati vires ex Galieno.

Nomina.

## CLEMATIS. CAP. VI.



CLEMATIS humi serpit. lacto, pinguique solo prouenit, viticulas spargens crassitudine iunci, exiguas: folia lauri figura & colore, & multò minor. Eacū caulibus in vino pota alui profluuii, & dysenterias sedant: subdita

in pello cum lacte, & rosaceo aut cyprino, cruciatibus vuluæ medentur: dolores dentium commanducata finit. Imposita serpentium moribus iuuamentum præstat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opitulari. Gignitur in terrenis.

CLE

Polygonati conside-  
ratio.

Manardi  
tractatum.

CLEMATIS AIT. HA. CAP. VII.



Es t et altera Clematis, quæ viticolum emittit ramulum, rubescentem, lentum: folium gustu admodum acre, ac exulcerans. repit per arbores, vt sinilax. Semen tritum pituitam, bilemque detrahit, in aqua aut hydromelite potum. Folia eius illita, lepras purgant. Cum lepidio conditur ad cibos.

*Clematis dum consideratio.* CLEMATIS, quæ primo loco describitur, aliquibus Vinca peruinca dicitur, nobis vulgo appellatur Prouenca, cuius fronde mulieres pueris, ac puellis virginibus, funestas tenent corollas. In hac siquid nullam reperi notam, quæ Clematidi primi generis reclamare videatur. Quamobrem eorum sententiam explodenda putauimus, qui nostratæ Peruinca chamædaphnem esse sibi persuadent, quam vulgo Laureola appellamus. Nam hæc virgas emittit cubitales, singulari stipite à radice exeuntes, rectas, tenues, æqueque semine rotundum, rubens, inter folia residens, quæ facie laurina æmulatur. Porro Clematis, quam secundo loco reddidit Dioscorides, nimirum à prima quæ maxime diffidet. Et sanè, vt ex quibusdā notis, quæ probe ad stipulari videntur, colligi potest, hæc nostris Vitalis vulgo vocatis plurimum facie respondet, quandoquid hæc viticulis exeunt rubentibus, ac lentis: foliis sunt sinilaci similibus, quæ si linquam consulas, & vehementer acra, & exulcerantia deprehendes. Ambius hæc mirè inuoluendo sese sepes, repuntque per arbores non aliter, atque sinilax. quin & earum semine alium efficeret desiccat. Quo fit, vt mihi omnino persuaserim, nostratæ Vitalis esse Clematidē alteram contra eorum opinionem, qui acra Clematidem eam plantam putant esse, quæ nascitur in sepibus, flores proferens candidos, calathi effigie, quos quidam rei herbariæ imperiti Ligustra falso vocant: falso inquam, quoniam Dioscoridi ligustra arbutula est, non herba, vt superius libro primo monuimus. Fuchsius tamen medicus doctissimus nostratē Vitalibā esse Clematidē alteram contra eorum opinionem, qui acra Clematidem eam plantam putant esse, quæ nascitur in sepibus, flores proferens candidos, calathi effigie, quos quidam rei herbariæ imperiti Ligustra falso vocant: falso inquam, quoniam Dioscoridi ligustra arbutula est, non herba, vt superius libro primo monuimus. Fuchsius tamen medicus doctissimus nostratē Vitalibā esse Clematidē alteram contra eorum opinionem, qui acra Clematidem eam plantam putant esse, quæ nascitur in sepibus, flores proferens candidos, calathi effigie, quos quidam rei herbariæ imperiti Ligustra falso vocant: falso inquam, quoniam Dioscoridi ligustra arbutula est, non herba, vt superius libro primo monuimus.

*Fuchsius error.*

purpureū florem promit, facie tamen ab altero diuersum. Cæterum herba, quam quidam FLAMMVLAM.



*Flammula leuistoria, & Gires.*

FLAMMVLAM. FLAMMVLAM dicunt, folijs, floribus, ac semine nihil ab hac clematide differt, quemadmodum nec acerrimo gustu. Attramen neque sepius circūuoluitur, neque arbores scandit, cum recticaulis assurgat. Plures autem hæc ex semine caules bicubitales, subrubentes, & in his folia sinilacis, quibus in tolerabilis inest acrimonia, vnde Flammulæ sibi nomen asciuit. Ex hac ego sepius aquam elicui, demisso vitreo organo in calentis aquæ balneo: quia eadem, qua herba ipsa, pollebat acrimonia. Hæc compertū est efficacissimam esse in morbis frigidissimis. Flammula (vt Platearius est author) excalcatur, siccatque ordine tertio. Sed quod imposita carnem non secus exulceret, ac ignis, calidam ordine quarto rectius crediderim. Sunt qui Flammulam quartanariis edendā præbeant magno (vt ferunt) iuuamento. Alij eius oleū commendat ischiadiciis, articulorū illumque doloribus, vrinæ angustis, & renū calculis, in quibus morbis aut calidū illud inungunt, aut clysteribus infundunt. Id autē præparat hoc modo. Flammulæ folia tenuissimè cōcisa in rosaceū imponūt, quod vitreū vas exceperit, ac inde per asellatē insolent obturato vase. Datur etiā in cibis hisce morbis affectis, triū drachmarū pondere. Sed vt iam ad Clematidū vires reuertamur, de his subiciā, quæ Galen. lib. v. i. simplic. medica. adnotata reliquit. Clematidis folia, inquit, acra & adurentē siue causticā facultatē obtinent, adeo vt & lepras excorrient. Fuerit itaque in quarti ordinis excalcificantū initio. Vocatur autem clematis & daphnoides, quod quidā myrsinoides, alij polygonoides appellatur. Cæterum id nec exulceratorij est, nec acra, sicut quod antedictum est, inōd profluuiis, & dysentericiis cū vino potū prodest, dentitque dolores miasmū mitigat: tū vteri quoque doloribus in pefso admodū, vsui est, tantū abest, vt perinde vratur, ac viceret, ceu illud superius. Sed summè nobis suspiciendus Pamphilus ille, sicut in reliquis nugatur de iis, quæ nunquā vidit, licet ea mandans, sic hæc ambo in vnū confudit. At Dioscorides vtriusque in quarto meminit, & eius quæ simpliciter vocatur Clematoides, idque in fine libri, & alterius, sed in principio. Quamobrem necesse non est, me etiā describere species ambas, sicut nec in alijs feci, hæc Galenus de veris, Clematide.

*Clematidum Gires ex Gale.*

Ex quibus palam est exulcerantis Clematidis caput ab aliquo curioso ex huius quarti libri cales, ubi cōmodē inter aliuū deliciētia medicamēta, sibi locū adinueniat, exemptū fuisse, & hic alteri Clematidi adiunctū ob eam, quam inueniunt habent nominis conuenientia. Prima clematis Græcis *καματίς*, *Asperitidis* appellatur: Latinis, Clematis, & Vinca peruinca: Italis, Clematide prima, & Prouenca: Germanis, Singrien: Hispanis, Peruinqua: Gallis, Peruenche. Secunda verò *καματίς* Græcē: Clematis altera Latinē: Lyncen Germanicē vocatur, Gallicē, Liferon.

Nemina.

## POLEMONIA. CAP. VIII.

POLEMONIA, alij philetariā, Cappadoces chiliodynamin appellant, ramis exilibus, vtrinque pinnatis: foliis paulo quā rutæ maioribus, ac longioribus, calaminthæ, aut sanguinariæ, proximis: quibus in summis velut corymbi pendēt, nigro semine: radice cubitali, albicante, radicula similis. nascitur in montosis, & asperis. Bibitur in vino radix cōtra serpentes, & dysenteriam: & ex aqua aduersus vrinæ difficultatem, & coxendicū crucians. datur ex aceto drachmā pondere lienis. Eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt eum, qui radicem gustauerit, à scorpione non feriri: eūque, si ictus sit, nihil molesti passurum. Dentium dolorem mansa mitigat.

Polemonia confidetur.

CREDO equidē nē iam sepe vidisse Polemoniam in altioribus, & asperioribus vallibus Ananiæ montibus, tenui, & quadrangulari caule, vtrinque pinnato: foliis effigie nepetæ: corymbis quadantenus dependentibus, nigro semine: referens radice prælonga, albicante. Hinc itaq; non facili adducor, vt credam, quemadmodum censet Brasauolus, eam esse Polemoniam, quam nostrum Hetruriz vulgus appellat Lauaneferialij verò Gægam, alij Rutam capriariam nominant. Quandoquidē hæc omnibus fere notis sœnem græcum refert, in cuius ramorum summis cornicula dependent, in quibus semen recluditur subrupeum, non autem corymbi. Radix illi inest brevis. Nascitur læto solo, & plerumque in scrobium marginibus, alijsq; vlginosis locis: non autem in montibus asperis, vbi nasci Polemoniam tradidit Dioscorides. Cæterum Fuchsius lib. 1. de compositione medicæ eam Polemoniā putat esse, quā officinæ Ben albū vocant. Sed ab eo, pace

Fuchsius opinio.

viri eruditissimi, planē dissentio, quodd hoc ramulis non sit vtrinque pinnatis: quodd corymbos nullo proferat, sed siliquam, vel calycem oemoidis modo: quodd denique non solum in montibus, & asperis proveniat, sed vbiq; præsertim in prætis. De Polemonio differens Galenus libro VII. de simplicium medicamentorum facultatibus, sic inquit. Polemonium quidam philetarium, quidam (velut Cappadoces) chiliodynamon: tenuum partium est, & desiccandi vim obtinet. Quamobrem quidam radicem eius cum vino ad ischiadicos, dysenteriam, lienemque induratum potui exhibent. *Πολέμωνιον* sic Græcis, vt etiam Latinis Polemoniū, & Polemonia nominatur.

Polemonia dicitur ex Galeno.

Nemina.

## SYMPHYTUM. CAP. IX.

SYMPHYTUM PETRAEUM.



SYMPHYTON petraeum nascitur in petris, ramis tenuibus, parvis, organo similibus: capitulis, & foliis thymi: lignosum totū, odoratum, gustu dulce, & saluū ciens: longa radice, subrusta, digitali crassitudine.

Decoctū in a-

qua mulsā & potū, pulmonis vitia purgat: sanguinem reiciuntibus, & renu malis ex aqua datur: ad dysenteriam, rubrāque sceminarum profluvia in vino decoctum: ad conuulsa verò & rupta, ex aceto mulsū bibitur. Quin & commanducatum sitim sedat, faucibus asperis subuenit, vulnera recentia, enterocelāque conglutinat, & illitu cohibet. Carnes autem cum symphyto decoctæ coalescunt. Est & alterum symphyton, quod aliqui pepton vocant. id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, vt sonchi inanem: circa quem breui interuacante spatio, folia exeūt angusta, buglosso proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum angulo

## SYMPHYTUM ALTERUM.



gulos quosdam  
liriatos: foliis te-  
nuibus, exala-  
rum sinu pro-  
deuntibus, in  
quibus flores lu-  
tei, & circa cau-  
lem velut ver-  
basci femina e-  
micant. Tam  
caulis, quam fo-  
lia aspera lanu-  
gine horrent, ta-  
ctuque pruritu  
concitant. Ra-  
dices demittuntur foris nigrae, intus  
candidae, viscosae. quarum est usus. Tri-  
tae, & potae cruentis excreationibus,  
ruptisque proficiunt: recentia vulnera  
illatae conglutinant. carnes quoque si  
concoquantur, cogunt additae. Inflam-  
mationibus praesertim sedis, cum fene-  
cionis foliis, vtiliter illinuntur.

10  
20

CONSOLIDIDA  
MINOR.CONSOLIDIDA  
MEDIA.

qua officinae con-  
solidam, & *Quorundam  
erroris.*  
Solidaginem mi-  
norem vocant. Si-  
quidem eam nihil  
prorsus Symphyti  
petraei notis res-  
pondere, omnibus  
rei herbariae etiam  
mediocriter gearis  
evidens est, quae  
ut à me indicari  
deceat. Neque etiā  
statuendum censeo  
idem Symphytum  
esse eamaliā her-  
bam, cujus folia  
aurea parte pur-  
pureascent, quae ab  
herbariis vulgo

*Solidagi-  
nis mino-  
ris.* *Consolida  
media nuncupatur,  
ab aliquibus vero  
Laurentina, & à dia Vires.*

Senesibus Moran-  
dola. Harum mo-  
do dictarum stir-  
pium est usquequā,  
quod hactenus in-  
venierim, memine-  
rint Graeci, aut  
Mauritani, ex ta-  
men mirū in mo-  
dum prodesse exil-  
limantur distri-  
ptis, fractisque; in-  
ternis, & externis  
corporis partibus.  
Idcirco vtiliter dā-  
tur potandae ab  
alto deuolutis, ac  
etiam iis, qui in-  
terna, intestinae  
vulnera accepe-  
runt: namque illa, sint vel exterius, vel in-  
terius illata, mirifice sanant. Tradiere non-  
nulli, qui reum experimenta profectur,  
Consolidam median vocatam potu sangui-  
nis grumos in ventriculo, vel in alia corpo-  
ris parte concretos dissolvere, & dissolvere.  
Illata verò folia, vel eorum succum efficacē me-  
dicamentum esse praedicant viceribus omni-  
bus in ore manantibus, excedentibusque, ac etiam  
testium, pudendorumque; virilium, & mulierum.  
His omnibus fluctantibus ea quoque praestita  
est, quam Solidaginem minorem vocant, ut  
quidam existimant. Etenim ubi vulnera guri-  
nare, adstringere, & reprimere sit opus, mi-  
norem vsurpant, quam etiam aliter longe  
praestantiorum esse sepe numero compertum  
est. Recensetur praeterea Germanis inter Sym-  
phyti genera quaedam ipsius vulgaris herba, quam

*Symphytum  
runt consi.*  
QUANTIS in nostris commentariis, quos  
multo ante tempore Italicè conscriptos edi-  
dimus, ingenuè confessus essem, me non antea  
aduenisse Symphytum primi generis petraeum  
cognominatum; id tamen postea reperi mense  
Septembri suis floribus emicans, longè à Gori-  
tia circiter viginti millia passuum, in laterē ma-  
gni montis Vipaci paulo supra arcem, ac deinde  
in aliis ipsius montis partibus, aliisque Iapidiae  
locis, praesertim eo tractu, qui vulgo Sciauis  
dicitur Gabernich, quin & in monte illo eius-  
dem tractus, quem vocant Sancti Urbani, nul-  
lis prorsus deficientibus notis, quae illi à Dio-  
scoride tribuuntur. Est profecto planta, praeser-  
tim ubi floruerit, visu iucundissima, ita ut ma-  
xima cum voluptate ad se videndum viatorum  
oculos salliciat, argumento quidem quòd etiam  
viribus polleat insignibus. Porro Symphytum  
alterum, quod secundo loco reddidit Diosco-  
rides, nulli dubium est, quin ea sit herba, quae  
hodie passim Consolida maior nominatur, quae  
etiam nonnulli herbariorum Alum falso appel-  
lant. Quippe quod eius notae singulae Diosco-  
ridis historiae ad vnguem haerere deprehendan-  
tur. Hae frequentissima nascitur in pratis,  
floribus non modo luteis, ut Dioscorides in-  
quit; sed & candidis, & purpureis, eadem sine  
facie, ac forma. Ceterum hallucinantur, meo  
quidem iudicio, qui Symphytum petraeum pu-  
tant eam esse plantam nullis non cognitam,

03

40

50

## SANICVLAR GENVS.

*Sanicula  
Sui generis.*



*Sanicula  
aliud ge-  
nus.*

ostendunt genera. quorum vnum, quod aliquibus herbariis Auricula vrsi nominatur, folia fert plantaginis magnitudine, sed crassiora, veluti fabariz vulgo vocatz, laciniijs circum magno artificio factis a natura, colore in album flauescente. Id genus copiosè nascitur in agro Goritienfi monte Saluatino. Hoc ceteris præferunt ad enterocelas, & thoracis vulnera, si quotidie in potu sumatur: quin & ad alia vulnera, tam incus sumptum, quam exterius illitum. His aliam denique annumerant Solidaginem, quam vulgus medicorum Consolidam regalem, & ipsi sua vulgari lingua Ritterstorn vocant, quod sonat nobis Sperone da caualiere, & Latinis equitis calcar. Huic sunt caules cubiti altitudinis: folia oblonga, tenuia: flores planè purpurei, magnitudine violæ: è quorum basi corniculum eminet, antiqui calcaris effigie, vnde illi à Germanis inditum est nomen. Laudantur flores ad rubentes, & inflammatos oculos triti, & aqua rosacea illiti. Herba auxiliatur ardoribus, tussi, inflammationibus, venenis, vomitionibus, biliosis affectibus, suppressæ vrinæ, calculosis, ischiadicisq; quin & alium citat. Verùm hoc Solidaginis genus magis, quantum equidem reor, Cuminum syluestre, quod à Dioscoride secundo loco describitur, repræsentat, quam aliam quamuis plantam, vt superius in Cumini conmentatione diximus. Meminit vtriusq; Symphyti Galenus libro v 111. de simplicium medicamentorum facultatibus, vbi ita scriptum reliquit. Symphytum petraeum ex contrariis constat viribus: habet enim incidendi vim quampiam, qua collectum in thorace, & pulmone pus expurgare potest. Habet etiam quandam contrahendi vim, qua ciedionibus sanguinis auxiliatur, & tertia ad eas inest humiditas quedà non immodice calida, per quam gustantibus dulce apparet, & odoratu iucundum. Commenducatum situm extinguit, & arterie asperitates sanat.

*Symphyti  
Sui generis  
Sic et ex  
Galeno.*

appellant. Exit hæc foliis pentaphylli maioribus: radice candida, tam miro naturæ ipsius artificio nodulis, ac lacinijis quibusdam elaborata, vt non parum admirentur, qui tantum naturæ opus diligenter intuentur. His vtuntur in potionibus ad enterocelas, & ad interna vulnera, præsertim ad ea, quæ in thoracis cautatem penetrauerint. Plura insuper Saniculæ

Porro secundum omnium dictarum virium missionem simul digerere abunde potest, simulq; corpora contrahere, & constringere. proinde enterocelis imponitur, & ad conuulsa, & rupta cum oxymelite bibitur. Porro qui ipsum in vino decoctum ad dysenteriam, & rubrum profluuium exhibent, vtuntur tanquam desiccante, & contrahente. Qui verò ad nephritin renumve dolorem, tanquam expurgante, & incidente. Symphytum verò alterum, puta magnum, similem dicto vim habet: non tamen gustantibus dulce est, nec odorantibus odoratum. Sed his sanè à modò scripto diuersum est. Cæterum quatenus viscositatem quandam, & mordacitatem obtinet, scillæ simile est. Vtuntur eo ad omnia, ad quæ iam dicto. Quod *symphytum petraeum* Græci, pariter Latini Symphytum petraeum, & Itali, Simphio petreo vocant. Quod verò *symphytum vrsi* Græci, Symphytum alterum Latini appellant: Itali, Consolida maggiore: Germani, Vual vurtz: Hispani, Suelda maior, & Confusida maior: Galli, Oreille d'asne, Consyre, vel Consoilde.

*Memina.*

† Ne quis commoueat, quòd nos hic folia adiecimus præter Ruellij, & Marcelli interpretationem. Id enim ea ratione fecimus, quoniam in Aldino codice hoc loco *symphytum* hoc est, folia habetur. Tum verò quia folia thymi pulchre illi herbæ quadrant, quam verum Symphytum petraeum censemus.

† Illud præterea hoc in loco adnotandum est, quòd vbi communis lectio habet *symphytum*, hoc est, folia quam procuans, in Oribasio legitur *symphytum*, quod est adstringens.

## HOLOSTIVM. CAP. X.

<sup>40</sup> HOLOSTIVM quadrantalıs herba est pusilla, tribus quatuorve digitis supereminens extra terram: folijs, viticulisque coronopo, aut graminı proximis, gustu adstringentibus: radice alba: prætenui vsque in capillamenti speciem, longitudine quatuor digitorum. nascitur in collibus terrenis. Vfus eius ad rupta in vino pota: nam & carnes coguntur decoctionibus addita.

<sup>50</sup> HOLOSTIVM etsi à nemine, quod equidem sciam, cognoscatur in Italia; tam tamen plantam illi consimilem esse crediderim, quam libro secundo in Coronopi mentione à Goritensibus ideo Serpentinam vulgò vocari diximus, quòd mirum in modum serpentinum moribus optulerit. Hæc siquidem herba est exigua, humi procumbens, quæ folijs, cauliculisq; coronopi modo exit, guttu adstringentibus: radice tenui, lignosâ. Nascitur ipsa quoque in collibus, ac etiam fabulosis locis. Ex his vtriq; quispiam facillè posset hanc herbulâ pro holostio

*Holostij  
considera-  
tio.*



fio habere : quanuis hoc ego pro certo affirmare non aſum. Recenſetur Hoſoleſtium inter ſymphyti genera. Sed hallucinantur haud dubie qui credunt eam herbam eſſe Hoſoleſtium, quam Pilofellam herbariorum vulgus appellat. nam quanquam Pilofella dicta frequens naſcitur in collibus, folia tamen edie oleæ proxima, albicantibus pilis horrida, vnde illi nomen. Iſdem veſtiuntur pilis & cauſes, qui humi ſerpunt, ac reptant, è quibus poſtea prodeunt flores aureo colore. Radicibus nitiuntur breuibus, & tenuibus. Sed hæc eius delineatio nihili proſul Hoſoleſtium competere videtur. **PILOSELLA** & plura ſunt genera. quorum vnum naſcitur inter ſaxa Saluatio monte in comitatu Goritiensium : foliis in terram ſparſis, longis, echij inſtar, pilis innumeris, lanugineq; obductis:

*Quorumda error.*

*Pilofella deſcriptio. ES Veres.*

**PILOSELLA.**



caule duum palmorum longitudine: flore cyani ſimilitudine, maiore tamen. Præſtat hæc planta ad vulnera glutinanda: quinetiam ad enterocelas, tam ſilita, quam pota. Hanc nobis Pilofellam, maiorem licet appellare, quando nondum conſitet, an veteribus Græcis, aut Latinis cognita fuerit, à quibus nomen mutuari poſſimus. Tota Pilofellæ planta vehementer adſtringit: quapropter huius rei non ignari paſtores maxime cauent, ne ouium greges in illis paſcuis immorentur, vbi huiusce plurimum gignitur. Quandoquidem depaſcentes oues tanta alui adſtrictione afficiuntur, vt inde facile emoriantur. Hinc didicerunt medici, eam mederi dyſentericis, & vteri profluuiis: quin & vulnera glutinare tam ſcilicet exterius, quam interior ſilita, colicisq; magno eſſe auxilio, & bilioſis vomitionibus: cruentis item ſputis, enterocelis, & omnibus in vniuerſam fracturis opè ferre, ſed præcipue caluſiæ. Cæterum vt ad Hoſoleſtium noſtra redeat oratio, ingenuè fateor nullam hæc plantam ſe mihi obruliſſe, quæ magis Hoſoleſtium reſerat, quam ea, quæ Serpentina, vt diximus, à Goritiensibus vulgò **Holeſtj** vocatur. Hoſoleſtium (vt author eſt Galenus *res ex Gal. libro v l i ſimplicium medicamentorum*) deſiccandi vim habet cū adſtrictione: quam obrem ipſum ad rupta potui exhibere. Quod Græci *ἀλγίστη*, Latini item Hoſoleſtium, & Hoſoleſtium dicunt: Itali, Hoſoleſt.

*Nomina.*

**STOEBE. CAP. XI.**

**STOEBE** vulgaris eſt notiæ. Cuius ſemen, & folia ſtringunt. quapropter decoctum dyſentericis inſunditur: auribus quoque purulentis inſtillatur. Il lora folia oculis ab icſtu cruentis proſunt, & erumpentis ſanguinis impetus cohibent.

**SCABIOSA.**

**STOEBE** *Stoebe cōsideratio.*

Dioscoridis tempore omnibus vulgò cognitam fuiſſe, illud maximo argumento eſt, quòd eam nullis proſulis notis repræſentauerit. Hinc certe nobis faciliſſimè negotium, quò minus ſciſe poſſimus quænam ſit illa inter tot plantas, cuius nomina, & facultates ignorantur. Plinius libro x x l. cap. x v. Stœben inter aculeatas herbas reſeruit (id quòd à Theophrasto lib.



v l. cap. l i l i. de plantarum hiſtoria mutatus eſt) ſic iniquens. Quædam ſunt herbæ, quæ ſpinas in folio habent, & in caule, vt phleoes, quòd aliqui Stœben appellauerunt. Idem lib. x x l. cap. x l. Stœbe, inquit, quam aliqui phleon vocant, decocta in vino præcipue auribus purulentis medetur: item oculis icſtu cruentatis: hæmorrhoidi quoq; & dyſenteria inſuſa. hæc Plinius. Ex quibus equidem verbis planè aſſerere aſum, Phleon, & Stœben eandem plantam eſſe. Hanc in Orchomeno lacu naſci ſemine placentaceo, & molli, colore rubido, author eſt Theophrasto lib. l i l i. cap. x l. de plantarum hiſtoria. Hinc itaque Matthei Syluatici error manifeſtè deprehenditur, qui in ſuis pandectis Stœben eam herbã interpretatur, quam vulgò Scabioſam nominat. cuius, quòd ſciã, nec Græci, nec Mauritanii meminerunt. Quæquam nò de ſunt, qui Scabioſam eã eſſe contendunt, quæ ab Aetio vocatur Mora: quæ tamen in nomine tantum expreſſit, nulla adiecta deſcriptione, ex qua aliquid certi conſtitui poſſit. Cæterum Scabioſam vocatam non eſſe Stœben illud abunde offendit, quòd hæc ſolis conſtet laciniatis, ſubhiſſus: cauibus tenuibus, cubitali altitudine, atque etiam maiore: in quorum cacumine flores emicant in cæruleo albicantes: & in pratis, & campeſtribus proueniat. At Stœbe folia fert aculeata, & in lacubus, ſtagnis paludibus, aliſq; locis aquoſis naſcitur. Vnde Ariſtophanes comicus

*Matthei Syluatici error.*

micus recte in comœdia ranas inter se loquentes adducit, quæ admodum lætabantur, quòd tota consumpsissent diè inter cyperũ, & phleum saltantes. Sed quoniam nusquam reperio veteres SCABIOSÆ meminisse, ne à nobis quoque silentio prætermissa in posterum deperdatur, hic eius facultates explicabo. Pollet in primis hæc aduersus scabiem, unde illi nomen: in quem vsũ non modò eius decoctum quotidie potandum præcipiunt, sed & herbæ ipsũ succo, per se, aut in vnguentis addito, scabiosa corpora illinunt. Prodest omnibus pectoris vitis, & respirationi inferuentibus organis: quippe quæ & eorum inflammationes purulentas disiciat, & omnia pectoris excrementa expurget. Anthracibus, siue Carbunculis pestiferis vtiliter illinuntur: adde vitilita hos lethales abscessus trium horarum spatio prorsus abolere existimetur. Sed iam ad Stœbes vires redeamus, de quibus Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, disseruit his verbis. Stœbes tractus, & folia maximo sunt vsui, adstringendi vim habentia mordacitatis experient. Sed & desiccant euidenter in tertio ferè ordine incipient. Quamobrem decoctum eorum dysentericis iniicitur, & anribus pure fluentibus, tum vulnera magna conglutinat. Euidētius hæc præstat cum vino atro austero: valenter enim desiccant omnes præter naturam humiditates. Præterea folia viridia, si illinantur, vim habent erumpentis sanguinis suppressendi: denique & oculorum ex icthi suscitantes illicia iuuant. Quæ planta *sic* Græcis, similiter Stœbe Latinis, & Stœbæ Italica appellatur.

## CLYMENVM. CAP. XII.

CLYMENVM caulem fert fabæ, quæ dratum: folia plantaginis: folliculis supra caulem fescinflexis, vt in Iride & polyporum cirris. Probatissimum est è montibus. E frutice toto cum radice succo exprimitur: qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est: cœliacos, rubrâque scæminarum profusio, refrigerando infrinat: sanguinem naribus erumpentem suppressit. Trita folia, aut siliquæ recentibus vulneribus inpositæ, ea ad cicatricem perducunt.

*Clymeni* SI CAVLES, itemq; flores herbæ, quæ Saponaria vulgò vocatur, Clymeni delineationi responderent, quemadmodum folia illi quadrare videntur, quippe quæ plantagini profusus referant imaginem, cum Ruellio vique sentirent, fatereretur; Saponariam legitimum esse Clymenon. At certè neq; caulis, quem rotundum profert, & per intervalla genticulatum, neq; flores illi quicquam aditipulari deprehenduntur.

Quamobrem quænam herba Clymenum in Italia hodie referat, hæcenus non satis compertum habeo. Hanc (vt Plinius memoriæ prodidit libro. X. V. cap. VI.) inuenit rex Clymenus, unde & nomen herbæ. Quo in loco idem Plinius clymeno perperam illa omnia reddidit, quæ Dioscorides periclymeno assignauit. Huius nusquam, quod inuenierim, meminisse Galenus, sicut nec post ipsum Paulus. Planta hæc *indigetur* Græcè, quemadmodum & Latine Clymenum dicitur.

Nominis.

## PERICLYMENVM. CAP. XIII.



## PERICLYME

NON simplex fruticat, ex interuallicis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcàdida, hederacea: inter folia surculi exeunt, in quibus baccæ hederæ similes: flos fabæ, candidus, aliquantulum rotundus, & quasi

in folium procumbens: semen durum, & quod difficilè euellatur: radice rotunda, crassa. Nascitur in aruis, ac sepibus, conuoluens se ad miniculis propter assidentibus. Semē eius postquam ematuruit collectum, & in vmbra sicca tum, si drachmæ pondere detur in vino, quadragenis diebus, lientem assumit, lassitudinem discutit: sed urinam ciet, statim à sexto die cruentam. orthopnœæ, & singultui prodest: patrum accelerat. Folia sunt eisdem viribus prædita: quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatē facere produntur: perunctis ex oleo, febrium algores abigunt.

SUNT qui Periclymenum perperam Capri folium appellent: officinæ Matrisylvam vocant: nos verò, quòd propinquas vinciat plantam, vulgò appellamus Vincibosco. Ceterum id potissimum nos ad credendum impellit, vulgatam Matrisylvam esse Periclymenon, quòd non solum omnes huiusce rearis rei herbarie peritissimos in hanc sententiam deuenisse comperimus,

*Periclymeno*  
*ni conside*  
*ratio*

pererim: sed quòd etiam ex notis, quas illi reddidit Dioscorides, ita esse cognouerim. Quandoquidem Matrifylua vnico tantum caule fruticat, qui ex interuallis gemina tantum folia mittit, ipsum amplectentia, subcandida, hederaceaque. Flos ei fabæ non dissimilis, candidus, cum adoleuerit, in folium procumbens. Semen hederaceum, prædurum, & quod difficile euellitur, in furculis quibusdam cònexum, qui inter folia erumpunt. Constat præterea eius caulem, qui ab radice simplex assurgit, arbusculis, & fruticibus mirè sese conuoluere, ubi in sepibus, & fruticulis nascitur, adeò vt sæpe tam pertinaciter inhaereat, ligetque adminicula, vt in ea manifestum imprimar vestigium: vnde à nobis merito Vincibosco dicitur. Porro planè, mea quidem sententia, hallucinantur, qui Caprifolium, & Matrifyluam seu Periclymenum idem esse existimant: in quorum numero esse deprehenduntur Ruellius, & Fuchsius, alioqui viri doctissimi. In hunc autem lapsum hos fortasse deduxit Matthæus Syluaticus pandectarum author. Siquidem is suum Caprifolium Matrifyluam nominat, eam tamen, vt subinde iocimur, nil aliud Syriatico Caprifolium fuerit, quam Dioscoridi pyxacantha, seu lycium, non autem periclymenum, de quo seorsum sub titulo Matrifylus Syluaticus ipse disseruit. Quod fortè non animaduertentes iur, Caprifolium, & Periclymenum idem esse putarunt. Cæterum

Matrifylua in eorum vnguentorum vsum venit, quæ ad capitis vulnera parantur. Nanque hac in re efficacissimum est medicamentum. quanuis è veteribus neminem hæcenus inuenerim, qui Periclymenon ea vi pollere, memoriz prodiderit. Hanc etiam herbam commendauit Ioannes de Vigo clarissimus chirurgicus, ad erurum vlcera, quòd etiam ad hoc (vt ipse inquit) vtile esse tradiderit Galenus libro 10 v 111. simplicium medicamentorum. Veruntamen id non legitur in meo Galeno: nam loco citato Galenus de Periclymeno ita scriptum reliquit. Periclymeni tum fructus vtilis est, tum folia, adeò vehementer incidentis, simul & excoctiscentis facultatis, vt si plustulum bibantur, vrinam sanguinolentam efficiant: principio quidem vrinam tantum mouent: porro foris cum oleo illita excoctant. Iuuant & lienosos, & difficulter spirantes. Competens portio mensura est, drachmæ vnus pondus cum vino. Porro desiccatur quoque semen. Et quidam aiunt, si copiosius bibatur, sterilitatem omnino bibentibus afferre. Sed & sunt qui certum dierum numerum ad talem potionem præstint, vt Dioscorides, qui septem & triginta eos tradi refert. Hic etiam vrinam eruentem reddi à sexto die memorat. Planta, quæ Græcis *περικλυσ* *periklysus*, Latinis quoque Periclymenum dicitur: Italis, Matrifylua: Germanis, Geißblatt: Hispanis, Madrefylua: Gallis, Cheurefueil.

*Periclymenon  
nuncius ex  
Galeno.*

*Nomen.*

## TRIBVLVS TERRESTRIS.



TRIBVLVS. CAP. XIII.

TRIBULI genus vnum terrestre, foliis ad effigiem portulacæ, tenuioribus: viticulis ¶ in terra stratis: spinis secundum folia rigidis, præduris. iuxta amnes, & rudera nascitur. Est & alterum genus, aquis familiare, quod in flu-

## TRIBVLVS AQUATICVS.



minibus natum comam exerie, aculeo condens: foliis latis, & pediculo longo: caule parte summa, quam ima crassiori: ad sunt ei & capillamenta quædam spicacea: semen durum, ab altero non abhorrens. Vterque refrigerantis, & inspissantis est nature: ideo inflammationes omnes cataplasmate adiu-

uat. vlcera in ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillâsque perlanat. Succus ex his colligitur ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestris tribuli pota, illitave, ictos à vi pera recreat: contra venena cum vino aptissimè bibitur. decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnem habitant, virenti tribulo equos saginant: & è dulci semine & escu lento panem, quo vescuntur, faciunt.

*Tribuli cō  
sideratio.*

Er s i vnum duntaxat, Tribuli terrestris genus descripsit Dioscorides, duo tamen eius genera à Theophrasto redduntur libro v i. capite v. de plantarum historia, his verbis. Tribulo peculiare est, vt fructum gerat aculeatum. Eius duo sunt genera: vni solum effe ciceris, alteri aculeatum. Vtrunque terrestre, & furculosum: serius germinat, cui in foliis sunt aculei, magisq; hoc apud septa villarum erumpit. Semen præcoci sēsām figura cernitur: alteri, hoc est ferotino, rotundum, nigrum, siliquis inclusum. Hæc duo terrestris genera Theophrasto. Tribulum, cui folia portulacæ Dioscorides assignavit, memini me vidisse Venetiis in maris litore propè diui Nicolai sacellum. At hunc, cuius hic figuram exprompsimus, Pisis misit ad me Lucas Ghinus Forocorneliensis medicus rei herbariæ peritissimus. Ruellius Tribulum aculeatum Theophrasti eam plantam esse arbitrat, quam Hetrusci vulgò vocant Cacatreppola, ea fortasse ratione ductus, quòd prope torrentium, & fluminum ripas proveniat. Verùm cum lateat nos foliorum effigies, quæ à Theophrasto illi tribulo non redditur, æque etiam consier hanc plantam furculos non mittere, neque siliquam ferre, in qua intus claudatur semen, cogor omnino à Ruellio dissentire. Non frates seplasiarj huius radices melle, & saccharo condunt, eryngij eas esse existimantes. Qua in re haud dubitè illi falluntur, vt superiori libro in eryngio ostendimus. Sed ad Tribulos redeamus. Aquaticum genus in plerisque Italiae fluminibus, & lacubus provenit, præsertim in agro Mantuano, & Ferrariensi: neque solum in dulcibus aquis gignitur, sed etiam in mari. Hos tribulos Venetiis in foro vendunt, quos marinos appellant, vt qui in lacunis illis vicinis enati inveniuntur. Ex his porò cui peregrè proficiscuntur, verticillos faciunt, quibus suas preces enumerant, collòque gestant, vt maiorem præ se ferant religionem, ne dicam hypocrisim. Nonnulli fructu, qui castaneis refert similitudinem, sub cineribus calidis cocto, non secus, atque illis pro bellariis vescuntur. Tribuli vtriusque facultates perstrinxit Galenus libro v i i. simplicium medicamentorum, vbi sic inquit.

Tribulus ex humida esēcia modicè frigida, & sicca non mediocriter & ipsa frigida componitur. In terrestri tamen superat terreum frigidum, quòd & adstringens offendimus: in aquatico verò aequum. Propter vtrunque itaque & contra phlegmonarum generationes, & omnino contra omnes influxus congruit. Porò terrestris fructus cum tenuium sit parcius, potus lapides in renibus comminuit. *Tribulus terrestris* *Nomina.*  
sic Greci à Tribulus terrestris Latinis dicitur: Italis, Tribolo terrestre. *Tribulus terrestris* Græcè, Tribulus aquaticus Latinè vocatur: Italicè, Tribolo aquatico: Arabicè simpliciter tribulus Hasch, seu Haserk appellatur: Hispanicè, Abrojos, & abrolhos, Gallicè Saligors, Escharbotts, chatagnes d'eau.

† Hoc in loco ita equidem legunt vulgata Græca exemplaria, sed Oribasius libro x i i. itemque vetustissimos Dioscoridis codex habent *manis*, qua voce Tribulum terrestris viticulis longis repræsentant. Id quòd etiam satis plantæ pictura demonstrat.

SAXIFRAGA.

CAP. XV.



† SAXIFRAGA non aliqui far xiphragon, alij empetron, Romani saxifragā vocant. frutex est furculosus, in petris, & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino, mox potus, febricitantibus opitulatur: stranguriæ prodest, singulatum sedat, calculos vesicæ frangit, & vrinam ciet.

LIC ET omnibus huius ætatis rei herbariæ petitis satis superque persuasum esse non ignorem, hoc Saxifragæ caput Dioscoridi illegitimum esse, quòd Latina nomenclatura contra scriptoris morem Græcè proferatur, tamè cum in omnibus ferè Græcis exemplaribus habeatur, id mihi quoque dissimulandum non putavi: eaque maximè ratione, quòd eam plantam habet, nouitque Italia, cuius vsus præcipue expectatur ad renem, & vesicæ calculos comminuendos, ad vrinam remoracandam ciendam. Ea in Hetruria pluribus locis è durissimis erumpit saxis, foliis capillaribus, epithymo non dissimilibus, præsertim Argentario promontorio in maritimis nostris. Invenitur quinquè in agro Gorticiensi

*Saxifragæ consilium  
ratio.*

*Ruellior.  
ror.*

Goritiensis quibusdam saxis enascens, iuxta Sontij fluminis ripam; quâ Saliceno rure itur Canelum. Sed aliquis fortasse obiciet, hanc plantam non esse legitimum Saxiphragon hoc loco descriptum, quod ea nullis ferè notis epithymum repræsentet. Neque id quidem temere obicietur: etenim non video ego, quomodo Saxiphragon rectè epithymo assimilari possit, quod illud frutex sit furculosus, hoc autem tantum abste a frutice furculoso, ut videatur potius esse quoddam capillamentum. Ideo facile adductus sum, ut suspicer codicem hoc in loco depravatam esse: aut Saxiphragon frutex erit, qui foliis duntaxat epithymum æmuletur, ut illa folia satis ostendunt, quæ in hac planta, cuius imaginem hic expressimus, capillorum instar tenuissima conspiciuntur. Cæterum sunt & alia herbarum genera, quæ sub Saxifragæ nomenclatione vulgaribus demonstrantur, nempe Trichomanes, Adiantum, Asplenium, Filipendula, Massiliense fœli, Pimpinella quæ hircum redolet, & alia plures herbæ: quæ ideo Saxifragæ nomine insigniuntur, quod omnes urinam ciant, & calculos frangant pellantq. Est porro alia quoque planta Germanis herbariis

notissima, quam Saxifragam albam cognominant. Prouenit hæc mensè maio saxosis, arenosis, alperis, siccantibusq; locis: foliis humi procumbentibus, exiguis, rotundis, in ambitu serratis, vulgaris terrestris hedere modo, pinguioribus tamen, & mollioribus. Caulem proster tennem, iunci modo, hirsutum, cubitalem: in cuius acumine flores prodeunt albi, candidis violis non absimiles, qui mensè tanto absque semine decidunt. Radix huic exilis, granulis quibusdam coherens, coriandri magnitudine, quæ partim albicant, partim verò rufescunt, & pro semine serantur, amaro gustu. Folia cum radice in vino decocta urinam cient, renum, & vesicæ calculos pellunt. Idem præstant & granula, quæ radicibus adherent, si tusa deuorentur. Planta, quæ Græcis *σαξίφραγος*, & *σαξίφραγος*. Latinis Saxifraga, & Italis Salsifragia nominatur, Gallis verò Perce pierre.

Qui postremo impressi sunt Græci Dioscoridis codices non hic, sed in fine separatim scriptum habent hoc caput de Saxifraga, inter ea relatum, quæ in hoc authore adscritta censerunt. Hoc dictū sit, ut omnibus constet illud non solum Latine, sed etiam Græcè scriptū reperiri.

Nomina.

Saxifraga  
alba.Saxifraga  
alba.LIMONIUM.  
CAP. XVI.

LIMONIUM folia habet betæ, tēnuiora, & longiora, decem, & sæpe plura: caulem tenuē, rectum, lilio æqualē, feminibus rubris seentem, quæ gusta ta adstringunt. Semen tritum, & ex vino acetabuli mensura potum, dysente ricis, cœli acisque prodest: rubra femininarum profluvia sistit. Nascitur in pratis, & palustribus.



LIMONIUM ALIUD.

PROVENIT Limonium, nullis profus 50 reclamantibus notis, innumbris ferè plantis in paludibus, quæ Timavi fontibus irrigantur, ac etiam Tergentino tractu. Hanc autem plantam seplaxi falsò Behen rubrum appellant, quam si quis diligenter expendit, eam, ni fallor, inueniet omnibus notis Limonio adscriptari: unde cogetur fateri aut hanc verum Limonium esse, aut saltem eius genus. Siquidem herba est (ut imaginem duæ, quas hic damus, aperte demonstrant) foliis betæ, tenuioribus, & longioribus, decem, sæpe pluribus: caulibus item tenuibus, in quibus semen rubrum, quod gustatum adstringit. Præterea in pratis, præsertim vligino

viliginosis, & palustribus prouenit. Addā etiam quod experimento compertum est. Behen hoc adulterinum præditum esse facultatibus & viribus, quas Limonio reddiderunt Dioscorides & Galenus. Quare non temere me facturum putauī, si pro vero Limonio hic eas plantas depicias exhiberem, quæ in officinis Behen rubri nomen perpetim acceperunt: quod iam mihi persuasum sit (vt in glandis vnguentariæ commetatione dicitur) eas planè Behen illud ementiri, de quo à Mauritanis mentio facta est. Plinius libro x. c. ap. v. 111. Limonium syluestrem betam vocari tradit. Sed huius, vt in beta notauimus, refragatur Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus, vbi se nullam inquam syluestrem betam nouisse scribit: nisi quis pro ea rumicem accipiat. Atque adeo hinc colligamus licet, Limonium esse per se genus herbarum. Limonii vires memorat, prædicit Galenus libro v. 11. simplicium medicamentorum, sic inquires. Limonii semen vt pote austerum, colicis, dysentericis, & sanguinem spuentibus cum vino exhibent. Iuuat & profluuium muliebri. Satis autem est acerbuli mēsurā. Quod Græci *καυλός* Latini item Limonium dicunt: Itali, Limonio.

LAGOPUS. CAP. XVII.

LAGOPUS herba siliat aluum in vino pota: aut in febris, ex aqua. Eadem inguini alligatur in inflammatione. Nascitur in fegetibus.

Lagopi siliat.

CARYOPHYLLATA.

Synonyma  
opuntia ex  
posita



Synonyma  
opuntia ex  
posita

Caryophyllata vires.

SANE tam paucis Lagopus perstrinxit Dioscorides: utpote qui ne vilius quidem eius imaginis notam designauit, vt arduum æque, atque difficile sit asserere, quam statuendus sit in tam ingenti plantarū multitudine, quarum nulla apud homines extat cognitio. Ceterum Matthæus Syluaticus parū recte, meo quidem iudicio, tradidit Lagopū eam esse herbam, quam

herbariorum vulgus Caryophyllatam appellat: quandoquidem hæc non gignitur in fegetibus, sed in montibus, & in viis iuxta septa. quod mirum in modū sepius opacari gaudeat. De hac veteres, quod sciam, nihil memorat prodiderunt. Nisi fortasse fuerit Gemā Plinio descriptum lib. x. c. ap. v. 11. cap. v. 11. cui radicles reddidit tēnues, nigras, & bene olēct. Porro cā-

RYOPHYLLATA planta est non vulgaris, neque viribus inefficax, argumento quod eius radices manifestum caryophylli spirent odorem. Ea recentiores vtuntur pota ad thoracis internā vulnera. Quin & eius succum, adusta rugine, cuniculosi, & consumacibus viceribus vtiliter iniiciunt. Eadē olfactu spiritus recreat, & frigidum roborat cerebrum. Epota prodest colicis, dysentericis, fæminarum profluuiis, & cruenta expuentibus. Tam intus sumpta, quam foris illita enterocelis auxilio est. Temperamentum ei exalfaciens, & exicans, vt manifestum. Indicio eius radices: quippe quæ gustu odoratæ, adstringētisq; deprehenduntur. Quibus qualitatibus non modò attenuare, discutere, & adstringere valent, sed etiam roborare. Sed, vt ad nostrum institutum reuertamur. Germanorum vulgus Lagopus appellat herbam, quæ folia habet trifolio similia, oblongum caulem tenuem, rotundum, hirsutumq;: semen in paniculis paruis, mucosis, lanuginosisq;: cui non obscura adstringendi vis inest. Proinde sunt & Germanis, qui ea vtantur ad detergendam sedē in dysenteria. Nasitur hæc quidem in fegetibus. verū an ea legitima sit Lagopus non ausim affirmare: nullus enim, quod sciam, Lagopi faciem repræsentauit. Lagopi vires scriptas reliquit Galenus lib. v. 11. simp. medic. res ex Galeno. paucissimis verbis. Lagopus facultatis est deficcantis, adeo vt fluxus alui probè exiceat. Huius plantæ nomen Græcum est *καυλός*, pariter & Latinum Lagopus.

Lagopi vires ex Galeno.

Nominat.

MEDIUM. CAP. XVIII.

MEDIUM in faxis, & opacis nascitur. folia habet iridis: caulem tricubitalem, & in eo florem grandem, purpureum, rotundum: semine enici, minuto: radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinam, & ex melle decocta, rubros menses fæminarū siliat, eclegmate per aliquod dies sumpto. Semen in vino potum, mēstrua pellit.

MEDIUM in Media distaxat nasci quibusdam proditum est. Quod si ita feres haberet, mirum profectò non esset, si non proueniret in Italia, vbi ipsum hæcenus facere me non reperisse, aut vidisse. Sunt qui eius folia intubo similia faciant, non autem iridi, vt communis habet lectio, quibus etiā Orribatius adimplatur. Et certè facilius potuit esse librorum lapsus, vt qui vocabulorum similitudine decepti *ipsum* pro *opuntia* in Dioscoride scripserint. Mediū facultates tradidit Galenus libro v. 11. simplicium medicamentorum, sic inquires. Mediū radicem contra atque semen ipsum, temperatam esse contigit, nam illa quidem austera est, & fluxiones cohibet cum alia, tum profluuiū muliebri quo-

Medij cum siliat.

Medij vires ex Galeno.

quod vocant. At semen tantum abest, ut tale quid efficiat, ut etiam menses ciat, ut vapore quod tenuium partium, & incidentis effi sculatis. Vt Graeci hanc plantam *μυθω*, ita etiam Latini Medium vocant.

*Semina.*

ΕΠΙΜΕΔΙΥΜ.

CAP. XIX.

ΕΠΙΜΕΔΙΥΜ, caulis est non magnus, hederæ foliis, denis atque duodenis, neque florem, neque fructum ferens: radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo, nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mamas crescere non sinunt. Radix conceptum adimit. Folia trita quinis drachmis, post menses purgationes, quinque diebus in vino pota, praestant mulieribus, ne concipiant.

*Epimedij consideratio.*

Quia Epimedium in Italia, quantum mihi perquirere licuit, hoc tempore cognoscat, demonstretque, haecenus reperi neminem. Quare putauerim aliis in regionibus hanc plantam proferre: vel si fortasse nascatur in Italia, non dum ad nostram peruenisse cognitionem. Non tamen nos fugit medicum esse in Italia materiam medicam profertentem, cuius nunc nomen libet silentio dissimulare, qui Epimedium eam plantam esse censet, quæ a triquetra foliorum figura quibusdam recentioribus Trinitas appellatur. idque illis constanter affirmat, & persuadet, qui maiorem forsitan ei fidem praestant, quam ipsi Dioscoridi. Sed quod his aperte hallucinatur: et si unicuique medicorū etiam in re herbaria versato, perspectum esse possit, pro aliis tamen iam nobis ostendendum est. Quod facile constabit, si expendatur veriusque plantæ descriptio: siquidem Epimedium, Dioscoridis testimonio, caulis est non magnus: folia habet hederæ similia, dena aut duodena. Trinitas vero nullo constat caule, sed foliis tantum modo vicinis, modo tricenis, modo quadrigenis, pluribusque à radice cyclamini modo excurrentibus. Præterea Trinitas primo statim vere florē dedit comæleū, mox semen. Epimedium vero, Dioscoride auctore, neque florē neque semē profert. Adde quod Trinitas radice nititur multifida, odore non ingrato, & sapore adstringente. Radix vero Epimedij tenuis describitur, graui odore, & insipido ac fatuo gustu. Ex quibus omnibus, ni fallor, harum plantarum discrimen luce clariū ostenditur, & medicis illius opinio vana apertissime expiōditur. Ceterum Plinius libro x x v i i. capite i x. Epimedij historiam ad verbum seruat à Dioscoride mutatus est: cui item Galenus suam acceptam referre potest libro x i, simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. Epimedij vis est moderatè refrigerato-

ria cum aqua humiditate, quare nullam habet insignem qualitatem. Mamas cataplasmate impositum rectas seruire potest. Aliut vero epotum concipiendi spem adimere. Planta, quam Graeci *μυθω*, Latinis similiter Epimedij appellant.

*Nomina.*

ΕΠΙΜΕΔΙΟΥ.

ΛΑΥΡΕ ΧΧ.



XIPHION, alij phasganon, alij machæronion, Romani gladiolum vocant. nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus, & angustius videretur, & gladij

modo mucronatum, neruolumque. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus geminis, una paruorum bulborum modo, super altera insidente, quarum inferior gracilis est, superna vberior. nascitur in aruis. Superior cum thure illita, admisto vino, spicula & aculeos è corpore extrahit: panos cum lolij farina, & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi emplastris inseri solet. men ses imposita trahit. Superiori radice ex vino pota, venerem stimulari, & inferiori sumpta sterilesce tradunt. Superiorem quoque vtiliter infantium enterocelis, cum aqua potui dari præcipiunt.

NASCITUR Gladiolus, quem Graeci xiphion vocant, frequens in Hecuria, & in conitatu Geritensi, in pratis, & in aruis inter segetes: vnde Segetalis plerique dicitur. huius flores nostri vulgo appellant Monacucce. Folia ei iridis, breuiora tamen, & angustiora, lineis neruorum modo striata, mucronataque. Caule attollitur cubitali, succoso: in quo flores emicant purpurei, paribus inter se spatis distantes, qui etiam iadis flores

*Gladioli hifloria.*

forma effigieque plurimum amulantur, quam Gladiolo minores sunt, & vno tantum colore constant. Prodit ex his semen (vt Dioscorides inquit) rotundum. Radicibus cohaeret geminis, rotundis, pressis; verticillorum modo, vna super alteram insidente, albicantibus, bulbosis. Hæ obteguntur capillæ inuolutæ, in nigrum purpurascente, veluti croci radices. Cæterum quanuis tradiderit Dioscorides, quod superior radix magnitudine inferiorem superat, plerumque tamen contrarium visitur. Plinius porro hæc in historia à Dioscoride diffinit: siquidem Gladiolum, quem in aruis nasci scribit Dioscorides, in palustribus is & aquis inueniri existimat. Ex quo facile crediderim, Plinio illum vocari Gladiolum, quem passim officina Acorum nominant. Gladioli meminit Galenus libro v. i. i. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Xiphii radix, & maxime altera, quæ superior est, attrahentem, digerentem, & exiccantem scilicet facultatem etiam possidet. Hæc planta si quis Græcè vocatur: Latine, Gladiolus: Arabice, Kasilon: Italiane, Gladiolo: Germanicè, Schuuetel: Gallicè, Glais, & Glayeul.

Plinius a  
Dioscori-  
de differen-  
tians.

Gladioli  
vires ex  
Galen.

Nomina.

SPARGANIVM.

CAP. XXI.



dix cum vino datur.

SPARGA-  
NION, aliqui  
xiphidion vo-  
cant. folia ha-  
bet gladioli, sed  
arctiora, & in  
terram magis  
procumbentia:  
in summo cau-  
le veluti pilulæ  
prominent, in  
quibus semen.  
Contra serpen-  
tis venena, ra-

Sparga-  
ni confi-  
deratio.

EXISTIMAT Ruellius eam plantam esse Sparganium, quæ in aquis locis prouenit, quam herbariorum vulgus Spatulam scetidam appellat. Verum hæc, vt in proxima commentatione dicitur, nil aliud est, quam Dioscoridis xyris. Quare mihi planè retellenda videtur in hoc Ruellij opinio. Siquidem herba hæc, quam ideo Spatulam scetidam cognominant, quod grauem exhalet odorem, folia quidem habet gladioli, sed latiora, longioraque, minime in terram procumbentia. Adde etiam quod illa in summo caule non pilulæ, quæ semen continent, sed folliculos, aut siliquas profert. Sylvaticus Spatulam scetidam describens, eius histo-

Sylvatici  
eratum.

riam Paulo Aeginetæ perperam acceptam refert: id enim ipse in Paulo nusquam potui reperire. Sed ad Sparganium nostra redeat oratio. Vidimus hoc primum in agro Romano apud Tolpiani prope aluminis fodinas ad pedem montis Ronconi, & deinde in aliis plerisque locis, foliis gladioli, arctioribus: pilulis in caulis cacumine platani proximis, herbaceo colore, in quibus semen continetur. Sanè quam paucis de Sparganio deseruit. Galenus libro x. i. i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Sparganium & ipsum desiccantis est facultatis. Nomen Græcum habet planta hæc enagyriop: Latinum item, Sparganium: Arabice, Satarhe ramon: Italicum, Sparganio.

Spargani  
facultates  
ex Galen.

Nomina.

CAP. XXII.



XYRIS folia  
habet iridis, la-  
tiora, & in ca-  
cumine mucro-  
nata: quorum  
medio caulis  
erumpit, satis  
crassus, cubita-  
lis, ex quo sili-  
quæ triangula-  
res dependent:  
in quibus pur-  
pureus flos, in  
medio puni-  
ceus: semen in folliculis, simile fabis, ro-  
tundum, rubrum, acre: radix longa, ge-  
niculata, rufa. Contra capitis vulnera,  
fractaque efficax est: aculeos, & spicula  
omnia, citra molestiam extrahit, adie-  
cta floris aris tertia parte, & radicis  
centaurij, ac mellis quinta: tumoribus,  
& collectionibus illita cum aceto me-  
detur. Radix ex passo bibitur, ad con-  
uulsa, rupta, coxendicem dolores,  
stragurias, & alui profluvia. Semen tri-  
bus obolis potum, vrinam vehemen-  
tius impellit: & cum aceto, lienem ab-  
sumit.

XYRIS pluribus locis prouenit in Italia, præsertim in Hetruria, nullis deficientibus no-  
tis, quas ei tribuit Dioscorides. Eam vulgus Spa-  
tulam scetidam appellat, quod eius folia, si ma-  
nibus atterantur, grauem & ingratum reddant  
odorem. Sunt qui huiusce succo vrantur ad sca-  
biem, vitiliginem, & lichenas. Hanc memorat  
prodidit Galenus libro x. i. i. simplicium medi-  
camentum

Xyris  
confidera-  
tio.

Xyris  
vires ex  
Galen.



dicamentorum, vbi de eius viribus ita differt. Xy. is tenuium partium, attractioris, digerendi, ac nimirum etiam desiccandi est facultatis, cum radix, tum multo etiam magis eius fructus: qui quidem & urinam ciet, & lienes induratos sa-

nare potest. Planta Græcis *xyris*. Latinis quoque *Nemina*. Xyris dicitur: Arabibus, Cafotas: vulgò, Spatula fetida: Germanis, Vuandeleufz: Hispanis, Lirio spadanal: Gallis, Glaieul Sauvage.

ANCHUSA PRIMA.



ANCHUSA TERTIA.



ANCHUSA. CAP. XXIII.

ANCHUSA, quæ alio nomine calyx, aut onoclea appellatur, folia habet lactuca, in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoquo versum humi sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ æstate provenit, & manus inficit sanguineo colore. læto solo nascitur. Radix adstringit: ad ambusta, & vetera ulcera, ex oleo & cera efficax est: igni sacro cū polëta medetur: lepris, & vitiliginibus illinitur ex aceto: partus extrahit, vul-

ANCHUSA ALTERA.



ua indita. Eius decoctū renū vitii, lieni, & bile salfasis datur: & si febris sit, ex aqua multa. Siftūt aluū folia in vino pota. Radice pigmētarij vtuntur ad vniuentorū spissamēra. Est & altera, quā aliqui alcibiadion, aut onochiles appellant. Hæc à priore distat, quòd minora habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exiles, in quibus flos purpureus in puniceum vergens conspicitur: radices habet rubras, prælongas, quæ mēsisibus sanguineū succū fundūt. in fabulosis nascitur. Vis ei, foliisq; inest, quæ contra virus cū reliquorum serpentium, tum maximè viperarū auxilietur, siue cibo, siue potu, siue alligatu: nam si quisquā mandēs, in serpentis os inspuat, eum necabit. Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semē māducarū, si in serpentis fauces inspuatur, eā interficiet. Radix acerbula mēsurā cū hyssopo, & nasturtio pota, latas vētris tinea excutit.

TRIA sunt Anchusæ genera, quæ hic à *Anchusa*. Dioscoride scribuntur: quanquam Plin'io libro *rum. an. xxi. cap. xx.* quartum quoque genus additur, *fideratio*. quod pseudonanchusam ob id appellatam ait, quoniam primo aliarū generi quadantenus similis est, hirsutior tamē hæc, lanuginosior, & minus pinguis, foliis tenuioribus, & languidioribus.

bus. Sed hanc nusquam equidem vidi, cum tamen alias omnes locis copulatur in Italia inuenisse me certo scia. Anchusæ omne genus in toto fere caule purpureos explicat flores à vulgari buglossio non longe diffiniles, quamvis Anchusis magis subrubentes, magisque expansi spectentur. Galenus inter Anchusas Lycopsim quoque recenset lib. v. simplic. medica. vbi ita scripta reliquit. Anchusæ quad-uplex species est. Quasi onoclea quidem radicem habet admodum refrigerantē, & desiccantē, tum adstringentē, & subamarā, tum quæ sufficit extenuandis, & extergendis humoribus biliosis, corporibusque condensandis. Ceteris folia habet imbecilliora quidē radicē, adstringunt tamē & ipsa, & desiccant. Porro Lycopsis cognominata refrigerat, & desiccāt, magisq; radix eius, quā onocleæ adstringit. At onocleæ calidior est, & magis medicata. Nam plusculū habet & gustu ipso protinus acrimoniæ. Hæc verò etiam calidior est parua, quæ & amarior, & magis etiam medicata est, Anchusæ nō omnes easdē vires obtinent. Nam onocleæ quā vocant, radicē habet simul adstringentē, & subamarā, corporibus condensandis, & modicē extenuandis idoneam tum abstergendis quoque, & abluendis biliosis, & salis succis. Dictū enī supra est, quòd qualitas æcerda mista amaritudinē ea præstare queat. Sic sanè regio morbo, & humoris, & renū affectibus est utilis. Sed & refrigerare idonea est, & sanè cū polenta illita iuuat erysipelatā, & abstergit non modò epota, sed & foris imposita. Proinde vitiligines, & lepras sanat cū aceto. At radicis quidē hæc opera sunt, & operum facultates, quas diximus. At folia ipsius herbæ radicē quidē sunt imbecilliora, non tamen aliena sunt à refecatione, & adstrictione. Itaq; etiam profluuiū sanant pota cum vino. Et quæ Lycopsis nominatur eodē modo erysipelatis congruit, & radicē habet quā onocleæ magis adstringentem. At onochili, & alciabiadi cognominatæ vis magis est medicata. Nam & gustu protinus maiore habet acrimoniā, & eos qui à viperis morfi sunt, admodū iuuat tum illita, tum suspensa, tum citā. Restat verò, nempe quartā, quæ parua est, & fere nomine caret ex illis folia, alciabiadio quidē persimilis est, verum & amarior, & magis medicaminosiora proinde ad latos lumbricos idonea, oxybaphi mensura cum hyssopo, & nasturtio epota. Quæ

Nomina.

ἄνθος Græcè, Latine pariter & Italicè Anchusa vocatur Germanicè, Rodochschen zung: Hispanicè, Soagem: Gallicè, Orchanette.

LYCOPSIS. CAP. XXIII.

LYCOPSIS, quæ & anchusā à nonnullis vocatur, foliis est lactucæ, longioribus, asperioribus, latioribusque, crassis, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis, multis, cubitalibus: flore in iis

paruo, purpurascente: radice rubra, & adstringente. nascitur in campestribus. Cū oleo radice illita, vulneribus medetur: & cū farina hordeacea, ignibus sacris: sudores perusta mouet, adiecto oleo.

Ego quoque vñ cū Ruellio, & Fuchsio viris doctissimis, credere Lycopsim eam esse plantam, quam officinæ legiti. Cynoglossi vice passim vsurpant, vocantq; Cynoglossum, si tamen hæc radice rubra, non autē candida niteatur: si foliis viresceret asperis, non autē laetibus, ad terrā recidentibus; non sursum spectantibus: si caule aspergeret scabro, non molli: si deniq; Plinius huic scaturienti non proflus refragaretur. Porro cū Plinium videam libro x x v i i. cap. x i. de Lycopsi scorsū tractasse, & similiter de hoc Cynoglossi genere priuatim scripsisse lib. x x v. cap. v i i i. cogor omnino, vt ingenuè dicā, ab illis dissentire. Potius enim adducor, vt credā, Lycopsin herbam esse anchusæ nō ab similiē: quā ideo non temerè Galenus, & Aëtius cum secutus in anchusarum genera retulerunt, vt superiori commentatione diximus. Lycopsin, quā ego legitimam esse existimo, vidi sæpius in campestribus, sitientibus, aridisq; locis enatam, anchusæ adeo similem, vt vix ab ea discerni possit. Ceterū quoniam in huius libri quart. progressu, Deo iuuante, nobis de Cynoglossi differendum est suo proprio capite, idcirco dispartio, quodnā verum sit Cynoglossum, & nunquid illud esse possit, quo officinæ vsigē vuntur, in illud tēpus commodius differet: Lycopsi, vt Plinius est author loco citato, foliis est longioribus, quam lactucæ, crassioribusq;: caule longo, hirsutis adnatis, multis, cubitalibus: flore paruo, purpureo, nascitur in campestribus. Hæc herba Græcis ἄνθος, Latinis item Lycopsis, & Italis Licopside appellatur.

Lycopsis  
considera-  
tio.

Opinio re-  
probata.

Nomina.

ECHIVM. CAP. XXV.



ECHIVM folia habet prælonga, aspera, aliquantum tenuia, anchusæ proxima, minor tamen subrubra, & pinguis, spinulis tenuibus horridula, cauliculis exiles, numerosos: minutæque utroque

latere folia, expansa, pinnatæque ni-

gra, in summo caule proportionemina: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti viperarum similia insunt: radix nigricat, digito tenuior: *Que non percussis modo à serpentibus ex vino prodest; sed eos qui antea biberint, feriri non patitur.* Folia, & semen idem præstant munus. Lumborum dolores sedat: in vino, aut forbitione sumpta, lac extrahit.

*Echij confectio.*

ECHION à viperis omnino nomen àdineuit (viperæ enim Græcis *ἰχθὺν* dicitur) vel quod semen proferat capitibus viperinis simile, vel quod viperarum moribus præstantissimum sit medicamentum. Hanc herbam ab Alcibio quodam fuisse inuentam author est Nicander in theriacis, & proinde à posteris cognomine Alcibiæcam appellatum. Is enim dum secus aræa dormiret, à viperæ in extremo inguine ictus est. excitatusq; à somno ex hac herba succum commanducando palato & denticibus expressit, hausitq; in corpus. Mansit verò herbæ reliquū vulneri superimposuit contra dolorem, quo medicamento liber euasit. Vnde postea Echion nomen inditum est Alcibion ab eo, qui primus ostenderat, quantum viribus posset contra viperarum ictus. Numerius scriptor grauissimus duo Echij genera inueniri scriptum reliquit, quorum alterum Ocimoides appellari inquit, quod folia ocimo similia habeat: alterum verò, quod folio est spinis horrido, priusquam Echion nominari. Id sane quod in theriacis ante ipsam scripserat Nicander. Quibus videtur etiā Dioscorides adipsulari, quippe qui Echio statim subiecorit Ocimastrum. His quoque subscribit Plinius libro x x v. cap. i x. sic inquitens. Echios duum est generum: altera foliis coronata, pulegio similis: altera lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula viperæ similia sunt. Sed ramen ignorasse Plinium Alcibion, & Echium idem esse, satis manifestum est: siquidem is lib. x x v. cap. v. Alcibios inquit, qualis esset herba, apud auctores non comperi. Ex cuius verbis illud facile colligi potest, quod scilicet Plinius non satis accurate Nicandrum legerit. Ceterum non parum admiratio eum capiet, qui in Echio diligenter opus prudentissimæ naturæ perpexerit, nempe quod ipsum genuit viperinis capitibus, ut ita apud homines, quorum potissimum curam gerit, testatam relinqueret, eam herbam præstantissimam esse ad huiusmodi lethalium ferarum morbos. Echium, quod ubique ferè proueniat, aridis præsertim locis, sepe in Hecuria, in agro Tridæno, & Goriensibus vidimus, seminisq; eius viperinum deceperimus ad antidota. Herba est ancyuse, quæ secundo loco Dioscoridi redditur, non ab similia. Vocant quidam sylvestre Buglossum. Flo-

res profert hæc in rubrum purpureascentis interminuta folia à medio caule ad summum: quibus semen prodit nigrum, hirsutis, spinosisq; inuolutis inclusum, viperarum capitibus simile. Non inuenio Galenum vllam Echij mentionem fecisse in libris, quos de simplicium medicamentorum facultatibus edidit. Paulus tamen eius vires describit Dioscoridem secutus libro v i i. vbi hæc refert. Echion, alij doria-da, nonnulli alcibiadion vocant. Spinosa herba est, quæ non modo à serpente commoriss cum vino pota auxiliatur, sed præsumens quoque ex ictu nihil molestum pati solet. Quod Græci *ἰχθυον*, Latini quoq; Echium dicunt: Itali, Echio: Germani, Vuuld ochsen zung: Hispani, Yerua della biuora: Galli, Englosse sauauge, vel, langue de Bouc.

OCIMASTRUM. CAP. XXVI.



OCIMOIDES, Latini ocimastrum vocant, folia fert ocimi, & ramos dodrantales, hirsutos: filiquashyoscyamomifiles, gemine, ut gith, nigro prægnantes. Vim habet semen in vinopotum, quæ viperarum, cæterarumque ser-

pentium moribus medeatur. Datur ischiadicis, cum melle, vino, myrrha, & pipere. Radice nititur tenui, & superuacua.

OCIMASTRUM, siue sylvestre Ocimum *Ocimastrum* idipsum nobis appellare liceat, passim copiosè nascitur in Italia, præsertim inter segetes prope septa, & in agrorum marginibus, foliis sanctiuo similibus: ramulis hirsutis, quadratis, dodrantali, vel cubitali longitudine: in quorum summo flores emicant, candidi, quandoque verò purpurei, id quod silencio præterit Dioscorides: æquibus vascula erumpunt hyoscyami figura, capaci ventre, arcis faucibus, per ambitum denticulatis, viperinis capitibus similia: in quibus semen includitur nigrum, melancholio seme simile. Hæc vascula ita à natura facta pueri nostrates colligunt, vbi exaruerint: siquidem, cum semen exciderit, his intus sustinantes acutissima eduntur.

L 2 sibilis.

*Plinij lapsum.*

fibila: sic enim natura pueris interdum ludendi præbuit instrumenta. Meminit huius Nicander in theriacis inter echij genera, sic inquit. Echij genera duo: alterum spinoso folio, anchusæ simile: alterum minoribus foliis, & purpureo flore, aspero lanuginosoq; caule, capitulis viperarum figura. Ocimastri vires tradidit Galenus in calce libri v 111. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Ocimoides quidam Philitarum cognominant. Radix superuacanea est. At semen tenuium partium, & desiccatis citra mordacitatem facultatis est. Herba Græcis *ὀκίμωδις*, Latinis Ocimoides, & Ocimastrum appellatur: Italis, Basilico saluatico: Hispanis, Albahagua montefina: Gallis, Basilic sauage.

*Ocimastri vires ex Galeno.*

*Nomina.*

ERINVS. CAP. XXVII.



ERINVS nascitur apud fontes, & fluuios, foliis ocimi, sed minoribus, parte superna diuisis: furculis quinque, senisve, dodratalibus: flore candido. femine nigro, & acerbo: folia, & caules lacteo succo turgent. Semē drachmis duabus in quatuor mellis cyathis oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus cum sulphure, & nitro instillatus, aurium dolores sedat.

*Erinicon sideratio.*

Ex si nonnulli Dioscoridis codices habentur, in quibus non legitur Erinum aliquo lacteo succo turgere; non desunt tamen & in quibus planè oppositum scriptum inueniatur, quorum lectio mihi magis probanda videtur non infimis, ut arbitror, nixus rationibus. Quippe quoddam herbam hanc apud aquarum riuiulos viderim, legerimq; lacteo succo manantem, ad eam ut eo manus inficeret. Quod præterea Plinio reddatur Erinus herba lactaria, seu lacte madēs libro x 111. cap. v 11. ubi de ea hæc memoriz prodidit. Herba, inquit, in quam Græci Erinon vocant, reddenda est in hoc loco propter gentilitatem. Palmo alta est, cauliculis quinque, ferè ocimi similitudine, flos candidus: semen nigrum, paruum, quod tritum cum melle Arico oculorum epiphoris medetur. Manat lacte

multo, & dulci. Herba perquam vtilis aurium dolori, nitri exiguo addito. Folia resistent venenis. hæc Plinius. Cæterum Erini facultatis aduersus venena non meminit Dioscorides, quanquam Nicandro, ut quæ ad id præster, addatur in antidotis. Galenus hanc herbam non Erinum, sed Echinon appellat: neq; id sanè mirum est, quandoquidem in vetustis aliquot Dioscoridis codicibus Echinos legitur. De qua differens ipse Galenus libro v 1. simplicium medicamentorum, sic inquit. Echini herbe semen acerbum est: ac proinde repellentis, & exicatoriz facultatis. Vtuntur eo ad oculorū, & narium fluxiones. Quæ herba Græce *ἐρίνη*, Latine Erinum, & Ocimum aquaticum nominatur: Italicè, Erino: Hispanicè, Basilgo de lhagoa, Gallicè, Basilic d'eau.

*Erini vires ex Galeno.*

*Nomina.*

GRAMEN. CAP. XXVIII.



GRAMEN geniculatis serpit ramulis, à quibus radices spargit dulces, articulis præcinctas: folia acuminata, dura, & ut arundinis parua lata, eaque iumenta, & boves pascunt. Trita radix illicitu vulnera conglutinat.

Decoctum eius in potu, torminibus medetur, & vrinæ difficultatibus: calculus etiam vesicæ excrementa comminuit. Est & arundinaceum gramen, priore multò maius, quod iumenta necare traditur, præsertim in Babylone: idque iuxta vias nascitur. Quod in Paraso monte gignitur, densius fruticat. foliis hederaceis: flore odorato, candido: femine paruo, non inuiti: radicibus quinque, aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & admodum dulcibus. Succus si in vino cum melle pari, & myrrhæ dimidio decoquatur, adiicianturque piperis, & thuris tertiz portiones, probatissimum

erit

erit oculorum medicamentum: id in  
arca pyxide reconditur. Decoctum ra-  
dicis idem, quod herba, præstat. Semen  
vehementius vrinam impellit: alium,  
vomitionesq; sistit. Natum in Cilicia  
gramen, quod incolæ Cinnam appel-  
lant, boues inflammat, si eo virenti sa-  
pe pascantur.

*Graminis  
hysteria  
Plinio.*

PLINII, ac varia sunt Graminis genera: si-  
quid præter hæc tria, quorū meminit Dio-  
scorides, alia quoque tria aculeati generis Plinio  
redduntur lib. x x i i i . cap. x i x . naturalis  
historiæ, his verbis. Gramen ipsum, inquit, est  
inter herbas vulgarissimū: genicularis serpit in-  
ternodiis, crebroq; ab iis, & ex cacumine no-  
uam rursus spargit. Folia eius in reliquo orbe  
in exitat fastigiatur. In Parnaso tantū hede-  
racea specie densius, quā vīquā fruticante flore  
odoratq; candidoq; tumētis herba nō alia gra-  
tior, sue viridis, sue in sæno siccata. Tunditur  
aspera aqua. Succū quoq; eius in Parnaso ex-  
cipi tradunt propter vberatē: dulcis enim hic  
est. In vicē eius in reliqua parte terrarū succe-  
dit decoctū ad vulnera conglutinanda. Quod  
& ipsa herba tusa præstat illita, tuerq; & ab  
inflammationibus placat. Decocto adicitur vi-  
num, ac mel ab aliquibus, & thuris, & piperis,  
myrrhæq; tertia portiones. Rursusq; conquitur  
in æreo vase, ad dentū dolores, & epiphoras.  
Radix decocta in vino torminibus medetur,  
& vrinæ difficultatibus, vlceribus vesicæ: cal-  
culos frangit. Semen vehemētius vrinam im-  
pellit: alium, vomitionesq; sistit, priuatim au-  
tem draconū moribus auxiliatur. Quod ē gram-  
inū genere septem internodia habet, effica-  
cissimē capiti contra dolores adalligatur. Sunt  
qui & aculeatū gramen vocant trium generū,  
cū in cacumine aculei sunt plurimū quini,  
dactylon vocant. Hos cōuolutos naribus in-  
serunt, extrahuntq; sanguinis, ciendi gratia. Al-  
tero, quod est aīzoō simile, ad paronychia, &  
prerygia vnguim, & cū caro vnguibus ex-  
creuerit, vniuntur cū axungia. Tertium genus,  
quod tenuius est, nascitur in parietibus, & re-  
gulis. Huic caustica vis est. Sistit vlcera, quæ  
serpunt. Gramen capiti circumdatū, sanguinis ē  
naribus fluxiones sistit. hæc Plinius de gram-  
inibus. Cæterum hinc omnibus planē perspi-  
cuum esse puto, Gramen, quod in Babylone,  
quodōd: in Parnaso mōte oritur, nō gigni in  
Italia: quanquam illud primum, ac vulgatū ge-  
nus nobis passim frequētissimū nascitur.  
Neque illud quoq; omnibus non cognitum &  
vulgare est, cui in cacumine caulī quini sunt  
aculei, veluti digiti, quos pueri naribus inserūt  
extrahuntq; ut sanguinē efficiant. Hanc herbā  
Hærrusē ab effectu vulgō appellat. Sanguin-  
ella, aliq; Capriola. De qua latius in Coronop-  
o diximus, ubi Leonici, & Ruellij senten-

tiam reprobauimus, qui hanc & Coronopum  
Dioscoridis vnam & eandem herbam esse asse-  
runt. Verū de Coronopo separatim disse-  
ruit Plinius lib. x x i i . ca. x i x . sua natu-  
ralis historiæ. Sed iam Graminibus suas red-  
damus vires ex Galeno, qui de iis agens lib. v i .  
simplic. medicam. ita scriptum reliquit. Grami-  
nis radix mediocriter frigida, est, & secca, mor-  
dacitatem quandam exiguā, & partium tenui-  
tatem obtinens. At herba ipsa primo quidem  
excessu refrigerat, in humiditate verō, & siccitate  
moderata. Porrō semen alibi quidem im-  
becillum est, in Parnaso verō desiccatorium, &  
tenuium partium, & subacribū. Gramen escu-  
lentam habet radicē, ubi mollis fuerit, dulcem  
quidem instar aquæ, sed acre quiddam exigū,  
& subacrum obtinentem. Hæc herba planē  
aquea gustantibus est. Ex quibus apertū est, ra-  
dicem modicē esse tum frigidam, tum siccam:  
ac proinde cruenta vlcera glucinare. At ipsa  
herba illita, non vehementer refrigerat, in me-  
dio constituta humiditatis, & siccitatis. Porrō  
mordacitas & tenuitas, quæ radici inest, exigua  
est quidem, sed interdum tamen lapides fran-  
gere asolet, si quis eam decoctam edibat. At  
semen alterius quidem imbecillū est, eius verō  
quæ in Parnaso nascitur, vrinam citē & fluxus  
ventris, & stomachi rescat: vis enim eius est  
exicatoria, tenuium partium, & subacra.  
Herba, quæ Græcis *ἡγστρα*, Latinis Gramen ap-  
pellatur: Arabibus, Vagem, Negen, seu Negien,  
Thel, Kel, & Negli: Italis, Gramigna: Germanis,  
Grafz: Hispanis, Grama, & Gramenhai:  
Gallis, Dent de chien.

*Graminis  
vires ex  
Galeno.*

*Nomina.*

#### SIDERYTIS. CAP. XXIX.



SIDERITIN  
aliqui heracleā  
vocāt. folia ha-  
bet marrubij,  
sed longiora, fa-  
tis ad frondem  
quercus, aut sal-  
uiz accedentia,  
minora tamen,  
& aspera: cau-  
les edit quadra-  
tos, dodratē al-  
tos, aut etiā ma-  
iores, non inui-

cundi gustus, aliquantumq; subtrin-  
gentis: in quibus per interstitia orbicu-  
lata vertebra, vt in marrubio spectan-  
tur: & semē in eis nigrū, nascitur in pe-  
trosis. Illita folia, suapte vi vulnera sine  
inflammationis periculo iungunt.

SIDERITIS  
ALTERA.SIDERITIS ALTERA.  
CAP. XXX.

ALTERA Sideritis binum cubitorum ramulis, exilibus: folio filicis, numerofo, vtrinque per oras diuifo, pediculo longo, prodeuntibus è summo alarum finu furculis, longis, tenuibus: capitulo in cacamine orbiculato, afpero: in quo fermen continetur, quam betæ rotundius aliquatò, ac durius. Huius vis, foliorumque ad vulnera, præcipua eft.

SIDERITIS TERTIA.  
CAP. XXXI.

SIDERITIN aliam effe tradunt, quam Crateus heracleam vocat, in maceris, & vineis nascentem: foliis, ab vna radice multis, coriandro fimilibus, circa coliculis dodrantales, læues, teneros, fubcandidos, atq; fubrubicundos: flore puniceo, paruo, & gustanti amaro, & lento. Huius ea vis eft, vt quauis recenti vulnere impofita, fanguinem fupprimat.

*Sideritis a miferere- tis.* TERTIA Sideritidis genera præter Achilleam, de qua frequenti capite dicitur, hic à Diofcotide repræfentari conftat. Quorum eft illam, quæ fecundo loco defcribitur, antea in noftro Italicis commentariis me nunquam in-

SIDERITIS  
TERTIA.

ueniffe, ac vidiffe tradiderim, eam tamen hoc anno Pifis ad me mifit Lucas Ghinus Forocornelienfis vir rei medicæ peritiffimus. Reliqua verò genera iandiu nouiffe nos putamus, quòd ea omnibus notis fuam quæque hiftoriam fequi deprehenderimus. Cæterum nemini mirum fit, quòd tam varia effigie primæ Sideritidis folia reddiderit Diofcotides, vt qui ea modò marrubij, modò quercus, modò faluiz figura depingat. Quippe eorum longitudo faluiz accepta referatur oportet: fæbrities deinde fuperciliætenus, ac fubalbidus color tum eidem faluiz, tum marrubio: quercui poftremo, quæ in ambitu effe diuifura. Sed ea mihi quidem nihil prioris primæ Sideriti adftipulari videtur, cuius imaginè exprefsit Fuchfus in fuo infigni de fimplici hiftoria com-

mentario. Siquidem perfpicuum eft, quòd eius pictura non folum non præfe fert folia, & caules, quæ Sideritim veram referant, fed etiam flores eius fpicati in cacamine, non in caulibus inter folia marrubij modo, planè veræ Sideriti refragari confpiciuntur. Ruellius porro Sideritim hanc nonnullis herbam Iudaicam appellari tradit. Verùm fi is Iudaicam illam intelligit, cuius libro 111. meminit Auicenna, nullo modo erroris culpa vacare poteft. Nam Auicennæ Iudaica herba nil finè aliud designat, quam eruum. Sunt tamè aliqui, qui herbam Iudaicam, itemq; Paganam eam nominat, quæ herbarijs, & medicis quibufcùq; VIRGA aurea dicitur, caule rubente, bicubitali, lru: folijs oluæ larioribus, circùm minutiffimè ferratis, in fuperficie læuibus: floribus in fummitate caulium fpicatis, colore auro, non tamen anthem dis modo rotundis, radiarifs, vt eam minus rectè depingit Fuchfus. Flores ij, vbi maturuerint, in pappos abeunt. Hanc chirurgici in Germania, alijs quibufcùq; addic-  
felicet

Fuchfij ex-  
raturum.Ruellij opi-  
nio repro-  
bata.Virga au-  
rea faciet.  
Es Sicut.

feliciter potandum exhibet, quibus intrinsecus infusa sint vulnera, & ad fistulas. Quinetiam eam in vnguenta, quæ ad id consuevit, vtiliter addunt. nam, ut ipsi referunt, glutinandis vulneribus tam intro in corpus sumpta, quam exterius illita, efficax admodum est medicamentum. Extulit hanc A. naldus inter recentiores clarissimos author, ad vrinam ciendam, comminuendosque calculos. quod tamen apud alium scriptorem hæcenus mihi non licuit reperire. 10 Pota hæc alui fluxiones cohibet. id quod etiam præstat clysteribus infusa. Eius decocto sanantur oris ulcera, firmanturque dentes. Idem gargarizatu anginam, & columellæ inflammationem arceat, & faucium morbis medetur. Veruntamen hæc, vt ad institutum nostrum redeamus, non erit Sideritis primi generis, vt fortasse Ruellius existimauit. Sideritis vires memorie prædit Galenus lib. v. 1. 1. simplicium medicamentorum, vbi ita scriptum reliquit. 20 Sideritis habet quidem etiam abstergendi quandam facultatem: sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida: pauca vero inest adstrictio, quare phlegmonem sedat, & glutinat. Hæc Galenus, de vna tantum Sideritide scribens. Sed cuius ex tribus meminerit, non facile est discernere. *Sideritis* Græcè, vt etiam Sideritis Latinè vocatur: Arabicè, Sidrichis: Italicè, Siderite.

*Sideritis vires ex Galeno.*

*Nomina.*

ACHILLEA. CAP. XXXII.



ACHILLEA, quibusdā Achillea sideritis, do drantales, aut maiores gerit scapis, fusorū 40 effugie, minutulis foliis circumdatos, ex obliquo crebras incisuras habentibus, coriandri similitudine, subsul- 50 uo colore, lentis, odore mul-

to, non insuauī, verū medicato: umbella in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurum æmulantibus, prouenit læto solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur: erumpentem sanguinem inhibet, & cruenta

vulnū profluuiā in vellere. Decocto quoque insident scæminæ fluxione vulnū laborantes. ad dysenteriam bibitur.

Qy i vulgaris vsus Millefolium Achilleam *Achillea* esse existimant haud dubie, mea quidem sententia *considera* tia, decipiuntur. Siquidem id (vt infra latius *110* dicemus de Stratiore millefolio differens) folia non profert crebris ex obliquo sectionibus, coriandri similitudine, sed aëcularum pennas æmulantia. Porro tantum confiter, Millefolium umbella coronari modò alba, modò *Multarū error.* purpurea, modò aurea: non tamen propterea colligendū est Millefolium, & Achilleam vnam & eandem herbam esse. Quandoquidem non putauerim ego fuisse Dioscoridis institutum (vt Ruellio placet) quòd hæc Achillea umbellam ferat candidam, illa verò purpuream, alia denique auream: sed quod omnibus in vniuersum Achilleæ plantis eadem insit umbella, quæ tantum prædictis coloribus distincta spectetur. Nascitur in Heeturia planta, nascitur & in Gortienſi agro, scapis ferè cubitalibus: foliis coriandri proximi, odore quadtanens graui, non tamen ingrato: umbellæ in cacumine rotunda, amplius, colore in purpura candicante, punctis quibusdam aureis depicta, quam semper putari esse legitimam Achilleam. Atque 30 in hac persistam sententia, donec quis certiorē plantam protulerit: quòd hæc mihi planè omnibus notis Achilleam Dioscoridis repræsentare videatur. Cæterum in hunc forè errorem, vt crederent nostrum millefolium esse Achilleam, illos deduxit Plinius, qui libro x x v. cap. v. Achilleam Latinis millefolium vocari tradidit. Veruntamen is, quantum videre est, eo in loco non Achilleam hanc describit, sed eam omnino plantam, quam Dioscorides myriophyllum appellat. Quare paulò post hæc verba subiunxit. Sed alij, inquit, fatentur veram Achilleam esse scapo cæruleo, pedali, sine ramis, ex omni parte singulis foliis rotundis eleganter vestitam. Ex quibus verbis liquidò apparet dubitasse Plinium, qualis legitima esset Achillea: & ideo ita indeterminatè locutum fuisse, vt nihil in eo perpetuum statui possit. Serapio, aut *Serapio non lapsus* 50 inſe ait, licet falsò) rubrum succum fundat, sanguinem draconis appellat. sed fortasse hic interpretis lapsus suus factus est. Siquidem succum rubrum fundere Achilleam non tradidit Dioscorides: neque etiam (vt omnes compertum habent) lætyma, quam officina sanguinem draconis appellant, hæc sit succus est, sed Arabice cuiusdam magnæ arboris gummi, vel, vt aliqui volunt, draconis animalis est sanguis ab elephate collig. Cuius loco illius plurimum vendunt impositiores, quem hirci sanguine cum resina quauis, foetibus acis, aliisq;

*Achillea  
Scirrus ex  
Galeo.*

nonnullis adulterant, & in rotundas placentas conformant. Achillea meminit Galenus libro v 111. simplicium medicamentorum sic de eius viribus scribens. Quidam etiam vocant Achillea fidericin, quæ propositæ quidem, quod ad iam dicta attinet, viribus est non dissimilibus: ceterum adstrictione exuperat. quare ad sanguinis eruptiones, dysenterias, & muliebri profluuii congruit. Planta Græcis *ἀχιλλεύς*, Latinis pariter & Italis Achillea vocatur: Arabibus, Sichritis, & Egilos: eius verò succus Demalochorten.

*Nympha.*

RVBVS. CAP. XXXIII.



RVBVS notitiæ vulgaris. Vim habet siccandi, & adstringendi: capillum tingit. Ramorum decoctum, potu aluum sistit, & sceminarum profluuium præsternit. præsternit morui acco-  
modatissimū. Gingiuas fir-  
mant, & oris vi-  
tiis medentur folia comman-

ducata: cohibent vlcerata quæ serpunt: vlceribus in capite manantibus, oculisque procurrentibus, remedia sunt: condylomatibus, & hæmorrhoidibus folia illinuntur. cardiacis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. Caules cum foliis tunduntur, exprimiturque succus, mox sole cogitur. singulari remedio contra omnia, quæ modo dicta sunt. Mori in rubo nascentis quam optimè maturi succus, ad oris medicamenta conuenit. Sistitur alius præmaturi cibo, necnon flore in vino potu.

RVBVS IDAEVS.  
CAP. XXXIII.

IDAEVS Rubus appellatus est, quoniam copiosus in Ida provenit. Est autem longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens: quanquam & sine

spinis inueniatur. Insuper eadem præstat, quæ supradictus. Cæterum flos cum melle oculorum collectionibus illinitur. ignem sacrum extinguit, stomachicisque ex aqua bibendus datur.

RVBVS vulgaris plantæ, plura apud nos reperiuntur genera. quod etiam testatum reliquit Theophrastus libro 111. cap. x v 111. de plantarum historia. Alius namque arboris inflat crassescens, in altum attollitur: alius sepibus, fructibusque implicatur: alius humi sæpit, radicaturque gramini modo, quem ideo humirubum appellant: alius denique a his modis in syluis, & montibus vagatur. In montibus liquidem, Tridentinis, præsertimque Ananienibus Rubi quoddam genus nascitur, rubra proferens mora, fragis non dissimilia, nullis incus officulis, quæ ab incolis vulgò vocantur Ampomelle, gustui per zestatem non inuicunda. Is maxime delectantur vrsi: qui ac de causa eo potissimum tempore, quo illa marescunt, à venarioribus capiuntur. Hoc rubi genus sunt recentioribus, qui pro certo crediderint esse Idæum rubum. Sed equidem non video, quomodo illorum sententia prorsus rectè probari possit: nam si Idæus rubus dictus est (ut interpretatur Dioscorides) quod in Ida proveniat, hinc nimirum colligi posse putauerim: ut Plinius lib. x x 111. cap. x 111. nò temere: è fortasse collegisse videatur, quod is in Ida tantum, non alias nascatur, quæ admodum etiam radix, quæ Idæa dicitur, & dictamnum in Creta, nisi forte quis Idæum promontano accipiat. Eufasius rubi mora (ut libro primo in ligustri mentione diximus) vacinia esse putat. Sed quare ab eo diffentiam, ibidem diffusius ostendi, quod scilicet vacinia flores, non fructus esse existimem. Rubi vires descripsit Galenus libro v 1. simplicium medicamentorum, si inquit. Rubi folia, germina, & flos, fructus, & radix qualitate adstringente participant, eaq; non obscura. Sed hoc inter se differunt, quod folia, mollia potissimum, & recens nata, plurimum in se habent substantiæ aqueæ, parum verò adstrictionis: eadem ratione & germina. Itaque si mandantur, aphthas, & aia oris vlcerata sanant. quin & alia vulnera glutinare valent. Est enim eorum temperies & ex terrea frigida essentia, & aqua tepida. At fructus, siquidè maturus fuerit, non parum habet succi calidi temperati, qui dulcis est, uti monstrauimus. Proinde ob hoc, & propter modicam adstrictionem, esui non insulzus est. At immaturus à frigida substantia terrea vincitur: & propterea acerbus est, & valde exiccatorius. Et sanè uterque siccatus reconditur, validius quam recens desiccans. Sed & flos eandem fructui immaturo facultatem possidet: utraque ad dysenterias, & ventris profluuium, tum robur perditum, & sanguinis expunctiones, idon-

*Ruborum  
considera-  
tio.*

*Opinio  
quædam  
reprobata.*

*Rubi Ci-  
reæ ex Ga-  
leno.*



nea remedia. Porro radix præter adstrictio-  
nem non paucam in se habet substantiam tenuem, propter quam & lapides renum comminuit. Hæc planta Græcis *παρβή* appellatur: Latinis, Rubus: Mauritanis, Buleich, seu Ha-  
*Nomina.* leich: Italis, Rouo: Germanis, Carza: Gallis, Ronce. Eius verò fructus Græcè *βάρβα* & *βάρβα* dicuntur: Latine, Mora rubi: Italice, More di rouo: Germanicè, Bramber, & Krazber.

HELXINE. CAP. XXXV.



HELXINE  
cognomèto cissampelos, foliis  
est hederæ: mi-  
noribus: ramu-  
lis exilibus, qui-  
bus completitur  
quodcumq; con-  
tingerit admini-  
culationum. Nas-  
citur in sepibus,  
vinetis, & segetibus. Foli-  
orum succus potu de-  
licat alium.

*Helxinis* *considera* *tio.* N V L L I certè dubium esse parauerim, quin Helxine cognomine cissampelos, quasi hederæ-  
cam vitæ dixeris, species sit Conuoluuli. Sed quæ ea sit, non faciliè explicari potest. Verum cum eam reddiderit Dioscorides foliis hederæ similibus, minoribus tamen: ramulis exiguis, quibus quodcumque contingerit completitur: nasciturque in sepibus, vineis, & segetibus, satis mihi declarasse videtur, eam esse Helxinem, quæ quidem in aruis tum segetes ipsas, tum linum, tum legumina omnia irretit, ac vincit, & in vinetis, palis, & vitibus circumuoluitur. Hanc Hetrustum vulgus suo idiomate nominat Vilucchio minore, Tridètinis verò Minutola dicitur. Quanquàm nō defuit, qui putent Helxinem eam esse herbam, quæ crebra resolutione septa, & vicinis implicat frutices, flores illos candidos æstare ostentans, quos nostri vulgo appellant Campanellæ. Hanc Plinius conuoluulum vocat libro xxi. cap. v. ubi eam his verbis depingit. Est inquit, flos non dissimilis lilio in herba, quam Conuoluulum vocant, nascens per trutrea, nullo odore, nec crocis intus, candorem tantum referens, ac veluti naturæ rudimentum lilia facere confidencis. Sunt qui aberrantes hanc herbam, & eius florem ligulitum vocant: in qua appellatione deceptus fuit Seruius grammaticus, hunc

errorē explosimus libro primo, ubi veri ligulitum mentionem fecimus. Helxinem perpaucis perstrinxit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquires. Helxine, quæ & cissampelos nuncupatur, digerendi facultatem habet. Ea Græco nomine *ἡλξίνη* Latino item Helxine cissampelos: Arabicè, Acfin: Italice, Vilucchio minore: Germanicè, Metel viund: Hispanicè, Campanella yerua, Gallico, Campanette, Clochette, Vitreole, Liset petit, vel, Liferon.

*Helxinis*  
*Gires ex*  
*Galeno.*

*Nomina.*

ELATINE. CAP. XXXVI.

ELATINE folia habet helxinæ similia, minora, rotundiora, pilosa: tenuibus, & dodrantalibus ramulis, quin-  
tis, senisve, à radice foliosis, gustu adstringentibus. nascitur in segetibus, & cultis. Oculorum fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, foliis cum polenta tritis, & impofitis. Eadem cocta sorbitionis vsu dysenteriam sistit.

NUMMLARIA.



SVNT qui velint Elatinen eam  
esse plantam, quam  
quidem Nummlariam vocant. Alij  
verò non hanc volunt, sed eam quam  
nos vulgò vocamus Solbasella, officinæ  
Pimpinellam, & alij quidem San-  
guisorbiam dicunt.  
Sed mihi quidem,  
vt dicam quod sen-  
tio, neutrorum pla-  
cet opinio. Siqui-  
dem Nummlaria in  
primis non fert fo-  
lia pilosa, neque in  
segetibus, neq; in  
cultis prouenit, sed  
plerumque in serobium marginibus, præsertim  
vagine madentibus. Deinde Pimpinella voca-  
taramulis exit lógè pluribus, quin senis in ter-  
ram procumbentibus, & folia habet vndique  
in ambitu lacinia, asterisæ modo. Ruellius por-  
rò Elatine in Gallia vulgo Rapistrum vocari,  
ait, eoque vt rapo syluestri in vernis acetariis ru-  
ra vti. Verum si rapistrum id Hetrustis est, quod  
Gallis certo scio, Elatine esse non posse. Quæ  
tamen quòd nascatur in Italia, nec negare qui-  
dem, nec affirmare ausim, cum hæcenus plantam  
non viderim, quæ illam legem referat.  
Galenus de Elatine quàm breuissimè distinxit  
lib. v. i. simp. medic. sic inquires. Elatine mo-  
dicè tum

*Elatines*  
*considera*  
*tio.*

*Quæritur*  
*quid sit.*

*Elatines*  
*Gires ex*  
*Galeno.*

dicē tum refrigerat, tum adstringit. Huic no-  
men Græcum est *ἰατρὴν* : Latinum similiter  
Elatine : Arabicum, *Athin*.

## EUPATORIUM. CAP. XXXVII.



EUPATO-  
RIVM frutico-  
sa herba est, vni  
cum efferēs cau-  
lem, lignosum,  
nigricantem, re-  
ctum, tenuem,  
hirsutum, cubi-  
talem, interdū  
ampliorem: foliis per interval-  
la quinefolij,  
aut cannabis po-  
tius similibus,  
quinequepartitō,

aut amplius diuisis, nigricantibus &  
ipsis, per ambitum ferratis: semen me-  
dio caule erumpit, pilosum, deorsum  
spectans, quod siccatum vestibus inhæ-  
ret. Contrita huius folia, & cum suillo  
adipe imposita, vlcibus, quæ ægre  
cicatricem trahunt medentur. Herba,  
aut semen in vino potum, dysenteria,  
iecinoris vitii, & serpentium icibus  
liberat. Nec desunt, qui aberrantes ar-  
gemonem hanc appellarint, cūm ta-  
men longè alia sit, vti exposuimus.

Eupatorium  
confidera-  
tio.

SVMNT nonnulli, imò vniuersa ferè se-  
plasiariorum turba, legitimi Eupatorii vice  
quandam aspectu insignem plantam, quæ ple-  
runque in virginis locis, & in scrobium mar-  
ginibus nascitur, tricubitali longitudine, foliis  
cannabinis æmulis, maioribus tamen, subalbi-  
dis, hirsutis, & amaro gustu : caule subrubeo,  
rotundo, firmo, hirsutisq; multis alarum ca-  
uis, multisq; adnatis referto. Huic flores in  
umbellam exeunt, non tamen simul coheren-  
tem, sed diuisam, organo vulgaris modo, colo-  
re in purpuram albicantē, qui maturescen-  
tes in pappos abeunt. Radix, quæ in plures  
diuiscitur partes, illi inuicilis est, nulliusque  
in medicina vsus. Et quanquam ii sciunt, legi-  
timum Græcorum Eupatorium eam esse plan-  
tam, quæ vulgò Agrimonia vocatur, eorum  
fortè imitatione, qui Dioscoridi ætate ean-  
dem perperam argemonem appellabant, cūm  
tamen animis inambitos iandū errores relicere

nequeant, vel potius nolint, difficile quidem  
adduci patiuntur, vt vulgare Agrimonia  
Græcorum medicamentis, quæ Eupatorium  
excipiunt, admisceant. Non tamen hæc pro-  
pterea dicimus, quòd omni ex parte illius Eu-  
patorii vsum dam-  
natus, cūm id  
proprium sit Auicē-  
næ Eupatorium,  
sed vt numquod-  
que suo reddatur  
authori. Palam et-  
enim est, vt ex fo-  
liorum amaritudi-  
ne, & odoris præ-  
stantia, quo huius  
Eupatorii tota re-  
doler planta, per-  
cipi potest, id & ob-  
structiones aperire,  
& crassos, lentosq;  
humores misce-  
re incidere posse. Ve-  
runtamen nunquā  
eò deueniam, vt af-  
feuerem, hoc apud  
Græcos legitimi Eu-  
patorii nomen sibi  
asciuisse : tantum  
illud abest, vt crā-

EUPATORIUM  
AVICENNÆ.

à nullo, quantum equidem inuenerim, vere-  
rū sub alio nomine posteritatis memorie pro-  
durum sit, præterquam ab Auicenna. Ruellius  
tamen nescio qua ratione ductus in suis de na-  
tura stirpium commentariis non sine magno  
errore sibi persuasit, vulgare hoc Eupatorium  
du bio procul hydropiper esse à Dioscoride li-  
bro secundo descriptum. Sed nos ibi in nostra  
hydriopiperis commentatione Ruellij errorem  
laciis explosimus, quā vt quicquam super sit  
addendum. Ceterum Mesues quoque habet  
suum peculiare Eupatorium, quod, vt ex eius  
descriptione apparet, à prædictis longè diuer-  
sum est. Id namq; plures ab radice emittit cau-  
les: foliis minori centaurio similibus, per ambi-  
tum lacinia: floribus aureis, in umbellam co-  
hærentibus, helichryi modo. Hoc nostratibus  
Senensis vulgò vocatur herba Giulia. Huius  
comam mulieres per noctem vino albo mace-  
rant, & subinde diluunt pueris potandum præ-  
bent dimidij cyathi mensura ad accendos ver-  
mes admirabili successu. Nascentur hæc in cam-  
pestribus atq; vt mea fere opinio, ea est planta,  
quæ Dioscoridi ageratum dicitur: quippe quæ  
omnibus notis illi respondeat. Hinc itaq; ad-  
discant Mauritanorum sequaces, cūm tunc ha-  
beantur plāta nomine Eupatorii, in medicamē-  
tis à Mesue relictis suū interpretare. Eupatorii  
in Auicenna remedia suis quo item vti: & in Græ-  
corum compositiones Agrimonia vulgò voca-  
tam addere. Sed animi aduertat velim ne in hoc  
Valerij Cordi dispensationem sequatur, quòd  
perpe-

Eupato-  
rium Auicē-  
næ.

Eupato-  
rium Me-  
sues.

Cordi &  
Fuchij  
et  
perpe-

perperam, meo quidem iudicio, scribat in confectioe pillularum aggregantium, quin & in syrupo de Eupatorio, pro ipsius Mefus Eupatorio admiscendam esse Gratiolam. Siquidem hæc præterquam quod alium magno incommodo deiciat, nullis etiam planè notis, ac reliquis facultatibus illud repræsentareprehenditur. Nempe sua deiectiona vi, qua magno cum impetu ventrem soluit, secur imbecillum, atque infirmum reddit. Cordum secutus videtur Fuchsius, vir alioqui doctissimus, in libro de compositione medicamentorum, quem postremo auctum edidit, ubi in antidoto è lacha magna illud Eupatorium vsurpandum esse tradit, quod a Mefus describitur, & Græcis ageratum, Italis verò gratia Dei nominatur. Quæ in re illud de iis duobus viris (pace eorum dixerim) dici posset, quod est in communi proverbio: Cæcus cæcum ducit, & ambo in foueam cadunt. Eupatorii meminit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. Eupatorium herba tenuium partium, incidendi extergendique facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. quocirca obstructions iecoris expurgat. Inest & adstrictio modica, propter quam robur visceri addit. hætenus Galenus. Est & herba Agrimoniz non dissimilis, quæ nonnullis

*Eupatorium  
Scribitur  
Galenus.*

POTENTILLA.

*Potentilla  
descripta  
est Viris.*



*Nomina.*

Nascitur in viginosis locis, & propter semitas. Vniuersa hæc planta adstrictoria, & exiccatoria facultate pollet. Idcirco mulierum profusio, & dysenterias cohibet, & vulnera recentia agglutinat. Prodest item & sanguinem reicientibus. Tundendorum, & oris vlcera sanat. Firmat commotos dentes, stringitque gingiuas, & dentium dolorem mulcet, si eius decoctio so sæpius colluatur. Herba quæ Græcis *donarigis*, & *harigis*, Latinis item Eupatorium & Hepatorium appellatur: Arabibus, Cistis, Cist, seu Gaset: Italis, Agrimonia: Germanis, Ode-men: Hispanis, Agramonia: Gallicis, Aerimonia.

QUINQUEFOLIUM.

CAPVT XXXVIII.



QUINQUEFOLIUM ramulos fert festucarum similitudine, tenues, dodrantales, in quibus semen, folia mentha, quæ singulis pediculis, rarè plura, in ambitu ferrata: florem excandido pal-

lescentem, auri æmulum. Nascitur in riguis, & aquariis ductibus. Subrubram habet radicem, oblongam, veratro nigro crassiore. plurimis pollet remediis. Ius radicis decoctæ ad tertias, si in ore contineatur, dentium dolores sedat: putrida oris vlcera, collutione sistit: arteriæ scabritias, gargarizatu leuigat: contra alui profusiuia, & dysenterias auxiliatur: item articulorum coxendicumque cruciatibus potum. Cocta in aceto, & illita, serpentia vlcera cohibet: strumas, tumores, duritias, abscessus, & collectiones discutit: ignes sacros, redunias, condylomata, pforasque sanat. Tenet radices succus, contra iccinoris, pulmonumque vitia prodest: item aduersum venena. Cum hydromelite autem, vel diluto vino, & piperis exiguo, bibuntur folia contra febrium circuitus: in quartana quidem, quaternum ramulorum folia: in tertiana verò, ternum: in quotidiana, vnius. Ea quoque folia tricenis pora digbus, comitialibus profunt. Foliorum succus tribus cyathis aliquot dies potus, colerrimè regio morbo medetur. Illita cum melle & sale, tam vulneribus, quàm fistulis remedio sunt: enterocelicis auxilium præstant. Quinquifolium sanguinis profusiuia & per-

& illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

Quinque-  
folij prole  
m

## DIAPENSIA.



TAM ET SI  
vnius tantum Pen-  
taphylli, siue Quin-  
quefolij memine-  
rit Dioscorides,  
nos tamen qua-  
tuor eius genera  
vidimus in Italia.  
Quorum vtiq[ue]  
primum à Diosco-  
ridis historia nihil  
prorsus dissentit.  
Secundum à primo  
differt, quòd  
foliis sit albican-  
tibus, hirsutis, & flo-  
re candido. Ter-  
tium folio erum-  
pit paruo, sub-

albido, per terram repit. Vitium verò folia  
fert virginea, in partes visque diuisa, quod  
aliqui DIAPENSIA, alij Saniculam ap-  
pellant. Huic in cauliculis summis viribus, &  
adnatorum fastigiis, capitula prodeunt subalbi-  
da, facie fragis similia. Primum prouenit in ri-  
guis, & scrobibus marginibus, cauliculis tenui-  
bus, floribus aureis, è quibus subinde semen  
oritur. Pediculus è se mitit, & in singulis qui-  
na folia oblonga, menthae ferè amula, in ambi-  
tu tamen magis serrata. Radix illi subrubens  
apparet, quod quauis negat Brasauolus, id ta-  
men aliis, vt mihi eam effodienti, verum esse  
deprehenditur. Hæc in plures radículas diui-  
ditur, elleboro nigro crassiores. Hinc autem  
mirari subit Manardum Ferrariensem virum  
alioqui huius nostræ ætatis ingenio, & doctri-  
na insignem: quippe qui tam facile sibi persua-  
serit, id legitimum esse Quinquefolium, quod  
Græci heptaphyllon, officinæ verò herbario-  
rumque vulgus Tormentillam dicunt. Siqui-  
dem hæc septem ex vno tantum cauliculo pro-  
fert folia: Pentaphyllum vero quinque, vnde &  
illi nomen. Hoc radices elleboro similes habet,  
crassiores tamen, oblongas: illa verò admodum  
breues, strumofas simulque in vnum compactas  
globum. Gignitur hæc plerumque in incultis,  
sticticosisque locis, in aleis præsertim monti-  
bus: illud verò in campestribus, & prope aquæ  
ductus, & in riguis. Quæ sanè omnia aperte de-  
clarant, hæc in re Manardum cæcueruisse. Cæ-  
terum nunquam admirari sum Plinium in  
hoc (in quo tamen à Leonico, vt arbitror,  
immeritò reprehenditur) quòd libro x x v  
capite x tradiderit reperiri Quinquefolium,  
quod fraga gignendo commendatur. Quando-  
quidem (vt paulò antè diximus) Quinque-  
folij genus est, quòd à quibusdam Diapensia.

Manardi  
erratum.

nominatur, in cuius summis cauliculis capitu-  
la spectantur fragis non dissimilia. Verùm essi  
asserit Brasauolus in Veronenf agro nasci Fra-  
gariam, cui quinque vnicuique pediculo infunt  
folia, & quæ fraga gignit, in cibis gratissima, pu-  
tæque de hac intellexisse Plinium, quòd à Ve-  
rona, vt ipse inquit, fuerit oriundus, non tamen  
ita planè cum à calumnia vindicari posse puta-  
mus, cùm Suetonius Tranquillus suo de illus-  
trium virorum catalogo, Plinium Nouoco-  
mentem fecerit, non Veronensem. Quarta hæc  
Quinquefolij specie Germaniæ chirurgici maxi-  
mè vtuntur ad intrinseca vulnera, enteroce-  
las, & fistulas, eius puluerem, vel decoctum po-  
tuit exhibentes. Quinetiam ad morbos omnes,  
vbi adstringenti, solidantique medicamine sit  
opus. Est tamen non ignorandum, hoc non esse  
Saniculam illam, quæ etiamnum quinis exori-  
tur foliis, radice alba, miro naturæ artificio la-  
cinata, de qua superius in symphyti mentione  
differuimus: sed aliud longe differens. Quin-  
quefolij vires retulit Galenus libro v i i i. Sim-  
plicium medicamentorum, his verbis. Penta-  
phylli radix, inquit, desiccatur vehementer, mini-  
mum verò acris est. Quare in multo est vsu, ve-  
lut alia quoque omnia, quæ cùm sint tenuium  
partium, citra morsum desiccant. Est enim hæc  
radix desiccatoria ex tertio quodammodo or-  
dine, minimum habens euidentis caliditatis.  
hæc Galenus. Cæterum quoniam Pentaphyl-  
lum Fraga nobis in mentem redegit, cùm ea  
sint tam cibis, quàm medicamentis idonea, ideo  
& res, & locus mihi expetere videtur, vt hic  
tum plantæ, tum fructus eius vires perstringa-

Quinque-  
folij vires  
ex Galen.

## FRAGARIA



mus. FRAGA-  
RIÆque plan-  
ta est nemini ferè  
non cognita, addo  
res.

vt hoc nomine su-  
peruacuum pu-  
tem, eius faciem  
representare. Re-  
frigerat ordine  
primo, siccatque  
secundo. Folia, &  
radix vulnera, &  
vlcera sanant: mu-  
liebres fluxus, &  
dysenterias cohi-  
bent, vrinã cient,  
& lieni conse-  
runt. Herbæ, &  
radicum deco-  
ctum potum, au-

xiliatur iecinoris inflammationibus, man-  
datque renes, & vesicam. Idem ore con-  
tentum, collutionisque modo agitarum, gingi-  
uas roborat, dentes commotos firmat, & de-  
stillationes sistit. At Fraga præter id quod gu-  
stui æstare in cibis ardeant, biliosis, æstuan-  
tibusque ventriculis profunt, sticticosisq[ue] firmi-  
sedant. Vinum, quod ex illis elicitur, vlcusculis,

quæ

quæ in facie à caliditate proueniunt, mirificè medetur: itemq; varos, & oculorum nubeculas, calidasq; defluxiones impositum tollit. Neque etiam hic silentio dissimulanda videtur Euphrasia deli-  
*Euphrasia deli-*  
*neatis, &*  
*Gries.*  
phragia, quam nobis Fraga nunc ob vocabulo-  
rum vicinitatem ad memoriam reuocari, cum  
& ipsa miris ad oculorum morbos viribus præ-  
dita sit: etsi à veteribus Græcis nusquam, quod  
legerim, descripta reperitur. Est itaque *EUPHRA-  
GIA* tenuis planta, quæ ad palmi alti-  
tudinem affurgit: foliis minutis, cris-  
pis, per ambitum serratis, gustu ad-  
stringentibus, paululumque amaris: caule exi-  
tenui, rubentique flore inter purpuram & au-  
rum albicante, quæ emittit abeute ælla-  
re, nascitur in pratis. Præstat hæc quo-  
cunque modo sumatur tamen cibus, quam in medica-  
mentis recens, vel exiccata ad omnia impedimenta, quæ oculorum claritati officit, præsertim cum in cibus diu-  
tius sumitur. Fit ex ea vinum vindemiarum  
tempore, vis & musto macerata, de quo Ar-  
naldus in hunc modum disseruit. Euphrasia vi-  
num, inquit, fit ad oculos ponendo herbam  
in musto donec fiat vinum. Cuius vsu oculi  
senum reiuuentsunt, & austeri impedimentum  
eorum, & defectum visus in quocunque cuius-  
vis ætatis homine, præsertim vbi pinguedo, &  
pictura redundant. Et est qui permansit nihil  
videns per longum tempus, & infra annum,  
eius vsu restitutus est ad visum. Ipsa enim her-  
ba calida est & sicca: & habet hoc à proprietate,  
quod quando pulvis eius comeditur cum  
ouorum vitellis, idem mirificè præstat, vel  
quando pulvis idem recipitur cum vino. Et super-  
sunt testes fide digni, qui fecerunt in se ipsis;  
& qui non poterant legere sine oculariis, & le-  
gerunt postmodum absque ipsis, etiam litteram  
subtiliorem. Et vsus vini Euphrasiæ non ha-  
bet par in proficiendo visui. Si autem vinum  
esset nimis forte, temperetur cum aqua foeniculi:  
& si opus est, addatur zucharum necessarium.  
Hæc Arnaldus in libro de vinis. Herba  
*Nomina.*  
*ἑννέφυλλον* Græcè, Quinquæfolium Latine  
dicitur: Italicè, Cinquefoglio: Germanicè,  
Vveis funf, & Fingelkaut: Hispanicè, Cinco  
en rama: Gallicè, Quinte sueille.

## EUPHRAZIA.



*Nomina.*

PHOENIX. CAP. XXXIX.

PHOENIX folia habet hordei, sed

## PHOENIX.



breuiora, & angustiora: spicæ lollio similis: calamos digitorum senum, radiciad uolutos: septenas octonasve spicas. In aruis, tectisque recen-  
ter illitis nascitur. Harum virium còpos, vt in vino austero pota alui profluuium, & emanatæ vulua sanguinis sistat, vrinæ impetus infrænet. Sunt qui adalligatam in puniceo vellere, & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

breuiora, & angustiora: spicæ lollio similis: calamos digitorum senum, radiciad uolutos: septenas octonasve spicas. In aruis, tectisque recen-  
ter illitis nascitur. Harum virium còpos, vt in vino austero pota alui profluuium, & emanatæ vulua sanguinis sistat, vrinæ impetus infrænet. Sunt qui adalligatam in puniceo vellere, & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

PHOENIX Hæcuscis syluestre Lolium di-  
citur, quod spicas proferat lolio similes. Nasci-  
tur frequens in vicis secus vias, in agrorum  
marginibus, & in temporum plateis: quæ quid-  
em nulla prorsus repugnantia nota Dioscori-  
dis descriptioni adscriptari deprehenditur. Pli-  
nius libro x x i i. cap. x x v. Phœniceam her-  
bam ita à Græcis appellatam, à Latinis lolium  
murinum vocari ait, quod fortasse mures derod-  
ent spicas illius, quæ in ædificiorum tectis pro-  
uenit. Hæc frequentissima visitur Goritiæ in  
cœmeterio diui Francisci, & Venetiis in litore  
maris prope sacellum diui Nicolai. In summa  
eius vber vbiq; prouentus. Huic herbæ no-  
men Græcum *φωινίς*, Latinum similiter Phœnix,  
Lolium murinum, & Hordeum murinum: Ita-  
licum, Gioglio saluatico, Gallicum, Iuraye  
sauuage.

IDAEA RADIX. CAP. VI.

IDAEAE radici folia sunt ea, quæ  
rusco: adherent iis veluti exigui cap-  
reoli, è quibus flos. Radix spissandi  
naturam habet, his conueniens, quibus  
adstrictione opus est. Pota, citam alu-  
um, mensesque, & omnem abundan-  
tiam sanguinis sistit.

IDAEA radix hodie, quod sciam, ad nos *Idæa*  
non conuenit: nec quenquam hætenus re-  
peri, qui scribat, vbi hæc planta proueniat: etsi  
cognomine natale eius solum faciliè indicari vi-  
deatur,

deatur, quòd scilicet in Ida monte, qui ad Troa-  
dem spectat, nascatur: vel in eo eiusdem no-  
minis, qui in Creta habetur, vt etiam Idæo  
rubo euenire superius dictum est. Huius vires  
tradidit Galenus libro v. simplicium medi-  
camentorum, sic inquit. Idæa radix gustu  
admodum acerbæ est: ac si opere periculum fac-  
ias, eandem vim præferre, nimirum sanguinis  
profusio, alui fluxus, dysenterias, profusum  
mulierum, & quæcumque eius sunt generis tum  
pore, tum foris imposita curans. Ea vt Græcis  
Idæa, ita etiam Latinis Idæa radix voca-  
tur: Italis, Radice Idea.

## RHODIA RADIX.

## CAP. XII.



**GIGNITVR**  
Rhodi radix in  
Macedonia co-  
sto similis, le-  
uior, inaquabi-  
lis: quæ contri-  
ta rosas redo-  
let. Vtilissima  
capitis dolori-  
bus, si madafa-  
cta frôti, & tem-  
poribus cum ro-  
facei momento  
imponatur.

**RHODIA** radix planta est non omnibus  
plânæ vulgaris, & cognita in Italia: est ea fa-  
cile in Gergano, & Gergano montibus nasci,  
& tangeri possit. Quæ in nostro horro Goritæ  
viti, iunctu eam Gratio Styriæ oppido Petrus  
Sollicæus medicus clarissimus, & in simplicium  
taxi acie non imperitus, ad nos primum viden-  
dam misit: quam tamè postea frequentissimam  
reperi in monte magno supra Vipacum, qui cir-  
ca viginti millia passuum à Goritia distat.  
Cuius in quam paucis sitis notis eam per-  
spicimus. Dicores, vt ab omnibus facilius &  
reperi possit, nos non temerè fa-  
cturne sumus, si eius historiam hic diffusius  
trahamus. Radix itaque Rhodia caules emittit  
rotundos, quadrantes concavos, cubitales, à  
quibus circumquaque folia prodeunt longiuscula,  
in ætate densius, portulacæ, aut ibi in-  
ter pinguia, minutiusq; per ambitum serrata.  
In caulis cacumine umbellam præfert, viri-  
dem cithymali cyparissij modo, sed quæ, vbi  
deseruerit, rubescat. Radix et inæqualis, ru-

mosa, crassa, qualis costæ, laui cortice quæ re-  
cens est, exterius splendescens, & intus subal-  
bida: quæ verò sicca est, lauis percipitur, intus  
rubens, & foris squamosa. Mansa hæc recens,  
aut tria odore mirum in modum rosas refert:  
vnde merito ei Rhodiæ nomen. Præterea om-  
nium radicum viuacissima est: quippe quæ è  
terra effusa, nisi locis perquam siccis repona-  
tur, post multos menses rursus plantata statim  
repullulat. Nascitur in altissimis montium ru-  
pibus saxosis, præruptisque locis, vbi vix tan-  
tum terræ circum habet, vt illi inhærere possit.  
Valet hæc ad capitis dolores à quacunque cau-  
sa prominentes, si recens contracta, & rosacea  
aqua persusa, vbi calidus sit affectus, aut cum  
amaraci aqua, si frigidus sit morbus, fronti tem-  
poribusque illinatur. Cerebrum roborat odo-  
ris iucunditate, conuenitque (vt diximus)  
omni capitis dolori, vapore quæ temperatis sit  
qualitatibus prædita: id quod indicat rosaceus  
eius odor, quo nitrificæ redolet. Rhodiæ ra-  
dicis meminit Galenus libro viii. simpli-  
cium medicamentorum, sic de eius viribus  
scribens. Rhodia radix ea videlicet, quæ in Ma-  
cedonia nascitur, tenuum partium, & dissec-  
tionis est facultatis. In calcescendo verò se-  
cundi recessus censenda est, aut certe tertij  
incipientis. Hæc planta Græcè ῥοδία ῥίζα, Latine  
Rhodia radix nominatur: Italicè, Radice  
Rhodia: Germanicè, Rosen wurtz.

## EQUISETVM. CAP. XIII.

EQUISETVM  
PRIMUM.

**EQUISETVM**  
in riguis, & scro-  
bibus nascitur.  
cauliculi pro-  
deunt inanes,  
geniculati, in se  
sarcati, rubescen-  
tes, leniter sca-  
bri: & iuxta cir-  
ca eos folia, cre-  
bra, exilia. In su-  
blime attolli-  
tur, vicinos ar-  
borum candices  
scandens, obuo-  
luntumq; depen-  
det comis mul-  
tis, nigris, vt equorum cauda: radix li-  
gnosa dura. Vis herbæ spissare: quare  
sanguinem naribus erumpentem succus  
ipse sanat

vis herbæ spissare: quare  
sanguinem naribus erumpentem succus  
ipse sanat

## EQUISETUM ALTERUM.



ipse ficit: prodest dysentericis in vino potus: urinam cit-Sanguinolenta vulnera glutinantur, tritis foliis, & illitis. Radix cum sua herba tussim, orthopnoeam, ruptaque adiuuat. Foliis in aqua potis, dis-

sectiones vesicæ, & intestinorum, enterocelæque in unum coalescere, cogique feruntur. Alterum Equisetum caulis est rectus, cubito maior, inanis: comis per intervalla brevioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum, vulneribus remedio est, eademque fungitur facultate.

*Equisetum confidera-  
tio.* **EQUISETUM** officinis, & herbariis plerisque verbum Græcum reddentibus Cauda equi na nominatur. Vtunque eius genus vulgaris est notitia. Alterum, quod aspero sit caule, à quibusdam vulgo Asperella vocatur. Expetitur hæc mulieribus ad stagna vasa detergenda, illustrandaque, necnon etiam materiaris fabricis, iis præsertim, qui toro opera sua faciunt: siquidem huius herbæ scabritia illæ suis vasibus splendorem, nitoremque conciliat: isti verò similiter suorum operum rudicatem expoliunt. Primum autem Caudam equi omnes ferè appellant, quod facie equorum caudas referat, unde & Græcis Hippuris dicta est. Proferit hæc, cum primum è terra erumpit, quoddam tenerum germen, oblongum, iuglandium iulo non absimile. Hoc rura nostra vulgo vocant Palerufalo, in cibumque assumunt, ieiunij quadragesimalis tempore. Etenim illud prius elixant, mox farina circumspargunt, & oleo in sartagine frigunt, manduntque piscium vice. Ex quo cibo aliis quandoque eorum adeo constringitur, & coarctatur, ut in coli cruciatum facile incurrant. Sunt qui primum hoc Equiseti germen siccum afferunt, per annum, quo subinde restat vtiatur ad dysenteriam. Quippe quod aqua calida nocte maceratum eo modo decoquant, quo dictum est, & in cibum magno succellu exhibent. Vtunque Equisetum eleganti admodum pictura expressit Fuchsius clarissimus in suis magnis de stirpium historia commentariis. Sed nescio qua postea ratione du-

ctus, is in parvo libro, in quem plantarum imagines duntaxat depingi, & imprimi curavit, primi generis Equisetum pro Polygono famina aperto lapsu reddiderit. Equiseti meminit Galenus libro 7. simplicium medicamentorum, ubi eius vires recitat his verbis. Hiopura, inquit, adstringentem cum amaritudine fuculentam possidet, ac proinde valenter, simulque citra mordacitatem exsiccatem. Itaque vulnera maxima cataplasmate imposita conglutinat, etiam si præfectos esse nervos contingat: præterea vocatas enterocelas glutinat. Cæterum ad sanguinis resectionem, ad profluviū mulierum, potissimum rubrum, ad dysenterias, & ad alios ventris fluxus generosum est remedium herba ipsa aut ex aqua, aut ex vino pota. Sunt qui de ea scriptum reliquerunt, quod nonnullum etiam vesicæ, ac tenium intestinorum vulnera succus ipsius sanauerit. Prodest etiam profluviū sanguinis ex naribus, tum fluxui obnoxii in ventre affectibus ex ætheriorum viscerum quopiam potus: ac si fere teneantur, ex aqua. Quæ planta Græcis *ἵππων*, Latinis Equisetum appellatur: Arabibus, Dhenben alchail, Dhenib alchi, siue Daneb alchail: Italis, Coda di cavallo: Germanis, Rosßschwanz: Hispanis, Coda de mula, & Rabo de mula: Gallicis, Queue de cheval, & Puelle, vel. Cheualline.

*Equiseti  
vires  
et  
Oleum.*

*Nomina.*

## COCCUM INFECTORIUM.

CAPVT XLIII.



**COCCUM**, quo infectores vtuntur, frutex est surculosus, parvus, cui grana ceu lentes adherent, quæ electa congeruntur. Optimum gignitur in Galatia, & Armenia: deinde Asia, & Cilicia: vltimum

ex omnibus Hispanicum. Vis huic spissandi: vulneribus, nervisque præcisis, conuenienter ex aceto tritum illinitur. Nasctur quoque in Cilicia quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & coccum vocitant.

Et si Coccum seu granum tinctorium se-  
placariis, & infectoriis notissimum sit, quia  
& medicamentis amiscetur, & prima  
tum

*Contra  
scorbutum  
et  
Pleuriam.*

tum sericea, tum lanca stamina infici soleant, nescio tamen an eius arbuscula in Italia proueniat. Nos autem eam, cuius picturam damus, vidimus ex Byzancio allatam. Porro Coccum tinctorum communis vsus constat rotunda, inanisque bacea, quæ nullam profectò lentis faciem refert, vt Dioscorides asserit. Vt hinc plane coniectare liceat, Coccum hoc diuersum esse generum, nostrumq; facile illud esse, quod Plinius in Attica, & Asia prouenire tradit, scollectione ideo vocatum, quoniam ex eius medulla tenues exoriuntur vermiculi: argumento quòd hoc inane intus deprehendatur. Huius puluere non infelicitè vtuntur mulieres Italice ad prohibendum abortum, ipsum grauidis in ouo torbili propinquantibus paucò addito thure, vel mastiche. Cæterum contendunt Monachi illi reuerendi, qui in Mesium commentarios ediderunt, aliud esse Coccum, aliud verò Chermesinum vulgò vocatum, quo serica stamina roseo colore inficiuntur. Etenim asserunt ij legitimum chermesinum equibuscum fieri granulis, quæ vt plurimum vulgari Pimpinellæ radicibus adhaerentia reperiuntur, vocarique hæc propriè Mauritanis Chermes: & hinc isti deinde colligunt, minime credendum esse, quòd Græcorum coccum vulgò grana tinctorum nuncupatum, sit Mauritanorum chermes: quandoquidem magna omnino inter colorem coccineum, & chermesinum intercedat differentia. Sed hos patres hallucinari (pace tamen eorum dixerim) ex eo equidem euidentissimum fieri arbitror, quòd hæcenus neminem Arabicæ sectæ inuenerim, qui eorum adspiciatur sententiæ. Siquidem Serapio per chermes nil aliud intelligit, quam coccum tinctorum à Græcis appellatum, cum de Chermes agens ea sanè omnia in eius historia referat, quæ Dioscorides suo cocco tribuit. Quapropter scirem libentissimè qua ratione, cuius auctoritate nixi ij reuerendi monachi in hanc vanam, & errorum cascade decuerint opinionem. Verum non ob id negauerim ego nostrum Chermesinum à cocco minime differre, quòd cerò seriam, aliud esse coccum, aliud chermesinum, vnde & infiores differentie causa coccum Granam nuntupant, Chermesinum verò, quòd è pimpinellæ radicibus decerpitur: sed negauerim quidem Mauritanorum chermes nostri vsus chermesinum esse, quòd nil aliud Chermes esse putem, quàm Coccum, cuius hic meminit Dioscorides. Chermesinum nouum iam pridem conuehitur in Italiam ex Hispaniis ab occidentali India importatum; quod cum copiosissimum asferatur, Chermesina, stamina nunc viscere cæperunt. Cocci seu Grani insectorij vires descripsit Galenus libro v. 11. simplicium medicamentorum, his verbis. Granum tinctorum adstringentem, simulque amarum facultatem possidet. Viraque sine morfu desiccet, p.oinde ad ingentia vulnera congruit, præsertimque nervorum. Sed tunc ipsum quidam cum aceto

terunt, alij cum oxymelite. Quæ nomen hæc Nomina, Græcè, Latine pariter Coccus baphica, & Granum insectorium nominatur: Arabicè, Char-men, Kermes seu Chermes: Italicè, Grana de tinctori: Germanicè, Scharlachher: Hispanicè, Grana para tennir, & Grana en grano: Gallicè, Vermillon, vel. Graine d'Escarlante.

TRAGIVM. CAP. XLIII.

TRAGIVM nascitur in Creta tantum insula, lentisco semine, folio, & ramis simile, singulis tamen minoribus: succus ei lacteus, gummi non dissimilis. Semen, folia, lacrymaque illitu spicula è corpore eiciunt: omnia quoque corpori impacta, euocant: pota stranguriæ medentur, calculos vesicæ trahunt, menses trahunt. modus in sumptione est, drachma vna. Fama est sylvestres capras sagittis confectas, eius herbæ pabulo spicula excutere.

TRAGIVM ALTERVM.

CAPVT XLV.

EST ET alterum Tragium, quod tragoceros aliqui vocant: folia scolopendrij habet, & radicem sylvestris raphani, tenuem, candidam. Quam crudam vel coctam esse dysentericis prodest. Folia autumnò, hirci virus olent: exinde sibi tragij nomen adoptauit. Prouenit in montibus, & præcipitiis.

TRAGIVM, quod in Creta tantum nasci tradit Dioscorides, quòdque in vniuersum lentisco simi è facie, Plinius libro x. 11. capite x. 1. ipsum fruticem terebintho similem reddidit, & libro x. 11. capite vltimo, idem iunipero assimilauit. Id quod dubio procul offendit, Tragium hoc omnino illi fuisse ignotum, & quòd tantum id de eo memorie prodiderit, quod ab alijs auctoribus non minus fortasse hæc in re cæcipientibus mutuatus est. Hoc ætate nostra non desertur, quod sciam in Italiam. Quo fit, vt id mihi hæcenus sicut & cæteris herbarum studiosis, vt ferme suspicor, sit in Italia incognitum. Quod autem secundo loco à Dioscoride representatum est, id potius hæc habere crediderim, quam arbuticulam, cum eius radix tam cruda, quam cocta in cibum veniat, sitq; sylvestri raphano proxima. Veruntamen nondum reperi qui plantam mihi demonstraret. Folia scolopendrij similis us, quæ hirci virus olcant. Ex quo adducor, vt ab iis plane differat

Tragij con  
suetudo.


Alenachor  
vni opio.  
explicsa.

Grani tin  
ctorij &  
res ex Ga  
leno.

Opinio et  
probat.



## PIMPINELLA SAXIFRAGIA.

Pimpinella  
la genera.  
et virt.PIMPINELLA  
VULGARIS.Pimpinella  
la vulgaris.  
et virt.

dissecti, qui putant Tragum hoc cam esse plantam, quam quidam Pimpinellam, quidam verò ab odore Saxifragiam hircinā appellant. Quandoquidē huic scolopendrij folia nō insunt, nullāque eius ad dysentericos vsus, tametsi ad ciendam vrinā, expediendosq; viscerū infarctus plurimū præstet. Huius PIMPINELLÆ duo habentur genera. Maior radice nititur longioris foliis circūque

solo procumbentibus, dissectis, perambitumq; serratis: caule quadrangulari: floribus in umbellā coherentibus, tenuibus, albicantibusq; Minor caule exit rubet: foliis minoribus, minus dissectis, minutiusq; serratis. Vtraq; tamen hircum redolet. Radix, in qua vis tota consistit, exal-

cit, siccataq; ordine secundo completo, aut finē tertio incipiente. Præstat hæc ad renum, & vesicæ morbos, quorum calculus est causa. Quod id enim renes à calculi expedit, & vrinam remorata pellit. Prodest expressus ē radicebus succus ex vino haustus, deleteriis medicamentis, & venenosorum animalium moribus. Quia ratione non desunt, qui ad pestilentiam, radicem hanc miris laudibus efferrant. Est & alia Pimpinella, quæ à nostris vulgò SOBRASTRELLA nominatur, nullis non cognita, utpote quæ acetariis frequentissimè insertitur. Verum hæc ab antedictis longè distat viribus, etsi foliorum facie satis inter se conueniant. Siquidem vltima hæc gustata non leuiter adstringens percipitur, & lentoris copiam præbet. Vnde facillè consiicitur, eam esse adstrictioris facultatis. Hinc itaque fit, ut muliere profluum efficacissimè sistat: dysenteriam, & cæteros alui fluxus cohibeat: quin & biliosas vomitiones reprimat. Herba ipsa vulnera, & vlcera sinat: misteturque inguentis, quæ tum ad capicis vulnera, tum ad carcinomata parantur. Hanc

Matthæus Curtius clarissimus ætatis nostræ medicus, contagiosis, pestilentibusque febribus maximè commendauit. Sunt qui eam Eiatinen esse putent. Sed ij, meo quidem iudicio, aberrant, ut supra etiam in sua mentione docuimus. Tragij meminit Galenus libro Tragi v. 1. 1. simplicium medicamentorum, ubi hæc de eius viribus tradit. Tragij, inquit, folia, semen, & lacryma trahentis, digerentisq; sunt facultatis. Est verò & tenuium partium, & facultate in principio tertij ordinis calida. Corpori infixa extrahit, lapides frangit, menses mouet drachmæ pondere potum. Porro in Creta sola nascitur tragion lentisco simile. Cæterum alterum Tragium hoc minus, cuius folia scolopendrio similia sunt, vistrum quidem multis in locis: sed non parum habet scilicet adstringentis, ut & ad fluxionum affectus conueniat. Vtraque planta Græcis τράγος, quæ admodum & Latinis Tragum appellatur.

Nomen.

## TRAGVM. CAP. XLVI.

Est etiam herba tragos, quam aliqui scorpion, aut traganon vocant: maximè in maritimis nascens, palmū alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine foliis: pusillis circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum acini decem ex vino poti, celiacis, & foeminis fluxione vuluæ laborantibus, auxilian tur. Tunduntur à plerisque, & in pastillos digesti asseruntur: quibus vtuntur, cum opus est.

## TRAGVM.

TRAGVM Tragi con  
siliatio.

Spinosarum, inquit, multa species. In totum spinosa est asparagus, scorpio: nullum enim solum

folium habet. Id quod ante ipsum posteritatis memorie prodiderat Theophrastus libro v. capite primo de historia plantarum, cum inquit. Aculeatorum alia ex toto aculei sunt, ceu corruda, & scorpius: hæc enim nullum præter aculeum folium gerunt. Hinc itaque omnibus abunde constare arbitror, herbam, cuius hic effigiem damus, legitimum esse Tragum. Ea siquidem in maritimis nascitur (plurimum enim in Tergetino litore prouenit, & ad Argentarium promontoriū in Hæturia) nulla profus reclamante nota ex iis, quas rei herbarie auctores Trago reddiderunt. Huius tamen nusquam, quod iuuenierim, meminit Galenus in simplicium medicamentorum censu.

*Nomina.* Herba hæc *ῥάγος* & *σκορπιός*. Græcè dicitur: Latine item Tragus & Scorpio.

I. Y. N. C. V. S.

CAP. XLVII.



IVNCI duo genera. vnum læuis nominati: alterum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera. vnum sterile: reliquum fert semen nigrum, rotundum, & cras-

nore contritacalamo, carnosioréque. Tertius est iuncus, qui vocatur oligoschenos, prioribus carnosius, asperiorq;: is similem supradicto fructum in cacumine parit. Semen vtriusque tostum, ex diluto vino potum, sistit aluum, & rubra sceminarum profluua: vrinam cit, capitisque dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur aduersus phalangiorum morsus. Athiopici iunci semine somnus allicitur: sed modus in portione seruandus est ne sopor fiat.

*Paracelsus*  
*proscissus*

*Corne* I. Y. N. C. V. S. omne genus vulgare est nomine Galienus quandoquidem propter stagnantes aquas

omnes eius reperiuntur species. Iunci generum meminit Galenus libro v. i. i. i. simplicium medicamentorum, vbi de iis ita scriptum reliquit. Schornos læa, hoc est, Iuncus læuis, quædam oxyfchenos, alia oligofchenos nuncupatur. Gracilior, duriorq; oxyfchenos: crassior, laxiorque oligofchenos. Fructus oligofcheni somnū avertit. At oxyfcheni duæ sunt species: altera sterilis, cuius quidem in medicina nullus usus est: altera verò semen fert, cuius etiam semen somnū conciliat, sed minus quàm oligofcheni: quanquam tamen hoc caput tenet. Vtrunque si frictum cum vino bibatur, ventris fluxus desiccat, & muliebre profluuium rubrum sistit. Ex quibus clarum est, quod composita eorum temperies est ex terrena videlicet essentia leuiter frigida, & aquæ leuiter calida: vt & inferna desiccare possint, & sensim frigidos ad caput vapores submittere, quibus somnoletos efficiant.

*Latine* sic Græcis, Iuncus verò Latinis vocatur: Arabibus, Dis: Italis, Giunco: Germanis, Bintzen Schmielen: Hispanis, Iuncos: Gal-  
lis, Ionc.

*Nomina*

LICHEN.

CAP. XLVIII.



LICHEN, qui faxis est familiaris, aliquibus bryon appellatur, asperginosis petris adheret, vt muscus. Is illitus sanguinis profluua sistit, inflammationes arcer, impetigini medetur. Inuat

regio morbo correptos, cum melle illitus oris, & linguæ defluxiones inhibet.

LICHEN procul dubio ea est planta, quam officinæ, & herbarij hodie Hepaticā vocant. Hanc autem Græci Lichena appellarunt, quod lichenas serpentis morbi genus, imposita sistat, & finet. Lichen in asperginosis, & rorulentis prouenit locis, nudis petris adherens, musci modo. Folio constat suppingui, cartilagineo, prope radicem angusto, in fauci se pendente, triplici vel quatriplex lacinio interfecto. Prodest à radice cauliculi tenues, quibus eripit

*Licheni*  
*considera*  
*tio.*

*Lichenis  
genera ex  
Pli.*

capitula infunt parua, stellarū effigie. Lichenis Plinius libro x x v i . cap. 1111. duo produntur genera, quæ his verbis depingit. Lichen, inquit, herba omnibus his præfertur, unde nomine inueto. Nascitur in saxosis, folio vno ab radice lato: caule vno, paruo, longis foliis dependentibus, Hæc delet & stigmata: teritur cum melle. Est aliud genus Lichenis petris tantū adhærens, vt muscus, qui & ipse illinitur. Hic & sanguine fistit vulneribus instillatus, & collectio nes illitus. Morbum quoq; regium cū melle sanat ore illito, & lingua. Qui ita curentur, aqua falsa lauari iubetur, vngi oleo amygdalino, horrentibus abstinere, hæc Plinius. Cæterum est herba Licheni non longe dissimilis, quæ in quercuum, aliarumq; syluestrium arborum caudicibus nascitur, in opacis præsertim syluis, hæc tamen aridior, & ambitu latior, superiore parte virentes, inferiore vero pallescentes, maculis quibusdam referta, adeo vt formam pulmonis referat: unde pleriq; PULMONARIA dicta est. Vtuntur hac nonnulli magis fortasse nomine quam ipsi viribus freti, ad tabem, pulmonū vlcera, & cruenta sputa. Nec desunt qui laudibus eā effierant ad vulnera sananda, ad pudēdorum vlcera, & ad verumq; muliebri profluuium, cui mirifice mederi aiunt. Quin & eam dysentericis exhibent, & bilioso euomentibus. Est & alia herba, quæ etiam Pulmonaria vulgo nominatur, ab illa

*Pulmonaria  
via depi-  
cto, &  
Gires.*

## PULMONARIA



*Pulmonaria  
via alia.*

tamen maximè differens, in opacis proveniens, folio buglossi, aspero, hirsuto, albis maculis circumsperto. Caulis gerit hæc inuente verè, in cuius cacumine flores erupunt purpurei, perinde ac in vulgari cynoglossio. Huic plaze rei herbarie periti non contemnendas vires tribuunt, ad pulmonis vlcera sananda. Quæ in re, iteq; in sanguinis erectione mirabilis successu se eā exhibuisse mihi sæpius retulit Iulia à Marofica Teruensis medicus peritissimus, de eoquitur enim ad medias, daturq; decoctum potandum addito siccharo: vel succus ex ea expressus serapij modo cum siccharo paratus. Præstant hæc omnia herba ipsa, & flores, quoquo modo à tabe affectis sematur decocta. Lichenis meminit Galenus libro v i i . simpliciū medicamentorum, sic inquit, Lichen, qui in petris nascitur, est velut muscus quidem sed rectè ex plantarum genere censi potest. Sic autem nominatus videtur, quod lichenis seu imperigines curet. Ex-

*Lichenis  
Gires ex  
Gal.*

tergentem, ac modicè refrigeratè: facultatem habet, vtraq; verò resiccantem. Abstergentem quidem, atq; exiccantem à petra obtinet, refrigeratè verò ab humore aqueo: nascitur enim in humidis, & grauior olentibus faxis. Porro quod ex talibus substantiis componitur, aduersum esse inflammationi, nihil mirum est. Cæterum an sanguinis profluuiū fistat, vt refert Dioscorides, id neutiquam dicere queo. Quod Græcis λεχες, Latinis item Lichè dicitur: Arabibus, Azex alfacieri: Italis, Lichene: Officinæ, Hepatica: Germanis, Stein lacer kraut, & Brunnen leber kraut: Hispanis, Hepatica, & Figadella: Gallicis, Hepatique, & Porcoira.

*Nominat.*

## PARONYCHIA. CAP. XLIX.

PARONYCHIA exiguus frutex, in petris nascens, peplio similis, minor longitudine, maioribus foliis. Illa paronychii, atq; fauis remedio est.



PARONYCHIA non modò in faxis gignitur, sed etiam in veterum edificiorum parietibus, foliis peplio, aut rutæ similibus, aduersa parte pallentibus, paruisq; maculis resectis, phyllididis vel hemionididis modo. Hæc aique parietis Rutæ, alij Saxifragam appellat. Copiosissima provenit hæc in ingenti sylua, quæ in itinere est, quo Gortia descendentes petiit Labacum, Carniolæ vrbeni, vbi & in faxis, & scæcis arborum truncis frequētissima visitur. Meminit Paronychiæ Galenus lib. v i i i . simpliciū medic. ita de ea scribens. Paronychia ab effectu nominata est: nam paronychias, & vt refert Dioscorides, fauos quoq; Vis eius est tenuium partium, & exiccatoria morsu vacas: talia enim sint oportet, quæ paronychias sanant. Porro si rectè constat tale esse idoncum ad digerendos ascessus omnes, qui digerì possunt. Siquidem eiusmodi sunt, quæ cum ex tercio sint ordine exalfacientium, & desiccantium, velut & hoc, essentia insuper tenuium partium sunt.

*Paronychia  
coris  
det.*

*Paronychia  
Gires  
ex Lal.*

Planta Græcis παρωνυχία, pariter Latinis & Italis Paronychia nominatur, Gallicis, Percepierre.

*Nominat.*

## CHRYSOCOME. CAP. I.

CHRYSOCOME palmi altitudine fruticat: coma specie corymborum, hyssopo simili: radice hirsuta, veratri nigri modo, tenui, cyperum æquante: gustu non inuicundo, ex dulci austero. in petrosis, opacisque nascitur. Radix 10 excalfacit, & adstringit: his conueniens, quos iecur, aut pulmonis inflammatio malè habet. contra purgationes vuluæ, decocta cum hydromelite assumitur.

*Chrysocome cosid.*

Qy i Chrysocomen in Italia mihi ostenderet, hæcenus reperi neminem. Quamobrem in eo naturæ viridario, plantis compluribus nobis incognitis referto, quod tantu in suis ipsius vsum 10 colit natura, ne omnibus exuta medicamentis, suis etiam languoribus mederi nequeat, eam & virefcere, & florescere omittamus, donec nobis, aut aliis compertam in communem quoque cognitionem, & vsum prodere contingat. Interim tamen, vt nostrum institutum sequamur, vires eius ex Galeno subiiciam: quas ipse libro 7 111. simplicium medicamentorum, iis verbis descripsit. Chrysocome vocatur & christes. Radix vincentes acrem simul, & adstringentem 30 qualitates habet: quare neque multi vsum est. Vsum tamen est decocta in melicrato in peripneumoniis, & morbis hepaticis. Sed & mensuræ purgationis prouocandæ vim quandam obtinet. *Xgouonix* sic Græcè, vt etiam Chrysocome Latine dicitur.

*Vires ex Galeno.*

*Nomina.*

## CHRYSOGONVM. CAP. II.

CHRYSOGONVM dense fruticat, 40 quernis foliis, flore coronarij verbasci: radix vt rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ trita cum aceto, atque imposita, muris aranei moribus auxiliatur.

CHRYSOGONVM, nisi aliunde in Italiam deferatur, inter plantas, quæ minime cognoscuntur, & ipsum perpetuo recensendum esse putauerim: vel nobis in abditissimis naturæ horris, vbi delitescit, inuestigandum erit. Id siquidem hæcenus mihi neq; inuenire, neq; ab aliis compertu videre licuit in Italia. Quod 50 *Xgouonix* Græci, Latini quoque Chrysogonum dicunt.

*Nomina.*

## HELICHRYSVM. CAP. III.

HELICHRYSVM, quidam chrysanthemum, nonnulli & id amaranton vo-

cant, quo deorum simulacra coronant. Ramulum habet candidum, virentem, rectu, firmum: folia intercedentibus spatii angusta, abrotano similia: comam aureæ lucis, in orbem: umbella rotunda, veluti siccis corymbis dependentibus: radice tenui.



Nascitur in asperis, & torrentium alueis. Contra serpentium ictus, coxendicum dolores, vrinæ stillicidia, ruptaque, coma è vino pota opitulatur: ciet mensis. Sanguinem concretum ventris ac vesicæ absumit, pota cum mulso: ieiunis, trium obolorum pondere, sistit destillationes, data in vino albo diluto. Vestibus inferitur, vt eas ab erodentium iniuriis tueatur.

HELICHRYSVM copiose prouenit in Hetruria in pratis gracili solo, incultisq; locis, siccis,osis collibus, necnon etiam in fluminum 50 alueis. Caule constat recto, æquali, ac lignoso, cubitale longitudinem non excedente: foliis per interualla emergentibus, abrotani æmulis: comantibus in cacumine floribus, aureo colore fulgentibus, & in orbem umbellæ modo coherentibus, corymbacea facie, veluti myriophyllis, vel ageratis: qui exiccati aureum colorem diutius retinent. Proinde commodè hyeme, quod eo tempore flores deficiant, puellæ siccam Helichrysum coronamentis suis inserunt, quemadmodum & Amarantum purpureum, quod nostris Hetrustis vulgò dicitur Fiorueltulo. Helichrysum depinxit Fuchsius in suis clarissimis de 60 stirpium historia commentariis, folio echij aculeato, & floribus huphthalmi. Qua in pictura ipsum deceptum suspicor, quod ea Helichryso minime respondere deprehendatur. Helichrysi meminist Phinius lib. x x i. cap. x x v. vbi de eo differuit his verbis, Heliochrysum, inquit, quod alij Chrysanthemò vocant, ramulos habet candidos: folia subalbida, abrotano similia: ad folis repercussum aureæ lucis in orbem veluti corymbis dependentibus, qui nunquam marcescunt: qua de causa deos coronant illo. Quod dilig

*Helichrysum, si confideratur.*

*Fuchsius error.*



Chrysan-  
themum ca-  
pit refli-  
utum.

moræ prodidit Dioscorides. quemadmodum imprudenter de Ruta & Hyperico, Afaro & Bacchari ab aliis factum esse in præcedentibus ostendimus. Hoc itaq; argumento fretus crediderim ego hoc modo Chrysanthemum caput esse legendū. Chrysanthemum herba est tenera, fruticosa, laevis proferens caules, & folia multifida: flores luteos, admodū splendentes. Eius caules manduntur olerum modo. Flores cum cerato triti sciatomata discutere produntur. Hinc itaq; sic Chrysanthemum capite resistuto, facile patebit, quantū aberrauerint ij, qui Chrysanthemum cum Bupthalamo confundunt. Chrysanthemum, cui nulla prorsus ex modo traditis reclamet nota, frequentissimum promerit in Senensi agro prope Montē nigrum oppidum ita appellatū, est atq; ibi à rusticis veluti beta. & brassica. Bupthalamū verò et si antea à me nō visum in nostris cōmentariis Italica lingua conscriptis concessus essem, ad nos tamen hoc anno verum Patavio allatum esse superius in sua mentione indicauimus, quod etiam postea accepimus Pisis à Luca Ghino medico clarissimo, & rei herbarie peritissimo, omnibus prorsus ad stipulatis notis, quæ illi tribuuntur. Quo factū est, vt certius auzim affirmare Chrysanthemum historia auctā, deprauatūq; esse in Dioscoride. Creditit Leonardus Fuchius medicus doctissimus in suo de plantarū historia cōmentario, Chrysanthemū illud esse raniculi genus, quod folio apij, luteis floribus, in pratibus plurimum nascitur. Qua in opinione quantum, pace eius dixerim, hallucinetur, euidentius omnibus esse puto, quam vt à nobis ostendi debeat. Chrysanthemum meminisse Galenum in libris de simplicium medicamentorum facultatibus, hætenus incertum habeo. Eius nomen Græcum est *χρυσάνθεμον*: Latinum item Chrysanthemum: Italicum, Chrysanthemo.

Encler-  
vur.

Nemina

AGERATUM CAP. LIIII.



fruticosa herba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, origano maximè similis: umbellæ gerit, in qua flos bullis aureis emicat, heliocyso minor. Nomen ei indicum est, quoniā diutissime flos in sua coloris specie cōseruetur. Vis decocti seruēs: huius vstæ nidor urinā cit, & vuluæ durities emollit.

AGERATUM ALIVD.



NASCITUR Ageratum passim in vniuersa Hetruria, foliis origano proximis: floribus aureis, in umbellæ emicantibus, heliocyso modo. Hæc herba Mesius Eupatoriu existimat, vt superius in Eupatorii cōmēntatione abundè diximus. Ea à nostris Senesibus vulgò appellat herba Giulia. Agerati vires paucis perstrinxit Galen. lib.

Agerati  
considera-  
tio.

VII. simplici medicamen. sic inquit. Ageratum digerit, & inflammationes leuiter quodammodo resoluit. Quæ herba *ἀγέρω* Græcè, Ageratum quoq; Latine dicitur: Italicè, Herba giulia.

Nomina.

VERBENACA. CAP. LV.

PERISTEREON, siue verbenaca, nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse videtur, qd colubæ circa hæc perquā libet versari soleat. Dodratis altitudine, & interdū amplius adolefcit. Folia è caule prodeunt incisæ, & subalbida. ea singulari ramo, radiceq; sola, consistere sæpius inuenitur. Folia cū suilla adipe recenti, aut rosaceo imposita, vuluarū dolores finire putatur: igne sacrū illita ex aceto reprimunt: putrida vlcera cohibent: vulnera glutinant, veteraq; ex melle ad cicatricem perducunt.

SACRA HERBA. CAP. LVI.

SACRA HERBA, quæ & peristereon nominatur, ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos: in quibus ex intervallis folia querc, sed minora, angustioraq; eisdē diuisuris in ambitu, colore aliquatenus cæsi: radix longa, tenuis: flores purpurei, graciles. Folia cū radice in vino pota, illitæ aduersus serpentes pollēt. eadē drachmæ pōdere cū thuris obolis tribus in vini veteris hemina, quadragenis dieb; ieiuno ore, cōtrā regiū morbū bibitur: veteres tumores, & inflammationes mitigat: fouda vlcera purgat. Tota in vino decocta, consillarū crustas abrūpit: oris nomas gargazatu cohibet, Añt si aqua spar-  
gatur

gatur tricliniū, qua maduerit, lactiores conuictus fieri. Datur potādum in tertianis febribus tertiu à terra geniculū, cū foliis circūdantibus: quartanis quartum. Sacra vocat herbā, quoniam multū ad amuletā, expiationesq; cōmēdetur.

## VERBENACA.

VERBENACA. Hetruscis vulgō Verminalola, aliis verō Italis Berbera, & Berbenaca dicitur. Huius (vt ex his duobus capitibus elici potest) duo habentur genera, quæ hoc tantū inter se differunt, quod alterum caulibus in alium attollatur, rara ex intervalis proferens folia. Alterum verō restipinatis caulibus humi procumbat, & numerosioribus foliis constat. Nec



Verbena-  
ca confusa-  
ratio.

Fuchsi-  
g. 177.

sanē alia inter hæc tum foliorum, tum florum deprehenditur differentia. Hinc fit, vt in suo insigni de stirpium historia commentario Fuchsiū virum alioqui cruditissimū, apertē errasse existimemus: quippe quā discriminis causa. Verbenacæ rectæ florem luteum tribuat. Quod tamē in Dioscoride mihi nunquam licuit inuenire, quemadmodum neq; in Plinio, qui utrāq; Verbenacæ speciem libro x x v. cap. i x his verbis descripsit. Nulla tamē Romanæ nobilitatis plus habet quā hierobotanæ, aliqui perisleredō, nosse verbenacam vocant. Hæc est, quā legatos ferre ad hostes indicauimus. Hac ionis mēsa veritur, domus purgatur, lustraturq; Genera eius duo sunt: foliosa, quā fœminā putant: minus rariis foliis. Rameli vtriusq; plures, tenues, cubitales, angulosi. Folia minorā, quā quercus, angustioraq; diuisuris maioribus: flos glaucus: radix longa, tenuis. Nascitur ubiq; in planis aquis. Quidā non distinguūt, sed vni omnino genus faciunt, quoniam utrāq; eosdem effectus habet. Utrāq; fortiantur Galli, & præcinitres pōsa. Sed magi vtriq; circa hanc insaniūt. Hæc per vñctos impetrare quæ velint existimant, febres abigere, amicitias conciliare, nulliq; nō morbo mederi. Colligi circa canis ortum debere, ita vt ne luna, aut sol cōspiciatur, fauis antē, & melle terræ ad piamentū dactis. Circumscriptam ferro effodi sinistra manu, & in sublime tolli: sicari in vmbra separatim: folia, caulē, radicē. hæc Plinius. Ex quibus verbis, vt arbitror, facillē deprehendi potest error Fuchsiij Brūssellum fortē secuti, quod in suis de plantarū historia commen-

tariis primō editis, pro Verbenaca fœminā eam plāram depinxerit, quæ à Dioscoride, cæterisq; antiquis scriptoribus Erigerō, siue Senecio nūcupatur, tamen mutata sententia libro primo de compositione medicamentorum in vltima methodo, rectam verbenacā perperā, meo iudicio, alterā sinapi speciem esse contendit. Cæterū inter haud nescius Gallenus nullum, vel parū riter vtrasq; verbenacas distinxim esse, breuiter de eorum viribus sub vna tantū specie diffinit libro v i i i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Verbenaca ideo perisleredon appellata est, quod in ea perisleræ, hoc est, columbæ versentur. Vim habet adeo desiccantē, vt vulnere conglutinet. Et libro secūdo de cōpositione pharmacorum secundum locos, de antiquo capitis dolore scribit, sic inquit. Omnium porro longē maximē discuit, & perfectē corroborat verbenaca recta, maximē viridis: imō & arida cū radicibus, & simul cū serpyllo, oleo incōcta. Conicienda etiam ad ea crocodilidiæ maximæ iuxta aquas nascētis radix. Quin & ipsam per se verbenacā, si oleo incoxeris, caputq; inde rigaueris, omni capitis dolori antiquo ex frigide, aut ex crassis humoribus oborto medebere. Primū Verbenacæ genus Græcis *ωγιστὴν* & *ωγιστὴν ἁπλὴν* vocatur: Latinis, Verbenaca recta. Alterum verō genus Græcis *ἡεστὴν* & *ωγιστὴν ἡεστὴν* appellatur. Latinis, Verbenaca supina. In vniuersum Italis Verminalola, Berbera, & Berbenaca nominatur: Germanis Eisen kraut: Gallis, Veruaine malle.

Verbena-  
ca Sires ex  
Galeo.

Nomina.

## ASTRAGALVS CAP. LVII.

ASTRAGALVS paruos est à terra frutex, foliis, & ramis ciceri similis: flore purpureo, paruo: radice rotunda, raphani modo grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, veluti cornua; inter se implicatas, gustu ad-



stringentes. Nascitur in ventosis, opacis, & in niualibus. eo Memphis Archidæ scætet. Alium sistit radix in vino pota: vrinam mouet: vetustis vlceribus sicca efficaciter inspergitur: sanguinem suppressit, ægrē ppter duritiā rūduntur.

*Astragalus* frequens nascitur in agro Tridentino, in vallis Ananiz montibus, folio ciceris maiore, floribus purpureis: radice raphaniz nulla, adnatis appendicibus firmis, nigris, prædoris, inter se implicatis, & gustu astringentibus. Astragalus aliter à Plinio, quam à Dioscoride describitur. Plinius siquidè libro x x v i. cap. v i i. Astragalum his notis representauit. Astragalus, inquit, folia habet longa, incisuris multis, obliqua, circa radices: caules tres, aut quatuor: florem hyacinthinum: radices villosas, implicatas, rubras, præduras. Nascitur in petrosis, apricis, & iisdem nivalibus, sicut Pheneo Arcadiæ. Meminit Astragali Galenus libr. v. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Astragalus frutex est exiguus, radices habens adstrictorias: quamobrem etiam in numero est non infrenuè exiccantium. Nam vlcera vetera cicatrice obducit, & aluum fluxu tentatam sistit, si quis in vino decoctam radicem bibat. Plurimus huius fruticis proventus est in Pheneo Arcadiæ. Is Græco nomine ἀστράγαλος dicitur: Latino similiter Astragalus: Italico, Astragalo, Gallico, Chiches de montaigne.

*Astragalus*  
vires ex  
Galenus.

*Nomina.*

## HYACINTHVS.

CAP. LVIII.



HYACINTHVS folia habet bulbi: dodrantalem caulem, læuem, minimo digito tenuiorem, herbacei coloris: comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruam: radicem quoque bulbaceam. Quæ, vt creditur: pueris

cum vino albo illita, pubertatem coercet, & non patitur erumpere: sistit aluum pota, & vrinam impellit: phalangiorum morbis auxiliatur. Semè adstringentius est, theriacis expetitur: regium morbum emendat, cum vino potum.

*Hyacinthus*  
confusio.

HYACINTHVS in vniuersum in campis sibus inter segetes, & in syluis provenit: foliis, & radicibus bulbaceis: caule dodrantali, viridi,

tenui, læuibus: flores cum violis circa finem Martij, & Aprilis initium: florètem emittit comam, ab ipso caulis medio vsq; ad summum purpureis circumdant floribus, qui maturescentes ad terram incuruantur, perdurantq; diu antequam contabescant. Hetruscis nostris Hyacinthi vulgò vocantur Cipolle canine. Flores primo statim exortu nostrates pueri colligunt ob purpurei coloris præstantiam. Cæteri scire conuenit, quod Hyacinthus hic non est ille, quem ex Asiæ sanguine editum poetæ fabulantur, in cuius flore ipsius Asiæ nomen primis literis expressum legitur. Siquidem is (vt poetæ canunt) florè propter rubentem, lilio adsimilem. Hyacinthi vires memorie prodidit Galenus libr. v i i. simplicium medicamentorum, sic inquires. Hyacinthi radix bulbosa est, ordinis primi in desiccando: secundi verò completi, aut certè tertij incipientis in refrigerando. Itaq; pueros diutissime feruare impuberes illita cum vino creditur. Semè leuiter extergit, & adstringit: quamobrè & ipse regio morbo laborantis exhibetur in vino, ordine quidem tertio quadantenus desiccans, cæterum in medio consistentis caliditatis, ac frigiditatis. Planta Græcis ὕακινθος, Latinis itè Hyacinthus appellatur: Italis, Hiacintho: Germanis, Mertzzenbluomen: Hispanis, Mayos flores: Galilis, Vaciet.

*Hyacinthus*  
vires ex  
Gal.

*Nomina.*

## PAPAVER ERRATICVM.

CAP. LIX.



PAPAVER erraticum, quod rheada vocat, vere quidem in aruis cum hordeona nascitur: flo re protinus deciduo, vnde & nomen apud Græcos accepit. Folia erucæ, autorigano, aut cichorio, aut thymo similia spectantur, sed longiora,

diuisa, scabra: iuncus ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos syluestris anemones, puniceus, interdum albus: oblongum caput, sed quàm anemones minus: semen rufum: radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudi-



ne, gustu amara. Huius capita quinq; aut sex in vini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis quibus somnus accersendus est. Semina acetabuli mensura ex aqua multa pota, alium leniter emolliunt: ad idem praestandum mellitis placentulis, & dulciarius libis admiscetur. Folia cum calycibus illita, inflammationes sanant: eorumdem fotu, & perfusione somnus allicitur.

PAPAVER SATIVUM.  
CAPUT. LX.



E SATIVI papaveris genere, quod hortense est, semen in panem densatur, qui fanis in usu sit: eo etiam ex melle pro sesama utitur, thylacitin vocant. Capitulum habet longum, & semencandidū. Sylvestre verò caput habet in-

fidens, demissumque, & nigrum semen: quod pithitis nominatur: nonnullis tamen & ipsum rheas dicitur, quoniam eius scapo lacteus succus emanat. Tercium magis sylvestre, & ad medicinas valentius, multo his longius, productiore capitulo. Omnium in commune natura refrigeratrix. quare si capita ipsa, & folia decoquantur in aqua, somnum fotu conciliabunt. Bibitur decoctum contra vigilias. Calyces cum polēta triti, & cataplasmatibus admisti, ignibus sacris, & inflammationibus profunt. Tunduntur quoque virides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum reconduntur. Capita quoque per se in aqua coquuntur addimidias, iterumque adiecto melle, dū humor coeat in elegmatis lentorem. Id medicamentum in tussi, arteriae fluxionibus, & cæliacori affectu, doloris leuamētum præbet. ef-

ficacius tamen redditur, addito hypocistidis succo, & acacia. Papaveris nigri semen tritum cum vino bibitur, contra citam alium, & feminarum profusum, in perugiliis fronti, temporibusque; illinitur ex aqua. Opium eius magis refrigerat, inspissat, siccaturque. Sumptū erui magnitudine, dolorem finit, cōcoquit, & somnum allicit: tussi, atque cæliacorum valetudini auxiliatur: verum si copiosius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad dolores capitis cum rosacco perfusum, efficax est: aurium dolori cum amygdalino, myrrha, & croco instillatur: inflammationibus oculorum cū torrefacto oui luteo proficit: igni sacro, & vulneribus cū aceto: podagris, cum lacte mulieris, & croco, somnum accersit subditum sedipro balneo. Optimum habetur graue, & densum, gustu amarū, odoratu soporiferū, quod faciliē aqua diluitur, laue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandū non ut cera coeat, & in sole diffundatur: dein admotum lucernis, nō atra luceat flāma: extinctū denique odoris vim conseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut sylvestris lactuce succo adulterant. Verū glaucio succatum, in dilutione croci colorem reddit: lactucaceo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: gummi vitiarum splendescit, & infirmū est. Nec desunt, qui eò demētia denenerint, ut adipem ei admiscerent. Fictilino uero torretur ad oculorum medicamenta, dum mollius, atque rufius appareat. Diagoras, ut Erasistratus auctor est, usum eius dānavit, oculorum lippitudinibus, & aurium vitis infundi vetans, quoniā visus aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addit Andreas, illitos eo protinus excacari, si non adulteraretur. Mnesidemus usum duntaxat olfactū probavit, quoniam ad conciliandum somnum conueniret: alioqui nobis ut noxio interdicit. Quæ cōmentitia esse experimento deprehenduntur: siquidem effectus, virum huiusce medicamenti fidē faciunt. Quæ

re non alienum fuerit scriptis mādare, quoniam modo is excipitur succus. Alii qui capita ipsa, & folia tundunt, & prælo expriment, terentēque in mortario digerunt in pastillos: id meconium vocatur, inultum opio ignavius. Porro opij faciendi ratio hæc est. Cum ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem incidere oportet, lacrymam exeuntem digito in concham abstergere: nec multo post redire, ut concreta inveniatur: etenim quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in vetere pila teri debet, & in pastillos cogi, cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne vestibis succus deradatur.

*Papaueris erratici* **SPECTANTUR** Maio mense Papauera erraticæ rubentibus floribus nitentia, in aliquibus campestribus locis adeo numerosa, ut deceptis oculis, campi videantur coccineis velaminibus vestiti. Horum flores non desunt qui affriment lateris dolori, qui Græcis *ἄνεσις* dicitur, misericordiam in quem vsum eos siccatos in puluerem redigunt, & in potu exhibent. Ab hoc experimento nonnulli medicorū edocti, ex ipsorum florum recetum succo teræ, aut quater iterato diluto, serapium conficiunt: quo postmodum magno, ac prospero successu in pleuriticis vtiuntur. Tridentina rura Papaueris erratici folia prima statim germinatione olerum modo decoquunt, sumuntq; in cibum caseo, & butyro admixtis. Nec mirum sanè, cum etiam Theophrasti ætate (ut ipse scripti reliquit lib. 1. x. cap. x. 1. 1. de plantarū historia) eadē fuerentur in cibis. Loco enim citato ita de eo scribit Theophrastus. Papauer erraticum vocatum non ab simile intrubo erratico constare quare in vsum venit cibariū. Nascitur in arvis potissimum inter hordea. Florem rufum producit: caput pollicaris vnguis magnitudine. Legitur ante hordei messem, atque viridius etiam, purgat inferius, hæc Theophrastus. Sed iam de Papauere satiuo, siue domestico nobis differendum est. Videtur Dioscorides cum satiuo duo syluestris Papaueris genera tradidisse, & hoc nomine hæc ab illo distinctisse. Qua in re animaduertendum est, ne aliquis fortasse decipiat, quod omnes hæc Papauerū species ab agricolis feruntur. Verum illud dōxax, mea quidē sententia, hortense appellatur Dioscorides, quod albo conficitur semine, quoniam hoc frequentius in viridariis, & hortis prope ædes feritur. Cætera vero syluestria nominauit, non quod sponte & per se nascatur (feritur enim omnia) sed quod asperiora, hirsutioraq; proueniāt tum caule, tum ca-

pitibus, tum etiā foliis: quod præterea nigrum, asperumq; proferant semen: quod deniq; serantur in campestribus segeti, & leguminū modo. Rem autem se ita habere testari videret Plinius lib. x. 1. x. cap. v. 1. 1. eū sic inquit. Papaueris satiuū tria genera. Capdidū, cuius semen totum in secunda mensa cū melle apud antiquos edebatur. Hoc & panis suffici crustæ inspergitur ad fuso ouo inhærens, vbi inferiorē crustam apio, githū; cereali sapore cōdiunt. Alterū genus Papaueris nigrū, cuius scapo inciso lacteus succus exprimitur. Tertiū genus rufum vocat Græci, id nostri erraticū dicit. Spōte quidē sed in arvis cum hordeo maximē nascitur. hæctenus Plinius. Papauere candido passim abundat Hetruria. Vtriusq; verò nigris scatet vniuersa Insubriū telus: sed præcipuē apud genes, quæ Tridentinas incolūt valles, vbi Papauera hæc copiosē feruntur in campis, & inter legumina, præsertim inter fabas. Ibi siquidem eius semine vescuntur homines, immisso placentulis, quas ex passa foliolis multiplici inuolucro conficiunt. Comedit illi quidem hæc placentas ad saturitatē vsque: nec ob id tamen inquam (quod mirum alui fortasse videbitur) diuturniore somno capiunt, neq; veterosī sunt. Quin nec illi etiā, qui Stiriam, superioremq; Austriā incolūt, in veterinū incurant: etsi oleum ē nigrū papaueris semine expressum in cibis cōtinuē assumant, oliuarum olei vice. Ea demum experientia fecit, ut intrepide quandoq; ausus sim Papaueris feminis cre morem hordei decocto expressum in ardentissimis febribus ad sitim extinguendā, somnūq; conciliandū etiā largius exhibere. Hinc præterea factum est, ut cum merum excullerim, & deposuerim, quem mihi olim preceptorū meorum graues admonitiones incusserant, & ingererant. Cæterum ex incisus Papauerum capitibus opus, siue succus manat, quin in Opium vocatum addensatur, ut scite docuit Dioscorides. Et quanuis Opium quarto excessū frigidiū statuat, tamen si ex sapore, & effectu rerum temperamenta, & qualitates cognoscuntur, opium nostrū vsus (quantum equidem deprehendere potui) non modō gustu amarum percipitur, sed etiam acro, adeo ut paululum in ore detentum linguam, & palatum exulceret. Vnde haud dubiē colligi posse putauerim, calidissimas illi inesse qualitates. Cuius rei fidem augere potest, quæ ex eo prodit odoris grauitas. Veruntamen ne impudent, atque arrogantis nomen subeā, quod in hoc omnium ferē medicorum sententiam destruere velint: eorum iudicio rem hanc æstimandam relinquam, qui ante nos opij tum qualitates, tum facultates diligentissime expendunt. Sed forte ea acris, amarāq; facultas in opium facile inuehitur ex glauci adulatione, quod illi sapius admiscetur, ut Dioscorides adnotauit. Illudq; argumento esse potest, quod aqua colligatum croceum colorem reddat. Adde quod opium, quod hodie ad nos conuehitur, non est illud

*Papaueris satiuū* **considera-**  
*tes.*

*Papaueris satiuū, sine Opij facultate.*

*Papaver  
vires  
ex Galen.*

illud verum & legitimum è lacryma, quæ ex inciso papaveris capite exierit, concretum, sed potius hoc è foliorum, & capitum contritorum succo confectum est: idq; meconium vocatum erit, opio longè deterius. Papaverum vires memoriz prodidit Galenus libro 11. simplicium medicamentorum, sic inquit. Papaver alterum Rhœas nuncupatur, quod scilicet celeriter flos eius defluit. Alterum domesticū, quandoquidem collitur. Quin & alterè dux sunt præter hæc species *lyluestris* papaveris, alterum velut incidentem calycem sustinens: alterum longiorem quam illud calycem obtinens, totum autem procerius, ac squalidius. Ab hoc succus defluit, atque hinc est, quod hanc speciem quidam Rhœada nomen. Porro omnium facultas refrigeratoria est. Ceterum sativum semen, quod & thylactis cognominant, mediocriter somnum conciliat, visū candidum: proinde panī ipsum inspergunt, ac melle macerātū edunt. At eius, quod primo loco recessimus, cuius florem celeriter decidere posuimus, validius semen refrigerat, ita ut nequaquam eo quis innoxie solo vi possit, sicut sativū siue domesticū mellī admiscens. Admodum verò, si ita sumptum sit, somnum conciliat. Ceterum pusillum eius inspergunt iis, qui ex melle concipiuntur bellariis, atque placentis, panibūque. Porro tertio loco dīci semen atrum etiam medicamentosum est, admodum refrigerans. At quod quarto loco posuitur est, omnium est medicatissimum, tum in semine, tum in calyculis, tum in foliis, tum in succo. Valide enim refrigerat, ad stuporem vsque, & mortem perducens. quare medici quò probè eo vrantur medicamentis miscentes, frigiditatis vehementiam retundunt. Est enim ex quarto, & ultimo refrigerantium ordine. Porro quo pacto maxime ex methodo missionem facere oporteat, non est præsentis tractationis proprium. Et libro 11. de compositione medicamentorum secundum locos, de dolore capitis agens citra manifestas causas oborto, ita de opio differit. Rarè, inquit, cogimur pharmacia ex opio vi, cum videlicet præ doloris vehemētia homo de vita periclitatur. Quamquam & tunc solidæ partes ex eius usu offenduntur, adeò ut post hæc correctione opus habeant. Sic & ex opio colliria multis detrimento fuerunt, adeò ut debilem oculum reddiderint, & visus hebetudinem, amblyopiam Græcis appellatam, induxerint: velut etiam auditus gravitatem inducunt quæcunque ad vehementem aurium dolorem ex papaveris succo sunt composita. Idem Galenus libro 11. eiusdem tractatus, de aurium inflammationibus agens, sic inquit. Pharmacia ex papaveris succo omnia sensum stupefaciunt: & ob id sanè necessariò cogimur ipsis vi ubi nullum aliud mitigativum opem tulit. hæc Galenus. Ex quibus sanè omnibus admoniti esse debent medici, ne temerè, aut inconsultè ad usum opij se conferant. Sed ratio, quæ id corrigendum, administrandumq;

sit ex ipso Galeno colligi potest, libro VIII. de compositione pharmacorum secundum locos, ubi ita scriptum reliquit. Calefacientia miscentur, quæ refrigerantium stupefactionem de ducere possunt, cum illa ipsa per se tardi transitus existant. Hæc igitur ubi quis inadiuerit, quantitatem consideret simplicium pharmacorum, quæ in compositiones miscentur. Ex hac enim sciet num magis, an minus efficere possit compositum pharmacum, ea quæ promittit. Si namque refrigerantia plura apparuerint, sensum affectorum magis obtundit, & quantum calor in ipsa particula fuerit, etiam hunc extinguit. Vbi verò calefacientia fuerint aucta, minus quidem hæc efficiet ipsum pharmacum, in nocentem autem reddetur. Noscere enim oportet, corpora viventium mortificationi simile quippiam perpeti ab omnium ex opio, hyoscyamo, & mandragora compositorum pharmacorum usu: nimirum causis dolorem indigentibus insensibilibus factis, & multi sanè qui assidue talia accipiunt, ad immedicabilem fragilitatem particulas perducunt. Papaver erraticum sic Latinis, *Nemina* *utitur* Græcis appellatur: Italis, Papauero saluatico: Germanis, Klapper rosen: Hispanis, Amapolia & Papoulla: Gallis, Coquelourde. Papaver verò sativum Latine dictum, *μυκω* Græcè vocatur. Arabicè, Thaxthax, seu Chaschas: Italicè, Papauero domesticum: Germanicè, Magfomen: Hispanicè, Dormidera: Gallicè, Pauot. Quod denique Græci *σάπυ*, & *μακρό* *μαυρ*, Latini item Opium & Meconium dicant: Mauritani, Afium: Itali, Opio.

## PAPAVER CORNICULATVM.

CAPVT LXI.



PAPAVER ceratites, id est, corniculatum, folia habet cædida, hirsuta, verbasco similia, in ambitu sylvestris papaveris more ferata: caule non dissimili: flore pallido: calyculo fœni græci, in

corniculorum modum inflexo, vnde nomen mutuatur: semine papaveris, pusillo, nigroque: radice per summa cespitum, nigra, crassa. nascitur in maritimis, & asperis. Radici ea vis inest, vt in aqua

in aqua decocta ad dimidias coxendicum, & iecinoris affectus potu sanet. prodest his, qui crassa quædam, & araneosa cum lotio reddunt. Aluum leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulsâ potu. Crustas emarginant, illira ex oleo folia florêsq; argemâ ac nubeculas iumentorum, perunctas abstergunt. Sunt qui glaucium hoc papaueris genere factitari existimarunt, falsi quædam foliorum cognatione.

PAPAYER SPUMEUM.  
CAPUT LXII.

ALIVD Papaueris genus aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab aliis heracleum, caule dodrantali: foliis admodum parvis, radicula similibus: fructu interea candido. nam herbula alba est, & spumeca tota: radice in summo cespite. Legitur æstate semen, cum integrè adoleuit, deciditque exicatum. Datum acetabuli mensura in aqua mulsâ, vomitione expurgat, priuatim huiusmodi purgatio, comitialibus prodest.

Papauer  
m. corni-  
culati con-  
sideratio.

PAPAYER corniculatum in maritimis nostris Senensibus Cræstano, & Orbetellano agro, & circa Herculis portum Argentario promontorio, itemq; in Adriatici maris litore non longè à Timavo fonte, & Tergesto saxoso litoris tractu, ubi sæpius ipsum legimus, frequentissimum provenit: quanquam etiam in aliis Italia locis nascitur, sed quod potissimum in hortis, & viridariis ad publicum omnium commodum, & spectaculum fuerit satum. Huius meminit Theophrastus libro x. capite xiiii. de plantarum historia, sic inquit. Papaueris quoque sylvestris genera notantur: quoddam enim corniculare appellatur: quoddam autem nigrum est, folio constans verbasci nigri, sed minus nigro: cauli altitudo cubitalis: radix brevis, per summamque cespitum: fructus inflexi, ut cornicula figurantur. Legitur circa menses. Aluum purgare potest: folium albuginem omnibus auferit. nascitur iuxta mare, saxosis locis. hæc ille. Credidere nonnulli Glaucium, quod Mauritanis memitte vocatur, fieri è corniculatâ Papaueris succo. Verum id, ut Dioscorides est author, procul dubio decipiuntur. Cæterum Papauer spumeum, quod aliqui heracleum vocant, non dum mihi compertum est, neque etiam hætenus aliquem reperi, qui illud legitimum ostenderet. Quo fit, ut ipsum quoque inter tot alias nobis incognitas plantas relinquere malim, quàm aliquod incertum præferre, ut quidam faciunt.

Papauer  
spumeum.

Veruntamen non mihi videtur silentio prætereundus fatalis ferè Plinij lapsus, in Papaueris spumei mentione libr. x. cap. x i x. Quippe qui huius papaueris folia speciem passerum autum repræsentare tradiderit, deceptus nimis duplici eiusdem nominis Græci significatione. *agrostis* enim Græcis non modò passerem auiculum significat, sed & plantam eam, quam Latini radiculam, sive lanariam herbam appellant: cui quidem Dioscorides, non autem auiculus, quas passeris Latini dicunt, Papaueris spumei folia similia reddidit. Quemadmodum & Theophrastus, qui de eo loco citato ita scriptum reliquit. Papauer heracleum nuncupatum folio constat struthij, hoc est radicula, quâ linteis candorem conciliant: radice candidâ in summa terra eunte: fructu albo. Huius radix purgare superius nata est. Non desunt, qui contra comitiales ea videntur in vino mulsâ. hæc Theophrastus. Papaueris corniculati meminit Galenus libro xii. simplicium medicamentorum, de eius viribus in hunc modum differens. Papauer corniculatum nominatum quidem est à semine leuissimum inuersionem habente, velut & senem gregum, ut bouis cornu videatur esse simile. Vocatur porò à quibusdam paralium, quandoquidem ut plurimum iuxta mare nascitur. Vim habet incidendi, & abstergendi. Itaque radix herbæ in aqua decocta ad dimidium, hepaticos affectus adiuvat. Porro folia, & flores fordida admodum, & maligna vlcera iuuant. Sed ab his abstinere oportet, vlcibus iam expurgatis: addo enim abstergere valent. ut & puræ quoque carnis non nihil eliquent. Hoc virium robore non sordem duntaxat, sed & crustam vlcibus detrahit. Papauer verò Herculeum, quod & aphrodes, hoc est, spumeum vocatur, eo quod totum sit candidum, & spumosum, exile est. Semen habet pituitum expurgans. *Mûnup nasestra* id Græcis vocatur, quod Latinis Papauer corniculatum: Arabibus, Almacharum: Italis, Papauero: cornuto: Germanis, Gelbolmagen, Moen, & Beelmaglamen: Hispanis, Dormidera marina: Gallis, Pauor cornu. Id verò *μύμπος ἀπιδύς* Græcè dicitur, quod Latine Papauer spumeum: Arabice, Dabre, & zebecolij: Italicè, Papauero spumeo.

HYPERCOVM. CAP. LXIII.

HYPERCOON, aliqui hypopheon vocant. nascitur in segetibus, aruisque, foliis rutæ, exilibus ramis. Natura cadem, quæ papaueris succo.

HYPERCOVM iis facillè sese offerret, qui inter segetes, & legumina ipsum perquirere non grauibuntur. Hoc pro sylvestri ruta olim Petros. *Hypocyon* spezzalancia Clesij vallis Ananæ oppiduli pharmacopola computat meus, mihi ostendere solebat. Quandoquidem id provenit in aruis, foliis rutæ paulò maioribus: caulibus exiguis, mollibus, hirsutis in quibus sunt flores, qui in luteum pallescunt, etsi prope calycem purpurei spectentur. in horum medio flocculus

Plinij la.  
psm.

Papauer  
vix corri-  
culati vi-  
res ex Ga-  
leno.

Nomina.

## HYPECOON.



*Hypecoon  
vulgaris Ga-  
lene.*

*Nomina.* rum abfit a papauere. Quod Græci *ὑπεκων* La-  
tini quoque Hypecoon vocant: Itali, Hi-  
pecoo.

HYOSCYAMVS, SIVE APOL-  
LINARIS. CAP. LXIII.

HYOSCYA-  
MVS frutex est  
caules emittēs  
crassos: folia la-  
ta, oblonga, di-  
uisa, nigra, hir-  
suta: flores è la-  
tere caulis, or-  
dine prodeūt,  
tanquam puni-  
corum cytini,  
seutulis septife-  
minum plenis,  
vt papaueris.  
Tres eius diffe-  
rentiæ. Vna se-  
mine nigro. flo-

ribus penè purpureis, smilacis foliis, cy-  
tinis præduris & spinosis. Alterius se-  
men sublauum virionis. flores lutei,  
folia & siliquæ simplices. ambo in-  
saniam gignunt, & soporem: ideo in  
communi vfu damnantur. Tertium ge-  
nus, vt quod mitissimum esset, medici  
recepere: pingue, lanuginosum, molle,  
candidi floris feminisque, in maritimis  
rudribusque nascens, cuius occasio si

non adfit, rursus vsurpari oportet. ni-  
ger, vt deterrimus, improbatur. Re-  
centi semine, caulibus, foliisque tuis  
succus in sole exprimitur, & exiccato  
humore, vsus ad annum vsque proro-  
gatur: nam facilè corruptionem sentit.  
Extrahitur etiam ex sicco semine sepa-  
ratim in aqua calida tuso, & expresso.  
Liquamentum autem succo lacteo præ-  
stantius est, & magis dolores finit. Cò-  
tusa herba recens, addida trimestri fa-  
rina, digeritur in pastillos, & recondi-  
tur. Liquamentum primum, & quod à  
sicco semine exemptum est, collyriis,  
quæ doloris ventum auferunt, commo-  
dissimè inferi solent. contra acutas, ca-  
lidāsque fluxiones, dolores aurium at-  
que vuluæ mala prosunt: cum farina  
autem, aut polenta, oculorum, pedum,  
cæterarumque partium inflammationes  
placant. Semen eadem præbet: tuf-  
si, destillationibus, oculorum fluxioni,  
& doloribus efficax: contra mensium  
abundantiam, & erumpentem aliunde  
sanguinem, oboli pondere cum papa-  
ueris semine, & aqua mulsa bibitur:  
podagris subuenit: testibus inflatis,  
mammisq; tumentibus à partu, tritum  
ex vino illinitur. Aliis quoque catapla-  
smatis, quæ doloris leuamentum præ-  
stant, admisceri solet. Folia omnibus  
medicamentis dolorem sedantibus, per  
se, & ex polenta vtilissimè imponun-  
tur. recentia ad mitigandos omne ge-  
nus dolores oblinuntur: cum vino ter-  
na, quaternave pota sanant algidas fe-  
bres, quas epialos vocant. Cocta ole-  
rum modo folia, si acetabuli mensura  
manduntur mediocrem insaniam gi-  
gnunt. idem efficere tradunt, si co-  
lo vlcus sentiente, infundantur. Radi-  
ce in aceto decocta, dentes in dolore  
colluuntur.

Ex si tria Dioscoridi Hyoscyami tradun-  
tur genera, id tamen solum mihi videre licuit,  
quod aureum, forem proferit, & semen in va-  
sculis sublauum potius. quam nigrum: nam  
reliqua, quanquam diligenter inquisierim,  
qui mihi ostenderet, hæcenus reperi nemi-  
nem. Hyoscyami meminit Scribonius Largus,  
iniquas.

*Hyoscy-  
mi conf.*

inquiens. Alterum, quod Græcis hyoscyamus vocatur, qui biberint, capitis grauitate, & venarum diffentione laborant, mentisque abalienantur cum quadam verborum alteratione: unde et nomen apud Latinos. Hoc idem equidem testari possum, quod viderim in Ananiz vallis montibus pueros, qui Hyoscyami semen comederant, adeo desipientes factos, ut parentes, & vicini eos crederent à caco demonibus vexatos esse. Hinc est, quod eius regionis incolæ Hyoscyamum vulgari sermone appellant Diuturbio, ut quod mentem maximè turbet. Aues, quæ huius herbarum semen ederint, præcipue quæ in gallinaceo habentur genere, non multo post tempore pereunt quemadmodum & pisces. Hyoscyamus videtur Græcis dicta, quasi faba fuilla: propterea quod (ut Helianus inquit) huius herbarum passu resoluuntur, & conuellantur apri. Sed remedium nouere, aquas

medio caule exoritur, duobus tribusve conuolutis in cacumine capitulis: in his

PSYLLIUM.



femine duro, nigro, pulicum simili, unde & nomen. in aruis, & incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, in ipsissimum, & molliedum conueniens: articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, luxatis, illitum auxiliatur: imponitur indole capitis, cum rosaceo, aqua,

aut aceto: enterocelis infantium, & prominenti umbilico, illitum ex aceto: medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, ubi concreuit aqua, illinitur: siquidem vehementer refrigerat, & in seruientem aquam deiectum calorem reprimat. contra ignes sacros efficax est. Fama est, si virens domum importetur, non sine in ea pulices gigni. Cum adipe asinum fordida vlcera, & quæ cacoethe vocantur, expurgat. Succus vermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest.

PSYLLIUM, quod & Pulicarium herbarum nuncupant, ubique ferè provenit, sed in maximè siccis frequentius. Sepalsæ semen recondunt ad glutinosos liquores conficiendos, quibus in infrigidandis inflammationibus, prohibendisque calidis defluxionibus, & ad extinguendam sitim, lauigandamque linguam, & faucium febrilem, in ordentlichis febribus vtiuntur medici: quin etiam ad aluum emolliendam. Psyllii vires retulit. Melius inter ea medicamenta, quæ deiectioni vi possent, ubi hæc ad sensum saltem habet. Psyllium de his est, quæ temperantem immutant, & quæ emolliendo aluum ciant. Huius seminis tria habentur genera, candidum, subflauum, & ad purpuram vergens. Præstantius perfectè maturum, ponderosum, & quod in aquam densissimam statim immixtum peccat. Contrarius constat cum viribus, tum sub

Hyoscyamus  
ex Gale.

ita protinus saluti restituantur. Hyoscyami vires recensuit Galenus libro 7 11 1, simplicium medicamentorum, his verbis. Hyoscyamus, cui semen atrum est, insaniam, ac soporem affert. Huic autem is, cui semen mediocriter flauum est, propinquam insensibilitatem obducit. Verum utriusque fugiendi sunt, ut inuicem, & venenosi seu delesterij. Cæterum cuius seminis, ac flos candidus est, ad sanationes vel maximè idoneus est, ex tertio quodammodo ordine refrigerantium. Porro flos eius quidem, cui semen est nigrum, mediocriter purpureus est: eius verò, cui est subflauum, leuiter melleum colore refert. hæc Galenus. Cæterum, ut ad hyoscyami historiam nostra reuertatur oratio, nihil quidem non videtur prætermittenda suspicio, quæ est, quod in huius capitis initio, ubi de floribus sit mentio, mendum aliquot subsistit. Ea namque inibi floribus tribuuntur, quæ siliquis legitime debentur. Etenim siliquæ sunt, quæ sicutulis contingunt, atque semen intus continent, non autem flores. Auger hanc nobis suspicionem Serapio: quippe qui illud de fructibus Hyoscyami Dioscoridi acceptum referat, quod hic de floribus scriptum legitur. Quare non temere, meo iudicio, consicere possumus, hanc locum in Dioscoride deprauatum aut mutilatum esse. Planta, quæ Græcis *hyoscyamus*, Latinis appellatur Hyoscyamus, Apollinaris herba, Alterum: Arabibus, Bengi: Italis, Iusquiamor: Germanis, Bilsen, & Bilsen: Hispanis, Venicio: Gallis, Iusquiamæ, & Hanebane.

Nasturtium.

PSYLLIUM. CAP. LXV.

PSYLLION foliis est coronopos non dissimilibus, hirsutis, longioribus. sarmentosa sceni modo in totum herbula, ramis dodrantalibus: coma à

tum substantiis: ea siquidem, quæ in medulla continetur, calida est, & secca ordine quarto, admodum acris, incidens, exulcerans, septicæ, & deleteriz facultatis. Quæ verò in cortice residet, teste Rufo, infrigidat, humectatque tertio excessu. Infunditur psyllij semen in aqua fontana frigida, agitatæque rudicula tandiu, quousque aqua lentorem contrahat, percolaturque deinde à feminibus, & admiscetur oleo, aut syrupo violaceo, hoc enim modo psyllium potu alium mirificè emollit, & delicit. Verùm si fruxum prius semen rosaceo admistum eodem modo ageretur, tunc sumptum dysentericis remedio est, & cæteris alui fluoribus, præsertimque iis, qui deiectione medicamento exuperante hausto superueniunt, sed præcipuè acris, quale est scammonium. Cæterum maxime animaduertendum est, ne Psyllij semen (id quod tamen desectantur recentiorum quidam) tustum in puluerem potandum exhibeatur. Quippe quod, attrita medullari substantia, ventricu-

lum, & Intestina exulceratiocur, & sanguinem inflammat, & omnia denique viscera lædit. Integri seminis dilutum eo modo, quo diximus, paratum bilem deiectioneque propter ardenssimis febribus, intolerabili fiti, inflammationis valde spiritibus, & faucium, & pectoris asperitatibus mirificè medetur. In aceto diu agitatam inflammatione, igni sacro, & herpete laborantibus auxiliatur, exterius illitum: priuatim prodest capite dolentibus fronti impostum, si tamen dolor à causa calida fuerit excitatus. Hæc ex Mesie decerpimus. Psyllij vires paucis perstrinxit Galenus lib. v. 1. 1. simplicium medicamentorum, sic inquires. Psyllij semen admodum vile est, ex secundo refrigerantium ordinem in desiccando verò, & humectando, medium quodammodo est, & symmetrum. Herba *Psyllium* Græcè, Psyllium item Latine dicitur: Arabicè, Bazara chathona, seu Bezer cothune: Italice, <sup>20</sup> Psillio: Germanicè, Psyllen kraut: Hispanicè, Zargatona: Gallicè, Herbe à puces.

*Psyllij Si  
res ex Ga  
leno.*

*Nomina.*

SOLANVM HORTENSE.



SOLANVM HORTENSE.

CAPVT LXVI.

**HORTENSE** Solanum frutex est <sup>50</sup> bis idoneus, exilis, pusillus, multis concavus alis: folio nigro, maiore quam ocimi, & latiore: fructu rotundo, viridi, qui post maturitatem nigricat, aut fulvescit. herba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi: quare folia ulceribus quæ serpunt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline polentæ illinuntur. ægilopis, capisique dolores, trita & imposita per se sanant: æstuanti sto-

SOLANVM MALICACAEVM.



macho auxiliatur: parotidas cum sale detrita illitu discuriunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, atque vlcera quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo, & argenti spuma: ad ægilopas cum pane: infantium adusioni, quam syriaci vocant, cum rosaceo persusus proficit: in collyriis, aqua vel oui vicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus: aurium dolori instillatus prodest. mensium abundantiam sistit in vellere subditus. Succus fuluo gallinarum corallium fimo subactus, & linteo appositus, ægilopiis præsentaneo est remedio.

## SOLANVM HALICACABVM.

CAPVT LXVII.

EST ET aliud Solanum, quod peculiari nomine halicacabon, aut physalida, id est vesicariam vocant, foliis antedicto similibus, verum latioribus, cuius caules, posteaquam adoleuerunt, prona terram spectant: folliculis orbi-

culatis, vesiculis similibus: in quibus semen continet fulvum, rotundum, laeue, acinorum vuae figura: quo coronarij vtuntur, corollis intexentes. Vim, vsumque hortensis solani habet: verum cibus nequaquam expetitur. Regium morbum purgat, femine potio, & vrinam pellit. Ex vtraque herba succus extrahitur, qui siccatus in vmbra reconditur, ad eadem valens.

## SOLANVM SOMNIFERVM.



## SOLANVM SOMNIFERVM.

CAPVT LXVIII.

SOLANVM somniferum, aliqui etiam halicacabon appellant, fruticat multis ramis, densis, caudicosis, fractu contumacibus. pinguium foliorum, cotoneaeque mali similibus, plenius flore grandi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice grandi, subrubro cortice vestita, nascitur in saxis, non procul à mari. Radicis cortex, in vino drachmae pondere potus, somnificam vim habet, opio mitiorem. Semen vehementer vrinam cit. Corymbi duodecim hydropicis dantur: si quid numero adiciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsæ, potui data. Succus pastillis inferitur, & medicamentis, quæ doloris leuamentum præbent, decoctus in vino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxi-

## SOLATRVM SOMNIFERVM.



liatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

## SOLANVM FVRIOSVM.

CAPVT LXIX.

SOLANVM manicon, aliqui perfon, alij thryon appellauere. Huic folium cruce simile, maius aliquantò, satis acantho, quàm pæderota vocant, accedens: caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adollescentes: caput in cacumine oliuæ figura, sed vt platani pilulæ hirsutius, verum maius, latiusq; florem nigrum: postquam eo exiit, racemus exit rotundus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus hederæ corymbis, vt vuae mollioribus: radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. gignitur in montibus, vento perflatis, & platanæis. Radix drachmæ vnius pondere



pota ex vino, facit species vanas, imaginationesque; non inuicundas obuersari: sed duplicatus hic modus, ad tres vsque dies mentis alienationem affert: quadruplicatus interimit. Remedio est aqua mulsa copiosius pota, & vomitione reiecta.

## SOLATRYM MAIUS.

Solani generum consideratio.



et eruditione clarus Lucas. Ghinus Forocorneliensis: idque mihi plane omnibus notis legitimo respondere videtur. Verum quoniam Solani genus, quod Manicum cognominant, hactenus me non vidisse fateor. Ceterum errat. mea quidem sententia, qui eam plantam, quam herbariorum vulgus Solatrum maius nominat, Veneri vero vulgo Herba bella donna, Solanum somnificum Dioscoridis esse existimant. Siquidem id fructum non profert in folliculis croceis, tametsi eius baccæ largius sumptæ interficiant, facto inextinguibili somno, ut quandoque accidit pueris, qui discriminis ignari eas vix vice deoratur. Vnde quoniam hæ plantæ viribus conuenire possint, facie tamen inter se maxime distant. Horum sententiæ adimplutus est Fuchsius medicus, alioqui peritissimus, in suo magno de stirpium historia commentario. Sed cum in hoc se manifestè errasseprehendisset, in suo postea paruo plantarum libro, hanc herbam in Mandragoras reposuit, eamque Mandragore speciem voluit esse, quæ Dioscorides Morion vocari tradit, lapsus, ni fallor, de vno in alterum errore. Mandragora siquidem nomine Morion, folia fert mandragoræ mari similia, dodræali longitudine, terræ procubentia, circa radice summum. Id quod manifestè præbet indicium, hanc perpetuo caule viduam esse, quædammodum eam mandragoræ genera. nã pediculis, quibus mādāgoræ fructus sustineantur, caules dici non possunt. Hinc itaque fit, ut plantam hanc, quæ vulgo Bella donna vocatur, in nullo Mandragoræ genere legitime referendam putet: cum hæc folia emit

tat hortensi Solano maiora, palmi mensuram nunquam excedentia, minimè candicantia, nec humi strata, sed in caulibus excurrentia, adnatis plurimis refertis, bicubitalibus, & ligni modò præduris. Quinimò crediderim ego, hanc esse Solani quintam speciem, antiquis scriptoribus incomperatam. Nam, quantum equidè longa experientia comperi, varia ac diuersa Solani reperiuntur genera. Somnifici, & manici Solani meminit Theophrastus lib. 1 x. cap. x 11. de floribus ex

plantarum historia, sic inquit. Solanorum genera duo. Alterum somnificum, radice rubra, sanguinis modo, sed candida cum siccet: fructu cocco rubriore: folio tithymalo simili, aut malo dulci, sed piloso, & parte ima magno. Huius corticè radicis rudentes admodum, & in vino miraculo mædificantes dant, atque ita dormire faciunt. Nascitur in rupibus, & faucibus, atque sepulchris. Alterum genus insanire facit. id alij Bryoron vocant, alij perission. Constat radice candida, & longa ad cubitum, atque caua. Dabitur eius radice drachmæ pondus, si ut quis ludat, seq; pulcherrimum putet, placuerit: si magis insaniat vis, drachmis duabus opus est: si autem nunquam insaniam solui malueris, tres dabis: & quatuor, si interimendum sit. Habet folium erucæ proximum, maius tamen: caulem longitudine ferè quatuor cubitorum: caput ge-thyi, sed maius, atque pilosius: nec fructui plantæ ab simile constat. Est & aliud Vesicariæ genus, quod hæc tempestate scenas, attegias, turguria, & pergulas inumbat: quin etiam ædium fenestras topiario opere contexit, & opacat. Constat hæc foliis oblongis, per ambitum latiniatis: floribus candidis, è quibus vesiculæ prodeunt, in quibus semen includitur album, pisi similitudine, in cuius medio veluti humani cordis effigies visitur, obfignata nigro colore. Nec sine ratione id à natura factum confici potest, quod fortasse huius cordis nota nobis insinuet, hanc stirpem ad cordis affectus maxime

Solani his-  
torie ex-  
Theophras-  
ta.

Vesicariæ  
genus a-  
liud.

## STRAMONIA.



spirant, gerit hæc albos, æmulus consueti illius, qui compluribus rei herbariæ imperitis

Fuchsi  
error.

Stramo-  
nia.

*Solanum  
Cives ex  
Galen.*

Ligastum falsò dicitur. Fructus ei circumqua-  
que spinosus, umbilicatusq; colore viridi. Fo-  
lia solanum quadantenus referunt, maiora ta-  
men. Quo factum est, vt quidam existimaue-  
rint, hanc viribus solano non dissimilibus pre-  
ditam esse. Solani singulis generibus vires red-  
didit Galenus libro *v* 111. simplicium medi-  
camentorū, vbi ita scriptura reliquit. Solanum  
esculentum, quod in hortis nascitur, notum est  
omnibus, vtunturq; ad omnia ea, quæ refrige-  
rari, & adstringi possunt: potest enim hæc duo  
ordine secundo. Cæterorū verò non esculen-  
torum vnum quidem nuncupatur Halicacaba-  
bum, fructum habens rufum, acino vix tum  
figura, tum magnitudine adsimilem: quo etiā  
ad coronas vtuntur. Alterū autem fruticosum,  
*trivisculum*, hoc est, somniferum: & tertium est  
præter hæc, quod *paucius*, id est, furiosum ap-  
pellatur. Halicacabum igitur in foliorū facul-  
tate hortensi solano simile est, fructum habens  
ciendæ vinx idoneū: promde multis compo-  
sitis facultatibus, quæ ad iecur, ad vesicam, &  
renes accommodantur, miscetur. Solani verò  
somnifici cortex radicis, si cum vino bibatur,  
somnum accersit drachmæ pondere sumptus.  
Sed & ad cætera quoq; papaueris succo perfi-  
missis est: nisi quòd conque imbecillior est, vt  
ipse autj habeatur ordinis refrigerantiū, cum  
hic in quarto sit constitutus. Huius solani se-  
men vrinam ciendi vim habet. Verum si plus  
duodecim corymbis hauserit, dementia fur-  
iamve adsciscet. Porro quod reliquū est ex di-  
30 cisis Solanis, ad medicaciones, quæ intro in cor-  
pus adhibetur, inutile est. Nam si quatuor eius  
drachmæ sumptæ fuerint, morbum inferent: si  
pauciores insaniā. Vna certè innoxie sumitur:  
cæterū nec ipsa vile quid obinet. Verū si for-  
ris corpori emplastrū modo illatur, vlcera  
maligna, & depascentia curat. Sed ad talia ra-  
dicis cortex optimus est, desiccans secūdo or-  
dine iam cōpleto, & tertio incipiente: refrige-  
rans verò secundo incipiente. Illud solani ge-  
nus, quod Græcis *σπύγος* & *πυρρόν*, Latinis So-  
lanum hortense nominatur: Arabibus, Hame-  
barhanaleb, Hameb alchabaich, siue Hanab  
alchaleb: Italis, Solatro hortolano: Germanis,  
Nacht schadt: Hispanis, y erua mora: Gallis,  
Morelle. Quod verò Solanum Græcè *ἐλάκα-  
μα* & *γυμνά*, Latine Halicacabus, & Vesi-  
caria appellatur: Arabicè, Kekengi, Alkeken-  
gi, siue Kekenegi: Italicè, Halicacabo: Germa-  
nicè, Laudékirlen: Hispanicè, Bexiga de perro:  
Gallicè, Beguenaudes. Quod deinde Græcis  
50 *σπύγος* & *πυρρόν*, Latinis Solanum somniferum  
dicitur: Italis, Solatro somnifero. Quod deni-  
que Græcè *σπύγος* & *μαυρόν*, Latine Solanum fu-  
riosum vocatur: Italicè, Solatro furioso.

*Nomina.*

DORYCNIUM. CAP. LXX.

DORYCNION Crateus halicaca-  
bon, aut caleam vocat. frutex oleæ mi-

per prodeunti similis. Nascitur in pe-  
tris non procul à mari. ramis cubito  
minoribus: foliis oleæ similibus colo-  
re, minusculis, firmioribus, præter mo-  
dum scabris: flore candido: siliquis in  
cacumine, ceu ciceris, densis, rotundis:  
quini intus aut senis feminibus, exi-  
gvi erui magnitudine, læuibz, firmis,  
10 versicoloribus. radix ad digiti crassi-  
tudinem, & cubiti longitudinem ado-  
lescit. Id somniferum esse constat. Co-  
piofius haultum mortem adfert. Nec  
desuere qui dicerent, semen in ama-  
toria expeti.

DORYCNIUM, Crateus testimonio, in-  
20 ter saxa in maritimis nascitur, foliis cūforma-  
tum etiā colore oliuæ proximis. Verū mihi  
hactenus non contigit ipsum inuenire, aut in-  
uentum videre: quanuis in eo quoq; inquirēdo  
multum laboris insumpserim. Cæterū hal-  
lucinatur, meo quidem iudicio, qui putant  
Dorycnium esse eam Vesicariā, quæ femine est  
rotundo, albo; macula cordis effigie insignito:  
cuius historiam inter Solani genera præcedēti  
capite retulimus. Siquidem hæc Dorycnio om-  
nibus ferè notis repugnare deprehenditur.  
30 Dorycnij meminit Galenus lib. *v* 1. simplicii  
medicamentorū, vbi de eius viribus ita scribit.  
Dorycnium temperamento papaueri simile  
est, & mandragoræ, & iis qui sic refrigerandi  
vim habent: excellit aquea frigidaque admo-  
dum efficaci. Quamobrem modicum quidem  
soporem conciliat: largius verò sumptum in-  
terimit. Id *Ανθόνιον* Græci, quod Dorycnium  
40 quoque Latini vocant.

*Dorycnij  
considera-  
tio.*

*Vires ex  
Galen.*

*Nomina.*

MANDRAGORAS. CAP. LXXI.

MANDRAGORA, aliqui antime-  
lum, alij circæam vocant, quoniam vi-  
deatur radix ad amatoria conducere.  
Duo eius genera. niger, quæ fœmina  
existimatur, thridacias appellatus, an-  
gustioribus foliis, ac minoribus quàm  
lactuæ, virosi ac graucolentibus, in  
terra sparsis: mālā gerit forbis similia,  
pallida, odorata, in quibus semen ve-  
luti pyrorū: radicibus inhæret bene ma-  
gnis, binis, ternisve, inter se cōvolutis,  
nigris foris, intus albis, crasso cortice  
vestitis: caulem non fert. Alter candi-  
dus, qui mas dicitur, nonnullis morion  
vocatatur. huius folia magna, alba, lata,  
10  
læui:

MANDRAGORA MAS.



MANDRAGORA FOMEINA.



mala quam alterius duplò maiora, colore in crocum inclinãte, iucundè cum gravitate quadam olentia, quorum potum cibò aliquantùm opiliones soporantur: radix alterius similis, maior & candidior, orbata & hæc caule. Succus fit è cortice recētis radicis tuso, & prælis subiecto: qui insolatus, vbi concreuerit, fīcili reconditur. Malis quoque succus depromitur, sed aliquantò ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad vsum suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias coquūt, & defæcatum ius seruant, cyathoque vno vtuntur in peruigiliis, & doloribus, & ante sectiones, vñonesque, ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus, vt veratrum, per vomitiones bilem aram, pituitamque extrahit: verum potu largiore vita adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, pesis quoque emollientibus, admiscetur: semioboli pondere inditus, per se menses, & partus expellit: subditus sedi pro balano, somnificus est. Radix ebur emollire fertur, quæ senis horis cum eo decocta sit: & ad accipiendam quam effingere optaueris formam ipsum facile præstat. Foliarcentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus, quas vlcera citarunt, cum polenta illinuntur: duritias omnes, suppurationes, strumas, & tubercula discutiunt: stigmata

sine exulceratione delent, si quinis, senisve diebus sensim perfricentur. Folia seruantur in muriis eosdem ad vsus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium icibus ex melle, aut oleo medetur: strumas, atque tubercula cū aqua dissipat: artienlorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem vinum è cortice radicis, ad hūc modū. Ternæ minæ in vini dulcis metretam coniiciuntur. Dantur ex eo terni cyathi, iis qui fecari, aut amburi debent, vt antè dictum est: siquidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed veterno quodā pressis torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur: item expressus ex eis succus, nimio tamen odore percussis, obmutescunt. Semen malorum potum vuluas purgat: appositumque cum sulphure ignem non experto, rubra fœminarum profluvia sistit. Scarificata, punctisq; multifariam aperta radice erumpens lacryma, cauo vase recipitur. Liquamentū autem succo lacteo præstantius est, sed non ubiq; vt experientia docet, radices lacteum succum delacrymant. Alium tradunt esse mandragoram, nomine Morion, in opacis iuxta specus enatum: foliis albi mandragora, minoribus, albis, dodrantibus, radicem ambiētibus: quæ mollior est, & candida, paulò maior palmo, pollicèque crassitudine æquat. Tradūt eam in pane, ossa, obsoniōve drachmæ

ponderē deoraturam, vsum rationis interceptere. obdormiscit enim homo, eo ferē quo comederit habitu, sensus impositis, ternis quaternisque, ex quo data est horis. Hac medici vtuntur cum scindendi, vrendi necessitas adest. Antidotum esse volunt radicem, cum manico solano potam.

*Mandragora stri-  
usque cum  
acerabo.*

MANDRAGORAE vtrunq; genus frequēs nascitur in compluribus Italice locis, præsertim in Apulia Gargano monte, vnde radicem cortices, & poma herbarij quotannis ad nos conuehant. Habentur & in viridariis spectaculi gratia, etenim Neapoli, Romæ, & Venetiis vtrunq; Mandragoram in hortis & vasis fœtilibus satam vidimus. Sed profecto vanum ac fabulosum est, quod Mandragoræ radices ferant, quæ humanā effigiem repræsentent, vt ignarū vulgus, & simplices mulierculæ certō credunt, & affirmant. Quibus etiam persuasum est, eas effodi haudquaquam posse, nisi cum magno vitæ periculo, cane qui effodiat, radicibus adalligato, & auribus pice obturatis, ne radices clamorem audiat effodientes, quod audita voce periclitentur, pereantq; sossiores. Quippe radices illæ, quæ humanam formā referunt, quas impostores, ac nebulones quidam venales circulerunt, infocundas mulieres decepturi, fœticiæ sunt ex harundinum, bryoniæ, aliarumq; plantarū radicibus.

*Mandragora hu-  
mana forme  
ma fœticiæ  
ita.*

Sculpunt enim in his adhuc virentibus tam virorum, quàm mulierum formas infixis hordei, & milij granis, iis in locis, vbi pilos exoriri volunt: deinde facta scrobe tādū tenui fabulo obruant, quousque grana illa radices emittant: id quod fiet viginti ad summum dierum spatio. Erunt eas demum, & adnatas ē granis radices acutissimo cultello scindunt, aptantq; ita vt capillos, barbā, & cæteros corporis pilos referant. Huius sanē rei certā fidem facere possum, quod cum Romæ essem, impostorem quendam circumforaneum lue Gallica correptū nobis curare contigit, qui præter alias innumeras imposturas, quibus circumuectis hominibus multam pecuniam extorquebat, docuit & artem, qua fœticiæ sibi cōparabat Mandragoras. quarum complures mihi demonstrauit, asserens vnam tantum interdum diuitibus vendidisse quinque & viginti, nonnunquā etiā triginta aureis. Quamobrem nos, qui omnium vilitati & saluti quantum possumus consulimus, hæc silentio haudquaquam inuoluēda duximus, vt palam omnibus fiat, quibus fallaciis ac fraudibus maximo eam detrimento, & vitæ sæpe discrimine homines ab his impostoribus, & nebulonibus decipiantur. Qui vt antiquorum quoque auctoritate suas imposturas adstruant, prædicant Pythagorā vocasse Mandragoram Anthropolophon, quod eam humanam formam reddere voluerit. Verū sciendum est, non sine ratione

Mandragoram ita à Pythagora dictā fuisse. quippe quod in vniuersum omnes ferē Mandragoræ radices à medio ad imum bifurcatæ proueniāt, adeo vt crura hominum modo habere videantur. Quapropter si eo effodiatur tempore, quo fructum gerunt, qui mali insular super folia ad terram procumbentia breui pediculo appesus, parum à radice distat, hominis, cui brachia desint, effigiem quadantenus repræsentant. Hanc

quidem rem nulli, quod sciam, vel pauci sunt, qui rectē acceperint. Quin potius plerique huius sententiæ ignari adducti sunt, vt Pythagoræ & Columellæ id maxime vicio verterint, vt qui eos de Mandragora fabulosos esse crediderint. Sed vt ad fabulam illam redeamus, quæ periculum denunciat ignaris radices Mandragoræ effodere voleantibus, iis cane qui effodiat, non ad alligato, ea mihi quidē desumpta videtur à Flauio Iosepho: qui etsi de alio radicis genere scribat, ea tamen potuerunt faciliè ab impostoribus in Mandragoræ radices transferri. Quod vt omnes clarius intelligāt, hīc Iosephi verba subiiciam, quæ lib. v. i. cap. x. v. de bello Iudaico ita scripta sunt. Vallis, inquit, qua ciuitas à parte septentrionali cingitur, quidam locus Baras appellatur, vbi radix eodem nomine gignitur, quæ flammæ quidem adsimilis est colore, circa vesperam verò veluti iubar fulgurans. Accedentibus, eamq; euellere cupientibus facilis non est, sed tandiū refugit, nec prius manet, quam si quis vnam multibrem, vel mensurū sanguinem super eam fuderit. Quinetiā tūc siquis eam tetigerit, mors certa est, nisi fortē illam ipsam radicem, ferat de manu pendente. Capitur autem alio quoque modo sine periculo, qui talis est. Totam eam circūfodiunt, ita vt minimum ex radice terra sit cōditum: deinde ab ea reliquant canem, illoq; sequi eum à quo religatus est cupiente, radix quidem facile euellitur, canis verò continuo moritur, tanquam eius vice, à quo tollendus erat, traditus: nullus enim postea accipientibus metus est. Tantis autem periculis propter vnam vim capi eam operæpretium est. Nam quæ vocatur demonia, pessimum hominum spiritus, vitiis immersa, eosq; necantia, quibus subuentum non fuerit, hæc cito, etiam si tantummodo admo-

MALA VVIGO  
MEIANZANE.



ueratur

ueatur ægrotatibus, abigit. hæcenus Iosephus, Ex cuius vtiq; verbis omnibus perspicuum esse potest, quòd hinc impossitores occasionem acceperint, qua postea vanam ac falsam de Mandragoræ radicibus commenti sunt historiam. Cæterum tertium Mandragoræ genus, quòd Dioscorides Morion appellari tradit, in opacis iuxta specus proveniens, qui mihi ostenderet in Italia, hæcenus reperi neminem. Brauolus, itemq; Fuchsus Hermolau immeritò, meo quidem iudicio, damnant, quòd virum hunc in ea sententia fuisse velint, vt putaverit mala illa, quæ Insubribus MELANZANE vulgò vocantur, nostris verò Hetruscis Petranciani, esse huius tertie Mandragoræ fructus. Sed quòd hæc non fuerit certa ac firma Hermolai sententia, eius verba abunde testari poterunt, quæ in suis corollariis de Morio ita scripta inuenio. De Morio, inquit, mandragora nihil habeo quod addi possit iis, quæ a Dioscoride notantur. Sed quoniam mala terrestria & canina Mandragoræ fructus appellantur, in mentem subeunt, quæ vulgò Melanzana vocantur, hoc est, vt ipse puto, mala insana de quibus nihil veteribus scriptum fuisse iam desino mirari, quòd multa huiusmodi reperio, sicut hercle multa quondam fiere, quæ modo vel ignorantur, vel certè non habentur. Mala ergo insana è fructu vulgari sunt, passim nascente, vt melones, & cucurbitæ: pari quoq; cultu, foliis propè ficulneis: flore oblongo, specioso, candido. Mandatur vulgò pomum ex oleo, sale, pipere, fungorum modo coctum. Hæc ad verbum Hermolai. Ex quibus equidem omnibus palam fieri arbitror, quòd perperam tum Brau-

uolus, tum Fuchsus hac in re Barbarum insinulauerint. Sunt è nostratibus, qui Malis insanis vescantur ad venerem excitandam. Quod fortè ideo præstant, quoniam flatus gignunt, concoctusq; contumacia existunt. Verum cum frequentius mandontur (vt testis est Auicenna) biliosos generant humores. Quinetià pariunt viscerum obstructions, carcinomata, elephantiasin, capitis dolores, tristitiam, & iecinoris & lienis infarctus: vnde postea diuturnæ proveniunt febres, & habitus malus. Hinc itaq; fit, vt Auerroem mirari subeat, quòd libro v. collectaneorum, mala insana commendauerit suo quodam modo parata. Iam & aliud horum genus importari cœpit, pressum, orbiculatum malorum modo, melopeponum more sectum, colore primum viridi, deinde vbi maturitatem fenserit, in quibusdam plantis aureum, in quibusdam verò rubrum visitur. Ideoq; vulgò appellantur P O M I doro, hoc est, mala aurea. Eduntur & hæc quemadmodum illa. Mandragoræ vires descripsit Galenus libro v. i. simplicium medicamentorum, his verbis. Mandragora vincentem habet facultatem refrigeratorem, adeò vt tertij sit ordinis refrigerantium. Veruntamen & caliditatis cuiusdam particeps est, & in pomis humiditatis: proinde soporem conciliandi vim ea habent. Radicis cortex, cum sit valentissimus, non tantum refrigerat, sed & desiccatur, reliquum quod intus est, imbecillum existit. Hæc planta, quæ Græcis *mandragora*, Latinis itè Mandragoras appellatur: Arabibus, Iabora, seu yabroha: Italis, Mâdragora: Germanis, Alraun: Hispanis, Mandracola: Gallis, Mandragore, & Mandegloyre.

*Malorum insanorum vires.*

*Mala anona.*

*Mandragora vires ex Galie.*

*Nemina.*

ACONITVM PRIMVM.

ACONITVM SECVNDVM.



ACONITVM. CAP. LXXII.

ACONITVM, aliqui pardalianches, alij cammorò, alij chelyphonon, alij myoctonon, alij theriophonon vo-

cant. Folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora, & subhirsuta: caulem palmo altum: radix scorpij caudâ æmulatur, & alabastri modo

spēdet. Torpescunt, vt fama est, scorpiones admota radice, stupēntque: qui rursus ellebori contactu, excitantur. Oculorum medicamentis leuandi doloris gratia addicitur. Enecat pantheras, lues, lupos, & feras omnes, in carnibus obiectum.

ACONITUM ALTERUM.  
CAP. LXXIII.

ACONITUM TERTIUM.



ACONITUM  
ALTERUM.



ACONITUM  
TERTIUM.

EST ET alterum Aconitum, quod aliqui cynoctonon, alij lyconon appellant. Huius genera sunt tria: vnū, quod vtuntur venatores: alia duo in vsu suum vertere medici. ē quibus tertium, quod Ponticū nominatur, plurimū in Italia, montibus Iustinis exilit, a priore distās, quoniam folia faciat effigie platanī, crebriore diuisura, longiora, & multo nigriora: caulē filicis pediculo simile, nudū, cubitali altitudine, aut ampliore: semē in siliquis oblongis recōdit: radices in modū squillae marinae cirrōrū nigrescūt. Quibus ad venationē lporū vtūtur: inserta siquē crudis carnib; & deuorata lupos enecat.

Aconiti duo Dioscoridi produntur Aconitū alterum, et tertiū genera, quāquam postremum triplici distinguitur diuisione. Prīmū, quod pardos enecat, Pardalianchen: alterum verō, quod canes, luposque conficiat, Cynoctonon, Lycononque vocari ait. Hoc (vt diximus) in tria genera distribuit: verū tamen postremum tantum describens, duorum priorum historiam, & vires silentio praeiit. Quo fit, vt Hermolai, & Marcelli sententiam probandā putē: qui non temerē quidē suspicantur, in altero capite plura desiderari, quibus & priorum historia, & quonā pacto tum medicum, tum venatores iis antiquitus vterentur, palā fieret. Huius diminutae lectionis illud non parū suspiciōē auget, quod in tertio genere, quod Ponticū appellauit, nihil sit ab ipso Dioscoride praeuissum, ex quo quis fortē conicere potest, in ceteris quoque eum quicquā nō praeuississe. Tertiū hoc genus passim in Italia omnibus ferē montibus nascitur, folijs quae platanū quadantenus amulantur, magis tamē per ambitum serratis, albis quibuslibet maculis resperis: caule filicis, bicubitali: floribus subluteis, acutis galericulis facie similibus: quibus siquae prodeunt, semē cōtinentes: radice multiplici, ac nigra. Habetur & aliud genus iudem ferē folijs, & caule, floribus tamē melius, ranūculo nō dissimilibus, longē tamen maioribus, adeo vt syluestres rosas hae aequet amplitudine. Quāquā Gesnerus in suo magno libro de animalibus inscripto (in quem is mihi quidē videtur vt multa vera doctē, ita non pauca etiā falsa ac vana ineptē cōgessisse) negat inueniri Aconitū, cuius flores lutei sint, atque rosas amuletur: vt qui sibi fortasse persuaserit omnia naturae opera se nouisse & vidisse. Attamē in hoc, pace eius dixerim, decipitur: siquidē plures extāt montes, qui cū hoc Aconiti genere scauant, nos hic vera scripsisse, Gesnerū contrā veritati refragari, posteris omnibus testatū relinquit. Sic qui hoc Aconitū ab effectu Lupariā vocērat rura Tridēcia, in quorū montibus copiosē prouenit, ipsum passim Lupariā nomināt, vt pote quod prater lupos, vulpes etiā interimat. Quin & canes occidit, & felles, & mures, & omnia deniq; animalia, quae suo exortu tanquā caeca produciuntur. Prīmū genus chelyphonū appellatū, quo venatores pantheras, & pardos interficiūt, saepius legimus in Tridēcia montibus. Huius generis est & illud, quo vtuntur quidā in Romano, & Neapolitano agro, lupo eo tantū cadem procurantes. Radices eius pluries venales vidimus Romae in Aurelio ponte iuxta molē Adriānicā: quod quidē non desunt, qui eas expectant, ad mures, canes, & lupos enecandos. Primi generis Aconiti, quod chelyphonū vocant, meminisse Theophrastus lib. i. x. cap. x. de plantarū historia, vbi ita scribit. Chelyphonū, quod alij scorpionē appellāt, quia radice scorpioni similem habet, adnotū, scorpionē occidere tradit: & cū reuoluerē posse, si ellebori candido linatur. Enecat idē & oues, & boues, & iumenta, & ad summam omnes quadrupes eodē die, si genitalia solum, vel radica imponentur. Proficis potū contra scorpionū ictum. Folium habet cychlamo simile: radicem, vt dictum est, scorpion

10  
20  
30  
40  
50

Dioscori-  
die locum  
suspiciū.

Gesnerus  
deceptus.

scorpionis effigie: nascitur graninis modo, & geniculis confat. loca amat umbrosa. Quod si vera sunt, quæ de scorpione narrantur, iam & reliqua eiusmodi haudquam incredibilia, & fabulosa dici debent. Hæc Theophrastus de thelyphono: qui alterius quoque Aconiti mentionem fecit cap. x v i. eiusdem voluminis, sic inquit. Aconitum nascitur in Creta, atq; Zacyntho: sed plurimum, optimūq; in Hærelia Ponti. Constat id folio intubaceo, radice tū specie, tum colore nuci proxima. vim illam mortiferam in hac esse, folium, & fructum nihil nocere affirmant. Fructus herbæ est, non humilis materie: herba ea brevis est, & nihil superuacui habens, sed frumento similis semē nō spicuum. Nascitur ubiq; & non in Aconis solum, à quibus habet appellationem: is autem vicus est Perandinorum, amat autem loca potissimum saxosa. Pascitur eo necq; pecus, neque vllum animal. Preparari ad afficiendum modo quodam enarrant, nec nosse quenquam: quamobrem medicos, quoniam componere nesciant, pro putrefactario vti. Hæc ille de secundo Aconiti genere. quod duorum alterum Dioscoridi esse potest, & illud fortasse, quod (vix ipse inquit) in vsum suum verere medici. Sed & de tertio Aconiti genere differuisse Theophrastum equidem crediderim, cum eodem loco paulo post hæc verba subdit, Aliud quoq; venenum vim diurnarum enecandi fortis conpertum affirmant: esse namq; radicalem quandam, quæ eodem die possit occidere: folium hanc habere ellebori, notamq; omnibus esse. hæc tunc Theophrastus. In quo nihil moueor, quod huic Aconito, quod tertium suspicor, veratri folia tribuerit. nam & Dioscorides nigro veratro folia platani reddidit, quemadmodum etiam tertio Aconitorum generi. Fuchsius in suis clavis de stirpium historia commentariis, primi generis Aconitum eam plantam esse censet, quam herbariorū vulgus

## HERBA PARIS.



HERBAM Paris appellat. Sed is plantæ, mea sententia, aberrat: siquidem hæc vno tantum consistat caule, rotundum, duorum palmorum altitudine: è cuius medio quatuor erumpunt folia, eodem ambitu, crucis instar patentia, sanguineæ virgæ simillima: alia præterea quatuor eodem modo procedunt prope caulis summum, sed hæc minima sunt, & linguiscula: in

quorū medio purpureus, vinosusq; extat globulus, acino vix similis, in quo semen concluditur album, minutum, copiosumq; halicacabæ modo. Radix, quæ illi subest tenuis, in capillares ferè particulas dissecta, pallescit, nulla scorpionis caudæ effigie, nec alabastræ modo aliqua ex parte niter, vtrum Aconiti genus à Dioscoride representatur: cuius folia (vix etiam Plinius libro x x v i i. cap. i i i i. est author) præter id quod cyclamino, aut cucumeri similia sunt, nunquam, quod viderim, in caulis medio suam habent originem, sed statim ab ipsa radice exeunt, hirsuta, humiq; recumbentia. Semen huic nullum, quod sciam, à rei herbariæ scriptoribus redditur. Sed ex herbæ Paradis acino semen colligitur, cui non modò nulla deleteria vis inest, sed etiam contra veneficia præstantissimum est medicamentum. Noui enim ego quosdam, quorum aliqui morborū diuturnitate, alij verò veneficiis semilulti facti erant, hoc tantum Paradis herbæ semine ad vigesimum vsq; diem in puluerem hussito drachmæ pondere, pristinae sanitati omnino resitutos esse. Porro idem Fuchsius in suis paradoxis nil aliud Aconitam esse putat Mauritanis, & præsertim Auicennæ, quam Napellus. Qua in re rursus, meo quidem iudicio, fallitur, quippe quod reperio Auicennam de viroq; Aconiti genere scripturasse, & alterum appellasse strangulatorem adib, alterum verò strangulatorem leopardi, quæ nomina eadem sunt, quæ apud Græcos lycodætonos, & pardaliches: atque eundem prius magna differentia speciatim de Napello egisse cõstat. Præterea

Fuchsii error alius.

Napelli historia, &amp; Gener.

## NAPPELLVS.



NAPPELLVS radicem Aconitis longè dissimilem profertissimè & folia, quæ porus artemissæ, quam cyclaminum, & platani referunt. Flores idem edit purpureos, qui anrea quam dehiscant, mortui hominis caluariam representant, dehiscentes verò pandunt sese vtriq; mortuæ modo. Caulis ei bicubitalis, & aliquando maiores: semen paruum, nigrum, corniculis conclusum breuib. Quæ

certe omnia & harum plantarū discrimen aperte ostendunt, simul & Fuchsij sententiam refellunt. Hinc itaq; colligendū putauerim, Aconitū cuiusque generis nullā habere cū Napello cognationem. Napelli vis in necandis hominibus

NAPPELLI GENVS  
ALTERVM.



noniensis chirurgicus tunc præceptor meus cõtra deleteria medicamenta, & venenosorum animalium quoruncumq; mortus parauerat, iussit Pontifex venenũ dari duobus latronibus, quos leges damnauerant, quod suorum facinorũ pœnas luerent, laqueo vitam finire, vt in iis olei huius experimentum fieret. Horum alterũ, qui plurimum Napelli sumperat dulcians panibus cõmisit, pontifici medici statim oleo inungẽdum præbent, qui post tertium diem sapius oleo perunctus euasit incolumis: quanquã non sine magna formidabiliũ symptomatum accessione. Alterum vero, cui longẽ minus venenati panis exhibuerant, oleo inungi verant, vt assumpti veneni effectum, seu etiamq; cerne-  
rent. Id quod illis rei exitus faciliẽ cõprobauit: quandoquidem paucis põst horis obiit infelix, iis omnib; incommodis, cruciatibus, & symptomatibus correptus, quæ ab epoto Napello prouenire scribit Auicenna. Ceterũ idẽ quoq; Fuchsius loco suprà citato Leoniciensi testimonio nixus, in Auicennam accerrimẽ inuehitur: nec sanẽ eum, vt nostri recentiores, principem, sed tyrannum, & homicidam nuncupat, eosq; pariter derellatur, qui eius sedantur doctrinam. quippe quod Auicenna scripserit ( vt ipse inquit ) Napellam perniciosũ esse venenũ: mox subdidit, quod linitum, & bibitũ deler albaras cutanei morbi genus. Qua in re nõ possum non admirari Fuchsiũ, virum altoqui ingenio & eruditione clarum, quem etiam hoc nomine plurimũ diligo, quod in tam celebrẽ & antiquũ scriptorem paulo acrius & immodestius egerit. Hominem enim eruditũ partes effe semper existimavi, etsi ego eas vsquequaq; seruare non potuerim, vt non vanis contentio-  
nibus, neq; conitiis aliorum scripta resellant, sed rationibus, iisq; probatissimis, præferẽtẽ cum eos accusant, qui multis antẽ sæculis è vita decesserant, nec amplius à calumnias se tueri

adeo immanis, sæ-  
uãq; existit, vt nul-  
lis ferẽ antidotis  
occurrì possit, nisi  
quã primũ, &  
statim succurra-  
tur, quod tamen  
Aconitum fumen-  
tibus non euenit.  
Napelli immanita-  
tem vidimus nos  
Romæ anno à chri-  
sto nato 1524. mē-  
se nouẽbri in Ca-  
pitolo Clementis  
v. i. Pont. max.  
anno primo. Nam  
cũ decreuisset  
experiri olei cu-  
iusdã præstatiissi-  
mi vires, quod Gre-  
gorius caruita Bo-

possunt. Qui præterea considerare debent, 2a  
in quo aliquem reprehendunt, in eo proprius  
sit authoris lapsus, an interpretis, aut librarij,  
antequã illũ iurgiis potius, quã rationibus  
inuvadant. Quippe relictis tam Mauritanorum,  
quã Græcorum sectis, quã vni magis quã  
alteri additus esse nolo, mihi quidem non vi-  
detur existimandum, quod Auicenna vir sanẽ  
singulari doctrina, & admirabili ingenio ab om-  
nibus recentioribus nostris maxime cõmendã-  
tus, eodẽ in loco sibi oĩnino contraria scrip-  
serit in veneno tam seuo, cui exitiales formi-  
dandasq; vires tribuit. Cuius rei firmissimum  
præbet indicium scriptura Auicennæ ab An-  
drea Bellunensi castigata in qua nusquam legi-  
tur Napellum bibitum albaras delere, sed quod  
hoc efficit quædã eius cõfectio in potu sumpta.  
Verba enim Auicennæ secundum castigationem  
Bellunenens ita sonant. Napellus deler albaras  
linitum, sicut & cõfectio eius dicta alberzaci-  
li in potu sumpta. Ex quibus verbis plura mihi  
sefe offerunt cõficienda, vt tuerar Auicennam,  
aut quod cõfectio illa tam exiguam Napelli  
partem excipiat, aut ea, quam recipit, adeo an-  
tidotis correctã sit vt non solũ necem non in-  
ferre possit, sed ne tantillum quidẽ obesse. Aut  
quod Napellus in illam additus, is fortẽ est,  
quem Auicenna appellat Napellum Moyfi, aliqui  
verò Antorã. quandoquidem hæc planta an-  
tidotum sit admodum efficax contra Napelli ve-  
nenum, præsertim quod dicat Auicenna, ineffe  
similiter huic plantæ vim ad albaras, & lepras:  
aut in eadẽ cõfectione fortasse mus ille inter-  
ponitur, qui Napelli radicibus victitat, à nobis  
pluries inuentus in Ananissibus mōtibus, quod  
etiam mus iste Napellus Moyfi ab Auicenna di-  
catur, quoniã iisdem contra Napelli venenum  
pollcat viribus, quibus & eiusdẽ nominis plãta.  
Hæc fortassis fufus, quã decebat, p̃fectũ  
sumus. Sed tamen eo cõsilio id libenter feci-  
mus, primũ vt quantũ per nos fieri posset,  
Auicennã à calūniã vindicaretur. Deinde vt inge-  
nuẽ dicere quod de iis omnibus sentio, qui  
optimos etiam quosq; autores, præsertim Ara-  
bas, lacerant ac discerpunt, quorum plerisq;  
magna est habẽda gratitudo: abest vt eos odio  
perpetuo prosequi debeãt. Verũ cur id faciãt,  
nõ video, nisi quod tũtũ sit in mortuos inuahi,  
quãdo hodie pauci sint, qui eos tueri velint.  
Ceterũ existimant Manardus Ferrariensis, &  
Leonicius, quod Napellus, & Toxicũ Græcis  
vocabũ inter se nõ differant. Sed quantũ à illi  
viri grauissimi aberrauerint, inferius libro sexto  
in toxici mētionẽ latius ostendẽmus. Aconito-  
rũ vires tradidit Galenus lib. v. i. simpl. medicã.  
vbi ita scriptum reliquit. Aconitum pardian-  
ches putrefaciendi facultatẽ obĩnet, & lethale  
est. Itaq; in cibo potuq; sugendum: attamen  
ad putrefaciendũ externas corporis partes,  
aut etia sedem idoneum est. Herbz v. e. rãd-  
ix ad hæc vtilis est. Quod autẽ Lycõ-  
don non vocatur, similem alteri facultatem ha-  
bet,

Auicenna  
a. ferfius.

Aconitũ  
Sicut ex  
Galenũ.



bee, sed peculiariter lupos, sicut illud pardos, interficere consuevit. Hactenus Galenus. Meminit Aconiti etiam Plinius lib. x v 11. cap. 11. his verbis. Sed antiquorum curam, diligentiamque quis possit satis venerari, cum conslet Aconitum venenorum omnium acerrimum esse, & tachi quoque genitalibus foemineis sexus animalium, eodem die inferre mortem? Hoc quoque tamē in vsus humanæ salutis vertēre scorpionum ictibus aduersari experiendo dat in vino calido. Ea est natura, vt hominem occidat, nisi inueniat, quod in homine perimat. Cum eo solo colluctatur, velut pari intus inuenio. Sola hæc pugna est, quom venenum in visceribus reperit: mirisq; extialia per se ambo quum sint, duo venena in homine commoriantur, vt homo superet. Torpescent Scorpiones Aconiti tactu, stupentq; pallētes, & vinci se cōfiteantur. Auxiliatur eis Helleborum albu tactu resoluente, ceditq; Aconitum duobus malis, suo, & omnium. Quod si quis illa fortē ab homine excogitari potuisse credit, ingrātē Deorū munera intelligit. Aconiti primum genus Græcē vocatur *ἀκόνιτιον παρὰ λαιαγγίτι*: Latine, Aconitum interficiens pardos ac pantheras: Italicē, Aconito pardalanche: Germanicē, Vuolfs beer, & Dollwurt: Hispanicē, Centelha: Gallicē, Herbe de la toire. Alterum verō genus Græci *ἀκόνιτιον κυανέον* dicunt: Latini, Aconitum, cyanoconum & Lycogonon: Itali, Aconito cinofo: Germani, Vuolfs wurz: Hispani, Yerua mata lono, & Yerua de baihefteros: Galli, Parelousine.

## Appendix.

Conradus  
Gefneri  
causam  
remon-  
strat.

CONRADVS Gefnerus hac ætate eruditione, ac copia rerum carissimus medicus suo, quem de raris, & admirandis herbis appellauit libello, de primo Dioscoridis Aconito differens, quod ipse vulgus sequutus Toram appellat, non solum imaginem nostram in huius capituli initio apertam pluribus impugnare nititur, sed (vt arbitror) inuidorum potius quorundam suasionibus, quam sui ipsius genio excitatus eō immodestē, inprimisq; peruenisse demonstrat, quod haudquaquam decere crediderim honestos quosque viros desistere. Quamobrem non possum non admirari, Gefnerum, quem hactenus modestissimē de omnibus scriptis constat, nunc primum longē alter itē genere, præsertim cum certō sciat se iam plura magna edidisse volumina, quæ censuris innumeris non vocabant. Equid profecto turpius, deestabilisq; Gefnero euenire potuit, quam infidelitatis istum arguere hominem, cuius auctoritas, integritasque tanta iudicanda fuit apud ipsum, vt innumeris ferē locis in libris de animalum historia, aliisque voluminibus non solum istum laudauerit, probauerit, ac etiam obsecrasset, sed illius scriptis, inuentisque pro sui commodō vsus sit, ac multa illi accepta re-

ferre possit? Etenim non abest suspicio, quin eius sinceritatem vaser quispiam labefactauerit maleuolus, (nam & aliosynceros, ac probos viros ab ipso deceptos scimus) quo postea factum sit, vt dum is immerito nostram accusat imaginem, aliam ipse in medium afferat, quæ (pace eius dixerim) merito damnari possit, quum planta, quam ipse pro primi generis Aconito pingit, de quo Dioscorides, & antiquorum alij meminere, nullis prorsus notis legitimum illud Aconitum referat. Ad eō vt a genuino non minus differre videatur, quā coruus a cygno. Nam vbi hirsuta folia? vbi Cucumeris, aut Cyclaminī facies? vbi plura quā in xum tantum folium? vbi radix caudæ Scorpionis æmula? vbi (Dij boni) alabastrī splendor? Nullum penitus talium notarum apparet vestigium. Quamobrem plurimum mirari subit, quod quasi fascinatū maluerit Gefnerus imperitissimū otiosum, cuius halitus se telum effecit, contra nos probare sententiam, quā Theophrastum, Dioscoridem, Plinium, Orisabium, & alios quorquos sunt clarissimi nominis auctores admittere. Adhuc non video, cur ea ratione adducatur Gefnerus, vt non putet imaginem nostram nisi fictitiam, quod scilicet nimis artificiosa sit radix, & quod absque vllis videatur fibris, quum aliarum etiam plantarum habeantur radices omnino glabræ artificie editæ longē maiori, vt in Dentaria vocata, & in eo Sanicula genere, quod album Germani vocant, cuius superius inter Symphyta meminimus, videri potest. Sed dicat Gefnerus, obsecro, quotnam in suis de animalibus libris fictitiis appinxit imagines: longum sinē esset recensere. Recensebo fortasse alius: quippe nil minus ferendum, quā rationem ab alio recedere eum, qui suæ reddere non possit. Sunt enim in promptu doctissimi viri, & in platatum historia, ac facultate exercitatissimi, qui rerum veritatem optime norunt, quorum nomina, etsi copiosum non efficiant numerum, fictis mihi fuerit iis commendari labores hostros, quā a cæteris improbari. Equidem Gefnero aliquo viro doctissimum nostri Aconiti silepem mittere possem, nec me taderet ad montes illos me iterum recipere, licet magna intercedat itineris distantia. Atqui quum plantam non requirat, sed duorum, aut trium eruditiorum testimonio, hæc semper in promptu erunt. Viuit Georgius Liberalis pictor, qui plantam delineauit, Viuit Petrus Spertzialancia, qui eam effodit, Viuit Franciscus Melchiorius medicus Tridentinus, qui nobiscum ierat. Viuo ego (Dij boni) qui adhuc fidei aliquid præstare possum, & montes viuunt, qui tales nobis alunt plantas. Mirum sinē, quod iam tant morosi sint homines, vt nil aliud extare terris, maribusq; censent, quā quod ipsi tantum viderint. Verum enimvero non possum fatis explorare Gefneri mem-

Generi la-  
ssum.

Gefnerus  
notat.

Matthioli  
testimo-  
nia aduer-  
sus Gefne-  
rum.

*Melich-  
ria Guila-  
dini explo-  
sa temeri-  
tate.*

tem, quippe qui hæc, & alia nonnulla aduer-  
sum me prius scripserit, & nunc primum nos  
honestè benignèq; defendere aduersus Gui-  
landinum quendam Borussum, qui ad ipsum  
epistolam quandam scribens de Bulbo Casta-  
neo, Trasis, Moly, aliisque nonnullis barba-  
ra quadam inuidia fuscatus citra causam om-  
nem, ac rationem temulenti hominis instar,  
acrius, immodestiusque, quinetiam iniquius  
quàm par fuerat, in nos inuehitur. Sed licet  
etiam nobis, obsecro, parumper vna cum  
Gesnero, quem tamen suis maledictis fauto-  
rem sperabat, tam impudentis hominis rabiem  
repellere. Nam quis hoc pati possit? Quis non  
modestis sine prætergrediatur, vbi tantum  
contumeliis, calumniis, & imposturis fuerit  
lascissus? Nihil est, quod bono, doctoque viro  
gravius, molestiusque contingat, quàm si  
fenserit labores suos ab imperitissimis homini-  
bus rabidis moribus carpi, & præter equum  
impugnari. Id, quod si aut nostro tantum ruo,  
aut mihi soli euenire perspectum haberem,  
dolerem primum horum temporum nequit-  
iam, inde verò fortunam meam deplorarem.  
Verum quum id omni tempore fuisse commu-  
ne animaduertam, eamque fuisse semper bo-  
norum, doctorumque virorum conditionem  
non ignorem, vt inuidiorum tela euitare, ra-  
biemque effugere neutiqum possint, facile  
æquo animo patior quorundam audaciam, insi-  
gnemque temeritatem. Inter quos nulli mihi  
secundus videtur Borussus ille, quem potius  
(vt ita dicam) Marassum vocauerim. Quid?  
Mihi blatero inuidiam parare credit, quod me  
herbariorum Deum appellat? An nescit rabula,  
non alia ob causam labores nostros in omnium  
ferè studiosorum manibus florescere, & lepi-  
laudari, foueri que ab omnibus, quàm quod ij  
de re herbaria benemeritum me iudicent? quin  
etiam ob id mihi tantas agant, habeantque  
gratias, quantas mihi vix meritis esse videor?  
At qui is, tameris stultissimus sit, in hoc ta-  
men (me hercule) sperere videtur, quod cor-  
rium illud suum tantum faciat, vt Matthioli pelli  
anteferendum iudicet, quod sibi aliquando ex  
usu fore putat. Seruet ille suum corium dili-  
genter inuentum, & magno existimet pretio.  
Quippe nisi proprio fuerit adiutus corio, pa-  
rum aberit, quin liuoris intumescencia rum-  
patur medius. At videant candidi: pique le-  
dores, qua hypocrisi incepit in nos inuichi  
Guilandinus, quum primum inquit. Non is  
sum, qui caulis, & imposturis inanem glo-  
riolam aucupari velim. Mentiri nescio, nec si  
scirem, velim, quum tamen nil magis profe-  
teatur: quàm calumniis, maledictis, & impo-  
sturis synceritatem, & modestiam nostram  
impugnare, & id me scripisse asserat, quod  
nusquam in nostris legitur commentariis. Sed

nescio quomodo turpiora sint vitia, quàm quæ  
virtutum specie celantur. Porro si quandoque  
fortassè nonnullas bonas horas malè consum-  
psero, vt huic impudentissimo conuictori  
respondeam (id enim hic non exposulat lo-  
cus, ne huius futilitate, & friuolis ineptiis  
nostra defordentur commentaria) rogaros velim  
studiosos omnes, ne id à me factum pu-  
tent, vt aliquam mihi exinde laudem requi-  
ram, quæ nulla mihi tam diu esse potest, quàm  
diu cum homine tam impudenti negotium  
est: qui tanquam humulentus sus cum quouis  
volatari cupit, sed si quam ille maledicendo  
voluptatem accepit, eam malè audiendo amit-  
tat, ceterique eius simillimi apertè omnes  
intelligant, plus esse bonis, eruditisque  
viris se defendendo præsidij, quàm vanis  
obtrektoribus in calumniando fraudis.

CICUTA. CAPVT.

LX XIII.



CICUTA cau-  
lem edit genicu-  
latum, vt fœni-  
culi, grandem:  
folia ferulæ, an-  
gustiora, graui  
odoratu rami,  
moxymbellæ in  
sumo prodeunt:  
flores quodq; al-  
bicantes, & se-  
men aniso can-  
didius: radice  
non alta, conca-  
ua. Cicuta le-  
thale venenum  
ineft, suaque vi  
refrigeratoria  
necat. Remedio  
est vini meracu-

lipotus. Succus exprimitur contusis  
cacuminibus, priusquàm semina, & co-  
mæ siccetant, qui sole densatur in pa-  
stillos. Multus ad medendi rationem  
usus est aridi: commodè miscetur col-  
lyriis, quæ leuandi doloris gratia tem-  
perantur: ignes sacros, & vlcera quæ  
ferp

serpunt, illitu restinguit. Herba cum coma trita, & testibus circumlita, libidinum imaginationes in somno compescit, sed genitale resoluit. Iac puerperarum mammis apposita extinguit: in virginitate mammas coarctat, & incrementum non patitur. pueris præstat, ut eorum testiculi cibum non sentientes intabescant. Efficacissima vis Cretica, Megarensi, mox Attica, & in Chio, & Cilicia nascenti.

*Cicuta con sideratio.*

CICUTA vulgaris notitiæ est planta, utpote quæ pteruncque prope urbium, & oppidorum monia proveniat, ferulæ adsimilis, odore tamen admodum graui. Maxima vis Cicutæ, ut Plinius refert, quæ nascitur in terra Parthorum, mox Laconica, Cretica, Asiatica. In Græcia verò Megarica, deinde Attica. Cæterum in Italia constat Cicutam non adeo exitialem esse. Eam in Hetruria si asini depascantur, profundissimo somno, & torpore capiuntur, ita ut non tantum stupidi, sed planè mortui videantur. Id quod aliquando rusticus huius rei ignarus fessellitum dum asinis, quos mortuos credebant, pellem ad visum detraherent, accidit mirum, quod in medio feris operis asini perrexi sunt, non sine magno excoarctantium terrore, atque ingenti spectantium risu. Cicuta breuiter meminit Galenus libro v. 11. simplicium medicamentorum, ubi tantum omnibus notum esse scribit, quod ea extremè refrigerantis sit facultatis. Et in libro quod animi mores corporis temperaturam sequantur, Cicutæ potum illam fieri amentiam tradidit, quam à Cicuta ipsa Græci conion appellant. Hoc nobis contingi videre, ut latius libro sexto explicabimus, in quibusdam, qui imprudenter Cicutæ radices pastinacæ vice decoctas comederant. Planta, quæ Græcis *νύκταρα*, Latinis atque etiam Italica Cicuta vocatur: Arabibus, Sucaram: Germanis, Zigerkraut, Schirling, & Vuetterich: Hispanis, Ceguda: Gallis, Cigué, Cocuë, & Seguë.

*Cicuta Si res ex Galeno.*

*Stamina.*

TAXUS.

CAP. LXXV.

SMILAX à Græcis, Taxus à Latinis appellatur, arbor abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura, in Italia, & Narbonensi Gallia Hispaniæ contermina nascent. Auiculæ quæ Italicæ taxi bacca deuorant, denigrantur: & qui edierint eandem homines, alui

TAXUS.



profluuiis corripuntur. Narbonæ tam præsentis est veneni, ut si qui dormiant sub ea, aut in eius umbrâ subsideant, lædantur, & sæpè penumero moriantur. quare de taxo hæc traduntur, ut ab ea cauamus.

NASCITUR Taxus frequens in Ananix *Taxi cent.* vallibus montibus, saxosis ac præruptis locis, inter abietes, & piceas, quibus folio, ac forma non longè dissimilis visitur: quamquam hæc illam proceritatem non nisi rarsissime æquat. Bacca fert rubentes, agrifolij modo, dulces, vinosasque: quæ quandoque mandentes tum pastores, tum qui in sylvis arbores cædunt, flammam in febres incidunt, & dysenterici fiunt, sanguine & spiritibus inde admodum inflammatis. Lignæ materies, quod rufescat, quum plurimis intercurrentibus venis, incorruptaque sit, lignarum fabris maximè expetitur, & plurimi se, præsertim concinandas mensis, & hastis, telisque conficiendis. Quamobrem Germani huius arboris asseres ad sua construenda hypocaula non exigua sibi cõparant pecunia. Taxi meminit Theophrastus libro 11. capite x. de plantarum historia, sic inquit. Taxus quoque genere simplex, proceræ, autem insignis, similisque abieti, nisi quod non pariter excelsa, magisque alis sinuata est: folio quoque Abieti similis, sed pinguior, molliorque ligno. Quæ in Arcadia nascitur, nigro ligno, aut puniceo constat: quæ autem in Ida, flavo admodum, & cedro simili, propter quod vendentes fraudare dicuntur, tanquam cedrum venundent. Totum enim cor esse, cortice detracto: corticem similem cedro habere tum scabritia, tum colore: radices breues, graciles, per summaque cespitem, rara hæc circa Idam. At in Macedonia, Arcadiæque vel fructum abunde proferre, rotundum, saba paulò maiorem, colorem rufum, tactuque mollem. Aiant, quod si ismentia folia comederint, emoriantur: si ruminantia, nihil patiuntur. Fructus & ab aliquibus hominibus manditur, suauisque est, atque innoxius. hæc enim Theophrastus. Cuius sententiæ illud obstat videtur, quod nostra Taxus fructum ferat non innoxium, ut ipse ait, sed noxium, ut suprà

*Taxi historia & Theophrastus.*

*Ex Plinio.* vt supra diximus. Taxi Plinius quoque meminit libro x v l. capite x. vbi de ea ita scribit. Absteri, & piceæ similis etiamnum absteru est Taxus, minus virens, gracilisque, & tristis, ac diræ, nullo succo, ex omnibus sola baccifera. Mas noxiæ fructu: lethale quippe baccis, in Hispania præcipue, venenum inest. Vasa etiam viatoria ex ea vinis in Gallia factis mortifera fuisse compertum est. Hanc Sessius sinifacem à Græcis vocari dixit: esse in Arcadia tam præsentis veneni, vt si qui dormiant sub ea, cibumve capiant, moriantur. Sunt qui & toxica hinc appellata dicant venena, quæ nunc toxica dicimus, quibus sagittæ tinguntur. Repertum innoxiam fieri, si in ipsam arborem clauus æreus adigatur. hæc *Plinius*. Postiorum fumo mures necantur. Taxi præterea nouimenta tradidit Dioscorides libro sexto, vbi de noxiis medicamentis pertractat. quod cum peruentum fuerit, de iis diffusus nobis differendum erit. Taxi vires quam paucis reddidit Galenus libro v l l l. simplicium medicamentorum. sic inquit. Smilax, aut taxus arbor est venenosæ facultatis. Huic arbori nomen Græcum est *εὐνάξ*: Latinum, Taxus: Italicum, Tasso: Germanicum, Eibenbaum: Hispanicum, Texo: Gallicum, Yf.

*Taxi vires  
ex Galen.*

*Nomina.*

APOCYNUM. CAP. LXXVI.



APOCYNON, siue cynocrambe, brassica canina, frutex est longis viticulis constans, malè olentibus, lentis, vitiliumq; modo obsequiosis, fractu ferè inuictis: folio hederæ, molliore tamen, & per extremum

acutiore, lento, graui odore: id luteo succo turget. Siliquæ ceu fabarum, folliculari specie, digiti longitudine protrudentur: semine intus duro, paruo, nigro. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant, in cibo data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

*Apocyni* APOCYNON, quod & Brassicam caninam appellant, etsi iamdū mihi quidem incognita fuerit, adeo vt inter alias incomperitas stirpes in amplissimo naturæ viridario posteris relique-

rim explorandam, hoc tamen anno è Pisis medicis eruditione, & in re herbaria clarus, Lucas Ghinus Forocornelienfis duas ad me misit plantas, quarum vna per omnia Dioscoridis Apocynon representat. Scribit enim vir ille, duas à quodam nobili amico siliquas dono accepisse è Syria allatas, quarum alteri inferiptum erat Periploca repens, alteri verò Periploca non repens, fortasse quod ita Syri eas plantas nominent. Subdit præterea, has siliquas rhododendri siliquis admodum fuisse similes: inter quas tamen hæc erat differentia, quod repentis Periplocæ siliqua ea sanè longitudine constabat, quæ & rhododendri, gracilior tamen erat: alterius verò breuior. E' longiori fata plantam proventille ait, quæ non modo humi reptet, sed & arbores quantūvis proceras scandit: breuiori verò aliam, quæ notis omnibus Apocynon refert. Vtraque porro non minus lacte turget, vt scribit, quam rithymali omne genus: verum id repenti omnino album inesse: non repenti verò suberocem. Hinc itaque fit, vt huic viro planè subseribam, & alteram, cui omnes prorsus notæ adamussim adfiliari videntur, Apocynon esse cerò credam. Neq; hæc facile mutabere sententiam, nisi aliam plantam proferri videro, quæ clarioribus notis, quàm hæc, cuius picturam exhibemus, Apocyni faciem exprimat. Apocyni vires memoriæ prodidit Galenus libro v l l. simplicium medicamentorum, sic inquit. Apocynum, aut Cynocrambe. Vocant autem quidam eam Cynomorum, quandoquidem canes celerrimè interimit, sicut Lycotona lupos. Est autem hominibus venenum, herba multum grauitè olens: proinde omnino calida est non infrenuè, non tamen proportionè deficiat. Itaque illa admodum digerens est facultatis. Quæ planta *κύνων* Græcè, Apocynum item & Brassica canina Latine dicitur: Italicè, Apocino.

30

40

*Apocyni  
vires ex  
Galen.*

*Nomina.*

NERTIVM, SIVE RHODODENDRYM.

CAPVT LXXVII.

NERTIVM aliqui rhododaphnen, alij rhododendron vocant. frutex est vulgaris notitiæ, longioribus quàm amygdala foliis, crassioribusque: flore in rosam conformato: fructu amygdalæ simili, corniculato, qui patefactus quandam lanosam naturam ostendit, spinarum pappos representantem: radice longa, acuta, lignosa, gustanti salsa. nascitur in amœnis, maritimis, & secus amnes. Flores, & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedū plurimis venena sunt

sunt: hominibus verò contra serpentium morsus præsidia, è vino pota, èo magis rura addita. Imbecillæ etiam animantes, vt pecus, & capræ, si aquam bibant, in qua folia ea maduerint, moriuntur.

Nerij com-  
sideratio.

NERIVM.



NERIVM, quòd flores rosarum effigie proferat, laurinisq; foliis conflet, Græcorum quidam Rhododendron, alij Rhododaphnen appellant. Italis Oleandro vulgò dicitur. Vidimus nos hoc primum ad Benaci ripas, & in Argentario promontorio in maritimis nostris. Planta est lauri facie, spectabilis, & visu non iniucunda, præsertim cum roseis emicat floribus. Horum similitudine deceptus quondam fuit

Lucius Apuleius sub asini metamorphosis, dum rosas quæreret, quarum pastu in pristinum formam restituendus erat. Nam cum procul vidisset Nerium suis floribus refertum, ratus eos esse veras rosas, èo aperto ore accurrit tanta auiditate, vt parum defuerit, quin eas primo occursum imprudens deuoraret. Verum, vt qui in platarum historia, in viribus earum indagandis diligentissimus author extitit, non immemor Nerij flores depastos asinis venenum præsentaneum esse, ita deceptus labra submouit, demissisque ad terram auribus abiit. Nerij vires descripsit Galenus libro v. simplicium medicamentorum, sic inquires. Nerium, vt Rhododaphne notus omnibus est frutex, Foris quidem corpori illius, discutiendi vim obtinet. Intrò autem in corpus assumptus, perniciosus, ac venenosus non tantum hominibus est, sed

Nerij Girex Galeni.

Conciliatio Dioscoridis cum Galeno.

plerisque etiam pecudibus, hæc Galenus. Quæ maxime repugnant Dioscoridis, & Plinij placitis: quippe qui Nerium potum commendauerint hominibus contra serpentium venenosorum morsus. Nisi dicere velimus, quòd Nerium sumptum secundum Galenum sithominibus non demorsis perniciosum: secundum verò Dioscoridem idem iis remedio sit, quos serpentes momorderint. Idq; ea ratione fiat, qua & cantharides (vt inquit Auicenna) à cane rabido demorsis medentur, & euphorbium à scorpionibus idem, & alia denique lethalia medicamenta aliis item venenis aduersantur, vt inferius li-

bro sexto latius dicitur. Siquidem mihi non videtur verisimile, quòd præter rationem id prodiderit Dioscorides in simplicium materia omnium facillè princeps. Nisus, jeda, hagen, & jeda, hagen, sic Græcè planta dicitur, quæ Latinis pariter Nerium, Rhododaphne, & Rhododendrum: Italis, Oleandro: Germanis, Olander: Hispanis, Adelfa, & Elocadro: Galis, Rosagine, seu, Rosage.

FVNGI. CAP. LXXVII.

FVNGORVM differentia duplex: aut enim manduntur, aut perniciales sunt. Multis de causis venenosi gignuntur, vbi videlicet clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerint: aut si iuxta serpentis cauernam, arborisve, quæ priuatim pariunt noxios fructus, erumpat. Continent qui tales sunt, nescio quod strigmentum, concretamq; pituitam, terræque cruti, quàm cellerrimè computrescunt, atque marcore vitiantur. Sed qui veneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent: largius tamen sumpti nocent, & ægrius concocti strangulant, aut cholederam morbum citant. Remedio est nitri potus, aut lixiuium cum acida muria, aut feruefactæ satureiz, aut origani insculum: debellantur etiam gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle multo. Corpus aluunt, sed ægrè dissoluantur, cum magna ex parte integri ipsi cum recrementis alui deliciantur.



TAMETSI duo tantum Fungorum genera hic videatur recensere Dioscorides, ad fungos duntaxat innoxios, & perniciales respiciens, consideratamen, vt omnibus palam est, plura ac diuersa generum, quæ in cibis expetuntur, discrimina notantur.

norantur. Horum inter omnes Italice regiones feracissima est Hetruria, ubi illi Fungi ceteros antecellunt, qui vulgo dicuntur Prignoli: ij si quidem singulis annis primis Aprilis imbribus erumpunt, neque solum odorem eximium spirant, gustuq; gratissimi sunt: sed etiam omnino innoxii habentur. Secundum verò locum apud nostros Hetruscos tenent ij, qui vulgo Porcini, hoc est, suilli nuncupantur: quippe qui prius elixi, ac denum farina circumliti, & oleo vel butyro frixi, magnam cum palato inant gratiam. Verum hi non adeo tuti sunt, quòd in suo genere perniciosi plures, quàm in aliis reperiantur. Ceterum periculosi ac malefici à peritis, & oculatis viris facile dignoscuntur, cum à terra & cortice purgantur, incidunturq; decoquendi. Nam cultello dissecti illi (vt Plinius inquit) dilutus eius aduenit rubor, rancidus subinde aspectus, liuidus intus color, rimo fa sitia, pallidum per ambitum labrum: postmodum accedit nigredo, & ita proinus computrescunt. Quamobrem rectè scribit Auicenna libro 1111. fen v 1. eos nocentiores esse, qui nigri, vel virides, vel in nigro purpurascens videntur. Proinde amens quidem, & planè stupidus, & stipes fuerit is, qui tam repentinis mutationes viderit, & non cognouerit his notis eorum virus patefieri. Sed accidit plerumque, vt illos potissimum Fungi interiam, aut saltem in magnum distemem adducant, qui eos super cetera craticula, aut prunis, calentibusq; cineribus afflatis deuorant. Hoc enim modo decocti, cum in taleolis non fecerunt, non tam facile cognosci possunt, vt ij qui dissecti parantur. Ad hæc non semper efficiunt Fungi, quòd per se lethiferi sint, sed quòd copiosius quam par sit, ingerantur. Quandòquidem cum lenti admodum, crassissimiq; succi existant, arteriarum ostia vsque adeo obstruunt, vt conclusi intus spiritibus suffocent. Quod cum probè norint agrestes in Hetruria mulieres, rarissime fungos mādunt, nisi alio, & pipere adiectis. Afferuntur Fungi muria, præsertim qui vulgo Porcini dicuntur: nanq; hoc modo parati innocentes redduntur amisso lentore. Præter hæc multa alia fungorum genera apud nos inueniuntur, vt ij qui nobis vulgo appellantur Prataioli, Turini, Boleti, Orcelle, Cardarelle, Manine, Ordinali, Parigiolæ, Veschie di lupo, & cōplura alia, quæ cum nihil vel parum ad rem faciant, silentio inuoluenda duximus. Ceterum Fungi non tantum humi proueniunt, sed & in arborum caudicibus, qui omni ferè periculo vacant (dummodo non sint arbores noxiæ) quòd è cortice proflant, cui nec ferrum, nec tabefactus pannus, nec serpenti cadaver subesse potest. Ex hoc genere quidam, præter agaricum, laticibus innaſcentur in Ananiciſibus montibus triginta librarum pondere, aureo colore. per ambitum dissecti, in cibis gratissimo, nullo amore præditi, licet agaricus ibi eadem arbore productus fit amarissimus. Hic certè mirari subit, quòd tanta homi-

nibus inferitur gulæ libido, luxus, & incontinentia, vt adeo necōsulò, auideq; fungis vescatur, in quibus sæpius immatura mors delitescit. Tanta hodie intercessit gratia Fungis cum mensis in Italia, ubi eorum frequentissimus est vñus, vt Neapoli inuenti sint lapides, qui desolati, & in cellis vinariis translati, terra aliquantulum operci, & subinde tepida aqua inspersi intra quatridduum fungos non ingratos procreant. Hos & Romæ, & Neapoli vidimus, ubi magna seruantur diligentia, nempe quorum merito quolibet tempore fungos edant Sunc & lucernarum Fungi, qui in ellychnio sunt, præsertim cum aer humorem contraxerit, & ad pluuiam præparatur. Fungus itaque lucernarum, meo quidem iudicio, fuerit is carbonis globulus, qui fungi faciem repræsentans, in ellychnij extremitate concreſcit, & flammæ lumē obumbrat. Neq; enim in hoc subscribam Cornario, viro alioqui ingenio & doctrina celebri, qui in commentariis, quos in tertium Galeni librum de compositione medicamentorum secundum locos edidit, cæſet fungum illum esse ellychnium lucernarum ex quodam fungi genere factum, quod facie (vt ipse inquit) marinas æmulatur spongas. Siquidè apud veteres nusquā me legisſe memini, & fungis ellychnia fieri: cum tamen legerim apud Virgilium, & Plinium, cum fungi generantur in lucernis, futuræ pluuiæ esse præſagium. Nanq; Virgilius libro primo Georgicorum, ubi futuræ pluuiæ signa recenset, id aperctissime testatur, his carminibus.

Tū cornix plena pluuiæ vocat improba voces:  
Et sola in secca secum spatiat arena.

Nec nocturna quidem carpes pelli puellæ  
Nesciuerè hyemè, testa cum ardere viderent  
Scintillare oleū, & putres cōcreſcere fungos.

Eorum porò generationis causam scitè quidem reddidit Seruius Grammaticus in commento hisce verbis. Nam (vt inquit Plinius) cum aer humidus esse cōperit, fauilla, quæ cum fumo solet egredi, prohibita aëris crassitate in lucernis reſidet, & quasdam velut fungorū imitatur imagines. hæc ille. Sed præterea ipse Plinius Virgilio, & nobis quodæ adſtipulari libro x v 1. cap. vltimo, cum ita scribit. Pallidi nanq; ignes, murmurantesq; tempeſtatum nunciij ſentiuntur: pluuiæ etiam, si in lucernis fungus hæſtens Plinius. Ex quibus omnibus luce clarius fieri potest, hæc in re Cornarium cæcitiſſe.

Fungi præterea apud Hippocratem & Galenum lib. & comm. ij. de morbis vulgaribus, sunt excreſcentiæ, quæ quandoque in palpebris, quandoq; in pudendis enaſcuntur. Quin & Fungi dicuntur à Galeno lib. 1. de locis affectis adnæſſe capiti, ubi hoc fracto, meninx, quæ est membrana cerebrum custodiens, fuerit affecta. Nec alia sanè de causa hos affectus pūntur, id est fungos, vocari crediderim, quàm quòd fungorum imaginem referant: quemadmodum & ij qui in lucernis concreſcunt. Fungorum vires memoriæ prodidit Gale

Fungi  
aliæ generæ

Fungi lucernarum

Cornarij opinio ex-  
pugna

40

50

Fungi corporis affectus

Fungorū vires ex Galeno

Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Fungus frigida, humidaque admodum planta est. quamobrem etiam proximè ad deleteriam, enecantemve facultatem accedit: & sanè inter eos sunt qui interficiant, potissimum qui ex natura nascuntur qualitate putredinosam. Et libro secundo de alimentorum facultatibus, idem de fungis ita differit. Inter fungos Boleti, si bellè in aqua elixi fuerint, propè accedunt ad cibos insipidos. Non tamen sic foliis ipsis vulgè videntur, sed adparant variè & condiunt, ut alia omnia, quæ nulla insigni qualitate sunt prædita. Alimentum autem ex ipsis est pituitosum, & frigidum videlicet, prauisque est succi, si quis ipsis largius vtatur. Omnium igitur fungorum ij minimum sunt noxii. Secundi autem post hos sunt Amanitæ. Reliquos verò tutius est omnino ne attingere quidem: multi enim ex ipso est in-

terierunt. Equidem noui quendam, cui post Boletorum non satis elixorum (qui innocentissimi esse putantur) vsus largiorem, os ventriculi pressum, ac grauatum, coarctatumque fuit, difficilèmq; habuit respirationem, & in animi deliquium incidit, sudoremque frigidum sudauit, ac demum steruari ægrè, sumptis iis quæ humores crassos incidunt, potuit: cuius generis est oxymeli ipsum per se, & cum hyssopo, & origano, ipsi mediocriter incoctis. Is enim hæc sumpsit, tum natri spumam ipsis insper fiam: post quæ fungos, quos comederat, vomuit, qui iam quodammodo in succum pituitosum, frigidumque admodum ac crassum erant mutati. *Moments* qui Græci, Fungi Latinis appellatur: Arabibus, Hazar seu Facher: Italis, Fonghi: Germanis, Pfifferling, & reysken: Hispanis, Hongos, Cogomelos, & Cytherquas: Gallis, Champignon, & Potyron, & Moucerons.

*Nemina.*

COLCHICVM.



COLCHICVM.

CAPVT LXXIX.

COLCHICON, aliqui ephemeron, sunt qui agrestem bulbum vocant. Autumni exitu florem edit croci, candidantem: ab eo tempore folia bulbi, sed <sup>50</sup> pinguiora: caulem palmo altum, ferentem rufum semen: radicem foris è nigra rufescentem, quæ delibrata, candida, & mollis spectatur, lacteo succo mader, atque gustatu dulcis inuenitur: bulbus eius mediam habet rimam, fissuramque, qua flos erumpit. plurimum in Messenia, & Colchis nascitur. Ea comesta, fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne à

EPHEMERVM.



EPHEMERVM.

CAPVT LXXX.

EPHEMERON, aliqui sylvestrem irin appellant. Folia habet lilij, sed tenuiora: caulem parem: florem candidum, amarum: semen molle: radicem vnam, digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam. nascitur in syluis, & opacis. Huius radix dentibus præcipua

præcipua, si decocto colluantur. Folia in vino cocta, discutunt tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidum con-  
traxerunt.

*Colchici.* EPHEMERI duo genera constituisse vide-  
tur Dioscorides. vnum, quod Colchicon, & agre-  
stem bulbum: alterum, quod Irin sylvæstem  
cognominant. Quod primo loco describitur,  
visque adeo perniciosum affirmant, ut vno die  
sumptum interficiat: vnde illi Ephemeris no-  
men. Ea autem ratione illud se depinxisse tradit  
Dioscorides, ne ab aliquo imprudenter bulbi  
vice deuoretur: mirum enim, inquit, quantum  
saporis voluptate imperitos allicit. Verum  
cum hoc diuina Dioscoridis institutum non  
animaduertent, vel forte neglexerint Mauri-  
tani, & eos secuti medici superioris nostræ  
ætatis, non modo seipsos, & sequaces miserè de-  
ceperunt, sed & cæteris omnibus errandi an-  
sam facile præbuerunt. Siquidem Colchicum  
ephemerum deleterium medicamentum, si eius  
notæ diligentissime expendatur, nil aliud, meo  
quidem iudicio, representare deprehenditur,  
quàm candidum illum bulbum, quem vulgo  
officinæ Mauritani secutæ falso Hermodactylum  
appellant. Sed quantum decessandus sit er-  
ror is, & abolenda praua, ac perniciofa hæc cõ-  
suetudo, quantumve discriminis, & incommodi  
nostris corporibus hinc imminet, æstimabunt  
ij, qui rectè diligenterque ea perpenderint,  
quæ non solum Dioscorides, & Galenus, sed &  
Paulus, & Nicander, & Plinius de Colchico  
ephemero posteritatis memoriæ prodiderunt  
quippe qui affirmauerint, id deuoratum eadem  
die homines interire. Quem effectum etsi hæc  
tempestare ab hoc manifestè præstari non  
constat experimento in his, qui ipsum in  
medicamentis assumunt, id tamen non alia  
de causa fieri putauerim, quàm quod fortasse in  
Italia, ut in Colchide, mortiferum non proue-  
niat: aut quod ea, quæ sumitur quantitas, exi-  
gua sit, neque ad perendum sufficiens. Sed non  
propterea dubitandum est, quin hoc sumentibus  
grauia & periculosa incommoda inferre va-  
leat. Erroris occasionem dedisse videtur Sera-  
pio, vt pote qui confusè vno tantum capite de  
vtroque Ephemero, & de Hermodactylo scrip-  
serit. nomine denotat Hermodactyli omni-  
bus inscripto, immemor, vel potius ignarus,  
apud Græcos, à quibus tamen quicquid ferè  
boni habet, mutuatus est, eas plantas inter se  
maximè differre. Quod autem in hoc deceptus  
Serapio has herbas turpiter confuderit, fidem  
manifestam facit Paulus Aegineta, qui li. v. 11.  
de Ephemeris, & de Hermodactylo separatim  
tanquam de diuersis differunt: & primum de  
Hermodactylo, sic inquit. Hermodactyli radix  
& per se, & ipsius decoctum vim habet pur-  
gandi præcipuam arthriticis tunc, cum humores  
desiunt, exhibetur. verùm stomacho nimis

quàm aduersatur. Mox paulò inferius, sex tan-  
tum interiectis capitibus, de Ephemeris ita scri-  
bit. Ephemerum non venenum illud, sed quod  
Iris sylvatica nominatur, mixta potestatis est, &  
repellens, & discutientis per halitum, hæc-  
nus Paulus. Ex quibus sanè palam fit, non modo  
Hermodactylum cum Colchico nullam habere  
cognitionem, sed etiam hac in re planè  
hallucinatum fuisse Serapionem, quem secuti  
cæteri Mauritani, qui post ipsum libros conscripserunt,  
æque etiam ex nostris plerique, qui  
superiore ætate, claruerunt, ut cæci cæcos se-  
quentes omnes in hanc erroris foueam incid-  
erunt, & posteros hucufque in hunc pessimum  
& decessandum vsum pertraxerunt. Iam itaque  
respicant tum medici, tum seplasiarij, qui Col-  
chicum suis medicamentis, & catapocis inse-  
runt, & ipsum iam non secus ac scopulum euen-  
t, vt pote quod, omnium probatissimorum  
authorum testimonio, mortiferum sit medica-  
mentum. Quæ autem radix nobis hodie Her-  
modactylus dici possit, d' difficile quidem fuerit  
decernere, quod ex probatis rei herbariæ scrip-  
toribus hætenus neminem inueni, qui  
notis vllis eius traderet historiam. Verumta-  
men, si ex vocabuli etymo conicere licet, nil  
aliud significare videtur Hermodactylus, quàm  
digitum Hermi, aut Hermetis. Vnde factum  
est, ut aliquando cogitauerim, an illa bulbacea  
radix, quæ manus humanæ formam refert,  
quàmque vulgo Christi palmam appellant, ad  
Hermodactylum accedere posset, quod bulba-  
cea sit, quemadmodum & Colchicum, quodque  
sumpta non modo vomitiones, sed & aluum  
ciat, vt testis est Nicolaus Florentinus, qui hac  
radice pluribus factis vomitionibus, Biliotum  
quendam quartanarium curauit. Hæc in me-  
dium proferre libuit, non quod ira esse certò  
asserere ausim, sed ut rei herbariæ studiosis res  
hæc melius æstimanda proponeretur. Nec illud  
sanè hoc loco prætereundum duxi, quod  
Hermodactyli Actuarius, & Nicolaus Myrepsico,  
qui albi, & rubri Hermodactyli meminere, nil  
aliud representant, quàm Behen album, & ru-  
beum Mauritani appellant. Siquidem ex de-  
scriptione aureæ Alexandrinæ apud Nicolaum,  
& diamoschi antidoti apud Actuarium id li-  
quidò constat. Sed non ob id dicendum est, her-  
modactylum Pauli, & Serapionis idem cum il-  
lis esse: his nanque alterius generis radix est,  
quæ vim habet decessoriam ad articulo-  
rum fluxiones præcipuam. Fuchsius medicus ætatis  
nostræ celebris, in libro de compositione me-  
dicamentorum, quem non pridem locupletatum  
edidit, hermodactylum Pauli describens,  
inquit. Vnus habet radicem albam, crassam, ac  
modicè duram. atque is est, qui in hodiernum  
diem nomen hermodactyli in officinis medico-  
rum retinet. A Paulo quoque hermodactylus  
appellatur. Ex iis nimirum verbis Fuchsius sibi  
persuasisse videtur hermodactylum communis  
vsi eundem esse cum Pauli hermodactylo, cum

*Hermodactyli id  
iellura.*

*Fuchsius  
deceptus.*



tamen omnibus ferè conflet, illud non aliud esse quam Colchicum. Quocirca nulli equidè dubium esse puto, quin Fuchus hac in re deceptus sit, nisi seplasia Tubingenses pro hermodactylo aliam vserpent radicem ab ea, quā hactenus in reliquis Germaniæ pharmacopoliis vseruari vidimus. Cæterum Ephemerū, quod syluestre Irin appellant, in Ananienſibus montibus tam in pratis, quam in sylvis copiose nascitur, ubi indigenis vocatur vulgè Giglio mæto. hoc est, Liliū stultum. Huic certè, nisi me fallit iudicium, omnes proſus notæ conveniunt, quæ alteri Ephemero à Dioscoride tribuuntur. Hinc itaq; fit, vt in hoc Fuchus, vir alioqui doctissimus, apertè errasse deprehendatur, qui plantam vulgè Liliū conuallium vocatam Ephemerum alterum, & non lethale esse contendit. Quandoquidem illud folia lilio latorā, non autē angustiorā, & dissimilia profert: caulē non liliū modo, sed gracilem, & flaminis instar tenuem: radicem item exilem, quæ capillaribus diuiditur fibris, tantum abest, vt digitū crassitudinem æquet, qualis in Ephemero requiritur. Præterea neminem adhuc reperi, qui tradat Ephemerum flores ferre suauiter olentes: cū tamen Liliū conuallij dicti flores adēo iucundum spirent odorem, vt eius gratia ab omnibus maximè expectatur: id quod nunquā silentio præterisset Dioscorides in re herbaria grauissimus auctor, præsertim quod ea nota fuisset Ephemero insignis, & notabilis. Ex his igitur colligendum esse putauerim, non solum Fuchum in aperto errore versari, sed reliquos etiam, qui Liliū conuallium vocatum Ephemerū esse contendunt. Sed ad Colchicum reuertamur. Florer hoc autumnī tempore, floribus croce amulis, nullis tamē emissis foliis, nisi appetere vere, quo tempore subrubēum gignit semen, quibusdam folliculis inclusum, iuglandum similitudine. Verū hoc tempore radix ei dulcis non est, quemadmodū in autumnio, sed lacte prægnans, & amara inuenitur. Quare hic cogimur dicere, & fateri, quod hoc non obseruauerit Dioscorides, vel saltem, quod iudicium id omiserit. Porro in communem illam hallucinationē antè explosam deduci sunt & patres illi reuerendi, qui in Mæſſæ commentariis ediderunt: quippe qui nullā faciant differentiā inter Colchicum, & Hermodactylum, idq; apertè asserunt. Quorū etiam auctoritate freti pharmacopolæ adduci possunt, vt cum maximo humanæ vitæ detrimento colchicum catapotis immisceant. Quare cauente meo consilio seplasiarū, neq; facile fidem iis, quos magis decet libros sacros, quā medicos euoluere, vt animabus potius, quā corporibus mederi stiant. Cæterum colchici floribus, vt audio, vter Turcæ, cū inebriari volūentes enī vino macerant: eoq; potō adēo stupidi redduntur, vt in ecclasia abeat. Vtriusq; Ephemerī meminit Galenus libro v. simpliciū medicamentorum, sic inquires. Ephem-

merum non illud lethale seu deleteriū, quod & Colchicum vocant, sed alterum, quod & Irin agreſtem cognominant, folia, & caulē lilio similem obtinere: radicem oblongam, non rotundam cū colchicum, digitū potissimū crassitudinis: nec autē adstringens, & boni odoris. Ex quibus palū fit, quod mista sit facultatis, temperaturæq; nempe repellentis, & huius digerentis. Testificatur verò id opera, quæ particulatim edit. Siquidem non inefficaciter radix eius in dentium doloribus colluitur: & folia tubercularum tum augmento, tum vigori congruunt. Oportet autem ea in vino decocta, priusquam pus moueas, illinere. Planta, quæ Græcis *καρχύρις*, Latinis Colchicum, & Bulbus agreſtis vocatur: Arabibus, Surgen: Italia, Colchico: Germanis, Zeidolz, & Vuld fassranbluon: Gallis, Mort au chien, & chiennee. Quam verò Græci *λοσυπερ*, Latini item Ephemerū dicunt: Itali, Ephemerō. At quæ recentioribus Græcis *ἰσος ἀνέμοιο*. Latinis quoque Hermodactylus appellatur: Italis, Hermodartilo: Mauritanis, Surugé, vel Surengiam, ita tamē vt hanc cum colchico apertè confundat.

## HELIXINE. CAP. LXXXI.



HELIXIN  
nascitur in p  
rietinis, sepi  
bus, & mace  
riis. folia ei mer  
curialis infant,  
hirsuta: caulicū  
li subrubentes,  
& circa eos velu  
ti semina as  
pera, adharen  
tia vestibus. Fo  
lia refrigeran  
di, spissandique  
naturā habent.

qua ex causa sanant illicu sacrosignes, adusta, condylomata, panos incipientes, tumores, inflammationesque. Succus eius cum cerussa, ignibus sacris, & viceribus quæ serpunt, commodè illinitur: imponiturque podagris cum hircino adipe, aut cerato cyprino: vterem tussim emendat instar cyathi haustus: tussis inflammationem sentientibus vtiliter & gargarizatur, & oblinitur: aurium dolorem cum rosa-  
ceo, instillatus leuat.

Fuchus  
Tubing.

Mæſſæ  
commentariis  
ediderunt.

Ephemerī  
vires ex  
Galeno.

*Helxines  
considera-  
tio.*

HELXINEN, quæ hæc à Dioscoride describitur, officinarum vulgus Parietariam appellat, quod in ædificiorum parietibus nascatur. Alij, quod detergendis vitreis poculis sit aptissima, Vitreolam nominant. Hæc planta omnibus notissima est: quare superuacaneum esset, eam longiore historia representare. Verum alia ab hac, & longè diuersa est Helxine, quam Plinius libro x x i. cap. x v i. inter aculeata retulit, & depinxit his verbis. Helxine rara visu est, neque in omnibus terris estradæ soliosa, ex qua media voluti malum extruberat, congestum sua fronde. Huius vertex summus lacrymam continet, iucundi saporis, acanthicen masticchen appellatam. hæc Plinius. Helxines vires tradidit Galenus libro v i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Helxinen aliqui perdicium nominant. Alij parthenium, alij sideritum, sunt qui heracleam appellant. Cæterum vis ei inest abstergendi, & leuiter costringendi cum humiditate subfrigida. Quamobrem phlegmonas omnes in initio, & augmento sanant vsque ad statum, & maxime si calidæ fuerint. Quinertiam incipientibus phygethlicis cataplasmatibus ritu illinitur. Succus quoque eius cum rosaceo ad aurium dolores phlegmonosos, mediocriter profuerit. Gargarizandum item nonnulli exhibent ad paristhiam. Sunt etiam ex medicis quidam, qui iis, qui diutina tussi vexantur, illâ exhibuerint. Certè euidens extergendi experimentum præder & in vasis vitreis. Herba, quæ Græcis *ἡλξίνη* & *ῥοσάκη*, Latinis item Helxine appellatur: Italice ac vulgo, Parietaria, & Vitriola: Germanis, Tag vnd nacht: Hispanis, y crua del muro: Gallice, Paritoire, vel, Paritaire.

*Helxine  
vires ex  
Galeno.*

*Nomina.*

HELXINEN, quæ hæc à Dioscoride describitur, officinarum vulgus Parietariam appellat, quod in ædificiorum parietibus nascatur. Alij, quod detergendis vitreis poculis sit aptissima, Vitreolam nominant. Hæc planta omnibus notissima est: quare superuacaneum esset, eam longiore historia representare. Verum alia ab hac, & longè diuersa est Helxine, quam Plinius libro x x i. cap. x v i. inter aculeata retulit, & depinxit his verbis. Helxine rara visu est, neque in omnibus terris estradæ soliosa, ex qua media voluti malum extruberat, congestum sua fronde. Huius vertex summus lacrymam continet, iucundi saporis, acanthicen masticchen appellatam. hæc Plinius. Helxines vires tradidit Galenus libro v i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Helxinen aliqui perdicium nominant. Alij parthenium, alij sideritum, sunt qui heracleam appellant. Cæterum vis ei inest abstergendi, & leuiter costringendi cum humiditate subfrigida. Quamobrem phlegmonas omnes in initio, & augmento sanant vsque ad statum, & maxime si calidæ fuerint. Quinertiam incipientibus phygethlicis cataplasmatibus ritu illinitur. Succus quoque eius cum rosaceo ad aurium dolores phlegmonosos, mediocriter profuerit. Gargarizandum item nonnulli exhibent ad paristhiam. Sunt etiam ex medicis quidam, qui iis, qui diutina tussi vexantur, illâ exhibuerint. Certè euidens extergendi experimentum præder & in vasis vitreis. Herba, quæ Græcis *ἡλξίνη* & *ῥοσάκη*, Latinis item Helxine appellatur: Italice ac vulgo, Parietaria, & Vitriola: Germanis, Tag vnd nacht: Hispanis, y crua del muro: Gallice, Paritoire, vel, Paritaire.

ALSINE, aliqui anthyllion, nonnulli myos ota vocant, quoniam muscutorum aure folia imitantur. Lucis, opacisq; gaudet, vnde alsine dicta est. Hæc erat eadem, quæ helxine, nisi humilior esset, & foliis minoribus, nec hirsuta. cum teritur, odorem cucumis reddit. Vim refrigerandi, adstringendiq; obtinet: oculorum inflammatio-

nibus cum polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur, quin & emendat omnia quæ helxine, id est, muralis herba.

ALSINE etiam nimirum herba est mollicula, quæ Herodotus Centone, aliis verò Pauarina, aliis Piza gallina, aliis Centonice vulgò appellatur. Et quantus Dioscorides vnâ tantum Alsinem representauerit, plura tamen eius reperiuntur genera. Porro habentur quædam Dioscoridis exemplaria, in quibus caput hoc legitur in calce libri secundi statim post Muris auriculæ mentionem. Sed nos, vt eo in loco latius diximus, hanc suam veram ac germanam sedem esse censemus. Alsines meminit Galenus libro v i. simplicium medicamentorum, ita de eius viribus scribens. Alsine, aut Myos ota similem helxinæ facultatem obtinet, nempe refrigerantem, & humectantem: est enim essentia aquæ frigida: quare & citra adstrictionem refrigerat. Quocirca ad feruētes phlegmonas, & mediocria eryspelata competit. Hæc *ἡλξίνη* Græcè, vt etiâ Alsine Latine dicitur: Italice, Centone, & Pauarina: Germanicè, Heuener dorm, & Vogelkraut: Gallicè Mouré.

*Alsines cō  
sideratio.*

*Vires ex  
Galeno.*

*Nomina.*

#### LENS PALVSTRIS.



LENS PALVSTRIS.  
CAP. LXXXIII.

LENS palustris inuenitur in aqua non fluente, muscus lenticulæ similis, refrigeratoriæ naturæ. Propter quod conuenienter collectionibus, ignisacro, & podagris illinitur per se, & cum polenta: glutinat & procidentia puerorum interanea.

PALVSTRIS lens, quam officinæ, & Lenticis palustris herbariorum vulgus Lenticulariam appellant, lustris connotior omnibus est, quam vt pluribus describi mereatur. Ea plerumque flagrantibus aquis innatat, iisq; præsertim, quæ vrbes, & oppida cingunt. Lentic palustris non nisi temperamentum prodidit Galenus libro viii. ex Galeno.

*Facultas  
ex Galeno.*

simplicium medicamentorum, ubi sic inquit, Lenticula palustris humida, frigidaq; temperata est, vrens; ex secido quodammodo ordine.

*Nomina.* Quæ Lens palustris Latinis, *καλή i lei rân*

*καλή i rân* Græcis vocatur: Arabibus, Tahaleb, seu Thaleb: Italis, Lente dei paludi: Germanis, Vuasser linsen: Hispanis, Lenteya de la goa: Gallis, Lenticule de marais.

SEDVM MAIVS.



SEDVM MAIVS. CA. LXXXIIII.

SEMPERVIVM magnum ideo nominatur, quoniâ perpetuò folia vi-  
reant. cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, virêtes, characiæ tithymali modo infecti: folia pingua, carnosa, longitudine pollicari, in cacumine linguæ similia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem, ita ut ambitu effigie imitentur oculi. nascitur in montibus, & testaceis: supra domicilia etiam feritur. Eius vis refrigerare, & adstringere. Medetur igni sacro, nomis, vlceribus quæ serpūt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, poda-  
gris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti in doloribus, cum polêra, aut rosaceo perfunditur: datur in potu contra phalangiorū ictus, dysenteriam, aluiq; profluuiâ: teretes tinea potus in vino excutit: subditus in vellere, mulierum abundantiam sistit. Succus oculorum lippitudinibus, sanguinis vitio conceptis, inungitur.

SEDVM MINVS. CAP. LXXXV.

SEMPERVIVM paruum in petris, parietinis, & maceris, necnon scrobibus opacis nascitur, caulibus ab una

SEDVM MINVS.



radice multis, tenuibus, crebrò foliatis: exilibus foliis, rotundis, pinguibus, mucronatis: caule à medio emicante, palmum alto, umbellam, herbidotque flores, & tenues gerente. Folia eisdem cu priore viribus prædita sunt.

SEDI GENVSTERTIVM  
CAP. LXXXVI.

TERTIVM videtur sempervivum genus, quam aliqui andrachnem agriam, aut telephion vocauerūt, Romani illecebram, pusillis, crassioribusque foliis, hirsutis, portulacæ proximis, nascitur in faxis. Vis ei excalectorum, acris, exulcerans. illita cum auxungia strumas discutit.



EX TRIBVS Sedi, siue Sempervivi generibus, quæ hoc loco à Dioscoride pinguntur, primum, & alterum omnibus nota sunt. Vtrumque officinæ Sempervivum appellant, addita maioris, & minoris differentia, quoniam non desunt,

qui minus Vermicularem, Crassulamq; herbam vocent. Minoris duo videntur genera. Alterum, cuius Dioscorides meminit, foliis crassioribus, longioribus, rarioribusq; facie nucleis pineis à putaminibus repurgatis similibus, unde quibusdam vulgò etiam Pignola dicitur. Caules fert tenues, pluresq; in eorum cacumine flores exeunt herbacei, seu subcandidi, vmbellæ diffusæ modo. Alterum foliis breuioribus, angustioribus, copiosioribusq; floribus melinæ, eodem ordine prodeuntibus. Hoc marem, illud foeminam recentiorum quidam existimant. At tertium, quod mihi iamdudum incomperitum exiit, cum vsquedò excafciauit, vt carnem exulceret impositum, à cæteris longè facultatibus diffidet. Huius varia in Dioscoridis codicibus legitur historia: cæterum nos Aldinum exemplar secuti, hinc ea abdicauimus, quæ adulterina censetur. Nec desunt qui crediderint, tertium hoc Dioscoridi esse spurium, quòd duorum tantum meminerit Galenus. Veruntamen è Pisis hoc anno tertium Sedi genus, gustu sanè acerrimo, adeò vt linguam exulceret, ad me misit Lucas Ghinus Forocornelensis medicus rei herbariæ peritissimus. qui illi plantæ hæc verba subiecerat, quæ hic referam eius humanitate fretus. Visitor, inquit, in viridario Illustrissimi Ducis Florentiæ quoddam tenuissimum Sedi genus, gustu nihil minus acri, quàm rannunculi omne genus, quod etiam in antiquis ædificiorum parietibus, & faxorum rimis provenire conspexi. Hoc, meo iudicio, tertium est Sedum. Sed cum Dioscoridis verba hoc loco obscura sanè, & intellectu, difficiia habeantur, iandudum vñ cū aliis plerisq; qui hæc simplicium facultate maximè delectantur, plurimum laboris impendi, vt tertium Sedum consequi possem, cui folia inessent hirsuta, & facie portulacæ similia. Cæterum cum postea attentius, diligentiusque Dioscoridis verba perpendere, sic Latine sonare videntur. Est & tertium sedi genus, quod portulacæ respectu, folia edit pinguiora, densioraq;, &c. Quibus cum hunc dederim sensum, qui, mea sententia, propriam Dioscoridis mentem explicat, tertium hoc sedum faciliè mihi sese obtulit cognoscendum, vt omnibus quoque idipsam enutire haudquaquam dubitauerim, qui Græcam dictionem *Αεολία* densa, nō hirsuta expoluerint, interpretatque fuerint *αεολία* ad folia portulacæ collata. Nam huiusce tertij sedi folia, portulacæ foliis comparata, si densiora, crassioraq; faciliè cernuntur. Hæcenus amicus ille. Cuius certè sententiæ non possum non ad stipulari, quippe quæ doctissimis rationibus nitatur, & ipse sit apud me gravis testis. Semperuium mentionem fecit Theophrastus libr. xviii. cap. viii. de plantarum historia, sic inquit. Semperuium datum à natura est, quòd humidum, viridèque semper durare valeat. Folio carnosò, læui, arque oblongo id constat. Planis parietibus nascitur, necnon & in tegulis, cum terræ consueui quod-

dam arenaceum factum est. hæc & Theophrastus. Sedi vires descripsit Galenus libr. vi. simplicium medicamentorum, his verbis. *Αεολιον* vtrumque, tum maius, tum minus, desiccatur quidem leuiter, quandoquidem & mediocriter adstringit, omnis alterius vehemens qualitas expersquare in eo plus cæteris abundat essentia aquea. Cæterum nō mediocriter refrigerat. 10 est enim ex tertio ordine, & recessu refrigerantium. Hinc etiam ad erysipelata, & herpetas, & phlegmonas à fluxione natas accommodatur. Semperuium siue Sedum maius quod Latini vocant, Græci *ἀεολιον* maius: Mauritani, Beibabala, seu Hai alhalæz: Itali, Sempreuium magiore: Germani, Groß hausz vurtz: Hispani, Sempreuius, & yerna puntera: Galli, Ioubarbe. Quod verò Græci *ἀεολιον* minus, Latini Semperuium, siue Sedum minus dicunt: Itali Sempreuium minore: Germani, Klein hausz vurtz: Galli, Ioubarbe petite. Quod deniq; Græci *ἀεολιον* *ἀεολιον*, Latini Semperuium siue Sedi genus tertium appellatur: Arabibus Alsebrā, Handrachabara, & Tilafon: Italici, Sempreuium terzo.

Sedi vires  
ex Galeno

NOMINA.

## VMBILICVS VENERIS.



COTYLEDON, siue vmbilicus Veneris, folio est in acetabuli formam tornato, inuidenter cōcauo, breui in medio cauliculo, in quo semē inest: radiceoliuæ modo rotunda. Succus cū vino circumlitus, instillatusve cōtecta

genitalia nudat: inflammationibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus, illiue auxiliatur: stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesta, calculos frangunt, vrinam cient: hydropicis ex melle dantur. Herba vtuntur ad amatoria.

## VMBILICVS VENERIS ALTER.

CAPVT LXXXVIII.

EST ET alterū vmbilici Veneris genus, cymbalion aliqui vocant, pinguibus

bus foliis, latioribus, ligularum modo, densis circa radicem, medium oculi ambitum describentibus, vt in maiore semperuiuo, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores & femina hyperici: radice maiuscula. Facit eadem, quæ semperuiuum.

## VMBILICVS VENERIS ALTER.

*Vmbilici  
Veneris  
utriusque  
considera-  
tio.*



VMBILICVS Veneris, quæ primo generi assignant, frequens nascitur in vniuersa ferè Hetruria, saxis, & vetustis edificiorum parietibus. Huius folia, quod fœcililimum operculis similia sint, vulgò Senenses appellat Copertoiole. Alteru verò eius genus à quibusdam Cymbalion vocatur, vidimus primum in Foro iu-

liensium ciuitate Austriæ, in hortulo quodam excellentissimi medici Iuliani à Marostica Teruissensis. Hanc porro plantam in pluribus montibus saxis inhzrentem inuenimus. Cui, meo quidem iudicio, omnes proflus conueniunt notæ, quæ alteri vmbilico Veneris tribuuntur. Cæteru apud Insabres officina legitima Coryledonis, siue vmbilici Veneris loco, herbam quandam in parietinis, & maceris nascentem vsurpant, quæ ex iis eminet, & comæ modo dependet, caule tenui, foliis hederaceis, per ambitum mucronis instar laciniatis. Hanc fortè, quod Cymbalaria vulgò vocetur, putant à cymbalio corruptè nomen traxisse, & ideo verum Veneris vmbilicum esse. Sed euidentius errant, quam vt ostendi debeat. Fuchsius quoque, cuius viri aliqui erudidi pace dixerim, in hac re hallucinatus deprehenditur, quod in paruo suo libro, in quo plantarum duntaxat imagines expressit, pro vtroque vmbilico Veneris eas nimiru plantas depinxerit, quæ nonnullis vulgò Fabaria, & Fabæ crasse appellantur: quas tamen prius in suo de stirpium historia commentario pro telephio ostenderat. Verum tam prima, quam altera eius opinio, vt dicam quod sentio, mihi planè reprobanda videtur. Quemadmodum & tertia eiusdem de eadem re sententia, quam non ita pridem protulit in eo libro de compositione medicamentorum, quem postremo auctum excudit. Ibi enim putat Fuchsius Acetabulum alteru, siue

alterum vmbilici Veneris genus, esse Fabaria, quam vulgus & seplaxia Crassulam maiorem nominant. Sed quod is in magno versetur errore, manifestum sit satis ex Dioscoride. Quippe qui Cymbalio, seu alteri Veneris vmbilico, folia reddiderit densa circa radicem, quæ medium oculi ambitum describant, vt in maiore semperuiuo: cauliculum verò tenuem, in quo flores & femina hyperici. Quæ ramen notæ in Fabaria, aut Crassula maiore desiderantur. Si quidem hæc foliis constat hortensis portulacæ maioribus, quæ cum semperuiuo nullam habent ferè similitudinem, nec oculi formam describunt: caulem præterea emittit crassum & firmu, radicibus deniq; nitricis pluribus, asphodeli proximis. Vmbilici Veneris meminit Galenus libro vii. simplic. medica. sic inquires. Coryledon facultatis mista est, nempe humidæ, subfrigida, & cuiusdam obscure adstringentis, & cum ea leuiter amara: vnde refrigerat, repercutit, abstergit, & discutit. Itaque phlegmonas erysipelatodas, & erysipelata phlegmonode curat: & maximè stomachi ardore æstuantis admodum vtile est epiplasina. Putantur folia cum radice manducata calculos confringere, & vrinam mouere. *Κυβαλίον* sic Græcè, Latine verò Acetabulum, & Vmbilicus veneris nominatur: Italicè, Ombilico di Veneri: Hispanicè, Scudetes: Gallicè, Efudes. Quæ verò *Κυβαλίον* Græcè, Vmbilico Veneris & Acetabulū alteru Latinis appellatur.

*Vmbilici  
Veneris  
res ex Galeno.*

*Namina.*

## VERTICA. CAP. LXXXIX.

## VERTICA PRIMA.



DVO VERTICAE genera. Altera syluestrioris, asperior: latioribus, nigrioribusq; foliis: femine lini, sed minore. Altera non æquè aspera, minuto femine: Folia vtriusq; illita, canis moribus addito sale, medentur: gangræ-

nas, carcinomata sordida vlcera, & quæ cacoëthe vocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppuratiónesque sanant: lienosis cum ce-

rato imponuntur: faciunt ad proflu-  
uiarum cum succo trita, & naribus  
indita: menses cum eadē detrita cum  
myrrha, & imposita: procidentes vul-  
uas recentia contactu resiliire cogunt.  
Semen porum ex passio venerem stimu-  
lat, & vulvæ ora patefacit: cum melle  
delinctum orthopnoæ, lateris & pul-  
monum inflammationibus prodest: 10

## VERTICA SECUNDA.



Vertica co-  
sideratio.

VERTICA adeo vulgaris notitiæ est, ut non  
modò interdiu, sed etiā noctu in tenebris solo  
tactu ab omnibus facillimè cognoscatur. Pro-  
inde operæpretiū non est, ut hic pluribus eius  
faciem depingamus. Veruntamen ignorandum  
non est, quòd etsi Dioscoridi duo tantū Vertice  
assignentur genera, tria tamen in Italia reperi-  
untur. Siquidem præter Verticæ à Dioscoride  
traditas, alia est, quā aliqui sylvestrē appellant,  
cæteris acrior, & mordacior, foliis parvis, hir-  
sutioribusq; caulibus. omnibus & hæc nota.

Vertica Si-  
res ex Gal.

Verticæ vires memorix prodidit Galenus libro  
v. 1. simplic. medicam. ubi sic inquit. Vertica,  
& huius herbæ rum semē, tum folia (nam hæc  
potissimū in usum veniunt) digerentis sunt fa-  
cultatis, adeo ut & phymata, & parotidas sanet.  
Sed & quiddam flatuosum obtrinet, quo & ve-  
nerem extimulant, & maximè ubi cum musto  
semen bibitur. Porro quòd non vehementer  
calfaciat, sed admodū tenuium sit partium, te-  
stimonio est crassiorū, viscosorumq; humorū ex  
pectore, pulmoneq; educit, tum quòd partes,  
quas congerit pruriant. Cæterum flatuosum  
eius, cuius particeps esse dicta est, dum conco-  
quitur, nascitur: non enim actu flatuosa est, sed  
potestate. Ventrem autem modicè sedulucit,  
duntaxat abstergendō, ac veluti citillando, non  
purgando. Et gangrenosa, & cancerosa, & in to-  
tum quæ exiccati citra mordicationē postulat,

thoracem expurgat. erodentibus me-  
dicamentis admiscetur. Cocta cum  
conchis folia aluum emolliunt, urinas  
mouent, inflationes discutiunt: deco-  
cta cum prifana, vitia pectoris extra-  
hunt: mulierum menses euocant, cum  
myrrha modico pota. Inflammatio-  
ne turgentem vnam, gargarizatus suc-  
cus reprimat.

## VERTICA TERTIA.



ea conuenienter sanat. nimirū cum subtilium  
sit partium, & temperaturæ siccæ, non tamen  
tantum habens caliditatis, ut iam mordicat. Et  
lib. 1. 1. de alimentorū facultatibus, idē de ver-  
tica ita scribit. Vertica, herbarum agrestium vna  
etiā hæc est, tenuium partium vim obtinens.

## CARDIACA.



Iure itaque nemo  
ipsa, ut alimento  
vitiatur, nisi maxi-  
ma prematur fime.  
Vtilis autem  
est ut obsonium  
ac medicamentū,  
quod aluum deici-  
cit. hætenus de  
vertica Galenus.  
Sed quoniam her-  
ba illa, quā hodie  
herbarij CAR-  
DIACA MNO-  
bysoria, et  
minant, nunc ob  
vires.  
cognitionē, quam  
cum Vertica habe-  
re videtur, mihi  
in mentem venit,  
ideo non alienum  
puto, quòd hic de ea quoq; aliquid differamus.  
Hæc itaque verticæ proxima est, tamen si foliis,  
quæ prope terrā prodeunt, rotundioribus con-

flet, rannunculi modo per ambitum lacinatis. Ei caulis est quadrangulus, in quo bina vbiq; folia paribus intervallis exeunt, oblonga, vtrique similia, sed per ambitum serratoria. Flores, qui in purpura albicant, vtrique fortidæ, de qua sequenti capite dicturi sumus, non dissimiles proferunt, minores tamē qui verticillato ambitu marubij modo caulem circumdant in ipso foliorum exortu. Radix in rubro pallefcit, aliis pluribus parvis radicibus adnatis. Provenit vbiq; iuxta semitas, circa sepēs, & post vrbium mœnia. Gustu vsque adeo amarefcit, vt facili existimari possit ad secundum exsiccantiū ordinem, & ad tertium siccantium accedere. Præstat hæc, vt recentiores quidam tradunt, ad cordis affectus, unde etiam apud vulgares nomen accepit. Medetur item consulsis, ac resoluens. Obstructiones aperit, quas causa frigida induxerit: vrinam cit, & menses. Pectus à pituita detergit, & lumbricos necat. Caterum in puluerem contrita, & cochlearis mensura ex vino hausta, difficilē parientibus mirum in modum opitulatur. Vrtica sic Latinis dicta, *ἄκνις* Græcis nominatur: Arabibus, Huriure, Vraich larum, & Angiara: Italis, Ortica: Germanis, Nessel, Hispanis, Ortiga: Gallis, Ortie.

Nomina.

## GALIOPEIS. CAP. XC.



GALIOPSIS, frutex in totum caulem, & folia habet vtrique uiora, & quæ grauē odorem trita reddat: sio repurpureo, tenui, nascitur circa sepēs, ædificiorū areas, ac semitas vbiq; Folia, caules, semen, succusq;

durities, & carcinomata dissipant: strumas, panos, & parotidas excutunt. Oportet bis die tepidum ex aceto cata plasma imponere, & eius decocto fouere, ad putrescētia, gangrænas, & nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

Galiopeis conf. de astro.

GALIOPSIN eam equidem plantam crediderim esse, quam nos in Italia Vrticam fortidam appellamus, quæ vbiq; ferè provenit, in ædificiorum areis, in plateis, iuxta semitas, &

circa hororum sepēs, odore ingrato: unde & fortidæ cognomen adinuenit. Quandoquidem hæc foliis, & caule constat vtrique similibus, tactu tamen non mordentibus: floribus item purpureis, tenuibusq;. Hinc itaque fit, vt si mea quidem sententia, in errore versentur, qui putant Galiopsin esse herbam illam vulgarem, quæ officinis, & herbariorum vulgò Scrophularia maior, Millemorbia, Ferraria, æque etiam Castrangula dicitur: hoc fortasse argumento nixi, quòd ea flores edat, quæ galææ similitudinem referunt. Sed eorum error ex eo, vt arbitror, apertè diluitur, quòd Scrophularia maior dicta folia non proferat vtrique æmodum æmula, nec ea graui odore prædita sentiantur. Adde quòd huic radix subit magna, alba, vndique strumosa, unde fortè Scrophulariæ nomen traxit, adeò notatu digna, vt non videatur verisimile, quòd eius faciem non depicētam reliquisset Dioscorides, quando sensisset hanc herbam esse Galiopsin. Huc etiam illud accedat, quòd illa vt plurimum in scrobium marginibus, in riguis, & viginosis locis nascitur, non autem (vt Dioscorides inquit) circa sepēs, & in ædificiorum areis. In hac sententia fuisse inuenio Fuchsinum, alioqui eruditum, qui à galca, cuius effigiem Scrophulariæ flores repræsentat, hanc sibi nomen assignasse existimat. Id quod mihi planè non videtur esse rationi consentaneum, quòd non sit ex more Græcorum, veterū præsertim, apud quos nulla verborum inopia fuit, vt ex Latinis, & Græcis dictionibus plantarum, & aliarum rerum nomina componant: galcam enim Græcum nomen non esse constat. Ex his igitur adducor, vt in hoc neque Fuchsius, neque alii adimplari possint, quorū potius sententiam ex suprà dictis reprobendam esse censco. Est præterea alia planta Vrticæ fortidæ non obssimilis, quæ à lacteis maculis singula folia in longū procurentibus Vrtica lactea à nostris Senensibus vulgè cognominatur, quā rectius fortè quis Galiopsin dixerit, si à *γᾶλα*, quod vocabulum Græcis lac significat, Galiopsin dictam esse statuat. Quòd autem res hæc ita esse possit, ex Dioscoridis ordine coniectura quidam colligi possent, nam quòd statim post Galiopsin Galion descripserit, cui ex eo nomen inditum esse tradidit, quòd in cogendo lacte coaguli vicem expleat, videtur innuisse, inter vtrumque magnam esse nominis cognitionem. Hanc itaque legitimam esse Galiopsin quā affirmare non dubitarem, nisi Plinius lib. x x i i. cap. x i i i. eam Lanium appellari prodidisset, laudibusq; extulisset album, quòd habet in medio folio, ad sacros ignes, & foliorum reliquum cū vniuersa planta, addita mica salis, ad contusa, incusq; ad ambusta, strumas, tumores, podagras, & vulnera. Quibus sane Plinij placitis decernere cogimur, primam, quam Vrticam fortidā diximus, esse Galiopsin: alteram verò Plinij Lanium. Sed si sustinere velimus hanc secundam esse veram Galiopsin, dicere nobis liceat, Plinium non cognouisse

Opinio quorundam, qui præbent.

Fuchsinum.

Vrtica lactea.

Lanium Plinij.

Galiopfin, neque id fortasse temerè diceretur, quòd in multis alijs Plinius euidenter errasse deprehendatur. Cæterum quanuis ex rationibus superius adductis perspicuum, ni fallor, factum sit, SCRO-

## SCROPHULARIA.



PHYLARIAM nò esse Galiopfin, cò tamen viribus pollet non contemnendis, nanque eius radix strumas, & hæmorrhoidas sanat. In quem visum radix effoditur autumnali tempore, & repurgata tunditur cum recenti butyro, opercularoque siccit in vliginolo loco reponitur, vbi dimittitur per quindecim dies. Deinde lento igne butyrum illud liquefit, & percolacum affer-

## GALION. CAP. XCI.



natur, quo prædicti morbi utilissimè illinuntur. <sup>1</sup>Antea, quæ Græcè γαλιόψιν, Latine item Galiopfin, Vrtica labeo, & Vrtica foetida nominatur: cò, Ortica foetida: Hispanicè, Ortigamuerta. <sup>30</sup>

GALION nomen ex eo traxit, quod in contrahendo late, coaguli vicem impleat: ramulum, foliumque habet aparinæ simillimum, recta: florem in cacumine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Flos

flore tenui, spicato, partim luteo, partim albo. Verum non propterea omnibus nota est vis, quam coagulandi lactis habet: nam si ea pastoribus innotuisset, non minus apud eos huius herbæ inualuisset usus, quam cinaræ apud Hetruscos: qui eius flore, ut dulcior suauiorque; caesus euadat, tum ouillum, tum etiam caprinum lac cogunt, ac spissant. Galio vires cepidit Galenus lib. v. 1. simplicium medicamentorum, sic inquit. Galium inde adeo nomen sortitum est suum, quod lac coagulet. Ad simile autem est aparinæ, facultatem obtinens exiccatoriam, & subacrem. Flos eius sanguinis profusui competere videtur, & combustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei. Huius herbæ nomen Græcum γάλιον: Latinum Galium: Italicum, Galio: Germanicum, Vnser fraunen, Vuegstro: Hispanicum, Coala leche yerua: Gallicum, Petit muguet.

## SENECIO. CAP. CXII.



SENECIO cuniculo est cubitali, subrubro: folijs còtinuis, per extremitates erucæ modo diuisis, sed minoribus multo: luteis floribus, qui celeriter dissecti vane scut in pappos. Nomè vero sibi vindicauit, quoniam

flores capillorum ritu canescant, radice superuacua. Nascitur maxime in maceris, & circum oppida. Folia cum floribus refrigerant: quare illita cum vini modico, vel per sese, testium & sedis inflammationes sanant: quin & ex manna thuris medentur, cum reliquis vulneribus, tum iis quæ nerui acceperunt. Illi per se cum aceto pappi, idem munus præstant: verum recentes epoti, strangulant. Tortus caulis, si coctus in passio potui detur, stomachi dolores à bili contractos per sanat.

SENECIO, quæ Græcè Erigeron dicitur, Senecio, aliquibus vulgo Cardoncello, alijs verò Spel. nō confusio vocatur. Planta est vulgaris notitiae, Cauti

GALIVM vbique copiosè nascitur prope fepes, & secus vias, folijs aparinæ minoribus:



Cauliculis exit (vt Dioscorides inquit) subrubentibus: foliis lacinatis, eruce amulis, minoribus tamen, & asperioribus: floribus luteis, qui desiccantes in pappos abeunt. Nascitur palustre, adeo vt etiam super vrbium moenia, & in parietinis proueniat. Hanc herbam Ortho Brunsfeldius esse verbenacum supinum magno & aperte errore existimauit. Senecionis quam breuiter mentionem fecit Galenus lib. v. i. simplicium medicamentorum, eius tantum facultatem referes his verbis. Erigeron, siue Senecio facultatem mistam obtinet, simul refrigeratorem, & modice digerentem. Herba hæc Græcis *εργηρόν* dicitur: Latinis, Erigerum, & Senecio: Italicis, Cardoncello: Germanis, Creutz vurtz: Hispanis, Bon varon: Gallis, Seneson.

THALICTRUM. CAP. XCIII.

THALICTRON folia coriandri habet, pinguiora paulo: caulem rutæ crassitudine, in quo folia. Quæ trita illitu antiqua vlcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maximè in campestribus.

*Thalictri confidera- error.* THALICTRON, si Ruellio credimus, herbæ in Gallia Argentanæ appellant, quod argenteo misceatur coloratu, ceteris notis Thalictri picuræ adspicantibus. Hæc (vt ipse scribit) inuenitur vrbium, sæpe in campestribus, & maceris. Verùm cum mihi hæctenus non contingerit eam herbam videre, idcirco Ruellij sententiam non ausum probare, neque etiam refellere. Thalictron Thalietron nominat Galenus lib. v. i. simplicium medicamentorum, vbi de eius viribus in hunc modum differt. Thalietrum folia habet coriandro similia, caulem crassitudine rutæ. Vis ei inest exiccatoria circa mortuum: itaque vlcera inueterata ad cicatricem perducit. Quod Græci *θάλιτρον*, Latini item Thalictrium, & Thalietrum appellant.

MUSCVS MARINVS.  
CAP. XCLIII.

MARINVS muscus nascitur in scopulis, testaceisq; haud procul a mari, gracilis, capillaceus, caulis expers. Præcipua ei spissandi vis, & collectio nes cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus sit.

*Muscima vna confi. Corallina.* Non possum eorum non probare sententiam, qui dicunt Muscum marinum eam capillaceam esse plantã, quam officinæ Corallinam appellant. Hanc circumforanei in puluerem contritam in placeis vendunt ad puerorum vermes necandos, mirisq; laudibus efferunt. Quia in re nimirum ceteris præstat medicamentis: siquidem non modò interficit lumbricos, sed eos quoque eadem die expellit, magna sæpe

cum alantium admi ratione, quod quandoque vilis sit puer, qui ex assumpta huius pulueris drachma centum vermes excreuerit. Crediderim itaque Corallinam hanc esse Muscum marinam, quod certo sciam, eam ab illis reperiri, qui corallia expiscantur, corallia, sicuti etiam scopulis, & piscium tellis inhaerentem, eo finemodo, quo arbores muscus arboribus ipsis innascitur. Is vique egeris præfertur, qui corallia adnascitur, vnde ei nomen.

MUSCVS MARINVS



probatum secundo loco, qui axis adheret, colore rubicundo: cinereus verò improbatum. Sed marinum muscum hac polleere facultate non nouere veteres: quandoquidem nusquam apud ipsos legimus marino musco interaneorum vermes necari. Musci marini huiusmodi (longè tamen ab ea diuersti, quam Plinius perstrinxit Dioscorides) proferuntur est in libro xxi. cap. viii. his verbis. Bryon marina herba sine dubitatione lactuæ foliis similis, rugosa veluti contracta, sine caule ab ima radice exeuntibus foliis. Nascitur in scopulis maxime, testisq; terra comprehensis. Præcipua secandi ei spissandiq; vis, & collectiones omnes inflammationesq; cohibendi, præcipue podagras, & quicquid refrigerare opus sit. hæc Plinius. Ex quibus nimirum verbis liquido constat ipsum errasse in historia Musci Marini, quod hunc perperam fecerit foliis lactuæ similem. Ceterum Musci marini meminit Galenus lib. v. i. simplicium medicamentorum, sic inquit. *Muscima vna confi. Corallina.* Muscus marinus compositus est ex terrenis, & ex Gallica aqua essentia, vtraq; frigida. Siquidè & guttum adstringit, & calidis quibusvis illitus, ea eundem refrigerat, & adiuuat. Id Græcis *μαρινὸς δαμάσκην* quod Latinis Muscus marinus vocatur: Tahaleb, siue Tahel Arabibus, quibus tamen muscus est cum lente palustri, confunduntur: Italicis ac officinis, Gorallina: Germanis, Meerwies, seu Mermoes: Hispanis, Malhorquiana yerna Gallis, Coralline.

MUSCVS MARINVS. CAP. XCV.

ERHVCII marini generibus, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens: tertium candidum, nascens in Creta, floridum valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia vim

habent refrigeratorem, non podagra modò sed etiam inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter vtilem: verum iis vti humidis conuenit, priusquam ex arefcant. Nicander puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc fucus quidam putant mulieres suum colorem mentiri, cum tamen sit radícula eiusdem nominis, qua sese fucant.

*Fucus marinus h. b. Plin.*

DE FVCO marino locutus est Plinius lib. x lll. cap. x lll. vbi ita scriptum reliquit. Nasuntur in mari frutices, arboresq; minores in nostro. Rubrum enim, & totius orientis Oceanus refertus est syluis. Non habet lingua alia nomen quod Græci vocant phycos, quoniam alga herbarum magis vocabulum intelligitur: hæc autem est frutex. Et lib. x xvi. cap. x. Tria inquit, Phyci thalassii, id est, Fuci marini genera, latum, & alterum longius, quadantenus rubens: tertium crispis foliis, quo in Creta vestes tinguntur. hæcenus Plinius. Cæterum cum Fuci genera mihi planè incomperita sint, quid de iis dicam non habeo, Non tamen deest suspicio, quin Fucus marinus si alga non est, in eius saltem genere recenseri possit & de ætatem Theodorus in Theophrasto non aliter.

Fucus marinum interpretatur, quam algæ nunc. Adde quòd & Plinius aliis in locis Fucus marinus algam maris aliquòd vocauit, vti iam adnotauit Marcellus. Sed nò ob hoc extimauerim, Fucus marinum eam vulgare esse algam, in qua Veneri vasa vitrea recondunt, ne inter vehendù collidatur, & cõfringatur. Quòd præterea Fucus marinus alga esse possit, illud argumeto sit, quòd nullum aliud, quòd sciam, apud Latinos nomen inueniit. Algæ species est, quæ & Vlva dicitur, hoc tantum inter se differentes, quòd hæc palustris, lacustris, fluuiatilis; sit: illa verò tantum in mari proueniat. Quòd differimè illo vulgari versiculo indicatur.

Alga venit pelago, sed nascitur vlva palude. Vnde etiam Virgilius libro sexto Aeneidis ita cecinit.

Tandem trans fluuium incolumes, vatemq; virumque,

Informi limo, glaucæq; exponit in vlva.

Et libro secundo eiusdem.

Limofq; lacu per noctem obscurus in vlva

Deitavit.

*Fucus marinus h. b. Plin.*

Fuci marini mentionem fecit Galenus lib. v lll. simplicium medicamentorum, his verbis. Phycos humeni etiamnum, & vires ex mari exemptas desiccant, & refrigerat ordine secundo: habet enim quiddam modicè acerbum. Nominatur Græcis *φύκη θαλάσσια*: Latinis, Phucus seu Fucus marinus: Italis, Phuco marino.

POTAMOGETON. CAP. xcvi.

POTAMOGETON, folium betæ simile, hirsutum, paululum supereminens

extra aquam. Refrigerat, & inspissat: pruriginibus vtile, & contra veterum vicerum nomas. Nomen ex eo inditum est, quòd palustribus, & aquosis enascatur.



POTAMOGETON lacubus, & paludibus innasci amat, vbi foliis betæ proximis, super aquam expansis in compluribus locis emicare inuenitur. Hanc herbam nos sæpe vidimus, & legimus, primum in lacubus quibusdam in Ananiasum agro, quam ibi vna cum nymphæa aquis supernatantem deprehendimus. Potamogeton, vt testatur Galenus lib. v lll. simplicium medicamentorum, adstringit, & refrigerat similiter polygono, sed essentia eius crassior, quam polygonon est. Huc herbæ nomen

*Potamogeton h. b. Plin.*

*Vires ex Gal.*

*Nomina.*

Græcum *ποταμογενής*, Latinum similiter Potamogeton: Italis, Potamogeto: Germanis, Seehalden, kraut, & Sam kraut.

STRATIOTES. CAP. xcvi.

STRATIOTES in aquis nascens, iisdem supernatat, & sine radice viuitt: vnde cognomètum traxit. Herba semperuiuo similis, ni maiora haberet folia. Quæ refrigerant sanguinem, qui de fluit à renibus, pota sistunt vulnera, quæ inflammationem minantur, incunescere non sinunt: ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

NON EST profectò quòd miremur, si Stratiotes in Italia non prouenit. Quandoquidem ea, vt lib. x lll. cap. x lll. Plinius testatur reliquit, est in Aegypto tantum, & inundatione Nihil nascitur, aëre quoque similis, ni maiora haberet folia. Vocatur Græcis *στράτιος* in *Αἴγυπτο*: Latinis, Stratiotes aquaticus.

*Stratiotes h. b. Plin.*

STRATIOTES MILLEFOLIUM.

CAP. xcvi.

STRATIOTES millefolium exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit: foliis auium puli pennas imitantibus, breui admodum, dissectoque foliorum exortu. Folia sylvestre cuminum simulant, præsertim breuitate, atque scabritia, breuiora paulò: denfiore umbella, & plenior. Sarcules in cacumine

*Nomina.*

caemine gerit exiguos, & capitula in modum anethi, flores paruos, & candidos. Nascitur in asperis agris, præci-

pue circa femitas. Eximij vsus ad vlcera vetera, recentiaque, profluentem sanguinem, & fistulas.

MILLEFOLIUM MATVS.

MILLEFOLIUM MINVS.



*Stratiota  
millefolia  
-confidera  
tio.*

STRATIOTES in hunc vsque diem Mil-  
lefolij cognomen retinet. Planta est officinis  
notissima, in incultis proueniens, in pratis, &  
circa femitas, lignosis caulibus, dodrante maio-  
ribus, pluribus ab vna radice prodeuntibus, qui-  
bus folia insunt auium nouellarum pennis simi-  
lia, syluestriq; cumino æmula. Flores eius den-  
sissime umbella sustinentur, candidi, etsi nonnun-  
quam in purpura rubescant. Ex his vtiq; no-  
tis palam est, communis vsus Millefolium nil  
aliud dici posse, quàm Stratioten, de quo hic  
agitur, non autem, vt Brasauolus existimat, My-  
riophyllum infra à Dioscoride descriptum. Si-  
quidem Myriophyllum caulis est tener, singu-  
laris, vnica nixus radice: foliis plurimis, leui-  
bus, feniculo similibus. Quæ sanè omnia, ni  
fallor, aperitissimè ostendunt, Brasauolum hac  
in re hallucinatum esse. Millefolij genus quod-  
dam nascitur in Goritienfi agro Saluatino mon-  
te prope facellum diux Mariz virginis, eo tan-  
tùm saxoso tractu, quo ad Sontiũ fluuium de-  
scenditur. Id quoniam aliud præstat magnitu-  
dine, vt eius effigies, quam hic damus, aperte  
ostendit, ideo nobis iure liceat ipsum nomina-  
re Millefolium, malus. Stratioten hunc, & supe-  
riorem perstrinxit Galeanus libro v. 111. simpli-  
cium medicamentorum, vbi de vtriusque viri-  
bus ita differit. Stratiotes aquaticus quidem hu-  
mida, & frigida facultate est terrestris verò non  
nihil habet adstrictionis: proinde sanè, & vulne-  
ra glutinare potest, & vlcibus esse vtilis. Sunt  
qui eo & ad sanguinis eruptiones vtantur, & ad  
fistulas. Herba, quæ Græcis *στρατιότης* *καλίζεται*,  
Latinis Stratiotes millefolium appellatur: Ita-  
lis, Stratiote millefoglio: Germanis, Garben:  
Hispanis, Milhoyas yeraaz: Gallis, Mille feuille,  
Cumin, vel, Ane sauvage.

*Stratiota  
Græc. ex  
Galeo.*

*Nomina.*

VERBASCUM PRIMUM.



VERBASCUM.

CAP. XCIX.

VERBASCUM differentias summas  
habet duas, hoc nigrum, illud album  
in quo mas, & femina intelligitur. Fæ-  
minæ igitur folia sunt brasiæ, pilosio-  
ra multò, & latiora, candida: caulis al-  
bus, cubitalis, aut amplior, subhirsu-  
tus: flores albi, aut ex luteo pallescen-  
tes: semen nigrum: radix longa, gustu  
acerba, crassitudine digiti. nascitur in  
campestribus. Verbascum, qui mas ap-  
pellatur, oblongius, albis foliis, & an-  
gustioribus

VERBASCUM SECVNDVM.



VERBASCVM SYLVESTRIS.



PRIMVLA VERIS.



VERBASCVM TERTIVM.



VERBASCVM LYCHNITIS.



PRIMVLA VERIS ALTERA.



gustioribus, tenuiori caule. Sed nigrum  
 prorsus albo simile esset, nisi nigriore,  
 latoréque constaret folio. Sylvestre  
 folia fert saluix: altas virgas, & ligno-  
 fas, & circa eas ramulos, quales marru-  
 bium: flores luteos, auri æmulus. Sunt  
 & phlomidis duæ, hirsutæ, rotundis  
 foliis, humiles. Tertia lychnitis appel-  
 latur, ab aliis autem thryallis, foliis  
 ternis, aut quaternis, vel paulo pluri-  
 bus, hirsutis, crassis, pinguibusq: apta  
 ad lucernarum lumina. Radix prio-  
 rum duarum adstringit: quare quod  
 magnitudine ludicrum talum æquet, in  
 alui profluuium, conuenienter ex vino  
 datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fra-  
 ctis, antiquæ tussi auxiliatur: dentium  
 dolorem collutione mitigat. Verba-  
 scum, cui flos aureus, capillos tingit,  
 & quocunque abiciatur, blattas in se  
 contrahit. Cocta in aqua folia aduer-  
 sas tumores, & oculorum inflamma-  
 tiones illinuntur: syderatis vlceribus  
 ex vino, & melle, cum aceto aurè vul-  
 neribus medentur: contra scorpionum  
 ictus sunt auxilio. Sylvestris folia ambu-  
 sis igni sunt cataplasmata. Aliant in foli-  
 is eius, quam fœminam dicimus, ari-  
 dos ficus omnino non putrefcere.

*Verbasco genera, et  
 consideratio.*

*Ruellia, et  
 Fuchsia op-  
 pinio re-  
 probata.*

PRIMA Verbasci genera, domestica scilicet  
 duo, nulli non cognita sunt. Verum sylvestre,  
 quod foliis saluix similibus, aureisq: floribus  
 provenit, non omnibus sanè notum existimo.  
 Viret tamen hodie Patavii in nobilissimo sim-  
 plicium horto, quem ad commune studiosorū  
 commodum illusterrimus Venetorum Senatus  
 construxit curavit. Quin nec fortasse Lychnitum,  
 cuius etiam figuram hic damus, novere multi.  
 Reliqua verò, quæ mihi demonstraverit in Ita-  
 lia, hæcenus reperi neminem. Et quantum sint,  
 qui putent, ut Ruellio, Fuchsio, & recentiorum  
 aliis placeat, eas vulgaris notitiæ plantas, quæ  
 quibuscum Brachæ cuculi, officinis Primulæ  
 veris, Germanis clausæ sancti Petri, nonnullis  
 verò herbæ paralytice appellantur, esse Diosco-  
 ridis Phlomidis, quæ hirsutis, rotundisq: foli-  
 is, humiles prostrant, eorum tamen sententiæ,  
 licet eruditorum virorum, hædusquam addipici  
 possum. Siquidem plantis istis folia non  
 insunt hirsuta, nec etiam rotunda, sed alteri læ-  
 via, alteri verò crispæ, hæcæ, aut dispici mo-  
 do. Adde quod florum, quos hæc Phlomidum  
 genera proferant, nusquam, quod sciam, memi-  
 nit Dioscorides, neq: e veteribus aliis, qui Ver-

basci genera recensent. Id quod in herba para-  
 lyti, meo quidem iudicio, silentio innotuissimum  
 non fuerat, cum hæc omnium prima suis au-  
 reis floribus emicet, verq: novum pronunciet  
 unde illi officinæ nomen imposuerunt. His re-  
 centiores vim eff acetum tribuant ad articulo-  
 rum dolores. Radicis earum decoctum ad re-  
 num, & vesicæ calculos commendat. Succum  
 quoque tum porum, tum exterius illitum fra-  
 ctis, luxariisq: ossibus vtile esse tradunt. Quo  
 item ex floribus expresso videntur mulieres ad  
 erugandam faciem, eiusq: maculas detergen-  
 das. Sed ad legitima Verbasci genera redeamus.  
 Hæc omnia in uniuersum, ut plurimum factis pe-  
 riculis constat, omnibus ferè sedis morbis mi-  
 rifice subueniunt: adstringunt enim, & exsiccat.  
 Quamobrem feminis, & florum pulu, additis  
 chamæmali floribus, & laticis resina, proci-  
 dentem sedem sustinui cohibet, & tenasium præ-  
 cipue dysentericis tollit. Verbasci fœminæ folia  
 inter lapides confusa, si equi claudicantis ex  
 clauorum noxa vngui prius excavato imponan-  
 tur, mirum dictu quam brevi tempore is liber  
 euadet. Radicis eiusdem succus, antequam  
 caulem proferat, datarum drachmarum ponde-  
 re ex Cretico vino haustus, in ipsa accessionis  
 hora (ut Arnaldus refert) quartanam fugat, cum  
 hoc tamen, quod tribus, aut quatuor iteratis  
 vicibus hauriatur. Succus tam florum, quin  
 foliorum asperis verratis illitus, eas facile de-  
 let, cū lauibis nihil proficiat. Est & herba  
 milis Verbasco, quæ BLATTARIA Plinio

## BLATTARIA.



nomina: lib. xxv  
 cap. ix. ubi eam  
 liis verbis depingit.  
 Est similis Verba-  
 seo herba, quæ sa-  
 pe fallit pro ea ca-  
 pta, foliis minus  
 candidis, caulicu-  
 lis pluribus, flore  
 luteo. Hæc abiecta  
 blattas in se contrahit, ideoq: Romæ  
 Blattaria vocant.  
 hæc Plinius. Ean-  
 dem verò effe-  
 ctum Dioscorides  
 illi Verbasci gene-  
 ri assignauit, quod  
 floribus aureis de-  
 scripsit. Quæ certe  
 res facit, ut cre-  
 dam, quod non  
 aberrarent ij, qui sibi animum inducerent, blat-  
 tariam Plinii, & verbasum illud Dioscoridis,  
 cui flores insunt aurei, vnam & eandem plan-  
 tam esse. Porro Blattaria passim ferè nascitur:  
 foliis oblongis, per ambitum serratis: floribus  
 tertium Verbasci genus maximè æmulancibus.  
 Quibus decidentibus circa caule folliculi exo-  
 riantur parui, lini instar, duriores tamen, ac  
 lauiore,

*Verbasco  
 vires qua  
 dam.*

*Blattaria, et  
 vires.*

maiores, in quibus semen continetur. De hac herba plures, quod inuenierim, facultates non produntur. Sed cum ea gustu amara deprehendatur, hinc certo colligere licet, quod eadem & aperire, & abstergere possit. Verbasco generatim vires memorie tradidit Galenus lib. vi. r. r. Pl. medic. vbi ita scribit. Verbasum, quodam foliis album est, quoddam vero nigrum. Et alibi aliud quidem mas est, cuius folia angustiora: aliud femina, cuius maiora. Est præterea aliud Verbasum sylvestre cognominatum, quod floribus constat aureis, & luteis. Sed & præter has species alia est, quam propriè phlomisida, & thryallida nominant. Priorum itaque duarum radix gustu æterba est, & fluxionis affectibus prodest: sed & ad dandum dolorem eam quidam colluunt. Attamen folia digerendi vim habent: sic & aliarum folia, & maxime eius, quæ aureos flores obtinet: qua etiam capillos rufant.

Omnium enim folia desiccanda, & digerenda moderatè vim possident. Quæ planta Græcè *φάρμακον*, Verbasum Latine dicitur: Italis, Verbasco, vulgò Tasso barbasco: Germanis, Vulkraut: Hispanis, Verbasco: Gallis, Bouillon.

Nomina.

AETHIOPIS. CAP. C.



AETHIOPIS folia habet verbasco similia, perquam hirsuta, densaque, in orbem circa radice in imam reducta: caulē quæ draculū, tscabrum, similem

apiastro, aut arctio, multis coccum alis: semine erui magnitudine, geminum, in vno conceptaculo: radices ab eodem cespice numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu: quæ sicce nigrescunt, duranturque, ut cornua possint videri. Plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Mesenia. Auxiliatur purulētis excreationibus, ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabritiis, decocta radix, & pota: quin & cum melle, eclegmatis vicem præbet.

*Aethiops* TAMETSI iam pridem existimauerim, Aethiopiā herban in Aethiopia, & Ida Troa-

dis tantum nasci, quod eam inibi plurimam gigni testentur Dioscorides, & Plinius, hoc tamen anno legitima, ni fallor, Aethiopia ad me allata est. Pataurio ab erudito iuvene medico Ioanne Oderico Melchiorio Tridentino, quā, nulla profus reclamante nota, Aethiopiā referre deprehendi, ut eius pictura, quam hic damus, pulchrè demonstrat. Aethiopiā non reperi meminit Galenus in simplicium medicamentorum censu, quāquam eam memorie prædidit Paulus lib. vi. r. r. vbi non plures de hac herba vires tradit, quā quæ Dioscoridi acceptæ referri possunt, cum ita scribat. Aethiopia similia verbasco habet folia. Radicis decoctum vorum auxiliatur ischiadicis, pleuriticis, & singuinem resistentibus: arteriæ etiam asperitates cum melle lenit. Vt Græcis hæc planta *αἰθίοπη*, ita etiam Latinis Aethiopia nominatur: Italis, Ethiopide.

Aethiopia die vnt ex Pau.

Nomina.

† Hoc loco in vulgatis Græci codicibus legitur *αἰθίοπη*, hoc est, crassum. Quam vocem interpretes Plinium fortè, ut solet, secutus omisit. Sed cur nos eam non adiecerimus, fecit Oribasius, quem in hoc Plinio adimplari inuenimus.

ARCTION. CAP. CI.

ARCTION, aliqui potius Arcturon vocant, similis est verbasco foliis, nisi quod hirsutiora, & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cumini, paruo: radice tenera, alba, dulci. Decocta cum semine radix in vino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum: ambusta, perionēs que fouentur eodem: bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam è vino.

CREDIT Ruellius, Arction eam esse plantam, quæ & secus vias, & in scrobibus marginibus nascitur, quāquā officinarum vulgus Lappem minorē appellat. Sed Ruellius in hoc haud dabiè, meo quidem iudicio, fallitur, neque audiendus est. Siquidem, ut diligenter notas expendentibus perspicuum fiet, Lappa minor aliud profectio non est, quā xanthum inferius à Dioscoride representatum. Etenim Lappa minor folio verbasci, eodè hirsutiorè non videtur: neque caulē proferit longum, & mollem: quā nec feminem cumino simile, neque radicem teneram, ac dulcem. Ex quibus sine notis repugnantibus Ruellij opinio euidentissimè refellitur. Nullam equidem hæc genus herbarum reperi, ac vidi, quæ Arctium legitime referat. Nūc meminit Galenus libro vi. r. r. simplicium medicamentorum, vbi de eo ita scriptum re-

Arctij cōsideratio. Ruellij error.

Arctij G. res ex Galeno.


liquet. Arction illud, quod verbasco est simile, radice tenera, candida, dulci: caule oblongo, & molli: semine cumino simili, facultatis est admodum tenuium partium, & ob id exiccatis,

EXCE

extergentique, tamen modicè. Quamobrem radix, ac semen eius cocta cum vino, quadantenus dolores dentium mitigant. Porro ambula, & chimethila, non horum modò decoctum perfusum, sed & caules teneriores sanare possunt. Quòd *apocryphi* Græci, Arctium quoque Latini dicunt: Itali. Arctio.

PERSONATA.

C42, C44



PERSONA  
 MA folia ha-  
 bet cucurbi-  
 ta, maiora ta-  
 men, hirsutio-  
 ra, nigriora, &  
 crassiora: cau-  
 lem albican-  
 tem, quanquā  
 & interdum vi-  
 dua caule re-  
 peritur: radi-  
 ce intus can-  
 dida, foris ni-  
 gra. Hæc drachmæ vnius pondere po-  
 ta cum pineis nucibus, purulenta, &  
 cruenta extussientibus auxiliatur: trita  
 dolores à contorsionibus artuum con-  
 tractos, illitu sedat. Folia vtiliter anti-  
 quis vlceribus illinuntur.

Personae  
et conside-  
ratio.

PERSONATAM. Plinio libro x x v. capite i x. teste, quidam Arcion vocant, cuius foliolum nullum est laeius, grandis lappas ferentem. Ex quibus Plinij verbis planum fit, Personatam esse nimirum Plantam repraesentare, quam of ficina vulgo Lappam maiorem vocant, quod huic folia insunt herbarum omnium maxima, longaeque cucurbitina excedentia: quodque hec lappas grandiores ferat. Huius altera habetur species, quae quidem foliis cucurbitas magis amulat, iis tamen maioribus, in tignis, & fero bium marginibus proeueniens, caule interdum vidua, non tamen perpetuo, quoniam veris initio & caulem, & flores profert, licet iis subinde confectum exuatur. Ex huius foliis nostrates rusfici pileos foliis conficiunt, quibus à solis radiis se tuerunt, dum Sirio ardente segetem vel metunt, vel tritulant. Huius item meminit Plinius loco citato, ubi eam non quidem Personatam, sed Persolatam appellat, sic scribens. Persolatam, quam nemo ignorat, Graeci verò Arcion vocant. Folia habet maiora etiam cucurbitis, & hirsutiora, nigrioraque, & crassiora radice albam, & grandem. Haec Plinius de Persolata. Ex cuius notis facillè cognosci potest, Plinium hic secundum Personatæ genus descripsisse. Quo

fit, vt maximè redarguendum putem Leonice-  
num, vt potè què Plinium in hoc perperam dàm-  
nauerit, affers non nif vnum Perfonatæ ge-  
nus reperiri. Fuchfus, & recentiorum nonnulli  
non dubitant, quin hoc Perfonatæ genus fit  
Petafus. Sed omnes, pace eruditiorum dixe-  
rim, in errore verfantur, vt proxima commen-  
tatione liquebit. Cæterum Brauaufus in fuo  
fimplicium examine Lappam credidit eſſe Dio-  
ſcoridis Aparinen, in hoc euidentius hallucina-  
re, quim vt eius error explodi debeat, vt etiam

*Stachys* *er-*  
*ect.*

Erasmus  
Kantzen  
18.

PERSONATA ALTERA.



ij diiudicare poterunt, qui in re herbaria etiam  
mediocriter versari fuerint. De Personata sub  
alterius Artij nomine diffusi: Galenus lib.  
v. i. simplicium medicamentorum, his verbis  
Alterum verò Artium, quod Prosopida ve  
cant, cuiusque folia cucurbitae similia sunt,  
nisi quareunt tum maiora, tum duriora, discu  
ter simul & desiccant, sed & adstringit medicocri  
ter. Quamobrem folia eius veteribus viceribus  
mederi possunt. Quae planta Graecis *ἑρπύριον*,  
Latinis Personata vocatur: Italici, Lappola mag  
giore: Germanis, Groff kletten: Hispanis, Bar  
dana, & Pagamacera mayor: Gallis, Glouteron,  
& Bardane.

Person  
Vente d  
Galeno.

*Nominat.*

### PETASITES.

CAP. CIII.

**PETASITES** pediculus est cubito maior, crassitudine pollicis, à quo prægrande folium, galeri modo amplum, ceu fungus dependet. Contra phagedænas, & vlcera quæ cacoëthe vocantur, efficaciter inlinitur.

QVANTVAM scribit Ruellius, nasci Petasiten in Gallia, non tamen video, quomodo quis recte eius sententia subscibere possit ac debeat. Quandoquidem in Perfoliaram, de qua superiori capite distulimus, pro Petasite sumptissime videtur, quoniam etiam ipsum forte secutus Fuchius pro eadem depinxit. Sed quoniam Petasites pediculum fundit cubito proceriorem, quo amplius folium, galeri figura, tanquam fungus, dependet, cui solum huius Perfoliaris,

*Petrus*  
*considera-*  
*tio.*

Руч. 2. 1.  
Руч. 2. 1.  
Руч. 2. 1.

Pinyin: *...*  
etc.

vel Atchij generis minimè respondere deprehenditur, hinc fit, vt horum aliqui doctissimorum virorum sententiam improbandam esse existimem. Nobis hæcenus veram Petasitem non licuit inuenire. Atque adeò mea sententia est, quòd hæc non nascatur in Italia, argumento, quòd tam grande folium tandiu nunquam latere potuisset. Petasiti vires paucis reddidit Galenus libro v 111. simplicium medicamentorum, sic inquit. Petasites ex tertio est ordine deficiantium. Quamobrem ad maligna, quæ cacoëthe vocantur, & phagedænica vlcera, ea videntur. Non secus Latinis Petasites, ac Græcis *petasites* nominatur.

*Petasites*  
*Galeno.*

*Nomina.*

## EPIPACTIS.

## CAP. CIIII.

EPIPACTIS ab aliis elleborine, parua herba, exiguis foliis. Iocineris vitii vilis, & contra venena pota.

*Epipactis*  
*dis consideratio.*

EPIPACTIDA adeò paucis perstrinxerunt Dioscorides, ac ceteri, qui ante & post ipsum de plantarum historia scripserunt, vt difficile admodum sit discernere, quænam planta sit hæc

## EPIPACTIS.



in Italia, vbi fortasse ea non provenit. Nam, vt Plinius libro x 111. capite x x. commemorat, Epipactis in Asia, & Græcia nascitur. Verum Enimvero si Epipacti Elleborine ex eo dicta est, quòd cum Elleboro nigro similitudinem habeat, eam equidem crediderim nasci in Gocitiensi agro.

Quandoquidem inibi frequens quædam parua herba reperitur, cuius hic figuram

damus, quæ foliis, floribus, & radicibus elleborum nigrum representat. Epipactidis inter simplicia, quod inuenerim, non meminit Galenus, Sed Paulus idè, quod Dioscorides, de eius viribus tradidit. Hæc *inuenisse* Græcè dicitur: Latine item Epipactis, & Elleborine.

*Nomina.*

## FUMARIA.



## FUMARIA.

## CAP. CV.

FUMARIA fruticosa herbula est, præterea, coriandro similis, foliis candidioribus, vndique numerosis, cineracei coloris: flore purpureo. Huius succus acris est: claritatem facit oculis, de lachrymationemque: vnde nomen traxit. Illitus cum gummi, cuiuslas passeras renasci prohibet. Commanducata herba biliosam vrinam trahit.

## FUMARIA ALBA.



FUMARIA, herba vulgaris admodum notitæ, officinis passim vocatur Fumus terræ. Fumariæ verò nomen sibi ascriuit, quòd eius succo oculis immisso, quibus mirifice claritatem conciliat, lacrymas, quemadmodum & fumus, cieat. Debet hæc Mauritanis longe magis, quam Græcis, quòd illi eam pluribus commendauerint viribus, nec eis quidem contemnendis, vt Serapionem, Auicennam, & Mesuem legentibus facile patebit. Fumaria Plinio duo traduntur genera libro x x v. capite x 111. vbi ita scriptum reliquit. Capnos priua, quam pedes gallinaceos vocant, nascens in parietinis, & se-

*Fumaria*  
*consideratio.*

*Fumaria*  
*genera ex Plinio.*



piibus, ramis tenuissimis, sparsisq; flore purpureo, viridis, succo caliginem discutiuntque in medicamenta oculorum additur. Similis & nomine, & effectu alia est Capnos fruticosus, præterea, foliis coriandri, cineracei coloris, flore purpureo. Nasitur in hortis, & segetibus hortaceis. Claritatem facit inunctis oculis, delacrymationemq; ceu fumus, unde nomen accepit, eadem euulsas palpebras renasci prohibet. hæc Plinius. Ceteram quænam altera sit Capnos, quæ etiam ab Aëlio describitur, superius libro tertio de Aristolochia, & Pistolochia differentes latius explicauimus. Eo igitur illos remittamus, qui plura de altero Fumariæ genere scire desiderant. Hic facis nobis sit eius tantum imaginem exhibere, Fumariæ alterius nomine inscriptam, atque eius notas, quas loco citato retulimus, omittamus, ne idem frustra repetere videamur. Porro in notis, & Dioscoridi adscriptis simplicium nomenclaturis reperio Capnos quibusdam Corydalis appellari. Unde factum est, vt in suspicionem, venerim, an de Capno intellexerit Galenus lib. x. i. simplicium medicamentorum, vbi de galericia scribens, quæ Græcis corydalis dicitur, Corydalis herbæ meminit, sic inquit. Adieci hæc sermone, quod vellem clare hoc animal, nempe galericam, manifestare, quos ferat in capite pilos erectos: quandoquidem expertus sum eius aduersus colicos virilitatem, velimq; qui ipsum non norunt, iis bene monstratum. Nam & ipsa Corydalis appellata herba colicis conuenit. Et hoc quoque tibi obiter sit notatum. hæc Galenus. Sed iam ad Fumariæ vires redeamus, quas primum ex Mesue sic ad sensum referam. Fumaria inter miora, innocentioraque recensetur medicamenta, quibus deiectoria vis inest. verum nimia huius herbæ copia facit, vt eius quoque auctoritas & pretium plurimum diminuatur. Hæc non modò aluum soluit, sed & viscera roborat, contrahitq; distentos eorū villos. Omni prorsus noxa caret: quo fit, vt haurientibus nullum inferat incommodum. Roboratur deiectoria eius facultas, quod non admodum sit valentior, additis myrobalanis, sena, caprino sero, insectorio cacco, aut vuis passis. Præstat quæ virentior, foliis extensis, non sanè crispis, & quæ violaceo sit flore. Colligi debet verno tempore, & ex eo succus exprimi. Sunt qui hanc in vniuersum temperameto frigidam dixerint. Sed aberrarunt, quoniam in ipsa foliorum superficie reperitur & caliditas, quæ

*Fumaria  
Vires ex  
Mesue.*

stos humores Eius vis non modò ad hepar, sed & ad venas diffunditur. Quamobrem sanguinem expurgat, omnibusq; incommodis medetur à bile, aut exulsiis humoribus prouenientibus. Proinde elephantias medetur, aduersus carcinomata efficax est: lichenas, & alia cutis vitia mirificè emendat: quin & omnibus morbis auxiliatur, qui ex viscerum infarctu originem ducunt. Roborat Fumaria ventriculorum, iecur, & cætera interna viscera, biliosasque finit febres, quemadmodum & eas, quæ ex vasorum obstructione excitantur. Fumariæ meminit Galenus lib. vi. i. simplicium medicamentorum, vbi de eius viribus differit his verbis. Capnos, hoc est, Fumaria acris simul, & amaræ qualitatis est particeps, nec tamen planè expers est acerbæ. Quamobrem vrinam biliosam multam prouocat, sanatisq; rectoris obstructiones, & debilitates. Succus eius oculorum aciem acuit, non paulum trahens lacrymarum, velut ipse fumus: nam hinc ei appellatio indita. Plebeius quidam ea vi solebat ad stomachum roborandum, vnaque ventrem lubricandum. Siquidem herbam primum desiccata condebat: porro cum vti volebat, subductionis quidem gratia, melicrato inspergebat: at roborare volens stomachum, vino nimirum diluto. Herba, quæ Græcis καυλή Latinis quoq; Capnos & Fumaria nominatur: Arabibus, Schehiterig, siue Saheterigi: Officinis medicorum, Fumus terræ: Italis, Fumaria, & Fumoterra: Germanis, Erdrauch: Hispanis, Palomilla: Gallis, Fumeterre.

*Fumaria  
Vires ex  
Galen.*

*Namina.*

#### LOTUS VRBANUS. CAP. CVI.

LOTUS VRBANUS alij trifolium vocant. nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubes, caterasque caliginones discutit.

#### LOTUS SYLVESTRIS. CAP. CVII.

SYLVESTRIS Lotus, quam trifolium minus appellant, plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & sæpe maiore, alis multis: foliis trifolij pratensis: semine fœni græci, multò minora, gustu medicato. Vim calfaciendi, & leniter adstringendi obtinet: vitia cutis in facie, maculasque cum melle peruncta expurgat. Trita per sese, aut cum malæ semine, in vino, aut passo bibitur aptissimè contra dolores, qui vesicam malè habent.

LOTVS VRBANA.



*Loti Urbani.* N V L L A certe hæcenus nobis sese ob-  
tulit herba, cui merito subscribi possit: hæc est  
*fructuosa.* vera ac legitima Lotus fatiua. Cæterum non  
*Gesneri.* defunt: è recentioribus, quorum opinionem tue-  
tur Gesnerus vir doctissimus in suo libro ani-  
*malibus dicato,* qui putant, Lotum fatiuam esse

Trifolium illud, quod in pratis passim atque  
alibi etiam provenit: eo fortasse argumeto ad-  
ducti, quod Dioscorides scripserit Lotum tam  
urbanam, quam sylvestrem ab aliquibus trifoli-  
um appellari. Sed quod errent ij, qui ita sen-  
tiunt, ex eo manifestè cognoscitur, quod à Dio-  
scoride Loto sylvestri folia trifolij pratensis  
tribuantur. Nam si Dioscoridi Lotus fatiua  
trifolium pratense, is nimirum scripsit  
tradidisse, eam in pratis nasci, non in hortis:  
atque satis illi fuisset Locum sylvestrem fatiue  
similem reddere, omisso trifolij pratensis men-  
tione. Hinc ergo colligendum arbitror, Lotum  
esse plantam aliam à Trifolio: eosq; in errore  
versari, qui secus opinantur. Sunt porro alij,  
qui existimant, eam plantam esse Lotum urba-  
nam, quam vulgares herbarij, & officinæ Mel-  
ilotum falsò appellant, vpotè quæ foliis con-  
stet trifolij effigie, nascaturq; non in pratis tan-  
tum, sed etiam in viridariis ac hortis. Verùm  
horum sententiam eut planè probem, aut re-  
fellam, nihil equidem habeo, cum ij sua potius  
opinionem duci, quam rationibus aut auctorita-  
tibus niti videantur. Inclinat tamen animus ad  
credendum, quod ita, ut illi reatur, facile esse  
possit. quandoquidem vulgaris Melilotus & in  
hortis provenit, & tota trifolio proxima pro-  
fertur: quin & omnibus notissima est herba, quæ  
admodum Lotum urbanam olim fuisse aperte  
innuit Dioscorides, qui eam ut triualem ideo  
non depinxit. His illud etiam accedit, quod in  
huic vsque diem propriè ferè seruauerit no-  
men, eo tantum iusto ex Loto in Melilotum.  
Vnde postea faciliè factum esse potest, ut eadem  
legitima meliloti locum occupauerit. Syue-

LOTVS SYLVESTRIS.



stris verò Lotus, quam copiosam in Libya gi-  
gni tradidit Dioscorides, an nascatur in Italia,  
non ausim affirmare. Equidem herbam quan-  
dam sæpius vidi, ac legi in incultis, & pratis  
nascentem, foliis trifolio æmulis, bicubitali  
caule, quam plurimis adnatis, luteis floribus, è  
quibus cornicula prodeunt semine plena, sæni  
græci modo, odore non ingrato. Sed an hæc  
sit verà Lotus sylvestris, nondum compertum,  
& exploratum habeo. Loti vtriusque vines  
reddidit Galenus libro 7 11. simplicium me-  
dicamentorum, sic inquit. Lotus domesti-  
ca, quam quidam triphyllon, hoc est, trifolium  
nominant, ut mediocriter concoquendi vim  
possidet, sic etiam excaicandi: in caliditatis,  
frigiditatisq; coniugatione media quodammo-  
do est, & temperata. Lotus autem agrestis plu-  
rima in Libya provenit. Semen eius secundum  
est ordinis excaicamentum, habetq; nonnihil  
absterforium. *Nasit quæ Græcè λωπός, Latine*  
Lotus urbana cognominatur: Italicè, Loto do-  
mestico. Quæ verò λωπός αγρικός Græcis, Lotus  
sylvestris Latini vocatur: Italice, Loto siluatico.  
Arabes vtrunq; cum Aegypto etiam indiffe-  
renter vocant Handachocha, Garch, & Thust.

CYTISVS. CAP. CVIII.

CYTISVS frutex est albus in totū,  
ut rhamnus, ramos spargēs cubitales,  
& maiores: in quibus folia sæni græci,  
aut loti trifolia, minora, dorso medio  
prominente. Ea digitis trita erucam  
olent, gustataq; cicer recens sapiunt.  
Folia refrigerant: tumores inter initia  
discutiunt, si cum pane trita illinan-  
tur: decoctum potu vrinam ciēt. Non-  
nulli, quod apes allicit, prope aluca-  
ria ferunt.

C R E D

Cytisum  
fulcratio.

CREDIDIMVS iandum Cytisum, si tamen is in Italia proueniret, non aliam esse plantam, quam eam Trifolij odorati speciem, quæ Romanis vulgò appellatur Tribolo, alijs verò Trifoglio cavallino, hoc est, Trifolium equinum, eo quod equis gratissimum sit pabulum, cum nulla sanè mihi occurreret planta, quæ magis notis omnibus Cytisum præ se ferre videretur. In hanc opinionem me primum deduxerat Plinius, quod scripserit, iumenta degustato Cytiso hordeum spernere. Nam cum certò scire, equos adeò huius Trifolij genere avidos esse, ut eo magis delectentur, quam hordeo, aue-  
na, & reliquis frugibus, idcirco videbar non temere adduci, ut crederem, hanc stirpem legitimè esse Cytisum, præsertim cū pluribus consiliet notis, quæ Cytiso respondent. Huc præterea alia accedebat ratio, quod cū Dioscoridem viderem de Cytiso inter herbas, non autem inter frutices, & arbores differere, non aliud quidem mihi persuadere poteram, quam quod Cytisus esset herba potius, quam arbor: præcipue cū palam sit, iumenta herbas, & fenum potius depasci, quam arborum frondem. Siquidem eruo, & medica herbis antiqua ætas armenta, & pecora alebat, ac signabat. His itaque rationibus fretus (tunc enim plura neglexerā inuestigare) adduxi etiam, ut existimarem, illud Trifolij genus odoratum omnino esse Cytisum. Verum enimvero cū postea rem hanc accuratius, rectiusque expendissem, me in errore versari deprehendi. Proinde in præsentia non granabor priorem mutare sententiam, constanterque affirmare, aliam ab illa planta Cytisum esse: nec eam quidem herbam, sed fruticem, qui cultura arboræscat. Non enim is sum, qui opinionis alienius sustinendæ gratia adeò pertinax esse velim, ut falsum magis, quam verum tueri contendam. Sed quod iure putem in altam me devenisse sententiam, facit in primis Galenus libro primo de antidotis, ubi Cytisum fruticem esse myrti magnitudine scribit, his verbis. In Mysia quoque, qua parte nostræ provincie finitima clytactus occurrit, quem Briton nominant, in quo nec Aëcio persimile magna cum admiratione conspexi. Extabat enim ibi quoque collis quidam non magnus, fixosus totus, thymo, & origano reforescens: alibi locus erat Cytiso plenus. Apes plurimum mellis ex Cytisi floribus excerpere scriptores vni ore tradunt. Fruticosa verò planta Cytisus est, eam altitudinem attingens, ad quam myrti crescunt, hæc Galenus. Est deinde Plinius, quem Galeno subscripsisse inuenio libro x. i. cap. 111. cū inquit. Alterum est ebeni genus fruticosum, Cytisi modo & tota India dispersum. Et libro x. v. l. cap. x. x. v. l. i. ubi inter arbores Cytisum enumerat, scribens. Tota ossa est, illex, cornus, robur, Cytisus, morns, ebenus, lotus, & quæ sine medulla esse diximus. Accedit his etiam Columella, qui idem testari videtur in calce libri v. ubi cum longius de Cytiso differuisset,

Cytisum  
fruticosa est,  
non herba.

demum inquit. Hactenus de arboribus præcepisse abunde est. Horum itaque probatorum auctorum testimonio planum fieri arbitror, Cytisum arborefcentem esse fruticem myrti modo, ut Galenus scriptum reliquit. Sed mihi quidem hactenus inter Italicos frutices, qui arboris instar adolefcunt, nullū conigit inuenire, qui legitimè Cytisum referret. Cæterum non desunt, qui sibi persuadeant, atque etiam scriptis tradant (ut Gesnerus in libro magno, quæ de quadrupedibus edidit) se Cytisum vidisse, legisq; in Italia in sylvis, alijsq; sylvestribus locis, qui per se tantum proueniat. Sed equidè dubitauerim, ne, & ipsi decipiantur: quandoquidè ij, quantum ex eorum scriptis colligi potest, Coluteæ sic Theophrasto vocatam sumunt pro Cytiso. Neque propterea illud dixerim, quod putem cytisum sua sponte non prouenire, cū teste Columella lib. 1. x. cap. 111. de re rustica, duplex sit cytisus, una sativa, & altera sua spontis: sed quod scribat Plinius, rarè esse in Italia. De sativa autem Cytiso diligentissime scriptis idem Columella lib. v. de re rustica, capite vltimo, cuius hæc verba subiiciā. Cytisum, inquit, in agro esse quàm plurimum maximè refert, quod gallinis, apibus, capris, bubus quoque, & omni generi pecudum vtilissimum est, quod ex eo citò pinguefcit, & lactis plurimū præbet ouibustum etiam quod octo mēsis viridi eo pabulo uti, & postea arido possis. Præterea in quolibet agro, quantum uis macerisimo, celeriter comprehendit: omnem iniuriam sine noxa patitur. Mulieres quidem si lactis inopia premuntur, Cytisum aridum in aqua macerari oportet, & cū tota nocte permaduierit, postero die expressi succi ternas heminas permisceri modico vino, atque ita potandum dari sic & ipsæ valebunt, & pueri abundantia lactis confirmabuntur. Satio autem Cytisi vel autumnio circa idus Octobris, vel vere fieri potest. Cū terram bene subegeris, areolas facito, ibiq; velut ocymi semen Cytisi autumnio serito. Plantas deinde vere disponito, ita ut inter se quoque uersus quatuor pedum spatia distent. Si semen non habueris, acuminata Cytisorum vere deponito, & stercoreatam terram circumaggerato. Si pluvia non incesciderit, rigato quindecim proximis diebus, simul atque nouam frondem agere ceperit, sarrito, & post triennium deinde cædeto, & pecori præbeto. Equo ab idè est viridis pondo x. v. bubus pondo vicens, ceterisq; pecoribus pro portione virium. Potest etiā ante Septembrem facis commode ramis Cytisi feri, quoniam satis comprehendit, & iniuriæ sufficit. Aridum si habis, parcius præbeto, quoniam vires maiores habet, priusq; aqua macerato, & exemptum paleis permisceto. Cytisum cū aridum ficere volēs, circa mensem Septembrem, ubi semen eius grandescere incipit, cædeto, pauciq; horis, dum flaccescat, in sole habeto: deinde in umbra exiccat, & ita incoadito, hactenus Columella. Plinius quoque Cytisi historiam

Cytisi hi-  
storia in  
Col.

*Cytisi hi-  
storia ex  
Plin.*

copiosè prosequitur lib. x l i i . cap. x x l i i i .  
vbi hæc habet. Frutex est & Cytisus ab Ari-  
stomacho Atheniensî miris laudibus prædica-  
tus pabulo ovium, aridus verò etiam suum:  
sponderq; iugero eius annua HS. MM. vel me-  
diocri selo redditus. Vilis quæ eruo, sed ocior  
satieta, perquam modico pinguescente qua-  
drupede, ita vt iumenta hordeum spernant.  
Non ex alio pabulo lactis maior copia, aut mel-  
ior: super omnia pecorum medicina à morbis  
omni vsu præstante. Quin & nutritibus in de-  
fectu lactis aridum, atque in aqua decoctum,  
potui cum vino dari iubet, & firmiores, celsio-  
resq; infantes fore. Viridem etiâ gallinis, aut  
si aruerit madefactum. Apes quoque nunquam  
desere, Cytisi pabulo contingente, promittunt  
Democritus, & Aristomachus. Nec aliud mino-  
ris impendij est. Seritur cum hordeo, aut vere  
semine vt portum, vel caule autumnno ante bru-  
mam. Si semine madidum: & si desint imbres,  
sæcum spargitur. Plantæ cubitales seruntur sèro  
be pedali. Seritur post æquinoctia tenero fru-  
tice: perficitur triennio: demetitur verno æqui-  
noctio, cum florere desit, vel pueri vel anus  
vilissima opera. Canus aspectu, breuiterq; si  
quis exprimere similitudinem velit, angustioris  
trifolij frutex. Datur animalibus post biduum  
semper: hyeme verò quod inaruit, in adidum.  
Satiat equos denz libræ, & portione minora  
animalia: obiterq; inter ordines allium, & cepe  
feri fertile est. Inuentus hic frutex in Cythno  
insula, inde translatus est in omnes Cycladas,  
nux in vrbes Græcæ, magno casu prouentu.  
Propter quod maximè miror rarum esse in Ita-  
lia. Non æstuum, non frigorum, non grandini-  
um, aut niuis iniuriâ excrescit, hæc Plinius.  
Ex quibus hic certè subit nobis mirari Gesne-  
rum, virum alioqui eruditione clarum, quod in  
suo magno libro de quadrupedibus, vbi probare  
contendit arborem, quam rura Tridentina  
Eghelum vocant (nos eam Anagyris generi ad-  
scripsimus) esse Laburnum, scribat ex auctori-  
tate Democriti Cytisum apibus aduersari. Qua  
in re is mihi quidè videtur (pace eius dixerim)  
non fuisse memor illorum verborum, quibus  
paulò ante asseruerat eiusdem Democriti testi-  
monio, apes nunquam desere, cytisi pabulo con-  
tingente. Id quod nos quoque ex Plinio paulò  
suprà retulimus. Carterian de Trifolio illo odo-  
rato, cuius initio huius commentationis, atque  
etiam fufus lib. l i i . in Trifoliis mentionè feci-  
mus, neq; Dioscorides, neq; Galenus, quod scia,  
quicquam memorie prodiderunt. Non desunt,  
qui id velint esse Theophrasto plantâ Mel fru-  
gum appellatam, quam ipse inter loci genera  
recenset libro v l i . cap. x l i i i . de planta-  
rum historia, vbi sic inquit. Quædam enim-  
formis pluribus constant, quantum nomen  
vnum sortiantur, vt ita ferme æquiuoca sint,  
ceu lotus. Huius enim genera plura redundant,  
folio, caule, flore, fructuq; discreta. Inter quæ  
vel illud redditur, quod Mel singum appella-

tur, diuersum tamen viribus in vsu cibario, tum  
quod non eadem loca desideret. hæc Theo-  
phrastus. Quæ sanè illorum sententiam mihi  
probare non videntur, quod Trifolium odo-  
ratum minimè in cibis veniat, & illdem in locis  
nascatur, in quibus lotorum omne genus vire-  
scere conspiciunt. Atqui Plinio libro x l i .  
cap. vltimo, nil aliud est Mel frugum, Dioclis  
testimonio, quam panicum. Cytisi vires  
Galenus libro v l i . simplicium medicamentorum,  
reddidit his paucis verbis, Cytisi folia  
digerendi facultatem obtinent aquæ tempera-  
tæ mistam, sicut & maluz folia. Planta vt  
Græcè λέπρος, ita etiam Cytisus Latine, & Ci-  
tiso Italicè dicitur.

*Cytisi vi-  
res ex Ga-  
leno.  
Nomen.*

LOTUS AEGYPTIA.  
CAPVT CIX.

E S T E T in Aegypto lotus, quæ in  
campis flumine inundatis prouenit,  
caule fabæ: flore paruo, candido, lilio  
simili, quem tradunt occidente sole  
comprimi oculidique, ad ortum  
tem aperiri: adduntq; caput ipsum  
vespera aquis condi, & ad exortum  
solis emergere. Caput quale papaue-  
ris, maximum: & intus grana, ceu mi-  
lij, quæ Aegyptij excicant, & in panes  
cogunt. Radicem lotos hæc habet, mali  
coronei similitudine, quæ cruda coctâ-  
que manditur: decoctâque lutei oui  
qualitatem exhibet.

L O T U S AEGYPTI historiam de Loto Aegypto  
posterioris memorie tradidit Theophrastus  
lib. l i i . cap. x . de plantarum historia; cuius  
hic verba referam. Qui Lotus, inquit, vocatur,  
planis parte maxima prouenit, cum rura  
inundantur. Huic natura caulis similis fabæ,  
& fructus eodem modo, verum minores, gra-  
uioresq; nascitur fructus in capite, modo quo  
in faba: flos candidus, liliis foliorum angustia  
proximus: mulei, ac densi promiscui exunt.  
Sole occidente se comprimunt, caputq; integ-  
rent, ad ortum aperiantur, & super aquam  
assurgunt: idq; facit, dum caput perficiatur,  
fioresq; desiliant. Capitæ magnitudo quanta  
papauearis maximi, & percingenti incisuris non  
alio modo, quam papauearis: nisi quod in his fru-  
ctus frequentior habetur, qui milio non absi-  
milis est. In Euphrate caput, fioresq; mergi  
referunt, atq; descendere vsque in medias no-  
ctes, tantumq; abire in alium, vt ne demissa qui-  
dem manu capere sit, diuultu deinde redire,  
& ad diem magis: sole oriente iam extra vndas  
emergere, floremq; patefacere: quo patefacto  
amplius insurgere, vt planè ab aqua abistat.  
Aegyptij capita ipsa acceris putrefaciunt, cumq;  
regum

*Loti A-  
egypti hi-  
storia ex  
Theophr.*

*Generi  
lupul.*

tegumenta putruerint, in flumine lauando se-  
parant fructū, & sicantes, pinfantesq; panem  
faciunt, eoque cibo vtuntur. Radix loti Cor-  
fion appellata, rotunda est, cotonei mali ampli-  
tudine, cortice nigro, quali nux castanea tegi-  
tur. Corpus internum candidum: elixum, as-  
sumq; in Specimen albuminis vertitur, gratum  
cibus: manditur etiā crudū, sed gratus decoctū  
seu aqua, seu pruna. Hactenus de Loto Aegy-  
ptia Theophrastus. Cæterum hanc, & supra-  
dictas Loti species Serapio sua lingua Henda-  
chocha indifferenter nominat. E cuius femi-

*Arabum*  
*Henda-*  
*chocha.*

ne oleum exprimitur Mauritanis ad articulo-  
rum dolores expetitur. Neque enim sit Han-  
dachochæ oleum ex vulgaris trifolij semine,  
vt quidam aberrantes existimant, sed ex omniū  
Lotorum semine, & ex eo tantum trifolio,  
quod asphaltiten Græci vocāt. Loti Aegyptiæ *Lotus He-*  
breuter meminit Galenus inter alias lotos, li. *Egyptia ex*  
v 11. simplicium medicamentorum, sic in-  
quiens. Loti Aegyptiæ semen in panes quidem  
cogitur. Planta *αγυπτιος* Græcè, & Lotus *Nemina.*  
Aegyptia Latinè, Handachocha Arabicè, &  
Loto d'Egitto Italicè appellatur.

## MYRIOPHYLLON.



## MILLEFOLIUM. CAP. CX.

MYRIOPHYLLUM, siue millefo-  
lium, caulis est tener, singularis, vni-  
ca nixus radice: plurimis foliis, laui-  
bus, feniculo similibus, vnde nomen  
accepit. Caulis flauescit, varius, ac ve-  
luti ex industria deliniatus. nascitur in  
palustribus. Vulnere recentia ab in-  
flammatione vindicat, si vel viride, vel  
siccum ex aceto oblinatur: præcipita-  
tis in potu cum aqua, & sale datur.

*Myri. phyl-*  
*lis confite*  
*ratio.*

ET non desunt, qui velint Myriophyllū,  
vt superius in Serapionis millefolij commenta-  
tione diximus, esse vulgare Millefolium, quo  
omnes passim vtuntur in Italia, tamē cum hoc  
plurimis caulibus à radice proflatis, foliis con-  
ter à feniculo diuersis, nascaturq; in pratis &  
incultis, non autē in paludibus, hinc facti per-  
spicuum fieri putō, hos qui ita sentiunt, in er-  
rore versari. Equidem legitimum Myriophyl-  
lum me inuenisse, & sæpe vidisse crediderim  
in vallis Anconie palustribus, vnicō tantū caule,  
innumeris foliolis referto, capillaceis feniculi  
modo, odore non ingrato. Huius plantæ hic  
picturam datus, aliamq; appropinquamus ad nos  
Pisum missam ab eruditissimo viro Luca Ghino.

## MYRIOPHYLLON ALIYD.



Myriophylli vires paucis perstrinxit Galen. lib. *Myria-*  
v 11. simplicium medicament. sic inquiens. *phyllo Gi-*  
Myriophyllum vsque adeo deficcatorix est fa- *ret ex Gal.*  
cultatis, vt vulnera glutinet. Quod Greci *μυριόφυλλον*, Latini item Myriophyllum, & Mil-  
lefolium aquaticum vocant: Itali, Miriophillo. *Nemina.*

## MYRRHIS. CAP. CXI.



MYRRHIS si-  
millima est ci-  
cura, caule, fo-  
liisq; radix ei  
oblonga, mol-  
lis, rotunda, o-  
dorata, cibonō  
insuavis. Quæ  
potā in vino,  
phalangiorum  
morsibus au-  
uiliatur: cit me-  
stura, & partus  
secundos, pur-  
gatq; à puerperio scēminas: subuenit  
& phthysicis cocta in sorbitione. Aiunt  
quoque

quoque eandem bis die terve pota ex vino, in pestilentia salutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, obflare.

*Myrrhida  
dis cicutae  
radix.*

**GIGNITUR** in quā plurimis Italiae locis planta quaedā cicutae faciem representans, minor tamen, minaque graetolens. Cicutaria nonnullis vocata, quam quidam censent legitimam esse Myrrhim. Sunt deinde, qui pro Myrrhida Angelicam vulgō appellatam accipiant. Alij verō, vt Menardus, illud oleris genus intel ligunt, quod Charesolius vocant. Veruntamen hoc, meo iudicio, nullis notis Myrrhida refert, sicuti nec illa tamen si huius radix à recentioribus in pestilentia miris laudibus commendetur. Quod autem Angelica non sit Myrrhis, ex eo euidentissimum esse arbitror, quod ei folia sint sativae pastinacae similia, non quidē multifida, veluti cicutae. Ceterū si Myrrhis in Italia pro ueniat, nulla sanē mihi haecenus sese obtulit planta, quae magis illi respondeat, quā hāc, cuius hic effigiem pictam exhibemus, quae quidem longe ab Angelica differt. Sed quoniam

*Angelica  
hirsuta,  
et virens.*



mentio incidit, ne tam praestantissimam plantā silentio praeceamus, hic iussus de ea nobis differendū est. Haec itaque planta cubitale excedit altitudinem, caule cerniculo, inani, multis alarū cauis referto: folia pro fert oblonga, per ambitum serrata, in nigrā virescen tia: flores albos, in umbellam cohaerentes: quibus semen prodit tenue, lentū modo compressum. Radix ei subell crassa raphani modo, quae in plures diuiscitur ramos, gustu acris, & suauiter odorata. Excalfacit, pariterque desiccāt ordine secundo completo, aut tertio incipiente. Proinde aperit, attenuat, & discutit. Venenis misericē aduersatur: quare pestilentiam arceat hausta, aut frequenter commansa. Ipsa per se sumpta piuitosos, lentosque humores digerit. Idem praestat & radice decoctum. quod etiam celeriter ex frigore tussientibus auxiliatur: expectorāt enim efficaciter crassam, lentamque pituitam. Sanantur eodem ex aqua, aut vino interna viscerum vlcera, concretusque sanguis dissoluitur, & roboratur ventriculus. Radix in puluerem trita animi deliquis, & ceteris cordis affectibus opem vnicē praestat. Valet ad rabioforum, & venenosorum morsus, exterius cum ruta imposita, & intro in corpus assum-

pta. Hinc sit, vt recentiores quidam magna opinione hanc suā inferant antidotis. Myrrhidi iam suas eddamus vires ex Galeno, qui eius libro v. i. i. simplicium medicamentorum, his verbis describit. Myrrhis, quidam myrrham nominant. Radicem habet odoris iucundi, & dulcem, quae menses mouet, & ea quae in thorace, ac pulmone sunt, expurgat. Itaque ex secundo ordine fuerit excalfacientium, ad iuncta quadam partium tenuitate. *Myrris ita Graecis, Myrrhis quoque Latinis dicitur: Italis, Mirrhida.*

*Myrrhis  
dis virens  
ex Gale.*

*Nomina.*

# MYAGRUM. CAP. CXII.

**MYAGRUM**, aliqui melampyrum vocant, herba est succulacea: foliis rubris, pallidis, tripedanea: semen oleosum, foeno graeco simile. Quod contusum igni torret, perunctisque virgibus ad lucernarum lumina vtuntur. Hoc pingui, scabritias corporis laxigare, atque expoliri constat.

**SCRIBIT** Ruellius, Myagrū frequētissimum nasci in Gallia, eiusque semine agros bene subactos perinde quasi napsi feri: quin & suae spontis inter segetes inueniri. Ex semine autem oleum exprimi ait, quo non ad lumina tantum lucernarum, sed ad ciborum quoque condimenta pauperes vtuntur. Addit id à suis Cameliam, aut Camaminam vocari. Sed ipse non equidem Ruellio ausim subscribere: quod quidē non pudeat fateri me haecenus Myagrū non vidisse in Italia, quod Dioscoridis delineationi respondeat. Ceterū eos haud dubiū falli credide: im, qui putant, vulgare illud aurei coloris semen, quod aliqui Drodā, Drodellam aliq, nonnulli verō Dorellā dicunt, legitimum referre Myagrū. Siquidem hoc foliis rubriam non emulatur, sed lysuestrem erescit, vt quae laciniata spectentur: nec semen proferit foeno graeco simile, sed papaueris modo exile. Myagri semen, vt testatur reliquit Galenus libro v. i. i. simplicium medicamentorum, pingue est. Quare si tundatur, oleosum quid effundit, quod emplasticum vim obtinet. Herba, quae Graecis *μύαγρον*, Latinis pariter Myagrū appellatur: Italis, Miagro.

*Myagri  
hirsuti  
radix.*

*Quorū  
da error.*

*Myagri  
ferti et  
Galeni.*

*Nomina.*

# ONAGRA. CAP. CXIII.

**ONAGRA**, siue onothera, aut onuris frutex est arboris instar, praegrans, amygdalino folio, sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, magnoradice candida, longa, cū siccata est, vniū olente

olente nascitur in montibus. Aqua, in qua radix maduerit, in potu data, feras mitigat, & cirures facit: illitu quoque tetra ulcera mulcet.

*Onagra* *consideratio.* TAMETSI memorie prodiderit Theophrastus lib. i. x. cap. xxi. de plantarum historia, Oenotheræ radicem è vino potam mitiores, hilarioresq; mores conciliare, nullum tamen, qui eam mihi offederet, hæcenus licuit reperire, quanvis ad mitigandam omnium animalium feritatem, ne dum hominum quorundam, esset optimum, vtilissimūq; remedium. Cæterum ad me scripsit clarissimus medicus Lucas Ghinus Forocornelliensis, sepius ex Apennino in viridarium suum transfuisse plantam homine prociore: foliis amygdalæ, maioribus tamen: flore rhododendri semine perquam minuto, exilibus teretibusq; siliquis contento, molli ac cādida lanugine obuoluta: radice sabalbida, longa, subter humum repente. Quæ sine omni ex parte Onagram referre videtur, etsi ipse quoque pro certo non ausit asserere, hanc legitimam esse Onagram, cum hæcenus experientia compertum non habeat, an huius radix sicca vinum redoleat, mitigetq; feras aqua, in qua maduerit, pota, vt Dioscorides testatur. Onagræ meminit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, vbi sic inquit. Onagron, aut onothera, aut onothuris, huius radix arefacta vinosum quiddam redolet: sed & vini maximè facultatis est. Quæ *Onagra* Græcè, Onagra item, siue Oenagra Latine dicitur.

## CIRSIVM CAP. CXIII.



CIRSIVM, cauliseft tener, duorum cubitorum, triangulo similis: ab imo foliola, rofe speciem referentia: anguli spinosi, per intervalla molles: folia buglosio similia, longiora, subcandida, modicè hirsuta, parti-

bus extremis aculeata: cacumen caulis orbiculatum, hispidum: in quo capitula in summo purpurea, quæ solvantur in lanugines. Radicem huius loco laboranti ad alligatam, dolores varicum sedare Andreas scripsit.

CREDIDERE recentiores quàm plurimi rei herbarie periti, nil aliud esse Cirsium, quàm vulgare Euglossum. Sed mihi planè hæc sententia, pace eorum dixerim, refellenda potius, quàm probanda videtur: quòd Buglossio caulis triangulus non inest, sed rotundus: quòd ab imo foliola per ambitum aculeata rose speciem non referant, sed longa, & continua prædeant: quòd denique Buglossio flores nõ euascent in pappos, sed lanuescentes integri decidunt, relicti in folliculis camine. Plantam, quàm proculdubio Cirsium referre putamus, nuper Pisis ad me misit clarissimus medicus Lucas Ghinus, cuius etiam hic figuram damus. Nascitur, vt ipse scribit, in vliginosis locis. Ea, meo quidem iudicio, Cirsio maximè ad stipularem deprehenditur. Cirsij nusquam, quod legerim, meminerunt in simplicium censu Galenus, & Paulus. Id æquè *κίρσιον* Græca voce, atque Latina Cirsium appellatur.

## ASTER ATTICVS. CAP. CXV.



ASTER Atticus cauliculus ignosus, florem in cacumine habens purpureum leuè, per ambitum diuisum, anthemidis modo, capitulum, foliis stellæ modo radiatis: quæ autem caulem ambiunt folia,

oblonga sunt, ac hirsuta. Peruenti stomacho, oculorum inflammationibus, procidit sed, ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradunt purpureum florem, si ex aqua bibatur, anginis, & pueris comitale malum sentientibus, opitulari. Inguinum inflammationi recentem illinire conuenit. Si aridus flos sinistra dolentis manu decerpatur, & inguinibus adligetur, dolore liberat.

ASTER Atticus, qui & Eubonion, hoc est nostris Inguinalis, dicitur, sibi Attici nomen assignat, quòd in Atheniensis agro frequenter, quàm alibi proveniat. Eubonion verò, & Inguinalis dicta est herba, quòd Eubonion, siue inguinum præcipuum fit remedium. Asteris porro appellatur

lationem accepit, quoniam eius capitula, in quibus flores chamæmali instar emicant, per ambitum diuisa foliis stellæ modo radiata spectantur. Planta est hodie non paucis cognita. Nasceitur in asperis, incultis, & conuallibus.

*Serapio.* Hanc Serapio (vt libro tertio in eryngij mentione prodidimus) cum Eringio confudisse apprehendit, eorum similitudine falsus, qui in utraque planta stellæ figuram præ se ferunt. Cæterum non est prætereundum, quod nonnulli Dioscoridis codices reperiuntur, in quibus hoc capite plura leguntur, quam supra sint reddita. quæ quoniam a doctissimis viris Dioscoridi accreuisse cõperta sunt, ideo nos quoque ea, utpote adiecta omisimus. Quod autè adiecta sint, testimonio esse possunt Galenus, Oribasius, Paulus, & Serapio, in quorum libris illa, quæ redundant, nusquam leguntur, ceteri reliqua, vt solent, bona fide referant. In cuiusdam tamen Apuleij libello de plantarum historia & viribus scripto, nonnulla habentur capite de Aspere Attico, quæ inde facile, quod ferè eadem esse videantur, huc adiecta sunt: sic enim verba illa sonant. Stellarum radij noctibus colucent: quare qui naturam stirpis ignorat, inane simulacrum se videre putant. Reperitur à pastoribus pecudum. Altera Atticum à Virgilio quoque celebratum fuisse existimo libr. 1111. Georgicorum, ubi Amellum, quem florem ita ibi agricolis vocari ait, herbamq; eius descripsit. Id quod vix luculentissimis carminibus apertè testatum reliquit, dum ita cecinit.

Est etiam flos in pratis, cui nomen Amello  
Fecere agricolæ, facilis quærensque herba:  
Nanq; vno ingente tollit de cespite sylvam.  
Aureus ipse, sed in foliis, quæ plurima circum

Funduntur, violæ subluet purpura nigræ.  
Sæpe deum nexis ornate torquibus aræ  
Asper in ore sapor: tonsis in vallibus illum  
Pastores, & curua legunt prope flumina Mellæ.

*Asteris at  
tici Serapio  
ex Gal.* Asteris Attici recens herba (vt Crateus tradidit) cum axungie fenio tusa rabiosi canis morbis vtiliter imponitur. Turgentia guttura discutit, & incensa serpentes fugat. Huius meminit Galenus libr. 1. simplicium medicamentorum, ubi eius vires ornate his verbis. Aster Atticus, alij bubonium vocant, non ob id tantum quod illatum, sed etiam quod suspensum bubonas sanare creditur. Habet quiddam etiam digerens, habet verò nõ minimè & refrigerans quiddam, ac reprimens, adeo vt mixta sit facultas, vti rosæ: verum id non adstringit. hæc Galenus Galenus. Sed quoniam Attica stellæ mihi in mentem redegit Stellarium recentioribus vulgò vocatum, cum & ipsa viribus non vulgaribus sic prædicta, eam minime silencio dissimulandum duximus. Est igitur STELLARIA, quam alij Pedem leonis, alij Alchimillam vocant, planta, quæ vt plurimum in montibus provenit, præsertim in pratis, foliis malæ ferme

## STELLARIA.



similibus, durioribus tamen, & crispioribus, angulis octo distinctis, prominentioribus, & per ambitum serratis, adeo vt latius aperta stellæ formam referant. Caulis ciliatus, semicubitalis, a quo plures exeunt ramuli, in quorum summo flores emicant subpallidi, tenues, stellarum effigie. Radice nititur, quæ crassitudine digiti æquat, & longitudine palmum

excedit. Erumpit hæc Maio mense, Ianio verò floret. Efficax est pota sanandis non solum internis viscerum vulneribus, sed & sinusvis viceribus: quinetiam extrinseca vulnera glutinat. Expositur Germanis chirurgicis, mirisq; laudibus celebratur: quippe qui eam felici succellu vulneraris potionibus admisceant. Aride pulvis in sui ipsius decocto, aut cum aqua eius stillaricia sumptus, enterocolicis medetur. Datur idem pulvis ex vino, aut iure cochlearis mensura, quindecim aut viginti diebus, mulieribus, quibus adempta sit concipiendi facultas: a nimia vteri humiditate, quæ iniectum semen contineri prohibet. Stillaticia eius aqua epota, tum etiam in vuluam indita, alba mulierum profluuium mirifice sistit: adeo vt eius quoq; diutina iniectione corruptæ ab incorruptis vix dignoscere possint, restrictis mirum in modum feminæ locis: quod tum celerius, tum efficacius præstatur, si in eius decocto insidant. Quin & laxas procidentessq; mulierum mammas contrahit, & duras solidasq; efficit, si lineæ in eius decocto, aut stillaricia aqua iniectione mammis sapienter imponantur, diutiusq; importentur, præsertim hypochondiæ, equifero, stypteria, siccisq; rosis admixtis. Planta, quæ Græcis *ἄστρον* & Latinis item Aster Atticus nominatur: Arabibus, Aslaratnon: Italiis, Aster attico: Germanis, Sternkraut, Gallis, Aspergoutte mineur.

## ISOPIRON CAP. CXVI.

ISOPIRON aliqui phasiolon ob similitudinem vocant, quoniam folium, quod est aniso simile, in pampinis torquetur: capitula sunt in summo caule, tenuia, plena seminis, melanthij gustum imitantis. Contra tussim, & cætera peccatoris vitia, semen ex aqua malsa bibitur: hepaticis, & sanguinem excreantibus vtile.



HACTENUS, ut ingenue fatear, mihi non contigit verum Iſopyrum inuenire, neque ab aliquo compertum videre. non tamen negauerim, quin illud nascatur in Italia. Quare si hac nostra ætate nobis non sese offerret, id po-

steris inquirendum relinqueremus, qui fortasse diligentius in hæc studia incumbens, ut earum rerum, quæ nos latent, aliquando exactam cognitionem assequatur. Quod Græci *ισόπυρον*, *Nemica*. Latini etiam Iſopyrum vocant.

VIOLA PURPUREA.

VIOLA PURPUREA.  
CAP. CXVII.

VIOLA purpurea folium habet hereda minus, tenuius, ac nigrius, nec multò dissimile: cauliculus à radice medius prodit, in quo strobilus suauissimè olens, purpureus. opacis, & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se, & ex polenta illinuntur aptissimè stomacho æstuanti, & oculorum inflammationibus, sedique procedenti,

*Viola pur-  
purea chyl-  
deratio.*

SUNT in Violarum genere non modò purpureæ, sed etiam candidæ, frigidis & viginosis locis nascentes, prorsus tamen in odore, de quibus nihil, quod extet, memoriæ prodidit Dioscorides. Hæ numerosæ proueniunt in Ananienſi agro supra Tridentum, ubi mense Aprili adeo copiosè florent, ut si longè prospiciantur, oculos fallant, & extensa lineæ videantur. Alij præterea flores per æstatem Maio, & Iunio mēſibus videntur superne purpurei, in medio candidi, inferius verò lutei, forma purpureas violas referentes, aspectu gratissimo, cum tamen nullo & ipsi commendentur odore. Prodeunt hi ex quadam planta, cui primo exoritur folia insunt rotunda, per ambitum ferrata, quæ tamen per incrementum in longitudinem desciscunt. Constat hæc caulibus triangularibus, quadantenus striatis, & inus concavis, quibus paribus intervalis genicula supereminent, è quorum

IACEA.



concauo ransusculi exoriuntur, quibus flores dependent. Vocant hanc nonnulli IACEAM.

<sup>30</sup> Verùm an hæc illa sit Iacea, quam ad intestinorum rames magnificenti recentiorum quiddam, nondum satis compertum habeo. Quamquam non desunt, qui affirmant, hanc esse de qua modò sermo est, eamq; sympathici facultatibus pollere, quemadmodum etiam sunt, qui eandem ægrè spirantibus, & pulmonum inflammationibus, non obscure opem ferre tradant: quin & scabiem sanare, & cætera cutis vitia delere. Violarum purpurearum facultates exquisitè <sup>40</sup> descripsit Mesues inter simplicia soluentia, unde hæc decerpſimus. Viola temperatam, conueniensq; sunt medicamentum, quo immutatur malæ humorum qualitates, & natura eorū soluitur. Præferuntur quæ primo vere florent, solis ardorē, qui vim resoluit, minimè expertæ, nec imbris dilutæ. Violæ refrigerant, & humectant ordine primo, cum tamen sicæ minus refrigerent, & minus humectent. Recentibus quædam inest humiditas, quæ obtrundit caliditatem, à qua potior est vis. Quapropter sicæa humiditate, quæ in superficie continetur, gustu amaritudo deprehenditur, quæ à calido prouenit, qui prius sub humido delitescēbat. Quo fit, ut exiccatæ magis calidæ, minusq; humidæ habeantur. Humiditas, quæ superflua recentibus inest, aluum enolliendo citet: verùm arefactæ, deiectioniæ sunt facultatis, non quòd emolliant, sed quòd dissoluant. Violæ in summa soperieræ sunt, refrigerant, calidos dolores mulcent, inflammationes extinguunt, leniunt, & solvunt. Earum succus, & syrupus ex eo factus ventrem leniunt. Macerantur in aceto, quòd valentius

acea.

*Violarum  
Sires ex  
Mesue.*

ardentissimis conferant febribus. Fit ex violis oleum, iis in eo diutius maceratis: ceteris tamen præstat, quod ex immaturis oliuis, aut ex dulcibus amygdalis exprimitur. Viola bilem educunt, eiusque feruorem mitigant. Conferunt capitis doloribus, quos caliditas excitaueit: forum conciliant: pectoris, & asperæ arteriæ scabritiem leniunt: medenturque anginis, & colicæ vitis: præcipuo autem auxilio sunt pectoris, & lateris inflammationibus: strimque arcent. At quæ sicca sunt, iecoris obstructions referant, inflammationes discutunt, & morbo regio laborantibus opitulantur. Hactenus de violis Mesues. Parant hæc ætate à violarum recentium diluto, quo pluries violæ fuerint macerate, defectorium Syrupum, quemadmodum & ex rosæ rosaceum, quo disciendæ alui gratia recentiores medici in pleuritide vtitur, vncias quatuor, vel quinas exhibentes. Violarum vires tradidit Galenus libro v. t. simplicium medicamentorum, sic inquit. Viola folia aqueam & subfrigida substantiam saperantem possident: proinde tum per se, tum cum polenta illita calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori ventriculi æstuanti, & oculis. hæc Galenus. Ex quibus abunde palam est non noisse Galenum, sicuti & cæteros veteres, Violas defectoria facultate citra noxam præditas esse.

Viola nigra, & viola purpurea sic Latinis dicta, Græcis, *ὑπὸ μαύρη*, & *ὑπὸ πορφυρεῖ* vocatur: Arabibus, Senefthgi, Sonofrig, siue Benefefegi: Italis, Viola porporea, & Viola mammola: Germanis, Merzen violen: Hispanis, Violeta: Galis, Violettes, de Mars.

## CACALIA. CAP. CXVIII.

CACALIA, quæ leontica vocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, rectus, albus: florem ferens robori, aut oleæ similem nascitur in montibus. Radix in vino madefacta, vt tragacantha, delinctu aut manducatu per se tussibus, scabritiis arteria medetur. Grana, quæ post excussum florem innascuntur, trita & cum cerato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

Cacalia  
fiduciosa.

CACALIA, Plinio libro xxv. cap. xi. auctore, vocatur semen margaritis minutis simile, dependens inter folia grandia, in montibus ferè, ita Plinius: Sed non propterea mihi hactenus contigit Cacaliam reperire in Italia, etsi eam diu quæserim in montibus. Ceterum herbam Cacalia Emilem testatur se pluries vidisse in Apennini Alpibus Lucas Ghinus Forocornelienfis medicus rei herbariæ diligentissimus inquisitor, folio ruffilaginis, maiore tamè,

aucta parte candidiore, minusque per ambitum anguloso: caule palmi altitudine, recto, subcandido: in cuius cacumine flores exeunt paniculæ faciem referentes, muscosi, oliæ instar. Hanc ipsæ Cacaliam suspicatur. Equidem huius viri iudicio facile auiam subscribere, quod is in simplicium cognitione diligenter versatus sit, atque inter Italos in ea maxime præstat.

Cacalia  
vires ex  
Galeno.

Cacaliam cancanon vocauit Galenus lib. v. t. t. simplicium medicamentorum, ubi eius vires reddidit his verbis. Cancan radix facultatem habet mordacitatis expertem, & modicè excitantem: essentiam crassam, & emplasticam. Quapropter macerata vino, sicut tragacantha, & linctæ arteriæ asperitates sanat: nec minus, si quis eam cõmandat. Succus eius defluens prodest arteriæ, similiter vt glycyrrhiza. *Kauachia* ita Græcè, vt etiam Cacalia Latine dicitur.

Napam.

## BVNIYM. CAP. CXIX.

BVNIYM caulem edit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine: in quo ramuli minutis foliis, ac floribus scatent: folia proximè radicem, apio similia, longè tenuiora, coriandrinis proxima: flores anethi: semen odoratum, hyoscyamo minus. Vrinam ciet, exalfacit, secundas euocat: lieni, vesicæ, renibus vtile. Tam humidi, quàm sicci, expressique succi caulibus, foliis, radicibusque, vsus inualuit ex aqua mulsa.

## PSEYDOBVNIYM. CAP. CXX.

PSEYDOBVNIYM palmi altitudine fruticat in Creta, folia, ramulosque napi ferens, acri gustu. Tormina, atque stranguriam, laterumque dolores sanant quaterni rami eius poti in aqua: illiti quoque cum sale, & vino tepentes, strumas discutunt.

BVNIYM, quod nostri Napam syuestrem vocant, Plinius videtur posteritatis memoriam prodidisse libro xx. cap. 1111. ubi de nipsis ita scriptum reliquit. Naporum duci differentias & in medicina Græci seruant. Angulosi foliorum caulibus florentis, & quod Lunton vocant, purgationibus seminarum, & vesicæ,

& vrinæ vtile decoctum, potum ex aqua mulsa, vel sicci drachma. Semen dysentericis costum, triumque in aqua calida è cyathis quatuor: si d vrinam inhibet, si non lini semen vnâ bibatur. Alterum genus Baniada appellant, & raphano, & rapo simile. Semin' præclari contra venenarum ob id & in anticor' videntur libo. hæc Plinius. Ex cuius sanè verbis palam fieri arbitror, eam

eam nobis plantam esse Bunium, quæ Napum syluestrem rura in Hetruria appellatur. Nasctur hæc inculto solo, frigido præcipue tractu. Verum Pseudobunium, quod Græci vocant, nondum mihi in Italia comperitum est. Quod nulli mirum videri debet: nam quod planta hæc fructet in Creta, vt Dioscorides testatur, videtur potius Cretensium propria, quam aliarum gentium. Bunium, vt Plinius tradit, antidotis admiscetur: quare & in ipsa Andromachtheriaca Bunium expetitur. Veriusque vires sanæ paucis tradidit Galenus libro v. i. simplicium medicamentorum, sic iniquias. Bunium, alij arcticon, adeo exsiccatur, vt & vinum moueat, & mensis prouocet. Sed & Pseudobunium adsimilis illi caliditatis est. Quod Græci *βουνιον*, Latini similiter Bunium vocant: Itali, Nauone saluatico. Quod verò illi *βουνιον*, hi Pseudobunium, & Bunio falso.

Bunij  
res ex Ga  
leno.

Nomina.

mam pugnare deprehendantur. His etiam accedit, quod Chamæcisos (si Plinio credimus libro x. x. i. i. i. capite x. v.) spicata est tritici modò: & cum floret, exilimari potest alba viola. Ruellius hanc in Gallia nasci scribit. Sed eam aliam esse à Chamæcisso hic representato perspicuum est: ea enim, quæ Plinius refert, a Dioscoride dissentient, quem nullam spicatum mentionem fecisse constat. Equidem, vt ingenue fatear, nullam hæcenus in Italia heritum comperi, quam legitimam esse Chamæcisum ausum affirmare. De viribus Chamæcisii breuiter differuit Galenus libro v. i. i. i. simplicium medicamentorum, vbi sic inquit. Chamæcisii flos, cum sit admodum amarus, secur obstructione liberat. Sunt & qui ischiadici ipsam exhibeant. Hæc planta vt Græcis *χαμαίκευς*, ita etiam Latinis Chamæcisus nuncupatur.

10

Chama  
cisii vires  
ex Galen.

Nomina.

20

CHAMÆCISVS.

CHAMÆLEVCE.

CAPVT CXXI.

CAPVT CXXII.

CHAMÆCISVS folio est hederæ, tenuiore, longiore: ramulis à radice quinis senisve, dodrantalibus, foliosis: flore violæ albæ simili, candidiore, ac<sup>30</sup> tenuiore, gustu supra modum amaro: radice tenui, candida, inutili. nascitur in cultis. Bibunt conuenientissimè ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tribus, tricenis, quadragenisve diebus: eodem pota modo, senis aut septenis diebus, regium morbum purgant.

Chama  
cisii consi  
deratio.

CREDIDIT Leonardus Fuchsius, medicus ætatis nostræ celebris, in suo de stirpium historia commentario, nihil differre Chamæcisum ab ea vulgaris notitiæ planta, quàm, vt superius libro tertio in Asclepiadis mentione diximus, herbariorum vulgus Hederam terrestrem nominat. Sed cur eius sententiam comprobem, finè non habeo. Siquidem vulgaris hederæ terrestris folio constat rotundo, quadratenus serrato: caulibus, vel potius funiculis vitiisum modo longis, humi longo tractu repentibus. Chamæcisus verò Dioscoridi foliis est hederæ, tenuioribus, longioribus: ramulis à radice quinis senisve, dodrantalibus, foliosisque. Adde quod Chamæcisii flores violæ albæ similes facit Dioscorides, ac etiam candidiores. Sed terrestris Hederæ florem profert pusillum, in candido purpurascensem. Quibus vtique rationibus ducor, vt putem, hanc herbam non esse Chamæcisum, quod notis inter se pluri-

CHAMÆLEVCE lumborum doloribus propitia est. herba vires, incuruis foliis, furculisque: flore rosaceo.

SANE quàm paucis Chamæleuces historiam perscrinxit Dioscorides, quare difficillimè quidem decerni potest, quænam in vniuersis plantarum genere Chamæleuce referat. Cæterum hic silentio non dissimulandum puto, quod non desunt codices (vt Marcellus & Ruellius Dioscoridis interpretes aiunt) in quibus non *χαμαίκευς*, sed *χαμαίλευς* legitur. Alteram quidem sectionem nos quoque magis probamus, tum quòd in notis Dioscoridis nomenclaturis Chamæleuce nil aliud sit quàm tusilago, quemadmodum & apud Pannium libro x. x. i. i. i. capite x. v. vbi eam Farranum sive Farfugium vocari tradit: tum etiam quòd eodem loco Plinius idem ferè scripserit de chamæpeuce, quod de chamæleuce in hoc capite scriptum reperitur. Quod haud dubiè ostendit, huius capitis initio mendum subesse. Et certè facilis ac lubricus potuit esse librorum lapsus, vt qui vnus tantum literæ mutatione *χαμαίλευς* pro *χαμαίκευς* scripserint. Porro Plinius chamæpeucen foliis laticis similem reddidit, mihi tamen ea videtur potius piceæ foliis assimilanda, si in composito plantæ nomine voium rectè posterioris vocis significatum spectare: nam piceæ *πύκνῃ*, larix verò *λάγῃ* nem Græcè dicitur. Chamæleuce, vt author est Galenus libro v. i. i. i. simplicium medicamentorum, calidè est facultatis tertio quodammodo ordine, secus primo. Ea Græcè *χαμαίλευς*, Latine item Chamæleuce, & Chamæpeuce vocatur.

Chama  
leuces can  
siteratio.

Chama  
leuces vi  
res ex Ga  
leno.  
Nomina.

BYGLOSSVM, BORRAGO.

BYGLOSSVM VVLGARE.



BYGLOSSVM, LINGVA RVBYIA.

CAPVT CXXIII.

BYGLOSSVM nascitur in campestribus, & fabulosis. Iulio mense colligitur. Aiunt eam, quæ tres thyrsos emittit, cum semine, & radice tritam, potamq; 30 contra tertianis horrores prodesse: quæ quatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur. Herbam absceßibus vtilem esse volunt. Verbasco simile est, sed in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitans linguas. Quod in vinum deiectum, animi voluptates auget.

Bugl. si  
considera-  
tur.

Qui diligenter Buglosi historiam expendunt, omnes herbam Borriginem vulgò vocatam, in horribilibus locis nascentem, potius legitimum esse Byglossum censeant, quam illam, quæ Buglosi vulgò nominatur, cuius in officinis communis est usus. Quorum equidem iudicio non dubitauerim subscribere, siquidem Borrigo dicta foliis est in vniuersum verbasco similis, nigrioris tamen, & asperioribus: quibus etiam hæc symphytum alterum amulatur, quod folia buglosi proxima terre superius prodit: Dioscorides. Adde præterea, quod folia Borriginis in terram procumbunt, & bubulas linguas tum forma, tum asperitate imitantur. Contra quæ Buglosi nomen sibi falsè vendicant, folia habet longa, echio similia, non vsque adeò lata, ut bubulas referant linguas, minime humi depressa, quæ potius è toto ferme cespite sursum aspiciunt, nec aliqua ex parte verbascum, aut symphytum alterum representant. Non ob id tamen negare ausimur, quin vulgare Buglossum in campestribus nascentem cum Borragine polleat viribus: quando-

quidem eadem vtriusque asperitas, idemque sapor gustui manifestum præbeat eiusdem facultatis indicium. Atque facie non multum dissidere ea inuenias, si illud genus species, quod hodie in hortis feritur ex Hispaniis allatum: hoc enim et si verbasceum adeò ad amussim non repræsentet, quemadmodum Borrigo, foliorum tamen effigie bubulas linguas maximè imitatur. Sed quoquomodo hæc se res habeat, concedam facillè Borriginem, & vulgarem Buglossum & specie, & forma inter se differere: tamen crediderim alteram ad alterius vires proximè accedere, & si non eadem vtriusque, similissimas tamen inesse. Ceterum non desunt, qui his rationibus neglectis asserant vulgare Buglossum Iclij omnino genus esse, quod illud omnibus notis referre putent. Alij verò sunt, qui idem 40 Buglossum Cirsium exstimaunt. Verum nos ad id à vulgari Buglosso & echium, & cirsium esse censemus, ut absde suis locis docuimus. Quod insuper Borrigo facile sit legitimum Buglossum, Auicenna testimonio comprobari potest, qui lib. 11. sui canonis ita scribit. Lingua bouis est herba laca, habens folia sicut a mari, & ad tactum aspera, & rami eius asperi, sicut pedes locustarum. Oportet autem, ut illa administretur quæ est in Corascentia, & assa habens folia, super quorum faciem sunt puncta; quæ sunt radices spinarum, & pilorum exentium ab ea. Quibus notis adeò euidenter nostram Borriginem expressit Auicenna, ut nemo non intelligat, hanc esse Linguam bubalam. Eam præter morem descripsit Auicenna, quod suo quoque tempore non desissent, qui veri Buglosi loco aliam quandam substituerent plantam, ut aperte eius verba declarant, tum subdit. Quæ autem in hac terra reperitur, & qua vniuersi medici, plurimum eius est genus almaru, & non est lingua bouis, & neque confert, ut inueniuntur illius est. hæc tamen Auicenna. His omnibus illud denique accedit, quod apud Apuleium in eo libello, qui de

Bugl. si  
d. scriptis  
Auicenna

qui de herbarum medicaminibus inscribitur, inuenio Buglossum Lucanis Corraginem nuncupari prioris tantum literæ mutatione, quod cordis affectibusquam maxime opituletur. Quæ sane omnia, nisi fallor, clarissime ostendunt, Borraginem esse verum ac legitimum Buglossum. De cuius viribus differens Galenus libro v. it. simplicium medicamentorum, sic inquit. Buglossum humidæ calidæque temperiei est. Itaque vix iniectum, latitæ ac hilaritatis causa esse creditum est. Sed & his, qui ob fauicem asperitatem tussunt, coctum in melicrato conuenit. Herba, quæ Græcis *Βουγλωσσον*, Latinis item Buglossum & Lingua Bubula nominatur: Arabibus, *Lisn alchaur*, seu *Lefan alchaur*: Italis, *Borragine*: Germanis, *Burrettsch*: Hispanis, *Borraia*, & *Borraienes*: Gallis, *Borrache*.

*Buglossi  
Sunt ex:  
Galeno.*

*Nomina.*

CYNOGLOSSUM.

CAP. CXXIII.



CYNOGLOSSUM folia latifolia plâtaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa: caule vacat, & humi sternitur. prouenit in sabuletis. Folia cum suillo adipe veteri, medentur morfibz canum, alopeciiis, & ambustis. Emollit alium, decoctum herbæ ex vino potû.

*Cynoglossi  
consider.*

LEGITIMUM Cynoglossum, quod, Dioscoride teste, neque caulem, neque flores, neque semen pignit, pluries non modo vidimus, sed etiam legimus Romæ post Adriani molem in fabulosis quibusdam locis enatum. Hoc à vulgari Cynoglossi, quo passim officinæ vtuntur, perquam longè distat: quippe quod in radiantibus solis morem folia fert, suppinguia, tenui lanugine albicantia, humi strata, & caule perpetuo viduum est. Illa verò planta, quæ Cynoglossi vsum omnibus præstat, plurimos emittit caules, cubito sæpius longiores, adnatis in cæmine ramis: quibus flores insunt purpurei, echio similes: e quibus deinde quedam paræ prodeunt lappæ, non sine magno naturæ artificio factæ, quæ contactu velibus pertinaciter adherent. Meminit Cynoglossi Plinius libro x x v. cap. vii. his verbis. Iungitur & Cy-

noglossos caninas imitans linguas, topiariis operibus gratissima. Aiuatque quæ tres thyrsos feminis emittat, eius radicem potam ex aqua ad tertianâ prodesset: quæ quatuor, ad quartanas.

CYNOGLOSSUM  
VVLG.



humi sternitur. vt hinc aperitissime constat, hæc operi topiario, vt aliquid conueniat vel contexat, prorsus ineptam esse. Adde quod Dioscoridi Cynoglossum medetur canum morfibz, alopeciiis, & ambustis: quin etiam alium emollit Plinio autem ad tertianas tantum, & quartanas prodest. Id quod de Buglossi intelligitur, vt superiori capite testatur Dioscorides. Hinc itaque palam fieri arbitror, Buglossi historiam, & vires cum Cynoglossi turpiter confudisse Plinium. Cuius certe lapsus non animaduertunt recentiorum nonnulli, qui Plinij auctoritate freti contra Dioscoridis grauem sententiâ probare contendunt, Cynoglossum caules, flores, & semen proferre. Quod autem secundo loco à Plinio describitur, lappas minutas ferens, nil aliud, meo quidem iudicio, fuerit, quam vulgare Cynoglossum omnibus notum. Quo fit, vt oimino errasse existimem Ruellium, & Fuchium viros aliquo doctissimos: quippe qui crediderint, vulgare Cynoglossum esse Lycoplin, vt etiam supra suo loco monuimus. neque enim hos animaduertisse video de hac cum alio Cynoglossi scripisse Plinium, ac deinde speciatim de Lycopli lib. x x v. cap. x i. Cynoglossi in libris de simplicium medicamentis nufquam reperio neminis Galenum. Id Græcis *Βουγλωσσον*, Latinis Cynoglossum & Lingua canina vocatur: Italis, Cinoglossi.

*Plinij  
suo.*

*Ruell. &  
Fuch. er-  
ror.*

*Nomina.*

PHYTEUMA. CAP. CXXV

PHYTEUMA folia habet strutij, minorâ copiosum semen, perforatum: radice parua, tenuem, per summa terræ nitentē. Quam ad amatoria cōuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

CVM

CVM sit vſus Phyſtematis ad amatoria duntaxat, exemplo Plinii ductus, plura hic de eo referre ſuperuacui habeo: præſertim quòd nulli rei herbariæ ſtudioſo id hodie comper- tum eſt ſciam. Mihi quidè hæcenus herba hæc incomperata eſt. Quare eam reliquimus in hor- tis Veneris, quos ipſa ad delicias & amatoria tantum colit, donec quis Deo chariſſimus hanc herbam edoctus, eam nobis quoque in- dicare poſſit. Huius, tanquam ſuperuacue, & inutilis herbe, Galenus & Paulus nuſquam, quod legerim, inter ſimplicia meminerunt. *ſiſtens* vt Græcè, ita etiam Phyteuma Lati- nè dicitur.

Nomen.

LEONTOPODIUM.  
CAP. CXXVI.

LEONTOPODION duum digitorum<sup>20</sup> herbula eſt, folia ferens anguſta, longi tudine ternum quaternum, & digitorum hirsuta, quæ iuxta radicè lanofiore flo- co canescunt: capitula in ſummo cau- le quaſi perforata: flores nigri: ſemen vſqueadè ſpiſſa lanugine inuolutum eſt, vt ſape fallat: radice parua cohæ- ret. Quam tradunt appenſam ad ama- toria prodeſſe, & tubercula diſcutere.

VERVM Leontopodium hæcenus non ſolùm mihi incomperum eſt, ſed aliis quoque ignotum eſſe arbitror: nullum enim inueni, qui ipſum hodie offenderet. Neque propterea hoc multum curare debent medici, cum & eo adaligato ad amatoria tantum vſa fuerit anti- quitas. Caterum hic non eſt audiendus Brun- ſellius, qui Stellariam herbam vulgò vocatam in ſuo onomaſtico Leontopodium eſſe ſcribit. Qua in re non minus hallucinatus deprehen- ditur, quam in aliis compluribus. Vocant ita *Nomen.* *montana* Græci, vt Latini quoque Lcon- topodium.

Nomen ſeſquial- terum.

HIPPOGLOSSUM.  
CAP. CXXVII.

HIPPOGLOSSON, frutex eſt folia habens ruſci tenuis figuræ, & ſpinofam comam, & in ſummo ceu lingua eſt foliis exeuntes. Capitis colore in corona ex comis impoſita minuit malagmatis radix, ſuccenſque admifcetur.

Hippogloſ- ſiſiſtens.

HIPPOGLOSSUM, quòd in foliis ve- luti prominentes linguas proferat, Biſlinguam vocat Hetruria, alij verò Fontſciam. Naſcit- ur hæc frequentiffima in Liguriæ Alpibus, Vr-

binati agro, & quibuſdam ſyluoſis montibus non longè a Goriſienſi comitatu, quâ iter eſt in Hydriam ad argenti viui fodinas, Veruntamen non eſt hæc Lau- rus Alexandrina,

## HIPPOGLOSSUM.



Hippogloſ- ſiſiſtens.

rus Alexandrina, ſed tantum ſtructurâ rotundum tilia modo longio- ri pediculo appen- ſum proſert. Hip- pogloſſum recen- tiores longè pluri- bus commendant viribus, quam fece- rint antiqui ſcriptores. nam, vt illi tradunt, in vteri affectibus magno datur iuſuamento. Quo ſit, vt ſtrangulam vulvæ laborantibus mulieri- bus radicis, aut herbe pulvis cochlearis men- ſura, ex vino, vel iure hauſtus, præſentaneo remedio opem ferat. Eſt & ad puerorum ente- rocelas præſantiſſimum medicamentum, ſi diutius diluendū hauriatur pulvis idem ſeſqui- drachmæ pondere ex maioris ſymphyti deco- cto. Verùm id ſumentibus enenit, quòd primis tantum diebus aded radicem pulſare perci- piant, vt inteſtina foras prolabi velle videan- tur: quare ſubcingulis, ſaculis, & ſibulis repri- mentibus, roborantibusq; primis diebus vti opus eſt. Quæ planta Græcis *ἵππογλωσσος*, Lati- nis ſimiliter Hippogloſſum appellatur: Italia, Biſlingua, & Bonitaciâ: Germanis, Zepffit- kraut: Hiſpanis, Lengoa de cavallo: Gallis, Lingua pagana.

Nomen.

## ANTIRRHINUM.

## CAP. CXXVIII.

ANTIRRHINON, alij anarrhinon, vocant herbam caule, & foliis anagalli ſimilem: ſtrobilum alba violæ, purpu- reo, minore tamen, ideoque ſylueſtris anagallis nominata eſt: ſemine vituli narium ſimili. Tradunt peruncos ea cum oleo lili- no, venguſtiores fieri, nec vilo medicamento lædi poſſe, ſi quis ap- penſum geſtet.

Antirrhini con- sideratio.

## ANTIRRHINUM.



VARIAT admodum Antirrhini apud veteres historia. Siquidem Dioscorides Antirrhinum herbam foliis, & caule analidi similem reddidit. Theophrastus vero eandem sparanzam similem fecit. Veruntamen Antirrhinum illud, quod ego saepe tum vidi, tum etiam legi, semine vitulinum caput referente, unde Galenus hoc

& Bucranion appellari prodidit, foliis est longiusculis, & angustis, lino, aut oxyridi similibus: floribus lychnidi coronariae æmulis, purpureis, & visui gratis. Huic sanè ad stipularem videtur Plinius libro xxv. capite x. ubi Antirrhinon, fortasse rectius quàm alij, depinxit lino simile, & semine vituli narum. Unde facili suspicor, Dioscoridis & Theophrasti exemplaria hoc in loco depravata esse, atque in aliqua parte vitium latere. Antirrhini meminit Galenus libro v. simplicium medicamentorum, ubi de eius viribus ita scribit. Antirrhinum, aut anarinum semen habet vituli naribus simile, ad sanationes inutile. Ipsum autem ad similes est cum bubonio facultatis, sed multo minoris. Itaque ex illo de hoc coniecto. Hoc vt Græci *antirrhinon*, ita etiam Latini Antirrhinum vocant: Itali, Antirrhino: Germani, Orant, Sterck kraut, seu Streick kraut: Hispani, Cabezza de ternera: Galli, Moron violet.

Antirrhini con- sideratio.

Nomina.

## CATANANCE. CAP. CXXIX.

Ex eo genere una, folia coronopii habet, longa: radicem iunci modo prætenuem: capitula sena, septenave, in quibus erui semen inest. Crescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem vnguini milui exanimati. Altera mali parvi magnitudinem explet, radice exigua: oliuæ magnitudine: foliis quoque oliuæ colore, & figura, mollibus, diuisis, humi inclinatis: semen vt cicer, minutum, in virgulis pendet, puniceo coloris, multis foraminibus pertusum. Vtranque narrant in amatoria expeti. Thesalicæ mulieres his vt traduntur.

Catanan- cer consi- deratio.

NEUTRUM equidem Catanances genus

scio in Italia, qui alterum saltem legitime noverit. Sed nihil certè referre arbitror: quippe quod ea rebus venereis tantum conueniant, & amatoris nascuntur. Proinde mulieribus Thesalicis relinquenda sunt, quibus olim fuit usus: præsertim cum hac ætate homines in venereis admodum proclives sint, atque etiam multi nimis callescant amatoria. tantum abest, vt etiam huiusmodi herbarum, si cognoscerentur, auxilia iis indicari debuissent. Ceterum existimat Ruellius in hoc subscribens Hermolao, secundum di generis Catanance rectè eam herbam dici posse, quam herbariorum vulgus Bisfortam appellat. Sed meo quidem iudicio errat Ruellius, quod Bisforta dicta rumicis folia proferat, & radices quandoque humani brachij crassitudine, angustum modo contortas, non autem paruas oliuæ magnitudine, velut altera Catanance. Nomen eius Græcum, *καταναν* Latine. Nomina.

## TRIPOLION. CAP. CXXX.

TRIPOLION in marinis nascitur locis, quæ allicit vnda, recedensque dimittit, neque in mari, neque in sicco: folio gladii crassiore: palme caule, in mucrone diuiso. Eius, vt tradunt, flores colorem ter die mutant, mane candidi, meridie purpurei, sero puniceo conspiciuntur. Radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drachmis duabus in vino pota, aquam, urinamque per alium extrahit. In medicamenta digeritur, quæ venena arcent.

TRIPOLIUM Serapioni Turbit appellatur. Quapropter credidere nonnulli, Turbit vulgò vocatum Dioscoridis esse Tripolium, præsertim quod ipsum & album, & deiectionis facultatis esse deprehenderent. Veruntamen rem aliter se habere illud argumento est, quod communis usus Turpeteri nullo commendetur odore, nec gustui acedinem relinquat, sed tantum salsedinis, & asperitatis quidpiam. Ex quibus siquid notis asserere liceat, Tripolium in Italia non reperiri, neque aliunde aduehi: quem admodum nec Turbit, de quo differunt Antenna, quem etiam Dioscoridis Tripolium intellexisse reor. Ceterum ab his longè differre videtur TURBIT, quod i Mesue describitur, Turpeteris nostri Turpeteri omnibus proflus notis respondens. At enim Turbit radicem esse herbæ folia senile minora ferentis, triplicique notari differentia, nempe alba, subcinerea, & pigra. Quæ quidem omnia in nostri usus Turpeteri diligenter inventibus facili se se offerunt. Siquidem in Turpeteri radicibus, quæ ex orientali præga ad nos deferuntur, omnes hi reperiuntur colores

colores non tamen quod putem, eos ita factos esse tantum ex ipsius plantæ natura, sed quod ob vetustatem, & aduentitij æris humorem radices hæc corrumpantur, & nigrescant, illôsq; sibi afsiciant colores. Cuius rei in causâ etiam esse potest maris, per quod conuehitur, exorta procella, vndis tritremes superantibus, quibus madesfactæ radices facile sum, vel nigredinem contrahunt. Præterea cum asserat Actuarius, nil aliud esse album Turpetum, quam alypiæ radicem, eorum planè refellitur opinio, qui Mesuem errasse existimant, quod album Turpetum dixerit plantæ radicem esse, quæ folia ferret ferulacea. quandoquidem alypum, siue alypia, vt in se quentibus docebit Dioscorides, foliis tenuibus proflit, quemadmodum & ferula. Ex his igitur, vt arbitror, abunde liquet, Turpetum tam Mesui, quam Actuario alypiæ esse radicem. Est & aliud Turpetum, quod potius pseudo turpetum dixerim, crassius, & cortice nigrius, quod ex Gargano Apuliæ monte conuehitur duplici genere, quoniam vnum è thapsiæ, alterum è pityusæ radicibus concinnant impostores, à quibus hæc omnia didicimus. Non itaq; ab re scripsit Actuarius, nigrum Turpetum radicem esse pityusæ. Verùm hoc (vt mea fert opinio) Mesui Turpetum haudquaquam fuerit, cum ipsius Turpetum nil aliud esse existimem, vt paulò ante diximus, quam alypiæ radicem. Quàquam putat Brasauolus, nulla tamen, quod equidem sciam, ratione vel authoritate nixus, apud Mesuem Turpetum omnino tithymali myrsinici radicem esse. Sed quantum myrsi folia à ferulæ foliis differant, qui nesciunt, rei herbariæ peri-

ros consulant. Fuchsius porò libro de compositione medicamentorum Turpetum, de quo Mesues egit, è Thapsiæ radicibus exemptum existimat. Sed ipsius quoque sententia mihi plana, vt liberè dicam, reprobanda videtur: nam è veteribus nullû hæcenus reperi, qui Thapsiam lacteo succo turgere scribat: cum tamen Mesui Turpetum à planta exemptum, quæ plurimo lacte madet. Præstat in Turpeti genere album ex orientali plaga allatum, resinofum, minime cariosum. Delicet hoc pituitum, crassos lentosque humores ad articulum compages defluentes, remotioresq; corporis partes. Ventriculû expurgat, & quæ illi penitus inhærent excrementa detergit item & pectus à pituitæ lentore. Datur magno iuuamento aqua intercut laborantibus: item elephantiaci, & Gallica lue affectis: quin & iis, qui morbis ab exultis humoribus prouenientibus sunt obnoxij. Prodest diuturnis febribus, & in vniuersum vbi pituita redundet: verum qui samunt caue, e debent à piscium esu, & australi situ. Sed iam ad Tripolium nostra redeat oratio. Reperio hæc in historia non parum hallucinatum esse Plinium libro x x i. ca. v i i. vbi turpiter Tripoliû cum polysio herba confudit, adeo vt asserere non dubitauerit, polium ter in die foliorum mutare colorem. Id quod de Tripolij floribus tradiderunt Dioscorides, tum antiquorum reliqui. Tripolij quam brevissimè meminit Galenus libro v i i i. simplicium medic. ita scribens. Tripolij radix gustanti acris est, & facultate calida in tertio excessu. Quod Græci *τραπολιον*, Latini quoque Tripolium dicunt: Itali, Tripolio.

Brasauolus  
in errata.

Plinij  
lib. xxi.

Tripolij  
res ex Galeno.

Nemini.

ADIANTHUM.



ADIANTHUM. CAP. CXXXI.

ADIANTHON, polytrichon, pusillagerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exorientur, nigro colore nitent, præte-

TRICHOMANES.



nues, palmum alti: radice superuacua; neque caulem, neque fructum, neque florem profert. Decoctum herbæ potum, prodest spirandi difficultati, suspensiosus, lieni, & felle suffusus, & vrinx difficili



ficili:calculos frangit, aluum fistit, serpentium moribus auxilio est: contra stomachi fluxiones in vino bibitur: secundas ciet, & menstrua: sanguinis reiectiones iahibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas dicitur: furfures, & manantia capitis vlcera ex lixinio emendat: defluentes capillos cōtinet, cum ladano, & myrtino, & fusino, aut hyssopo, vinoq;. Decoctum eius cum lixinio, & vino infusum, idem prastat. Coturnices, & gallinaceos pugnaciores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia vtilitatis pecorum circa ouilia. Vmbrosus, & palustribus, circa parietū aspergines, & fontū specus enascitur.

## TRICHOMANES.

CAP. CXXXII.

TRICHOMANES nascitur eisdem in locis. quibus adianton: filici simile, sed exilius: foliis lenticulæ. tenuibus, in ordinem vtriusque digestis, aduersis in se, in ramulis tenuibus, æcerbis, fusco colore splendentibus. Eadem quæ & adianton prastare posse constat.

*Adianti.* ADIANTVM officinæ Capillum Veneris & Tricho appellant. Duo eius genera Theophrastus assignavit lib. v. 11. cap. x. 11. de plantarum historia. Roraria, ubi ita scriptum reliquit. Adianti solum in aqua nunquam madescit, nec quicquam adhaesit humoris constat: unde & nomen herba accepit. Genera eius duo, candidum, atque nigrum. Ambo ad defluuium, capillorum vtilis, oleo erita. Nascuntur maximè locis humidis. hæc Theophrastus. Cui subscribit Plinius, licet confusè satis, lib. x. 11. cap. x. 11. dum sic inquit. Aliud Adianton miraculum, æstate vires, bruma non marcescit, aquas respuit: persusum, merisive, sicco simile est, tanta distictio deprehenditur, unde & nomen à Græcis. Quidam callitrichon vocant, alij polytrichon, vtriusque ab effectu. Duo eius genera, candidus, & nigrum, breuiusq;. Id quod maius est Polytrichon, aliud Trichomanes vocant. Vtriusque ramuli nigro colore nitent, foliis filicis, ex quibus inferiora aspera, & fusca sunt: omnia autem contrariis pediculis densa inter se ex aduerso radix nulla. Vmbrosas: petras, parietumq; aspergines, ac fontium maximè specus sequitur, & saxa manantia. quod miremur, cum aquas non sentiant ita Plinius.

In quibus nimirum verbis manifestè deprehenditur ipse Plinius, Trichomanes, quod & Filicem appellamus, in secundi Adianti loci relictis. quippe qui perperam fortasse accepit Theophrasti sententiam, à quo illa mutatus est. Nam Theophrastus ubi de vtroq; Adianti genere differuisset, eodem loco citato statim de Trichomane hæc verba subiunxit. Trichomanes vel ad distillationes vrinæ vnicè facit, vt aliqui existimant. Cautem hæc ad anto nigro similem gerit: folia admodum parua, densa, aduersa, inter sese condita: radicem minimā. Loca amat opaca. hæc tamen Theophrastus. Ex quibus liquido apparet, Theophrasto Trichomanes, quod Fidicula à Theodoro vertitur, nullum Adianti genus esse, sed per se sui generis plantam: quod enim Fidiculam dixerit cauliculum ferre nigro adianto similem, clarissimè ostendit, candidum Adiantum cum Trichomane nullam habere cognationem. Hinc itaq; facile crediderim, Adiantum nigrum, quod caule filiculam referat, nobis legitimè esse, id sine intelligentis, quod Capillum Veneris passim nominant. Candidum verò eam plantam esse aliquando putavi, quæ vni cum Trichomane in petris, parietum, ac fontium asperginiibus, specubus, & humentibus locis nascitur: foliis nigricantibus, minutim laciniatiss, luteas maculas quàm plurimas aduersa parte habentibus: caule viridi, gracili, flexilib; quum nonnulli, quod foliis rutam æmuletur, & in muris proueniat, Rutam murariam cognominant, alij Saxifragam dicunt. Sed nunc equidem hæc eandem cum Paronychia Dioscoridis esse opinor, vt etiam superius in sua mentione monuimus.

Cæterum Enchiridis medicus clarissimus, hæc herbam pro Saxifraga Dioscoridis depinxit in suis de Sirpium historia commentariis. Verum quod hæc folio conflet rutæ, illa verò epithymi, capillorumq; modo tenui, cur planè eius sententiam comprobem, non habeo. Adiantum meminit Galenus libro v. 1. simplicium medicamentorum, sic de eius vitiis scribens. Adiantum in caliditate quidem, & frigiditate symmetrum est, verum desecat, & extenuat, & dicitur. Etenim alopecias capillis vltis, & strumas & abcessus digerit, lapidesq; frangit epotum. Viscosorum, crassorumq; & pectore pulmoneq; excretionibus non mediocriter confert, & ventris profluuium sistit: non tamè vllam manifestam caliditatem affert, sicut nec frigiditatem. Verum posuerit ipsum quæspiam secundum hanc oppositionem & temperiem in ordine medio. Trichomanis autem meminit libro v. 1. 1. eorumdem simplicium medicamentorum, ubi subscribens Dioscoridis, hæc tantum reulit. Trichomanes eadem prastat, quæ adiantum, hæc tamen Galenus. Porro Adiantum, vt Mesues inter sua simplicia refert, aliud subdugit, bilem, & pituitam deiecit, crassas excrementa, quæ diu interioribus inhaerent. Pedus, & pulmonem detergit, sanguinem clarificat,

*Adianti,*  
*& Trichomanis*  
*Galeni*  
*lib. v.*

*Adianti,*  
*& Mesues*



error quo  
runtam.

facillimè legimus. Eam rura Ananienſia vulgò  
Squalam appellant. Proinde errant ij, vt equi-  
dem arbitror, qui Aegilopem, & auenam idem  
eſſe cõtendunt, quandoquidẽ etſi primo ſtatim  
inuitu Aegilops auenæ faciẽ referre videatur,  
diligenter tamen ſingulas eius notas expendun-  
ti, faciliẽ & diſcrimen, & error deprehendetur.  
Etenim Auenæ in ſtipulæ cacuminibus grana  
proſerta, longiſculis appendiſ pediculis, oblon-  
gis folliculis conſecta, bipediũ locuſtarum ef-  
figiem repræſentantibus. At Aegilops tenuiſ-  
ſimas fert ſpicas, tribus, aut quatuor tantũ  
granis contentas, auenæ ferẽ modo dependen-  
tibus: è quibus ariſta prodeunt capillorum in-  
ſtar tenues, rubentes, & auenæ longiores. Quòd  
autem ita ſe res habeat, maniſeſtum præbet in-  
diciũ ipſe Dioſcorides: vtpote qui de auenæ  
libro ſecundo inter cerealia abunde ſcripſerit,  
neque bis ſeorũquẽ eiũdem plantæ hiſtoriam  
tractare ſoleat: ſuperuacaneũ enim fuiſſet  
idem repetere, & inordinatũ eidem incon-  
ſultò addere. Huc accedit, quòd ſi nota, quæ  
vtrique plantæ à Dioſcoride redduntur, inui-  
cem conferantur, haud dubiẽ alteram ab altera  
rum faciẽ, cum viribus, longẽ diſſerre compe-  
rieretur. Namq; Dioſcorides Auenam, quam By-  
zantini *αἰγίλω* vocant, depinxit ſtipulæ  
geniculis intercepta, dependentibus in cacumine  
paruiſ veluti locuſtis bipedibus, in quibus ſe-  
men concluditur. Aeglopæ verò in ſummo ca-  
pite ſemina bina, aut terna rubra habentem, ari-  
ſtis capillaceis. Porro cũ libro ſecundo de vi-  
ribus Auenæ diſſereret, inquit. Huſus ſemen  
non ſecus atque hordeũ, vile eſt ad cataplaſ-  
mata. Pulve eius alius ſilitur, prodeſt tuſſiten-  
tis in ſorbitione ſuccus. Verũ hic de vi-  
ribus Aegilops ſcribens, herbam eius ad ſnuo-  
ſos oculorum abſceſſus, quos Græci *αἰγίλω*  
vocat, & ad duritias diſcutiendas commenda-  
uit: ſuccumq; ſurinaẽ admiſit ad idem valere  
prodidit. Quæ ſanẽ omnia, ni fallor, apertiffimẽ  
demonſtrant, *αἰγίλω* auenæ quàm maximẽ  
repugnare. Aegilopẽ ex hordei vitio fieri, ſicut  
ſolum ex tritico nimia virgine, reſiſtẽtẽ Gale-  
nus libro primo, capite vltimo de alimentorum  
ſaculcationibus, vbi ita ſcribit. In tritico quidem,  
frequẽs ſolum ſpẽ inuenitur in hordeis verò  
reperiuntur, ſed paucum: quàm autem *αἰγίλω*  
appellant, ea in hordeis frequẽs inuenitur,  
cũ prima generatio, vel incrementum ipſis  
non rectẽ ſucceſſerit. Porro pater meus etate  
nũ declinante, cũ agricultura deſectaretur,  
triticiũ, ac hordeũ aliquando ſeminauit, omni-  
bus diuerſi generis ſeminibus, quæ ipſis erant  
admiſta, diligenter ſelectis, quò certò cognosce-  
ret, num ex ipſorum mutatione ſolum & *αἰγίλω*  
naſcereatur, an propriam hæc quoq; ſe-  
mina naturam haberent. Cũ autem fortẽ vnũ  
cum puris ſeminibus in tritico quidẽ frequẽs  
ſolum, in hordeo autem parum, ſed magnam  
*αἰγίλω* vim enatam conſpiceret, in aliis quo-  
que ſeminibus idem experiri eſt aggreſſus.

Aegilops  
ex horde-  
generatio.

haſtens Galenus. Ceterũ ipſe quoque teſ-  
tari poſſum, me ſæpenumero in Anania valle  
audiuiſſe agricolas conqueri, quòd hordeũ  
degeneraſſet in Squalam: ſic enim ipſi Aegilo-  
pem vocant. Aegilops vires retulit Galenus  
libro v. i. ſimplicium medicamentorum, iſ  
verbis. Aegilops digerendi vim poſſidet, hæc  
quòd ex guttu patet: leuiter enim eſt acris.  
Verũ & ex eo liquet, quòd phlegmonas in-  
duratas, & *αἰγίλω* ſanat. Hæc Galenus. Cuius  
etiã teſtimonio ſatis planum fieri poteſt, A-  
uenam, & Aegilopem inter ſe diſſidere, quòd  
de iis ſeorũ egerit, & ſingulis diuerſas vires  
reddiderit. Quæ Græcè *αἰγίλω*, Latine etiam  
Aegilops dicitur: Arabicè, Daufir, Daſifir, Do-  
ſana, Daufir, ſive Duſſir: Italicè, Egilpa,  
Gallicè, Coquiole.

Aegilops  
vires ex  
Gal.

Nomina.

## BROMVS. CAP. CXXXV.

BROMVS herba *αἰγίλω* ſimilis, exic-  
catoriam vim habẽs. Decoquitur cum  
ſua radice in aqua ad tertias, & iuri co-  
colato par modus mellis addicitur: rur-  
ſus incoquitur, dũ liquidũ mellis craſ-  
ſitudo fiat. Lintheum eo humore imbũ-  
tum, & naribus inditum, contra gra-  
ueolentiam vlcẽrum efficax eſt. Aliqui  
tritram aloẽ addunt, & eo modo vtun-  
tur. Cum ſiccis roſis cocta in vino, gra-  
uẽm oris halitum emendat.

TAMEYſI non deſunt Dioſcoridis ſtu-  
dioſi, atque etiam interpretes, qui putant, Bro-  
mũ huic loco illegitimẽ accreuiſſe, quòd de  
ea quoque libro ſecundo idem Dioſcorides tra-  
ctauerit, aliudq; non ſe Bromos, quàm Auenæ,  
nos tamen longẽ aliter ſentimus. Mea ſiquidem  
ſententia eſt, eritq; doctẽ melior ab aliis pro-  
feratur, quòd Dioſcorides, vbi ſecundo libro  
Bromũ inter fegetes, legumina, & alia frugum  
genera, quæ ſatione proueniunt, deſcripſit, de  
ſua Bromo tantũ intellexerit: hic verò, vbi  
de his, quæ ſponte naſcuntur, diſſerit, nobis  
ſylueſtrem Bromum reddat. Hæc vulgaris no-  
titia eſt, domeſtica auenæ in omnibus perſi-  
milis, granis tamen maioribus nigrioribus, hir-  
ſutioribusq;. Bromi huſus mentionem facit  
opinor Plinius libro xxi. cap. xxv. dum  
ſic inquit. Bromos ſemen eſt ſpicũ ſerentis  
herbæ, naſcitur inter vitis ſegetis auenæ Græ-  
cæ genere, & folio, & ſtipulæ triticiũ imitatur.  
In cacuminibus dependentes paruulas velut  
locuſtas habet. Semen vile ad cataplaſmata,  
atque hordeũ, & ſimilia. Byzantini ita Græcè,  
vt Latine Bromos & Auenæ ſylueſtris nomi-  
natur: Italicè, Vepa ſaluatica, Gallicè, Auoyne  
ſauoyne.

Nomina.

## GLAUX. CAP. CXXXVI.

GLAUX cytiso, aut lenticulæ foliis similis, quæ supernè virent, auersaque candidiora spectantur: ramuli à terra exiliunt quinî fenive, tennes ab radice, dodrantem altiflores violæ albæ, purpurei exeunt, minores tamen nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeaca farina, sale, & oleo in sorbitione, ad reuocandam extincti lactis vbertatem.

Quamquam scribit Dioscorides iuxta mare nasci Glaucem, eam tamen ipse hæcenus nusquam reperi, neque ab aliquo compertam audiui. Nisi Ruellio adimplari velimus, qui eam herbam Glaucem putat esse, quæ fruticat multis caulibus: foliis oblongis, in ordinem vtrinque digestis, ciceris modo, subter cæsis, supernè viridibus: flore purpureo, paruo, filiqua terete, non in aduncum vt fœni græci comunicata. Hæc, etsi Ruellio teste nullum apud Gallos inuenerit nomē, à quibusdam GALEGA,

## GALEGA.



Ruellij opi  
nis explicat  
fca

ab aliis Ruta capraria, in Hetruria verò vulgò appellatur Lauanese, siue vt quidam alij Lauamant, quod prope riuos aquarum nascantur, vbi manus lauantur sufficit, hæc planta saponis vice sibi sordidum lutum abstergunt. Verum cum videamus huiusce plantæ flores, & caules qui se quandoque ad bichitalem altitudinē attollunt, Glaucis faciē non repræsentare, cogimur dicere Ruellium hæc in re hallucinatum deprehendi: præsertim quòd Glaux, Dioscoride & Plinio authoribus, inuenitur iuxta mare. Galega verò in viginosis locis, in serotium aggeribus, in montibus, & deniq; passim ferè provenit. Huic plantæ recentiores assignant vires non vulgares contra pestilentiam, & venenosorum animalium morsus: in quorum remediū herba per se estur, atque etiam exterius illinitur. Sunt & qui eam morbo comitali laborantibus auxiliari prædicent: in quem vsum eius succum exhibent, drachmarum quatuor pondere. Quòd autem hæc extinctum lac reuocet, ad quòd Glaux à Dioscoride commendatur, non equi-

dem ausim asserere, cum nullum inueniam, qui Galegan his viribus præstare testetur. Glaucis meminit Galenus lib. v. 1. simplicium medicamentorum, de eius viribus differens in hunc sensum, modum. Glaux herba, & ipsa lactis generandi vim obtinere videtur. Quod si ita sit, calida quodammodo, humidatq; fuerit temperamēto. Ea æquè Græcis γαυξ, atq; Latinis Glaux appellatur.

## POLYGALA. CAP. CXXXVII.

POLYGALA palmi altitudinem petiit, foliis lenticulæ, gustu adstricto. Quæ pota, lactis abundantiam facit.

POLYGALA mihi planè incomperta est. neque id temerè fieri liceat, quòd tam paucæ eius tradantur notæ tam à Dioscoride, tum etiam à Plinio, vt admodum difficile sit decernere, quæ nobis hodie sese offerat planta, cui Polygalæ nomen rectè competere possit. Hæc Græcè πολυγάλη Polygalum quoque & Polygala Latine dicitur.

## OSYRIS. CAP. CXXXVIII.



OSYRIS frutex est niger, ramulos ferēs tenuēs, lētos, fractuque contumaces: & in his folia quaternā, quina, senāve, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescētia. Decoctum eius potum, inuat ar-

quatos.

OSYRIS, quòd foliis, & caule lini faciē repræsentet, officinis Linaria appellatur. Huius flores, quos tamen omisit Dioscorides, numero à medio vsque ad summum videntur, sylvestris cumini secundi generis modo, verum in hoc purpurei sunt, in illa sublatei. Sunt tamen qui velint, Osyrim eam esse plantam, quam vulgò nos appellamus Bel vedere, quòd belle, densissimeq; fruticet, vireatq; per æstatem, non solum in hortis, & viridariis fatis, sed etiam in scissibus ornandi fenestras gratia. Qui verò ita existimant, eo ducuntur argumento, quòd hæc non modò crescat foliis lino simili-

bus,

bus, sed quod etiam nunc seratur à multis ad scopas ex ea parandas. Quandoquidem id à Galeno dictum volunt in simpliciū censu, ubi verbum *ασπίδα* (ita enim legendum est, non autem *καυκίμια*, ut malè habent codices) non solum medicamenta, quæ faciem venustant, verum etiam scopas Græcis significare arbitrantur, quemadmodum & Cornarius in Aetio interpretatur. Quorum equidem sententiam non profus improbandam censeo, quoniam palàm est, hanc plantam foliis linum referre, & ad scopas faciendas aptissimam esse. tamen Dioscoridis placitis ea non admodum adstripietur, sicut nec alia vocata Linaria, quod neutrius folia è nigro, quod viderim, in rubrum mutentur, quodque harum ramuli longè plura habeant folia, quàm quina, vel sena.

Pliny La.  
p. 100.

x x v i i . cap. x i i . ubi ita scriptum reliquit. Osyris ramulos fert nigros, tenues, lentos: & in his folia nigra, ceu lini: semenque in ramulis nigrum initio, dein colore mutato rubescens. hæc Plinius. In quibus, meo iudicio, lapsus deprehenditur ipse Plinius, quod iis notis depinxerit huius plantæ semen, quæ foliis reddidit Dioscorides, à quo tamen Plinius illa mutuatus est. De viribus Osyridis Galenus libro v i i i . simpliciū medicamentorū disseruit, iis verbis. Osyridi, inquit, herbæ, ex qua *ασπίδα* (siue scopas, siue medicamēta, quæ cutè exterrunt, & læuigant, interpreteris) fieri solent, amara inest qualitas, & obstructions expediedi facultas. quare & in iecinore cōsistentes obstructions adiuuat. Herba hæc *ισυρίς* Græcis, Latinis item Osyris dicitur: Germanis, Harnkraut: Italis pariter & Hispanis, Linaria.

Osyridis  
vires ex  
Galeno.

Nomina.

SMILAX ASPERA.

20

SMILAX LAEVIS.

SMILAX ASPERA.  
CAP. CXXXIX.

40

SMILAX LAEVIS.  
CAP. CXI.

SMILAX aspera, folia habet pectylomeni: farmenta tenuia, multa, rubi modo, aut paliuri aculeata: arborescendit, ab imo ad summa perreptans, se conuoluens eis: fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumque leniter mordent. Nascitur in palustribus, & asperis: radice dura, crassa, 50  
faque. Folia, & acini, & antè, & post epoti, venenosorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem editis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum venena nocitura. Inciditur etiam ad alexipharmaca, id est, ad ea medicamenta, quibus venena arcentur.

LAEVIS Smilacis folia hederæ similitudinem habent, molliora, læuiora, tenuiora: huius farmenta supradictæ similia, nullis horrent spinis: conuoluitur arboribus, ut prior: fructum parit lupini modo nigrum, exiguum: floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac smilace, quadam topiariorum arte, tentoria contra æstus molestiam faciliuntur: folia per autumnum decidua. Semine cum dorycnio poro, ternis singulorum obolis, varia & tumultuosa in somnis obuerfari traduntur.

SMILAX aspera Hetruscis Hedera spinosa, siue Rubus ceruinus nominatur. Hanc dicitur Thrœphra  
Q 3 gent

Smilacis  
aspera his-  
toræ ex  
Thrœphra

gentilissimè persecutus est Theophrastus libro  
111. capite vltimo de plantarū historia, vbi ita  
scriptū reliquit. Smilax, id est, hederā Cilicia,  
amplexicaulis ipsa quoq; affurgit, frutex acule-  
atus, & velut præhorridus: foliū hederæ,  
paruum, sine angulo, iuxta pediculi retinaculū  
humectum: peculiare, quod medium illū cal-  
lem, qui instar spinæ animantiū secat, præte-  
nuum habet, & interualla flaminea, non ex eo  
porrecta, vt cætera, sed circa eum in orbē cir-  
cumacta, ab annexu pediculi ducit, ad caulem  
verò foliorū internodia consammantem: vltimus  
ab eisdem pediculis atq; folia, tenuis, seq; con-  
uolvens depēdet. Flos candidus, suauiter olēs,  
verno proueniens tempore: fructus proximus  
solano, atq; melothro, & maximè vix labruscæ  
vicinitate. Racemi peniles vt hederæ sunt, ve-  
rū ad labruscæ potius accedunt: nam de eo-  
dem puncto pediculi acinorum exeunt. Colo-  
re fructus rutilus est: nucleos in vniuersū qui-  
dem binos continet, quanquam grandior ter-  
nos, & paruulus vnum. Nucleus durus admo-  
dum est, & colore forinsecus niger. Peculiare  
racemū, quod per latera caulium sepiunt, pos-  
stemōque caulis racemū omnium maximū  
propendet, sicut in ramno, & rubo: vnde fit,  
vt extremo fructifera, & latere largè fructifera  
ista spectetur. Hæcenus Theophrasti de smi-  
lace aspera sententia. Quæ autē Smilax læuis  
appellatur, vbiq; ferè prouenit, sed præsertim  
in Hetruria, vbi passim frequentissimā inueni-  
tur. Incolæ eam vulgò vocant Vilucchio mag-  
giore. Hæc foliis asperam quadrantenū imita-  
tur, nec secus ac illa arbores standit, seq; con-  
uoluit eis, proxima quæq; vinciens: verū sar-  
mentis, siue ramulis consistit, non vt altera hor-  
ridis, aculeatisq; sed læuibus, flexilibus, ac len-  
tis. Flores profert candidos, calathi effigie: è  
quibus semen prodit atrum, lentibus maior,  
sed lupinorum figura. Officinæ hanc plantam  
Volubilē nuncupant. Cuius tamen plura Mau-  
ritanis habentur genera, quorū vnum illud est,  
quod Lupulum appellant. Huius etiā apud me-  
dicos ætatis nostræ frequentissimū sit vsus,  
additurq; ab iis in quā plurimā medicamen-  
ta, nihil tamen de eo, quod equidem inueni-  
rim, Galenas, & Dioscorides, aliq; veteres tū  
Græci, quā Latini auctores, posteritatis me-  
morie prodiderunt. quanquā non desunt, qui  
volunt, hunc Plinio esse Lupum salictarium, ab  
eo hoc tantū nomine demonstratum libro  
xx1. cap. xv. atq; ibi inter eas herbas con-  
numeratū, quæ sponte nascitur, quibusq; ple-  
raq; gentium vnum in cibis. Lupuli vocatū  
latius meminit Mesues inter sua deiectionis fa-  
cultatis medicamenta, vdi hæc ad sensum habet.  
Est aliud Volubilis genus, quod l v p v l  
v l s appellatur, folia habens aspera, cucu-  
maris modo: flores exilibus folliculis squama-  
tim compactos, racematimq; dependentes, co-  
lore subincenere. Hic flauam bilem detrahitis,  
sanguinē ab ea expurgat, & eius inflammationes



extinguit. Sero ex  
prino maceratus,  
valētorē redditur.  
Succus cum sac-  
charo decoctus sy-  
rupi modo, regio  
morbo laboranti-  
bus medetur. Sed  
profectū mirū est,  
quod eo nostræ æ-  
tatis medici tam  
parcè raroq; vtan-  
tur, cū tamen præ-  
stantissimū sit me-  
dicamentū, quan-  
doquidē tum her-  
ba ipsa per se, tum  
etiam succus po-  
tente admissus, su-

pitit dolorem à caliditate contrahiū tollit. Ie-  
cinoris, & ventriculi æstus mitigat. Syrupus ex  
saccharo, & eius succo paratus, vtilissimè exhi-  
betur in febris à bile, & sanguine excitatis.  
hæc Mesues de Lupulo. Cæterū ad institutū  
nostrum reuertamur. Smilacis vtriusq; vires  
tradidit Galenas lib. v11. simplic. medicam.  
sic inquit. Milax (sic enim Smilacem vocat  
Galenas) aspera clauiculis plena est, ita vt va-  
riè sursum deorsumq; arboribus circumuoluat-  
ur. Folia gustata aliquid habent acrimoniæ, &  
alioqui si illis vtaris, calefaciūt. Milax læuis fa-  
cultate quodammodo prædictæ similis est.  
Planta, quæ Græcis *quīnax* vocatur, Latinis Smi-  
lax aspera, & Hederā Ciliciā vocatur: Italis,  
Hedera spinosa, & Rouo ceruino: Germanis,  
Scharpfe vniuden. Quæ verò *quīnax* sūa Græ-  
cè, Smilax læuis siue lenis Latine dicitur: Ita-  
licè, Vilucchio maggiore: Hispanicè, Corre-  
guela mayor: Gallicè, grand Lisset.

Smilacis  
Striūque  
Vires ex  
Galeno.

Nomina.

R V S C V S.

CAP. CXLI.

SYLVESTRIS myrtus, aliqui-  
bus oxymyr sine, aut myrtacantha,  
Latinis ruscum appellatur. folium fert  
myrti, latius, in formam lanceæ mu-  
cronatum. baccæ per maturitatem ru-  
bescunt, rotundæ, à medio folio depen-  
dentes, osseo intus nucleo: cubitales ra-  
muli ab radice exeunt, vitilium modo  
lenti, fractu contumaces, foliosi: radice  
graminis simili, acerba, & subamara.  
Folia, & baccæ in vino potæ, vrinam  
cient: menses pellunt, vesicæ calculos  
frangunt, stillicidio vrinæ medentur,  
dolor

Smilacis  
Lenis his-  
toria.

Lupuli hi  
Historia. 13  
Vires ex  
Mesue.

dolores capitis sanant, & regium morbum. In asperis, & præcipitibus locis enascitur. Decoctum radicis in vino potum, eisdem præbet effectus. Cauliculi recentes, asparagorum vice in cibo sumuntur: amari autem sunt, sed vrinam mouent.

Ruscii consideratio.



Ruscus officina corrupto nomine ex literæ additione Bruscū appellant. Nos vero, quod ascendimus, sit, si saltem appensis carnibus funiculo circumligetur. Pungitopi Hetrusca lingua dicimus. Germinat huius asparagi modo, turionibus tamen brevioribus, crassioribus, hirsutisq; qui elixi māduntur ex oleo, sale, & aceto. Cæteri, quod non obscure amarorem gustui relinquunt, in medicamentis potius, quam in cibis expetuntur: sunt enim ciendæ vrinæ, aperiendisq; obstructionibus perquam idonei. Græcis, quod foliis sit acutis, & myrtum æmuletur, oxymyrs sine, hoc est, acuta myrtus appellatur. Ea Græcis *μυρτιά ὀξύμυρος* vocatur: Latini, Ruscus, & Myrtus sylvestris: Arabibus, qui Cubebas cum rusco confundunt, Cubebe: Italici, Rusco & Pongi topi: Germanis, Bruosch: Hispanis, Ius barba, & Gilbarbera: Gallis, Brusc, & Meurte sauvage.

Nomina.

LAURVS ALEXANDRINA.  
CAPVT CXLII.

LAURVS Alexandrina folio est rusci maiore, molliore, & cãdiore: semine inter folia rubro, ciceris magnitudine: ramos spargit in terra dodrantales, interdum longiores: radice sylvestri myrto simili, maiore, molliore, odorata. inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in vino dulci, & stillicidio vrinæ auxiliatur, sed sanguinem extrahit.

LAURVS ALEXANDRINA.



LAURVS ALEXANDRINA ALTERA.



rum meminit, nec aculeorum è foliis prodeuntium: tradidit quidem hanc folia habere rusco similia, sed maiora, molliora, & candidiora: ramos dodrantales, in terram sparsos: radicem rusco similem, maiorem tamen, molliorem, & odoratam. Cui vires tribuit ad difficiles partus, ad vrinæ stillicidium, & ad sanguinem extrahendum. His accedit, quod (vt Dioscorides testari videtur) Laurus Alexandrina fructum fert rubrum, ciceris magnitudine, inter folia, non autem in medijs foliis, vt hippoglossum, & rusceus. Ex his itaque tum notis, tum viribus, quæ in hisce duabus plantis maximè pugnare deprehenduntur, omnibus abunde constare arbitror, hallucinari eos, qui putant Laurum hanc, & hippoglossum vnam & eãdem esse plantam. Nos equidem hanc, cuius hic figuram damus, veram ac legitimam Laurum Alexandrinam esse

SILAVRVM Alexandrinam, & Hippoglossum vnam & eãdem plantam esse sensisset Dioscorides, vt quidam existimant, nulli quidem dubium est, quin superuacuum erat, de hisce seorsum, diuersis atq; etiam proximis capitibus Dioscoridem differere. vel nulla in earum notis, & viribus reperiretur differentia. Sed quoniam eas seorsum tanquam diuersas retulit, diuersasq; vtriusque notas assignauit, idcirco has plantas inter se differre dicatur, necesse est. Nam est vtrique, folia rusci reddiderit Dioscorides, tamen Hippoglossum statuit aculearum gerere comam, & in summo ceu linguas è foliis excurrentes: commaculatisq; comam ad dolores capitis contraxit modo impostam: & radicem, succinque malagmaris admisceri scripsit. Verum hic in Lauro Alexandrina nec linguarum

esse censemus, quæ (ut pictura pulchrè demonstrat) non parum ab hippogiosio differt. Huic alteram adieciimus, quæ et ipsa haud dubiè, si fallor, fuerit *Laurus Alexandrina*, si huic fructum in mediis foliis ignasci concedamus. *Lauri Alexandrinæ* vires memoris prædidit Galenus libro sexto, simplicium medicamentorum, sic inquit. *Lauri herbæ*.

Laari Alo  
xandrina  
vires ex  
Gal.

quam & Laurum Alexandrinum appellant, temperatura euidenter est calida, & gustantibus acris simul & subamara est: pota&gt; tum vinum, tum menses prolicat. Planta Græcis *Αλεξανδρινή*, Latinis *Laurus Alexandrina* dicitur: Arabibus, *Gar Alexandria*: Italis, *Lauo Alessandrino*.

### Naming

DAPHNOIDES.



С М А М А Е Д А Р Н М Е.



DAPHNOIDES. CAP. CXLIII.

DAPNOIDES cubiti altitudine fructat, ramis flexilibus, obsequiosisque multis, à medio sursum versus foliosis: cortex supra modum viscosus ramos vestit: folia lauri, graciliora, & molliora, fracta contumacia, quorum gustu os & fauces incenduntur: flores candidi: bacca, cum ematuruerit, nigra: radix inutilis, nascitur in montosis. Pituitam extrahit solum recens, vel aridum in potu: menses ciet, & vomitum: caput inanit commanducat: sternutamenta mouet. Bacca quindecim potæ alium resoluunt.

CHAMAEDAPHNE.  
CAP. CXLIII.

*CHAMAEDAPHNE virgas* emittit cubitales, singulari ramulo cōstantes, rectas, tenues, laeves: folia lauri similitudine, laeviora multo, ac viridiora: semen rotundum, rubens, annexum foliis. Illinuntur capitis doloribus trita folia, & stomachi ardores mulcent: ad sedanda tormina cum vino bibuntur.

3<sup>o</sup> Potus cum vino succus menses, & vrinam ciet: idem facit pello appositus.

DAPHNOIDES, quam officinarum, & herbariorum vulgus Laureolum vocant, frutex est vulgaris notior. Provenit hæc frequens in vallibus Ananiam montibus Tridentino agro, nullis prorsus relictis, manibus notis. Cubitalibus enim affurgit virgis, flexilibus, obsequiosisq; foliis numerosis, sursum spectantibus, lauro similibus, gracilioribus tamen, ac mollioribus, acerrimo gustu: quin & ramo-um cortex admodum tenax est. Hinc itaque fit, ut ejus rare toto celo deprehendantur, qui putant Mezerion Manritanis vocatum esse Daphnoidem, quandoquidem Mezerion Chamelæra est, de qua suo loco differemus. Porro Chamadaphne, quam Laureolum marem plerique cognominant, foliis ac fructu à Daphnoide non longe differt: verum hæc tantum intercedit dif-

Daphnei-  
dis, et Cha-  
maniaph-  
nes cōsid-

50 ferentia, quod Chamædaphne singulari re-  
 ctioque caule consistit, cui folia circumquaque  
 prominent, adeo vt in cacumine in orbem vbi-  
 bellæ instar diradentur: semine inde producente  
 Daphnoidis modo. Cæterum, quod voca-  
 uerit Plinius Chamædaphnen eam clematidem,  
 quam aliqui Vincum peruinum appellant, cre-  
 didere quidam hanc Dioscoridis esse Chamæ-  
 daphnen. Sed profecto id falluntur: errorq; om-  
 nibus euidenter fiet, quam vt pluribus explodi  
 possit, si modo contemplerur, & conferantur  
 notæ, quibus Vincum peruinum descripsit  
 Plinius lib. x. cap. x. i. & quibus repræsentat

Am. J. Pharm.

1122



vit Chamædaphnen lib. x x III. cap. x v.  
Verùm Plinio, quod clematidi folia sint lauri,  
videaturq; humilis laurus, ideo non temerè eā  
Chamædaphnen dici placuit. Sunt, qui Lau-  
reolæ fructum Piper montanum vocent, quan-  
tis rusticis Ananiensibus nil aliud sit piper  
montanum, quàm Dioscoridis granum Gni-  
dium, vt infra suo loco dicemus. Daphnoidis,  
& Chamædaphnes vno tantum capite meminit  
Galenus libro v i. simp. medicamentorum, sic

*Daphnoi-  
dis et Cha-  
mædaph-  
nes Græc.*

VERATRUM ALBUM.



VERATRUM ALBUM.  
CAP. CXLV.

ELLEBORVM album, Latini vera-  
trum album vocant, fert folia planta-  
ginis, aut betæ sylvestris similia, sed  
breuiora, & nigriora, rubescencia: cau-  
lem cauum, quodrantalem, tunicis con-  
uolutum, quas abdicat, cum arescere  
incipit, radicibus nititur multis, tenui-  
bus, ab oblongo, & exiguo capite cepa-  
rum modo exelutibus nascitur in mon-  
tibus, & asperis. Radices melsibus col-  
ligendæ. Optimum habetur cæcidum,  
friabile, carnosum, modicè extensum,  
nec tamen iunci modo mucronatum,  
quod frangendo puluerem emittit, &  
tenuem habet medullam, gustu non ad-  
modum feruens, neq; saluam subinde-  
ciens. huiusmodi autem strangulat.  
Primarū Cyrenaicū tenet. Galaticum  
aurè, & Cappadociū candidiora, & pul-  
uere quodā obfita, celerius strāgulatus  
mouent. Vomitione autem varios ex-  
trahit humores. Collyriis admiscetur,  
quæ caliginem oculorum discutiunt.  
partus impositum necar, menses pel-

inquiens. Chamædaphnes germina tenera edi-  
quoque assolent. Est autem persimilis viribus  
laurō Alexandrinæ: sicut sanè & quod Daph-  
noides nuncupant. Planta, quæ Græcis *Asp-  
vædis*, Latinis item Daphnoides, & Laureo-  
la nominatur: Arabibus, Daphnides: Italis,  
Laureola. Quæ verò *χάμαδαφνη* Græcè, Cha-  
mædaphne pariter Latine dicitur: Arabicè,  
Chamedaphnes: Italicè, Chamedaphne, Gal-  
licè Lauræole.

*Nomina.*

VERATRUM NIGRUM.



lit, sternutamenta excitat: mures inter-  
ficat, cum melle, & polenta subactum:  
absumit carnes, si coquatur vnā. Datur  
per se ieiunis, & cum sesama, aut ptisa-  
næ succo, aut halicæ, aut lentis cremo-  
re, cum aqua mulsa, aut pulte, aut qua-  
uis alia sorbitione. Cogitur cum pane,  
& ita inasatur. Preparatio corporum,  
ac victus ratio diligenter tradita est,  
cum ab his qui de medica eius potione  
scriptitarunt, tum maximè à Philoni-  
de Siculo Ennensi, cui nunc assenti-  
mur: quippe longum nimis esset in hac  
præsertim editione de materia, simul  
medicam curandi rationem exponere.  
Dant nonnulli in pulvis sorbitione, aut  
copioso halicæ cremore, & aut paucum  
antea cibum dari præcipientes, statim  
veratrum offerunt, iis præsertim, qui-  
bus strangulationis suspicio imminet,  
aut si valetudo corpus infirmat: hoc  
enim modo deiectio nihil periculi mi-  
natur, quod cibo munitis non in tempe-  
stiuè medicamentum corporibus offe-  
ratur. Vomitiones concitant subditæ  
ex eo balani cum aceto.

## VERATRUM NIGRUM.

CAP. CXLVI.

ELLEBORUM nigrum appellatur melampodion, quoniam caprarum pastor nomine Melampus furens in se Prætidas primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei viridia, platani similia, minora, foliis sphodylij proxima, subaspera, nigriora, pluribus diuisuris incisa: caulis asper: flores in purpura albicantes, racemarum coherentes: semen nucis, quod in Anticyra sesamoides vocant: quo deiectiones moluntur. Radicibus coheret nigris, tenuibus, & capitulo cepe simili confibratis, quarum est usus. In collibus, asperis, & sitientibus locis nascitur. Optimum est, quod ex huiusmodi petitur terris, ut ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum, & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensque: cuiusmodi est in Helicone, Parnaso, & Aetolia natum: attamen Heliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat ventrem, detrahitis bilem pituitasque, datum per se, aut cum scammonia, & tribus obolis siue drachma salis. decoquitur vel cum lente, & iusculis, quæ purgationis causa sumptitatur. Prodest morbis comitialibus, melancholicis, insanientibus, articulariis doloribus, & resolutis. Menses inditum trahit, partus necat: purgat fistulas impositum, & tertio die detrahitur. Item contra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibique in alterum, aut tertium diem esse finitur. Scabiem sanat illitum cum thure, aut cera, & pice, & cedrino oleo vitiliginibus, lepræ, impetiginibus ex aceto medetur: dentium dolorem collutione mitigat. Erodentibus medicamentis commisceatur hydropticorum ventri utilissimè imponitur factum ex eo, farina hordeacea, & vino, cataplasma. Confitum proximè radices vitium, vinum purgandi facultate donat. Huius res parva domos expurgari arbitrantur: quare inter fodientes stantes Apollinem, Aesculapiumque precantur, ac vitant aquilæ

volatus: aduolare enim non sine periculo tradunt. namque si auis effusione ellobori cospexerit, moriturum qui succidit, augurium est. Celeriter effodiatur oportet, quoniam halitu caput aggrauat: quapropter ad id arcendum, fossuri alium præsumere, & vinum bibere consueuerunt: nulli ita noxæ opportuni red duntur. Veratri albimodo emedullatur.

ELLEBORUM, quod & Veratrum Latinis dicitur, tam album, quam nigrum omnibus, ni fallor, notum est in Italia. Et quævis inibi vnum tantum Ellebori albi generis inueniatur, nigri tamen tria nobis comperta sunt genera, flore dumtaxat inter se distincta. Vnum quidem flores profert purpureos, quales suo reddidit Dioscorides: alterum verò candidos: tertium denique herbeos. Hæc ut flore distinguuntur, ita etiam viribus inuicem differunt. quandoquidem alterum, & tertium genus adeo viribus imbecillia sunt, ut ferè nihil ad alium desicciendum præstent. Id quod factum periculo didici, cum primum ellebori generis flores ferens purpureos nobis non esset ad manus. Huius radicem diluto ex more nostro parato, & hyeme etiam media, & magis urgente frigore (cæsi id improbant medici) preparata prius diutius materia decoctis, ac syrupis ad id facientibus, plures quartana febre laborantes sanauimus. Nunquam enim, quod meminim, hoc ellebori dilutum dedimus quartanariis nostris, quin ex unica assumptione, vel solum altera, Deo iuvante, fuerint ad sanitatem restituti. Ceterum albi quoque ellebori dilutum exhibuimus quibusdam melancholicis, magno sanè successu: nullo tamen agrotantium incommodo, nullaque noxa. Quod non alia ex causa euenisse putauerim, quam quod in Tridentino agro, aliisque circum finitimis locis, ea fortasse sit illius cœli temperies, ut non adeo perniciosæ facultatibus careat utrumque elleborum, quemadmodum illud, quod in calidioribus prouenit regionibus: tamen non dubitauerim etiam vtriusque acerrimam vim reprimi, ac corrigi propriis quibusdam additis medicamentis. Videntur nigri vniuersæ genera Martio, & April: mensibus vno & eodem loco florere in amplissima sylva, per quam transeit, qui Goritia Labacum Carniole urbem proficiuntur, ubi & nos præstantissimum sæpius legimus. Purpureæ radices nigriores, carnosioresque cæteris habentur: cum aliorum generum radices ut plurimum subalide spectentur: omnibus tamen in vniuersam eadem est foliorum facies. Herophilus antiquissimus medicus elleborum fortissimo duci æquabat: concitatis inuis omnibus, ipsum in primis exire dicebat. Ideo errauit antiquos parcius id præbendo, cum celerius eruperet, quod daretur largius. Sed hæc Herophili sententia non placeat.

Ellebori  
et. n. que  
conficit.

Herophilus  
sententia  
damna.

placet nostris ætatis medicis, neque etiam nobis, ut quæ pluribus daminari, & explodi possit. Elleborus niger boues, equos, & fures necat: proinde id in pascuis cauent, quantum alium innoxie depascantur. Nigri radices demorsis a serpente quadrupedibus mirifice medentur, si recentes in vulneris osculum, sublata à carne cetera, immittantur, quod ita eis calcatum reuocent venenum: quin & illud idem prodest, si regi pestilentia ingruerit, in auribus traiecta, vel pectori infixæ radice. Quæ ratione ducti credere nonnulli, id etiam in hominibus fieri posse, quod si in perforatam calcanei cutem nigrum elleborum intulerit, eos omnino à pettilentia tutos reddat, qui gessauerint. Ellebori semen, Aristotele auctore, coturnicibus gratissimum est: quam ob causam antiqui eas abdicarunt mensis, quæ tamen hodie magnopere expetuntur. Porro non desunt et recentioribus, qui putent nigrum communis vñs elleborum, cui flores herbacei insunt, non elleborum, nec eius speciem esse, sed eam sanè plantam, quam Columella, & Plinius Consiliginem vocant, quamq; ad pecorum pulmonariam curandam, pestilentiamq; arcendam summis laudibus effertur, hoc tantum puto argumento freti, quod scripserint ij, si in morbo quadrupedis auricula consiliginis radix insatur, perforata ferro prius aure, omnem morbi vim eò confluere, & per illud foramen pestilens virus elici. Si quidem eum pastores huius ætatis obseruauerint, id totum (ut nos quoque paulò antè diximus) præstari tantum illius ellebori radicibus, existimauerunt hoc veratri nigri genus, quod flores rubetes nò proferat, vel (ut Dioscorides inquit) in purpura albicetes, sed herbaceos, consiliginem esse. Sed ij, mea quidem sententia, falluntur: quippe Abyssus, & Hierocles idem præstare nigrum veratrum affirmant. Quibus etiam subscribit Plinius libro x x v. capite v. his verbis. Nigrum elleborum pecorum, & iumentorum pituitas sanat, furore per aurem traiecto, & postea die eadem hora exempto. hæc Plinius. Ex quibus vique perspicuum fit, non modo consiliginis, sed etiam nigri veratri radicem hæc omnia efficere posse. Vanum profectò esset dicere, exempli gratia, sabinam esse calamincham, vel contrà, quod vtræque remoratos menses eliciat. quasi natura adeò fuerit avara, ut vnicuique morborum generi vnum tantum generis medicamentum. cum tamen nullus sit morbus, cui innumeras non creauerit medicinas, vno & eodem ordine adhibendas. Adde etiam, quod cum nullus extet author, quod ego inuenerim, qui Consiliginis historiam describat, neque vix quidem nota eius faciem repræsentet, non video, quomodo rectè ij asserere possint, veratrum nostrum vñs esse consiliginem. Sciant itaque velim, qui nigrum herbacei floris Elleborum ideo Consiliginem esse contendunt, quod pestilentibus pecorum morbis præsens remedium sit, si eius radix auricu-

lis, & aliis corporis partibus inferatur, id successu longè meliori effici, si rubentis floris ellebori idem fiat, citiusque expurgari vñs illud pestilens, quod huc vires insit valentiores. Hoc enim quidem opinioem ut planè sequitur Fuchsius vir doctissimus in libro de compositione medicamentorum, quem postremò auctum edidit, ita etiam idem, meo iudicio, in manifesto florum errore versatur. Cæterum hic non est silentio dissimulanda inepta satis, & vana, meo quidem iudicio, de nigro veratri opinio Vgonis Solerij, viri aliqui doctissimi, ut eius testantur scholia, quæ nuper in priores Aëtii libros edidit. Is enim in prædictis scholiis center, Elleborum nostrum vñs tam illud, quod flores fert rosarum modo purpureos, quam quod albos, esse lycocodium, vel cynocodium aconiti species, quod verò herbidos habet flores, Plinij & Columellæ Consiliginem, aliorum iudicium secutus. Quod quibus rationibus comprobet, ex eius verbis, quæ modo referam, cognosci poterit. Si quis, inquit, commemoratam iam plantarum radices diligenter expendat, nihil illas cum nigri veratri radicibus (quæ, teste Dioscoride, cepæ modo bulbosæ sunt, erumpentibus ab imo earum bulbo multis radicibus) commune habere multò euidentius comperiet, quàm ut pluribus demonstrari nunc debeat. Taceo nullam ex his plantis dum velluntur, capitis dorum ex vaporum halium concitari, ut ipse miles sum expertus, id quod in nigri veratri euulsione testatur Dioscorides. Ex his igitur constat, nullam harum trium plantarum ad nigrum veratrum satis apte posse reduci, quin duas priores aconiti lycocodium postrema species esse, postremam herbam sui generis. hæc Solerius. Quibus verbis eum in me egisse, licet non apertè, meamque oppugnasse sententiam ex hoc planè conficio, quod nullus, quod sciam, ante nos scripserit, tria in Italia, ac priusquam in Carniola reperiri nigri veratri genera, florum tantum colore distantia. Neq; id certè agrè fero, quod libenter audiam, indies nouis in re herbaria proferri sententias. Velim tamen id liberius, apertius, & sumioribus tum rationibus, tum auctoritatibus fieri. Redeo ad Solerium, cuius sanè hac in re argumenta me facillè diluere posse spero, vtpote quæ (pace eius dixerim) leuia satis sint, & propterea a veritate desistant. Nam falsum esse, ac nimis fortasse temerè dictum arbitror, quod Ellebori genera illa, quorum superius meminimus, non mittant radices (ut Solerius asserit) tennes, nigras, à ceptæ quodam capitulo pendentes, ac confibratas: cum omnibus non modo rei herbarie peritis, sed etiam pharmacopolis, ne dicam lippis, & consoribus, manifestum sit, nigri veratri communis vñs radices non aliunde, quam à bulbaceo quodam tuberculo omni ex parte pendere nigras, ac graciles: non autem ex modo bulbosæ esse, & ab imo bulbo erumpere

Opinio  
quædam  
reprobata.

Forma 59  
libri 4  
capituli 14

CUCUMER SYLVESTRIS.

CAP. CXLIX.



CUCUMIS  
sylvestris fru-  
ctu solo distat à  
satio cucume-  
re, quē lōgē mi-  
nore parit,  
oblongis glan-  
dibus non dissi-  
miles: folia, at-  
que sarmenta  
satiui refert: ra-  
dice candida,  
magna. Nasci-  
tur insabuletis,  
& rudibus.

frutice in totum amaro. Instillatus fo-  
liorum succus aurium dolori conue-  
nit. Illita ex polenta radix, veterem o-  
mnem tumorē discutit: imposita cum  
resina terebinthina, tubercula rumpit:  
ischiadici infunditur: podagras discuti-  
tur, decocta ex aceto & illira. Eius deco-  
cto dentes in dolore colluuntur. Arida  
farina impetiginem, lepras, & vitili-  
gines absterget: nigris cicatricibus co-  
lorem reddit, & in facie maculas ex-  
purgat. Radicis succus sesquiboli pon-  
dere, & item cortex acerabuli quarta  
parte, bilem, pituitamque deiciunt,  
praesertim in hydropicis: deiectiones  
autem citra stomachi iniuriam mouet.  
Radicis selibra, in vini praesertim Ly-  
bici hemina conteritur, danturque ex  
eo terni cyathi triduo, dum tumor  
abunde deprimi cernatur. E fructu hu-  
ius cucumeris fit medicamentum,  
quod elaterium vocatur, ad hunc mo-  
dum. Decerpti cucumeres, qui tacti  
protinus exiliunt, seruantur nocte vna.  
postmodum imposito supra craterem ra-  
tore cribro, vtrisque manibus prehē-  
si, sigillatim supino cultro, sursum ver-  
sus aciem habente, finduntur, atque  
per cribrum humor in subiectum vas  
exprimitur: simulque carnosum, quod  
haesit cribro, quod facilius excidat, eli-

ditur. quod ita pressum est, residere fi-  
nitur, atque in vicinam peluim demit-  
tatur. Coaceruata autem in cribro se-  
gmīna dulci aqua perfunduntur, & de-  
nuo pressa abiciuntur. Humor in pel-  
ui agitur, & linteo opertus, soli ex-  
ponitur: dumque steterit, tota super-  
natans aqua cum humore concreto, ef-  
funditur. Hoc verò identidem fieri so-  
let, donec existens aqua liquecat: qua  
stilatim exhausta, sedimentum morta-  
rio suscipitur, & conterendo cogitur in  
pastillos. Sunt qui ad hauriendam pro-  
tinus succi abundantiam, cribratos ci-  
neres humi inspargant, & medium ca-  
uantes, triplicatum linereum obtendat,  
per quod elaterium cum sua humidita-  
te diffundunt, siccaturumque in Pila, vt  
dictum est, conterant. Aliqui pro dul-  
ci aqua marinam perfundentes, ita  
eluunt. Alij in nouissima lotionē mul-  
sam aquam respargunt. Elaterium opti-  
mum esse constat, laeue, non pondero-  
sum, cum candore leniter humectum,  
gustu amarissimum, quodque lucerna-  
rum luminibus obiectū, facile flagret.  
Porraceum tamen scabrumque, si tur-  
bidum spectetur, atque erui cinerisque  
plenum sit, graue & vitiosum esse so-  
let. Nec desunt, qui cucumis succo  
amylum immisceant, vt candorem  
ipsum, & lauitatem imitentur. A bi-  
matu ad decennium deiectionibus vti-  
le est. Integer modus obolus est, mi-  
nimus semibolus, pueris chalciduo,  
siquidem copiosius, periculum adfert.  
Bilem, ac pituitam vtriusque parte extra-  
hit. optima suspensio est purgatio,  
quod si in animo sit deiectionem moli-  
ri, adiecto salis duplo, & stibij quod  
colorare sufficiat, ex aqua, erui magni-  
tudine carapotia dato, postea cyathus  
vnius aquae repidae sorbeatur. Ad citan-  
das tamē vomitiones aqua diluens ela-  
terium, subiectas lingua partes penitis-  
simē penna oblinito. quod si quisquam  
difficilius euomat, oleo, aut vnguento  
irino resolutio: somnum inhibeto. Por-  
rò his, qui eximie vacuantur, continuè  
vinum,

Elateriū.

Præstat quod eoulis facim radicibus, interna  
 repurgatur matrice, siccaturq; in vmbra. Ha-  
 rum pulvis diluto longè fortior est: ob id enim  
 non datur nisi robustis, & vbi obcalluerit mor-  
 bus. Proinde de eo ita scriptum reliquit Actua-  
 rius in libro de cõpositione medicamentorum.  
 Veratrum nigrum, atram bilem suauisq; è to-  
 to trahens corpore deorsum, nec tamen citra  
 vllam difficultatem pellit. Ideo febribus cir-  
 cuitu repetentibus, & diurnis obicimus. Da-  
 tur quoque insipientibus: altera caluarie par-  
 te, & subter caput diutine cruciatis commodis-  
 simum: præsertim visceribus, vtero & vesicæ  
 deiectionum medicamentum postulantibus. Maxi-  
 ma autè eius vis est peculiariter educere, quic-  
 quid sanguini commissum, eum corrumpit.  
 Ideo veterascensibus arq; uis morbis vtile: &  
 quibus in superficie summatis aspericudines  
 emerferunt, velut lepris, impetiginibus, & ho-  
 rum similibus: elephantiæ quoque laboranti-  
 bus accommodatum est. Datur scrupulorum  
 ternum pondere, aut paulò plus minisve. Fit  
 è sicis radicum fibris, aqua paulùm maceratis:  
 postea cortice detractio, & in vmbra sicato, pro  
 iectaque tenui, quæ in ipsa subest, medulla.  
 Exhibetur autem ex passio, & aceto nullo: ve-  
 rum suauitatis gratia, quædam ex odoratis se-  
 minibus inferenda. Si verò efficaciorè alui  
 deiectionem moliri sit in animo, scammonij  
 pauillum adicio. hætenus Acturius. Ellebo-  
 ri vtriusque vires posteritatis memoriæ tra-  
 didit Galenus lib. v. i. simp. medic. sic inquiriens.  
 Elleborus vterq; tum albus, tum niger exte-  
 rgentis sunt, & exsiccatis est facultatis. Quã-  
 obrem ad albos, imperigines, scabies, leprasq;  
 accommodati sunt. Quinetiam niger, si in filu-  
 lam callo induratum demissus fuerit, duobus  
 tribusve diebus callum detrahât. Dentibus pro-  
 dest cum aceto colluentibus. Sunt autem in  
 tertio ordine exsiccantium, & desiccantium.

## OPHRIS.



Ophris de  
 simp. et  
 vire.

Porro niger gustu  
 calidior est, candi-  
 dus subamarus. Ha-  
 ætenus de vtroque  
 Elleboro Galenus.  
 Cæterum quæ-  
 dam planta repe-  
 ritur à recentioribus  
 OPHRIS appella-  
 ta, quæ foliis maxi-  
 me album veratrum  
 repræsentat. Duo  
 tantum hæc folia  
 profert: inter quæ  
 caulis erumpit, ca-  
 pitulis quibuldam  
 oblongis in vniuer-  
 sam referens: qui-  
 bus flores exeunt  
 candidi, exiguis lin-  
 guis similes. Radi-  
 ce nititur gracili, non sine multis appendicibus,

odore præstanti. Præfertur vniuersa planta ad  
 denigrandos capillos, fracturas sanandas, &  
 vulnera glutinanda. Illa planta, quæ Græcis  
 ὀφρίς, Latine Elleborus albus, & Veratrum  
 album appellatur: Arabibus, Cherba-  
 chem, seu Charberh abaid: Italis, Elleboro  
 Bianco: Germanis, Vveis niesz: vult: Hispanis,  
 Verde gambre blanco, & yeras de ballesta:  
 Gallis, Viraire, Veratrum, Veratree, & Ellebore  
 blanc. Illa verò, quæ ὀφρίς nigræ Græcè,  
 Elleborus niger, & Veratrum nigrum Latine  
 dicitur: Arabicè, Cherbachem, seu Charbench  
 asued: Italicè, Elleboro nero: Germanicè,  
 Christ vurtz: Hispanicè, Verde gambre ne-  
 gro, & Elleboro: Gallicè, Viraire, & Ellebo-  
 re noir.

SESAMOIDES MAGNUM.  
CAP. CXLVII.

SESAMOIDES magnum in Anti-  
 cyra elleborum vocant, quoniam albo  
 veratro in purgationibus miscetur.  
 Simile est fenecioni, aut rutæ: longo  
 folio: flore candido: radice gracili,  
 ignaua: semen gustu amaro, cætera sesa-  
 mæ simile. Ventrem detrahât. datur  
 tritum ad bilis, pituitæque deiectionem,  
 quantum tribus digitis capitur,  
 addito veratri albi sesquibolo, ex  
 aqua mulla.

SESAMOIDES PARVUM.  
CAP. CXLVIII.

SESAMOIDI paruo cauliculi sunt  
 dodrantes: folia coronopi, minora,  
 hirsutiora: & in cauliculorum cacumine  
 capitula florû penè purpureorum,  
 medio eorum albo: semen sesamæ, sul-  
 cum, amarum: radix tenuis. Detrahât  
 bilem, pituitasque semen ex aqua mul-  
 sa potum dimidio acerabulo: illiæum  
 ex aqua tumores, ac tubercula discentit.  
 Nascitur in asperis.

Non est, quod in rebus incognitis longiorem  
 moram nos ducere oporteat. quando-  
 quidem hætenus non solum ipse non reperi  
 Italia maius, aut minus Sesamoidis genus, etsi  
 in eorum inquisitione nucleum laboris ac studij  
 impenderim, sed neque etiam vllum inuenire  
 contigit, qui vnum, vel alterum legitime osten-  
 deret. Quare has plantas deinceps perscrutandi  
 curam his relinquemus, qui navigationibus  
 Anticyram petunt. Illud Græci *σεσαμοειδής*  
*μύκη*, Latini Sesamoides magnum nominant.  
 Hoc vero Græci *σεσαμοειδής μικρή*: Latini, Sesamoides paruum.

Nomen.

CUCUMER SYLVESTRIS.

CAP. CXLIX.



CUCUMIS  
sylvestris fru-  
ctu solo distat à  
satiuo cucume-  
re, què lōgè mi-  
norem parit,  
oblongis glan-  
dibus non dissi-  
mitem: folia, at-  
que sarmenta  
satiui refert: ra-  
dice candida,  
magna. Nasci-  
tur in sabuletis,  
& ruderibus.

fructus in totum amaro. Instillatus so-  
liorum succus aurium dolori conue-  
nit. Illita ex polenta radix, veterem o-  
mnem tumorem discutit: imposita cum  
resina terebinthina, tubercula rumpit:  
ischiadici infunditur: podagras discuti-  
tit, decocta ex aceto & illita. Eius deco-  
cto dentes in dolore colluuntur. Aridae  
farina impetiginem, lepras, & vitili-  
gines absterget: nigris cicatricibus co-  
lorem reddit, & in facie maculas ex-  
purgat. Radicis succus sesquiboli pon-  
dere, & item cortex acerabuli quarta  
parte, bilem, pituitamque deiciunt,  
praesertim in hydropicis: deiectiones  
autem citra stomachi iniuriam mouet.  
Radicis felibra, in vini praesertim Ly-  
bici hemina conteritur, danturque ex  
eo terni cyathi triduo, dum tumor  
abunde deprimi cernatur. E fructu hu-  
iusce cucumeris sit medicamentum,  
quod elaterium vocatur, ad hunc mo-  
dum. Decerpti cucumeres, qui tacti  
protinus exiliunt, seruantur nocte vna.  
postridie imposito supra craterem ra-  
riore cribro, utrisque manibus prehen-  
si, sigillatim supino cultro, sursum ver-  
sus aciem habente, finduntur, atque  
per cribrum humor in subsiectum vas  
exprimitur: simulque carnosum, quod  
habet cribro, quò facilius excidat, eli-

ditur, quod ita pressum est, residere fi-  
nitur, atque in vicinam peluim demit-  
titur. Coacervata autem in cribro se-  
gmina dulci aqua perfunduntur, & de-  
nuo pressa abiiciuntur. Humor in pel-  
ui agitatur, & linteo opertus, soli ex-  
ponitur: dumque steterit, tota super-  
natans aqua cum humore concreto, ef-  
funditur. Hoc verò identidem fieri so-  
let, donec existens aqua liquecat: qua  
stilatim exhausta, sedimentum morta-  
rio suscipitur, & conterendo cogitur in  
pastillos. Sunt qui ad hauriendam pro-  
tinus succi abundantiam, cribratos ci-  
neres humi inspargant, & medium ca-  
uantes, triplicatum linteum obtendat,  
per quod elaterium cum sua humidita-  
te diffundunt, siccaturumque in Pila, ut  
dictum est, conterunt. Aliqui pro dul-  
ci aqua marinam perfundentes, ita  
eluunt. Alij in nouissima lotionem mul-  
sam aquam respargunt. Elaterium opti-  
mum esse constat, laeve, non pondero-  
sum, cum candore leniter humectum,  
gustu amarissimum, quòdque lucerna-  
rum luminibus obiectū, facile flagret.  
Porraceum tamen scabrumque, si tur-  
bidum spectetur, atque erui cinerisque  
plenum sit, graue & vitiosum esse so-  
let. Nec desunt, qui cucumis succo  
amylum immisceant, ut candorem  
ipsū, & leuitatem imitentur. A bi-  
matu ad decennium deiectionibus vi-  
tile est. Integer modus obolus est,  
minimus semiobolus, pueris chalci duo,  
siquidem copiosius, periculum adfert.  
Bilem, ac pituitam utraque parte extra-  
hit. optima suspitiosis est purgatio.  
quòd si in animo sit deiectionem moli-  
ri, adiecto salis duplo, & stibij quod  
colorare sufficiat, ex aqua, cui magni-  
tudine catapotia dato, postea cyathus  
vnius aquae tepida sorbeatur. Ad citan-  
das tamē vomitiones aqua diluens ela-  
terium, subiectas linguae partes penitifi-  
simè penna oblinito, quòd si quisquam  
difficilius euomat, oleo, aut vnguento  
irino resoluito: somnum inhibeto, Por-  
rò his, qui eximie vacuantur, continuè  
vinum,

Elauii.

vinum, & oleum dare conuenit: etenim vomendo restituuntur. Quod si vomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, offrenda sunt. Ciet elaterium menses, & partus enecat, in pectus subditum. morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum, & diuturnis capitis doloribus liberat. efficacissimè anginis illoribus, cū veteri oleo. melle. aut felle taurino.

Cucume-  
ris sylue-  
stris confi-  
deratio.

SYLVESTRIS Cucumis frequens in Her-  
truria provenit, præsertim agro nolro Senen-  
si in oppidorum plateis, & fecus mania, & se-  
mitas. Ex eius fructibus succum exprimunt of-  
ficinæ, atque Elaterium vocatum parant. De  
quo differens Theophrastus libro i. x. capite  
x i i i. de historia plantarum, ita scribit. Sed  
omnium medicamentorum durtissimum  
Elaterium est, opimumque quod verutissimum.  
Iaque medicus quidam, vir haud insolens, ne  
quæ mendax, elaterium ducentorum annorum,  
virtute mirabili fersare apud se retulit, eo à  
quodam munere donatus. Causa, ob quam tam  
longo fersari tempore possit, i humoris copia  
est, quamobrem vel cùm præciderint, in cinere  
humidum spondit, & tamen ne ita quidem sic-  
cari potest, sed vsque ad quinquagesimum an-  
num lucernis admotum lumen extinguit. Hæc  
igitur vsque peculiaris isti tribuitur. hæstus  
Theophrastus. A quo maxime differre vide-  
tur Dioscorides: quippe qui Elaterium dixerit  
à bimatu ad decennium deiectionibus velle  
esse. Theophrastus verò, idem ducentis annis mi-  
rabili virtute fersatum esse. Quin & in eo di-  
scordare deprehenduntur, quod alter tradi-  
dit tantum humoris in se continere Elaterium,  
vt vsque ad quinquagesimum annum lucernis  
admotum lumen extinguat. Alter verò proba-  
tissimum illud esse Elaterium, quod lucerna-  
rum luminibus obiectum, facile flagret. Theo-  
phrastus subscribit Plinius libro x. capite i.  
vbi sic inquit. Elaterium vsque ad quinquage-  
simum annum lucernarum lumina extinguit.  
Hoc enim veri experimentum est, si admotum  
prius quam extinguat, finissare fersum ac de-  
formi cogat. hæc Plinius Theophrastum secutus.  
Cæterum hæc in re facile crediderim. Dio-  
scoridis codicem hoc in loco omnino deprava-  
tum esse. Quippe præter Theophrastum, & Plinij  
sententiam, cùm on ne humidum, quod pingue  
non sit, ignis flammam potius extinguat, nul-  
li profectò dubium est, quin Elaterium, in quo  
humiditas aquea multum exuperat, potius flam-  
mam extinguat, quam flagret. namque flammæ  
admotum, excitato in humidis calore flatu,  
lumen extinguit. Id quod nobis aliquando ex-  
perimento comperit esse Elaterij vires deesse

pit Mefues inter fua deficientia medicamenta, ubi in hunc fenfum inquit. Cucumis fylueftris, fuae afinus abradit, & vaforum ofcula aperit: proinde & inteftinorum tormina excitat, & alia adfert nouacula. Sed tolli hæc omnia poffunt, fi addatur aut bdellium aut tragacantha lacryma, aut aqua mulla cum filis medico- rum, ut ex lacte bibatur. Roboratur elaterij vis, addito foffitij falis momento, aut odorato puluere, quem officinae fpecies elephanginas vocantis enim admiffum feliciter quoque operatur. Purgat, vt quidam ferunt, fcammionij modo. At re vera magis pituitam delicit, quam bilem: quanuis & hanc quandoque detrahatur, præfertim cùm deiectioni parata promptaque feffe offert. Mirificæ præter hæc fan- guinis ferum expurgat, ab iis potiffimum partibus ducens, à quibus agere decumbentes hu- mores detrahi folent: quamobrem articulorum dolore vexatis opem non modicam præftat. Radix in aqua calida, tufa, & oleo fubacta cum ab- finthio, diuturnam hemicrantiam finat, incipiti, & loco dolenti illita, fi tamen prius eius deco- ctio fouerit locum. Præftat idem & fuccus ex lacte naribus immiffus, quod cerebrum purget: idcirco & narium tædia delet, & comitalis iuuat. Idem obduratos refoluit abfceffus, quem- admodum & ftreumas, præfertim addito melle, & caprino ftercore. Radicis, & cucumis ipfius fuccus aqua intercute laborantibus præftantiffi- mum eff medicamentum, quod flatim proprie educat aquam. Ad idem valet & radicis deco- ctum. Prodeft præterea arqutis, & tæcoris, & lienis obftructionibus. Item ifchiadicis, tum cly- fteribus infufum, tum etiam fi decocta radix ex- terius imponatur. Siccatæ radicis puluis, vulne- rum cicatrices attenuat ex melle impofitus: & fufigillata ex icu delet. Eiusdem fuccus fabacea farina admiffus, & limenitis modo adhibitus maculas omnes, quæ cutis nitorem vitant, mirifice dæterget. Sed animaduertendum efl, ne plufquam par fit hauriatur: quod referat va- forum oculis fanguinem eliciat. Cucumers, agreffis vires redditid Galenus libro v. i. i. fup- plicium medicamentorum, his verbis. Cucumers agreffis, & fructus ipfius fuccus, quem vo- cat Elaterium, & non minime radicis, ac folio- rum, ad medicationes accommodus efl. Elate- rium itaque menfes citat, & foetum interimit ap- pofitum, cui alia omnia amara fimul & fubtili- orum partium, maxime fi aliquam habeant ca- liditatem, veluti nimirum Elaterium. Summe fi quidem amara efl, leuiter calidum, vt ex fe- cundo fit ordine exalfacientium. Porro tale proutus quoque dgerendi vim poffidet. Sic igitur co angina laborantes inungunt quidam cum melle, aut oleo verere. Bonum item eff re- gio morbo affectis, fufum ceru lacte in nares. Hoc etiam vfu dolores capitis lenat. Atque Ela- terium quidem eiusmodi efl. At radicis fuccus, vt & foliorum, licet elaterio fimilem vim har- beat, imbecilliorè tamen. Sed & ipfa radix ad-  
fimilem

*Cucum-  
ris Sylve-  
stris Gires  
ex Galen.*

*Elatery*  
*Vires ex*  
*Stefue.*

family

similem facultatem possidet: abstergit namque, digerit, atque emollit. Porro cortex ea potentius desiccat. Huius planta Græcis *στέφης ἀγρία* appellatur: Latinis, Cucumis anguinus, sive *stis*, & erraticus: Arabibus, *Chefe allimar*, *Kate allenei*, seu *Cheha alhamar*: Italis: *Cocometo silustico*: Germanis, *Vuider cucumer*, & *Efels cucumer*: Hispanis, *Cogombrillos amargos*: Gallis *Cocombre sauvage*. Eius verò succum Græci *μαρτίριον*, Latini similiter *Elaeterium* vocant: Itali, *Elaeterio*.

Nomina.

## STAPHIS AGRIA.

CAPYT CL.



STAPHIS agria, siue herba pedicularis, folia habet labruscæ, diuisa: & cauliculos rectos, molles, nigrosq; fert florem glasti: & folliculos virides, similes ciceri, in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluescens, intus album gustu acrem. Grana quidecim, si trita in aqua mulla dentur, crassum humorem per vomitum purgant: sed qui hauserunt, ambulare debent. Prudenter tamen attendere oportet, & aquam mulsam continuò potui dare: quoniam pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo illita phthiriasi prodest: item prurigini, & psoriasis. Cit plurimam pituitam commanducata: decocta in aceto, dentium dolori, colluto ore, subuenit: rheumatismum gingiuarum sistit: vlcera oris manantia cum melle sanat. Vrentibus malagmatis imponitur.

*Staphidius* STAPHIS agria, quam officinæ Græca voce corrupta vulgò Staphisurium vocant, Latinis ab effectu, quod pediculos necet, Herba pedicularis dicitur. Hæc in istis, Dalmatia, Apulia, & Calabria, frequentissima provenit. Eius semen copiosum apud seplafarios invenitur: namque eo frequenter vtuntur medici in apo-

phlegmatismis. Id quod etiam plurimum expectitur mulieribus ad pediculos, & lentes necandos. Staphidis agriae meminit Galenus in *Astaphide* libro v. i. simplicium medicamentorum sic inquit. *Allaphis agria* vehementer acrem obtinet facultatem, adeò vt ex capite pituitam purget, quod *ἀνταρτίριον* Græci dicunt, abstergatque valenter. Itaque ad psoriam accommodata est. Sed & vrendi vini aliquam habet. Ea planta Græcis *στέφης ἀγρία*. & *ἀνταρτίριον* nominatur: Latinis, *Staphis agria*, *Vua sylvestris*, *Herba pedicularis*, & *Pituitaria*: Arabibus, *Alberas*, *Habelras*, *Muibazagi*, siue *Muibezegi*: Italis ac officinis, *Staphisaria*: Germanis, *Biszmintz*: Hispanis, *Fabarez*, *Paparriz*: Gallis, *Estaphisagrie*, & *Herbe au poult*.

Staphidius agr. sive ex Galen.

Nomina.

## THAPSIA. CAP. CLII.



## THAPSIA

nomē ideo accepit, quod in Thapso eiusdem nominis insula, primum inuenta sit. Tota verò natura ferula similis est: graciliore caule: foliis fœniculivmbella anethi in cacumine,

à singulis furculis erumpente: flore luteo: semen quale ferulae, latiusculum, sed aliquantò minus: radix foris nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro vestita. † Succo extrahendi ratio hæc est. Facto in ambitu scrobe cortices inciduntur, aut radix in forniciis speciem in se excavata cooperitur. quò merus succus confluat. oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per qualium expressus, fistili crasso insolatur. Aliqui folium vnà terunt: sed inualidior huiuscemodi succus. Hoc autem interest, quoniam qui ab radice manauit, grauius olet, & humidus permanet: foliis autem extractus exiccatur, atque teredinum iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus.



uersus vento: aut potius cū dies apri-  
cus est, & à flatu silet: quoniam ob  
halitus acrimoniā facies vehemen-  
ter intumescit, nudāque corpora in-  
uadunt pustulæ. ob id prius liquido ce-  
rato, & adstringente, nudas partes il-  
linunt, & ita muniti accedunt. Tam  
cortex radicis, quā succus purgandi  
vim habent, & lacteus succus in aqua  
mulsa potus: nam vtrinq̃ue bilem ex-  
trahunt. Radicis modus, quaterni o-  
boli, cum tribus seminis anethi drach-  
mis: succi, terni oboli: lactis, obolus  
vnus. quod eo amplius assumitur, pe-  
riculosum est. Huiusmodi purgatio  
conuenit suspensiosis, & diuturnis la-  
terum doloribus, reiectionibusque:  
datur in cibis, aut obsonio, quibus dif-  
ficile sit vomere. Tam radix, quā  
succus omnium maxime, quæ pares  
cum eis vires adepta sunt, vim habent  
extraetoriam ex alto, vbi ex imo ali-  
quid enocandum est, aut meatum la-  
xitas aliō transferenda est. vnde suc-  
cus illitione, aut radix recens affricu  
alopecias explent. Radix, succusque  
cum aquis ceræ, thurisque portioni-  
bus, sugillata, liuorēque tollunt: sed  
non plus binis horis dimittantur: lo-  
cus deinde aqua maris calida fouea-  
tur. Viria cutis in facie emendat, cum  
melle illitus succus: lepras tollit: tu-  
bercula discutit, perunctus cum sul-  
phure. In diuturnis pulmonum, late-  
rum, pedum, articularūque valetu-  
dinibus vtiliter illinitur. Valet ad in-  
tegendam colic glandem iis, qui na-  
tura, non circumcissione curti sunt: tu-  
morem enim excitat, qui pinguium  
forti emollitus, præputij iacturam re-  
sarcit.

lus seminis vsus. Nasctur tum alibi, tum in  
terra Attica, in qua pecudes incolæ eam non  
tangunt, peregrinæ verò depascūt: & aut alius  
soluitur, aut intereunt. hæcenus Theophras-  
tus. Thapsiam author est Plinius lib. x. 111.  
capite x. 111. à Nerone claritatem accepisse,  
eius magno vsui fuisse sui imperij initio, quod  
nocturnis grassationibus conuerberat faci-  
ciem illinens sibi cum thapsia, thure, & cera,  
sequenti die contra famam cutem fynceram  
circumferret: etenim ea mirum in modum su-  
gillata delet. Thapsia plurima nascitur in Apu-  
lia, præsertim Gargano monte, inter complu-  
res ferulacei generis plantas. Provenit & in no-  
stris maritimis locis adeo ferulæ adsimilis, vt  
non facile, nisi à rei herbaria peritis, vna ab  
altera dignoscatur. Visitur etiam hodie in hor-  
tis ad spectaculū plantata, qua ratione iam fer-  
me omnibus innotuit in Italia. Cæterum non  
desunt impostores, qui Thapsiæ radicem cor-  
tices pro Turpeto vendunt: quæ quidem à  
peritis seplasiariis in ea medicamentis iure opti-  
mo addi possunt, quæ Thapsiam exposcunt:  
sed in turpeti locum non sunt, meo iudicio,  
recipiendæ. Quapropter maxime in hoc (vt  
superius diximus in Tripsolij commentatione)  
à Fuchio dissentimus, qui Turpetum à Me-  
sæe descriptū, nil aliud esse censet, quā Tha-  
psiæ radices. Thapsiæ vires memoria prædi-  
dit Galenus libro 1. simplicium medica-  
mentorum, sic inquit. Thapsia acrem habet,  
ac vehementer exalfacientem facultatem cum  
humiditate. Quamobrem ex alto violenter  
extrahit, & ipsū quod extraxit, digerit.  
Verū plusculum ad ea efficienda tempus pos-  
tulat, vt quæ largè extremitatibus humida-  
te impleta est, ob quam celeriter corrompi-  
tur. Et libro primo de compositione medica-  
mentorum secundum locos, sic inquit. Qui  
Thapsia vitur, sciat opus est, maximam dif-  
ferentiam esse recentis ad vetustioris. Vis  
enim huius pharmaci post annum multum  
exoluitur, atque amplius adhuc post duos an-  
nos, assimūque ferè dicere eam penitus inu-  
tilem esse ad triennium progressam. Hæc vt  
Græcè *δαψία*, ita etiam Latine, & Italice *Tha-  
psia* nominatur: Muritanis, *Niantem*, & *Diz.*  
† Hoc loco Græci codices habent *δαψία*,  
quod verbum Ruellius verterat *hec*, lac ex-  
trahitur, licet alibi, vt in panace Hieracæo,  
idem vertat, succus excipitur. Nos v. o.,  
quod *δαψία*, à quo verbum illud defluxit, suc-  
cum, liquorem, & lacrymam significet, ma-  
luisse reddere, succus extrahitur. Neque  
certè temere, quod non solum nobis conue-  
niat cum Marcello interprete, sed quod etiam  
arbitremur hanc esse germanam illius verbi  
significationem, atque melius rem expimere,  
de qua sermo est. Huius tamen mutatz à no-  
bis versionis lectorem admonendum esse du-  
ximus.

*Thapsia  
virens  
Ga-  
leno.*

*Nomina.*

*Thapsia  
sideratio.* DE THAPSIÆ viribus locus est  
Theophrastus libro 1. x. capite x. 111. de  
plantarum historia, vbi ita scribit. Thapsiæ ra-  
dix vomitoria est, & si quis continet, tam su-  
perius, quā inferius purgat. Ad hæc liuida  
tollere potest: suppurationes tamen aliās ex-  
albidas facit. Succus eius validior est, & qui-  
dem tam superius, quā inferius purgat. Nul-

SPARTIVM.



SPARTIVM. CAP. CLII.

SPARTION frutex est longas ferens virgas, sine foliis, firmas, fractu contumaces, quibus vites vinciuntur: semen lenticulæ, in folliculis phasiolorum modo nascens: floræ, vt albæ violæ, luteum. Purgant per superna vehementer ellebori vice, citra periculum flores, & semina quinis obolis in aqua mulsapota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tuis, extractus succus, ischiadicis, & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clystere: strigmenta autem elicit cruenta.

*Spartij cō  
fideratio.*

TANTA nimirum inter Spartiū, siue Spartum, & Genistā intercedit similitudo tum facie, tum etiam viribus, vt eorū affinitate deceptus iam crediderim omnino errasse eos, qui alterū ab altera scernerent: præsertim cum hac in reprehendissimè Plinium dubitasse libro x x i i i . capite i x . vbi ita scriptū reliquit. Genista quoq; vinculi vsum præstat. Flores apibus gratissimi. Dubio an hæc sit, quam Græci auctores Sparton appellauere, cū ex calina pistatoria apud eos facitari docuerim: & nūquid hanc designauerit Homerus, cum dixit: Nautiū sparta dissoluta. Nondū enim fuisse Aphricanum, vel Hispanū spartum in vsu certū est: & cum fustes fierent naues, lino tamē, non sparco vnquā futas. hæc Plinius. Verū cum accuratius Dioscoridem perlegissem, hac de re prius admonitus à clarissimo medico Petro Can-

GENISTA.



nizero Hispano Serenissimi Ferdinadi Romanorū Regis Protophyfico, qui in Hispania copiosissimū Spartum, numerosamq; Genistam se vidisse testatur est, cōperi planè inter has plantas discrimen esse. Quippe quod Spartiū Dioscoridi frutex sit foliis viduus: & floribus constet albæ violæ similibus. Genista verò folia proferat longiuscula, lini ferè modo: & flores luteos, pisti modo lunatos. Hinc itaq; factū est, vt nunc in eorū sententiā consilia, qui Spartiū à Genista differre existimant. Non tamē quod diuersi prorsus generis has plantas esse putent, nam tanta, vt dixi, vni cū altera cognatio est, vt eorū non eadē sint, tamē cōgeneres esse videantur. Sparti quidē vsus (vt Plinius est auctor libro *Sparti G. x x i . cap. i i .*) multa post secula cōceptus est, *sum ex Plā* nec ante Porrorū arma, quæ primū Hispaniæ *mo.* intulerūt. Herba & hæc sponte nascēs, & quæ nō queat feri: iunctisque propriè aridi soli, vni terræ dasovio. Nanq; id malū telluris est, nec aliud ibi feri, aut nasci potest. In Aphrica exigū, & inutile gignitur. Carthaginensis Hispaniæ citrioris portio, nec hæc tota, sed quatenus parit, montes quoque Sparto operit. Hinc strata rusticis eorū hinc ignis, facesq; hinc calcesamina, & pastorū vestis. Animalibus noxiū, præterquam cacuminū teneritate. Ad reliquos vsus laboriosè euellitur: oc. earis cruribus, manibusq; tectis mancis: conuolutū ossis, ligneisq; conamētis. Vulum fascibus in aceto adunatū biduo, tertio resolutū. Spargitur in sole, siccaturq; & rursus in fascibus reddit sub tectis. Postea maceratur aqua marina optimè, sed & dulci, si marina desit. Siccaturq; sole iterū rigatur, si repenti urgeat desiderii, persusum calida in folio, ac siccatur flans compendii opere facietur. Hoc autē tunditur, vt fiat vile, præcipuè in aquis marisq; inuictum. In secco præferunt è cannabi funes. At sparti altius etiā demersum, veluti nataliū stium pensans. Est quid-

dem eius natura interpolis : rursusque quam libeat ventum nouo miferetur. Veruntamen complectetur animo, qui vult miraculum æstimare, quanto sit in vña omnibus terris nauum armamentis, machinis ædificationum, alijsq; desiderijs vitæ. Hactenus de sparto Plinius. Cæterum Genistæ in Hetruria adeo frequentissimæ pronuntiant, vt Maio, & Iunio mensibus magnum & iucundum spectaculum præbeant viatoribus, quoniam tam copiose suis speciosis, ac fulgentibus floribus ornantur, & vestiuntur colles, vt procul auri videantur. Gaudent ærum floribus apes, vt Plinius inquit: proinde alucaris circumferuntur. Genista nobis ligandis vitibus salicis vicem explet, maceaturq; etiam cannabis modo, suntq; inde funes, & rudia lintamina, quæ conficiendis saccis apertissima sunt. Expetitur Genistæ lignum etiam figulis, qui in Italia id vasorum scilicet genus conficiunt, quod vulgò de maiolica vocant: quippe quod (vt ipsi affirmant) nullo alterius arboris ligno fornax succendi possit, quo aureus ille color conferetur in opere. Genistam

Genistæ  
fibratio.

Genistæ de  
scripta, ex  
vires ex  
figue.

recentiuit Mesies inter sua simplicia deiectione facultatis, vbi hæc ad sensum scribit. Genista arbor est montana, è cuius caudice quam plurimæ funduntur virgæ, rectæ, flexiles, fractu centumaces, quibus vites, & alia ligantur. Flores edit flavos, lunari figura: è quibus siliquæ prodeunt, erui magnitudine: & semina in eis lentis similia, interuallis distincta. Planta tota perturbat, pronocat, incidit, attenuat. Obest cordi, & ventriculo. Sed tollitur noxa (vt Philagrius est author) addito rhodomelle, aut rosæ, & mastiche, quin & anisi, dauci, & feniculi semine. Eporum semen pituitam vtrinque valentissimè purgat, & ab articulis quoque humores trahit. Renum excrementa pellit, vrinam esse efficacissimè, & calculos dissumpit tam in renibus, quam in vesica: nec in his materias figi, & in calculum durescere sinit. Flores contriti strumas auferunt, si cum melle rosaceo, aut forbili onò deuorantur. Fit ex iis oxymel, cuius vsu indurati lienes resoluuntur. Prostant ischiadici, podagrici, calculosiq; si postquam illos sumperint, subinde frequenter euomant ægri. Modus, præsertim floribus, à drachmis duabus ad quinque: seminis verò à drachmis duabus ad quatuor, hæc Mesues. Qui tamen Genistæ semen non rectè obseruasse videtur, quandoquidem id erui, vel vicicæ faciem potius referat, quam lentis. Sparti, vt iam ad eius vires redeamus, meminit Galenus libro 1111. simplicium medicamentorum, his paucis verbis. Sparti, quo & vites apud nos alligant, tum feracæ, tum virgarum succus non insensum trahentis est facultatis. Quod Græci *εὐκρίπτε*, Latini item Spartium & Spartum dicunt Itali, Spartio. Quæ verò Latinis Genista, Itali Genestra vocatur: Hispanis quoque Genestra, Giesta, & Giestra: Gallis autem, Geneste.

Genistæ  
res ex Ga  
lena.

Nomina.

SILYBON lata spina est, folia serens chamæleonis albi. Hæc recens cum sale oleoque cocta estur. Radicis succus drachmæ pondere potus vomitiones ciet.

HACTENVS non ex nostra tantum, sed neque ex aliorum quoque inquisitione verum ac legitimum Silybum in Italia nobis licuit reperire. Et quauis inter tot alias plantas aculeatas inibi nasci, & esse possit, tamen tam paucis eius notas explicauit Dioscorides, vt difficile admodum illud inuentu iudicem: neque enim ipse, vt ingenuè fatear, quod ex illis sit, ausum decernere. Vt Græcis *σάμβυκος*, ita pariter Latinis Silybum appellatur.

Nomina.

#### GLANS VNGVENTARIA. CAPVT CLIIII.

GLANS vnguentaria fructus est arboris myricæ similis, magnitudine auelanæ nucis, cuius nucleus amygdalarum amararum more tritus, humorem reddit: quo ad pretiosa vnguenta pro oleo vtuntur. Nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Indæam. Præfertur plena, recens, candida, quæ faciliè delibretur. Ea drachmæ pondere pota lienem absumit: cum lolij farina, & aqua mulsâ podagricis illinitur. Pforas, leprasque, decocta in aceto: vitiligines, & nigras cicatrices cum nitro emendat: & cum lotio lentigines, varos, & papulas in facie, & cutis vitia tollit. Vomitiones mouet, & aluum cum hydromelite resoluit: stomacho aduersatur. Oleum, quod ea exprimitur, aluum potu ciet. Cortex eius magis adstringit: verum tusa, & expressa succus abstergentibus medicamentis adiicitur, quæ aduersus pruriges, & scabritias idonea sunt.

GLANS Vnguentaria, quam Græci *βάρβαρος* *Γλάνδα* *υπερσπύκη* dicunt, in Hispania frequentissima gignitur. Adfertur hodie copiosa in Italiam. Vnguentarij, ac seplasiarij Mauritanorum nomina secuti, eam Ben appellant. Forma hæc pistacia maximè refert, albo cortice, triquetrorum, fractu facili, nucleo intrinsecus conferto, & admodum pingui: ex quo oleum exprimitur, quod de Ben vocant. Magnificum id vnguentarij, quod quauis diu inueteratum, nunquam ran-

corem sentiat, vt etiam libro primo suo loco monuimus. Arabice familie auctores (vt modo dictum est) vnguentarium glandem Ben nominant. Proinde de ea inter sua soluentia simplicia scribens Mesues, in hunc sensum inquit. Ben duorum est generum. Maius est nucis ouellanae magnitudine, triangulare. Minus vero ciceri simile. Vtrique inest oleosa medulla, lenis, & alba. Præstat maius, quod noxa vacet: minus siquidem noxiu est. Præfertur in maiori genere, quod putamine sit albo, læui, tenui: nucleo fragili, albo, oleosoque. Verustum recentius melius. In minori autem præcellit in cinereo albicans, fragilis pariter, & pinguis. Dioscoridi tamen in maiori genere (minoris enim non meminit, quemadmodum nec Theophrastus, neque Plinius) præstantius est recens, etsi contrarium asserat Mesues. Oleum ab vnguentariis hoc tempore è nucleis tantum exprimitur, vt Dioscorides docuit, non autem, vt quidam existimant, ex putaminibus quod dixerit Theophrastus, vnguentarios putamine fructus confuso vt solere. Plinius, vt Theophrasti, & Dioscoridis sententiam comprobaret, vnguentarios prodidit è putaminibus, medicos vero è medulla oleum elicere, quod hoc medicamentis, illud odoramentis vsum præbeat. Verum tamen hac ætate (vt diximus) ab omnibus tantum è nucleis à putamine repurgatis exprimitur. Nec crediderim vnquam, quod ex folis putaminibus oleum effluere possit, quanuis diligentissimè comprimantur, & constellation prælo, etiam grauissimo: quoniam hæc putamina arida sunt, & omni profusus humore carent. Illud quoque fidem non dubiam facere potest, quod hanc parandi olei ratione silentio prætermisit Dioscorides, non modo in hoc loco, sed etiam libro primo, vbi tamen de oleis, & vnguentis conficiendis latius disseruit. Cuius fortè doctrinæ immemor Manardus Ferrariensis, vir aliqui nostræ ætatis celebris, dubitat in adnotationibus, quas in Mesuem edidit, an Vnguentariæ glandis oleum è nucleo, an è putamine exprimi debeat, asserens quanquam in quibusdam Dioscoridis codicibus legitur, oleum hoc è nucleis exprimi debere, in aliquibus tamen nec nucleorum, nec putaminum vliam fieri mentionem. Verum etsi ambigendi non desuerit occasio, præferim ex Theophrasti testimonio, quod putaminibus vti vnguentarios tradidit, aderat tamen grauissimus author Galenus, qui rem hanc abunde enucleauit. cum constanter assereret, Balaninum oleum vnguentariis ex carne nucleorum, non ex putaminibus exprimi. Id quod etiam faciliè ex Dioscoride colligi potest, cum dicat consimili modo fieri balanum & amygdalum, quod autem hoc ex amygdalarum nucleis fiat, nemo est qui dubitet. Hæc sanè nobis non leuem faciunt suspensionem, quod aut eo in loco Theophrasti exemplaria sint deprauata, aut minus integri,

& veraces fuerint auctores, à quibus fortassis vnguentariæ glandis historiam accepit. His porro accedit huius olei communis vsus, & eius parandi ratio. Siquidem Balaninum oleum plurimum faciunt vnguentarij, nõ quod aliqua odoris præstantia commendetur (inodorum etenim est) sed quod nunquam verustate rancorem contrahat. Id scilicet quod è nucleorum medulla, non autem ex putaminibus conficiunt. Nam rancoris experti cum sit, omnium aptissimum habetur ad odoratissima vnguenta (misturas vocant) temperanda, quæ ex moscho, zibetto, & ambaro, illinendis chirotheis, & aliis, quorum in deliciis, & lasciuia omnis est vsus & gratia, parantur. Quandoquidem si hæc alio quouis oleo liquefcerent in vnguentum, contracto inde non multo post tempore rancore (ætat enim omne oleum præter Balaninum rancefcit) non modo vniuersam odoris suauitatem exuerent, sed etiam putida, fœtidaque euaderent. Quo vtique experimento apertissimè dignoscitur, an oleum illud Balaninum fuerit, quod ex vnguentariæ glandis nucleis fieri solet. Cæterum de viribus Ben hæc subiunxit Mesues. Maioris, inquit, generis fructus incidit, abstergit, attenuat, expurgat, & aperit: sed ventriculum subuerit, & viscera perturbat, ob extreme nitiditatem, acremque humiditatem, quam possidet. Minoris autem vi longe vehementior, & magis periculosa: namque adeo perturbat, agitatque humores, vt sepius animæ deliquium faciat, & frigidos sudores concitet. Proinde non in alios vsus is admittendus est, quoniam in vnguenta, & caraplasmata. Maioris noxa demitur, cum igne torrefcit: siquidem ignis calore exuperantem perdit medicamentum, quæ vomitionem mouet, siquidem medicamentum tantum deiectionum. Decoquitur etiam cum aniso, & feniculi semine: quoniam hoc modo prior noxa corrigitur. Tam in potu, quam aliter sumptus lentam, crassamque pituitam, vomitu, & deiectione purgat. Ideoque aptissimum medicamentum est coli cruciati-bus non modo haustus, sed etiam clysteribus infusus, præsertim vbi à flatu, & pituita ortum habuerint. Fit etiamnum ex contritis ipsius nucleis, polenta, & melle admixtis, cataplasma ad strumas, durosque tumores admodum vtile, & ad nervorum morbos à frigida etate excitatos, addito tantum melle, quo fit, vt consensilis, resolutus, & contractus opere terat non obsecram. Poller præterea ad ictericis, & lenis infarctus duritiesque, si addita lupinorum farina, & nardo emplastri modo imponatur. Nucleorum oleum vulnere cicatrices attenuat, & delet: item lentigines, aliasque cutis fœditates emendat. Auribus infusus non modo doloribus leuantem præstat, sed & surditatem, & tinnitum curat. Glandis vnguentariæ vires memorat Galenus libro sexto, simplicium medicamentorum, his verbis. Balanus myreplice, hoc est, glans vnguentaria, adferitur ex

Glans vnguentaria  
Gules ex  
Mes.

Manardi  
d. b. s. s. f.  
lin. m. p.

Glans vnguentaria  
Gules ex  
Gal.  
barta

barbarica regione. Vtuntur vnguentarij carnis eius succo, qui facultate calidus est. Reliquiæ autem, vnde expressus est succus, terrestres scilicet, & duræ, vincentem habent qualitatem amarain. Sed & admixta est quædam adstrictio. Proinde exergentem simul, & incidentem, contrahentemq; & stipantem effictum possident. Itaque ad ionthos, lentiginis, ephelin, & pruritus, deinde & ad psoram, & lepram conueniunt. Verum enimvero & lienes liquæ, iecurque indurefcent. Quod si quis carnem eius drachmæ pondere cum melicrato bibat, medicamen experietur vomitoriū. Sæpe etiam per infernam aluum largiter subducit. Itaque cum hoc medicamento vitmur, ad vicerū expurgationem, & maximè iecinoris, lienisq; ex oxycrato ipsum exhibere consueuimus. Gaudet verò vel maximè aliqui aceto ad extrinsecas actiones. Aded enim efficax efficitur, vt & psoras, & lepras extergat, & multo etiam magis quæ his sunt minora, lentiginem, vitiliginem, ionthos, ephelin, exanthemata, psoras, tū vicerosa, & quæ crassi sunt succi omnia. Sed & cicatricibus decorè adfert. Porro quod cum illinenda est leni, præster admixtam esse farinam quampiam exiccantium, cuiusmodi est erui, ac lolij farina, id iam potius ad componendum medicaminū tractationē, haudquam ad præsens institutum pertinet: sed & in paratu facilius ipsum dicitur. Verè in præsens sufficit abstergentem, & incidentem cum adstrictione quapiam propositi medicaminis dixisse facultatem, ac sic ad aliud transgredi. Cortex tamen eius admodum adstringit: itaque eo possit quis ad ea vt, ad quæ valida vñt est adstrictio, hastenus Galenus. Sed quoniam Balanus myrsipha Mauritiorum Myrobalano nobis ad memoriam reuocauit, quoruq; iidem quinque faciunt genera, cum ea in medicamenta frequenter, & commodè veniant, nec eorum, quod extet, meminerint veteres Græci, ideo nunc de iis nobis differendum est: neque enim ab eorum vñs silentio erant dissimulanda. Sunt itaque, vt diximus, MYROBALANORVM genera quinque: nempe Flaua, Chepula, Indica siue nigra, Empelica, Bellerica: quæ omnia facie inter se distant, vt etiam viribus. Quamobrem omnino censendū esse putauerim, ea à diuersis produci arboribus, quanquā non desint, qui affirmant, flaua simul, & chepula ex vna & eadem arbore nasci, existimantes flaua decerpi ab arbore immatura, chepula verò cum vicinam adeptam fuerint maturitatem. Verum cum horum fructuum ortus, & arbores nos prorsus lateant, non est quod illorum sententiam probare, aut rescillere auiam. Recensentur genera omnia inter ea medicamenta, quæ alium citra noxam desiccant: nam etsi purgatoria vi possent, nulla tamen viriū imbecillitate, aut molestia fumentes efficiunt, sed potius sua adstringenti facultate, quam possident, cor, iecur, & ventricu-

culum roborant, quin etiam vniuersum corpus. Id tantum illis noxæ ascribunt, quod obstructiones, & viscerum infarctus augeant: proinde ne obstructis exhibeatur præcipiunt. Infrantur Myrobalanis medicameta omnia, quæ desiccant laborem inferunt: quo fit, vt vtiliter adificentur scamoniis. In flauorum Myrobalanorum genere ea cæteris præstant, quæ in viridi plene flauescunt, ponderosa, facta, gummosa, crassi corticis, & quibus pumilum officulum inest. E Chepulis ea probantur, quæ cæteris crassiora sunt, colore nigro purpurascente, cortice crasso, & quæ in aquam desicta fundum quam citissimè petunt. Inter Indicæ excellent, quæ maximè nigricat, crassa, ponderosa, nullo incus osse, & quæ confracta in vnum compacta cernuntur. In Empelico-rum classe laudantur, quæ in maiora, crassiora, densiora, ponderosioraq; frusta diuiduntur, & quæ minus ossis, quam pulpa habent. Bellericorum verò illa in suo genere præstantur, quibus crassities, densitas, grauitasq; non desit, & quibus crassus in vniuersum sit cortex. Flaua, Indica, Chepula, Bellerica refrigerant ordine primo, siccingque secundo. Empelica verò primo tantum tum refrigerant, tum exiccant. Vim obstructoriam exuunt omnia genera, adiectis aperientibus, & vrinam cientibus medicamentis: vel si macerata caprino sero, aut fumarie succo exhibeantur: vel si cum absinthio, aut agarico, aut rhabarbato hauriantur. Perfunduntur amygdalino, & sesamino oleo, vt contracta inde pinguedine, ventriculo non inharrent. Quin & id noxæ pariter tollitur, vbi cum casta nigra medulla, aut magna, aut acidis palmulis deo-rentur. Vbi desiccatione fit opus, eorum tantum dilutum præbet: vbi autem adstrictio in puluerem conterunt, & subinde propinant. Chepula quæ saccharo conduntur magis roborant, quam desiccant. Contrarium efficiunt, quæ cruda siccatique reponuntur. Myrobalana omne genus (vt Mésues est author) eorum senectutem remorantur, qui ipsis frequentè res-viuntur: colorem faciunt elegantiores, corpori odorem iucundum conciliant, hilaritatem effertur, & ventriculum, cor, & iecur roborant, conferunt hæmorrhoidibus, & bilis feruorem reprimunt: ad quod flaua cæteris præstant, vt quæ priuatum bilem detrahant: & eos peculiariter iuuent, qui temperamento calidi sunt. Fricantur cote ad oculorum collyria, cum vix æcerba, aut rosarum aqua, aut feniculi succo, quod oculorum inflammationes reprimant, lacrymas sistant, defluxionesq; cohibeant. Sanantur horum puluere vlcera, addita lentissima resina. Chepula pituitam exhauriunt, intellectum clarificant, & visum, præsertim saccharo asseruata, ventriculum tum mundant, tum confirmant. Dantur febriter aqua intercutie affectis, & diuturnis febribus laborantibus. Nigra vtranque bilem trahunt,

Myrobalanorum & uera.

Myrobalanorum & uera.

præsertim exuliam. Conferunt membrorum tremotibus, coloris nitorem conciliant, elephantiacos iuuant, meriores auferunt, & quartanam fugant. Empelica pituitam educunt, cor, & cerebrum corroborant, intellectum augent, ventriculum à pituita, alijsq; noxiis humoribus expurgant, ac etiam confirmant, ac sicut extinguunt, vomitiones cohibent, & cibi appetentiam inuitant. Bellerica ea omnia possunt, quæ & proximè dicta. Myrobalanorum inter recentiores Græcos tantum, quod seism, Actuarij meminit: qui tamen ea, quæ de illis scripto reliquit, à Mauritanis (vt ipse quoque fateri videtur) mutuauit est. Sed profectò nescierim, quâ ratione ductus inter ea medicamenta, quæ vomitum eliciunt, myrobalana reposuerit. cum omnia eorum genera planè vomitiones compescant. Porro hodie igeorata videtur quæ *myrobala* Græcis vocatur, digerens, & roboras Index nardi modo, ad colicos affectus, ventriculi ardore, & singultus à Galeno Asclepiadis auctoritate commendata libro v l i r. & l x. de compositione medicamentorum secundum locos. quamquam non desunt & recentioribus, qui sibi persuadeant Chrysobalanum esse nucem myrsiticam: cum tamen plura sint, quæ eorum destruant sententiam, nempe cinereus color, acutus ori sapor, & quod myrsitica nuncis nusquam meminerint veteres Græci. Nul-  
lām huiusce, quod legerim, mentionem fecit Galenus in libris simplicium medicamentorum. Id quod argumentum esse potest, Galenum ipsum non habuisse compertum, quid esset Chrysobalanum. Sed de his hæcenus. Cæterum quandoquidem Balanus myrsitica, quā ab Arabibus Ben appellari diximus, nobis in mentem redegit radices illas, quas officinæ Behen album, & rubrum vocant, ad cordis affectus iis, ac etiam recentioribus experitis, hunc locum non prætereundum esse duxi, quin de iis quoque aliquid differere, præsertim quod è Græcis non inueniatur, qui illa posteritatis memorie prodiderit. Sed illud in primis animaduertendum est, quod communis vsus radices, quas vulgò Behen nuncupant, ex quibus non sunt, de quibus Mauritani scripsere, imò eas prorsus euenturur. Siquidem scribit Serapio, Behen radices proferre minoris pastinacæ similes, contortas, odoratas, & manu lentas, & in Armenia nasci. Auienna autem radicem lignosā frustā Behen esse ait, in se contracta, & siccitate exolera. At nostrates, quæ in Italia, non in Armenia effoditur, nulla penitus odoris suauitate commendatur: quin & manse nullum ori lentorem reddunt, nec erraticæ pastinacæ faciem representant: cum tamen Arabicum Behen radicibus adeo pastinacæ referat, vt scripserit Haliabbas clarissimis Mauritanorum author, Behen & syluestris pastinacæ radices nullum inter se discrimen habere. Quo fit, vt nulla sese offerat no-

bis ratio, qua probare possimus, Behen communis vsus esse Arabum legitimum: quanuis & ipsi inter se hac in historia non parum dissentiant. Nicolaus Myrsiticus, itemq; Actuarius Behen hermodactylum vocant, nescio tamen quâ ratione, cum alia sit radix apud Paulum, & Arabes hermodactylus. Behè adulterina, tam album, quam rubrum, passim in Italia proueniunt. Sed quibus pollutis viribus, nondum mihi compertum esse ingenuè fateor. *Balanus myrsitica* sic Græcis dicitur, Latinis verò Glans vnguentaria: Mauritanis, Habben, seu Ben: Italis, Ghianda vnguentaria: Hispanis, Auellana de la India, Tartago, & Muia.

N. m. m.

## NARCISVS.

## CAP. CLV.



NARCISVS sunt qui vt lilium, liliū appellarint. folia proferit porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora: caulibus, & sine foliis, supra doratē attolitur: flos albus, intus croceus, in quibus-

dam purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen velut in tunica, nigrum, longum. Probatissimus nascitur in montibus, suauis odore: ceteri porrum imitantur, atque herbaceum virus olent. Radix costā, siue estur, siue bibitur, vomitoria est: ambustus igni prodest cum exiguo melle trita. præcisos nervos illita glutinat: luxatis malleolis, diuturnisque articularum doloribus trita ex melle, & imposita subuenit. Vitia cutis in facie, vitiliginēsque cum semine vriticæ, & aceto emaculat: cum eruo, & melle, vlcera fordes expurgat: abscessus rumpit concoctioni repugnantes: infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina, & melle.

*Narcissi* **NARCISSVS**, inquit Theophrastus libro & cap. vi. de historia plantarum, vel li-  
*historia* bro & cap. vi. de historia plantarum, vel li-  
*theophrasti* rium (alij enim hoc, alij illo nomine vocant)  
*ffo.* folium albus, terræ proximum gerit, sed longelatus, lilij modo. Habet caulem sine folio, herbaceum, florem suo fecerunt cacumine, in membrana veluti vasculo inclusum, largè amplum, colorèq; nigrum, figura oblongum. Hic decidens sponte germinat, ceterum & qui legunt defigere eum solent. Quin & radicem ferunt, quæ carnosâ, rotunda, amplâq; constat. Serotinus admodum: post ærurum enim, & circa æquinoctium floret. Hæc Theophrasti de narcissi sententia. Porro Plinius libro xxi. cap. xxi. duo Narcissi genera prodidit, quæ his verbis etiam depinxit. Narcissi duo genera in usu medicæ recipiunt. Vnum purpureo flore, alterum herbaceum. Hunc stomacho inutilem, & ideo vomitorium, alios quoque solentem, neruis inimicum, caput grauante, & à narce  
 20 narcissum dictum, non à fabuloso puero. hæc Plinius. In quibus planè deprehenditur à Dioscoride dissentire, quod neutrum Narcissi genus flore albo descripsit, quanquam idem Plinius cap. v. eiusdem libri inter lilij genera Narcissum connumerans, hunc flore candido constare tradidit. Veruntamen nulli ex hoc mirari hæcet, neque propterea Plinium damnandum esse censeo, quod viderim ego plures Nar-  
 30 cissi species florum tantum varietate distinctas. Narcissi vires retulit Galenus libr. vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Narcissi radix vsque adeo exiccant facultate pollet, vt & maxima vulnera conglutinet, vel ad incisiones vsque, quæ circa tendones accidunt. Habet verò quiddam absterforium, & attractorium. Planta, quæ Græcis *νάρκισσος*, Latinis item Narcissus appellatur: Arabibus, Narcēs seu Narcies: Italis, Narcisso: Germanis, Vehtblumen, Hornungsblumen, & Zeidosen.

*Narcissi*  
*vires ex*  
*Gal.*

*Nomina.*

#### HIPPOPHAES. CAP. CLVI.

**HIPPOPHAES**, quo fullones vestes interpolant, in fabulosis, maritimisq; nascitur, fursulacæo frutice, vndique denso, & largo: folijs oleæ longioribus, mollioribusque: inter quæ candicantes spinæ emicant, sicæ, angulosæ, interstitio quodam distantes: flores hædræ corymbis similes, recentim coherant, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescences: radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti: ex qua perinde ac thapsia, succus eximitur, qui per se, & cum erui farina subactus, siccatur, & ad usum

reconditur. Syncerus pituitas, bilem, aquâque deicit, oboli pondere: erui verò farina subactus, quatuor obolis, cum aqua mulsâ. Frutex cum radicibus siccatus tunditur, & cum aqua mulsâ dimidia hemina tritus datur. Radice, & herba liquamentum depromitur, vt in thapsia, huius in purgationibus modus est drachma.

#### HIPPOPHAESTVM. CAPVT CLVII.

**HIPPOPHAESTON**, id quod aliqui hippophaes appellant, nascitur eisdem locis, quibus hippophaes, est quæ spinæ fullonæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas habens molles, crassas. Succus radice, folijs, & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus, cui voles, tribus obolis in aqua mulsâ, aquam pituitâsq; detrahit: priuatim comitialibus morbis, neruorum vitiiis, & orthopnææ conuenit huiusmodi purgatio.

Et si quandoque maritima, & fabulosa adierim loca, vt Hippophaem, & Hippophaesium, vtpote plantas inibi nascentes, inquirens, neutrum tamen hætenus mihi licuit inuenire. Ceterum retulit nobis Hieronymus Amaltheus Optergeus, medicus ingenio, & eruditione clarus, se olim Venetiis plantam accepisse à Iohne Baptista Zopis Papiensi clarissimo medico, quæ non modo notis omnibus Dioscoridis Hippophaem referebat: sed etiam viribus, vt se experimento comperisse testatur est. Quare non proflus de sperandum est, quin & nobis, & alijs quoq; aliquando contingat Hippophaem consequi. Non inuenio, quod Galenus hippophaeis, aut hippophaesi meminerit in suo simplic. medicam. censu. Hippophaeis tamen mentione fecit Paulus lib. vii. inter simplicia. Hippophaesti verò Plinius libro xxi. cap. x. Illius nomen Græcum *ἵπποφαῖς*, Latinum quoque Hippophaes. Huius *Nomina*, verò nomen Græcum *ἱπποφαιῶν* Latinum item Hippophaetum.

#### RICINVS. CAP. CLVIII.

**RICINI**, aut croton, nomen accepit à ricini animalis similitudine. Arbor provenit parua: ficus altitudine, folio

platani, maiore, læuiore, & nigriore: ramis, caudicibusque cauis, in arundinis morē: semine in vuis asperis, quod corticibus exutum ricinum animal representat, ex quo osium nomine cicinum exprimitur, cibus sedum, lucernis emplastrisq; vtile. Grana triginta numero purgata, trita potu pituitas, bilem, aquamq; per aluum extrahunt, vomitionesque mouent, sed iniucunda admodum est, & molesta purgatio: siquidem stomachum vehementer subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie, varosque expurgat. Folia cum polenta trita inflammationes oculorum, tumoresque leniunt: turgentibus mammas cohibent, eadem ex aceto illita, ignes sacros restinguunt.

*Ricini cō-  
sideratio.*



subfres autem plumbus in locis Mirafale, quamquam id nominis potius Heliotropio conuenit de quo in huius libri calce differemus. Semen officinae Cheruam maiorem appellant: rametis ab ipso Mesue, cuius vestigia pharmacopoeae maxime sequuntur, Regium granum appellari consuet. Ricinus copiose fertur in Aegypto, vbi ex eius semine plurimum olei exprimitur, cibus quidem sedum (vt inquit Plinius) sed lucernis vtile. Desicit aluum, perinde ac balanus myrpicus, tolliturq; eius noxa iisdem medicamentis. Quamobrē de eo sic loquitur Mesues. Regium granū (hoc est Ricini semen) pituitam, tam per vomitum, quam per aluum extrahit, sed non sine affumentum molestia: quinetiam bilem, & aquam inter curam deiecit: & ea sine omnia excrementa purgat, quae ad articularum compages defluunt. Coniunt item coli, & ar-

ticularum doloribus, nepe podagricis, & ischiadicis, si ex iure veteris galli decoctū hauriatur. Hydropicis verō decoquitur cū caprino sero, *Ricini res ex* aut emulso recenter lacte maceratum. Ricini vires memoriae prodidit Galenus libr. v. t. t. Gal. simpl. medic. sic inquit. Ricini semen, quemadmodum expurgat, detergit, ac digerit, sic quoque foliū, sed vndequeque debilius. Oleum quod ex semine conuehit, tum calidius, tum tenuiorum partium est, quam oleū commune, ac proinde etiam discit. Planta, quae Graecis *κινος*, siue *κίνηρος*, Latinis Ricinus appellatur: Arabibus, Cherua: Italis, Girasole: Germanis, Vunderbaum, & Creuthzbaum: Hispanis, Figueira de Ihimferno: Gallis, Pauline dieu.

#### TITHYMALI. CAP. CLIX.

TITHYMALI genera septem, quorum masculus characias appellatur, ab aliquibus amygdaloides: alter myrtites, qui scemina exsiliatur, eumque myrsinitem, aut caryitem vocant: tertius paralius, quem tithymalida appellant: alius helioscopius: quintus cyprisissis: sextus dendroides: septimus platyphyllos dicitur. Characias caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo, atque acri madētes: foliis olea circū ramos, angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignosa: pendet in cacuminibus cauliū coma iunci, sub qua caueolae foliolis balnearum similes, in quibus semen continetur, nascitur in asperis, & montibus. Succus aluum purgat, trahit pituitam, bilēmq; binis obolis in posca sumptis, & cum aqua malsa vomitiones mouet. Appetente vindemiarū tempore succus, congestis ramulis, mox dissectis, & vase concludis, excipitur. Aliqui adiciunt farinā erui, & in pastillos digerūt, qui erui magnitudine impleant. Alij in aridas ficos ternas quaternave guttas infillant, vt cum his inarescant, quas ad vsus recondunt. Per se etiā tulus in pila, & in pastillos coactos reponitur. Porro cū extrahitur lac, neq; quō ventus aspires, stare quenquam, neque manus oculis ad mouere conuenit, sed antequam colligas, corpus, praesertim faciem, collum, scrotumque genitalis, adipe, aut oleo cum vino perfrēge. Fauces autē exasperat: quapropter cataportia cera, aut decocto melle



TITHYMALVS CHARACIAS.



TITHYMALVS MYRSINITES.



TITHYMALVS PARALYS.



TITHYMALVS HELIOSCOPVS.



TITHYMALVS CYPARISSA.



TITHYMALVS DENDROIDES.



melle oblini par est, & hoc modo dari. binas tamē ternasve ficos purgationis gratia sumpsisse, satis est. Recens lac ex oleo, perunctos in sole capillos euellit, renascentesque flauos, & exiles efficit, denique omnes perimit. dentium canernis inclusum, leuat dolores: sed cera dentes oblinendi, ne suo delapsu fauces, & linguam vitiet. Tollit illius impetigines, formicantes verrucas, pensiles, & quæ thymiflorem representant. valet aduersus pterygia, carbunculos, phagedanas vlcerum, gangrænas, fistulasq; Legitur semen autumnio, & siccātū sole leniter tunditur, seruatactumq; loco mundo reponitur. Folia item siccantur semen, & folia lactei succi effectum præbēt, dimidio acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admisso cum lacte lepidio, & caseo confuso. Radix drachma pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. decocta cū aceto, dentiū dolori auxiliatur, colluto ore. Fœmina, quam myrsiniten, aut caryoten vocant, similis suapte natura daphnoidi: foliis myrti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis, & pungentibus: ramulos ab radice mittit dodrantes fructum fert alternis annis, nucī similem, mordaci gustu, nascitur in asperis. Succus, radix, semen, folia, consimilem antedicto sortuntur facultatem: sed ad erandas vomitiones inualidior hæc est. Aliud tithymali genus dicitur paralios, quem tithymalida aut mecona aliqui appellauerunt. Nascitur in maritimis, ramis subrubentibus, palmū altis, quinis, senisve a radice exeuntibus: foliis lini, angustis, paruis, oblongis, in versus quosdam digressis: capite in cacumine orbiculato, in quo semen, ut eruum, vario colore emicat: flos albus. Frutex totus cū radice lacteo succo turget. Similes ad vsus reconditur. Helioscopius dicitur, foliis portulacæ, tenuioribus, rotundioribusque: ramulis prodeūtib; a radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis: capite anethi: semine velut in ca-

pitulis incluso. Helioscopi nomen accipit, quoniam comas cum sole circumagat. circa oppida nascitur, porifissimum in rudibus. Colligitur succus, semenque, ut aliorum. Eadem, quæ superioribus vires, non tamen vsque adeo validæ. Cyparissias in caulem exit dodrantalem, vel maiorem, subrubrum: ex quo folia pini similitudine exoriantur, molliora tamē, & tenuiora: & in totum nascentem pinum æmulatur, vnde nomē traxit. Candido succo mader: cui eadem vis, quæ superioribus. In petris nascens qui dendroides cognominatur, ampliter opacat, in cacumine frōdosam spargens comā, succo lacteo prægnans, cauliculis rubentibus, foliis myrti tenuioris, fructu characiæ. Eiusdem effectus, cuius superiores, similiq; modo reconditur. Platyphyllus verbasco similis est. Radix, succus, & folia per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tufus, & aquæ insparfus. Reliqua tithymalorū genera, quæ superscribuntur, idē efficiunt.

TITHYMALORVM omne genus officinæ Esulā indifferenter appellant, quoniam plurima sunt tithymali genera, quorū hīstoriā satis confusē Mauritanī tradiderunt, quo fit, ut apud nos sine magno labore tithymalorū genera credē, & distinctē cognoscei possint: quæ tamē à Græcis ordine pulcherrimo descripta inueniuntur. Ob id igitur mihi quidē difficile videtur decernere quæ Tithymali genera ex iis, quæ à Græcis res præsentantur, ea duo sint, quæ à Mesue, & Auicenna Scabrā, & Alsebrā nominantur: quoniam horum neuter, quod exeret, earū plantarum faciem notis explicauit. Credidit Brasauolus illud esse Mesui alsebrā minus, & Auicennæ scabrā, quod Dioscoridi paralios. Sed equidē ab eo dissentio, quod nusquam in horum monumentis legerim. Alsebrā minus in maricemis nasci: quin nec ramos ferre subrubentes, nec lini folia, nec semen eruo simile, capitulis conclusum: sed tantū reperim memoratæ prodiidit Mesuē, Alsebrā esse plantā lacteo succo reserctā, radicibus tenuioribus, quarum hæc præferuntur, quæ subrubescant. Auicenna verō Scabrā nasci ait in hortis, non autē in maritimis, caule tenui, hirsuto, foliis taceo similibus. Quæ sanē omnia Brasauoli sententia aperte refragari deprehenduntur. Nec possum præterea cum eodem fenestre, quod Alsebram maius apud Mesuē, & Mechezcheregi apud Auicennam idem sine Mauritanis, quod Græcis Tithymalus platyphyllus, quandoquidē in eorum scriptis nusquam repērī maiori generis

*Tithymalorum confiteratio.*

*Brasauoli opinio expressa.*

Alsebram folia edere verbasco similia: nec quòd  
tufum, & aquæ in parum pisces interficiat, sed  
quòd rectius (vt inquit Auicenna) eius folia  
minori Scebram sint similia. Porrò si mihi hæc  
in re coniectandum esset, putarem equidem nil  
aliud Mauritanis esse minoris generis Alse-  
bram, siue Scebram, quam plantam illam, quæ  
officinæ Eslua minor vocatur, quòd (vt in-  
quit Auicenna) in hortis, & vbique proveniat.  
Hæc autem, ni fallor, ea est, quam vocat Dio-  
scorides Tithymalum cyparissium: quippe quæ  
pinum arboræm puper natam foliis prorsus imi-  
tetur. Quinetiam censerm Alsebram maius,  
siue Mehezehergi eam omnino esse plantam,  
quæ Græcis dicitur pityusa, vtpote quæ Tithy-  
malo cyparissæ foliis sit similis, quamvis ma-  
gnitudine excellat: non enim desunt, qui inter  
tithymalorum genera etiam pityusam recen-  
seant. Proinde non ab re dicebat Auicenna,  
Mehezehergi esse simile Scebram, sed maius,  
& colore subcinerisio. Mefues verò, quòd ra-  
dicibus esset rotundis, crassis, crassoque corte-  
ce obductis, ponderosisque, quæ ferè omnia ra-  
dici Pityusæ reddidit Dioscorides. Accedit his  
Serapionis authoritas, qui de Scebram agens,  
ea omnia ex Dioscoride illi tribuit, quæ pityu-  
sæ idem Dioscorides assignauit. Ex his itaque  
perspicuum fieri arbitror, pityusam Mauritanis  
Scebram maius appellari: minus verò id, quòd  
Græcis tithymalum cyparissus dicitur. Cæterum  
Characiam vocatum, postquam multum labo-  
ris in eo indagando frustra impendissim, hoc  
anno nixæ ad me Pissæ clarissimus medicus, Lu-  
cas Ghinus Forocorneiensis: qui, meo quidem  
iudicio, omnibus prorsus notis legitimo respon-  
det. Myrsiniten quoque hoc tantum anno re-  
perimus, foliis circa caulem totum crassis, acu-  
tis, myrto similibus. Paralius verò in maritimis  
tantum nascens, quem vulgaris vsus tithyma-  
lum putat Brasuolus, in maritimis nostris Sen-  
sensibus, Argentario promontorio, & in vni-  
uerso illius regionis tractu, item in Aquilien-  
si agro frequentissimus inuenitur. Huic folio  
similis videtur quædam alia planta, quæ in He-  
turria vulgò appellatur Herba mora. Cuius ra-  
dicibus prius contusis, ac deinde fluminibus  
demersis, pisces protinus accantur. Sed caret  
hæc lætæ succo, quapropter eam inter tithy-  
malorum genera iam non esse adnumerandam  
cognoscimus: etsi aliis aliter sensimus, quòd,  
aliis notis neglectis, huius folia videntur, & cau-  
des subrubentes. Soli hæc desuerit, Platyphylli  
radices sunt, quo vniuersa regio scatet. Por-  
rò Helioscopius, sic dicit, quòd cum sole com-  
muni circummagat, omnibus vulgaris notitiæ  
planta est. Prouenit enim hæc passim prope vr-  
bium, & oppidorum moenia, in campis, incul-  
tis, hortis, collibus, & vbique tam culto, quam  
incolto solo. Cyparissas deinde (vt supra dixi-  
mus) ea est planta, quam Esluam minorem  
vocant, cuius pro omni Tithymalo inualuit  
vsus. Dendroidem vidimus primum in regno

Neapolitano extra Terracinae urbem inter  
saxa antiquissimi specus in itinere Neapolim  
versus, plantæ arborescentis effigie. Hunc dum  
contemplari crepissim, superuenit petrifissimus  
medicus Hieronymus Drogus Parmensis, &  
doctissimus Hieronymus Rorarius Portono-  
nensis (tunc omnes vni sequebamur Bernar-  
dum Clesum amplissimum Cardinalem Tri-  
dentinum ad Cæsarem pergentem) quibus  
magno solatio Dendroidem tithymalum ibi  
me primum repertum ostendi: erant enim an-  
tibus rei herbariæ studiosi, æque etiam gnari.  
Nascitur idem tithymalus etiam in Tergestino  
litore non longe à Timauo fonte, in saxosis  
qui busdam rupibus arborescens. Theophrasto tria  
tantum Tithymalorum genera produntur li-  
bro 1 x. capite x 11. de historia plantarum,  
vbi ita scripsum reliquit. Lactariarum (sic enim  
tithymalum vertit Theodorus) quod mariti-  
mum grauius appellant, folio est rotundo, cau-  
le, totaque magnitudine ad palmum, fructu can-  
dido. Demecitur, cum vna nigrescere incipit &  
siccatur fructus tritus portui datur acetabuli ter-  
tiæ parte. Macula autem vocata oleæ folio  
constat, & magnitudine cubitum æquat. Huius  
lac, cum videntia incipit, exprimit, & præ-  
parato vtuntur: purgat inferius. Myrtaria vero  
cognominata, candida lactaria est, foliis myr-  
ti condita, verum aculeatis parte postrema: sar-  
mentula in terram demittens, longitudine pal-  
mi, quæ non simul, sed alternis annis fructi-  
ficant, alia hoc anno, alia postero, quanquam om-  
nia eadem radice exorta. Loca montuosa de-  
siderat. Fructus nux appellatur. demecitur, cum  
hordeum turgescit, & exciccat, purgatque  
datur elotus cum papaueris nigri duabus par-  
tibus, ita vt totum modo acetabuli sit: trahit pi-  
tuitam per alium. At verò si nucem ipsam pla-  
ceat dare, trita dabitur ex vino dulci, aut cum  
sesama tosta, torrefactaque comedenda. hæc  
Theophrastus. Tithymali omnes, Mefue  
autore in suis simplicibus deiectionis facultas,  
cordi, iecinori, & ventriculo maxime effi-  
caci: vasi diffumpunt, intestina abradunt, vni-  
uersum exalaciant corpus, adeo vt inde feb-  
res facili concitentur. Tollitur prima tithy-  
mali noxa iis admixtis, quæ cor, iecur, & ven-  
triculum roborant. Secunda verò, & tertia iis,  
quæ agglutinatoria facultate pollent: cumusmo-  
di sunt tragacanthæ lacryma, gummi, bdellium,  
psyllij seminis spissamentum, & portulacæ suc-  
cus. Tollitur & quarta, admixtis frigidis, & hu-  
midis: proinde aut fœchi succo, aut iurati aut  
portulacæ, aut hortensis solani, aut aceto cum  
cydoniorum seminibus diutius rudicula agita-  
to, commiscetur. Vulgaris vsus Tithymali pi-  
ritum vehementer deiecit, ætrum quem vo-  
cant succum, pariterque pituitas ad articulos  
decurrentes. Aquam inter eam valde dissimè  
extrahit: nihil secius exciccat vniuersum cor-  
pus, & genituram extinguit. Vnde rusticiorum  
medicamenti nomen sibi interitò adiecit. Tithy-

Tithy-  
malorum hi-  
storia ex  
Theophras-  
to.

Tithy-  
malorum Ge-  
nera ex Me-  
fue.

Tithy-  
malorum  
hi-  
storia ex  
Theophras-  
to.

Tithy-  
malorum  
hi-  
storia ex  
Theophras-  
to.

*Tithymalus*  
serpens  
ex Galieno.

mali omnis generis vires commemorat Gale-  
nus libro v. simplicium medicamentorum, sic inquit. Tithymali omnes vincentem  
habent acrem, calidamque facultatem, inest  
verò & amaritas. Validissimus itaque est eorum  
liquor. Secundum locum tenet semen, & fo-  
lia. Sed & radix dictarum facultatum particeps  
est, sed non ex aequo. Sanè ipsa cum aceto deco-  
cta dolores dentium sanat, maximè qui illis  
erosis proueniunt. At liquores, vt qui valen-  
tior vim habent, in foramina quidem ipsa  
dentium induuntur: ceterum si aliam corporis  
partem contigerint, continuò adarunt, vlcé-  
rantque: proinde foris illis cera circumdantur,  
quippe cum ex quarto sint excoalfaciuntur ordi-  
ne, quem esse adurentium posuimus. Sic pi-  
los quoque succis inunctus tollit. Porro cum  
vehementior sit, oleo miscetur: & si d. sape  
fiat, tandem prorsum pilorum radices adu-  
ticipantur, corpùsque depile reddetur. Eadem  
facultate verrucas, quas acrochordonas nomi-  
nant, & myrmecias, & pterygia, siue oculorum  
vngues, & thymos auferunt, detergentque li-  
cheas & psoras quia scilicet & abstergendi fa-  
cultas inest propter amaritudinem. Præterea  
vulcerum phagedænicæ, anthrachodæ, & gangre-  
nodæ, quia valenter tum excoalfaciunt, tum ex-  
tergunt, si in tempore, & moderate vrent, iu-  
uant aliquando poterunt. Verum enimvero, &  
fistularum callos eximunt eadem facultate. Cæ-  
terum hæc omnia genere quidem similia, im-  
becillius tamen & folia, & fructus præstare  
possunt. Quibus sanè & ad pisces in aqua fla-  
gnali capiendos vi assolent. Celerrimè nanque  
ab illis in vertiginem acti, ac semimortui red-  
diti, ad aquæ superficiem feruntur. Porro cum  
septem sint eorum genera, valentissimus est  
quem characiam nominant, quem vique etiam  
quidam marem cognominant, & forma nun-  
cupata myrsinites, & qui in pennis nascitur ad  
modum arboris: incipit qui i. verbasco adsimi-  
lis est, & cyparissas: deinde paralius, siue mari-  
nus: denique helioscopius. Proportionem verò  
comprehensit illorum facultatis & cinis, & ex  
ipso lixiuum erit. In vniuersum planta Græ-  
cè *νήδυμος*, Latinis quoque Tithymalus no-  
minatur: Arabibus, Xauser, & Erhuba: Italis,  
Tithimalo: Germanis, Vuolffs milch: Hispanis,  
Leche trefna, & Leche tregua: Gallis, Herbe  
à lait.

*Myrsinites.*



radice crassa,  
candida, succo  
referta, quibus  
dam in locis  
frutex hic præ-  
grandis inue-  
nitur. Detra-  
hit per aluum  
radix drach-  
mis duabus da-  
ta in aqua mul-  
sa: item semi-  
nis drachma.  
succum cum fa-  
rina subacti co-

chlearium in catapotio datum, modus  
foliorum drachma tres.

PITYUSA, vt latius præcedenti capite re-  
tulimus, ea nimirum fuerit planta, quam officina  
Efulam maiorem nominant. Huius radices  
herbarij, qui quottannis è Gargano Apulie mon-  
te succos, & alias radices ad nos comportant,  
magna impossura pro Turpeto vendunt, quem  
admodum & chaplix radices pro eodem sub-  
sticiunt, vt superius in tripolij mentione dixi-  
mus. Quod cum sua ætate non ignorasset Aëtius  
rius, album turpetum Alypiæ esse radicem pro-  
didit, nigrum verò Pityusæ. Nec his obstat, quod  
dixerit Dioscorides, Pityusæ radicem subesse  
candidam: nam is de interiore substantia tan-  
tum intellexit, non autem de exteriori corti-  
cis membranula, quæ viridis rufescit, secunda ni-  
grescit. Porro quod Efula maior sit Mauritania  
alsebram, vel sebram, satis liquido ex Serapio-  
ne colligi potest, vtpote qui integrum de Pityu-  
sa caput ex Dioscoride sumpsit, & in suum Sec-  
bram reposuit. Quo fit, vt planè falli putem  
Brasacolum, quippe qui certò sibi persuadeat,  
Alsebram maius Mauritania esse tithymalum  
platyphyllum. Nicolaus Myrseus quibusdam  
in antidotis, & catapotis alium solentissimum  
Efulam imponit cognomine chamæpityr. Vnde  
Fuchsius in suis doctissimis adnotationibus  
nil aliud efulam Nicolao referre scribit, quàm  
Chamæpityr, non autem tithymali speciem.  
Qua in re Fuchsi opinio (pacè eius dixerim)  
mihi non planè satisficit. Nam cum plura sint  
tithymalorum genera, quæ in vniuersum Efulæ  
nomine appellantur, de ea tantum intellexisse  
Nicolauem existimo, quam Dioscorides à folio-  
rum forma Pityusam vocat, eo quod pins, vel  
picæ arboris folio conficit: quæ ob id efula  
chamæpityris differentia causa Nicolao appel-  
lata est. Paruum enim pinum pityusa repræ-  
sentat: quare non ab re efula quoque chamæ-  
pityris cognominari potuit. Pityusa in Italia  
passim ferè prouenit, facie minoris efulæ, sed  
longè

*Pityusa  
considera-  
tio.*

*Fuchsi  
opinio, re-  
probata.*

PITYUSA.

CAP. CLX.

PITYUSA specie à cyparissia dif-  
ferre constat, etsi tithymalorum gene-  
ri assignetur. Caulis supra cubiti alti-  
tudinem assurgit, geniculatus: folijs pi-  
cæ, acutis, exilibus: flore paruo, velut  
purpureo: semine instar lenticulæ lato;

longè in omnibus maior, adeò vt quibusdam in regionibus, vt in Apulia, arbusci speciem referat. Visitur copiosa in Veronensi agro, ea immensa planitie, per quam ad Benacum transitur. Sed quod aridissimum ibi sit solum, non admodum adolefcit. Hæc (vt Mefues est author) agrestium hominum medicamentum est: multa enim fumentibus adfert incommoda. proinde eius vsum apud medicos peritos profusus exoleuit, quemadmodum, & turpeti ex huiusce radicibus parati, postquam decepta est impostorum fraus: etsi non desunt improbi pharmacopolæ, qui pityusæ radices legitimi turpeti vice suis inferant medicamentis: sinq; etiam circumforanei, qui harum radicum puluere plures ingulgent rusticos, quum salent. Adscribunt quidam Pityusam tithymalorū generibus, quoniam & ipsa similiter lacteo succo madaet, purgetq; eorum modo. Id quod Galenus aperte testatur libro v. 1. 1. simpl. medic. dum sic inquit. Pityusæ, & hanc quidam speciem putant esse tithymali, quod succum habeat, vt illi quod quæ similiter illis purget, ceteraq; omnia viribus illis est adsimilis. Ea Græcè *πικύσσα*, Latine item Pityusa vocatur: Arabicè, Scebram, & Pthias: officinis, Efula maior: Italis, Picieusa, & Efula maggiore.

*Pityusa*  
*Gires ex*  
*Galeno.*  
*Nomina.*

## LATHYRIS. CAP. CLXI.



LATHYRIS, quam aliqui tithymalum appellant, eamq; tithymalorum numero adscribunt, caulem altitudine, & digitali crassitudine, inanem, gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amy-

gdalinis proxima, latiora, & læuiora: quæ autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur. aristolochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructum summis furculis gerit, triplici loculamento insignem, rotundum, ceu capparin, in quo grana, intercursantibus membranis, inter se distincta continentur, cruas maiora, rotunda: quæ dum corticibus exuuntur, cædida sunt,

& gustu dulcia. Nullus radicis vsus. totus frutex lacteo succo turget, vt tithymalus. Grana sex, aut septem in catapolio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata aluum purgant: sed aqua frigida postea sorbenda, trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. Succus, tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo, aut ole-ribus folia decoquuntur ad eisdem effectus.

LATHYRIN officinæ Cataputium appellant. Planta est vulgaris noxiæ. Hæc in Herbaria frequentissima nascitur. Apud Insulæ, quod aluum valenter euacuet, vomitionesque eliciat, catapuzza vulgo nominatur. Iisdem pollet facultatibus. quibus & ricinus, iisdem quoque medicamentis infranatur. Huius plantæ meminit Actuarius in suo libro de compositione medicamentorum, vbi ita scribit. Lathyrus vehementer pituitam purgat. Dantur grana eius maiora, quindecim: minora verò viginti. Is qui efficacius purgari copiant, mandenda præcipito: iis verò, qui deiectione non desiderant copiosam, iubendum est, vt integra deuorent, præsertim si qui sume, malo fuerit stomacho. hæc Actuarius. Lathyrus vires descripsit Galenus libro v. 1. 1. simplicium medicamentorum, sic inquit. Lathyrus, tum qui dicant & hæc esse tithymali speciem, tum quod similiter illis succum habeat, tum quod eodem illis modo purget, totaque illis facultate similis sit. nisi quod semen gustantibus videatur dulce: quod sanè etiam maxime purgatorium vim obtinet. Quæ planta *κατόπα* Græcis. Lathyrus item Latinis dicitur: Arabicus, Mendana, seu Mehendane: Italis Lathvri, & Cataputia minore: Germanis, Spring kraut, Spring, koerner, & Tereib koerner: Hispanis, Targato: Gallis, Espurge.

*Lathyrus*  
*Gires ex*  
*Galeno.*

*Lathyrus*  
*Gires ex*  
*Galeno.*

*Nomina.*

## PEPLVS. CAP. CLXII.

PEPLVS frutex est lactei succi plenus, foliis paruis vt rutæ, paulò latioribus: rotunda coma, ferè dodrantalis, humi resperfa semine sub foliis paruo, rotundo, minore quam candidi papaueris. pluribus scater auxiliis. Vnicam radicem habet superuacuum, ex qua fruticet. nascitur inter vites, & in hortis. Colligitur mensibus, siccatur in vmbra, & continuè versatur. Fructus tufus, & seruefactus reconditur, Bilis, ac pituita

acpituita detrabitur acetabulo eius in hydromclitis cyatho poto. Obsoniis inspersa conturbat alium. muria conditur.

PEPLIS. CAP. CLXIII.



PEPLIS, quā aliqui syluestrē portulacam vocant, Hippocrates pep lion, in maritimis maxime nascitur, late opaco frutice, candidi succi pleno: foliis satiuæ portulacæ, rotundis, infernè rubentibus: semine sub foliis rotundo, vti in peplo, feruente gustu: radice singulari, superuacua, tenui. Colligi, & reponi, ac dari, vti peplos, & sale condiri solet. Eadem habet vires.

*Pepli, & Peplum* herbariorum vulgus, quod orp. *peplid* cō biculata conslet coma, Esulam rotundam vocat. Prouenit non modò in vineis, sed etiam in agris cultura destituta, lacteo succo prægnans. Peplida verò, quæ Peplion dicitur, in maritimis nascentem, non prius quam hoc anno euulsam vidimus. Sed nobis non licuit hoc tempore eius effigiem pictam exhibere: tamen, Deo concedente, aliquando dabitur. Vtriusq; vires reddidit Galenus lib. v. 111. simplicium medicamentorum, vbi primùm de Peplo ita scribit. Peplos, quidā verò papauer spumum, & hic frutex paruus succum habet similem tithymali, cū in aliis, tum quia purgat, cū illi. Mox de Peplio idem Galenus hæc verba subiunxit. Peplum, & hic quoque frutex exiguus succum obtinet, sicut tithymali: nasciturque plerumque ad mare, radicem habens inuulsem, vt & peplos: succum verò validum, non tamen admodum vilem. Sed semen vile est, & flauosum, similiter semini pepi purgans. Quæ planta *πῆλον* Græcè, Peplus etiam Latine vocatur: officinis & vulgò, Esula rotunda. Quæ verò *πῆλον* Græcè, Peplis quoque & Peplum Latine dicitur.

*Vires vtri-  
usque ex  
Galena.*

*Nomen.*

CHAMAESYCE.  
CAP. CLXIIII.

CHAMAESYCE aliqui sycen no-  
minant. Ramos emittit quaternum  
digitorum, teretes, succosos, in terram  
deiectos: folia lentis, parua, peplum  
planè referentia, tenuia, quæ à terra  
non attolluntur: semine sub foliis ro-  
tundo, vt in peplo: neque caulem, ne-  
que florem promit: radice firmatur  
tenui, supernacanea. Rami ex vino tri-  
ti vuluæ dolores sedant, in pefso appo-  
siti: tollunt tumores, ac verrucas om-  
nium generum illiti. Decoctorum  
cibo alius resoluitur. Succus simili ef-  
fectu prodest. Illitus contra scorpionis  
ictus auxiliatur: aduersus caligines ocu-  
lorum vtilis, & hebetudines, incipien-  
tes fassiones, nubeculas, cicatrices,  
cum melle inunctus. In squalidis, pe-  
trofisque nascitur.

NASCITUR Chamaesyce, quemadmodū *Chamaesycen*  
& pepus, in vineis, petrosis, & squalidis mon-  
ticulis. Hæc, vt ex totius plantæ descriptione  
colligi potest, in pepi genere enumeranda vi-  
detur: quippe quæ ramulis exeat humi per-  
petuò sparsis, lacteo succo repletis: foliolis, &  
coma peplo similibus. Hinc itaque quæpiam  
fortè non aberraret, si censeret Chamaesycen  
esse minorem peplum: ego tamen id plane as-  
serere non auiam. Chamaesyces vires tradidit  
Galenus libro v. 111. simplicium medicamen-  
torum, his verbis. Chamaesyce abstergerendi si-  
mul & acrem vinum possidet. Itaque acrochor-  
donas, & myrmecias causas eius teneriores in  
modum cataplasmatibus adnoti, & ex eis liquor  
auferunt. Cum melle verò crassas oculorum  
cicatrices detergunt. Ied & hebetudinem vi-  
sus à crassitie naram adiuuant, sicut sanè & fus-  
fusonum principia. *Χαμαίς* sic Græcè, vt  
Chamaesyce pariter Latine vocatur.

*Chamaesycen  
ex Gal.*

*Nomen.*

SCAMMONIA. CAP. CLXV.

SCAMMONIA ramos ab vna radi-  
ce emittit trium cubitorum, multos,  
pingues, & qui nonnihil crassitudinis  
præ se ferant: foliis helixinæ, aut hede-  
raceis, mollioribus tamen, hirsutis, &  
triangulis: flore candido, rotundo, in  
calathi modū cauo. graeolente: radice  
prælonga, crassitudine cubitali, candi-  
da, graui

da, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus. Capite exemplo, radix in testudinis speciem cultro excavatur: quo fit, vt in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij serobes in terra concamera- to sinu fodiunt, in quos subiectis iuglandium folijs, profundunt succum, siccatumque extrahunt. Laudatur autem Scammonium leue, nitidum, rarum, & colore quam simillimum taurino glutini, fungoso, tenuibus fistulis, quale ex Myfia regione Asia deportatur. Nec attendere solum par est, si linguae tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod admisto sit tithymali lacte) sed longe magis antea narratis. Item si non vehementer linguam exurat, id quod misti tithymali argumentum est. Natione autem Syriacum, & Iudaicum deterrima habentur, graui, densa, erui farina, & tithymalo vi- tiata. Succus drachmae vnus, aut quaternum obolorum pondere haustus ex aqua pura, vel mulla, per inferna bilem, & pituitam extrahit. Ad resoluendam aluum binos obolos cum sesama, aliove semine sumpsisse satis est. Dantur efficacioris purgationis causa, succi tres oboli, cum duobus veratri nigri, & aloës drachma vna. Fiunt purgatorii sales, drachmis viginti succi scammoniae in fenos salis cyathos adiectis. Horum modus proportione virium: integer quidem, tria cochlearia: medius, duo minimus, vnum. Radicis drachma vna, aut altera purgat cum iis, quae retulimus. Nonnulli decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum hordeacea farinata teritur, cataplasmate ichthidicis vtili. Partus enecat succus, vuluae in lana subditus: tubercula discutit cum melle, aut oleo illitus. decocto in aceto perunctae leprae abiguntur: diu turni capitis dolores ex aceto, & rosaecco perfunduntur.

Scammonia  
radix, eiusque  
succus con-  
sideratio.

SCAMMONIUM, quod est Scammoniae succus, copiosum quidem in Italia aduehitur, praesertim Venetias, quo ex Alexandria

Aegypti, & Syria importatur: sed quod probatissimum sit, rarum admodum inuenitur. Si- quidem quod omnibus iis notis, ac dotibus praedictum sit, quas optimo tribuit Dioscorides, haecenus nunquam, vt ingenue fatear, sum consecutus. Nec mirum mihi quidem videtur, cum id, quod à mercatoribus ad nos deferretur, Syriacum plurimum sit, & Iudaicum, compactum, densum, graue, & erui fortasse farina, tithymali lacte, alisque imposturis vitiatum, & illud denique, quod vt omnium deterrimum, Dioscoridi improbat. Verum hoc parum expedites plerique pharmacopolae, illud praestantissimum Scammonium existimant, quod lingua salua madentis contactu, facile, confestimque albescit. In quo Dioscoridis doctrinam hi negligere manifeste deprehenduntur: quandoquidem ipsius Dioscoridis admonitio est, vt non solum illi experimento fidere conueniat, sed etiam alijs, certioribusque: id namque euenit adulterato quoque lactis tithymali admixtione. Quamobrem medici, qui Christianam religionem, ac pietatem colunt, si probe, sanctaeque artem medicam exercere cupiunt, pro viribus suos quisque pharmacopolas moneant, insistentque, vt laudatissimum quærant, habeantque scammonium. Nam cum hoc medicamentum omnium ferè electiorum, cataploriorumque, quorum passim est vsus ad humores in morbis deliciendos, sit basis, qui iis adulteratum immiscunt, nulli dubium est, quin pessima, & plerumque exitiosa faciant medicamenta. quo certe nihil detestabilius, nihilque execrabilius esse potest. Sed caueant seplacitij, & peritorum admonitis libenter audiant: alias enim scient, errorum perniciosorum, quos saepe committunt, tandem meritis poenas luent. Quod autem scammonium illud, quo omnes ferè officinae referta sunt, tithymali succo sit vitiatum, hinc liquidò patere arbitror, quod decem, vel quindecim eius graui aluum pluries resoluant, cum synceri drachma. Dioscoridis testimonio, id vix praestare possit. Plantam, è cuius radice scammonium colligitur, vidimus primum Neapoli, aliasiam ( vt quidam seplacitius asserunt) ex Gargano Apuliae monte, quae omnibus notis, meo quidem iudicio, legitimam Scammoniam referebat. Sed profecto mirari nobis subit, quod Galenus in libris de simplicium medicamentorum facultatibus, nihil de Scammonij viribus meminerit, cum tamen pleraque alia libri eius tradiderit longe etiam minoris momenti, atque alias saepius obiter Scammonij mentionem fecerit in suis alijs monumentis. Scammonium, auctore Mesue in suis simplicibus descriptis, quinq; corporibus laxa- tiones inferre potest. Prima est, quod flatum quoddam mordacis gignit, vsque adeo ventriculum lacerantem, vt iumentibus nauseam commoueat. Noxa hac tollitur, si in excava- to cydonio malo, clibano, aut prunis inspersit, passa vndique circumlita, praesertim additis, aut fœniculi, aut dactyli

Scammonia  
radix  
laxa-  
mes.

dauci, aut apij femine, aut galanga. Inflammata  
deinde acedinis exuperantia corporis spiritus;  
quo fit, ut facile febres excitet, his præcipuè, qui  
obstructionibus viscerum, & humoribus putre-  
fcentibus obnoxij sunt. Sed id nocuementi au-  
feretur, admissis inter coquendum, quæ refrige-  
rant, & feruorem extinguunt: cuiusmodi est  
psyllij seminis spissamentum, prunorum deco-  
ctum, seu potius pulpa, rosarum & violarum  
succus, aut dilutum, aut aqua: quæ etiam si ante  
coctionem maceretur oleo rosaceo, aut viola-  
ceo, aut cotoneorum misti saporis succo, aut  
admisso rhoë, aut saccharo spodio. Ad hæc quod  
magna tum attrahendi, tum aperiendi faculta-  
te sit præditum, immoderatis alui fluxiones  
facit: vasorum enim oscula pliusquam par sit ape-  
rit. Hæc læsio admittitur admittis rebus adtrin-  
gentibus, cohibentibusque, nempe malliche,  
cydoniis malis, succoque ab eis expresso, & my-  
robalanis, præsertim flauis. Abradit præterea  
acri succo, quo scaturit, intestina: proinde & tor-  
mina, & dysenteriam, & renasum excitat. Sed  
deleatur hoc incommodum, additis humidis,

pinguibus, lentisque medicamentis: cuiusmodi  
sunt, tragacantha, lacryma, bdellium, amygdali-  
num oleum, aut rosaceum: item prunorum pul-  
pa per se, & saccharo asseruata, psyllij spissamen-  
tum, malliche, cydonia mala post sumpta, & ca-  
lida aqua post bibita: utpote quæ medicamen-  
tum oculus à ventriculo & intestinis expellant,  
& ita simul noxam prohibeant. Hinc est, quod  
prudentes medici, quod celerius Scammonium  
à ventriculo, & intestinis deiciant, hordei iu-  
sculum, cum saccharo superbibendum præ-  
bent. Obest postremo scammonium cordi, ie-  
cori, ac ventriculo, substantiæ suæ totius pro-  
prietate. Vicium hoc aboletur, si illi tum calida,  
tum frigida admisceantur medicamenta,  
quæ cordi, iecinori, ventriculoque opem suam  
prestant. Deicit scammonium valentissimè bile-  
m, quam & à vasīs, & à sanguine exhaurit.  
Eius deiciendi facultas haud finè aliis medica-  
mentis absumilis est, quæ purgant cum labore  
& molestia. Planta Græcis *enchymnia*, Latinis *Nomina*.  
item Scammonia vocatur: Arabibus, Scammo-  
nea, siue Sachmunia: Italia, Scammonia.

CHAMELAEA.



CHAMELAEA. CAP. CLXVI.

CHAMELAEA furculosa fruticat,  
ramis dodrantalibus: folia oleæ simili-  
tudinem habent, tenuiora, & amara, 50  
quæ gustata linguam mordent, & arte-  
riam deradunt. Detrahit pituitam bi-  
lemque, foliis præsertim in catapotio  
deuoratis. nanque duæ absinthij par-  
tes, adiecta chamelææ vna, hydromeli-  
te excipiuntur, & in catapotia cogun-  
tur. ea autem in ventre non liquefcent:  
siquidem quotquot fuere deuorata, re-  
geruntur. Foliis cum melle tritis, for-  
dida vlcera, & crustosa repurgantur.

THYMELAEA.



THYMELAEA. CAP. CLXVII.

THYMELAEA est, ex qua granum  
Gnidium, quod est semen ipsius, colli-  
gitur. Hoc Syri apolinum vocant, quo-  
niam sacui lini frutex suapte natura si-  
militudinem referat. Virgas edit pul-  
chras, multas, tenues, binum cubito-  
rum: foliis chamelææ, angustioribus, &  
pinguioribus, viscosis gummosisque, si  
mordeantur: flore candido: fructu myr-  
ti in modum rotundo, qui inter initia  
viret, & tandem rubescit: inuolucrum  
fructus durum, foris nigrum, intus al-  
bum. Hoc per inferna bilem, pituitam,  
aqueisque



aquasq; detrahit, si viginti granorum pars interna bibatur: verū fauces adurit. Itaque cum farina, aut polenta, aut in vix acino dari debet, aut melle cocto obductum deuorari. Qui ægre defudant, trito femine cum nitro, & aceto innunguntur. Folia, quæ peculiariter eneorum appellantur, per menses colligi debent, & siccata in vmbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & neruos eximere conuenit. Illitum acetabuli modo cum diluta vini portione, aqua extrahit: mediocrius purgat, addita lente cocta, aut cōtritissimis oleis. Thymelææ farina vix acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta, partus imposita necat. Nascitur in montibus, & asperis. Hallucinantur, qui coccon Gnidium fructū esse chamelææ existimant, decepti quadam foliorum similitudine.

*Chamelea et Thymelæa consideratio.* CHAMELEAM, pariter & Thymelæam Arabes confusè satis, ac perplexè Mezereon appellant. Cuius est duo faciant genera, vnum album, alterum nigrum, tamen his etiam Daphnoidem admiscant, & hæc omnia adeo confundunt, & implicanc, vt hæc in re nihil certi, nihilq; perpetui ac tuti ex eorum scriptis elici possit. Illarum plantarum vis in exoluendo corporis humores, tam vehemens, violenta, ac furiosa existit, vt nisi robustissimis hominibus tutò in medicamentū dari possint: plerūq; enim imbecilles cōfecerunt, abrais visceribus, apertisq; vasorū oculis. Quare nō temè eas Mauritanii & terræ leones, & plantas vidiūcas cognominant. Proueniunt hæ plantæ numerosè in vallis Ananias montibus Tridentino agro: & vtræq; (licet hoc in chamelæa præterierit Dioscorides) fructū ferunt myrti baccis similē, quanvis Chamelææ quadantenus longior sit, & oliuæ formam representet. Vtrique fructus initio sui exortus virefcit, mox per maturitatem rubescit, denique exarctus niger conspicitur. Caterū bacca, quæ est Thymelæa decerpitur, quoniā sicca piperis facie præ se ferat, acrimoniamq; non obscuram gustantibus relinquat, rura Ananensis, vna etiā cum Laureolæ femine. Piper montanū indifferēter nominat. Nec sanè mirū, quandoquidē & Theophrastus lib. 1. x. cap. x. x. de plantarū historia, vbi de pipere differuisset, statim Cnidij grani meminit: utpote quod maxime piperis imaginē referat, & admodū etiā acre sentiat.

Sumunt hoc piper (vt eorū nomine vtar) frequenter incolæ in suis purgationibus aduersus omnes ferè morbos, alii medicos, & pharmacopolas fallere credentes. Sed sæpe euenit, vt cum futurā noxā non præuideant (quæ eorum multorū imperitia est) non solum seipsos decipiant, sed etiā sibi mortem consciant. Et certe hoc testari possū, quod ex montani illius piperis assumptione plures perissent, nisi antidotis nostris succurrissem, eosq; in vita seruasse. Proinde scitè posteritatis memorie prodidit Mesæs, nemini Mezereon præbendū esse, nisi iis admixtis antidotis, quibus eius deleteria facultas infranari possit, qua omnia corporis principalia membra corrūpit, ac destruit. Habentur tamē passim in pharmacopoliis cataplasia, quæ de Mezereon appella, quibus aliquando videntur medici, ad aquā inter cutē extrahendā. Verū ea non audent exhibere (quantū medicamenta simul receperint, quibus eorum malicia reprimatur) nisi robustis, ac fortioribus hominibus. Chamelæam tantū, quod Chamelea Grece ex Gale.

Chamelea Grece ex Gale. dicamentorum censu, de cuius viribus libro v. 111. eorundē ita scribit. Chamelæa vincentem habet qualitatem amarā. Quamobrē admodū sordida vlcera, & quæ maximas habent crustas, cū melle purgare potest. Quæ Grecis χαμηλαία, Latinis quoq; Chamelæa & oleastellum appellatur: Mauritanis, Mezereon, seu Alemezerion: Italis, Chamelæa: Germanis, Zylande: Gallis, Boys genil. Quæ verò Græce θυμαλεια, Latine pariter Thymelæa vocatur: Italice, Thimelea.

## SAMBUCVS. CAP. CLXVIII.

SAMBUCI duo genera. Vnum in arborem assurgit, furculos spargens arūdinaceos, teretes, cauos, candicātes, proceros: folia iuglādis, terna quaternave, ex intervalis circa ramos exēit, grauiā odore, minutim in ambitu fecta: & in ramulorū cacuminibus, cauliculisq; circinata vmbellæ, quæ florē candidū pariunt: mox acinū terebintho similē, in nigredine subpurpureū, racemosum, succo madentē, vinosūq;. Alterū genus chamæactē vocatur, Romanis ebulū, longē humilis est, magisq; herbaceo generi assignandū: caule quadrāgulo, geniculato: foliis amygdalæ, ex intervallo longioribus geniculatim expansis, pinnatisq;: graeco lentibus, in ambitu ferratis: muscario sambuci: flore, & acino eiusdem radice nititur, longa, crassitudine digitali. Eadem vtriusq; vis, & vltus exiccans, alio

detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia olerum more coquantur, ad pituitam, bilemque detrahendam. Caules teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in vino decocta, & in cibis data, hydropicos adiuuat: prodest viperarum morfibns, eodē pota modo, vuluas emollit infidentium, decocto: patetefacit eorum spiracula: & vitia cor-

rigit. Acini in vino poti, eodem funguntur munere: denigrant capillos illiti. Folia, si prætenera ac mollia ex polenta illinantur, inflammationem mitigant: ambustis, & canum morfibns illitu profunt: vlcera quæ dehiscunt in fistulam, agglutinant. iis, qui podagra tentantur, cum seuo taurino, aut hircino profunt illita folia.

S A M B U C Y S.



*Sambuci,  
Ebuli  
genera, et  
varietates.*

S A M B U C Y S, & Ebulus plantæ sunt nullis non cognitæ. Prioris est vñ tantū genus prodatur à Dioscoride, nobis tamē duo eius obseruata sunt generaliter quidem montanum, & sylvestre: alterū verò vrbānū, plerumq; in hortorū, & vinearū sepibus proueniens. Hæc genera fructu inter se differunt: siquidē montano bæcæ perpetuū rubescunt. Illud etiā discrimen facit, quod vrbānū in maiore proceritate adolescit, & leuiore constat materie. Sunt præterea: qui palustrem Sambucū ostendunt, nempe arbusculam vliginosa, & palustri solo enascentē, virgis sambuci æmulis, geniculatis, alba intus medulla, sed caduca, & fragili materie: folio virgineo: flore albo sambuci modo, odore non prorsus iniucūdo: à quo bæcæ prouident rubræ, oxyacanthæ magnitudine, vinoso succo replete, quæ deuorata vomitiones cient. Aquæ Sambuci floribus fronti, & syncope illita, capitis dolores mulcet, qui a calido humore prouenerint. Succus ē radicis cortice expressus, vomitu valentissimè commouet, & aquam inter cutem pellit. Præstat idem ē radicibus ebuli extractus succus. Quin & crassam pituitam ad articulos decurrētē extirpat. Ebuli semē per diutinas acq; lotiones nigro circumstante succo exurgatu m, datur vtiliter drachm pondere ex chamæpicyos de-

E B U L U S.



cocto, podagricis, ischiadicis, & Gallica lue laborantibus: mulcet enim deiectoria vi mirificè eorum dolores, cum humores eò fluentes tum reuocet, tum deiciat. Sunt qui ex ebuli radicibus succum eliciant, insolentq; subinde, & in pastillos digerant, feruentq; ad vsus. Hic clystere infusus tam intercellorū, quam coxendicū dolores tollit à frigidityte, & flatu genitos. Supponitur cōuenienter sceminarū locis ad euocandos menses, præsertim si lana exceptus inromittatur. Suffiantur ebuli decocto cōmodè ij, qui diuturna febre vexati ad malū deuenerunt habitū, si tamē ventriculus, & iecur interea roborētur odoratis adstringētibus, & ad id cōferentibus medicamentis. Meminit Sambuci vtriusq; Galen. lib. v. i. simplic. medicament. sic inquit. Vtræque sambucus tum magna illa, & arborescens, tum herbacea, quam & chamæcastem vocant, desiccandi, congelurandi, modicèq; digerendi facultatē obinent. Plantæ, quæ hæc Græcis, Sambucus Latinis appellatur: Arabibus Isafiti: Italis, Sâbueo, Germanis, Holder, seu Holler: Hispanis, Sabugo, & Caniæro: Gallis, Suseau, & Suyer. Quæ verò *χαρακία* Græcè, Ebulus Latine dicitur: Arabicè, Kameastis: Germanicè, Artich, & Niderer holder: Hispanicè, Hiezuos, & Sabugo pequenno: Gallicè, Hyble.

*Sambuci  
vtriusque  
vires ex  
Galen.*

*Namina.*

## PYNOCOMVM. CAP. CLXIX.

PYNOCOMON cōstat eruca foliis, acrioribus, scabris, & crassis: caule quadrangulo: flore ocimi: semine marrubij: radice nigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terram redolente: inuenitur in saxosis locis. Semen gra-  
uia somnia, & tumultuosa facit, drach-  
mæ instar potum, tumores discutit, il-  
litum cum polenta: & spicula, ad acrio-  
que corpori aculeos extrahit. Folia il-  
litu tubercula, panósque discutiunt.  
Radix eius in aqua mulsa duum drach-  
marum pondere, alium soluit, & bilem extrahit.

Nullam equidem vsquam plantam ha-  
ctenus sum consecutus, quæ facie Pynocomo  
responderet. Quare & hoc mihi, vt ingenuè  
fatear, referendum est inter alias herbas, quas  
hodie omnibus incompetas esse arbitror. Ita  
enim fiet, vt & posteris, quos spero futuros rei  
herbariæ diligentiores inquisitores, suus re-  
linquatur scribendi locus. Nec sanè quenquam  
pigere debet, cum ex his, quæ nobis vel in-  
cognita, vel incerta sunt, aliquid inuenierit,  
& compertum habuerit, ad communem utili-  
tatem in medium proferre. Eam vt Græci *πυνο-  
κομον*, ita Latini Pynocomum vocant.

Nomina.

## APIOS. CAP. CLXX.



APIOS ra-  
mulos duos si-  
ue tres iuncea  
spargit rubros,  
tenuis, qui à  
terra parum at  
tolluntur: foliis  
rutæ, oblongio-  
ribus tamè, &  
angustioribus,  
herbaceis: se-  
mine paruo: ra-  
dice hastulæ re-  
giæ in formam  
pyri turbinata,

rotundiore tamen, succi fecunda, in-  
tus habet corpus candidum, extrà cor-  
tices nigros. Superior pars eius vom-  
itione bilem, pituitasque extrahit: in-

ferior per alium: tota vtrinq; pur-  
gationes mouet. Succum si libet exi-  
mere, tusa radix in fistili mergitur, &  
agitata aqua, quod supernatat penna  
selectum, exiccatur. Purgat vtraque  
parte is succus, sesquibolo potus.

APIOS, quæ & Ischas appellatur, nascitur  
in Creta (quanquam nō desunt qui velint eam  
quoque provenire in Italia, præsertim in Apu-  
lia) foliis exiguis, rutæ, vel hyperico proximis,  
primo statim vere ab radice erumpentibus, ni-  
grioribus tamen, alba quadam linea in longi-  
tudinem percurrente: cauliculis iuncea sub-  
rubentibus, lacteo succo madentibus: radice  
exterior nigra, interior candida, pyri effigie,  
vnde & nomen: *Ischas* enim Græcis nil aliud  
significat, quàm Latinis pyrum. Theophrastus  
libr. 1 x. cap. x. de plant. historia, Apion his  
notis representauit. Ischas, siue Apios folio  
constat rutaceo, breui, caulibus ternis, aut  
quaternis, humi prostratis: radice, qua aspho-  
delus, verum squamosa. Nascitur in montibus.  
Legitur vere. Datur ad expurgandum corpus,  
quod altera radice parte superius, altera infer-  
ius purget, hæc ex Theophrasto. Apion le-  
gitimam, quam primum me vidisse recordor,  
ad me misit Venetiis Nicolaus à Sancto Mi-  
chaële Nouocomensis, medicus singularis inge-  
nij, atque eruditionis & rei herbariæ peritus.  
Cæterum scribit Ruellius Apion frequentissi-  
mam in Gallia nasci, eiusq; radice ruri paupe-  
res per inopiam frugum vesti. Sed Ruellij sen-  
tentia non esse subscribendum iudico: nam  
cum Apios per superna, & inferna purgati-  
onem molitur, malè nimirum eos haberet, qui  
nulla huius facultatis habita ratione copiose  
(vt rustici facere solent) eius radices sume-  
rent in cibis. Apij huius nusquam, quod in-  
uenerim, mentionem fecit Galenus in simplici-  
um medicamentorum censu. Hæc planta  
non secus Latinis Apios, atque Græcis *Ischas* Nomina.

Apj, siue  
ischas  
considera-  
tio.Ruell.  
p/m.

## COLOCYNTHIS. CAP. CLXXI.

COLOCYNTHIS farmenta, folia-  
que satiui cucumeris emittit, per ter-  
ram repentia, diuisa: fructum in spe-  
ciem mediocris pilæ conglomeratum,  
vehementer amarū, quem legere oportet,  
cum cœperit in pallidum colorem  
permutari. Medolla fructus purgato-  
riam vim habet, si quatuor oboli cum  
aqua mulsa, melle cocto, myrrha, & ni-  
tro excipiantur, & cogantur in catapo-  
tium. Arefacta pilæ teruntur, & infusa

## COLOCYNTHIS.



clysteribus pro  
sunt neruorum  
resolutioni, co-  
xendicum do-  
loribus, & coli-  
vitiis, vt quæ bi-  
lem, pituitam,  
& strigmenta,  
interdū etiam  
cruorē eliciāt,  
fecus admor-  
tēneant. Den-  
tium dolorem  
tollit, si vna re-  
purgetur, & lu-  
to oblita cum  
aceto & nitro

inferuescat, hōcque iure decocti dētes  
colluantur. Si aqua mulla, aut passum  
in eadem incoquatur, & sub diuo refri-  
gescat, poru crassum humorem, & strig-  
menta alui detrahet: stomacho supra  
modum aduersatur: subdita ex ea ba-  
lano alui excrementa eiiciuntur. Viren-  
tis succo vtilissimē ischiadici perfri-  
cantur.

*Colocyn-  
this com-  
sideratio.*

COLOCYNTHIS planta est tam medicis,  
quā seplasiarū vulgaris notitiæ. Verū est  
(vt Mesues est author) præstantissimum ex eius  
fructu parietur medicamentum ad varia mor-  
borum genera, ea tamen cordi, iecinori, & ven-  
triculo maximē aduersatur, quin & vniuersum  
perturbat corpus, fastidium, & intestinorum  
tormina excitat. Abradii enim intestina, & va-  
sorum oscula aperit, adeo vt etiam cruenta saepe  
eliciat. Hinc merito fit, vt eam dari prohibeant,  
nisi prius maleficia eius vis proflus aboleatur,  
iis additis antidotis, quæ ad id præstant: cuius-  
modi sunt illa, quæ ventriculum, iecur, & cor  
tum robore, tum tueri possunt, & quæ len-  
tore suo glutinandi vim habent. Colocynthis  
trahit pituitosa, crassa, lentāq; corporis excre-  
menta in remotioribus partibus delitescētia:  
proinde cerebrum, & neruos expurgat, nec  
non etiam musculos, thoracem, & pulmonem.  
Eam ob causam vertiginosis, comitialibus, re-  
solutis, conuulsis, hemicrania, diuturnoque  
capitis dolore affectis, asthmaticis, & ægre spi-  
rantibus vtiliter in cataplasitis exhibetur. Colla-  
chrymanes adiunxit oculis, & diutina tussis la-  
borantes. Est præterea vis eius efficax ad omnes  
frigidis articulorum dolores, præsertim poda-  
gricos, & ischiadicos: ad quæ non modō in ca-  
taplasitis deponatur, sed etiam clysteribus infun-

ditur: quibus finē nil præstantius est ad coli eru-  
cias ex flatu, & frigideitate prognatos. Pellit  
aquas tam bibita, quā per sedem infusa. Fit ē  
colocynthis fructu oleum, ad retardandam  
canitiem, denigandos capillos, & eorum de-  
fluuium cohibendum, si exempta ē fructu pul-  
pa, canitas oleo repletur, & in cineribus de-  
coquatur. Eodem mulcentur aurium dolores,  
& earum incerti sonitus discutiuntur. Colo-  
cynthis vires retulit Galenus libro sexto, sim-  
plicium medicamentorum, his verbis. Colo-  
cynthis gustu amara est, sed quæ amarissimo  
medicamento epoto adiunt opera, ea euidenter  
efficere nequit, ob purgatoriam facultatem,  
quā validam in sese continet, nimirum cum  
eis, quæ expurgat, antē & ipsa per alium ex-  
cerni præuertens. Viridis ipsius succus intri-  
tus ischiadibus prodest. *Karawis* sic Græcis,  
Latini item Colocynthis, & Cucurbita sylue-  
stris appellatur: Arabibus, Chandel, Handel,  
seu Handal: Italis, & Hispanis, Coloquintida:  
Germanis, Coloquint, & Vuilder korbz: Gal-  
lis, Coloquinte, & Courle sauvage.

*Colocyn-  
this vi-  
res ex Ga-  
leno.*

*Nomina.*

## EPITHYMVM. CAP. CLXXII.

EPITHYMON flos est ē thymo du-  
riore saturiæ simili. Capitula habet  
tenuia, & leuia: & in eis caudiculas,  
quasi capillamenta. Potum cum melle  
detrahit pituitam, bilemque atram per  
inferna. Priuatim prodest melancholi-  
cis, & inflatis, acetabuli mensura ad  
quatuor drachmas, cum melle, sale, &  
aceti exiguo. Plurimum in Cappado-  
cia, & Pamphylia gignitur.

## EPITHYMVM.



IN HAC eomē Epithymi  
dem opinione ver-  
sanctur complures  
huius ætatis me-  
dici rei herbariæ  
periti, quemad-  
modum Brasauo-  
lus Ferrariensis, ve-  
credant, Diosco-  
ridis, aliorūque  
Græcorū Epithy-  
mū magno discer-  
mine ab eo diuer-  
sum esse, de quo  
scripserunt Mau-  
ritani, præsertim-  
que ab illo, cuius  
meminit Mesues.  
Quippe qui asse-  
rant, nil aliud A-  
rabicum epithymum esse, quā capillaris cas-  
suthæ genus quoddam, quod thymo circum-  
uoluitur. Græcorum verō idem esse volunt cum  
prop

proprio flore durioris thymi satoreis similis. Sum autem sententia huius argumento comprobare videntur, quod si vulgaris vsus epithymum, Arabicum scilicet, illud esset, de quo dixerit Dioscorides, is non dixisset, Epithymum florem esse durioris thymi, sed alterius plantæ thymo adhaerentis, eiq; sese cōvoluentis. Id quod etiam Plinij auctoritate confirmant, vt qui eorum opinioni ex eo maxime adimplari videntur, quod duo Epithymi genera prodiderit libro x x v i. cap. v i i i. vbi sic inquit. Epithymū est flos ē thymo satoreis simili. Differentia, quod hic herbaceus est, alterius thymi albus. Quidam aliter epithymum tradunt sine radice nasci, tenuis similitudine pallioli (rectius forte pili legendum esset) rubens. hæc Plinius. Ex quibus vtique planum fit, duo esse Epithymi genera: quorum alterum illi ad Græcos, alterum ad Arabas referunt, & ita suam tuentur sententiam. Horum certe iudicio ego quoque facile subscribere, nisi quædam sese nobis offerrent, quæ aperte reclamare videntur, atque etiam offendere, Plinium ipsum Dioscoridis codicem, vnde illa mutaturus est, deprauatum habuisse, vel alium auctorem in hoc minus grauem secutum fuisse, vel seipsum deceptum, vt in aliis compluribus illi euenisse adnotauimus. Palam etenim faciunt, quantum equidem reor, nostri vsus, & Dioscoridis epithymum, vnum & idem esse medicamentum, quæ de eo Aëtius, & Actuarius, Dioscoridem, & Galenum secuti, concordēs posteritatis memoriæ prodiderunt, cum ita scribunt. Epithymum aram bilem externit. Datur adultis tulum, & cribro excussum, scrupulorū quatuor pondere, cum passo, vel oxymelice, & salis modico. Vitis statu turgentibus, & præcordiorum noxis opitulatur, & quibus iecur aggrauatur, & iis, qui spirandi vexantur difficultate. Quod verò in florbe nascitur, aut in satoreis proflit, Epistæbe, atque Epithymbum inde appellatum, thymi modo alium resoluit, sed verumq; facultate censetur infirmius. hæc illi ambo. Quæ sane liquido ostendunt, quod non secus Epithymbū thymbræ, & Epistæbe florbe innascitur, atq; Epithymū in thymo nascitur, vel proflit. Hoc idē præter Aëtium, & Actuarium longē antea testatus est grauiſſimus author Paulus Dioscoridis, & Galeni scēlato accerimus iis verbis. Epithymum inter ea, quæ aram bilem extrahunt, præstantissimum est remedium. Dantur iñsus diachmæ quinque leuigatæ ex lactis hēmina. Epithymbū verò, quod thymbræ innascitur, epithymo similiter emeuat, sed imbecillius est. hæc tenns Paulus. Ex his itaq; omnibus non dubitauerim asserere, vnum tantum esse epithymum, non autem plura. Quandoquidē si Paulus, Aëtius, & Actuarius pro certo non habuissent, legitimum Epithymū esse illi thymi florē, de quo scribit Dioscorides, putasset, duo eius genera reperiri, nullū dubium est, quin & ipsi

*Diostorū  
opinio re-  
prob.*

explicassent duplex in thymo nasci epithymū. Verum cum competum haberent, vnum & idem esse medicamentū capillamentūq; quod in thymo, thymbræ, & florbe proflit, iisq; nullo radicis adminiculo conuoluitur, & implicatur, sibi visum est, quod suo tempore Epithymum vulgaris notitia medicamentum esset, sat fore declarasse nō modò id in thymo gigni, sed etiā in florbe, thymbræ, & (vt nos scire vidimus) in polio, & chamædri. vt hinc seipē medici, in epithymi defectu, epithymbū, vel epistæbem substitui posse: quinetiam vt non ignoraret, id capillamentū harum plantarum proprium non esse partem, neq; suam habere sedem, sed aëritium quoddam esse exterius adueniens, & in iis profliens, & viuens. His igitur rationibus adducor, vt non temerè existimem, Dioscoridis codicem, quem Plinius habuit, fuisse (vt diximus) deprauatū, & ob id ipsum Plinium deceptum: effeatur hunc aliunde accepisse occasionem, vt duo, magno errore, faceret Epithymi genera. Quod autem Dioscorides epithymum florē thymi dixerit, haud ineptè dictum putauerim: nam cum is sciret Epithymum thymo innasci, nulla radice propria, sed thymi adminiculo sulci, floresq; per se albos ferre, qui cum in thymo sunt, huius plantæ proprii videntur, ideo non absurdū fore duxit scribere, Epithymum esse florem durioris thymi. Sed quod Epithymum flores albos ferat, declarasse videtur Dioscorides, cum dicit. Capitula habet tenuia, & leuia, caudicis habentia capillorum modo. Siquidem his notis nō desuperit Dioscorides thymi florem superius libro tertio (vt Brasauolus asserit) sed capitulis in cacumine, flore purpurascēte referri, nulla caudicularum, neq; capillorū habita mentione. Præterea conicere licet Dioscoridem epithymum thymi florem appellasse, quod à thymo decerpatur eo durioris tempore, quo epithymum ipsum largē floret. Nam quod pro epithymo non intellexerit is purpureum thymi florem, hinc perspicuū apparet: quoniam de epithymi viribus libro v i i. vbi de thymo, & eius floribus agit, nihil in medium protulit, nimirum eam ob causam, quod epithymum propriam thymi particulam non existimauerit esse, sed (vt supra dictum est) aëritium quoddam, vt in arboribus musus, & viscum: quæ tamen legitime arborum partes non sunt, sed viribus & facultate diuersæ. His igitur rationibus, vt arbitror, ductus Dioscorides, agit de thymo, & eius floribus libro tertio inter odoratas plantas: de epithymo verò, tanquam de re à thymo diuersa, differuit in hoc libro quarto inter deiectoria medicamenta. Similitè de arboribus, quibus viscum innascitur, disputauit libro primo: de ipso autem visco libro tertio cum iis medicamentis, quæ suo lentore glutinant. Adde quod idem indicare videtur nomē Græcum itaq; modò Latinis modò sub, modò in significat. Vnde nil aliud nobis epithymum in-

est, quàm in thymo, vel sub thymo: Id quod  
fiori thymi quomodo conuenire possit, non  
video: vt pote qui non in thymo, neque sub  
thymo nascitur, sed super thymo, ea eminenci-  
tiori parte, qua capitula emergunt. His alia  
accedit ratio, quòd cum scripserit Dioscorides  
Epithymum plerum in Cappadocia, & Pam-  
phyliā gigni, facile colligi potest, ipsum de  
Epithymo vulgari, vltus esse locutum. Quip-  
pe à epithymum proprii thymi norem esse  
duxisset, ei sane opus non fuisset scribere, quòd  
magis illi in locis epithymum copiosum pro-  
ueniret, quàm alibi: quoniam scripsisse sat  
erat, oriri epithymum, vbiuncum thymum  
proueniat, hoc argumento, quòd thymum  
vbiuncum nascitur, astate suos edat flores.

*Epithymum  
est plerum  
natum.*

Epithymum in thymo satoreis simili nos  
pissimè legimus prope Gortitiam Saluacino, &  
Gargaro montibus supra Salicam, qui eo  
durioris thymi genere copiose vestitur, sed  
cui epithymum insidet: eo tantum tractu, qui  
ad meridie spectat. Etsi enim montes illi thy-  
mo omni ex parte statent, nusquam tamen  
thymi plantas mihi licuit inuenire, in quibus  
Epithymū spectaretur, nisi in amoeniore mon-  
tis parte, vbi herbe enatae austro perstantur.  
Quamobrem nil mirum esse debet quòd in  
Pamphylia, & Cappadocia epithymū frequen-  
tissimum proueniat. Sed quoniam tot scio me  
frustra hac adduxisse argumenta, quibus meam  
firmaui sententiam, nisi etiam Plinij autho-  
ritati, qua nititur Brasauolus, clarius respon-  
derem: idcirco illi ita responsum volo, quòd  
cum Plinius Dioscoridis mentem, à quo priorem  
suorum verborum partem sumpsisse vi-  
detur, non rectè perceperit, ideo non affir-  
matè, sed dubiè quòd fecit Epithymi genera,  
& aliorum potius, quam suam opinionem re-  
tulit, cum inquit. Epithymum est flos è thy-  
mo satoreis simili. Differentia, quòd hic her-  
baceus est, alterius thymi albus. Quicquid aliter  
epithymum tradunt sine radice nasci, te-  
nuis similitudine pili, &c. Porro verò idem

*Plinij lo-  
cus.*

Plinius in iis verbis errasse deprehenditur,  
quòd maiori, duriorique thymo herbaceum  
florem, minori verò album reddiderit: cum  
tamen minoris flos purpureus sit, alterius  
autem modò candidus, modò in candido pur-  
purascens. Hinc itaque perspicuum fit, tam  
confusè, & inconstanter de epithymo, & thy-  
mo tractasse Plinium, vt nihil certi in hac re  
ex eius verbis elici possit. Ceterum hallucin-  
tantur, mea quidem sententia, in Epithymi  
historia, etiam Monachi illi reuerendi, qui in  
Mesuem commentarios ediderunt: quippe qui  
Dioscoridis verba perperam interpretati de-  
prehendantur, etsi vt forte alius doctiores vi-  
derentur, suam in Epithymo sententiam pro-  
ferant iis verbis. Certissimè à paucis verus sen-  
sus verborum Dioscoridis de epithymo per-  
cipitur. nam cum ipse Dioscorides dicat capi-  
tulo de epithymo, epithymum flos est è thymo

*Monacho-  
rum expo-  
sitiōe.*

satoreis similis, non per hoc intelligit Epithy-  
mum, scilicet capillamentum thymi esse simile  
herbæ satoreis, sed asserit illud dictum capi-  
lamentum thymi esse simile capillamento sa-  
tureis, scilicet thymbræ. quia etiam & supra  
thymbram generatur huiusmodi capillamen-  
tum, sicut supra thymū. hæc patres illi. In qui-  
bus facile cognoscitur horum inanem quædam  
sacrantia, ne dicam, pace tua, ignorantia, quòd  
sensus verborum obscuros, claros reddere pro-  
ficerentur, atque iis subinde, vt mihi videtur,  
maiorē caliginē offundant. Quòd enim Dio-  
scoridis sententia hoc loco euidentior sit, quàm  
vt exponi debeat, quòdque apertè Monachis re-  
fragetur, eius verba testantur, quæ ita Græcè  
habent. *Epithymum huius thymi similis est  
Dioscoridis thymbræ.* hoc est ad verbum. Epithymum  
thymi est flos durioris & satoreis similis. His  
sanè verbis liquet, quòd Dioscorides non com-  
parat Epithymum, quod florem thymi vocat,

10  
fiori satoreis, vt Monachi illi male interpretan-  
tur, sed illud genitium *thymbræ* ad thymum  
tantum refertur: ita vt thymum, cui Epithymum  
insidet, satoreis simile faciat. Thymi namque  
duo habentur genera. Vnum maius satoreis  
simile, in quo epithymum proficit. Alterū mi-  
nus, tenuissimis foliis repletum, in quo nullum  
nascitur epithymum. Hoc ceretè non lazebat  
Dioscoridem, quare ne quispiam fortasse pu-  
taret veriq; thymo epithymum innasci, id tan-  
tum in thymo duriori inueniri prodidit. Sed

20  
facis superq; de Epithymo disputatum effusum  
medicinæ reddenda est ratio, & de eius viribus  
agendum. Illud sibi peculiare ascriuit Epithy-  
mum (vt testatur reliquit Mesues in suis sim-  
plicibus) quòd valentius ceteris medicamen-  
tis atram bilem excernit, idq; facile, & citra vi-  
lam molestiā præstat. Efficax est ad morbos ce-  
rebrī, nempe melancholiā, epilepsiā, diuturnos  
capitis dolores, aliasq; atrabiliaris ægritudi-  
nes. Confort cordis tremoribus, & animi deli-  
quiis. Præterea cunctis lienis affectibus mirè  
opitulatur: itè renum vitis, & hypochondria-  
ca melancholia vexatis. Frequens epithymi  
vltus: datur enim vtilissimè aduerfus carcino-  
mata, elephantiasin, & vlcera maligna, & atra-  
quin & quartana febre detentos liberat. Epi-  
thymi vires breuissimè perstrinxit Galenus lib.

30  
1. simplicium medicamentorū, sic inquires,  
Epithymum thymi facultatem habet, ad omnia  
efficacius, excitat, & exalfacit ordine tercio.  
hactenus Galenus. Verum quia Epithymum  
ob similitudinem mihi ad memoriam reuoca-  
uit CASSIUS, ita à peritioribus  
medicis vocatum, licet officinis, & herbario-  
rum vulgo Cassutha nominetur, cum à ve-  
teribus Græcis nihil, quòd constet, de ea  
memoriæ proditum sit, hic locus postere  
videtur, vt de ea aliquod disseramus.

40  
Cassutha igitur, siue Cassutha eius generis est,  
vt in fructibus, & herbas epithymi modo pro-  
stat, & vltus earum adminiculo fulta, nulla  
radice

*Epithymi  
dicitur ex  
Mesue, et  
Galeno.*

*Cassutha  
histor. c. 6  
vires.*

CASUTHA.



capreolis crassitudine, & facie pares. Sunt qui parent, admirabile hoc plantæ genus Plinio Cassitam appellari libro x v i. capite vitimo, ubi ita scriptum reliquit. Est & in Syria herba, quæ vocatur Cassity, non tantum arboribus, sed ipsæ etiam spinis circumvoluens sese. Nec plura Plinius. Ex quibus equidem, quod reperiantur Plinij codices, in quibus: cassityas, non cassityas legitur, quodque hæc arboribus tantum, & spinis se circumvoluat, nostra verò Casutha duntaxat herbas, & frutices, non arbores complectatur, & irretiat, non ausim affirmare vulgarem cultum esse Plinij cassityam, præsertim cum in Syria tantum nasci scribat ipse Plinius. Credidere præterea plerique Casuthæ eandem inesse facultatem, quæ & plantis inest, in quibus nascitur. Quorum vixque sententiam potius probandam, quam refellendam censeo, argumento quod Epithymum isdem, Galeni auctoritate, polleat viribus, quibus & thymū. Excelsit Casutha ordine primo, siccatis sterendo. Abstergit, & quadam cum adstrictione roborat. Iecoris obstructions aperit, insarcti lienis vitia expedit: venas pituitosis, atque biliosis exonerat humoribus: urinam pellit, & regio morbo subuenit. Furorē inter febribus auxiliatur: sed diuturno viti ventriculum grauat, quæ tamen noxa tollitur, si anisi momentum adiciatur. Bilem deicit, præsertim abanthio admitta. In quem usum decoquitur, bibiturque: eius decocti felibera, cum sacchari sequencia. Quod Græci *inistepus*, Latini quoque Epithymum dicunt: Mauritani, Efficimo, seu Eficemo: Itali, Epithimo: Hispani, Cabellos, seu flores del thomilho: Galli, Teigne de thyn.

ALYPVM. CAP. CLXXIII.

ALYPON furculosa herba est, sub rubra: gracilibus ramulis: tenuibus foliis: flore molli, leui, & copioso: ra-

radice nixa, sed velut ab alarum sinu prodeuntibus cæcis, capillamentis longissimis. Hæc statim ab exortu plantarum ramulis se implicat, & adeo crebris inuolutionibus his se circumuoluit, vt breui plantas ipsas strangulet, atque enecet. Foliis nullis vnquam vestita visitur. Flores tamen edit albos, quam plurimos, à quibus semen tenue prodit. Cirri rufescent, vitium

10

ALYPVM.



30

post, ubi de simplicibus medicamentis vomitum cientibus tractauit, ita scribit. Turpetum, quod radix est ptyusæ, & album alypiæ, glutinosam detrahunt pituitam. Verum quia idem Aduarius, paulo ante Alypum describens, prodidit eius semen atram bilem per alium ducere, putauere quidam Aduario alypiam ab alypo differre, quod huius seminis tantum vires reddiderit. Sed his respondi potest, quod cum probè scierit Aduarius aliam vim inesse semini, aliam verò radicibus, proinde de radicibus sub turpeti, & de semine sub Alypi nomine differuit. Plantæ enim habentur, quæ alium foliis, alium semine, alium radicibus effectum præbent. Medium herba nobis exemplo erit, quæ, Dioscoridis testimonio, menses sistit, cum tamen eius semen contrarium efficit. Quamobrem facile crediderim Alypum, & Alypiam nullis inter se notis diffidere: nec modò his rationibus fretus, sed etiam Pauli auctoritate, quippe qui libro v i i. Alypum inter ea, quæ atram

50

Alypi cox  
fiduciat.Opinio  
querenda  
refutata.Alypi Ci.  
verbis, res ex  
Pauli.

bilem depellant, commemorauit illis verbis, res ex Alypi semen inferius atram purgare bilem pari epithymo mensura, cum siccæ, & aceto distillat: intestina verò, si fidem Dioscoridi accommodamus, leuiter exulcerat. Est autem, meo iudicio, quæ nunc Alypias vocatur, hæc Paulus. Ex quibus palam est, Paulo nullam inter Alypum, & Alypiam fieri differentiam. Cæterum ad nos solum radicem deferri, neque vllum hæcenus qui plantam, vel semen ostenderit, me natum fuisse,

fuisse, antea prodideram in commentariis nostris Italica lingua conscriptis. Verum hoc tempore Lucas Ghinus vir rei medicæ eruditissimus, Pisis herbam hanc pro Alypo ad nos misit, cuius hic picturam damus, quæ quidem descriptioni pulchrè quadrare deprehenditur. Alypi, quod legerim, non meminit Galenus in simplici medicamentorum censu. Hic de Turpeti viribus nobis discernendum esset, nisi superius in Tripolij cōmentatione, eius historiam, ac facultates latius prosecuti essemus, quàm vt adhuc plura dicenda, vel addenda supersint. Herba, quæ *ἄλυνος* Græcè, Alypum quoque & Alypia Latine dicitur: Italicè, Alipo, Gallicè, Turbit blanc.

EMPETRYM. CAP. CLXXXIII.

EMPETRON aliqui phacoides vocant: nascitur in montibus, & maritimis, falso gustu: sed quò propius terreno fuerit, amarius sentitur. Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

*Empetria  
considera-  
tio.*

EMPETRI herbae faciem nullis prorsus notis depinxit Dioscorides. Vnde solo nomine nobis de hac herba potius diuinandum esset, quàm quòd aliquid certi, ac perpetui statui possit. Non desunt tamen qui Oedipum se faciant, & hæc Dioscoridis obscura quasi enigmata zudeant soluere. Hi siquidem Empetron eam plantam putant esse, quam hodie Romani Fœniculum marinum appellant, alij vulgari sermone herba di san Piero. Sed hanc nos superius libro secundo legitimum esse crichum, pluribus probauimus. Porro & vbi nascatur Empetron, & quibus facultatibus sit præditum, Plinius quoque tradidit lib. x xvi. cap. ix. ita vt ea planè à Dioscoride mutuatus deprehendatur. Verum in reddendis medicinis, nominis fortasse similitudine deceptus, quòd Empetron fraxinam esse existimauerit, vires, quæ virique seorsum tribuit Dioscorides, ipse vni Empetro assignauit, addens huic, quòd vrinæ creat, & calculos frangat: quæ medicinæ saxifragæ debentur. Qua in re Plinium omnino errasse fatendum est. Empetri meminit Galenus libro vi. simplici medicamentorum, vbi de eius viribus in hunc modum disserit. Empetron ad totas purgationes videtur esse commodum, bilem, ac pituitam educens. Gustu salsum est: proinde ad alia quoque vtaris licet, ad quæ polere ostendimus substantiam salisam. Nominatur item prasoides. Hæc Galenus, qui tamen à Dioscoride in nomenclatura discordat: quandoquidem alter Empetron phacoides à quibusdam vocari prodidit, alter verò prasoides dicitur. Quare non deest suspicio, quin aut horum alter errauerit, aut alterius codex hoc in loco sit deprauatus. Non enim video, quo-

*Plinij  
error.*

*Empetria  
vires ex  
Galen.*

modo rectè idem Empetron simile reddi possit, & lèti, & porro, vt illa nomina demonstrant. Quod Græci *ἔμπετρον*, Latini similiter Empetrum & Calcifragam nominant: Itali, Empetro.

*Nomina.*

VITIS SYLVESTRIS.  
CAPIT. CLXXV.



VITIS sylvestris sarmen-  
ta vitis modo  
prælonga emit-  
tit, aspera, li-  
gnosa, rimoso  
cortice, foliis  
hortensis sola-  
ni, longioribus  
ac latioribus,  
muscoso flore,  
& capillaceo:  
fructu exiguis  
vitis simili, post  
maturitatē ru-

bente: rotunda est acinorum facies.  
Feruefacta radix in aqua, & in cyathis  
duobus vini aqua marina diluti, pota,  
humorem alui ciet: ideo hypopitici  
datur. Vitis eius vitia cutis in facie, &  
maculas omnes expurgant. Enascen-  
tes viticula, cibi gratia, sale cōdiuntur.

VITIS sylvestris planta est in Hetruria mulieribus notissima: vt pote qua eius vires, qui-  
bus lentiginis, & maculas in facie emendant, plurimum vtiuntur. Hæc constat foliis hortensis solani, sed longioribus, ac latioribus: floribus racematim coherentibus (ita enim legendum censeto in Dioscoride, non muscosis, vt vulgata habent exemplaria, Orisabij testimonio fretus, qui hoc loco nō *serpidan*, sed *serpidan* legit) capillaceis, purpureo colore: fructu exiguis vitis simili, rubente, ac vinoso. Illud porro nobis obflare potest, quò minus hæc sit vera Vitis sylvestris, quòd est eius sarmenta, quibus vinitæ vitis modo vicinas arbores scandit, ac vincit, quadantenus aspera videantur, non tamen, vt in Dioscoridis codicibus scriptum reperit, rimoso sunt cortice, sed albo. Huic obiectioni ita respondere possum, quòd ea non sit legitima huius plantæ nota, nam quòd verbum illud *rimosum* non legatur in Orisabio, facit vt suspicer in Dioscoride hoc loco mendum ac vitium subesse. Hinc itaque moueor, vt hanc pro sylvestri vitis nunc proferre non dubitem, donec alia nobis, aut alia comperta sit planta, quæ magis notis omnibus

*Vitis syl-  
vestris con-  
sideratio.*



bus illi respondeat. Theophrastus vitem sylvestrem Atragenam vocasse videtur libro v. cap. ultimo de plantarum historia, ubi de fomicibus ad ignem concipiendum egit. Antiqua enim ætas chalybem fortasse non experta, ex ligno duriore, & fungoso ignem parabat quod, meo iudicio, sylvestris vitis materies admodum apta fuit. De huius vitis sylvestris viribus scripsit Galenus lib. v. 1. simplicium medicamen-

*Vitis syl-*  
*vestris*  
*vi ENGA-*  
*lena.*

*Nomina.*

torum, his verbis. Vitis agrestis racemi extergendi vim habent, vt ephelus, & æneus, & id genus omnia in extrema cute existentia curare possint. Sed & adstrictionem quandam extrema germina obtinent, quæ & sale condiri assolent. Quæ vitis *αἰγία* Græcis, Vitis sylvestris Latinis vocatur: Vitis saluatica, Italica.

VITIS ALBA. CAP. CLXXVI.



VITEM albā aliqui bryoniā vocant. Foliis, viticulis, pampinisque satiuam vitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia: ea, quos prope se nacta sit frutices, suis clauiculis complectitur: fructus rubens in vva dependet, quo co-

ria pilis spoliatur. Ex ea asparagi, qui prima germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum, & vrinam cient. Folia, fructus, radix acrem vim fortiuntur: itaq; vlcenum phagædenis, gangrænis, chironiis, putrentium tibiærum radio, effica ceter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat: vitia cutis in facie, varosque, lentigines, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta Chia, & sœno græco. Eodem effectu prodest decocta in oleo, vsque dum liquefcat: sugillata tollit, & reduvias committit. inflammationes discutit illita ex vino: suppurationes rumpit. medicamento aptè immiscetur, quod carnem exest: infracta ossa extrahit, trita, & imposita. Datur comitialibus in potu, drachmæ pondere, quotidie anno

toto: prodest attonitis, & vertigine laborantibus, consimiliter assumpta. Contra viperarū ictus pota drachmis duabus, auxiliatur: partus necat: mentem interdè subturbat. Fœminarum locis apposita partus, secundasque morantes trahit: cit vrinam pota. Eclegma ex ea fit cum melle, difficilè spirantibus, strangulatu oppressis, tussientibus, vulsis, ruptis, & laterū doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto triginta diebus, consumit: illinitur ad eadem cum fico. Ad muliebres quoque infusus decoquitur: siquidem valuas purgat, sed abortum facit. Succus è radice vere exprimitur, qui trahit pituitam cū aqua mulsa potus. Ad psoras, & lepras semen efficaciter illinitur. Lactis abundantiam facit succus eius, si cum tritico decocto sorbeatur.

VITIS alba officinis, & herbariis Bryonia *Vitis alba* nominatur. Vulgò mulieribus Cucurbita sylvestris *considera-* dicitur. Nota omnibus ferè planta est, quod *ta, & vi-* passim secus vias, & propter sepes proveniat. *res.*

Hanc inter sua deiectoria medicamenta reposuit Mesues, qui de ea hæc ad sensum scribit. Vitis sylvestris, quod hausta, quemadmodum & dracunculus, ventriculo, & iccimi noxam inferat, danda non est, nisi aromatum pulvere permixta, aut addito mastiche, cydoniis malis, aut aliis astringentibus, roborantibusque medicamentis. Succus è contrita radice expressus pituitam eiicit, vrinam remorantem trahit, & cerebrum mundat, quin etiam pectus, & neruos à pituitosis, putridisque excrementis: viscenum obstructiones aperit: renes à calculis expedit: subuenit item vertiginosis, contriti- libusque. Præstat opem mirificè tussientibus: & induratos tumores resoluat, præsertim lienis, si cum vino, & sicibus tusa radix illinatur. Menstrua elicit, & vniuersum purgat vterum, atque etiam sacrum expellit, si in eius decocto infideat femina. Succus fabarum, aut cicerum farina exceptus, maculas in facie, & vulnenum cicatrices emendas, sinimenti modo adhibitus. / Oleum excauatis eius radicibus immixtum, cineribusque incotum, sugillata delet. Præterea mulieres vuluæ strangulationibus obnoxias mirum in modum iuuat, adeo vt eas strangulatæ liberet, & sanet. Equidem noui mulierem quotidie ferè per annos hoc morbo vexatam, quæ tandem à quodam vulgari herbario edocia, vt vinum album biberet, in quo vitis albae radicis vncia efferverit dormicum itura semel in hebdomada, cum hac medicina per annū vsa fuisset, optime ex illo morbo

*Vitis alba* hoc conuoluit. Vitis alba meminisse Galenus  
*libro v. i. simplicium medicamentorum* de  
 eius viribus ita scribens. Vitis alba, quam &  
 Bryoniam, & Phlothrū vocant, prima quidē  
 germina ab omnibus pro more in vere  
 eduntur, vepote edulium stomacho, eo quod  
 adstringat, gratum. Habent etiam subamaram,  
 & modicē acrem adstringentem: quare & vrinā  
 moderatē cient. At radix & abstergentem,  
 & desiccantem, & tenuius partium, ac  
 moderatē calidam vim obtinet: quamobrem  
 & lienes induratos liquat, tum epota, tum foris  
 cum sicibus imposita: & pforam, & lepram sanā.  
 Porro fructus eius racemi speciem præferens,  
 his qui coria tingunt, vilis est. Planta  
 hæc Græcis ἀμύνια δονά, & σπυρία vocatur:  
 Latinis, Vitis alba: Mauritanis, Fesfre, Alfesfre,  
 Fessera sive Alfesfera, Nezarieſan seu Nezar-  
 chasen: Italis, Vite bianca, & Zucca saluati-  
 ca: Germanis, Steckvurtz, & Teutekirbiz: Hi-  
 spanis, Nuxa & Anorea: Gallis, Colubrine, &  
 Couleuree.

Nomin.

VITIS NIGRA. CAP.

CLXXVII.



NIGRA vi-  
 tis, quam ali-  
 qui nigrā bryo-  
 niam vocant, fo-  
 lia fert hederæ,  
 smilaceis proxi-  
 ma, sed maiora:  
 caules etiam co-  
 gnatos: capreo-  
 lis suis arbores,  
 quasi adminicu-  
 la, comprehendit:  
 fructus racemati  
 cohærent, qui inter

principia virent, & post maturitatem  
 nigrescunt: radix foris nigra, intus bu-  
 xeo colore nitet. Viticulæ, quæ primo  
 germinum partu erumpunt, in olera  
 recipiuntur. mentes pellunt, vrinās  
 cient, lienem absumunt: vertiginosis,  
 comitialibus, nervorum resolutione  
 tentatis profunt. Radix eadem, quæ vi-  
 tis alba præstat, sed inefficacius. Folia  
 cum vino exulceratis iumentorum cer-  
 nicibus commodissimè illiniuntur: lu-  
 xatis itidem imponuntur.

VITIS nigra Hetruscis vulgò appellatur  
 Tamaro, corrupto à tanno vocabulo. Sunt  
 enim qui hanc tannum, siue tannum etiam  
 vocent, vnde Latinis eius vna Tannina dicta  
 est. Huius viticulæ, quæ vere primum è terra  
 erumpunt, quod asparagis similes sint, eorum  
 more decoctæ, hæc etiam tempestæe mandun-  
 tur, quannus non eam, quam asparagi, cum  
 palato ineant gratiam. Frequenissima hæc in  
 Hetruria prouenit, quin & in Goriensium comi-  
 tatu, vbi Martio & Aprili mensibus, eius cau-  
 culi in fasciculos digesti in foro veniunt ad  
 ciborum vsū. Huic tamen, quæ in Italia na-  
 scitur, illud tantum obici posse putarim,  
 quod in vuarum colore ab illa diffidere inue-  
 niatur, quam Dioscorides representauit, quod  
 huic vix post maturitatem nigrescant, nostræ  
 verò perpetuò rubentes spectentur: cætera  
 enim, meo quidem iudicio, inter se maximè  
 conueniunt. Sed illud nihil me mouet, neque  
 facit, vt mutare debeam sententiam, & crede-  
 re hanc aliam esse à Vite nigra, quod sæpe vi-  
 derim solum hortenſe quibusdam in locis  
 vuas ferre modò nigras, modò rubentes, mo-  
 dò croceas: quandoquidem natura plerumque  
 cum florum, & fructuum colore ludere so-  
 leat, vt in vuis, cerasis, moris, sicibus, prun-  
 is, malis, & aliis compluribus perspicuè cer-  
 nitur. Idcirco nil mirum esse debet, si in Ita-  
 lia Vitis nigra rubentes vuas proferat, alibi  
 verò nigras, vt in Græcia, Asia, aliisque ca-  
 lidioribus, quod huiusmodi discriminā sepe  
 numero cæli, ac soli diuersitate contingant.  
 Hæc igitur ratione fretus, quæ ni fallor, illam  
 obiectionem diluit, non dubitauerim asse-  
 re, hanc plantam, cuius etiam hic effigiem  
 pictam damus, esse veram ac genuinam Vitem  
 nigram, quoniam cæteræ omnes prorsus notæ  
 illi adſtipulari deprehenduntur. Cæterum credi-  
 dit Leonardus Fuchſius, medicus nostræ æta-  
 tis celebris, eam stirpem esse legitimam Vitem  
 nigram, quæ nostris in Hetruria vulgò Vitalba  
 dicitur, quamq; alteram esse Dioscoridis cle-  
 matidē superius huius libri initio abunde osse-  
 dimus. Verum hæc eius opinio nobis, pace sua,  
 planè reprobanda videtur. Siquidem nostræ  
 Vitalba non habet radicem foris nigram, intus  
 buxæo colore: non fert folia hederæ maiora,  
 sed potius minora, & per ambitum lacinia-  
 ta: nec scinca edie intracemi modū, sed simul com-  
 pactum, nulla cum vris similitudine. Adde,  
 quod eadem sua facultate exulcerat. Vitis verò  
 nigra exulceratis bonum ceruicibus medetur, &  
 luxatis ob adstringentem vim, quam habet, vi-  
 lissimè imponitur. Vitis nigra vires paucis per  
 strinxit Galenus lib. v. i. simplicium medicame-  
 ntorum, scinquens Vitis nigra (vocat autem  
 hæc propriè bryonia) viti alba ad omnia  
 similis, nisi quod imbecillior. hæc tamen Galenus  
 de vite nigra. Huius autem succo (vt est author  
 Mesues) nihil valentius ad strumas sanandas, si  
 cum viti, & mellis æquali portione is hauri-  
 tur. Præ

Fuchſi o-  
 pin. repro-  
 bato.

Vires ex  
 Galeno.

tur. Præstat ad idem radix quoque si tusa, & melle excepta illinatur. Sed quoniam Vites tam alba, quam nigra, de quibus hæcenus dictum est, mihi in mentem eam herbam redegerunt, quæ aliquibus vulgocatur ALSA MINA, aliis Viti-  
*Viticele, sine Bal- mine, et flor.*



cella, aliis Momordica, aliis Caranza, cum veteribus nihil de ea posteritatis memoria proditum, sit, sitq; doctibus, quam plurimis non obsecuris prædita, hunc locum opportunum duximus, in quo huius herbe historia pertractetur. Est itaque VITICELLA, siue Balsamina, planta, quæ prælongis, tenuibusque viticulis, vtro citroque repræstibus, proximas tum herbas, tum arbutusculas comprehendit: foliis vitis albe, aut viniferae similibus, sed longè minoribus magisque per ambitum lacinia-  
*Viticele, sine Bal- mine, et flor.*

tur. Præstat ad idem radix quoque si tusa, & melle excepta illinatur. Sed quoniam Vites tam alba, quam nigra, de quibus hæcenus dictum est, mihi in mentem eam herbam redegerunt, quæ aliquibus vulgocatur ALSA MINA, aliis Viti-  
 cella, aliis Momordica, aliis Caranza, cum veteribus nihil de ea posteritatis memoria proditum, sit, sitq; doctibus, quam plurimis non obsecuris prædita, hunc locum opportunum duximus, in quo huius herbe historia pertractetur. Est itaque VITICELLA, siue Balsamina, planta, quæ prælongis, tenuibusque viticulis, vtro citroque repræstibus, proximas tum herbas, tum arbutusculas comprehendit: foliis vitis albe, aut viniferae similibus, sed longè minoribus magisque per ambitum lacinia-  
 tis, capreolis tenuibus exalarum sinu prodeuntibus quibus sese implicat appositis adminiculis. Florem præmit cucumeri similem, colore subluteum: fructum utrinque turbinatum, qui omni ferè faciem repræsentat, cute carnosa, quibusdam acutis bullis rigente, disti-  
 ci modo. Huic maturo puniceus color, qui præterea facile dissilic vltimam maturitatem adeptus. Semen includit anguria vocatæ simile, minus tamen contextum cute crassa, pingui, lubrica, & perquam robente. Planta hæc gracili nictur radice, nec citius fructum perficit, ac maturat, quam aducente autumno, Augusto, & Septembri mensibus. Nusquam nisi fata, quod sciam, in Italia prouenit: pluribus autem in locis insibi plantatur, & nascitur. Folia vulnera re-  
 centia glutinant. Fructus exempto semine insolantur diu in oleo omphacino, aut macerantur eodem oleo in balneo calentis aquæ, aut equino calente fimo, sique inde oleum præstantissimum ad arcendas vulnerum, mamillarumque inflammationes, doloresque mulcendos. Valer idem ad exulceratos, inflammatosque vteros siphone iniectionem. Doloribus hæmorrhoidum mirè auxiliatur: in quem vsum macerantur fructus (vt diximus) oleo amygdalino dulci, aut è semine lini expresso, addita ad vnamquamque olei libram, liquidæ vernicis vncia. Medetur hoc ambustus tam igne, quam aqua. Punctis, fluctatque neruis vtiliter illinatur: quoniam & vulnerum cicatrices tum attenuat, tum etiam prorsus delet. Scribunt recentiorum quidam, steriles mulieres fecundas fieri, si a balneo medicamenti vtero conferenci-  
 bus parato, hoc oleo vteri osculum sibi perun-

xerint ac demum suis se iunxerint viris. Ramificis pueris efficac remedium est, si eo locus sæpius perungatur. Foliorum pulvis (vt si affirmant, qui periculum fecerunt) cochlearis mensura ex pulgarginis, siue equiseti decocto, intestinorum vulnera sanat. Nec desunt qui eundem puluerem laudibus efferant, ad coli dolores, & intestinorum tormina. Porro illud hic, prætereundum non est, ne forte huiusce plantæ nomina alicui imponant, quod sunt qui Momordicam etiam appellant geranij genus quoddam, illud scilicet, quod maiora inter cætera folia profert, malæ amplitudine, de quo libro tertio in Geraniis abundè differuimus. Quæ Vitis nigra Latinis, *Σκιάρα* Græcis nominatur: Arabibus, Fesre festanin, Fesfresim, Akfresim, siue Fesfresim, Italis, Vite- nera, & Tamaro: Hispanis, Congorca, Gallis Celeaurée noyre, vel Tam.

## FILI X: VITIS.

## CAPVT CLXXVIII.

FILIX folia sine caule, sine fractu, sine flore, ex vno pediculo cubitali longitudine exvnto, multifida, & lateribus pinnata, sub graui odore: radice per summa cespitum, nigra, oblonga, filices multas fundente, subastringente gustu, nascitur in montibus, & saxosis. Radix latas tineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulla: melius si cum scammonia, aut veratri nigri totidem obolis detur: sed qui sumunt, alia prægustare debent. laborantes lienis incremento recreat. Radix & potu, & illitu cum axungia, vulneribus sagitta arundinea factis, est auxilio. cuius rei probatio talis fertur. Peribit filix, quam per ambitum fata copiosior arundo coronet: & contra evanescens abibit arundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit.

## FILI X: FEMINA.

## CAPVT CLXXIX.

FILIX femina foliis est filicis furculosis, altioribusque, & quæ non singulari, vt illa, pediculo fulcian- tur: radicibus longis, pluribus, obli- quis, quæ ex nigro in luteum flauescunt: aliquæ etiamnum rubræ inueniuntur.

Pellunt lata interancorum animalia, cum melle, eclegmate sumpto; pota cum vino drachmis tribus teretes tineas efficiunt. Datæ feminis sterilitatem faciunt: & prægnantibus abortum

si supergrediuntur. Farina humidis viceribus, & cicatrici repugnantibus inspargitur: iumentorum ceruicibus medetur. Folia recentia in oleribus cocta manduntur, vt ventrem emolliant.

FILIX MAS.



*Filix  
Sterilisque  
hystoria.*

**FILICIS** tam maris, quam femineæ, quibus scater vniuersa Italia, meminit Theophrastus libro 1 x. capite x x. de plantarum historia, his verbis. Filix femina vulis contra interancorum animalia lata, melle subacta: & contra tenuia, in vino dulci cum farina hordeacea data. Si mulieribus grauidis detur, abortum facere: si cæteris, steriles in totum reddere aiunt. Differt femina filix à mascula, quod folium vni co artu porrectum hæc habeat, radicem verò crassam, longam, & nigram. Harum igitur vires sterilitati addidisse natura putatur. Hæcenus de filicibus Theophrastus. De his etiam scripsit Plinius libo x x v i i. capite 1 x. sic inquit. **Filicis** duo genera, nec florem habent, nec semen. Pterin Græci vocant, alij blechnon, cuius ex vna radice complures exeunt filices, bina etiam cubita longitudine excedentes, non graues odore. Hanc marem existimant. Alterum genus d. elypter in Græci vocant, alij nymphæa pterin. Est autem singularis, atque non fruticosus (forte rectius non singularis, atque fruticosus) breuior, molliorque, & densior, solus ad radicem canaliculara. Veriusque radice suæ pinguiscent. Folia vtriusque lateris pinnata, vnde nomen Græci impostere. Radices vtriusque longæ, & obliquum, nigre, præcipue cum in aruere: secari autem eas sole oportet. Nascuntur vbique, sed maxime frigido solo. Effodi debent Vergiliis occidentibus. Vtus radicis in trinitatantum, neque ante, neque postea. Pellunt interancorum animalia: ex his prænas cum melle, cæteras ex vino dulcitruduo potæ. Vtræque stomacho inuicibilissima. Alum soluit, primo bilem trahens, mox aquam, melius prænas cum scammonij pari pondere. Radix eius diuina

FILIX FEMINA.



obolorum pondere ex aqua, post vnius diei abstinentiam bibitur, melle præguflato, contra rheumaticos. Neutra danda feminis, quoniam grauidis abortum, cæteris verò sterilitatem facit. Farina earum viceribus tetrus inspargitur, iumentorum quoque ceruicibus. Folia cimicem necant, serpentem non recipiunt. Et libro x v i i i. capite v i. idem de Filice hæc scripto reliquit. Filix biennio moritur, si frondem agere non patiaris. Id efficacissime contingit germinantis ramis baculo decussis: succus enim ex ipsa desiliens necat radices. Aiunt & circa solstitium ausus non renasci, nec arundine sectas, aut exaratas vomeri arundine impositas. Filicem vtranque prodidit Galenus libro v i i i. simplicium medicamentorum, vbi de ea cum viribus in hunc modum disserit. Filix mas radicem habet maxime vilem: latum enim lumbricum interficit, si quis eam quatuor drachmarum pōdere in aqua mullâ compescit. Ad eundem modum forum viuum quidem necare, mortuum autem elicere mirum non est: est enim amara, paulum habens adstrictionis. Quamobrem viceribus imposita valenter desiccandi facultate obinet, nō tamen mordax est. Similem ei vim habet Thelypteris nominata. Planta Græcis *uſſus* & *uſſigis*, Latinis Filix appellatur: Arabibus, Sarax, sive Sarach: Italijs, Felce: Germanis, Vualdsiam: Hispanis, Helech yerua: Galijs, Fougierre, & Ofnonde royalle.

*Filix Sterilis  
ex Galieno*

*Nomina*

**FILICULA.** CAP. CLXXX.

**FILICULA** nascitur in muscosis petris, & vetustis arborum caudicibus, præsertim quercuū, palmi altitudine, sili.


filici similis, subhirsuta, non tenui perinde diuisura. Radix pilosa, in qua continentur cirri, seu polyporum, crassitudine digitiminimi, coloris intus herbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis. Purgandi vim habet. Coquitur

cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. Arida farina aquae mulsae inspersa, detrahibilem, & pituitam: trita luxuriae efficaciter illinitur, & aduersus rimas, quae inter digitos sunt.

POLYPODIUM.

10

POLYPODIUM ALTERUM.



*Polypodium confid.*

**POLYPODIUM** Latinis Filicula nuncupatur. Recentiores medici, atque etiam officinae Graecum nomen retinent. Eius duo reperiuntur genera. Alterum, de quo hic Dioscorides differit, omnibus notum est, quod ubique locorum frequens proveniat. Alterum vero non nisi paucis cognitum esse reor, folio asplenii, sed longiore, viridioris, magisque per ambitum laciniato: radice priori simili, graciliore tamen paulo. hoc plurimum nascitur in montium sylvis. Nos copiosum vidimus, legimusque; quibusdam in montibus, per quos iter breue ac compendiosum faciunt, qui Goritia Labacum contendunt. Praetulit Mesues filiculam, quae in quercuum caudicibus gignitur, quod ea, quae solo, aut muscosis lapidibus innascitur, suo quodam exuberante, incoccoque humore maximè ventriculo sit noxia, quoddamque ipsum flatibus repleat, ac etiam subvertat. Id quod postea in vniuersum de omni Filicula subiunxit, dicens Polypodium inter ea recensetur medicamenta, quae vel maximè corpora exiccant, & extenuant: subuersione, & nauseam facit. In quo tamen Mesui refragatur doctissimus Manardus Ferrariensis, asserens, quod polypodium, cum imbecilliter leniterque purget, corpora extenuare non possit: addens se certo scire, quod idem per se exhibitum, nullam stomacho inferat iniuriam. Proinde Auerroei in hoc magis ad stipulandum censet, quam alteri: quandoquidem Auerroes auctor *Actuario*, est, Polypodium tutum esse medicamentum, & epithymo praestantius. Polypodium (vt testa-

tum reliquit Aetnarius in libro de compositione medicamentorum) bile, & praesertim atram, & pituitam extrahit. Dantur purgatae radices leni scrupuli adfusa aqua mulsae. Mediocriter verò aluum ciēt, & citra molestiam, tum in galinaceo iure, tum in cremore prisanæ cocta radix. Polypodio facultatem duntaxat assignauit Galenus libro  $\vee$   $\text{I}$   $\text{I}$   $\text{I}$  simplicium medicamentorum, iis verbis. Polypodium dulcem simul & austeram habet vinecentem qualitatem, vt facultatis sit admodum desiccantis, citra morsum tamen. haec Galenus. Ex quibus sanè facis constare posse arbitror, Mesuem rectè dixisse, & in hoc immeritò à Manardo reprehensum fuisse. Nam quod Polypodium abundè exiccet, Galenus testis est grauisissimus. Ex quo cur etiam efficaciter extenuare non possit (vt inquit Mesues) non equidem video. Quare potius adducor, vt in hoc opinio Manardi aliqui celeberrimi, mihi planè reprobanda videatur. *veritas Nomina.* quod Graecis, Latinis similiter Polypodium & Filicula vocatur: Mauritanis, Bisberg, Aiberg, siue Bessaigi: Italis, Polypodio: Germanis, Engelsesz, Baumfar, & Droppflaunurz: Hispanis, Filipodio, & Polypodio: Gallis, Polypode.

DRYOPTERIS. CAP. CLXXXI.

**DRYOPTERIS** nascitur in veterum quercuum musco, filici similis, multò minore foliorum incisura: radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dul-

*Polypodium Gires ex Actuario.*  
*Et Gal.*

in dulcedinem vergētibz. Psilothrum est cum radicibus trita: illinitur enim primum vsque dum sudorem euocet, mox sudor abluitur, & recens imponitur.

*Dryopteridis confideratio.*

DRYOPTERIS.



Non aliud Græcis significat Dryopteris, quam filix in quercubus nascentes, quod filix hæc in annosis, muscosisq; (vt Dioscorides inquit) quercubus proveniat, foliis filicem ad vnguem referētibz.

Nascitur etiam humi mento solo, & inter vepres, circa quercuum caudices: et siquidem ipse in Goritienfi agro pluribus in locis inueni extra quercuum caudices enatam, nullis repugnantibus notis. Dryopteris iis, qui sylvas ingentes frequentant, notissima est.

*Dryopteridis famulatio Galeni.* Dryopteridis meminit Galenus libro 1. simplicium medicamentorum, eius facultates referens his verbis. Dryopteris gustu mistam facultatem præfert, dulcem, acrem, amaram: in radice vero item acerbam. Facultatem habet septicam, proinde etiam pilis glabram cutem efficit. Quæ *Aphysi* Græcè, Dryopteris item & Filix quercus Latine dicitur.

*Nomina.*

CNICVS. CAP. CLXXXII.



CNICVS foliis constat oblongis, per ambitum diuisis, asperis, spinosis: caule sesquipedali: capitulo magnitudinis grandis oliuæ: flore crochi semine cædido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore in obsoniis vtuntur. Seminis tusi, & expressi succus, cum

aqua mulla, vel iure gallinacei, aluum purgat: sed stomacho aduersatur. Ex eo autem fiunt offula, quas placentulas vocant, adiectis succo amygdalis, nitro, aniso, & melle decocto, quæ aluum emolliunt. Hæc in partes quatuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant: è quibus ante coenam duas, vel tres sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est. Cnici candidi sextarius, amygdalarum tostarum & delibratarum cyathi tres, anisi sextarius vnus, aphronitri drachmæ vna, cum carnibus triginta caricarum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluerendæ alui facultate donat.

Sunt et in Italia, qui Cnicum Crocum Saceracenicum appellant, quod eius flore plerumq; croci loco rura vtantur: tametsi officinæ Mauritanos secutæ Caranum vocent. Cnicus (vt author est Theophrastus libro 1. cap. 1.1.1. de plantarum historia) duorum est generum, satium vnum, alterum syluestre, vt latius libro tertio in Atractylidis mentione retulimus.

Porrò in vsum medicinæ semen tantum venit. Quod (vt Mesues inquit) haustum superne, inferneque purgat. Pituitam, & aquas extrahit: quo fit, vt coli dolore affectis, & aqua inter cutem laborantibus opem mirifice præstet, non modo haustum, sed & clysteribus infusum. Seminis medulla à putaminibus repurgata, & saccharo ecleptematis modo excepta, pectus, & pulmones abstergit, vocem clarificat, prolificumq; semen auct. Cnici vires paucis perstrinxit Galenus libro 1. simplic. medic. sic inquitens. Cnici semine duntaxat ad purgationes vtitur. Tertij est ordinis exaltacientium, si quis foris eo vti velit: Eius planta *nik* Græcis, Cnicus, & Cneus Latinis appellatur: Mauritanis, Kartam, siue Charchom: Italis, Zaffarano Saracinesco: Germanis, Vuilder saffran: Hispanis, Alacor, & Semente de papagallo: Gallis, Saffran baslard, & saffran sauage.

*Cnici Cistariæ ex Gal.*

*Nomina.*

MERCVRIALIS. CAP. CXXXIII.

LINOZEOTIS, aliqui parthenion, alij hermubotanion appellant. foliis constat ocimi, helixine cognatis, sed minoribus: ramulis duplici geniculorum modo cinctis, alarum cauis multis. fructu scæminæ, copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari è foriorum sinu dependente, paruo, rotundo, cui binis

ceū binis testiculis vnā coherentibus: frutice dodrantali, aut maiore. Vtraque in oleribus manditur, ad aluum ciendam. cocta in aqua, epoto iure, bi-

lem aquamque detrahit. Constat, vt mares gignantur, hunc facere: vt feminæ, illam, si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueat.

MERCVRIALIS MAS.



MERCVRIALES FOEMINA.



*Mercurialis confil-  
la hifto-  
ria en Plu.*

MERCVRIALEM, quæ Græcis Linozotis appellatur, duorum generum esse constat: vnum mas, alterum foemina. Vtraque non modo medicis, ac seplafariis vulgaris admodum est notitiæ, sed etiam mulierculis, & ferè omnibus, quod in clysteribus pierunque imponatur. Quare non est, cur de Mercuriali hic pluribus differamus. Subiiciam tamen quæ de ea memoria prodidit Plinius libro x. v. cap. v. iis verbis. Linozotis, inquit, siue parthenion, à Mercurio inuenta est, ideo apud Græcos hermi poan multi vocant eam, apud nos omnes 40 mercuriale. Duo eius genera, masculus, & foemina, quæ efficacior: caule cubitali interdum, ramoso in cacumine, ocimo angustioribus foliis, geniculis densis, alarum cauis multis: femine in geniculis dependente, foeminæ copioso, mari iuxta genicula flante, rariore, ac breui, con tortoque, foeminæ soluto, & candido: folia maribus nigriora, foeminis candidiora: radix superuacua, prætenuis. Nascuntur in campestribus cultis. Mirum est, quod de vtroque eorum 50 genere proditur: vt mares gignantur hunc facere, vt foeminæ illam. Hoc contingere, si à conceptu succus protinus bibatur in passo, edanturque folia decocta ex oleo & sale, vel cruda ex aceto. Quidam decoquant eam in nouo scili, cum heliotropio, & duabus, aut tribus spicis, donec decoquatur. Decoctum dari iubent, & herbam ipsam in cibo, altero die purgationis mulieribus per triduum, quarto die à balneo coire eas. Hippocrates miris laudibus in mulierum vsu prædicauit illas: eas ad hunc modum adhuc medicorum nemo nouit. Ille eas

uulx cum melle, vel rosaceo, vel iirino, vel li- rino admouit. Item ad ciendos menses, secundasque. Hoc idem præstare potu, foris dicitur. Instillauit auribus surdis succum, inunxitque cum vino vetere. Aluo folia imposuit, epiphoris, stranguriæ, & vesicæ. Decoctum eius dedit cum myrrha, & zthure. Aluo quidem soluendæ, vel in febris, decoquitur: quantum manus capiat, in duobus sextariis aquæ ad dimidias, bibitur sale, & melle admisto, necnon cum vngula suis, aut gallinaceo decoctum salubrius. Purgationis causa putauere aliqui vtranque dandam, siue cum malua decoctum. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachum lædunt. Hæstus de mercuriali Plinius. Eius quoque vires descripsit Galenus libro v. i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Mercurialis vran- tur omnes ad ventris purgationes duntaxat. Verum enimvero si quis eius facere periculum volet in cataplasmate, sanè eam digerentis ad- modum facultatis esse experietur. Aristoteles sic Græcè, Latine verò Linozotis & Mercurialis vocatur: Italicè, Mercorella: Germanicè, Bingel kraut: Hispanicè, Mercuriale, & Vrtigua muer- ta: Gallicè, Mercuriale, & Vignoble.

*Mercurialis  
latina: ex  
Galeno.*

*Nympha.*

## CYNOCRAMBE.

CAPVT CXXXIII.

CYNIA, aut cynocrambe, caulic- ulum binum dodrantum altitudine emittit, mollem, subalbidum: folia mercur

## CYNOCRAMBE.



*Cynocr.  
bes conf.  
deratio.*

VIDETUR Ruellius exillimasse Cynocrambem eandem herbam esse cum Atriplice sylvestri. Qua in re (si ita esse credidit) aperte

mercuriali, aut hederæ similia, certis interstitiis subalbida. semē foliis adhæret, parvū, rotundum. Folia cum caulibus pota, aluum crient, oleo ribus cōmendantur. Ius de cocti & pituitā, & bilē, aquām que detrahit.

10

20

erasse deprehenditur, quod præter sylvestrem atriplicem, etiam comperta sit legitima Brassica canina, quoddam de sylvestri atriplice simul cum sativa scripserit Dioscorides libro secundo. Cynocrambe, quam nos Mercurialem spuriam appellamus, in Italia omnibus ferè locis provenit, in campis, in viis, & in vineis, nulla prorsus descriptioni reclamante nota. Differt hæc ab agresti atriplice non modò foliis, & faciesed etiam caulis procēritate. Siquidem atriplex sylvestris quandoque ad duam cubitorum altitudinem affurgit. Cynocrambe verò binum palmarum longitudine contenta est. Huius nūquam, quod inuenerim, meminit Galenus in libris simplicium medicamentorum, nam ea Cynocrambe; cuius ipse Galenus, & alij rei herbariæ scriptores mentionem faciunt sub nomine Apocyni, alia est ab hac, de qua hic agitur. Quæ planta Græcis *κυνόκραμβη*, Latinis Cynocrambe, & Brassica canina appellatur: Italis, Mercorella bastarda: Germanis, Vuid bingel kraut, Gallis, Mercuriale sauvage.

*Ruellij  
er.*

*Nomina.*

## HELIOtropiUM MAIVS.

HELIOtropiUM MAIVS.  
CAPVT CLXXXV.

HELIOtropio magno flos est figie scorpionis caudæ, vnde scorpiuro ei nomen: & quoniam folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. Folia ocimi habet, hirsutiora, candidiora, & maiora: ramuli à radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis concavi: flos in cacumine candidus, aut sub fulvus, incurvatur vt scorpionis cauda: radix tenuis est, & inutilis. nascitur in asperis. Decoctum herbæ ex aqua, fasciculo manus plenæ, potu pituitam, bilemque per aluum extrahit: contra scor-

10

## HELIOtropiUM MINVS.



pionum ictus in vino potum, & illitum prodest. adalligatur ad cōceptus arceos. Aiunt per horam vnam ante accēsiones, feminis grana quatuor cum vino quartanas finire, triaverò tertianas. Illitum semen formicantes verrucas, pensilisque, & thymos, & epinyctidas exiecat. Folia infantium destillationibus, quas syriaseis vocant, podagricis, luxatisque, vtilissimè illinuntur. menses cient: partus trita, & imposita pellunt.

HELIOtropiUM MINVS.  
CAPVT CLXXXVI.

HELIOtropium paruum nascitur in palustribus, iuxta lacus, foliis antedicto



edicto proximis, rotundioribus: semine acrochordonum verrucarum modo, pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota, adiecto nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua, latus tinea, teretesque excutit. Pessiles verrucas, quae acrochordones vocantur, cum sale illita tollit.

*Heliotropij & ruifque confederatio.*

**HELIOTROPION** maius, licet in aspectis nasci Dioscorides tantum prodiderit, tamen in Hetruria, & in comitatu Goritienfi, ubi frequentissimum visitur, passim ferè prouenit, in campis, secus vias, in oppidorum plateis, & circa ædificiorum areas, aridis item, & sabulosis locis. Herba hæc apud Hetrusticos officinis Verrutaria appellatur, quod verrucas, myrmecias, & thymos affricata valenter adimat. Quare mihi, vt Ruellio quoque doctissimo, plurimum errare videntur, qui censent Calendulam officinis dictam, quæ & neoterics Caltha existimatur, esse Heliotropium maius, namque omnes profusus illius notæ huic reclamare deprehendunt. Neque eorum opinioni illud quicquid addit, quod huius Calthæ semina quodantenus scorpionum caudiculas referat, quantum Dioscoridi Heliotropij flos, non semen scorpionis caudæ effigiem repræsentat. Porro Ruellius Heliotropium hoc vocari ait herbam cancri, quod eius flores in caudæ cancri (qui nobis affacos esse putatur) similitudine insectatur. Verum hæc nominis ratio à Ruellio assignata mihi non planè satisfaciit, quod scorpionum, & affacorum caudæ forma inter se maximè differant. Vnde potius crederem, hoc Heliotropium herbæ cancri appellatione transisse, quod efficacissimum sit aduersus carcinomata, & vlcera gangrenosa ad quæ magno admodum successu eo vtuntur chirurgici, qui & plantæ, & eius vires compertas habent. Ceterum Heliotropium minus vidimus, ac sæpe legimus in Trideano agro, in palustribus quibusdam locis, idque copulosis offendimus, vt quod picturæ scorpionis respondere mihi videretur. Quod autem huius Heliotropij, aut alterius mentionem fecerit Galenus, non inuenio in simplicium medicamentorum censu. Paulus tamè veriusque meminit, sed non plura de his tradidit, quæ quæ Dioscoridi accepta referre potest. Sunt recentioribus (vt

suprà diximus) qui Calendulam vocatam, Virgilij & Plinij **CALTHAM** existiment, hoc artemisidæ gummeto nixi, quod flores aureos luteosque producit, ferat. Quorum equidem sententia non ausim omnino subscribere, aut refragari. Ea in Hetruria à florum colore vulgò Fior rancio nominatur. Hanc inibi passim acetariorum adhibent. Gustu est adstringenti, cum quadam leuissimula amaritudine. Ex quo non video, quomodo hæc, vt quidam scriptis tradiderunt, menses ciere possit, nisi id fortasse fiat ab occulta quidam facultate. Siccata puluis caulis denium immixtus, dolorem leuat. Vt Græci *ἐπιεμναι*, ita etiam Latini Heliotropium dicunt: officinæ & vulgus, Verrucariam.

**SCORPIOIDES.**  
**CAP. CLXXXVII.**

**SCORPIOIDES** herbula est, folijs paucis: semine candæ scorpionis effigie. Illita scorpionum ictibus præsentaneo est auxilio.

**SCORPIOIDES.**



**SCORPIOIDES** speciem Calendulam nominata haud dubie est censuræ, si folia, sicuti semine, Scorpoidi responderet. Verum, cum hæc folijs paucis, illa verò multis, longisque profusius, ij aperte falli deprehenduntur, qui in hac opinione versantur. Equidè veram, vt arbitror, Scorpoidem vidi primum superiori-

bus annis in Foro iulienfi agro in Ciuitate Austrie quodam in hortulo clarissimi medici Iuliani à Maroslica Teruensis. Hanc eandem, cuius hic effigiem pictā damus, dum hoc tempore diligenter curarem, vt singulis plantarum descriptionibus, quarum cognitionem habemus, pictura accederet, ad me misit quidam ex iis, qui rei herbariæ dant operam. Quam sanè suis notis veram Scorpoidè referre putamus: etsi non desunt viri doctissimi, qui aliter sentiunt. Scorpoidem breuissimè perstrinxit Galenus lib. v. 111. simplicium medicamentorum, se inquitens. Scorpoides exalciat quidè ordine tertio, debeat verò secundo. Ea non fœcus Larij s Scorpoides, ac Græcis *ἐπιεμναι* Nomen appellatur.

*Scorpoides fœcus. ex Gale.*

**CALTHA.**  
cessu eo vtuntur chirurgici, qui & plantæ, & eius vires compertas habent. Ceterum Heliotropium minus vidimus, ac sæpe legimus in Trideano agro, in palustribus quibusdam locis, idque copulosis offendimus, vt quod picturæ scorpionis respondere mihi videretur. Quod autem huius Heliotropij, aut alterius mentionem fecerit Galenus, non inuenio in simplicium medicamentorum censu. Paulus tamè veriusque meminit, sed non plura de his tradidit, quæ quæ Dioscoridi accepta referre potest. Sunt recentioribus (vt



PETRI ANDREAE  
MATTHIOLI MEDICI  
Senensis Commentarii,  
IN LIB. QUINTVM PED. DIOSCORIDIS  
ANAZARBEL, DE MEDICA

MATERIA.

\*\*

**S**UPERIORIBVS quatuor libris, amicissime Aree, tradidimus de aromatibus, oleis, vnguentis, arboribus, & earundem lacrymis, ac fructibus: item animalibus, melle, lacte, adipe, cerealibus, oleribus: necnon de omni radicum, herbarum, succorū, feminūque ratione. In hoc autem totius operis quinto differemus de vinis, & metallicis, à vite nostram commentationem auspicati.

COMMENTARIVS  
MATTHIOLI.



**Q**UONIAM non difficile tantum, sed quasi etiam impossibile esset, ut cuiuscunque scientiæ, aut facultatis principis, ac fundamentis vniuersalibus ignoratis, sciri perfectè possint illa, quæ deinceps speciatim in ea consideranda veniunt, ideo non minus necessarium, quam vile fore existimavi, si hic in vniuersum fossilium, ac metallorum materia tractaretur. Nam cū in hoc quinto libro nonnullorum fossilium medicamentorū cūq; historiam, tum facultates tradiderit Dioscorides, & ipsum secutus Galenus in libris simplicium medicamentorum, cū tamen eorū neuter originem, materiam, causas, ac alia plura in his asseruenda, ac cognoscenda explicauerit, illa

quidem hoc loco silentio inuoluenda non duximus, ut quantum per nos fieri potest, nihil quod ad absolutam rerum simplicium cognitionem, & communem usum faciat, à nobis intactum relinquatur. Cū itaq; plures tam antiquos, quam recentiores, qui de fossiliū, ac generationis metallorum materia scripserunt, diligenter sene lapidū tis perlegerim, eos utique non modo inter se sententia differentes reperi, sed in aliquibus etiam contrarios. Nam licet eorum quidam de veritatis tramite parum deflectant: videntur tamen non exactè ea omnia explicauisse, quæ hac in re maxime necessaria censentur. Fieri enim lapides, Aristoteles author est, igne non liquefcentes ex sicca ignescente exhalatione. Ex quibus deduci potest, exhalationem humidam materiam esse lapidum liquecentium, & quibus metalla constantur. quo fit, ut ex Aristotelis sententia lapides igne non liquefcentes fiant ex calido, & sicco vapore: liquefcentes verò ex humido halitu tantum. Sed opinionem hanc, qui rem alius, diligentiusq; inuestigarūt, minime probandam existimant, cū lapides longe minus, quam terræ ex vapore fieri queant. Siquidem puluis, qui sic gigneretur, vñ aliquid ex pluribus fieri nunquā posset, nisi humor illi committeretur: & omnes pariter lapides nū liquefcentes absque multa hominum opera, ac tundendi labore facili in arenam, vel puluerem transirent, si tantum ex his nullo accedente humore efficerentur. Quod profectò haud ita se habet: lapides namq; ferè innumeros admodum compactos, solidosq; videmus. id quod haud dubie ostendit, ex illo tantum vapore eos nequaquam genitos esse. Quod si ex eo lapides eiusmodi procrearentur, magis omnino fierent in sup

Aristote-  
lis opinio.

in sup

in superiore aëris regione, vt quæ facili ignis  
 contactu incendatur, quam intra terrâ. Quan-  
 doquidem omnibus liquidò constat, quam su-  
 perior illa aëris regio ex velocissima aliorum  
 conuersione, citius accendatur. Ac ceterè si  
 non alias, saltem quoties gigneretur cometa-  
 re, faces, flamme, clypeique ardentis, decide-  
 rent lapides è cœlo, aut terræ quod tamen fieri  
 non videmus. Et quauis tradiderint prodi-  
 giorum scriptores pluisse quandoque lapides, vt  
 Plinius, & alij quidam testantur, non tamen  
 hoc opinatus est Aristoteles in aëre lapides  
 gigni posse. Nempe is lapidem è cœlo dela-  
 psum ventorum vi in aërem sublatum scribit.  
 At si lapides in aëre fiunt (quod plane negare  
 non auiam) quid obstat, cur dici non possit,  
 hos ex eadem fieri materia, ex qua illi sub terra  
 generantur? quam quidem materiam facile  
 produxisse potuerint violentissimæ tempella-  
 tes: vt pote quæ repentinò aliquo motu dum  
 oriuntur, ex reliquorum elementorum muta-  
 tione terrena illa corpora genuerint. Theophrastus  
 verò non lapides solum, sed terras  
 etiam constare scribit ex pura, ac equali mate-  
 ria, quæ confluxu quodam, siue percolatione sit  
 effecta, aliòve modo excreta. Quod etsi iure  
 aliquo probari possit, non tamen iis duobus  
 modis tantum talis efficitur. Nec ea quauis  
 proxima sit materia terræ insignis, omnis etiã  
 est lapis, verum aliis quoque modis fit pura, &  
 equalis materia, vt cum succi nascuntur. Inter-  
 dum quoque necesse est, vt calor materiam  
 iis duobus modis genitam, prius coquat, vt  
 inde efficiat succum, ex quo tandem lapis, qui  
 liquefact ignis calore, fieri possit. Verum enim-  
 uero multo magis in hoc errasse Theophrastum  
 deprehenditur, quod scilicet omnes lapides  
 etiam preciosos terra abundare crediderit:  
 is enim ita inquit. Eorum, quæ in terra con-  
 sistunt, alia aquea sunt, alia verò terrena. Aquea  
 quidem sunt metalla, nempe aurum, argen-  
 tum, & reliqua. Terrena verò lapis, & lapi-  
 dum species pretiosæ, ac etiam terrarum spe-  
 cies omnes, quæ colore, vel laeuore, vel spissi-  
 tudine, aliaue facultate sunt insignes. Quando-  
 quidem si vera esset hæc Theophrasti senten-  
 tia, nulla quidem inueniretur gemma, quæ  
 transluceat, cum tamen variæ, ac ferme in-  
 numeræ reperiantur, quæ maximè pellucunt.  
 Hinc itaque fit, vt citra iniuriam dici possit,  
 non omnes pretiosorum lapidum species esse  
 terrenas, sed aqueas, id est, ex humore quodam  
 constatas, cui quæ pondus longè maius,  
 quam terræ insit. Cæterum Auicennæ opi-  
 nio, quam sequitur Albertus, multo magis ve-  
 ritati, ac rationi coherere videtur, quam aut  
 Aristotelis, aut Theophrasti. Quippe quâquam  
 non explicuerit ipse, quibus modis futura lapi-  
 dis materia congregetur, dixit tamen lutum  
 esse in primis lentum, & aquam non simplicem  
 illam, sed cum terra permistam. In qua permi-  
 xtione si plus terræ, quam aquæ confluxerit, lu-

tum dicitur, sin aquæ, succus. nihil enim aliud  
 est lutum, quam terra, quæ permaduerit aqua:  
 nec succus aliud quidam explicat, quam aquam,  
 quæ forbuierit terram, vel abraferit, terigere  
 quæ metallum. Lutum enim, ex quo lapis fu-  
 turus est, lentum, ac tenax esse oportet, cuius-  
 modi illud est, ex quo lateres & scillia fiunt:  
 nam ab alterius generis luto, quod penitus len-  
 tore careat, haud difficulter separatur, ac dissolu-  
 uitur humor, tumque non lapis ex eo efficitur,  
 sed puluis. Lutum verò tenax calor primū  
 exiccando conspissat, efficitque medium  
 inter lutum, & lapidem: deinde quia diutius  
 idem agit, vel arsius, lapidem gignit. Quin-  
 etiam succus crassus, & lentus facili conuer-  
 titur in lapidem. quod in animantibus est eu-  
 idens, præsertimque in nobis, cum iandudum  
 veteribus medicis, ac etiamnum recentioribus  
 decretum sit, tum renum, tum vesicæ calculos  
 non aliunde progigni, quam ex lentò, crasso-  
 que humore temporis tractu à caloris nostri fa-  
 culatate coactò. Ob id igitur translucentes gem-  
 mas non ex aqua tantum fieri constat, sed ex  
 puro, liquidoque succo, qui aquæ multum,  
 terræ verò tantillum refert. Siquidem si ex  
 aqua tantum huiusmodi lapides efficerentur,  
 non vique mergerentur in ea proiecti, sed  
 ea supernatarent, non secus ac glacies, & gran-  
 do. At cum omne lapidum genus demergatur  
 aqua, ac etiam crystallus, & beryllus, quæ ta-  
 men, quoniam glaciem colore repræsentant,  
 omnino videntur ex aqua constare, satis in-  
 telligimus, ex sola aqua non gigni lapides il-  
 los. Quapropter (vt in sequentibus suo loco  
 dicetur) planè explosenda venit Plinii, & alio-  
 rum quorundam sententia, quibus certum  
 est, crystallum glaciem esse, quæ nix in al-  
 gidissimis montibus concreuerit, cum aqua  
 non supernaret. Generantur præterea lapides  
 ex lapidibus ipsis, cum fluminum, riui-  
 lorum, ac subterraneorum fontium aquæ per  
 fixa excurrentes, ac eorum superficie liquidæ  
 lapidosi abraferint, quod cum residit, so-  
 lis calore siccat, ac lapidescit. Hoc enim  
 euidentissimè apparet in canalibus, ac soli pa-  
 tentibus aquæ ductibus, quibus nonnullæ  
 aquæ calidæ ducuntur. Ii nimirum lapideis  
 quibusdam crustis oblinuntur, quæ cum tenuis-  
 simis ramentis compactæ sint, ceteris mol-  
 liores, infirmiorisque habentur. Hoc idem  
 apertissimè conspiciuntur in quibusdam balneis  
 aquarum sponte nascentium, præsertimque  
 in balneo sancti Philippi comitatus nostri Sen-  
 ensis. Quandoquidem ex huiusce balnei a-  
 qua, particulæ quedam gignantur lapideæ,  
 saccharum tum candore, tum etiam materia  
 referentes, quæ vsque adeo imitantur femina sac-  
 charo confecta, & alia id genus, quæ in offi-  
 cinis saccharo similiter conuegiuntur, nempe  
 anisum, coriandrum, ac etiam plerumque cinna-  
 momum, vt iis capsulæ à quibusdā impleantur,  
 itaq; aptentur, vt solatij celsa aliquos sacchari,

de alio  
 de alio  
 de alio  
 de alio  
 de alio

Theophrasti  
 si opinio.

Auicennæ  
 opinio co-  
 probata.

Plinii opi-  
 nio explen-  
 da.

eius; confecturam audissimos decipiant. Fit hoc quoque in his, qui huius aquæ stillicidio videntur ad cerebri morbos curandos, illi quotidie caput sufficiens. siquidem lapidosa illa materia, capillis circumcisus continetur inhzrens, in granula quardam cogitur, ac coalescit, ab aniso saccharo contexto nihil ferè dissimulata, quæ non nisi tractu temporis inde se explicant, & dissoluuntur. Idem præterea euenit in montium concauitatibus, ac speluncis, quæ ex saxo potissimum calcario constant. quippe aquarum ex faxorum commissuris stillicidio lapidea concrevit materia, quæ è cavitatum illarum cameris non aliter pendet, quam striz hyberno gelu è domorum nostrorum tectis prominent. Ex eodem etiam saxo calcario oritur gypsum, melitites, galactites, & alij quidam lapides: & ex succo, qui ex eodem saxo, & aqua contemperatur, lapis specularis, & gypsum, quod raro transfluidum inuenitur. Eodem modo ex ramentis rubei lapidis fit hæmatites, & schistos: item in commissuris marmoris maculosi, aut eius, quod in candido cinereu coloreu refert, reperiuntur dactyli Idæi, lapides Iudaici, trochizæ, & consimiles. Verum enimvero succus lapidescens omnino differt ab aqua, quæ faxorum ramentis referta est, vel quod plus habeat sedimenti, vel quod calor callem coquendo aquam, eam densiore effecerit, vel quod aliquid is succus contineat, quod vehementer astringat. Ex quo (vt opinor) corallum maris planta, & antipathes oriuntur. Postremo materia lapidis erit quicquid habet meatus, per quos succus lapidescens imbibi possit, siue is à terra contineatur, siue cum aquis mistus ex ea effluerit. Quamobrem multoties arbores, frutices, animantes, ossa, & alia in lapides vertuntur, vt Boheimi apertè testantur. Quandoquidem in eoru regno pluries in subterraneis fodinis (Georgius Agricola auctor est) arbores inuenta fuerint in lapidem conuersæ, stantibus adhuc ramis, cortice, medulla, ac radicibus. Equidem ipse quoque ingenuè fateri possum, arboris ramu ex lacu cuiusdam litore mihi allatū esse, qui altera parte lapideus, altera vero ligneus cernebatur. Venetis tunc in magno Germanoru emporio, quod vulgo vocant il Fodaco de Todeschi, equi testiculum lapidem factum, Antonius Golb mercator ibi pro Fucharis agens, iucundo omnium spectaculo, & admiratione ostendebat. Id quod animalia quorundam carabibus, & osibus, tunc etiam testaceis pisciu operimentis euenisse cõperimus. namque in Hetruria quam plurimis in agris, buccina, cochleæ, cochleæ, & eiusmodi multa aratro ab agricolis eruntur in lapidem conuersa. Quæ sanè omnia hæc dubiam fidem faciunt, ita se rem hanc habere, vt diximus. Sed vt ex prædictis omne lapidum materiam paucis perstringamus, ea in primis est lutum, in quo multo plus sit tenacis terræ, quam aquæ. Deinde est succus, qui vehementi frigore congelascit, in quo aqua ipsa ter-

ram superat. Sunt præterea ramenta faxorum, quæ aquarum decursus abradit. Quinetiam succus lapidescens, qui cum in aerem effluxit, in lapide concrevit. Omne denique, quod habet meatus, in quibus lapidescens succus facillè excipitur. Nihilò secius in metallorum ortu & materia, de quo iam nobis dissendendum est, auctores inter se dissensu inueniunt. Alia etenim est philosophorum, alia chymistarum, alia astrologorum sententia, quibus etiam accedit opinio imperitissimi vulgi, quæ tantum ab aliis diffidet, quantum à veritate, & à ratione prorsus abhorret. Is nanque certò credit, non modò saxa, sed etiam metalla omnia, preciosos lapides, & gemmas, ac terrarum varia genera, in ipsa tantum mundi creatione Deum optimū maximum talia finxisse, atque creasse, qualia nunc reperiuntur: nec medio temporis lapsu, vllam ex materiis ad id dispositis esse natam, vel renatam, neque aliquam vim naturæ, ad eorum perennitatem summum rerum opificem tribuisse. Qui certè vulgus ita temerè pronuncians, non videt quā maximam naturæ inferat iniuriā, quæ nunquam aliquo temporis momēto quiescens, nil aliud agit, quā ea semper regenerare, quæ aliā genuit, quæ etiam noua multa producit. Vnde hæc vulgaris opinio prorsus explodenda, atque exhibenda est. Quam insuper vt vanam ac ridiculam, illud maximè diluit, ac demolitur, quod in antiquis metallorum cuniculis sole clarius visitur. Siquidem innumera inueniuntur metallorum fodinæ, tanquam inutiles à fossoribus derelictæ, quod inde omne metallum efoderint, per quas etsi prius longè, latèque patebat transitus, ita vt liberè, & absque vllō impedimento non modò fossores ipsi, sed vehicula, ac curruculi per eas d scurrerent, tractu tamen temporis factum est, quod materia lapidescens in ipsis adeo creuerit, vt fossoribus denuo ingredi volentibus eo cavitatis angustiam denegaretur aditus. Sed præterea metalla continue generari, ferrum indicio est. Id quod in flux insule metallicæ fieri (ea enim à maritimis nostris non longè distat) non modò probatissimi scriptores memorie prodiderunt, sed fossores ipsi, qui diutius in ipsis versati sunt, verbis referunt. quippe quod ferreæ illæ fodinæ multis iam annis desierint, iterum atque iterum ferrea materie impleantur. Porro philosophi, & chymistæ aliter sentiunt. Aristoteles lapidum materiam haberi tantum existimat. Chymistarum verò nonnulli omnino aliter, metalla in visceribus terræ gigni ex sulphure, & argento viuo: alij ex quadam cinere aqua madefacta. Quorum sententia, cum non solum suspecta, sed etiam planè falsa habeatur, eos nimis omnes deripit, qui horum lūbricis fundamentis vixi philosophantur, vt firmis tum rationibus, tum argumentis probare non videret, nisi id præter nostrum institutum esset, qui hic harū rerum capita tantum percurrimus.

Verum

*Varia de metallo-  
rum ortu  
sententia.  
Vulgi opinio explodenda.*

Verum si quis rem hanc subus enarratam, atque exactissime discussam habere cupit, librum legat Georgii Agricolae viri eruditissimi, à quo nos plura mutatos esse ingenuè fateamur. Ceterum illud omnibus, ut mea quidè fert opinio, persuasum esse debet, quod nil aliud sit metallorum materia, quam substantia elementaria, quae tanto perfectius metallum efficit, quanto magis sit aequali proportionè tum qualitatis, tum quantitatis impense depurata cõstat. Quippe in metallorù materia aquam esse, maximo apud auctores est, quod ignis calore liqueatur, ac fluant. Id è verò tum aeris, tum etiam aquae rursus densetur, ac coeant. Id quod clare ostendit, ea aqua multum, terrae verò parùm obtinere. Simplex enim aqua non est eorum materia, sed mista cum terraeque terrae quidem portio tanta in missione existit, quanta aquae perspicuitatem obscurat, fulgorem verò non auferat. Quinetiam mixtura quod purior fuerit, eò pretiosius (ut diximus) metallum constat, idque magis ignis pariens redditur. Sed quora portio tantum in missione existit, ex quo efficitur metallum, nemo mortalium vnaquã mente concipere potest, nedum verbis explicare. Id tantum nouit Deus optimus maximus, qui certas, ac definitas quasdam leges naturae tribuit, quibus res inter se miscet, ac temperat. Succus igitur est, ex quo formatur metallum, quem parum varij motus, quorù proximj sunt aquae defluxus terram molliens, aut secum rapientis: terrae cõ aqua permixtio: & vis caloris agens in mixtura, ut id genus succus gignat. Sed cum de metallorum materia facis dictum sit, iam causam efficientem prosequamur. Ea autem nil aliud nobis esse censetur, quam calor, & frigus, qui in ipsius terrae visceribus reconduntur. Calor inquam is est, qui humoris metallici missionem coquit, ac purificat. Frigus verò, quo eadem densatur, & dura efficitur. Hoc equidem experientia facillè comprobatur; cum neminem lateat igni metalla liquefcere, ac etiam tractu temporis post liquationem, ipsius ignis calore contabescere, auro excepto. Quamobrem detestanda videtur eorum opinio, qui tantum calore subterraneo metalla confici credere vult. Sunt & qui putent, metalla omnino effici siderum errantium influxu. Soli namque auri generationem assignant, Lunae argenti, Marti ferri, Mercurio argenti vini, Ioui stagni, Veneri æris, Saturno denique plumbi. Adduntque, quod sicut metalla ab errantibus stellis sui ortus principium habent, ita pretiosi lapides, ac gemmae, à fixis suam efficiendam causam suscipiunt. Huic autem sententiae plerique non acquiescunt, quoniam has causas nimis remotas credunt, & propinquioribus causis inhaerendum esse arbitrantur. Ego tamen insensas non eundem reor, quin omnia haec inferiora terrena, ac finita regantur, gubernentur, & producantur à superioribus celestibus, ac sempiternis: quae tandem diuturna orbium

circumuo: lutione, omnium causarum tam re-motarum, quam propinquarum causa existunt. Ita pariter dicendù existimo lapidum gignendorum causam non semper à solo frigore, vel calore, sed modo ab hoc, modo ab illo pronenire. Nam lapides, quos aqua humectando dissoluit, calore exco: cando compe: sse intelligimus. Contra verò, qui calore ignis liquefcunt, ut fluuiores, & torrensium siles, quibus igne liquidis vitrum conficiunt artifices, eos frigore concreuisse certum est. Concretio enim, eiq; oppositae affectiones, resolutio scilicet, atque liquefactio, oriuntur à causis inter se contrariis. Etenim calor à materia humorem extrahens, eam efficit durà: at frigus eandem, aere maxima ex parte excluso, vehementer confringit, quemadmodum agit, cum aquam in glaciem, vel niuem cogit. Hinc efficitur memoriae prodidit Galenus, eam aquam corporibus proflis inimicam esse, quae à niue, vel glacie colligatur: fluxit: quoniam omne, quod in ea tenuissimù erat, à gelu expressum fuerit. Duabus his causis tertia quoque accedit, quae est succus ille lapidescens, de quo superius diximus, qui vel solus, vel cum aquis permixtus in stirpium meatus, aut in animantium particulas recipitur. Nam praeterquam quod sit lapidum materia, causae etiam efficientis partes subit: quando scilicet in corpus aliquod per meatus penetrat, idque totum secum in lapidem vertit. Quod si in lapidem concreuerit guttatum cadens, aut in vireos diffusus, tunc materia immutetur, non causa efficiens dici merebitur. Gignitur hic (ut supra dictum est) in locis quibusdam lapidosi, & interdum aquae commixtus, per venas terrae manat, & effluit. Quapropter inquiri non licet, si fontes, riuuli, lacus, ac putei reperi possint, qui stirpes, ossa, & alia multa in lapidem tractu temporis vertat. Verum non est ignorandum, quod succus in lapidescens motu aliquo agitur, non facillè in lapide densatur, nisi crassus admodum fuerit, sed simulatq; in meatus ligni, aut alterius rei receptus, dispersusq; quiescens, frigore cogitur, & concretis: mutatq; res illas, quibus continetur, in lapides, ut in quodam Gothiae fonte euenire probatissimi auctores testantur. Cuius gutte solo persufus, cum moueri, aut agitari nequeant, ab ambiente aere densantur, & lapidescunt. Quod si praeterea verum est, in montibus Pyrenaeis esse loca, in quibus aquae pluuiales lapidescunt, id ideo fieri posse videtur, quod aquas cum terra permixtas vel solis calore paulatim concoquat, vel insignis propter calorem siccandi vis, quae terrae insit, conspisset: viroque enim modo ex eis potest effici lapis. Neque necesse est coningere, aut comminisci aliam vim, quae id ipsum agat, quoniam quatuor qualitatum, aut eam, quae ab ipsis inter se agentibus, & Corporibus, parientibus oria loco tribuitur. Sed hic nobis cur miles subit inquirendum, cur vnus tantum quandaque gignatur lapis, cur verò plures vno loco fiant.

efficientur. Fit igitur, ut arbitramur, vnus tantum lapis, cum locus, qui concepit materiam, solidus fuerit, ac meatibus carens. Quippe conclusus calor omnem tum operam, tum facultatem vndique in materia conferens, vnum duntaxat lapidem gignit, & ipsum quidem magnum, aut paruum, secundum materiam quantitatem. quapropter plerumque singulares à frigore efficiuntur, cum purissimi succi, ex quibus constant, rariis multi ac magni in locum vnum congregentur. Verum contra plures gignuntur lapides, si locus non fuerit planus solidus, sed meatibus repletus, per quos calor ipse discurrere quatinus si meatus pauci fuerint, calor materiam diuidens paucos efficit lapides, sin multi, multos. Ad hæc plures generantur lapides non modo ex prædictis, sed etiam ex materie diuersitate. quandoquidem calor partem vnus generis secernens ab alterius generis parte, plures efficit lapides. Item plures efficiuntur ex multis vnus loci receptaculis, in quibus infusa materia in plures partes diuiditur: siquidem in ea frigus non minus, quàm calor vires suas exercere potest. Qui lapides præterea pro diuersa materie mole magni, aut exigui redduntur. Isdem modis quoque glarea, & silices sunt: est iij sepius aquarum imperu, qui saxa frangit, & cōminuit, efficiuntur. Hæcenus causis explicauimus, quæ lapides, & metalla efficiunt. nunc ad eorum differentias progrediamur. Colorum itaque discrimina, quæ in lapidibus spectantur, materie, ex qua gignuntur, diuersitatem indicant. vnde vnus, & idem lapis sæpe varios colores consequitur, quod fit ex diuersi coloris materia. Deinde calor, cum ipsorum lapidum sit opifex, coloribus materiam inficit: nam obscuros ipsius colores illustrare, illustres verò obscuros reddere potest. Cuius effectus exemplum clarum habetur in coloribus iis, quibus scitilia vasa pinguntur. nanque colores omnes, qui ad vasa scitilia pingenda, vel inscienda parantur, anteaquam in fornacem coniciantur, ab his plurimum distant, qui in scitilibus ipsis igne torrefactis, postea videntur. Quandoquidem est scitilia æris squama super porphyrite lapide læuigata, admixta aqua, insecta rufo colore, æris ferè modo, appareat, igne tamen fornacis experta, viridia efficiuntur. Sicut & color, qui ex ferri squama paratur, melius efficitur. Lapis etiamnum, quem singuli nostrates vulgò vocant zaffara, porphyrite lapide læuigatus, colore subnigro crudè adhuc scitilia tingit: sed igne percoctus, in ceruleum præstantissimum mutatur, ut nobis apertè declarar ceruleus, ac pulcherrimus ille color, quem vulgò pictores vocant Smaltis: enim ex ipso lapide zaffara nominato, cum vitro misso in vitariis fornacibus efficitur. Verùm hanc colorum permutandorum facultatem in frigore non inuenias. quare lapides ab ipso

coacti colorem eundem seruant, quo prius eorum materia infecta fuerat. Ex his adduci possumus, ut non temerè credamus, quod pieriq; fluidorum, ac torrentium silices coloribus in superficie tingantur: quoniam modò aquarum inundatione madescent, modò solis calore siccantur. Solis enim calor, à quo silices ipsi æstate Sirio ardente adeo incalescant, ut vix tangi possint, ipsorum quidem colores (vt scitilium fornax) facillè immutare potest, licet id magis euenire constet in eorū superficie, quàm in centro. Differunt & metalla inter se colore, splendore, sapore, odore, pondere, & facultate. Color primum varius in metallis conspicitur, nam vnumquodq; suum sortitur colorem. Aurum siquidem inter metalla ideo fului coloris est, quod calor vel terram in fluidinem quandam synceram verterit, anteaquam cum aqua misceretur, vel succum ipsum mox futurum aurum. Aes verò suum colorem habet, & cum quidem subnigrum, eo quod terram nonnihil impuram adulescit calor. Ferrum autem subnigrum est, propter terram valde impuram, & adusam. Argentum porro candidum est, quod terra eius fuerit alba. Eadem in cæteris singulis colores inuestigandi ratio. Sequitur deinde eorum splendor, & nitor, qui ab aqua tantū (vt antè diximus) provenit. Ex quo fit, ut quantò humor ipse tenuior, densior, puriorq; fuerit, etò metallum nitidius, ac splendidius efficiatur. quàm ob causam reliquis hæc in parte præstat aurum. Atque hinc etiam saporem odoremq; sibi metalla asciscunt: dum enim aurum igne comburitur, terræ ipsius sinceritate, quæ optimè cum aqua commista est, fumum perexiguum, & vix sensibilem emittit, & dulcem, ac suauem magis, quàm foetidum. Argentum verò contra, quod terram impurā, licet combustū difficiliorem obineat, plus fumi eructat, & aurum, & subfoetidum quoque odorem exhalat. Sed tam ferro, quàm æri multò maior fumus copia effunditur, atque vni odor longè foetidior, quod scilicet adusam contineant terram. Plumbum denique ac stagnum, æque redundantiam, hebetes admodum odores promunt. Nec alia de causa tum ærea, tum ferrea vasa, qui rem hanc scite cognouerunt, ab usu coquinario abdicauerunt, quàm quod aduste terræ, quam possident, valde amara qualitate cibum omnes, qui in huiusmodi vasis vel coquuntur, vel parantur, vel asperantur, vel reponuntur, facillè infici possint. Id quod non modò gustum malè afficit, & exasperat, sed etiam in ventriculo nauseam, & subuersiorem commouet. In hoc ergo admonitis leplarios volumus, ut ab horum vasorum usu caueant: nam, quandoque compertū est, quod acida medicamenta in cacabo æreo (quæ fuit pharmacopola: vel lignaui, vel imperita) decocta, seu a cæterâ

*Metallo-  
rum differ-  
entia plu-  
res.*

*Lapidum  
colores Gen-  
de Gery.*

*Metalli*

50

tērea metalla omnia pōderosissima sunt: cuius rei causā est densitas ipsa, quæ sequitur bonam terræ cum aqua permissionem. Hinc fit, vt grauissima quæque pondera metallis liquefactis super narent, modò maior sit metallorum quantitas, quàm rerum quæ ipsis demerguntur. At huius rei experimentum quotidie facere licet, si argentum vitium in aliquod vas infundatur, ex quo metallica pondera superponantur, auro excepto, quod solum inter cætera fundum petit, quoniam plus cætera ponderet: argenti enim viuo ipsa pondera non aliter supernare deprehenduntur, quàm aqua ligna. Cæterum aurum in ipso mergitur, non modò quòd ponderosius sit; sed etiam quòd cognationem quandam. & quasi consensum cum ipso habere videatur. Metalla insuper, quæ liquefcunt, his quæ attingunt, minimè adhærent, nec eadem humectant, neque etiam labuntur, vt cæteri aquei liquores tam fossitij, quàm à plantis, aut animalibus producti: sed eorum partes inuicem coguntur, simulque coherent. Idque non alia ratione fieri constat, quàm quòd tam bona, firmaque mistio rei sicæ cum humida facta sit, vt sicca obfist humectæ, re adhærescat, & humectet: humida verò contrā impediatur, ne sicca prorsus conquefcant. Quæ quidem mistio quoniam in auro perfectissima reperitur, ideo hoc igne nunquam absimitur. nam cum eius purissima terra sit optimè cum aqua permixta, humorem stringit, & continet, ne vi ignis expiret: humor verò contrā tuetur, ac defendit terram, ne accendatur. Ideo nonnunquam comburitur aurum, vt cætera faciunt metalla. quæ quandoquidem impurioreni forficantur terram, deteriorēque mistionem; proinde ignis violentia faciliè rapiuntur, & conficiuntur: cum enim terra flammæ accensa fuerit, humorem celeriter perdit. Attamen metallum vnum alio magis, & citius comburitur, propter hoc illo plus terræ, eamque minus probè mistam obtrinet. Etenim si libeat experiri, in primis ferrum deprehendit igni consumi, propter nimiam, quam habet, terræ impuræ copiam. Mox plumbum, & stagnum, quòd his non satis firmum sit cum terra temperamentum. quam ob causam postquàm humorem exhaustit ignis, terram consumit. Deinde æs, quod cum terræ purioris, ac etiam paucioris particeps sit, quàm ferrum, etsi ea non satis exquisitè mista sit cum aqua diutius igni resistit. Postremo argentum, quod quia puriore terra constat, ac melius aquæ commixta, non nisi longiori tempore flammæ cedit. Verum plumbum, ac stagnum non ob id igne tam faciliè vincuntur, quòd multum impuræ terræ continent, sed solum ob misturæ vitium, quoniam in his imperfectè inueniuntur. Sed ad lapides nostra reuertitur oratio, de quorum quaque luciditate, siue perspicuitate, ac nitore, vel horum oppositis obcuritate, ac

squalore iam aliquid nobis differendum est. Ex prædictis itaque omnibus clarum esse arbitror, lapides aquam magis, ac terram participare, quàm cætera elementa. Sed quoniam non terra, sed aqua cernitur esse perspicua, ac pellucida, ideo ab ea tantum perspicuitatem, luciditatemque his adueniunt constare. Vnde ex succis claris, & pelucidis constare lapides, quæ transluent, asserimus. quemadmodum ex terra eos, qui qualitatis perspicuitati oppositè reperiuntur: hi enim ex claris succis gigni nequeunt, sed ex impuris, ac turbidis vel luto, vel nigriore infectis. Quod verò alij lapides magis, alij minus pellucant, non aliunde fieri certum est, quàm è succorum diuersitate, cum scilicet alijs alijs clarijores, ac lucidiores existunt. Ex quo sequitur, quòd albæ gemmæ gignantur ex succo, cui aquæ color insit, atque adeo cæteris clarijores, ac illuciores appareant, vt crystallus, & iris, gemma sic ex argumento vocata: nam sub recto percussu sole ob angulos, quos habet, colores ex opaco reddit, speciesque arcus cælestis in proximis (vt Plinius verbis utar) cæclatur parietes. At adamæ ex succo minus claro propignitur, deoque tam iride, quàm crystallo obscuriores. Non dissimili varietate notantur aliorum colorum gemmæ translucentes, siue ortæ fuerint è succis viridibus, vt smaragdus, ac prasij siue è caruleis, vt sapphiri, cyanei, & aspidum quoddam genus: siue è rubris, vt carbunculi: siue è purpureis, vt amethysti, & hyacinti: siue ex aureis, vt chrysolithi, & chrysopatii: siue ex misti coloris succis, vt opali. Hinc igitur colligi faciliè potest, quòd cætera gemmarum genera, quæ perspicuitate carent, è succis concreuant impuris, atris, & obscuris: quando nec aqua quidem limpidissima, cui ater succus infusus sit, clara ac pura perspicui possit. Nitent tamen gemmæ non translucentes propter insignem lauorem, qui lucis continuitatem, & densitatem parit. Quem quidem lauorem aut sibi natura comparat, aut artificum mangonio consequuntur. Iisdem de causis marmora quoque radiant. Porro lapides & gemmæ pellucantes nonnunquam coloris labem, aut vitium aliquod contrahunt: sæpe enim aut vmbra, aut nubeculis, aut capillamentis, aut salē, aut plumbagine vitiantur. Quæ sanè omnia non alia ex causa proueniunt, quàm ex coloris succi diuersitate. Gignitur quidem vmbra, cum succi color aliqua parte obscurior fuerit: nubeculaverò ob partem albidioris coloris. Ac capillamentum, quo præsertim sapphirus, inficitur, sal, quo opalus, plumbago, quæ smaragdus, ex alieno prorsus colore sunt, non autem proprio gemmarum. Quinetiam sibi gemæ scabritiè induit, cum obscuri diuersitate partes inæqualiter coalescunt. His ergo rationibus nixus, nemo nō audebit dicere atque asserere, lapides omnes ac saxa

mat

Lapidum  
diuersa  
firmitas.

que neque nescit neque pellucet, ex crassissimo  
 fucco, & terrena materia fieri. Differunt præ-  
 terea lapides spissitudine & raritate, leuitate &  
 grauitate. itaque ponderosis, ac compactis  
 lapidibus pauci, & admodum occulti sunt meatus:  
 raris verò, ac leuibus contrà multi, & patentiores.  
 Quapropter dicendum esse reor, quòd rari, ac le-  
 ues efficiantur lapides, vbi eorum humor cū ter-  
 ra non probè fuerit mixtus. Is siquidem à calore  
 siccatus locum, in quo confederat, vacuum relin-  
 quit, vt in tophis, & similibus conspicitur. Idem  
 quoque euenit, cū sponte flagent montes, vt  
 Aetna in Sicilia. & Vesulius in Campania Plinii  
 tempore, ac etiam hac nostra ætate. nam cū ibi  
 magnis incendiis terra cremetur, eadem ratione  
 ex ipsa sunt meantium pleni, cauernosi, & leuissi-  
 mi pumices. Contrarium planè fieri constat, si  
 humor vndiq; in terram penetret, & illi optimè  
 misceatur: is enim hoc modo lapides graues, com-  
 pactos, ac duros generat. Quod autem lapides du-  
 ri, vel molles fiant, partim materia in causa est,  
 partim verò id, quod materiam fingit. & format.  
 Nam si fuerit materia tenax, & calor tantus, vt ex  
 ipsa humorem exhaurire queat, vehementer con-  
 stringitur, & in se cogitur, sitq; ex ea lapis den-  
 sus, & durus. Sin lentioris peram admodum, aut  
 nihil habuerit, & calor fuerit multus, aquam etiā  
 si probe terræ permixta sit, absumit, & resolu-  
 it, terram verò comburit. quo fit, vt lapis adeò mol-  
 lis fiat, & friabilis, vt facile in puluere redigatur.  
 Obdurescunt autem hæc lapides frigore, vt potè quod  
 succum validè siccet, & constringat. Atq; ij  
 lapides, qui ex huiusmodi succis coactis concre-  
 uerint, in fornaces ardentes coniecti liquefunt,  
 fluuntq; ob conclusos humores. Qui verò igni  
 admodum franguntur, & dissiliunt, non quidè tan-  
 tum humoris in se continent, quantum priores, vt  
 ex terrene partes cohereri possint. Quos autè ex  
 luto genuit calor, ignis terit in puluerem, propter  
 terrenam siccitatem. Ceterum qui ex succis pin-  
 guibus, & bituminosis constant, accensi non secus  
 ac ligna ardent. Cuius generis est gagates lapis,  
 quo Cimbrj, & alij pleriq; Germaniæ inferioris  
 populi passim lignorum vice, quorum inopia  
 habent, ad ignem vtuntur. Vesum enim uero non  
 ob id tanta est ignis vis, vt adamantem vincat:  
 quindquidem huius humor ignis calore fortior  
 existit. Eandem etiam ob causam amiantus non  
 modo non comburitur igni, sed ne quidè dissolu-  
 tur. Vterque enim est siccus, cū tangitur, esse  
 sentitur; tamen humorem immixtum obinet,  
 non aliter atq; metallis. Porro lapides, qui corpo-  
 ra erodunt, vt in Lycia inuenti, vel absumunt, vt  
 Aëlius, in quo corpora defunctorum condita ab-  
 sumi tradit vnde illi sarcophagi nomen, ex mate-  
 ria admodum acri gignunt, vt in fodinis quibus-  
 dam cadmia quædam inuenitur, quæ fossoribus  
 ipsis manus erodit, & exulcerat. Postremò non  
 li lapides sunt, qui veluti prægnantes lapillū, vel  
 argillam, vel liquorem in uero gerunt. Cuius

rei causa est & materiz diuersitas, & quòd eadem  
 magna ex parte figurā globosam referat, aut quā  
 proximè accedat. Materiz enim pars interior ab  
 exteriorè differt, aut calore cocta mox diuiditur,  
 aut aliquo post temporis spatio si pratur, non fec-  
 tus ac aërefacta nuclei auelluntur: nucleus à putami-  
 ne. Quòd si fuerit succus, vel lutum tenax, ipsa  
 etiam pars interior in lapidem cogitur, vt in æti-  
 tē visitur: si verò lutum non tenax, uenit in ter-  
 ram pierunq; argillacea, vt cernere licet in gao-  
 de: sin succus tenuis, vel aqua, liquor interdum  
 remanet, vt in enchyro, in quo ad motū fluctuat  
 intus, veluti in ouis liquor, vt inquit Plinius.  
 Cæterum cochleas in saxis reperas, calor conclu-  
 sus, ex materia pingui, & lenta efflere videtur, &  
 ex eadem gignere musculos, & conchyliā: sed ter-  
 ra quanto est crassior, quā mare, tantò ea magis  
 imperfectè gignit. Nec mirū cuiuspiam esse debet,  
 quòd eiusmodi conchyliā in lapidem medio orta,  
 ibi diutius conclusa, ipsis cedente lapide, crescant,  
 & uiuant. Siquidem ego certò testari possum, me  
 uidisse non longè à Timauo fonte prope Duinum  
 caltrum in Adriaci litore situm, vbi maris alluit  
 vnda, lapides à sociis malleis ferreis frangi, atq;  
 in illis plurima reperiri conchyliā, quæ daëtylos  
 à forma, & colore vocant: sunt enim palmarum  
 caryocis similia. Hæc eadem me aliquando com-  
 edisse memini in castro Goritiæ in opiparis mensis  
 illustribus, ac clari comitis Francisci à Turi nostro-  
 rum studiorum (quæ eius est singularis humani-  
 tas) fauoris, promouitorq; maxime quæ sane ad  
 minorem quā ultra, in cibis gratiam habere  
 comperi. In ipso quoq; Duini castro isdem vesi-  
 mih conigie apud magnificum Mathiam Hoffe-  
 rem, virum suè nobilitate & moribus insignem.  
 Neq; me fugit, his nuper clapsis annis virum ma-  
 gnificum atq; præclarum Didacum Mendozium  
 Hispanum, lapideas quasi tabellas mihi ostendisse  
 ex Veronensi agro (vt asserbat) delatas, quæ in  
 longū fuisse varios intus pisces veluti insculptis  
 habebant, cum omnibus suis particulis quamuis  
 minimis, in lapidem versos. tot tamq; admirabi-  
 lia sunt opera naturæ. Huc præterea illud accedat,  
 quòd pisces fossiles reperiuntur vltra Pyrenæos  
 montes, vt narrat Polybius lib. x. x i i i. suarum  
 historiarum. Vsq; ad Narbonem amnem, inquit,  
 planities est, per quam fluuij feruntur Iliberis &  
 Rhodanus. fluentes propter vrbes eiusdem nomi-  
 nis, quæ habitantur à Cælis. In hac igitur plani-  
 tie sunt pisces fossiles dicti. in ea enim est terra re-  
 nuis, vbi multum nascitur gramen, sub quòd alti-  
 tudine duorum vel trium cubitorum per arenam  
 aqua fluminū delata fluit: & si quando inundaue-  
 rint, cum aqua pisces terrā subeuntes (nā mirificè  
 appetunt graminis radices) plantam efficiunt re-  
 ferant piscibus subterraneis, quos incolæ effodi-  
 unt h'c Polybius. Quibus adde, quòd etiam  
 pisces fossiles inueniuntur circa Heracleam, atq;  
 in alijs plerisque Ponti locis: vt Theophrastus  
 est auctor. quin & in Germania vltra Albim  
 fluiuium



*Terrarū  
brevis e-  
narratio.*

fluuium quibufdam in locis hac ætate effo-  
diuntur. Verum quandoquidem Dioscorides  
in hoc quintum libro fcriptis tractauitq; etiānū  
de variis terrarum generibus, quæ in medicum  
vsum veniunt, non alienū fore iudico, quod de  
his quoq; vniuerſim aliquid differamus. Terrā  
itaq; aut ſimplicem, aut compositam eſſe oportet.  
Simplicem nunc eam intelligo, quæ cum  
nulla re foſſilis, neque cum aliquo liquido ſucco  
fuerit permixta: non autem eam, quæ à cæ-  
teris elementis ſit penitus munda. quippe ob  
continū elemētorum miſtionē vix vllam repe-  
riri poſſe putauerim, quæ nonnihil aquæ, aëris,  
vel ignis non cōſpiciatur. Quamobrē eam ſim-  
plicem dixerim, quæ nullam proſus aluminis,  
aut ſaliſi, aut nitrī, aut chalcanti, aut bitumi-  
nis, aut cuiuſvis alterius rei metallicæ miſtio-  
nem admiſerit. Contrā compositam appella-  
uerim, quæ vnum, vel plura eſſe ſi in ſe rece-  
perit. Simplex autem terra, de qua nunc ſer-  
monem habemus, modō grauis, modō leuis  
conſtat, pro maiori, aut minori elemētorum  
miſtione, quæ illi ineſt. quis enim dubitet, quin  
eſſe leiior, ac rarior, quæ plus aëris, aut ignis  
participat, quam aquæ? Ad hæc terra ipſa per  
ſe omnis exiicat, ſed varias forſis facultates  
pro varia eorum, quæ ei admiſcentur, qualita-  
te. Nam illa, in qua ſit aquæ frigus, adtingit:  
quæ ignem accipit, acris eſt: quæ aërem, glu-  
tinoſa, & leuis: quæ aërem & ignem, leuis,  
& acris. Illa verō, quæ ſibi fulphur adiunxit,  
aut alumen, aut chalcanthum, aut metallum  
aliquid vel ſoſſilem ſuccum, facile quidem  
guſtu, ac etiam oſaſtu cognofci poteſt. Nec de  
his plura dicenda ſunt, quōd mihi planē per-  
ſuaſum huiuſmodi qualitates nuli non cogni-  
tu faciles futuras, guſtu duntaxat iudice, qui  
tamen dulcia ab amaris, acris ab acidis, ſaliſi ab  
inſipidis, acerbis à maturis diſcernere ſciat. Ter-  
ræ autem, quarum in medicina eſt vſus, ſua mu-  
tuantur nomina partim à locis, vbi eſſoduntur,  
& aſportantur: partim à coloribus, quibus in-  
ſiſcuntur: partim à facultatibus propriis. A locis  
enim denominantur Lemnia, quod ex Lem-  
no inſula deſeratur, Samia quod ex Samo,  
Chia quod ex Chio, Cimolia quod ex Cimo,  
Eretria quod ex Eretria Eubœæ ciuitate, & Pni-  
gicis quod ex Pnigite Libyæ pago. A colore ap-  
pellationem trahunt rubrica, & alia nonnullæ.  
A facultate denique nomen accipit ampelcis,  
quod eius ſit vſus ad illinendas vites ſub ger-  
minationis tēpus aduerſus erucarum iniurias.  
Et vt aliorum quoq; foſſilibus colores percurra-  
mus, colorealeb cōſtant, creta, qua ſurcinatores  
vſunt, gypſum, alumen, amiantum, Arabicus  
lapis, Iudaicus, melicites, galaſites, alabaſtrites,  
cryſtallus, argentum, ærum viuum, ſtagnum,  
& ſyncerithum marmor. Colore cinereo pro-  
dunt: melia terra, & Eretria altera. Cæruleo  
vero colore ſpectantur ſapphirus, cynus, &  
lapis propriè cæruleus dictus. Viridē ſmaragdus,  
praſſus, chryſocolla, & calchanthum. Flauo

luteoſe colore ſunt aurum, ochra, chryſopa-  
tius, chryſolitus, & auripigmentum. Rubeo  
tinguntur rubini, granati, ſandaracha, coral-  
lum, hæmatices, ſciſſilis lapis, minium, cinna-  
baris, rubrica, & Lemnia terra. Quædam colo-  
re purpureo ſurgunt, vt hyacinthus, & amethy-  
ſus. Alia cæruleo diſtulo viſuntur, quemadmo-  
dum iaspis, quem boream dicunt. Nonnulla  
cæruleo viſcente, vt ærugo, & Armenius la-  
pis. Alia albo ruſcente, vt aphrodiſiæ. Qua-  
dam ruſo candicante, vt xanthos. Quædam ni-  
gro ruſcente, vt tertia batrachitis ſpecies. Ali-  
qua atro purpurafcente, vt alabandicus lapis.  
Alia aureo candicante, vt topatius. Sed plura  
ſeparatos colores habent, vt nigro, albo, & quō-  
uis verſicolore, vt achates. Apſidion verō nigri  
rubentes venæ diſtinguant. Contrā naſo-  
monites, cum ſit ſanguinis colore, nigris venis de-  
coratur. Venæ autem, quæ ſpeciem præ ſe fe-  
runt ſanguinis intextæ, quodammodo ſunt he-  
liotropiſi, corpore porracei coloris. At in cæ-  
ruleo ſapphiro aurea puncta collucent. Quin-  
etiam quædam ſunt, quæ tres ſeparatos habent  
colores: nam per album ægyptellæ corpus duæ  
venæ permeant, altera nigra, altera rubra.  
Porro eupetalos, & orca quatuor habent colo-  
res: eupetalos enim cæruleum, igneum, mi-  
ni, mali: orca verō nigrum, ſuluum, viridem,  
candidum. Verſicolores poſtremō nonnullæ  
habentur, non aliter, ac collum gallinæ Numi-  
dicæ, vel pſonis, aut columbæ in ſole ap-  
parentis, vt erithalis, & pæderorum genera: ea  
enim ad inclinationem colores permu-  
tant. Cæterum ſciendum eſt, quod ex foſſilibus, quæ in  
medendi vſum recipiuntur, alia quidem corpo-  
ra ſanant, alia verō eadem aſſigunt, in cibis vel  
potionibus data. At quæ remedia corpori ſunt,  
medentur ei partim proprietate totius ſubſtan-  
tiæ, partim qualitate aliqua, qua proſiſcantur  
morbi. Quæ autem proprietate valent, eorum  
quædam reſiſtant venenis, quædam morbos  
ſanant. Quibus natura dedit vires ſuperandi  
venenæ, eorum alia corpora, quæ peſſilentia  
ſunt aſſecta, curant, vt ſmaragdus, ſigillum  
Lemnium, gleba Armenia. Alia ſingulari ve-  
neno medentur, ſicuti ſcorpionum icibus ſap-  
phirus potus, ſuppur plagæ illitum: ſanguis ſtran-  
gulariſus nieriū potum, ac pariter atramen-  
tum ſutorum. Alia plurius adueſantur ve-  
nenis, vt ſal moribus viperæ, cerauus, ac cro-  
codili. his enim emplaſtri modo imponitur:  
ſed potum opio, & ſungis præſidio eſt. Quibus  
verō foſſilibus comparatum eſt, vt morbos pro-  
prietate fugent, eorum quædam ſanguinis pro-  
fluuium ſiſcunt, vt hieracites. alia os ventri-  
culi geſtatu & appoſite roborant, velut iaspis.  
alia ſiniſtro mulieris brachio adaligata abor-  
tum prohibent, vt ætices. alia item ad ſenora  
prægnantis aligata partum accelerant, vt idem  
ætices, & iaspis. Sunt quæ craſſa è corporibus  
deſiciunt, vt magnes: alia acram bilem, vt Ar-  
menius, & cæruleus lapis: nonnulla vomitum

*Foſſilū ſa-  
citatē.*

faciunt, vt idem Armenius lapis, chryfocolia, & chalcanthum. Sed inter ea, quæ elementariis qualitatibus agunt, calefaciunt alumen, chalcanthum, chalcitis, miffy, fory, melanceria. refrigerant terra Eretria, molibdoïdes, flibium, argenti fuma. ceruffa. Quæ autem fecundis qualitatibus operantur, quædam molliunt, quæ dura funt, vt gagates: quædam contrariè indurant quæ mollia funt, vt lapis plumbarius, & flimmi. Sunt & quæ infenfibles ferè poros aperiant, & quæ claudant: aperit enim nitrum, fuma niri: claudit terra Samia, & in omnia omnis terra glutinofa. Alia, quæ corpori coherunt, nempe glandulas, & nodos, difcutiunt, vt pyrites, molaris, bitumen. Aliaque cicatricem inducunt, vt chalcitis, miffy, alumen feiffum. Nonnulla carnem excrefcenrem minuant, vt alij lapidis flos, ærugo, chalcantius, chalcitis, miffy, calx viua, auripigmentum, fandaracha, chryfocolia. Non defunt etiam, quæ diuerfis viribus prædita funt, vt cimolia, & fal cimolia enim & reprimat, & difcutit, & abftergit, & adtingit. Sunt deniq; quæ vires eafdem habeant, ita vt deficiente vna, altera eius locum fuppleat. Siquidem chryfocolia, & lapis Armenius eundem effectum præbent: auripigmentum, & fandaracha: hæmatites, & fchistos: atque hæc quinque chalcanthum, miffy, chalcitis, fory, melanceria inter fe viribus conſeſcunt. Veruntamen ex his chryfocolia vim efficaciorẽ obtinet, quàm lapis Armenius: auripigmentum, quàm fandaracha: hæmatites, quàm fchistos: calcantium, quàm reliqua fibi cognata. Cæterum non pauca reperiuntur foſſilia medicamẽta (vt folius libro ſexto dicitur) quæ in cibo, aut potu frequentius, aut copioſius ſumpſa, vel maximè ſumentes affligunt, vel iis mortem inferunt. Idq; efficit, vel quod viſcera erodant, veluti fandaracha, & auripigmentum, vel quod ſpirandi organa occludant, vt gypſum, & ceruffa. Sed hæc de foſſilibus ſa cultatibus. Nam de concretis fuccis, cuiuſino di eſt ſal, nitrum, alumen, chalcanthum, & cætera, quæ cum eo cognationem habent, ſupphur, ſandaracha, auripigmentum, chryfocolia, & alia nonnulla, in huius libri proceſſu ſuis locis ſatius tractabimus.

## VITIS VINIFERA.

## CAPVT I.

FOLIA vitium, & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigat: & inflammationem ſtomachi, ardorẽque cum polenta. Folia etiam per ſe, vt quæ refrigerent, & adſtringat, imponi ſolent. Potus eorum fuccus: dyſentericis, ſanguinem excreantibus, ſtomachicis, & grauidarum malaciæ medetur. Eadem efficiunt madefacti in aqua capreoli, & poti. Lacryma vitium, quæ veluti gum-

mi in caudicibus concreſcit, ex vino

## VITIS VINIFERA.



pota calculos pellit: illita lichenas, & pſoras, lepræſque, nitro prius perfrictas, fanatica dem cum oleo ſæpius pilis illitis, pſilothri effectum habet: maximèque ſanies, quæ accenſa farmenta vitæ viridia exudarunt: quia & perunctæ verrucarum informi-

cationes extrahuntur. Cinis ſarmentorum, & vinaceorum, detractis in ſede condylomatis, & thymiis, illitus ex aceto medetur: prodeſt luxatis, & viperarum morſibus: contra lienis inflammationem illinitur cum roſaceo, & ruta, & aceto.

## LABRVSCA. CAP. II.

LABRVSCA duorum generum eſt. Alterius vna non matureſcit, ſed florētus cenanthem nominatim producit. Altera ad frugem peruenit, paruis acinis, nigra, & adſtringens. Folia, caules, & clauicula, quibus repunt, vim habent cultæ vici ſimilem.

## VVA. CAP. III.

VVAE recentes aluum turbant, & ſtomachum inſiant. innocentioreſ, quæ decerpunt diu pendere, ideo quod in eis copia humoris exicatur, vtilẽſque ſunt ſtomacho, ægrisque, atque cibi auiditatem excitant. In vinaceis, & olis ſeruata, ori & ſtomacho gratæ ſunt, aluum ſolunt, ſed veſicam, & caput tenent ſanguinem excreantibus conueniunt. Simileſque, quæ in muſto fuerunt. Sapa, aut paſſo cõdita, ſtomachum magis inſeſtant. At quæ ſolem prius paſſa, in aqua celeſti conduntur, minus vino ſunt, ſticuloſis, ardentibus, & longis febribus ſalubres. Recõditi vinacçi inſtant

inflammatis mammis, rigentibus, ac præduris, cum sale illinuntur. Decoctura eorum dysentericos, cœliacos, & scæminas fluxione vulvæ laborantes iuvat infusa: ad defecationes, ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringendi vim obtinent: stomacho viles sunt. Inspargitur farina tostorum, polentæ modo, dysentericis, & cœliacis, & solutis stomacho.

*Vitis Vinifera. Vitis feræ. Vitis conserata.*

VITUM omnium genera, quæ non modò gratissimas, dulcissimæque vas ad cibos præferunt, verum etiam ex his vinum præcipuum potantæ vitæ bonum, suavissimæque potum largiuntur, quot & qualia sint, hic scribere superuacuum esse puto. Quandoquidem earundem dulcedine humanum genus allecti, ad eas sibi concessit, familiarisque reddidit, ut nullus tam clarus quam obscurus, tam nobilis quam ignobilis, tam denique vrbæus quam rusticus inueniatur, qui de vitium generibus, earumque historia non possit aptè, acque etiam illicite loqui. Ut autem & vites ipsæ, & vinum à quorundam vermiculorum erodentium vindicentur iniuria, illud omnino silentio inuoluendum non duximus, quòd si, dum à sarmen-  
tis repurgantur, ac putantur, salx hirci sanguine oblinatur, vel ea ipsa prius cotem experta, calore corio affricetur, nuper emissæ gemmæ (si tanta rei agrariorum authoribus fides adhibenda est) ab erucis minime erodi possunt: neque etiam emissæ iam folia, ab aliis quibusdam vermiculis conuolui. Præterea non ignorandum est, quòd magna admodum iniuria vitibus inferatur, atque visus maximum detrimentum, si brassica feratur inter vites, siquidem perneciale vni cum altera odium intercedit. Quòd cum animaduertenter rei medicæ scriptores, præcipuum ebrietatis antidotum in brassica collocarunt. Ea enim si cruda præsumatur (ut apud plerisque nationes in cœnæ initio capitam brassicam minuium rescissam, laetucæ & intubi loco in acetiis recipi obseruauimus) ebrietatem futuram mitum in modum arceat, quemadmodum etiam post sumpta crapulam discutit. Quo fit, ut Germaniæ populi vino admodum addicti, semper suis mensis brassicam interponant, vel recentem, vel muria asseruatam. Ad Elephantinem (ut Theophrastus est author) itemque circa Memphis, vites perpetua fronde virent: tametsi annuas tantum proferant vasas. In Italia verè vites hobentur, Plinio insanzæ appellatz, quæ ter in anno florent, sed primas tantum maturant vasas. Vvas sine vineæis quidam prouentive asserunt, si propinquum ima pars, quæ terra in scrobo obrui debet, ante plantationem adeò secetur in longum, ut medulla vitæque eximatur, ac deinde coniunctis par-

tibus, & vlmeo cortice circumuolutis, propagines ipsæ suis scrobibus implantentur. Sed ut iam visus suas reddamus facultates, Vvæ (ut Galenus libro 11. de alimentorum facultatibus memorizæ prodidit) quemadmodum inter fructus autumnales principatum obtinent, ita fugacibus omnibus magis nutriunt, minimumque prauis succi habent, præsertim cum exactam maturitatem fuerint adeptæ. Porro quòd ipsæ nutriant, maximo argumento sunt si, qui vinearum fructum custodiunt: quippe qui tunc temporis vuarum esu admodum pingueant. Cæterum non omnes vno quidem modo nutriunt, quoniam quæ dulces existunt, cæteris succum habent calidiorem: ob id sunt sticulose, ac ventriculum inflant, & aluum subducunt. Contrarium efficiunt austre, siquidem, & ventrem cohibent, pacum nutriunt, agred; concoquantur. Acerbz autem vitari profus debent, utpote quæ ventriculo aduersentur. Vvæ eò laudabiliores, quòd carnosiores fuerint, præsertim cum probe mature à vne decerpuntur. Apertiles, si prius mature sint, & dulces, cæteris minus ventriculum inflant, & aluum conuenienter emolliunt. Vitis, quæ Græcis *ῥαῖς* & *ῥαῖς* dicitur, Latinis Vitis vinifera appellatur: Arabibus, Harin, Karin, seu Karm: Italis, Vite vinifera: Germanis, Vveinreb: Gallis, Vigne. Quæ verò *ῥαῖς* & *ῥαῖς* Græcè, Labrusca Latine dicitur: Italicè, Lambrusca: Germanicè, Vvild vveinreb: Gallicè, Vigne sauage. At Vva Latinis ac Italis, *ῥαῖς* Græcis vocatur: Arabibus, Haineb, Germanis, Veinbeer: Gallis, Raisin.

## VVA PASSA.

## CAP. IIII.

VVA PASSA alba adstringentior est. Prodest esitata caro earum russi, faucibus, renibus, ac vesicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis: & decocta in patinis cum melle, admixta milij, ac hordei farina, & ovo, valet ad purgandum caput: eiusdem gratia cum pipere commanducatur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, & cumini farina. Fauos, epinyctidas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita sanat. podagræ conuenienter cum panacis succo illinuntur: mobiles vngues illita, celerius extrahit.

VVAS PASSAS, quarum vbique vulgaris & frequens est vsus, omnibus nostrisimas esse arbitror. Veruntamen non est, meo quidem iudicio, credendum, quòd cum de Visis patinis mentionem faciunt Galenus, & veteres alij, par-

*Vuarum facultas, ex Galeno.*

*Naming.*

*Vitis vinifera conserata.*

unas illas tantum intelligit, quæ hoc tempo-  
re ex quibusdam Aegæi insulis, ac Peloponne-  
se Veneris conuehantur, & in quibusdam etiã  
Italæ locis insolantur. Siquidem Galenus nulla  
magnitudine, vel paruitate habita ratione, om-  
nes in vniuersum vvas solis calore siccatas,  
passas appellat. Id quod ipse Galenus libro se-  
cundo de alimentorum facultatibus iis verbis  
declarat. Porro quemadmodum passum differ-  
entia, quæ à colore sumitur, nihil ad passa-  
rum facultatem confert, ita nec magnitudo: so-  
la autem qualitas, quæ gustui inest, differen-  
tia potest omnia. Ex his nimirum Galeni ver-  
bis satis colligi potest, ipsum omnis generis  
vvas, quæ solis feruore siccæ sunt, nullo pro-  
fus discrimine passas appellasse, nempe Dama-  
scenas ceteris grandiores (zibibum officinæ  
vocant) ac pariter his congeneres, quæ à Smyr-  
nis (vt aiunt) Cypro, & Creta comportan-  
tur. Præterea loco citato idem Galenus ita feri-  
bit. Nonnulli autem, & rectè sanè, è dulcibus,  
grandibusque, quales sunt scybelitides, prius-  
quàm mandant, semina eximunt. quæ & ipse  
inueteratæ, cutim duram, crassamque habent,  
easque prius in aqua coguntur macerare: nam  
& semen ipsum facilius sic eximunt. Aliæ qua-  
dam sunt his contrariæ, solidæ, & crassæ, quæ  
nullum proorsus semen habent. Crescunt hæ in  
Cilicia, colore subflauo. In Pamphylia autem  
scybelitidæ, & colore nigræ: quæ, vt dixi, sunt  
maximæ. hæc ille. Cæterum sciendum est, non  
omnes Vvas passas eiusdem esse facultatis, alia  
namque facultas inest dulcibus, alia austeris, alia  
vinaceos habentibus, alia nō habentibus. Quæ  
itaque vinaceis carent, vel quod ita natura pro-  
ducantur, vel quod ij arte fuerint exempti, si  
dulces sint, adstringente facultate vsque adeo  
priuantur, vt etiam misicis leniant, quomob-  
rem pectoris angustia, tussis, exasperatis fauci-  
bus, & renum, vesicæque vitis maxime conue-  
niunt. Id quod planè confirmat Galenus libro  
septimo, & octauo de compositione medica-  
mentorum secundum locos, vbi vvas passas sine  
vinaceis leniendo pectori, ac iecinorosis plu-  
rimam commendat. Contrà vero facultate om-  
nino adstringente censetur, quæ cum suis  
vinaceis manduntur. Quod cum non ignoraret  
Dioscorides, Vvam passam cum nucleis in dy-  
scenteria edendam esse tradidit. Hinc itaque fit,  
vt maxime in errore versari existimem medi-  
cos alioqui etatis nostræ celebres, qui alui de-  
liciendi gratia, Vvam passam parcam vulga-  
rem, quæ ex locis supra dictis in Italiam defer-  
tur, simul cum vinaceis deuorandam exhibent.  
quippe cū alium fluidum facere in animo sit,  
cum potius cohibent, quàm leniant: idque po-  
tissimum, vbi vvx passæ temporis tractu succi  
partem amiserint. Quæ re perspecta in hanc sen-  
tentiam deducor, vt ad alium emolliendam  
apriores censent Damascenas, Cyprias, ac Cre-  
ticas (quibus tamen prius nucleis exempti sint,  
vel ex sumantur, quæ sine nucleis nascuntur)

quæ quæ minutæ passim in officinis inueniun-  
tur, quadoquidem hæ succi longè minus, quàm  
corticis, & vinaceorum continent, nisi sint om-  
nino recentes, & diligenter asservatæ. Quapro-  
pter si hoc tenui varum passum genere vti  
quandoquæ cogimur ad emolliendam alui, eas  
eligi præstat, quæ sine vinaceis proueniunt: vel  
si hæ desint: suppleant illas, quæ à nucleis fue-  
rint expurgatæ, tamen si Damascenis, & Creti-  
cis longè bonitate cedunt: de quibus sanè in-  
tellexisse Galenum, easque ad pectoris vitia lau-  
dasse planè subicamur. In quorum genere hæ  
etiam tempestatæ sunt, quæ semine carent,  
quemadmodum quæ Galeni ætate ex Cilicia  
conuehebantur. Illud porro animaduertendum  
est, quòd vbi quis alium hominem facere cer-  
tendis, non debet passis vti, quæ gustui acce-  
ritatem, vel austeritatem relinquunt: sunt enim  
tales frigida, ac terrefices, quibus vtique facul-  
tatibus cohibent, adstringunt, & roborant, præ-  
sertim si cum vinaceis nucleis comedantur.  
Vnde scitè Galenus libro secundo de alimen-  
torum facultatibus, hæc prodidit. Vvx passa  
cum aliis vuis eandem habent rationem, quam  
carica cum seebus. Multæ enim sunt dulces,  
acerbæ autem omnino pauca: plurimæ verò  
ex dulci, & austera qualitate sunt mixtæ. quan-  
quam dulces nonnihil quoque austere quali-  
tatis habent: & austere, dulcedinis. Cæterum  
vt dulces temperamento sunt calidiores, ita au-  
stere frigidiore. Ad hoc austere stomachum  
roborant, & ventrem constipant, & his multo  
magis acerbæ: mediam autem quodammodo  
inter ipsas constitutionem dulces obtinent, vt  
quæ nec stomachum dissoluant, nec alium sub-  
ducant. Dulcibus tamen, vt vis quodam ser-  
per inest temperandi, ita & medicoriter de-  
tergendi: quibus duabus facultatibus exiguis  
mordicationes, quæ os ventriculi infestant, ob-  
tundunt. Et libro VII. capite VII. de com-  
positione pharmacorum secundum locos, idem  
Galenus sic inquit. Vva passa contempit vis-  
deri possit, ob familiarem eius vsum. At verò  
hoc ipsum eam facit vtiliorem: nam cum fa-  
miliaris nobis sit, in tantum adstringens est,  
quantum opus habet vicius assecutum. Habet  
autem & vim concoctiorum crudorum humo-  
rum, & vim coërcendi maligna, sitis ipsa haud  
facile puerit: ni obnoxia: & vitæ hæc secun-  
dam totam substantiam, visceri ipsi, hoc est  
iecinori: familiaris est, & propria. Item li-  
bro de attenuante viciis ratione, sic habet.  
Vvx passæ si non sint adstringentes, sien: qui-  
dem, & hepatis tumentibus non conducunt,  
thoracis tamen, & pulmonis affectibus con-  
ducunt. De vuis autem passis, vt cibus sunt,  
locutus est ipse Galenus libro secundo de  
alimentorum facultatibus, his verbis. Alimen-  
tum ex passis vuis tali qualitate in cor-  
pus distribuitur, qualis ipsarum natura fuerit,  
dulce ex dulcibus, austerrum ex austeris, mistum  
ex iis, quæ vtriusque qualitatibus sunt participes.

Quant.

Medic.  
m. cxi. ff.

Nemina.

Quantitate verò copiosius ex pinguibus, ac dulcibus: parcius ex austeris, & macris. Quòd si passarum pinguium, ac dulcium, à quibus semina fuerint exempta, parem mollem cum pari vuarum mole contuleris, passas valentius nutrire deprehendes. Huiusmodi sanè, vt minus quam caricæ subducant, abstergeantq; , magis tamen quàm illæ stomachum iuuant. Hæc vua, quæ Græcis *γαρί*, Vua passa Latinis pariter ac Italis vocatur: Arabibus, Zibib: Germanis, Vucinbeerden, Mettreubel, & Kosein: Hispanis, Passas: Gallis, Raisins de Caisles.

## OENANTHE. CAP. V.

OENANTHE vocatur vitis sylvestris fructus, cum floret. Recondi debet sicili non picato, collectaq; substrato linteo, in vmbra siccatur. Laudatissima in Syria, & Cilicia, & Phœnice. Vis ei adstrictoria: quare pota stomacho, ac ciundæ vrinæ vitilis. aluum sistit, ac sanguinis excreationes. Contra fastidia, & acorem stomachi, sicca, & illita efficax est. capitis doloribus tam viridis, quàm sicca ex aceto, & rosaceo perfunditur: sanguinolenta vulnera cataplasmate, & incipientes ægilopas, oris vlcera, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo ab inflammatione vindicat. Pessis miscetur ad sistendum sanguinem: contra oculorum delacrymationem, & stomachi ardores cum polline polentæ, & vino illinitur. Cinis crematæ in testa cadentibus prunis, facit ad oculorum medicamenta: reduuias, & pterygia, abscedentes gingivas, cruentasq; cum melle sanat.

Oenanthæ  
consid.

OENANTHEN non illius labruscæ modo florem esse, quæ vuas ad maturitatem non perducit, verum etiam alterius, quæ fructum perficit, asserere non dubitamus. Nam est superius scriptis Dioscorides, labruscam duorum generum esse, atque alterius vuae non maturescere, sed florentis Oenanthem nominatam perducere: nihil tamen propterea prohibet, quin alterius quoq; labruscæ florentis vua Oenanthæ pariter dici queat, cum non aliud veteribus significet Oenanthæ, quàm vitis flos. Quod in præsentî capite ipse Dioscorides manifesta declarat: quippe qui tradat Oenanthem vocari vitis sylvestris fructu, cum floret, nullius

facta generis distinctione. Quin & idè in sequentibus cõfirmat, vbi vini oenanthini meminit, è feracis sylvestris vitis floribus fieri scribens. Ex his itaq; abunde cõflare arbitror, nõ tantum in fructifera sed etiã fructifera labruscæ florem Oenanthem vocari posse. Adde quòd id quoq; apertè testatur Galenus libro v. 1. 1. cap. 1. de compositione medicamentorum secundum locos, his verbis. At verò quædammodum omphacium, sic etiam absinthij succo admisceo, quandoque etiam ambo, & tertium insuper hypacistidis, & quartum oenanthem. sic autem appello vitium sylvestrium germen vna cum floribus, ex quo succedentibus diebus vua fit. Plinius lib. x. 1. 1. cap. x. x. 1. 1. Oenanthæ vuae, non florem esse censet sic inquires. Eodem & Oenanthæ pertinet. est autem vitis labruscæ vua. Colligitur cum flore, cum optime olet. hæc Plinius. In cuius vltimis verbis suspicor mendum subesse, & fortè rectius legendum esse, cum floret, non cum flore. Non enim video, quomodo quis vnquam vuae cum flore colligere possit. Ceterum ne aliquis fortasse decipiatur, hic non duximus silentio dissimulandum esse lapsum Marcelli Vergilij, alioqui doctissimi interpretis, & commentatoris Dioscoridis. Is autem ex eius verbis, quæ nunc subiciam, magis innotesceat. Monemus, inquit, scribere in v. 1. suæ medicinz Paulum Aeginetam plurimum quidem ex labruscæ Oenanthæ vsum esse, quoniam egregie adstringit, stomachumque, & aluum maximè firmit. Veruntamen traditis his, idem statim subiicit. Dioscorides autem aliam describit Oenanthem contrarias huic vires habentem. ideoque secundis, stillicidio vesicæ, & fellis suffusionibus eam mederi ait. Quorum nihil in capite hoc legitur, neque in scriptore hoc alibi legisse me memini, & nihilominus non negligenda Aeginetæ

Marce.  
Vergilij  
p. 116.

authoritas, & testimonium est, quem credere oportet veræ, & quæ aliquando legisset, testari. hæc Marcellus. In quibus sanè verbis euidentissimè deprehenditur hallucinatus, vel potius eorum oblitus, quæ de Oenanthæ herba vitibus huic contrariis prædita, memorie prodidit Dioscorides libro tertio. Neque solum iustus, quam tamen Latinam fecerat, non meminisse videtur, sed neque eorum quoque, quæ ibidem in sua conmentatione doctè satis scripsit. Sed aliquando etiam bonus (vt auiunt) dormitat Homerus. Illud postremo addiderim, quòd etiam domesticæ vitis flos Oenanthæ dicitur. Verum quia sylvestris vitis vi multo magis adstrictoria pollet, is per excellentiam Oenanthæ appellatur. Dicitur igitur Græcis *οἰνάνθη*: Latinis, Oenanthæ, & Labruscæ flos: Italis, Enanthæ: Germanis, Vuld reben: Gallis, Grappe de vigne sauage, vel, Lanibrafques.

Nemina

## OMPHACIUM. CAP. VI.

OMPHACIUM succus est acerbæ  
vuarum

vux nondum maturefcentis, è Thafia vite, aut Aminæa. Oportet autem ante Canis ortum, expreflam melliginem in rubro ære, linteo cooperto, in foliare, vſque dum cogatur: ſempërque quod ceruici vafis concretum hæſit, reliquo humori permifcere: noctu verò à ſubdialibus locis in tectum reſſeri, quandoquidem nocturni rores ipſum conſcendere non ſiunt. Eligendum eſt flauum, friabile, vehementer adſtringēs, & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodeſt contra toſſillas, vuæ, vlcera oris, humida gingiuarum vitia, purulentas aures cum melle, aut paſſo: item ad fiſtulas, vetera vlcera, nomàsque ex aceto, dyſſentericis, & mulieribus fluxione vuluæ laborantibus clyſtere infunditur: oculorum claritati, & ſcabritiæ, & eroſionibus angulorum conuenit. Bibitur ad recentè ſanguinis excreationem, etiam ſi rupta parte aliqua contingat: ſed panco, & aq̃uatiore eſt vtendum, valde ſiquidem exurit.

*Omphacium conſid.*

OMPHACIUM ex omni immaturarum vuæ ſu genere parat Italia, cum Thafis, & Aminæis careat vuæ, è quibus veteres ſuum Omphacium conficiebant, ad medicinæ duntaxat vſum, id in ſole cogentes, vbi videlicet adſtrictione opus erat. Quæ tamen parandi ratio hoc tempore ſerè proſus exoleuit. Sunt qui vt maiorem omphacio adſtrictionem comparent, è ſyluſtrium vitium vuis illud exprimant, non ad medicamenta tantum, ſed etiam ad ciborum condimenta. Verum omphacium noſtrum ſole non cogitur, eſſi pluriſ diebus ipſum in ſolari dimitamus ſuis cum vinaceis in cado, craſſo lineamine cooperto, donec excrementa ſubleuentur, ſax verò ſubſidat, & inclareſcat ſuccus. Siquidem ac parandi ratione abſque ſale per annum incorruptum aſſeruatur tam ad ciborū, quam ad medicamentorū vſum.

*Omphacium vires ex Galeno.*

Omphacium (vt Galenus memoria prodidit lib. 11. 1. ſimp. med.) calidis morbis omnibus magno iuuamento adhiberi poſteſt. quippe cum id omnino acidum ſit, perfeſſe etiam refrigerat, vnicuique ardoribus prodeſt, ſue ori venteris impoſitum, ſue toris hypochondriis, ſue cuilibet aliq̃, quod refrigerare velimus. Id Græci *ἰμφάκιον* dicunt, quod Latini item Omphacium: Itali, Agreſto: Germani, Agreſt: Hiſpani, Agraz: Galli, Verius de grain.

*Nauina.*

VINI NATURA. CAP. VII.

VINO veteri nerui læduntur, & re-

liqui ſenſus, quod tamen guſtu ſuauius eſt: quare cauendum iis, qui in teſtina alicuius partis imbecillitatem ſentiūt. attamen in ſecunda valetudine paucum aqua dilutum, innoxie ſumitur. Nouum inflat, agrè coquitur, inſomnia parit grauiā, & vrinam ciet. Aetate medium vtraque vitia fugit: quare ad victus ſanorum, agrorūque vſurpatur. Album, tenue, ſtomacho vtile eſt, ac facile in membra diſtribuitur. Nigrum verò craſſum eſt, & concoctū difficile, carnem alit, & ebrietatem creat. Giluum, vtpote quod medium eſt, medias inter vtrunque vires habet. In ſecunda tamen, & ſiniſtra valetudine, cum primis laudatur album. Quin & vina ſapore diſtant. ſiquidem dulce craſſis partibus conſtat, & difficilius à corpore expirat: ſtomachum inflat, alium & interanea vt muſtum turbat, ſed minus inebriat: renibus, & veſicæ aptiſſimum. Auſterum per vrinam celerius tranſit: ſed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbum ad ciborum per membra digeſtionem accommodatiſſimum: alium, & cæteras fluxiones cohibet, minusque vrinam expellit. Nouum neruos minus tentat. Vinum aqua marina factum ſtomacho adæſatur, ſitim ſtimulat, neruos infeſtat, alio aptum, à valetudine ſe recolligentibus inutile. Paſſum, quod vuis ſole ſiccatis in arca, aut in ſarmento torrefactis exprimitur, Creticum cognomine, aut pramion, aut protropon: & ſapa, quæ fit muſto igni decocto, Græci ſirion, aut heſſema appellant: nigra quidem, & quæ dicuntur melampſithia, craſſa ſunt, & corpora multum alunt: candidum tenuius: & heluola inter hæc media, medias fortiuntur vires. Omnia tamen adſtringunt, & pulſus reuocant: faciunt aduerſus venena, quæ exulcerando necant, ex oleo pota, & vomitionibus reddita: contra ciuitas, meconium: pharicum, toxica, & concretum in grumos lac: item contra

1. c. 11. 11.

renum, & vesicæ pruritus, rosiones, exulcerationesq; inflat tamen, & stomacho aduersatur. Priuatim, prodest melampythium, si venter rheumatismum sentiat. Album magis cæteris emollit aluum. Gypso conditum nervis officit, caput aggrauat, & incendit, ac vesicæ aduersatur: contra venena cæteris aptius. Picata, aut refinata excalfaciunt, concoquunt: sanguinem excreantibus inimica. Quæ verò aparachyta vocant, vt quæ admixtam sapam recipiunt, caput implent, temulentiam gignunt, ægrius in halitum expirant, stomachum malè habent. Inter Italica vina Falernum principem locum obtinet: quod inueteratum per quàm facillè coquitur, pulsus exuscitat, aluum adstringit, stomacho vtile: sed vesicæ nocet, atque iis qui visus hebetudinem sentiunt, & ad potus crebros minimè idoneum. Albana crassioribus constant partibus, dulcia: stomachum inflant, ventrem emolliunt, sed concoctionem nõ æquè adiuuant, & nervosa minus infestant: vetustate eadem austerrimum saporem concipiunt. Cecubum, cum sit dulce, est & Albano crassius: corpus, & colorem alit: agrè tamen coquitur. Surrentinum valde austerrimum est: quare intestinorum, & stomachi fluxiones cohibet, & cum tenue sit, caput minus tentat: inueteratum suavius redditur, & stomacho vtile. Adrianum, & Mamertinum in Sicilia æquè crassis partibus gignuntur: modicè adstringunt, & ocysimè inueterantur, minùsque ob suam tenuitatem nervos tentant. Paratypianum, quod ex Adriatico sinu defertur, odoratum, ac tenuius est: quare liberaliter epotum fallit, diu seruat ebrietatem, & soporem adfert. Istricum Paratypiano simile est, sed urinam vehementius pellit. Chium tamen antedictis mollius, & aptum potui est. bene alit, & minus inebriat, fluxiones cohibet, oculorum medicamentis vtile. Lesbium facillè membra subit, Chio leuius, & alio idoneum. Ephesium eandem vim

habet, quod Phygelites nominatur. Verum Asianum è Imolo monte, Mesogites appellatum, capitis dolores ciet, & nervos lædit. Coum verò, & Clazomenium, quoniam multam sibi maris aquam vendicant, facillè corrumpuntur: status movent, aluum turbant, nervis officiunt. Vinum omne (vt reliqua in commune dicantur) merum, ac syncerum, & sua natura austerrimum, excalfacit, facillè in membra distribuitur, stomachum adiuuat, appetentiam ciborum inuitat: vires alit, ac robur augeat: somnum conciliat, & commendat colorem. Potum liberalius auxilio est contra assumptam cicutam, coriandrum, pharicum, ixiam, meconium, argenti spumam, taxum, aconita, fungosque: contra serpentium morsus, & omnium ictus, quæ refrigerando necant, aut stomachum in vomitiones effundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesque præcordiorum, ac distentiones, stomachi resolutionem, & si venter, aut interanea rheumatismum sentiant. Conueniunt sudatoribus, & quibus corpus immodico sudore digeritur, maximè alba, vetera, & odorata. Quæ tamen vetustate dulcescunt, renibus, ac vesicæ accommodatiora redduntur: vulneribus, inflammationibusq; in succida lana imponuntur: tetra vlcera, & phagedænica, & fluxionibus obnoxia commodè perfunduntur. Quæ marinam non receperunt, austera, & alba, ad sanorum victus vsurpantur. In his præstant Italica, Falernum, Surrentinum, Cecubum, Signinum, & permulta Campaniæ, & Paratypianum ab Adriatico sinu, & Siculum, quod Mamertinum appellatur. Ex Græcis Chium, Lesbium, & Phygelites ex Epheso. Crassa verò, & nigra stomacho negotium exhibent, inflationem pariunt, corpus augent. Tenuia tamen, & austera stomacho profunt, & minus carnes alunt. Vetera valde tenuia, & candida vehementius urinam ciunt, & dolores capitis movent, nervosque largius pota tentant. In media

dia etate, vt à septimo anno, potui sa-  
luberrima sunt. Modus autem pro eta-  
te, & tempore anni, & consuetudine, &  
qualitate vini definiatur. Non sitire, &  
modicè cibos prolui, optimum est præ-  
ceptum. Nocet ebrietas omnis, & ma-  
ximè assiduâ: siquidem obfessos nervos  
quotidie remittit: largiorq; potus acu-  
torum morborum adfert inicit. Me-  
diocri tamen vinolentia aliquot die-  
bus, maximè post aquæ potus, vt ilis:  
nanque modo quodam ex alto euocat,  
sensilesq; expurgat excretus, & per cæ-  
ca corporis ducit spiracula. Sed aquam  
post vinolentiam bibere oportet: siqui-  
dem valetudinis alicuius gratia factæ  
temulentia remedium adfert frigida.

*Vini fa-  
cultates can-  
dia pro-  
prio de sive.*

Cum profectò Vinum sit liquor omnium  
suauissimus, præcipuum humanæ vitæ bonum,  
ac præstantissimum subsidium, vitalium spiri-  
tuum regeneratur maximus, ac omnium corpo-  
ris tum facultatum, tum functionum insaura-  
tor optimus, cor lætificet tueaturque summo-  
pere, nulli mirum esse debet, quod plantam,  
quæ fructum fert, ex quo vinum exprimitur,  
vitem, quasi vitam, appellauerint veteres. Ve-  
rùm non ob id gaudent, iubilantq; ii, qui vino  
nimis indulgent, quòd ego ipsum tot laudibus  
extulerim, quippe cum omne extremum (vt in  
communi proverbio est) sit vitiosum, si vinum  
immoderatè, & plus quàm decet, bibatur, peri-  
culosos atque horrendos (vt mox dicitur) pro-  
creat morbos. Aliàs si in eius vsu temperantia  
adhibeatur, tum ad alendum, tum etiam ad ro-  
borandum corpus omnium efficacissimum ha-  
betur, quindocidem purissimum generat san-  
guinem, optimè in alimentum vertitur, conco-  
ctionem in quavis corporis parte adiuuat, ani-  
mum addit, cerebrum purgat, intellectum ex-  
citat, cor exhilarat, spiritus viuificat, vinâ ciet,  
status digestis, innatum calorem auget, conua-  
lescentes impinguit, cibi appetentiam inuitat,  
sanguinem turbidum clarificat, obstructions  
perit, alimentum in viuens corpus desert, co-  
lorem conciliat, & omne in corpore excre-  
mentolum deiecit. Sed hie modus est, & sine ra-  
tione, ac temperantia sumatur iugurgitur-  
ve (quod facere solent ebrios) ex accidenti to-  
tum refrigerat corpus, neque enim sicut nimio-  
eius potu (vt Galenus inquit) innatus corporis  
calor suffocatur, & aque parvus ignis magna li-  
gnorum stipe exstinguitur. Præterea cerebro,  
humali medullæ, ac nervis inde exoriantibus  
obest, hinc sit, vt princeps hac parte affecta, tem-  
poris tractu maximi, & perniciosè concutitur  
morbi, nempe apoplexia, epilepsia, paralysis, tre-  
mer, stupor, ephialtes, catalepsis, convulsio, ver-

tigo, articulorum contractio, lethargus, phre-  
nitis, destillatio, sorditas, cæcitas, & oris labio-  
rumque diffentio. Quinetiam vinum intempe-  
ratè haustum, bonos corrumpt mores, nam quòd  
homines contentiosi, loquaces, effrænique  
siant, quòd furant, mentèque moueantur, quòd  
denique alex, libidini, ac rei veneræ semper  
ferè indulgeant, ac nonnumquam homicidia cõ-  
mittant, nulli verius adscribendum est, quàm  
vino immo dicè sumpto. Adde quòd memoriâ  
dissipat, sensus omnes perturbat, assiduos mor-  
bos parit, & repentinâs mortes adfert: ne singu-  
la persequar, quæ recensere longum esset, &  
audire molestum iis, qui nimium vino dediti  
sunt. Cæterum Vinum magis senectuti, quàm  
relieui ætatis conuenit. Id siquidem frigi-  
dam senum temperiem, calidam annorum multi-  
tudo redditam, temperat, ac mulcet. Verùm  
pueris, ac adolescentibus ad vigesimum annum  
usque minimè concedi debet, si Galeni senten-  
tiæ subscribendum esse putamus, qui libro se-  
cundo de tuenda sanitate, nil aliud asserit vi-  
num esse pueris, & adolescentibus exhibitum,  
quàm ignem igni additum. Cauendum quoque  
est, ne in ardoribus ætatis vinum nunc, aut gla-  
cie, aut gelidissima aqua perfrigeratum hauri-  
tur: quòd, cerebrum, nervis, pectori, pulmone, ven-  
triculo, intestinis, spleni, iecinori, renibus, vesti-  
cæ, vtero, dentibusque maximè noceat. Quare  
admirari non licet, si tempore vinum arte frigi-  
dissimum bibentes colit, & ventriculi cruciatu-  
bus afficit, item convulsio, resolutionis, apople-  
xia, spirandi difficultas, vrinæ suppressio,  
calculus, viscerum obstruptione, aqua in-  
tercutit, ac pluribus aliis grauib, & pernicio-  
sibus morbis. Proinde scitissime Galenus libro  
de cibis boni, & mali succi, hæc prodidit. Qui  
non exercentur summa æstate, cum vehementi  
calore videntur, fontis aquam bibant, niumque  
& vini refrigerati usum vident. Hæc enim quan-  
vis protinus nullam iuuenem corporibus sensi-  
bilem læsionem inferant, sensum tamen, oculor-  
umque crescente vitio, cum iam ætas progressu  
temporis inclinauerit, articulos, nervosque, &  
visceratis morbis vexat, qui vel difficultè ad-  
modum, vel omnino tolli non possunt. Ad hæc  
in tuenda sanitate diligenter procurandum est,  
vt vinum, quod in potu alimenti gratia quoti-  
die sumitur, sit mundum, purem, clarum, odo-  
ratum, & sapore iucundum, atque corruptum,  
turbidum, impurum, odore graui, & gustu in-  
grato, non modò recti corpori noxam inferat, sed  
etiam sanguinem corrumpt. Quapropter sciti-  
ssimè suam tuentur sapientem, qui regiones in-  
colunt, in quibus optima vini proueniunt,  
quemadmodum in Gorticensi comitatu, vbi su-  
ne generosissima vina nascuntur, nimirum Pu-  
cinum illud antiquis adeo celebratum, necnon  
Vipacum illi bonitate prætinum. Hæc quidem  
parcè modesteque pota, ad tuendam sanitatem  
mirificè conferunt. Id quod ipse experientia in  
me facta comperi, atque etiam omnibus inge-  
nue

*Vini can-  
dia con-  
ueniat.*

20.

30.

40.

50.



nue testari possum. nam cum multis ante annis diuturnus ventriculi dolor male me habuisset, quem totius corporis imbecillitas consecuta erat, ex Pucini, & Vipaci tantum vsu, me pristinam meam sanitatem, & integrum robur adeptum esse certo scio. Ob id ergo mirandum non est, si Plinius magnus laudibus prædicauit Pucini libro x l i i i. cap. v i. vbi ita scriptum reliquit. Livia Augusta ostuaginta duos annos vitæ Pucino retulit acceptos, non alio vsa. Gignitur in sinu Adriatici maris, non procul à Timauo fonte, faxeo colle, maritimo afflatu, paucas coequente amphoras. Nec aliud apertis medicamentis iudicatur. Hoc esse crediderim, quod Græci celebrantes miris laudibus pythæum appellauerunt ex Adriatico sinu. hæc Plinius. Cuius certe testimonio planè subscribunt rustici Iapidiz incolæ: quippe cum ij vinis Pucino cognatis in quotidiano potu vtantur, rarissime ægrotant, & longæuam admodum vitam traducunt, adeo vt plurimi reperiantur, qui nonagesimum, & centesimum annu attingunt. Est autem vinum hoc tenue, clarum, lucidum, colore aureum, odoratu, gustuq; gratissimum. Potum valenter exalaciat, nisi dilutum fuerit, facileq; in vniuersum permeat corpus. Quamobrem (vt libro tertio simplicium medicamentorum scribit Galenus) tale natura vinum, non modò refrigeratorium omnium, sed eorum etiam, qui aut ex oris ventriculi, aut cordis dolore animi deliquio patiuntur, præstantium fuerit remediū. Ex quibus facile colligi potest. felicissimos esse eos, qui in regionibus, quæ vina optima ferunt, oriuntur, si tamen modeste (vt fieri decet) eis vtantur. Ceterum quæ vina in vniuersum quotidiano vsui magis conueniant, hic longior sermone commemorare superuacuum duximus, cum hoc à Dioscoride latius sit proditum, atq; etiam de omnium vinorum viribus diligentius scriptu, quam vt plura à nobis referri debeant. Vinu sic Latine, *vinum* autè Græcè vocatur: Germanicè, *Vein*: Italicè, pariter & Hispanicè, *Vino*.

VINVM OMPHACITES.  
CAP. VIII.

OMPHACITES nomine, peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acri vva, paulò ante maturitatè decerpta, triduo aut quatrduo, donec racemi in rugas contrahantur: expressumque vinum cadis insolat. Vim adstringentem habet, prodest dissolutis stomacho, & iei dōlore laborantibus: item prægnantium malaciæ, & crudis. in pestilentia quoque sortum auxiliari dicitur. Huiusmodi vina nō nisi post multos annos bibi possunt.

L O R A, quam deuterian, alij potimon appellat, fieri solet adiectis metretis tribus aqua in vinacea, quibus triginta vini metretæ extractæ fuerint: calcatis vinaceis, expressoq; decocto ad tertias partes, & additis in singulos congios modi eius qui remansit, binis salis sextariis, post hyemem transfunditur in vasa. Lora intra annum vtendum: etenim celeriter exolescit. Cōuenit ægris, quibus timeamus noxā vini, coacti sæpe desiderij eorū obtemperarent: item à longa valetudine fecoligentibus. Fit & vinum, quod adynamon vocant, loræ vires habēs, hoc modo. Pares aquæ, & musti mensuræ coquantur molli igne, donec albumatur aqua: quod, vbi refrigerit, elutriatum picato vase reconditur. Alij marinæ, & cælestis aquæ, mellis, & musti pares miscentur portiones, decapulat, & quadraginta diebus insolat. quo ad annum vtuntur ad omnia eadem.

L O R A alia ratione Galeni ætate, quā Dioscoridis parabatur. Ille siquidem loram faciendi modum libro i i. de alimentorum facultatibus, iis verbis tradidit. Vinaceorum quoque diluunt Græci *ῥύπον* vocitant. quod rursus ab Atticis *ἀσπίς*, à nostratibus *supernis*, id est, lora appellatur. Coniectis namq; in parua doliā vinaceis, tantum aquæ superaffundunt, quoad omnia permadeant. Quod vbi satis factum videtur, in doli j fundo foramen aperiunt, vt diluunt effluat, idq; pro vino bibunt. Perspicuū autem est, quòd pro racemorum copia aquam affundunt, experientia doctiq; videlicet neque aquosa admodum, neque merata sit lora. Deinde rursum aliam aquam, parciore tamen priori, vinaceis affundunt, si vt hoc quoq; portioni sit attemperatum: quod quidam Atticæ proprietatis curiosi propriè *ἀσπίς* dici volunt, non veluti prius illud. Vtraque lora capiti dolorem adfert, nisi dilutior bibatur, sed prior magis caput ferit. Dos vna huic portioni concessa est, nempe quòd ocyus per vinam reddatur: sed non pauca subest diuersitas ex varia vuarum specie, è quibus vinacei sunt relictū. Etenim si dulces fuerint, potus multò erit suauior, citiusq; per vinas excernetur: si vero acerbæ, & acidæ fuerint, insauior longè, ac minus ciens vinas. Porro dilutum hoc valentius vniuersusq; efficitur, cum vinaceis ad verum ætatem fuerit asseruatus. Hyemis autem

Namque

Lora paranda ratio ex Galeno.

tempore si quis vitatur, vt caput minus tentat, ita & per vrinas minus expellitur. Hæc de lora Galenus. Ea *Λορὰ* Græcis, Latinis Lora, & Italis Acquarello appellatur, Gallis verò, vin de despençe.

VINVM E LABRYSCA.  
CAP. X.

VINVM è sylvestri vna nigrum, adstringit: prodest alui, & stomachi fluxionibus, & cæteris, quibus contractione, & contractione opus est.

Non desunt in Hetruria, qui vinum è Labruscæ vuis exprimant, colore admodum nigro, idq; gisno admiscunt, vt rubicundius reddatur. Vtuntur eo rustici in alterius vini penuria. siquidem constat dulce simul, & austerum: verum tractu temporis dulcedinem facile deperdit, sicque tunc gustui omnino insuaue, adeò vt tantum medicamenti vicem expleat, vbi adstringitio sit opus.

VINVM MELITITES. CAP. XI.

MELITITES datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt. namque alium leuiter emollit, vrinâ ciens, stomachum expurgat. prodest articulario morbo, renum vitiis, imbecillo capiti, & mulieribus abstemiis: odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat à mulso, quod fit è vino vetere, austero, & melle exiguo. Melitites autè adiecto ad quinque congios austeri musti mellis congio, & salis cyatho. Cortinis magnis, quò magis ad effervesendum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale: cumque effervere desierit, in alia vasa transfunditur.

MYLSVM. CAP. XII.

MYLSVM è vetere vino, austeroq; & bono melle factum, præfertur: minus enim inflat, ac celeriter id genus in usum venit. Verus, corpus alit. media ætate, alio prodest, vrinam pellit: à summo cibo sumptum, nocet: & inter initia potum, implet: dein appetendi auditatem reuocat. Fit mulsum duabus vini metreticis, admista vna mellis. Aliqui, quò celerius præberi possit, mel

cum vino coquunt, & ita transfundunt. Alij vtilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentis vnum mellis adiciunt: & vbi ferbuerit, vase recondunt. dulce autem permanet.

AQVA MVLSA. CAP. XIII.

AQVA mulsæ easdem, quas mulsæ vires possidet. Cruda vitum cum moliri deiectionem, aut vomitionem incitare volumus: vt iis, qui venena hauserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illi dixerunt microphyctos, tussicibus, peripneumoniciis, & iis, qui immodico sudore digeruntur. Iâ paratum, conditiuumque, quod aliqui hydromeli propriè vocant, media ætate adynamo vino, aut lora in recreandis viribus responderet, & similem vim adipiscitur. quare inflammationibus alicuius membri plusquam lora prodest. Inueterati tamen vsus damnatur inflammatis, aut constrictis: sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusve conuenit. Fit duabus pluuiæ aquæ veteris ad vnam mellis partem additis, & insolutis. Alij fontanam aquam adiciunt, & ad tertias partes decoquunt, & ita recondunt. Nec desunt qui hydromeli appellent, quòd à melle elutis aqua fauis confici ac feruari soleat: sed meracius conficri conuenit. aliqui id coquunt. Aegrotantibus noxium est, quoniam plurimum ceraginis sibi vendicat.

ALIÆ sanè Aquæ mulsæ ratio conficienda est apud Mauritanæ familiæ authores, ab hac quæ hic à Dioscoride traditur. Inter Arabas namq; Mesues de ea ita scribit. Aqua mulsæ, ex antiquorum sententia, magnis vtique viribus prædita est. Sicim etenim arceet: frigidis artèctibus, præsertim cerebri, & nervorum, & articulorum, auxiliatur. Loco vini pota, humida extusfluentibus prodest: quin & pus, & lentam, crassamque pituitam pectore trahit. Intestina, viscera, vrinasque mentus purgat, terget, ac lauat: quapropter subuenit coli doloribus, alium subducit, & calculum gigni prohibet. Fit è libra laudatissimi mellis, non tamen veteris, colore pallido, odore iucundo,

*Aqua mulsæ ratio faciendâ varia*

cundo, sapore cum dulcedine modice acri, cum aquæ fontanæ libris octo, in vase lapideo, vel fictili vitreato, lento igni decoctæ, despumataque, & demum linteæ percolata. Verum si aqua hæc paulò post bibenda erit, aquatior fiat, & statim à sublatâ spuma percoletur. Nam quæ longa coctione iulapij consentientiam acquirit, diutius quidem feruari potest, sed ægrius penitus in remotas corporis partes, facileque in bilem vertitur, ob suam exuperantem dulcedinem. unde sicim accendit, nisi plurima assueta aqua dissoluatur, adeò vt aquæ ferè modo reddatur insipida. Variant autem mulsæ facultates pro diuersæ coctionis ratione. quippe quæ breui coquitur tempore, statim in ventriculo parit, aluum magis mouet, & minus nutrit. quæ verò longiori coquitur tempore, statim discit, magis nutrit, minusque aluum stimulat. Sunt qui mulsæ aromata etiam addunt, nempe gingiber, crocum, cinnamomum, macim, & id genus alia. Alij galliam moschatâ officinis vocant, & agallochum adijciunt. Fit præterea ex parte vna mellis, & aquæ fontanæ partibus octo, fermenti (alias foni græci) in his dissoluti vncijs tribus, & propriè ad centum mulsæ libras. Quæ denique omnia, multis modo effervescentia in ligneum cadum conciliuntur, non tamen ad summum repletum, ne feruescens resiliat. Vbi verò desuper obturto vase, asseruetur vini modo ad potandum, verumtamen non bibatur, nisi tertio mense transacto. Huic mulsæ aromata quoque admisceri possunt linteolo iuncta, & adalligata in cadum demissa. hæc Mesues. Cuius viciniam mulsæ parandæ rationem, Germani Medonem vocant, qui tamen fermentum addunt, non ex cerealium genere aliquo paratum, sed ex vini multo recremento, & lupi fasciarij floribus, quibus etiam vntur ad zythum conficiendum, quod Cerusiam appellant. Medonis plurimum bibunt Poloni, ac Litvani, quod melle plurimo abundant. Quod Græcis *μυσαγάρη*, Latinis item Melicratum & Aqua mulsæ vocatur: Italis, Aqua melata, Gallis, Eau miellée.

Nomina.

† Hoc loco vulgata exemplaria Græca habent, *ἀγίαστα δὲ τῶν ἀγίων*. hoc est, Vtetur cocta. In quibus nimirum verbis vitium aliquod latere suspicor. nam contextus verborum & res ipsa postulabant, vt prius Aquæ mulsæ crudæ, mox coctæ vsum transferret Dioscorides. quod hunc fecisse puro, fide librariorum culpa euenisse, vt sit negatio omnia, vel verbum *ἀγίαστα* alterius loco scriptum. Auger nobis suspensionem Aqnarius, qui in libro suo de compositione medicamentorum, vbi ea de Melicrato, id est, Aqua mulsæ scribit, quæ Dioscoridi accepta referri possunt, inquit primum, Cruda vntur ij &c. deinde. Cocta vero exhibetur &c. Hunc secutus fortasse Ruellius, vir doctissimus, vulgatam illam lectionem vt depravatam reliquit, & alteram vt ve-

riorem accepit. Addam insuper, quod ratio ex vsu Aqua mulsæ sumpta suadet, vt cruda magis quam cocta aluum deicere, aut vomitum ciere possit.

AQUA.

CAP. XIII.

DE AQUIS in vniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, cælum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, sincera, nullius omnino qualitatis particeps, & quæ ne minimo quidem tempore in præcordiis commoratur. ad hæc quæ & facili via fertur, & citra molestiam, nec inflationes creat, & minimè computrescit.

PAYCISIMIS quidem verbis de potabili in vniuersum aqua differuit Dioscorides, ita tamē vt nullam planè notam prætermiserit ex his, quo in optima aqua requiruntur. Quare si nobis esset iis tantum sciendum scitis, qui rerum naturalium periti sunt, non operæ pretium existimarem, hoc in loco plura de aquis commemorare. Verum quia hocce commentarios in studiosioribus, & imperitorum potissimum gratiam condimus, ideo non solum aquarum omnium, quæ in cōmune tam cibi, quam potus vsum veniunt, tum qualitates, tum facultates hic breuiter perstringam, sed etiam eas, quæ sponte nascuntur, & sibi metallorum, eæterorumque fossilium varias vendicant facultates. In primis itaque illa aqua ad potandum laudatissima censetur, quæ clara, pellucida, tenuis, pura, frustillorum, & saporum omnium experta, leuissimè reperitur: necnon quæ igni admodum cito calefit, remota verò ocyllimè frigescit, gustu iucundo: quæ denique celeriter præcordia pertransit, & sine vlla ventriculi molestia labitur, & secedit. Talis autem ea esse solet, cuius fons ad orientem solem erumpit, curritque super lapides, aut arenam, aut purissimam terram: quæ; æstate frigida, hyeme autem calida manat. Omnium tamen præstantissima est pluuialis, eaq; præsertim, quæ æstate media pluit, silente cælo. Huic ferè illa respondet, quæ eodè tempore cum tonitruis descendit, tonitruosa propriè appellata. At ea, quæ maxima æris, ac ventorum procella, terrifico tonitruum, fulgurum, & grandinis impetu, ex velociter eoncitatis nubibus cælo demittitur (vt in commentario libri sexti epidemiorum scribit Galenus) in humanæ vitæ vsum admitti non debet. Porro aqua cisternarum non tam sanè laudibus commendandæ videtur, licet à quorundam plurimis medicis laudetur. Siquidem non modò noxia existit, quod miscella quædam sit diuersarum aquarum, quæ

Aquarum  
differe-  
ntia. Et fa-  
cultates.

ia diuersis anni temporibus inibi colliguntur ex pluuiis, tum ex grandine, & niuibz hyemali tempore in rectis colliguatis sed etiam quod aquæ omnes stationarie putrefactioni facile sint obnoxie. Quo fit, vt aqua in cisternis collecta (si rem recte expendamus) syncera pluuiali minimè sit comparanda. Dicendum igitur erit, æquam sic asseruam eò pluuiali syncera deteriore esse, quò magis fuerit niuium, & grandinum liquationibus commissa. Quandoquidem (vt in libro de bonitate aquæ scribit Galenus) quæ à niuibz & glacie colliquefcit, concoctionem impedit, vrinam cohibet: pectus, pulmonem, ac ventriculum malè habet, conuulsiones, laterum dolores, & flacus generat. Quod alia de causa non euenit, quàm quòd cum in glaciem, vel niuem concreuit, omne, quod tenue inerat, de perdit. Putrescit præterea grauis quidem est, ægrèque conficitur, nec statui quidem potest, quòd sit putredinis omnis expert: veruntamen tantò minus fuerit damanda, quânto frequentius hauriatur, vel si è subterraneo fonte scaturiat. Sequuntur lacustres, & palustres, quæ omnino sunt improbandæ, nisi coctæ, vel igne destillatæ fuerit. Pluuiatilis deinde probatur, vel improbat, pro concurrentium aquarum, & rerum iniectarum qualitate, quemadmodum iis omnibus euenit luminibus, quæ magnas perluunt ciuitates. Nam quibus animalia putrefacta, excrementa, & vrbium sordes inesse sentiuntur, eæ ab alimentorum vsu abdicandæ sunt, nisi longo temporis tractu magnis scitilibus asseruatz, ac de faccarè clarificant, & prorsus expurgentur. vt Romani faciunt cum sui Tiberis aqua, quæ præ cæteris hac facultate pollet, vt clara facta, ad centum, & plures annos perduret incorrupta. Ad hæc noxiæ sunt, quæ plurimam terræ missionem consequuntur, quòd nõ modò viscera obstruant, sed & calculos in renibus, & vesica procreent. Cæterum aquæ, quæ lapideum admittunt succum, de quo satis diximus in prima huius libri commutatione, prorsus vitandæ sunt, vt quæ potantes strangulare possint, eo sanè modo, quo epotù gypsum quippe hæc arterias obstruunt spirituum transitum interceptiunt: quin & alimentum in corpus deferri prohibent. Quocirca huiusmodi aquæ potabiles non sunt, neq; in ciborum coquendo rum vsum recipiende. Quemadmodum nec illæ sanis probantur, quæ salnitru, chalcantum, alumen, & alia id genus concretæ succi continent. quanquam omnes in medicinæ vsum veniunt. Nam quòd omnes prædictis exaltantibus medicamentis referatæ sint, frigidis, & humidis morbis laborantibus vtilissimè exhibentur: iis verò noxiæ sunt, qui à biliosis vel acerbis proueniunt humoribus. Salsæ, si bibantur, pituitam eliciunt, sanguinem in ventriculo concretum dissolunt, æquam intercurrentem excitant, & o'esa corpora extenuant. Sed his consumptis potantes siticulosos reddunt, ven-

triculum lædunt, intestina abradunt & scabiem, & pruritum excitant, vapore quæ non obscure sanguinè acuant, & sua falsedine adurant. Clysteribus infusæ pituitam attenuant, & detrahunt, & ex ea prognatos dolores mirificè tollunt. Factis ex ea balneis aquæ curæ subeunt resoluuntur, si nouus fuerit morbus: frigidis neruorum dolores mulcent, peccatoris fluxiones cohibentur, exaltitq; ventriculus frigiditatis obnoxius, & humiditate languescens: quin & pituitosa scabies curatur. Tollitur quoq; vapore ex iis calentibus accipit, tum capitis grauitas, tum aurium cruciatu: foru verò frigidit tumores, & torius corporis fugillata desolentur. Nitrosæ, si bibantur, corpus perturbant, pituitam deticiunt, foeminas prolificas reddunt, & strumas absumunt. A salis hæc facultatibus non dissident, præterquam quòd in omnibus illis valentiores sunt, non adeò tamen adstringunt, sed valenter abstergunt, quare & scabiosos mundant, & aurium vlceribus medentur, incertòsque earum sonos, atque tumores discutiunt. Aluminosæ admodum adstringunt. proinde mirum non est, si ventriculū roborent, qui crebris vomitionibus imbecillus efficiatur. Vteri fluxiones cohibent, abortum prohibent, & in his præsertim foeminis, quæ ante sætus maturitatem plerumq; abortiri consueverunt. vesicæ vlcibus medentur: & oris, ginginarumq; inflammationibus, si ex eis frequens collutio fiat, Gargarizatu non modò desillationes ad fauces inhibent, sed etia confluos resoluunt humores. Idem præstat balneum ex iis paratum: consist enim magno iuuamento exterioribus totius corporis exulceratis, particulis, istq; præsertim, quæ defluxionibus tentantur. Cruentis item expuitionibus subuenit, anum prociudentem reprimi, & sudorem superfium cohibet. Nocet tamè tam in potu, quàm balneo, iis qui viscerum infarctu laborantes in febres faciliè incidere possant. Porro aquæ, quibus chalcantum, aut missy, aut sory, aut me lanteria immiscetur, cum omnia eadem facultate consent, aluminosæ sanè perfimiles sunt: veruntamen hæc valentius saum obeunt minus, nempe quòd præter alteriorum facultatem, succum etiam admodum acrem obtineant, quamobrem serpentibus vlcibus, ac phagedenis opitulantur. Sulphureæ exaltant, ac efficiant neruos emolliunt, proinde resolutis, conuulsis, tremulis, stupidis, contradistque peridoneæ inueniuntur. Eadem compagnum tumores discutiunt, & dolores mitigant, nam ubi quispiam coxendicum dolore, aut podagra, vel chiragra vexetur, sulphureæ aquæ balneo magnopere iuuatur. Præstant præterea ad ictericis, lienis, ac vteri dolores, atque tumores in iis genitos mirificè resoluunt: ventriculum tamen laxant, & infirmant. Bituminosæ, et si poze internis quibusdam morbis conueniant, & balneis adhibitis aliquo tēporis tractu neruos emolliant, ac exaltant, attamen caput replent,

sensus hebetudine afficiunt, præsertimq; oculos. Quæ autem Armeniæ, aut cærelei lapidis, aut æruginis, aut chrysocolle aliquid admixtum habent, si bibantur, vomitiones concitant: abluentibus verò phagedanica vlcera sistunt. Quæ præterea auripigmentum, aut sandaracham continent, pectus dilant, asthmaticis, & suspiriosis profunt, & omnibus frigidis in vniuersum morbis opem ferunt, quibus respirandi facultas impeditur. Aereæ oris, & genitalium membrorum vlcera sanant: quoniam & faucium, & oculorum desillationibus auxiliantur. Quæ denique ferreæ sunt, ventriculi, lienisq; vitis, seminis profluuiis, & mensuræ albis vitiis adhibentur. Et ut rem hanc summam coplectamur, aqua omnis, cui quodvis fossile medicamentum admisceatur, eandem facultatem præbet, quam quod illi admiscetur. Quia nimirum ratione duor, ut superuacuum putem, reliqua figillatim prosequi, ut taceam id nimis longum futurum.

Aqua Latinis dicta, Græcè *ὕδωρ* appellatur: Italicè, Acqua, Galicè, eau.

## AQUA MARINA.

## CAP. XV.

AQUA maris calida est, & acris. Stomacho aduersatur, alui enim conturbat: pituitam expellit. Si verò calida ad fortius adhibeatur, elicit, & discutit, nervuorū vitis, & pernionibus, ante vlcera prodest. Misceatur cataplasmatibus ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmaris. Ad mouēdas deiectiones tepefacta infunditur, & ad tormina, calida, psoras, pruritus, impetigines, lentes, & mammæ rigentes, foueri vtile est: liuiores foris discutit, ad venenatos ictus, qui tremorē, & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur: maximè scorpionū, phalangiorum, aspidumq; etiam si quis in calidā descendat, auxiliatur. & malo habitu confectis iandiu corporibus, neruisq; balneæ ex ea vtilis, hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates feruentis vapor leuat. Syncera, & sine portabilis aquæ mistione reposita virus deponit. Sunt quietiam præcoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum vino, aut melle: verum post deiectionem dant gallinæ, aut piscium iuscula, ad domandam morfus acrimoniam.

## THALASSOMELI. CAP. XVI.

QUONIAM thalassomeli vocatur, vehementer purgare constat. Temperatur autem æquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto, desecatis, & picato vase per Canis æstus insolat. Alij ad binas marinæ coctæ singulas mellis adiciunt, & vase condunt. huiusmodi moderatius est aqua marina, & mitius.

## ACETVM. CAP. XVII.

ACETVM refrigerat, & adstringit. Stomacho vtile, appetentiam excitat: erumpentem vnde cumq; sanguinem, potu infestū sistit. prodest alui fluxionibus coctū cum cibis: cruentis vulneribus inditur: inflammationes arcet, in succidis lanis, aut spongia impositū: reprimat procidentia sedis, vuluæque: item abscedentes gingiuas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, lepras, impetigines, prervgia, cum aliquo conuenienti efficac est: phagedanas vlcera, nomasque foris continuo cohibet: podagricis calido foris, cum sulphure auxiliatur: sagillationes rapit, cum melle illitum. Contra capitis ardores cum rosaceo in succidis velleribus, aut spongia imponitur. Ad aquam inter cutem, grauitatē aurium, & sonitus sibilosq; feruentis vapor proficit, insillatū quoque aurium vermes necat. Panos coëcet tepidi fatus, aut si imbuta aceto spongia admoveatur: pruritus permulcet. Contra venenatos serpentium ictus, qui refrigerando nocet, calidū commodè fouetur: & frigidū iis, quæ exurens virus eiulantur. Calidum potum, atq; vomitionibus redditum, aduersus omnia venena efficac est, præsertim contra meconium, & hausta cicuta, conglobatū in ventre sanguinē, lac coagulatū, fungos, ixiā, taxumq; cum sale. haustu voratas hirudines, si sorbeatur, elicit: tussim veterē mitigat, & recentem lacepsit. In orthopneæ calidum comodè sorbetur: gutturis fluxiones

gargarizatum inhihet: anginis, & vix  
procidentem conuenit. contra dentium  
dolorem, calidum colluitur.

*Aceti m.  
fl. f. eu.  
in c. fide.  
ratio.*

**QUANTVS** Dioscorides simpliciter pronun-  
ciauerit Acetum esse frigidū, quod fortasse  
in eo magis frigiditas exuperet, quam calidi-  
tas, tamē Galenus qualitatum medicamentorum  
omnium indagator maximus, ex contrariis quali-  
tatibus, calidis scilicet & frigidis, acetū con-  
stare docuit lib. 1. de simplic. medicam. facultatibus, nec esse homōmeres similareve, quē  
admodum nec lac vniuersum. Id quod ipse Galenus  
libro 1111. de eorundem facultatibus,  
apertissimē confirmauit suis verbis. Acetū primo  
horum commentariōrum misit esse substantiā,  
nempe frigidā, pariter & calidā, eiusque  
vtriusque tenuium partium demonstratū est: cē-  
terum calidā frigidā exuperat. Porro magnam  
desiccandī facultatem obinet, adēdē vt sit tertij  
ordinis desiccantium iam completi, vtiq; cū  
validum extiterit. Et lib. 1. de compositione  
pharmacorum secundū locos, idem sic inquit.  
Atqui Acetum ex incidenti ordine existens,  
vtra hoc quod descurit, præcipuum quiddam  
in se habet, quod reprimat, ac quod influit, &  
repellit: vtpote quod substantia sua parum cali-  
dum est, plurimū verō frigidum, & partū tenui-  
um. Idem quoq; lib. 1111. simplic. medic.  
ita scribit. At frigiditas, quæ ad acetū profici-  
scitur, tantū est validior, quantū & tenuior.  
Inest verō illi & acrimonia quædā exalfaciēs,  
quæ tamen satis non fit ab superandā ab acidi-  
tate procuenientē frigiditatem: verū quæ transi-  
tus modo celeritatē promoueat. nam quantū  
calidū frigidū facilius penetrat, tantū acris suc-  
cus aprior est, qui sensibilibus corporū meatus  
transfert, quā acidus. Itaq; ille, velut præce-  
dens viam sternit, hic verō haud ita tardē in-  
sequitur: quo tēpore sensus perficitur mistus,  
& qui ægrē exponi queat, vtpote qui nec planē  
frigidum esse acetum denunciet, quippe cū  
in eo ignea quædā percipiatur acrimonia, nec  
planē calidum. Nam perpetuū, quæ ex præce-  
dente fit acrimonia, calefactionē frigus ab in-  
sequente aciditate occupans, obscurat, prius-  
nusq; exstinguit. quo fit, vt maior multo ex fri-  
gore percipiatur sensus, quā ex calore. Hæc  
ad literam Galenus. Ex quibus abunde liquet,  
quod acetū etsi ex contrariis qualitatibus con-  
stat, plus tamen frigiditatis, quā caliditatis par-  
ticipes est. Quod cum rectē animaduertisset  
Dioscorides, acetum simpliciter (vt suprà di-  
ximus) refrigerare pronunauit. Verū tamē illud  
ignorandum non est, quod acetum nimium  
eō calidius erit, quod vtriusq; & acius ex-  
titerit. Siquidem ex Galeni sententia, lib. 1.  
simplicium medicamen. capite de adipē, item  
tertio de compositione pharmacorum secundū  
locos, vinum, mel, acetum, oleum, adeps,  
vetustate calidiora sunt. Ex quo faciliē fieri po-

test, vt reperiatu acetum adēdē vetustate aceri-  
rimum, vt plus habeat caliditatis, quā frigi-  
ditatis. Acetū quod Latini vocāt, Græcis *ἄξος* *Nomina*  
dicitur: Arabibus, Cal: Italis, Aceto: Germanis,  
Eßig: Hispanis, Vin agre: Gallis, Vin aigre.

ACETVM MVLSVM.

CAP. XVIII.

**ACETVM** mulsum, quod oxymel  
vocant, hoc modo temperatur. Aceti  
heminas quinque, salis marini pondo,  
mellis minas decem, aquæ sextarios  
quinque pariter coquito, decies effe-  
uescente cortina: atque vbi refrixerit,  
diffundito. Sumptum crassos humores  
extrahere, & ischiadicis, comitialibus,  
& articularum morbo cōsistatis pro-  
desse creditur. Contra morsum eius  
vipere, quam sepa vocant, haustum  
meconium, ixiāmve auxilio est. Angi-  
nis vtiliter gargarizatur:

**TRIPLEX** oxymelitis componēdi ratio *Oxymeli-  
tis confe-  
ctio tri-  
plex Gal.*  
tionem posteritatis memoriæ tradidit Galen.  
lib. 1111. de vitare tuenda: qui tamē sal nulli  
commisit, vt eius verba loco dicto apertē res-  
tantur, quæ ita sequuntur. Vni acetī parti, mel-  
lis, à quo detracta spuma fit, duplū est miscen-  
dum: deinde ambo in leni igni coquenda, do-  
nec eorum qualitates in vnū coierint: ita enim  
nec acetum amplius crudum apparebit. Cum  
aqua verō statim ita facies oxymeli. Melli quæ-  
druplum optimæ aquæ miscabis: dein coques  
modico igni, quoad spumare desinat. Ac malū  
quidē mel multā egerit spumā, quo etiam diu-  
tius coqui debet. Optimū verō, vt breuissi-  
mo tēpore coquitur, ita minimū spumæ euo-  
mit, vnde nec pari ei coctione est opus. Pluri-  
mum certē quātā partem eius, quod ab initio  
est indicū, amittit: post verō dimidio acetī ad-  
iecto, rursus coquendū, donec qualitātū omni-  
no sit vnitas, nec acetū crudum etiā appareat.  
Confectur sanē oxymeli etiā tribus statim ab  
initio mistis, ad hunc modum. Aceti vni parti  
addit mellis duplū, & aquæ quadruplū: atque  
hæc ad tertiā partē coquuntur, vel etiā quar-  
tam, spuma interim detracta. Quod si valentius  
id facere studes, tantundē iniciēs acetī, quan-  
tum mellis. hactenus Galenus. Quem secutus  
Mesues, ipse quoque de oxymelite sic scripsit.  
Oxymeli fit ex aqua, aceto, & melle. Aqua verō  
miscetur, vt longa coctione resoluitur id, quod  
in oxymelite statim exurit, vt etiā promptius  
despumetur, vt deniq; medicamētū huius scilicet  
tas, aquæ mixture tenuior facta, facilius in cor-  
pus distribuitur. Mel verō additur, ad oppu-  
gandum *Oxymeli-  
tis confe-  
ctio ex Me-  
sue.*

gnandam pituitam. Ex melle denique, & aceto mistis, facultas quædam tertia, quæ neutri eorum inest, tanta confurgit, vt efficacissima sit, atque certissima ad attenuandum, incidendum, resoluendumq; crassa, lentia; extremæ, quæ in ventriculo, & iecore existit longo tempore genita: quin & ea, quæ ad articularum compagines defluxerunt, & diuturnas procreantur febres: necnanque & incidit, & coquit. Fit ex aceti parte vna, mellis partibus duabus, aquæ partibus quatuor. Primum autem mel, & aqua simul coquantur, vbi despumata probè sunt, addito aceto percoquantur, semper quoq; despumando. Datur ab vicia vna, ad vicias tres. hæc ille. Nomen eius Græcum *ἰσχυρόν*: Latinum, Acetum mullum: Italicum, Aceto melato.

*Nomina.*

ACIDA MURIA. CAP. XIX.

ACIDA MURIA, quam Græci oxalem vocant, contra nomas fotu, putrida vlcera, canum morsus, & venenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in vulnus iniiciatur: & prociuiam sedem reprimat. dyfentericis, si nomas sentiât, infunditur: oportet autem ex lacte infillare. Hirudines forbitione, aut gargarizatu necat. furfures, & manantia capitis vlcera exterget.

ACIDAE MURIAE, quæ Græcis oxalme appellatur, vsus ætate nostra prorsus exoleuit. Parabatur autem veteribus illis ex sale, & aceto: vel ex muria, & aceto. Quæ Latinis Acida muria. Græcis *ἰσχυρόν* vocatur.

*Nomina.*

THYMOXALME. CAP. XX.

THYMOXALME veteres vtebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosve cyathos, aqua calida dilutos: itè in articularibus est morbis, & inflationibus. Crassos humores, atriosque trahit. Hoc modo facitatur. Thymi tritici acetabulum, salis idem modus, ruta, pulegij, polentæ, singulorû exigua portiones in vas coniciuntur, aquæ terni sextarij, & acetiterni cyathi infunduntur, & circumposito linteo sub dio madesunt.

SCILLINVM ACETVM. CAP. XXI.

SCILLINVM acetû hoc modo fit.

Scilla, quæ candida fuerit, expurgata conciditur, traictâque lino segmenta modicis intervallis, ne se contingant, siccatur in vmbra quadraginta diebus: mina corû in aceti boni sextariis duodecim immergitur, & vase diligenter operto septenis diebus in sole madescit: post eum dierum numerum scilla eximitur, & expressa abicitur: defacatum acetum transfunditur, & repositum. Aliqui scillæ minam quinque acetis sextariis miscent. Alij citra exiccationem repurgantes, parem mēsuram adiciunt, & senis mensibus macerari patiuntur. Id multo magis humorum lentitias digerit. Gingiuas humor prægnâtes colutione stringit, firmatq; & motos dentes stabilit. putredines oris, & graues halitus tollit. durat fauces sorbitione, & callosas facit: vocem expedit, & lympidam, canoramq; reddit. Datur stomachicis, agrè cibum cōcoquentibus, melancholicis, comitialibus, vertiginosis, mente captis: item vulnarum strangulationibus, lienis incremento laborantibus, ischiadicisq; Imbecillos admodum recreat, corpus sanum reddit, & bonum colorem præstat: oculorum aciem exauiat: tarditatem quoque aurium infusione purgat. In summa ad omnia efficax. Cauendum tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut neruorum vitis. Datur quotidie ieiunis forbendum inter initia exiguum, paulatim adaugendo, ad cyathum vsque. Nonnulli binos dant cyathos, aut largius.

40

QUANQVAM satis superque de Scillino aceto à Dioscoride dictum est, non tamen alie num fore exillimo commemorare hoc in loco, quæ de eo miris laudibus scripsit Galenus lib. 11. de medicinis paratu facilibus, sic inquit. Salubre optimum acetum Scillinum à Pythagora tribuitur, quo omnes Imperatores vsi sunt. Ab ipsius auctore fertur, quicumque hoc vratur longæ vitæ fore, & eius extrema integra, vsq; ad finem permansura. Et ipse quidem Samius senex huiusmodi extitit: quârum enim temporis vixerit, haud ignoras. de ipso in libro traditum est, quod cum suis consanguineis hæc facultatem communicauit: cumq; hoc medicamento vel incepit, quinquagesimū annū natus erat.

*Scilline acetis virtutes mirabiles.*

erat, & vsque ad centesimum decimum septimum vitam produxit integer, & nulla vnquam aduersa valetudine tentatus. Hæc sanè medicamentum auctor differuit, quòd fortasse vir philosophus erat, mentiri nescius. Nos autem viri huius fidei periculum fecimus, ac firmam, constan-  
temque huiusce medicamenti facultatem esse testamur. Oportet igitur sumere Scillam mon-  
ranam libræ vnius ponderis, & dura circunci-  
dere, & mollia minutatim concidere, & aceti  
acerissimi sextarios octo in vitreum vas mittere  
atque obturare, ac per triginta dies in Canicu-  
læ caloribus, vt maceretur, permittere: deinde  
scillam extractam expingere. Id genus aceti  
parum mane sorbeto. Tibi autè hæc cueniat,  
vt ne faucium orisque partes vnquam remol-  
lescant, os ventriculi benè valebit, facile spi-  
ritum duces, vox rectè habebit, oculi acutissi-  
mè cernent, aures in officio manebunt, nullus-  
que flatuosus vapor in ventre vnquam excita-  
bitur, nullum viscus suspensum erit, & benè  
spirans, bene coloratus deges. Ad ciuilia nego-  
tia rectè affectus, non acidum, non salum ructa-  
bis, si aliquid aceti huius assumpseris: & ieu-  
nus vt assumas præcipio, seprémque postea sta-  
diò deambules. ita enim dissoluetur. Hoc ace-  
to qui vitur, in victu quauis licentiosus esto:  
omnia enim cibaria conficiet, & à nullo vn-  
quam offensam patietur, neque valde implebitur,  
sed in melius proficere videbitur. nihil su-  
peruacui in corpore residere, non flatus, non  
bilis, non stercus, non vrina, sed omnia faciliè  
excernit, atque educit. Alius lubrica omnino  
est, totiusque corporis purgatorium medicamen-  
tum, etiam si in ossibus sordes inhæreant. Item  
phthisicos ab omnibus deploratos, hoc medi-  
camento sanitati restitutos nouimus. Morbo  
comitiali diuturno efficaciter profuit, vt nisi  
post longa temporis intervalla, non redierit:  
incipientem verò ac nouum perfectè discutit,  
neque reuerti amplius hunc affectum permit-  
tit. Ad podagras præterea, & articulorum mor-  
bos, iecoris, lienisque duritias vehementer fac-  
cit. & particulares quidem aceti scillini effec-  
tus hi sunt. Communes autem quam plurimi,  
quibus nos comuotì salutare hoc medicamen-  
tum, sanitatis, integritatisque causa, tibi tradi-  
dimus. Hæc ille, quicunque fuerit. nam liber est  
inter nothos, & Galeno adscriptus recensetur.  
Acerum Scillinum quod Latini, *Acetum Scillinum*  
Græci nominant: Itali, Aceto scillino.

## SCILLINVM VINVM. CAP. XXII.

SCILLINVM vinum fit hoc modo.  
Dissectam, vt dictum est, scillam, & so-  
le siccatam contundito: minam eius te-  
nui cribro incernito, & linteo raro illiga-  
tum in vicenos sextarios multo recen-  
tis, ac boni demergito. vbi trimestri  
spatio maduerit, elutriatum vinum,

obstructo diligenter vase, recondito. Li-  
cet quoque sic humida scilla vti. In or-  
biculis, rapi modo, dissectam duplica-  
to pondere, quadraginta diebus insola-  
ri oportet, & valde inueterascere. Alia  
parandiratio. Scillæ dissecæ, & repurga-  
tæ tres minas in Italicam metretâ mu-  
lti demittito, & senos menses in vase ob-  
structo macerari finito. post id tempus  
defæctum, & excolatum vinum recon-  
dito. Vtile est contra cruditates, & ci-  
borum corruptiones: item vīs, qui reuo-  
munt cibum: & si pituita in ventre, aut  
stomacho coierit. Prodest lienosis, ma-  
lè habitis corporibus, aquæ inter cutē,  
regio morbo, difficili vrinæ, tormi-  
nis, inflationibus, resolutioni neruorū,  
horroribus lōgis, vertiginosis, & vulsis:  
menses pellit: minimè neruos infestat.  
Hoc vinum vetustate fit melius. Cauen-  
das in febre vsus, aut si interanea vlcus  
sentiant.

SCILLINVM vini meminit Galenus lib. ter. *Scillini vi-*  
tio de medicamentis paratu facilibus, his verbis. *ut videret*  
Vinū hoc potui dari, omnē sanitatē adferre. hu-  
mores enim attenuat, sed maxime pituitā, neque  
ipsam in stomacho, aut vētre, aut capite, aut ie-  
core, aut liene, aut neruis, aut ossibus cōsistere  
permittit, neque aliū id genus tenacē humorem  
obstructiones facientes: sed omnia dissoluit, &  
ventrē lenit, atque ita subducit, & vrinā mouet,  
& per ipsam causas attenuat, excernitque. Adeo  
verò caput purgat, vt nares humiditate vacent.  
Commodū est podagræ, articulari, & comitiali  
morbo: denique omnis sanitatis est author. Ex  
his constat. Scillā albā, montanā circiter Canis  
exortū accipio in libræ pōdere, p dies decē in  
vmbra refrigerat: deinde scillæ laminas refrige-  
ratas in vitreū vas mitte, & vini albi veteris sex  
rarios duodecim superinsande, & suspensum vas  
per quadraginta dies habeto: postea scillā exi-  
me, & abice, & vino ad antedictā vitæ vttere, &  
eius vim percipies. Subinde ante cibū vini duas  
vncias exhibe, sin à cibo vnciam medrā. Quòd  
si ipsam potui commodū efficere velis, vt ma-  
gis delectet, mellis sextarios duos, aut tres ad-  
misseto. Quod Græcè *vinum scillinum*, Latine  
Vinū scillinū appellatur: Italicè, Vino scillino.

## VINA MARINA. CAP. XXIII.

VINA ex marina aqua, variè faci-  
tantur. Aliqui enī statim cū decer-  
ptæ sunt yuæ, aquam maris admiscunt.

Alij



Alij in area vuas sole siccant, quibus cal-  
catis marinam adiciunt. Alij passas  
prius vuas in doliis marina aqua mace-  
rant, mox calcatas exprimunt, id mag-  
is passis generibus ascribunt. Quæ ta-  
men austeriore gustu temperantur, cõ-  
tra febriam aduentantium indicia va-  
lent, modò meliora non adsint: alium  
subducunt: profunt purulenta extusien-  
tibus, & si dura alius exerceat. Quæ ex  
Aminæis vuas sunt, caput tentant, sto-  
macho aduersantur, flatus creant. Ve-  
rùm quò plenior habeatur historia, iis  
qui huius studio tenentur, non inutile  
existimamus varias vinorum composi-  
tiones adferre, non quòd frequens co-  
rum, aut necessarius existat vñs, sed ne  
quid omisisse videamur, quod ad eorũ  
rationem attinet. Sunt autem quædam  
ex iis facticia, minoris curæ ac impen-  
dij, quæ cadunt in vñs: vti quæ coto-  
neis malis, pyris, filiquis, item myrti  
baccis componuntur.

## VINVM CYDONITES.

CAP. XXIII.

CYDONITES, nomine alio meli-  
tes appellatur, & ita fieri consuevit. Ma-  
la cotonea exemptis seminibus, frustra-  
tim rapi modo scinduntur, & duodecim  
minarum pondus in multi metretâ, tri-  
ginta diebus macerantur: postea defre-  
catum vinum reponitur. Alia faciendi  
ratio. Oportet ad singulos mellis sexta-  
rios denos succi cotoneorum tusorum  
presforumq; addicere, & ita recondere.  
Vinũ hoc adstringit: prodest stomacho,  
dysenteriz, hepaticis, renum vitiiis, &  
vrinæ difficultati. Melomeli, quod &  
cydonomeli nominant, sic fit. Cotonea  
mala seminibus suis castrata, in quàm  
plurimum mellis, quo penitus demer-  
sa contegantur, coniciuntur: id post an-  
num mitescit, mulso nõ dissimile. Præ-  
stat eadem, quæ superior compositio.

## HYDROMELVM.

CAP. XXV.

Fit hydromelon duabus mensuris  
aquæ costæ, & sub Caniculæ sydus info-

lata, additis ad vnam melomelitis fa-  
cti ex coroneis. Vis huius eadem est.

## OMPHACOMELIA. CAP. XXVI.

OMPHACOMELITIS faciendi ra-  
tio hæc est. Acerbæ vuæ adhuc immatu-  
ræ, & tribus diebus insolata exprimu-  
tur, & ad ternas succi partes, mellis o-  
ptimi despumati singulæ partes adii-  
ciuntur: & insolatur in vasa transu-  
sum. Vim reprimendi, ac refrigerandi  
habet stomachicis, cœliacisque conue-  
nit. Vñs post annum est.

## VINVM EX PYRIS.

CAP. XXVII.

Fit & è pyris, perinde atque coto-  
neis, vinum, apites nomine, sed ita vt  
pyra non magnopere maturescant. Ex  
filiquis etiam, mespilis, sorbis, simili  
modo temperatur. Omnia hæc genera  
acerba sunt, & adstringunt. Stomacho  
vtilia sunt, atque intestinas fluxiones  
cohibent.

## VINVM CENANTHINVM.

CAP. XXVIII.

Fit è feraci vite syluestri, quod vo-  
catur cenanthinum. Siccæ flores minis  
duabus musti cado macerati, post tri-  
ginta dies mutantur, mox colatum vi-  
num reconditur. Facit aduersus stoma-  
chi imbecillitatem, cibi fastidia, cœlia-  
cos, & dysentericos.

## VINVM EX PUNICIS.

CAP. XXIX.

Fit è punicis malis maturis, quod  
rhoeten nominant, succo expresso ab  
acinis eorum, quibus lignosus nucleus  
abest, apyrena vocant, ac decocto ad  
tercias, & ita reposito. Efficax est con-  
tra fluxiones internas, & febri cum  
alui profluuiio exortam. Stomacho vti-  
le, adstringit alium, & vrinam mouet.

VINVM è Punicis malis multifariam con-  
ficitur in Italia. Aliqui enim repurgatos puni-  
corum acinos prælo statim subiciant, & ex-  
pressum succum vitreis amphoris recondunt: Alii  
ibiq; per se candu effervescenti sinunt, quousq;  
deserbuerit, & subsidat fax deinde in alios  
transfundunt amphoras, quòd à facibus repur-  
gatum eximunt, & oleum superinfundunt, ne  
evanescat, & corrumpatur, vel acescat. Alij, qui  
magis punicis abundant, acinos in ligneum cas-

V 5 dum al

dem altera parte parulum coniciunt, & vuarum modo pedibus caleant, donec vinus exillat fuscus: deinde per se in sole effervescere sinunt, cado linreo spissiore cooperto, vsque dum saxe vniuersa residat, nuclei superantent, & vinum defecatum, ac pellucidum redatur. Vbi autem hæc facta sunt, perforato paulo supra sæcem vase, vinum eximunt, & cadis lignis afferunt. Huic oleum superinfundere non opus est: servatur enim sic paratum per se, modo vasis ostium pice, vel cera obturetur. Sunt præterea, qui repurgatos panici acinos, cum pari mensura nigre vix austerisculi superis commisceant, calcent, & per se effervescere sinunt, quoad vinum claritatem consequatur. Subinde in doliolis afferunt: siquidem hoc gustui plurimum ardeat.

NOSACEVM VINVM.

CAP. XXX.

**RHODITES** sic fit. Rosarum siccarum, tusarumque minam linteo deligatam in sextarios octo musti demergito: & post tres menses defecatum vinum transfundens, recondito. Vtile iis, qui febri carent: & ad stomachi coctiones, & dolores, à cibo potum: & contra humidas aluos, & dysenterias. Fit quoque ex succo rosarum addito melle, quod rhodomeli vocant: quod arteriarum scabritiis conuenit.

MYRTITES VINVM.

CAP. XXXI.

**MYRTITES** fit, baccis nigris, quæ maturitatem exceßerint, tuis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextariis contusarum, ternas aquæ heminas adiciunt, & vini veteris parum modum: postea exprimunt, & seruant. Magnopere adstringit, stomacho vtile: fluxionibus ventris, ac stomachi prodest, & contra intestinas ulcerationes, & profluvia, denigrat capillos.

MYRSINITES VINVM.

CAP. XXXII.

**MYRSINITES** sic temperatur. Rami nigri myrti cum suis baccis, & foliis tuis, decem minarum podo, in tribus musti cõgiis seruescunt, donec duo super sint, aut certe dimidium. Id vinum colatum ad vsus reconditur. Contra furfures, vlcera in capite mania, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aures efficax est: sudores sistit.

LENTISCINVM, ET TEREBIN-  
THINVM VINVM. CAP.

XXXIII.

**LENTISCINVM** similiter vt myrsinites temperatur. Nec secus terebinthinum. nanque bacciferi eorum rami sumi debent. Similes insunt vires. adstringunt, stomacho accommodantur, & defluxionibus intestinorum, vesicæ, & stomachi, & sanguinis profluvio. Vlcera omnia fluxionibus obnoxia, fortis ad cicatricem perducunt: fluxiones vulnæ, ac sedis, infestatione cohibent.

PALMEVM VINVM.

CAP. XXXIIII.

**PALMYLAS** maturas, quas vocant chydæas in vrecolum imo pertusum, & obstructum picara arundine, demittito: lino foramen sit obturatum, & quadragenis sextariis ternos aquæ congios infundito. quod si ipsam ira dulce esse non libeat, quinque congios infudisse satis est. post decem dies detracto ab arundine linteo, assumito vinum crassum, & dulce, & reponito. Suae illud quidem, sed capiti noxium. contra fluxiones propter adfrictoriam vim efficax: stomachicis, coeliacis, sanguinem expuentibus conuenit. Aliqui idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sextoque faciunt, quod tandem acore vitiatum.

VINVM EX CARICIS FACTVM.

CAPVT XXXV.

**CATORCHITES**, aliquibus fycites vocatur, in Cypro fit, ita vt palmæ: sed hoc interest, quoniam pro aqua tantumdem humoris adiciunt, in quo recenter pressa vinacea maduerint. Caricæ, quæ chelidonia, aut phenicæ appellantur, præsertim nigra macerantur, vt diximus: & post decem dies humor excipitur, atque iterum, aut tertio, idem modus aquæ, in qua vinacea maduerint, infunditur. simili modo in recentis spatio, quarto, aut quinto assumitur. Demaceratorum liquor non secus acorem contrahit, & aceti vsum præbet. Id tenue est: satus gignit, stomacho aduersatur. fastidium parit, aluo tamen prodest, vrinam ciet, menses trahit, lactis

absterge.

uertatem facit, vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, vt potio, quam zython appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adii-  
ciunt. Alij murie amphorā, quod non  
facile vitiat, & aluo idoneū fore cen-  
sent. Alij thymum, & sceniculum imo  
subliciunt, & caricas superponunt : &  
ita vicissim, donec vas expleuerint. Fit  
& è sycomorīs eodem modo vinum,  
sed in aceturacore degenerat : quoniam  
non ita præualeat vis eorum, vt fluentis  
liquoris dulcedinem retinere possit.

RESINATVM VINVM.

CAPVT XXXVI.

RESINATVM vinum populatim fa-  
ctitari solet, copiosum in Galatia : quo-  
niam vinum illic coacefcit, vna non  
maturefcite, ob cœli algorem, nisi pi-  
cea resina temperetur. Resina autem  
cum cortice tunditur, & amphorā di-  
midia hemina permiscetur. Aliqui  
vbi efferbuit, excolant, separantes resi-  
nam : alij relinquunt. Hæc vina vetusta-  
te dulcescunt. Omnia capitis dolore,  
& vertigines faciunt : coctionem tamen  
adiuant, & vrinam cient : tussientibus,  
ac destillatione vexatis conueniant :  
item cœliacis, dysentericis, & hydropi-  
cis, & scœminis fluxione vuluæ laboran-  
tibus : altis exulcerationibus infundi-  
tur. In hoc autem genere nigricans ma-  
gis albo constringit.

VINVM STROBILITES.

CAPVT XXXVII.

STROBILITES fit maceratis in mu-  
sto nucibus pincis, recentibus, fractis-  
que : præbèrque resinati effectus. Siquis  
madefactas nuces pini musto deco-  
quat, potum affarim conuenit iis, qui  
tabitudine conficiuntur.

CEDRINVM, ET EX ALI-

QVOT ARBORIBVS, AC

FRVCTIBVS VINVM.

CAPVT XXXVIII.

CEDRINVM, iuniperinum, cupres-  
sinum, laurinum, pineum, aut abiegnū,  
simili ratione fiunt. Diuisos recen-  
ter ramos, cum fructum edunt, aut soli,  
aut balneo, aut igni admoouere opor-

tet, vti confudent, congioque vini mi-  
nam vnā permiscere, & post duos  
menses transfundere, & antequā re-  
condantur, in solare. Factitiorum vino-  
rum vasa impleri debent : nanque non  
plenis vasis, vina in acorem corrup-  
puntur. Medicata autem vina recte va-  
lentibus insalubria. Omnia excalsa-  
ciunt, vrinam cient, & substringunt.  
Laurinum tamen vehementius excal-  
facit. Fit quoque è fructu cedri maioris  
vinum, congio musti, adiecta tusaram  
baccarum selibra, diebus quadraginta  
insolari debet, & defæcatum in vasa  
transferri. Fit etiam vinum è baccis iu-  
niperi, non aliter quā cedrites, & ad  
eandem valens. Cedrites hoc modo fit.  
Cedriam dulci aqua lauant, & singulas  
amphoras singulis cyathis diluunt, &  
ita musto replent. Hoc genus vini ex-  
calfacit, extenuat : tussi antiquæ vtile si-  
ne febre, pectoris laterisque doloribus,  
torminibus, ventris, & interaneorum  
vleceribus, purulentis excretionibus,  
mulieribus vuluæ causariis, hydropi-  
cisque : facit aduersus ventristineas, &  
horrores. Contra venenatos ictus au-  
xiliatur : serpentes necat : aurium dolo-  
ribus insilliarum medetur.

PICATVM VINVM.

CAPVT XXXIX.

PICATVM ex liquida pice, & mu-  
sto temperatur. Picem autem primam  
marinā, aut muria tantisper eluere o-  
portet, dum inalbuere, & sincera ma-  
ris aqua defluat : mox aqua dulci pro-  
luenda : congiis octo musti vncia picis  
vna, aut altera adiiçitur : vbi efferbue-  
rit, & constiterit, in vasa diffunditur.  
Hoc genus vini excalfacit, concoquit,  
purgat, abstergit : vtile doloribus pec-  
toris, alui iecinoris, lienis, & vuluæ, si  
sine febre sint, veteri rheumatismo, ex-  
ulcerationibus in altum recedentibus,  
tussi, suspiriis, concoctionibus tardis,  
inflationibus, & luxatis, præsertim in  
succida lana impostum.

VINVM ABSINTHITES.

CAPVT XL.

ABSINTHITA faciendi ratio eua-  
riat. Aliqui enim duodequingenta

sextariis Italicarum amphorarum, admistam absinthij pontici libram decoquant ad tertias: & ubi infuderint sex acceri sextarios, & absinthij selibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in vas: dūmque conquieuerit, defæcant. Alij absinthij minam in amphoram demittunt, tufamque, & raro linteo deligatam, in cado musti macerant binis mensibus. Alij absinthij quadrantem, alij trientem, & nardi Syriacæ, cinnamomi, cassiæ, floris iunci odorati, calami, elatæ, palmarum singulos sextantes iniiciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstrueto vasis spiraculo, binis ternisve mensibus dimittunt: postea defæcatum vinum transfundunt ad vsus. Alij addunt in musti cadum Celticæ nardi drachmas quatuordecim, & absinthij drachmas quadraginta, linteo involutas: & post quadragesimum diem elutriant. Alij in senos sextarios musti, absinthij, libram, & siccæ pini resinæ sextantem immittunt: & post decem dies excolant, & recondunt. Vtile est stomacho, vrinam ciet, tardam concoctionem accelerat: hepaticis, regio morbo, & renum vitis auxiliatur: fastidia discutit, iis prodest, quibus stomachus negotiū exhibet: valet contra longam præcordiorum distentionem, & inflationes, teretēsque ventris tinea, & remoratos menses: contra hausta ixiæ venena quàm plurimum potum, & vomitionibus redditum, auxiliatur.

## VINUM HYSSOPITES.

CAPVT XLI.

HYSSOPITES è Cilicio hyssopo maximè laudatur. Fitque similiter, foliorum hyssopitussorum libra in amphoram musti coniecta: linteo raro cum quibusdam lapillis folia inuoluuntur, vt degranatus ponduscule fasciculus fidat: vinum post quadraginta dies defæcatum elutriatur. Contra pectoris, laterum, & pulmonis vitia, veterem tussim, & suspiria prodest: vrinā ciet: torminibus, & horroribus febriū circuitu repetentibus auxiliatur. menses mouet.

## VINA EX DIVERSIS PLANTIS FACTA. CAP. XLII.

SIMILI modo chamædrites fieri solet. Excalfacit, discutit: conuulsis, regio morbo, vultu inflationibus, tardæ concoctioni, incipienti aquæ intercutem subuenit. Inueterascēs melius redditur. Stæchadites non secus temperatur. Congiis sex stæchadis minam addere oportet. Crasitiem, inflationes, laterum nervorumque cruciatus, & perfrictiones discutit. comitialibus commodè datur cum pyrethro, & sagapeno. Fit ad eadem acetum è stæchade herba, vt paulo antè diximus, aceto macerata, quod eodē implet effectus. Fit vinum è betonica, quæ cestron psychotrophon appellant. Herbam semine maturo pręnantem, cum suis ramulis minæ pondo, congiis duobus vini macerant, & post septimum mensem transfundunt. Ad multa interaneorum vitia, vt frutex ipse, pollet. Et vt in vniuersam dicatur, factitia vina sibi misturarū vires adsciscunt, quare non difficile fuerit iis, qui illarum naturam norint, vinorum vires coniectura quadam consequi: veruntamen vinorum vsus sebricitatibus abdicandus. Fit etiānum è betonica acetum ad eadem vitia vtile. Tragoriganites fit quaternis tragorigani drachmis linteo colligatis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post tertium mensem transfusis. Prodest torminibus, vullis, ruptis, laterum doloribus, spirituū discursationi, ægris concoctionibus. E napis fit vinum, nomine bunites, drachmis duabus tufina pi in sextarios duos musti additis, & cæteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. Dictamni drachmas quatuor macerato quaternis musti sextariis. Facit aduersus stomachi fastidia: menses, & purgamentū à partu subducit. Marrubij adulti folia tun diro, & sextarios octo in musti metretademmittito, & reliqua cōsimiliter facito. Cōuenit hoc vinū pectoris vitis, & omnibus, quibus marrubiū. Thymi rasi, & cribrati vncias

centum linteolo colligatas, in amphoram multi adiecto. Valet contra ægras coctiones, fastidia, dysenteriam, neruorum & præcordiorum dolores, hybernos algores, & venenata animalia, quorum morsus frigus insequitur, aut putrescit locus. Simili modo è satureia vinum fit. quod eadē, quæ thymites præstat. Sic quoque origanites ex Heracleotico origano cōficitur similiter cum supradicto. Facit eadem, quæ thymites. E calamintha, pulegio, & abrotono vina sunt eodem, quo thymites, modo. Profunt stomachicis, cibum fastidientibus, & regio morbo: quod vrinam moueant. Fit item è conyzâ vinum contra venenata ante alia efficax.

VINUM AROMATITES.  
CAP. XLIII.

AROMATITES ita fit. Palmæ aspalathi, calami, nardi Gallici, singulorum quatuor sextarios sumito: postquam contriueris, passo subigito, coactis ingētibus ossis, & in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato vase, quadraginta diebus quiescere finito: deinde ubi facie expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio. Calami vncia, ph drachmæ septem, costi drachmæ duæ, nardi Syriaci drachmæ sex, cassiæ vncia, croci drachmæ quatuor, amomi drachmæ quinque, asari drachmæ quatuor. Omnia simul trita, & linteo colligata in cadum musti demerguntur: & postquam vinum deferbuerit, transfunditur. Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores, difficili vrinæ, horribus, retardatis mensibus, atque iis qui per frigora iter faciunt, potum conuenit. pituitæ crassitiem extenuat, colorem alit, somnum conciliat, dolorem finit: renum, & vesicæ vitiiis auxiliatur.

VINA EX DIVERSIS ODO-  
RAMENTIS FACTA.  
CAP. XLIIII.

FIT & vinum ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor in stomacho coit. Myrrhæ duæ drachmæ, piperis candidi drachma vna, iridis

drachmæ sex, anisi drachmæ tres. omnia plenius tusa, & linteolo inuoluta, in sex vini sextarios coniciuntur: vinum post triduum colatur, & in lagena reconditur. Datur post deambulationem meraculum, cyathi vnus mensura. Fit quoque nectarites ex helenio herba, radice siccapondo quinque drachmarum linteolo colligata, & in congios sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi, & pectoris vitia: vrinâ pellit. E Syriacâ nardo, & Celticâ, malabathroq; vinum facitatur, hac ratione. Singulorū selibram in binos musti congios mittito, post menses duos colato. Datur cyathus vnus cum tribus aquæ. Hoc vinum efficax est contra vitia renum, hepaticos, regiū morbum, & vrinæ difficultatem. prodest stomachicis, atque iis quos pallor decolorat. Alij vnciam, aut sextantem acori, & Celticæ nardi quadrantem in musti amphoram adiciunt. Asari quadrantem in senos musti sextarios iridē demittito. Id vini genus vrinam ciet: hypodipicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq; cōuenit. Radicis syluestris nardi recentis, & tritæ, cribratæque bessem in congiū musti conicio: duos menses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili vrinæ, inflationibus, stomachicis.

VINA EX DIVERSIS HER-  
BIS FACTA. CAP. XLV.

RADICIS dauci cōtusa drachmas sex in musti amphoram imposito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & vuluæ: menses pellit, rudus ciet, & vrinam: prodest tussis, ruptis, vulsisq;. Saluiz vnicā in musti amphoram, quod idem cū ceramio est, mittito. Valet contra renum, vesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vulsa, & suppressos menses. Panacis vnciam in musti congiū mittito, & transfundito. Prodest ruptis, vulsis, confusis, orthopnæ: lienis crassitiem extenuat: cōtra tormina, coxendicum dolores efficax

est: tardas concoctiones accelerat: mentes, & partus extrahit: aqua inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur. Vina ex acoro, & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorum vncias octo in fenois congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus, & latera, & vrinam mouent. Seminis apij recentis, maturi, & cribrati vncia nouem in linteo colligata in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat: stomachicis, & difficili vrinæ auxiliatur: faciles spiritus facit. Ex sceniculo, anetho, & petroselino, vina eodem modo fiunt, & ad eadem efficacia. Fit & è flore salis vinum, multo ad purgandum efficacius, quam vinum aqua marina temperatum. Fauces, vesicam, renes, & stomachum infestat: quare neque in secunda, neque aduersa valitudine prodest. Fit etiam vinum, quod phthorion vocant, quoniam partus necat, & abortus facit, veratro, aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta radices vitium sato: siquidem vires sibi illorum vires adsciscunt. Id vinum partus enecat: datur ieiunis mulieribus, quæ antè vomuerunt, cyathorum octo mensura, dilutum. Ramorum thymelææ cum suis foliis, & fructu triginta drachmas mittito in congios tres musti, & leui igne coquito, donec congiij duo supersint, defactumque recondito. Aquosa purgat excrementa, & lienem absumit. Chamæla dum floret, cum foliis tusa, & cribrata decem drachmarum pondere, in musti congium additur: post duos menses vinum in vas transfertur. Aquæ inter cutem, hepaticis, & lassitudine contractis, efficax est: item mulieribus, quæ à partu agrè purgantur. Chaphithyrium simili modo fit, ad eadem conueniens: vrinam quoque ciet. Librum radices mandragoræ concidito, segmenta lino traiecit, quod felibrum æquat, in musti cadum demittito, ibique esse finito ad menses tres, deinde

transfundito. Media potio, hemina dimidium: bibitur, passo in duplum addito. Aiant heminam vini congiomistam, pora soporem adferre. cyathus vnus cum sextario vini potus, enecat. Mediocris vsus eius doloris sensum aufert: fluxiones increasat. olfactu, potuque, & cum inditur, idem præstat. In congium musti aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri veratri triti in linteo mundo mittito: dumque effuerit, in marinæ aquæ congios quatuordecim, vbi pleniusculè fregeris, iniicito: post aliquot dies colato, & vitior. Dato cyathum vnum ex aqua balnei, in potu ad aluū soluendam, iis qui euomuerunt è cœna. Alia ratio. Veratri drachmas viginti, iunci odorati vncias duodecim, spicæ Syriacæ vncias tredecim, cribratas, & linteo colligatas, in septem vini Coi sextarios, diebus quadraginta macerandas indito, postmodum colato. dabis in potu sesquiheminam. Aliter. Decoctæ marinæ aquæ ex alto petita sextarios duodecim, veratri candidi libras sex, in musti amphora quadagesimo die quam madefeceris, colato, & vitior. Alia ratio. Veratri drachmas duodenas, & aphronitri quaternas in fenois musti sextariis diebus quinifidinis macerato, mox colato: & semestri exacto, vitior. Id vini genus abortus facit, & partus necat. Aut vvas in sole siccatas imposito in musti metretam (implet autem metreta congios duodecim) & gypsum in vinū mittito pondodrachmarum viginti, & biduo residere finito: coniecit veratri nigri drachmas triginta, iunci odorati, calami, singulorum drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios duos, & trientem, myrrhæ, & croci singulorum drachmam: inuoluens linteolo diebus quadraginta appendito, postea colato. dabis heminas tres, aut duas dilutas. Purgat à partu, & abortu scæminas: fetus extrahit: contra stragulatulus vuluæ efficac. Scæmonites sic fit. Radicis scæmoniæ per

niz per mēſſes effoſſa, trita, & linteo colligata drachmas quinque in muſti conſiū mittito ad dies triginta. Aluum purgat: bilem, & pituitam extrahit.

*Venerunt  
ſacſtitia  
conſidera-  
tio.* VINA ſacſtitia parandi ratio diuerſa, quam ſuperius ab initio propē huius libri ad hunc uſum locum pluribus capitibus diſſuſe diligen-  
terque tradidit Dioſcorides, nobis quidem clari-  
rior, & euidentior viſa eſt, quam vt operæ pre-  
tium eſſet, ſingula eorum capita noſtris com-  
mentationibus proſequi, præſertim cū om-  
nium ſerē iam uſus apud nos exoleuerit. quan-  
quam non equidem dubitauerim, quin eſſent  
huiusmodi uina, ſi eo modo parata in promptu  
eſſent, iis morbis proſutura, quibus prodeſſe  
produntur. Vnde pluribus adhuc rationibus  
nixus, primus ego, vt arbitror (quod etiam li-  
bro primo in Ebeni mentione diximus) è ligno  
Guaiaco uinum conſeci, & aliis quoque conſi-  
ciendum eſſe ſcriptis tradidi. Cuius poſtea uſu  
innumeros Gallica lue correptos, nos, & alij  
medici ſanitati reſtituerunt. Videmus enim Eu-  
phraſiatum ad oculorum claritatem efficacissi-  
mum eſſe, Myricinum lienis morbos ſanare, &  
quod ex ſena paratur, atrabiliaris morbis, &  
cutetenus exulcerantibus, nempe ſcabiei, le-  
pris, vitiliginibus, lichenis, & id genus aliis,  
commodiſſimum eſſe medicamentum. Quod  
cū animaduertuſſet magnus philoſophus, &  
medicus non ſpernendus, Arnaldus de Villa  
noua, de ſacſtitis uinis, quæ medicinz uſui con-  
ueniunt ad varios corporis morbos, copioſissi-  
mum edidit libellum. In quo qui uinis me-  
dicamentosis delectantur, & hæc conſiſcendi mo-  
dum, & eorum facultates, faciliè adpiſci po-  
tunt. Nam apud Germanos, & alios illis con-  
terminos, medicamenta uinis commiſta in frequen-  
tiſſimo habentur uſu, quòd magis, quam nos  
odoratis, & concinnatis delectetur potionibus.

tis quibusdam perinde quaſi zonis cin-  
cta, ob quod eam zonitin appellauere. Alia oſtracitis nominatur, gracilis, &  
magna ex parte nigra. Sed quæ testa-  
ceam faciem habet, terram amplexa  
eſt. Improbatur candida. Oculorum  
medicamentis botryitis nomine, &  
onychitis, viles: reliquæ ad emplaſtra,  
& farinas, quæ cicatricibus inducendis  
inſparguntur. Ad eadem Cypria pro-  
deſt. Ex Macedonia uerò, Thracia, &  
Hiſpania delata improbantur. Cadmiæ  
eſſectus adltringere, caua explere, for-  
des expurgare, exiccare, corporis me-  
atus inſarcire, excreſcentia in carne coër-  
cere, cruſtas creare, & vlcera, quæ ca-  
coethe vocantur, ad cicatricem perdu-  
cere. Gignitur cadmia ex ære in forna-  
cibus candente, fuligine egeſta ſlatu, &  
lateribus, camerisque fornacum inhæ-  
rente. Prægrandes autem, ac ferreæ  
ſunt rudes, ab officinis appellatæ ace-  
ſtides, per ſumma ſaſtigia connexæ, &  
concameratæ, vt quæ ab ære iactantur  
ſurſum corpuſcula, cohæreant, & inibi  
detineantur: quæ cū ſpiſſius inſident,  
in corpus concreſcunt, & modò genus  
vnum eius, modò duo, modò omnia  
perſciant. Extrahitur & cadmia in Cy-  
pro è monte, qui Solis incumbit, cre-  
mato lapide, cui pyritæ cognomen eſt,  
in quo etiam monte quædam quaſi ve-  
næ chalcitis, miſſos, ſoreos, melante-  
riæ, cærulei, chryſocolla, atramenti ſu-  
torij, diphrygiſque inueniuntur. Nec  
deſunt, qui cadmiam in lapidum fodi-  
nis inueniri tradant, falſi quadam la-  
pidum cognatione: qualis inuenitur, &  
apud Cumas lapis, nullâ ſui vim oſten-  
dens. Iſe o deprehenduntur, quòd ſunt  
cadmia leuioreſ, nullumque alienum  
mandentibus ſaporem exhibent: com-  
manducatus item lapis dentes offen-  
dit: cadmia, utpote cū cedat, eſum  
non reſpuit. Alio autem diſcerni poſ-  
ſunt argumento. Cadmia in farinam  
detrита, & aceto ſubacta, atque in ſo-  
le ſiccata, coit: quod in lapide non  
accidit. Item tritus, & igni appoſitus  
lapis

## De Metallicis Lapidibus.

CADMIA.

CAP. XLVI.

**E**X CADMIAE generibus optima  
eſt Cypria, botryitis nomine, den-  
ſa, modicè grauis, & in leuitatem ma-  
gis declinans, racemofa facie, colore  
ſpodij, quæ fracta cinerulenta eſt, & æru-  
ginofa. Proxima habetur foris cæru-  
lea, intus candidior, internatis vena-  
rum diſcurſibus, onychitæ lapidi ſimi-  
lis, cuiuſmodi ſunt quæ è veteribus me-  
tallis effodiuntur. Quædam etiam pla-  
codes, id eſt, cruſtoſa dicitur, ſegmen-

lapis proflit, & fumum igni similem  
 ei aculat: cadmia verò quieta manet,  
 fuliginemq; luteo colore, aut æreo  
 splendentem expuit, vario zonarum  
 difcursu. Insuper lapis ignem expertus,  
 arque refrigeratus colorem mutabit,  
 ac leuior multò fiet: sed cadmia nihil  
 euariat, nisi quis eam multis diebus cre-  
 mauerit. Fit & in argenti fornacibus  
 candidior, ac minus ponderosa, sed vi-  
 ribus nequaquam comparanda ærariæ.  
 Vritur cadmia superior carbonibus ob-  
 rura, donec translucida spectetur, &  
 ferrei stercoris modo bullet: mox ex-  
 tinguitur vino Amineo, quæ ad empla-  
 stra præparatur: sed quæ ad pforarum  
 medicamenta præparatur, aceto. Alij  
 hoc modo exustam conterunt in vino,  
 rursumque fictili crudo torrent, donec  
 pumicosa videatur: iterumque tritam  
 ex vino, tertio vrant, donec prorsus in  
 cinerem redigatur, nihil scabritiæ reti-  
 nens. hac spodij vice vtuntur. Lauatur  
 autem in mortario trita, effusa subinde  
 aqua, dum sordium nihil emergat: dein  
 coacta in pastillos reponitur.

*Cadmia  
 considerat-  
 io.*

CADMIÆ duo genera, nanque non modò  
 fœtita, sed etiam fossilis reperitur. Arte qui-  
 dem ea fit, quæ in fornacis tellurine, vbi æris  
 materia comburitur, coalescit, vt ea quæ Dio-  
 scoridis, & Galeni ætate in Cypro eo monte,  
 cui Solæ vrbs adiacet, ex pyrite lapide in for-  
 nacibus concrenato conficiebatur. Verùm fos-  
 silis (vt Galenus est auctor libro 1 x. simpli-  
 cium medicamentorum) in ærariis ipsius mon-  
 tis fodinis frequentissima habebatur, de qua ita  
 scriptum reliquit. Cadmia fit, vbi in fornacibus  
 æs paratur, nempe tota terra illa, ex qua æs ge-  
 neratur, in fornacibus in altum egerente, velut  
 fuliginem quampiam, & fauillam, sine vtunque  
 appellare licebit. At si non terram, sed lapidem  
 nuncupare velis, ex quo in fornacibus secer-  
 nendo partim fit æs, partim cadmia, partim di-  
 phryges, nihil sane retulerit. Sed & in argenteis  
 metallis efficitur simili secretionem, siue gene-  
 ratione, aut quomodocunque vocare voles. Quin  
 & ex pyrite lapide in fornacibus vñ fit cad-  
 mia. Cæterum absque fornace in Cypro cad-  
 mia inuenitur: ac iure quispam illam lapidem  
 nuncupet. Itaque in Solis, quo tempore ego in  
 insula peregrinabar, paucissimum etiam reli-  
 quum erat cadmiæ, quæ in fornacibus fit. Ve-  
 rum lapidibus, qui in montibus, & riuis repe-  
 riebantur, à metallis profectò acceptis, eos in  
 Asiam, Italiamque portari ad amicos, à quibus

summam inibam gratiam, quòd se vel maxi-  
 mum munus accepisse dicerent, & quæ alia o-  
 mni cadmia multò effect præstantior. Et talem  
 certè merito quæ lapidosam vocet cadmiam.  
 At eius, quæ combusta est, aliam botryticam,  
 aliam placitam medici nuncupant. Botryticam qui-  
 dem, quæ in edioribus domorum, in quibus  
 fornaces extructæ sunt, partibus colligitur. Pla-  
 citam verò, quæ in inferioribus. Ac liquet sanè  
 botryticam esse tenuiorum partium, crassiorum  
 verò placitam: vt ranque autem vi desiccandi,  
 ceu alia metallica omnia, & lapidosa, terrenâ-  
 que. Porro præter desiccandi facultatem, me-  
 diocriter item extergit. Attamen, quæ in for-  
 nacibus colligitur, igneæ facultatis aliquid ha-  
 beat necesse est. Merito itaque lauantes eam,  
 medicamentum efficiunt mediocriter tum de-  
 siccans, tum extergens absque mordicatione,  
 vile ad vlcera impletionem expositentia, & in  
 oculis, & in toto corpore. Porro vlcera magno-  
 pere humida, aut putrescentia, in corporibus  
 impendiò mollibus, qualia sunt eunuchorum,  
 puerorum, & mulierum, eiusmodi cadmia ad-  
 iuuat. At in durioribus, & contentioribus, quæ  
 valentius desiccant, requiruntur. Itaque illud  
 semper memoria tenendum, sermonem ad tem-  
 peratam, & mediâ excessuum naturam, in iis  
 quæ ita simpliciter esse videntur, referendum: pu-  
 ta cum dicimus medicamentum, aut vlcera car-  
 ne implere, aut cicatrice claudere, aut aliud  
 quidvis eius generis præstare, ad quam vtique  
 & nos nunc respicientes, leuiter desiccatorium,  
 abstersoriumque cadmiæ esse facultatem dici-  
 mus. In caliditatis autem, & frigiditatis diffe-  
 rentia, temperata quodammodo existit cadmia,  
 nempe neutrum insigniter efficiens. hæc Gale-  
 nus. Quibus maxime ad stipulat Plinius libro  
 x x i i i i. capite x. sic inquit. Metalla  
 æris multis modis insruunt medicinam, vt po-  
 te cum vlcera omnia ibi occyssimè sanentur. Ma-  
 ximè tamè prodest cadmia. Fit sine dubio hæc  
 & in argenti fornacibus, candidior, ac minus  
 ponderosa, sed nequaquam comparanda æra-  
 riæ. Plura autem genera sunt. Nanque ipse la-  
 pis, ex quo fit æs, cadmia vocatur, fuluris ne-  
 cessarius, medicinæ inutilis. Sic rursus in fornaci-  
 bus existit, aliâque nominis sui originem  
 recipit. Fit autem egesta nomis, atque statu  
 tenuissima parte materiæ, & cameris lateribus  
 vt fornacium pro quantitate leuitatis applica-  
 re. Tenuissima est in ipso fornacium ore, qua  
 flammæ eluantur, appellata capntis, exusta,  
 & nimia leuitate similis fauillæ. Interior opti-  
 ma cameris dependens, & ab eo argumento  
 botryticis cognominata. ponderosior hæc prio-  
 re, leuior porro securarius. Duo eius colores,  
 deterior cinereus: punicus melior, friabilis,  
 oculorumque medicamentis vtilissima. Tercia  
 est in lateribus fornacium, quæ propter graui-  
 tatem, ad cameras peruenire non potuit. Hæc  
 dicitur placitis, & ipsa ab argumento, crusta ve-  
 rius, quàm pumex, inusuraria: ad pforas villior,  
 & ad

*Cadmia  
 historiam  
 Plin.*

*Historia  
 ex Galen.*



& ad cicatrices trahendas. Fluunt ex ea duo alia genera. Onychitis extra penè cœrulea, intus onychis maculis similis. Ostracitis tota nigra, & cæterarum sordidissima: vulneribus maxime utilis. Omnis autē cadmia in Cyprî fornicibus optima, hæc Plinius, qui à Galeno in hoc dissentit, quod dixerit fossilem cadmiā futuris tantum necessariam, & medicinæ inutilem, cum tamen Galenus contrarium scribat. Cadmiæ omne genus vidimus sæpe nos in pluribus Germaniæ locis, ubi æs, argentum, & aurichalcum conficitur. Sed speciatim botrytita apud Perzenum quinto à Tridento lapide, & apud Sbozum in Tirolensi comitatu, ubi in quam plurimis fornicibus æs, ac alia metalla funduntur. Botrytis cadmiæ frustulum sine pulcherrimum nouissimè ad me misit Sagabria Dalmatiæ vrbe clarissimus medicus Iosephus Salandius Bergomensis: quæ adeo in racemi modum congesta est, vt planè vix specie referat. Porro officinæ omnes Tutiam, quæ pompholyx est, Cadmiā perperam nominant. Quandoquidem Tutia illis vocata (nisi mea me fallit opinio) Cadmia est è botrytis genere. Neque enim mirū esse debet, quod Cadmia proprio amisso nomine, in pompholygis locū successerit, cum etiā Dioscoridis tempore spodij loco vterentur medici. Metallicū, quod Græci καδμιά Latinis item, pariter & Italis Cadmia nominatur: Arabibus, Chlmia seu Chlmia: Germanis, Grauer, Augustem: Gallis, Tutie Alexandrine, vel, Calamine.

Nominat.

POMPHOLIX, SPODIUM, ANTI-  
SPODIUM. CAP. XLVI.

POMPHOLIX specie sola, non genere à spodio distat. Siquidem spodos nigricat, & plerunque ponderosior est, palearum pilorumq; plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab ærariarum officinarum pavimentis, & fornicibus euerritur. Pompholyx verò pinguis est, & candida, vsque adeo leuis, vt in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera. Vnum ad æris colorem vergens, subpingue: alterum magnopere candidum, summamq; leuitatem nactum. Candida sit pompholyx, quoties in perficiendo ære, fabri præstantiorem facere volentes, detritam cadmiā cumulatius insperferint, namq; tenuissima fauilla, quæ effertur, in pompholygem coit. Cæterum pompholyx non ex æris modò materia, & fabrilis industria facitatur, sed ex cad-

mia quoq; ad gignendā ipsam eximie follibus proflata. Cuius faciundæ ratio hæc est. In domo gemina contignatione operta, fornax extruitur, iuxta quā mediocris fenestra, ad tabulatum à supernis partibus pateat. domicilij paries fornaci proximis, tenui foramine ad fornacem vsq; perforetur, ad excipendam follis narem: ostiū mediocre habeat, pro exitu ingressuq; artificis fabricatum. domuncula altera huic coniuncta sit, in qua & folles, & flator suo munere fungatur. deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex cadmiā particulatim fractā inspargit, à locis supra infurnibulum extru-  
tis. idem negotium obit infernè artificis minister, simulq; carbones adiciit, vsq; dum indita cadmiæ copia prorsus absumatur. Itaq; egesta fustien tenuis pars, & leuis materia in summam domum euolat, & parietibus, testis, fornaciq; adhærescit: conflatum autem inde corpus, inter initia erumpentibus aquarum bullis simile prodit, postea maius incrementū capessiens, glomusculus vellerū simile redditur. Ponderosius autem in ima loca se recipit: sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pavimento cohæret: quod tenuiore deterius existimandū est, ideo quod multum terræ collegerit, & spurcitia in acernatione resericiatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spodiū arbitrantur, de qua antè dictū est. Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto halitū æris præstat, colore aliquantum piceo, sapore cœni horrido: & si fraudem non experta, flagranti carbone inferuescit, aëreum colorem contrahit. Antedictis autem notis diligenter attendendum est. Siquidē à nonnullis adulteratur taurino glutine, o-nullo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam cōsimilibus, quod facile cognitu fuerit: quippe nihil in iis probandis inueniatur eorum, quæ antè dicta sunt. Pompholygem in commune ita lauari oportet. Ligatam

linleo mundo, modiceq; raro, aut sic-  
eam, aut aqua respersam in labellum  
demittito, quod imbrem contineat, &  
huc atque illuc fasciculum deferens,  
immergito: ita enim limosa pars eius,  
ac vtilis effluet, & omne sedimentum  
in linleo remanebit. postea residere  
sinens aquam cum cinere colis incer-  
nito, & nouam infundens, agitato, &  
effundito: mutata tantisper aqua, & co-  
lata, dum arenosi nihil fidat. demum  
aquam exprimito, & siccatum cinere  
recondito. Alij quantum maximè fieri  
potest siccant, manibus in aqua con-  
terunt, dum mellis crassamentum imi-  
tetur: deinde linleo faucibus exceptu-  
ri vasis obtento, aut laxius illigato, co-  
lant, & quò facilius transeat, infusa per  
lintheum largiore aqua, cinerem con-  
turbant: mox spumofum, quod traie-  
ctum est, & supernat vasi, concha ex-  
cipiunt, & fictili nouo ad vsus recon-  
dunt. Quod verò refedit, sensim cri-  
bratum, in aliud vas transfundunt, re-  
lictò arenoso, quod pessum ierat: rur-  
sus lapidoso fidere parantur, & in vas  
aliud excolant: hoc identidem faciunt,  
donec cinis merus, & arenæ expers in-  
ueniatur. Alij paulatim integram in  
aqua respergunt, arbitrati arenas, lapil-  
losq; suo pondusculo degravatos, pes-  
sum ire: pilos autè, & paleas leuitate  
sua in sublime attolli. Ceterù cinerem  
mediù separant, & in pilâ coniectù, vt  
cadmiâ, eluunt. Quinctiâ lauatur vino  
chior marina aqua diluto, modis quos  
suprà diximus: & ita redditur adstrin-  
gentior, quàm aquis elota. Vis pom-  
pholygis adstringere, refrigerare, ex-  
plere, purgare, obstruere, & aliquantū  
exiccare. Inter medicamēta numerat-  
ur, quæ leniter crustas obducit. Quòd  
suspodon torrare libet, diligenter tri-  
tam, & irrigatâ aqua, colliges in pastil-  
los, fictiliq; nouo, subiectis leuibus pru-  
nis orbiculos continuò versabis, dum  
assiccati fuluescant. Neque ignoran-  
dum ex auro, argento, plumboq; fieri  
spodium: verum post Cyprium, plum-

beum maximè commendatur. Quo-  
niâ spodos sæpenumero desideratur,  
neceffe est ostendere, quæ simili virtu-  
te polleant, vt in spodij locum suffici  
possint, antispoda vocant: quoq; mo-  
do sumi debeant. Folia itaq; myrticū  
floribus, & baccis immaturis, in fictile  
crudum cōiecta, indito operculo con-  
tinua foramina habente, vruntur for-  
nacibus, donec figlinum percoquantur.  
iterum in fictile aliud crudū transferen-  
tur, quod vbi perassatū fuerit, exempta  
lauatur ad vsus. Idè quoq; fit & termitè  
syluestris oliuæ, si habeatur: sin secus,  
fatiatur cum suis floribus, aut malis coto-  
neis dissectis, & detractis ossibus, aut  
gallis aut laceratis lintheolis: itè ex mor-  
ris immaturis, id est candidis, in sole  
prius arefactis, aut terebintho, aut len-  
tisco, cenanthæ, aut mollibus rubi so-  
lis, vel è buxi coma, vel è pseudocype-  
ro cū flore. Alij ficulneas frōdes in sole  
antea siccatas, eodem modo parant: ali-  
j taurinum glutem: ali-  
j succidas lanas  
asperas, pice aut melle irrigatas. Quæ  
omnia in spodij vicem vsurpantur.

POMPHOLYX officinæ Mauritanos *Pompholyx*  
secutæ Tutia dicunt. Ita enim pompholyx ap-  
pellatur Serapioni, & Auicennæ. Verū quæ fe-  
derata, *gū conf-*  
plasiarij Tutia existimant, legitima non est, sed  
cadmiæ potius species. Siquidè cū hæc lapidis  
modo crustosa, prædurâq; sit, pompholygem,  
sue tutiâ dictâ prorsus mentitur. Pompholyx  
nanque, Dioscoride, & Galeno authoribus, ex  
zeris, vel cadmiæ fauilla in glomusculos vellerū  
similes coit, & farinæ modo contacta dispergi-  
tur. Id quod recentiorū nullus, quod scitâ, ani-  
maduertit: forsâ quòd omnes set herbariæ  
indagandæ magis insudauerint, quàm in huic  
genda fossiliū materia. Quamobrè Manardus  
Ferrariensem, medicū ætatis nostræ clarissimū,  
hæc in re deceptū satis reperio. Quippe qui, dū  
Auicennâ redarguit, quòd spodiū è combustis  
arundinū radicibus cōficiat, sedulò nos admo-  
neat, vt secuti Galeni sententiâ, in spodij dese-  
ctu, tutia potius vtatur, quæ seplax abundat,  
quàm Auicennæ antispodio. Sed in hoc Manar-  
dus planè hallucinatur deprehenditur, quòd  
procul dubiò crediderit, vulgare officinarum  
tutiâ legitimâ Dioscoridis, & Galeni esse pom-  
pholygem, cum tamè legitimæ Tutie nullis in  
officinis sit vsus, quòd (vt iam diximus) omnes  
pompholygis loco cadmiâ tantū vtantur. Por-  
rò legitimam tum pompholygem, tum spodiū,  
quæ à Dioscoridis, & Galeni historia nullis dis-  
sident

Manardus  
erratum.

sident notis, ego ab ætariis, argentariisque fornacibus plures mecum detuli, tam ab his, quæ Parzeni, & Lausii in Tridentino agro habentur, quàm ab illis, quæ Sbozj in Tirolensi comitatu Germaniæ inveniuntur, ubi certè celeberrimæ sunt metallorum ferè omnium fornaces, ac fodinæ: ex quibus non modò pompholygis, & spodij quantum satis fuerat, accipiendi nobis fuit facultas, sed etiam cadmiæ, pyritis, diphrygis, floris æris, helcyfinæ, molybdanæ, cæruleæ, & Armeiij lapidis. Quorum ne minimam quidem particulam apud Italice seplafarios reperiri unquam, præterquam apud eos, qui vel à me ab amicis meis adnotati, legitima hæc metallica medicamenta, adulterinis ex suis officinis abdicatis, in medicum suscepere vsum. Nunc verò amicos intelligo (quos tamen verius fratres amanissimos appellare possem, vt qui & ætate, & longa consuetudine, & studiorum communione mihi coniunctissimi sint) clarissimos medicos Tridento oriundos Andream Galium, & Iulium Alexandrinum, qui iandudum ob suam tum doctrinam, tum integritatem à Serenissimo Ferdinando Romanorum, Vngariæ, Bohemiarum Rege in sui, & suæ prolis commodum in medicos honorificè recepti sunt. Hoc itaque pacto cadmiæ officinis pompholygis vicem explet: quibus etiam antispodia quedam ex arundinum radicibus, & bonum ossibus cœcremata facta, spodium falsò referunt. Quod tamè non omnino fuerit reprobandum. Nani, Dioscoridis testimonio, ubi legitimam desideretur spodium, antispodius vt sanè licebit: nempe quæ fieri possint à myrti foliis, floribus, hæcisque: ex oliuæ frondibus, cydoniis malis, quercuum gallicis, attitis lineamentibus: item minoris nondum maturis, terebintho, lentisco, buzo, pseudocyprio, sici frondibus, tauri glutino, succida lana, pice aut melle persusa. Quo fit, vt mihi planè immerito à Manardo reprehensus videatur Auicenna, qui ex combustis arundinum radicibus sibi spodium confecit, medicinis commiscendum, quæ ad cordis robur parantur, & intus in corpus sumuntur. His enim longè melius, ac consultius fuerit arundinaceum adniscere spodium, quàm eius vice tutiam seu pompholygem imponere. licet hæc quoque sit Brasauoli sententia. Sed equidem hætenus nunquam me legisse recordor, pompholygem seu spodium iis medicamentis tuto adnisceri posse, quæ intus in corpus sumuntur: cum neque Dioscorides, neque Galenus, nec qui post ipsos diuersis temporibus clauerunt, tam ex Græcis, quàm Mauritanis, vsuam, quod inuenierim, memoris prodiderint, cetera vitæ periculum hæc hauriri posse. Nam fieri non potest, quin tam pompholyx, quàm spodium ventericulis, & cæteris ventericulis, mirum in modum noceant, cum ex tenuissimis æris substantia vehementissima ignis vi consiciantur, & ob id deleterij aliquid habeant. Quod maiori quidem diligenter expendere petuissè Brasauolus, cum interrogatus à suo senè pharmacopo-

la, quid spodij loco in compositis medicamentis imponendum foret, inconsultè satis respondit, pompholygem, vt faciebat Galenus. Qua in re duplici, meo quidem iudicio, notatur errore. *Brasauoli duplex error.* Primùm, quod respondens non distinxerit, aut hoc vel alio modo agendum fuerit cum medicamentis, quæ ore sumuntur, quibus myrropolys spodium quandoque commiscetur, omnino hac in re concludere videtur, pompholygem indifferenter pro spodio vtendum esse, tam in hauriendis, quàm exterius adnoscendis medicamentis. Deinde verò cum pompholygem, siue (vt ipse habet) tutiam spodij loco sumendam statuit, in eodem versari errore deprehenditur, in quo Manardum eius ciuem veratam ostendimus. Quandoquidem si rectè nouisset tutiam communis vsus, legitimam non esse pompholygem, omnino (vt semper in cæteris tam adulterinis, quàm supposititiis medicamentis facere adsolet) errorem hunc suo senè pharmacopole indicasset. Nec obstat, quod dixerit Galenus in spodij defectu, pompholygem supplendam. Siquidem is in instantum medicamenti id faciendum voluit, quæ exterius illiuntur. Nam Galeni ætate nullus spodij vel antispodij exercebat vsus ad medicamenta, quæ intus corpus sumuntur, vt longo pòst tempore à Mauritanis factum esse reperio. Cæterum Fuchsius medicus ætate nostra celebris, libro de componendorum medicamentorum ratione, Agri- *Fuchsi opinio.* colam fortasse secutus, præter illud Spodium, quod in fornacibus fit, alterum quoque recenset subterraneum seu fossile dictum, idque in quatuor species, cinereum videlicet, nigrum, viride, & luteum digerit: quod quidem fossilis Arabibus (Agricola soli Serapion) notum esse scribit. Veruntamen Serapio ubi de pompholyge agit capitulo 4 2. ubi item de Spodio capitulo 3 4 2. nullam, quod legerim, spodij fossilis mentionem facit: quemadmodum neque Auicenna, neque etiam alij Arabice familie auctores. Porro meminit tum Pompholygis, tum etiam Spodij Galenus libro 1 x. supplicium medicamentorum, sic inueniens. Pompholyx fit in aris fornace, velut & cadmiæ: sitque & dum in fornacibus cadmiæ vitur, vt in Cypro. Cum enim præfectus ad æris fornacem instructus res non haberet, præcepit ex ipsa cadmiæ preparari (præsentibus, atque inspectantibus nobis) pompholyga, videlicet minutis cadmiæ fragmentis in ignem coniectis, qui ante ararium hæcebat fossilum. Camera erat incurua, nusquam pertusa, sed integra, quæ ogellum ab vltà cadmiæ fauillam excipiebat: quani ubi collectissent, habebant pompholyga. At quod relictens infra in pavimentum recidebat, spodus est quam vocant, quæ plurima, ubi æs in fornacibus vitur, colligi soles. Quidam eam spodium neutro genere pronunciant: cui videntur similes habere facultatem quod vocant Antispodium. At ego illo vsus sum nunquam, cum largè mihi semper pompholyx suppetere. Nec enim quicquam,

fident notis, ego ab ærariis, argentariisque fornacibus pluries mecum deuli, tam ab his, quæ Parzeni, & Lauisii in Tridentino agro habentur, quam ab illis, quæ Sbozj in Tirolensi comitatu Germaniz inueniuntur, ubi certe celeberrimæ sunt metallorum feræ omnium fornaces, ac fodinæ: et quibus non modò pompholygis, & spodij quantum satis fuerat, accipiendi nobis fuit facultas; sed etiam cadmiæ, pyritis, diphrygis, floris æris, helcyfinæ, molybdænæ, cærulei, & Armenij lapidis. Quorum ne minimam quidem particulam apud Italiæ sepasariis reperiri unquam, præterquam apud eos, qui vel à me ab amicis meis admoniti, legitima hæc metallica medicamenta, adulterinis ex suis officinis abdicatis, in medicum susceperunt usum. Nunc verò amicos intelligo (quos tamen verius fratres amantissimos appellare possem, ut qui & ætate, & longa consuetudine, & studiorum communione mihi coniunctissimi sine) clarissimos medicos Tridento oriundos Andream Galum, & Iulium Alexandrinum, qui iandudum ob suam tum doctrinam, tum integritatem à Serenissimo Ferdinando Romanorum, Vngariæ, Bohemiarum Rege in sui, & suæ prolis commodum in medicos honorificè recepti sunt. Hoc itaque pacto cadmiæ officinis pompholygem vitæ explet; quibus etiam antispodia quædam ex arundinum radicibus, & bonum officibus cœrematis facta, spodium falsò referunt. Quod tamè non omnino fuerit reprobandum. Nam, Dioscoridis testimonio, ubi legitimum desideretur spodium, antispodii vii sanè licebit: neque quæ fieri possint à myrti foliis, floribus, bacisquæ: ex oliuæ frondibus, cydoniis malis, quercuum gallicis, attutis linteaminibus: item moris nondum maturis, terebintho, lentisco, buzo, pseudocypere, fici frondibus, tauri glutino, succida lana, pice aut melle perfusa. Quo fit, ut mihi planè immeritò à Manardo reprehensus videatur Auicenna, qui ex combustis arundinum radicibus sibi spodium confecit, medicinis commiscendum, quæ ad cordis robur parantur, & intus in corpus sumuntur. His enim longè melius, ac consultius fuerit arundinem admiscere spodium, quam eius vice tutum seu pompholygem imponere. licet hæc quoque sit Brasauoli sententia. Sed equidem hæcenus nunquam me legisse recorder, pompholygem seu spodium iis medicamentis tutò admisceri posse, quæ intus in corpus sumuntur: cùm neque Dioscorides, neque Galenus, nec qui post ipsos diuersis temporibus clauerunt, tam ex Græcis, quam Mauritanis, usum, quod inuenierim, memoris prodiderint, citra vitæ periculum hæc hauriri posse. Nam fieri non potest, quin tam pompholyx, quam spodium ventriculo, & cæteris visceribus, mirum iam modum noceant: cùm ex tenuissima æris substantia vehementissima ignis vi conflagrentur, & ob id deleterij aliquid habeant. Quod maiori quidem diligentia expendere petuissè Brasauolus, cùm interrogatus à suo scæne pharmacopo-

la, quid spodij loco in compositis medicamentis imponendum foret, inconsultè satis respondit, pompholygem, ut faciebat Galenus. Qua in re duplici, meo quidem iudicio, notatur error. Primum, quod respondens non distinxit, aut hoc vel alio modo agendum fuerit cum medicamentis, quæ ore sumuntur, quibus myropolæ spodium quandoque commiscunt, omnino hæc in re concludere videtur, pompholyge indifferenter pro spodio vtendum esse, tam in hauriendis, quam exterius ad mouendis medicamentis. Deinde verò cùm pompholygem, siue (vt ipse habet) tutiam spodij loco sumendam statuit, in eodem versari errore deprehenditur, in quo Manardum eius ciuem versatum ostendimus. Quandoquidem si rectè nouisset tutiam communis vsus, legitimam non esse pompholygem, omnino (vt temper in cæteris tam adulterinis, quam supposititis medicamentis facere adsolet) errorem hunc suo seni pharmacopolæ indicasset. Nec obstat, quod dixerit Galenus in spodij defectu, pompholygem supplendam. Siquidem is in istantium medicamentis id facitandum voluit, quæ exterius illinuntur. Nam Galeni ætate nullus spodij vel antispodij extrinsecus vsus ad medicamenta, quæ intus corpus sumuntur, ut longo post tempore à Mauritanis factum esse reperio. Cæterum Fuchsius medicus ætate nostra celebris, libro de componendorum medicamentorum ratione, Agricola forassecutus, præter illud Spodium, quod in fornacibus fit, alterum quoque recenset subterraneum seu fossile dictum, idque in quatuor species, cinereum videlicet, nigrum, viride, & luteum digerit: quod quidem fossilis Arabibus (Agricola soli Serapioni) notum esse scribit. Veruntamen Serapio ubi de pompholyge agit capitulo 4 2. ubi item de Spodio capitulo 3 4 2. nullam, quod legerim, spodij fossilis mentionem facit: quemadmodum neque Auicenna, neque etiam ceteri Arabice familie auctores. Porrò meminit tum Pompholygis, tum etiam Spodij Galenus libro 1 x. simplicium medicamentorum, sic iniquens. Pompholyx fit in æris fornace, velut & cadmiæ: siquæ & dum in fornacibus cadmiæ vitæ, ut in Cypro. Cùm enim præfectus ad æris fornacem instructas res non haberet, præcepit ex ipsa cadmiæ preparari (præsentibus, atque insectantibus nobis) pompholyga, videlicet minutis cadmiæ fragmentis in ignem coniectis, qui ante ararium iacebat solem. Camera erat incurua, nullquam pertusa, sed integra, quæ egestam abvsa cadmiæ fauillam excipiebat: quam ubi collegissent, habebant pompholyga. At quod reflectens infra in pavementum recidebat, spodos elci quam vocant, quæ plurima, ubi æs in fornacibus vitæ, colligi assolet. Quidam eam spodium neuro genere pronunciant: cui videtur similem habere facultatem quod vocant Antispodium. At ego illo vsus sum nunquam, cùm largè mihi semper pompholyx suppetere. Nec enim quiquam,

*Brasauoli  
duplex er-  
ror.*

*Fuchsi  
pino.*

*Pompholy-  
gis, & spodij  
diffinitio.  
Fuchsi  
ex  
Galeno.*

quisquam, ubi hæc adfit. spodio uti velit, nedum antispodio. Est autem pompholyx medicamentum prope omnium, quæ citra morsum desiccant, si elota fuerit, præstantissimum, quamobrem ad vlcera canerosa idonea est. & ad alia omnia maligna. Itaque inditur collyriis, quæ ad oculorum imponuntur fluxiones, quæque bullas: seu pustulas in eis natas curant. Præterea ad pudendorum, ac sedis vlcera optimum est medicamentum, nimirum sine morfu desiccans. Sed non est huius negotij in istis diutius immorari. Idem libro 1111. de compositione pharmacorum secundum locos de pompholyge ita scribit. Pompholyx lota nulli pharmacorum mordacitati expertum inferior est: atque ob id ea vitur ad acres, & tenues fluxiones, capite videlicet prius simulque vniuerso corpore euacuato. At verò manifestum est, quod per venæ sectionem, ac purgationem totum corpus euacuamus, per apophlymarismos verò caput à picuita vindicamus. Foris enim pompholyx lota, quemadmodum etiam spodium, atque amyllum simul, & moderate humores resiccare, simulque ne per tuni-  
culas euacuetur ea, quæ in magnis ipsorum venis, superflua humiditas continetur, prohibere. Quare si quis prius, quam caput ab humoribus ad oculos desluentibus expurget, obturantibus pharmacis vtatur, vehementem dolorem ex differtis tunicis efficiet, & ex multitudine influentium humorum aliquando rupturam, aut corrosionem inducet. *Πομφολύξ* sic Græcis, vt etiam Pompholyx Latinis & Bulla dicitur: Arabibus, Thucia: Italis, Pompholige: Germanis, Vucis nicht. *Ξυδιον*, & *Ξυδιον* Græcè, Spodiū similiter Latine vocatur: Italicè, Spodio: Germanicè, Grauu nicht.

Nomina.

## AES VSTUM. CAP. XLVII.

AES VSTUM probatur rubrū, & quod contritu colore cinnabarim imitetur: nigrum verò plusquam deccat, exultū est. Fit autem è clauis solutarum nauis, fictili crudo compositis: subperso sulphure cum sale pari, omnibus vicissim insparsis, fictile, circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figlum percoquatur. Quidam pro sulphure, & sale alumen inspargūt. Alij sine sulphure ac sale, fictili multis dies vrunt. Alij sulphure solo vtuntur, fuliginem tamen excutunt. Alij oblitos scissili alumine clauos cum sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in ænea olla aceto resperfos vrunt, & iterum ac tertio idem efficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet, in

Memphide combustum, proximum in Cyprio. Adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, attrahit: vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: vitia oculorum emendat, exfrescentia in carne consumit, nomas cohibet: vomitus ciet cum hydromelite potum, aut cum melle de linctum, illitumve. Lauatur vt cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris recrementum, sterécusve, quam scoriam vocant, eodem modo lauatur: & eandem vim, sed imbecillio rem, habet.

Aeris Essi  
considera-  
tio.

AES VSTUM, quod officinis passim habetur, pauci sanè valoris esse existimauerim, cum nigrum sit, & plusquam oporteat, igne exultum. Verum facile quispiam huic malo mædèri poterit, si Dioscoridem secutus, ipsum conficiendi laborem subierit. Quod si ærei clauis è nauigiis soluti, exempti non adfint, æs aliud omne vetustate expurgatum, commodè assumi poterit. Vñ æris meminit Galenus libro 1 x. simplicium medicamentorum, his verbis. Aes vstum habet & acrimoniam quandam, sed & adstrictionis est particeps. Proinde si laeetur, pulcherrimum est medicamentum cicatrici vlceribus inducendæ: quanquam id ipsum prestare, & antequam laeatur, possit, potissimum in carne duriore: alioquin in molliore commodius est. Quod Aes vstum Latinis, *χαλκὸς ὑπερκαυτός* Græcis appellatur: Italis, Rame abbruciato: Gallis, Erain brulé.

Vñ ex  
Gulene.

Nomina.

## FLOS AERIS. CAP. XLVIII.

FLOS æris, quæ nonnulli clauorum veterū plegma, quasi resegmè aut segmentum, nominantur, optimus est friabilis, in attritu fuluescens, milij effigie, & numero, brevis, ponderosus, modicè splendens, atque constringens, qui delimatam æris scobem non recipit, quæ sæpe adulteratur. Sed id facileprehenditur, cum dentium illisu dilatantur ramenta. Fit autem, cum æs fornacibus fusum, in receptacula delabitur, per cola fistularum ad eam pertinentium, tum huic negotio addicti ministri, sordes expurgantes, aquam clarissimam infundunt, refrigerandi proposito: itaque repentino concretu, ac addensatione, velut expuitur, & erumpit antedictus flos. Adstringit, & exfrescentia

creſcentia coërcet: offuſam oculis caliginem emendat, ſed magnopere mordet. Quaternum obolorum pondere datus, craſſum humorē extrahit. carnoſa nariū, & ſedis vitia abſumit: eruptiones papularum cum vino cohibet. Candidiſ contra diuturnas aurium grauitates tritus, in eas per fiſtulā ſtatu impellitur: vnam, tonſiſlaſq; reprimi, farina eius cum melle admota.

*Floris aris  
hiſtoria.*

**FLOREM AERIS** verum ac legitimum in fornacibus, vbi æs ipſum funditur, in Tridenden agro, ſæpius collegimus, in hunc modum. Cum æs fornaci liquatū, in paratū receptaculum extra fornacē diſtunderetur, antea quē omnino coiret in maſſam, frigida ſuper ipſum adhuc ignitū infundebatur: ſtatimq; vapor magnus excitabatur, ſub quo mox ferream laminam, & eam quidem amplam, ſubiiciebā, tandiūq; tenebam, donec ceſſabat vapor. Itaq; demum æris ſlos, qui ſuper lamina illa ferrea deciderat, mihi ſeſe oſtendebat granulis milio proximis, minoribus tamen, ſed colore rubicundo ſplendentibus. Quandoquidē tenuiſſima æris pars, quæ a vapore in ſublime fertur, æris frigiditatem experta, facili in eiufmodi exigua grana concreſcit. Is nuſquā, quod ſciā, in officiis reperitur. quapropter eius vice æruginē perpetuū vruntur. Florē æris paucis perſcrixit Galenus lib. i. x. ſimplic. medic. ſc. de eius viribus diſſerens. Flor æris tenuiorā partem ſaculatis eſt, quā aut æs vſu, aut ſquama. Merito itaq; ex eo factis collyriis, extergunt, auferuntq; ſuperciliorum magnas aſperitates, quas vocant ſycophas. *Χαλκός ἀέρος* ita Græcis, Latinis verō Flor æris dicitur: Mauritanis, Zar alnhas, ſive Zer alnhas: Italis, Fiore del rame, Gallis, Fleur de Bronze.

*Vires ex  
Galeno.*

**SQVAMA AERIS.**  
CAP. XLIX.

**SQVAMA æris** excuſſa ex Cypriis officinarum clauis, craſſa quidem ipſa præſtantior, quæ helitis, id eſt, clauaris nominatur. ſed ex vili promiſcuoque ære, aut candido, vitioſa intelligitur: quam, vtpote tenuem, & inualidam, damnamus, maximē approbates craſſam, ruſam, præſertim ſi acetī reſperſu æruginem contrahat. Vim habet adſtriſtoriam, extenuantem, reprimentem, & erodentem: nomas coërcet, vlcera ad cicatricem perducit. pota ex aqua muſſa, aquā trahit. Aliqui farina

ſubaſtam, dant in catapotio. Additur ad oculorum medicamenta: genarum naq; ſcabritiam abſumit, & fluxiones exiccat. Lauatur hoc modo. Siccæ æris ſquamæ expurgatæ ſelibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter cōturbatur, quouſq; peſſum irit: abiicitur, quod ſubſidit, & effuſa aqua, hemina cœleſtis imbris adicitur, & diſtenta manu, ſquama, quaſi deſtringenda ſit, vehementer confricatur: dumq; lentorem emittere cœperit, aqua ſenſim ad ſex heminas vſq; ſuperinfunditur, terendo validē: ſquama ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur, quo facto, expreſſus humor pyxide ex ære rubro facta, excipitur. Hoc eſt enim velut ſlos ſquamæ, valens viribus, & ad ocularia medicamēta cum primis efficaci. Inutile, imbecillumq; quod ſuper eſt, lauatur donec nullā prorsus lentitiam excernat: & linteo opertū biduo conqueſcere ſinitur, effuſaq; extāte aqua, vbi ſiccātū erit, reconditur pyxidicula. Alij vt cadmiam lauant, & reponunt.

**SQVAMA STOMOMATIS.**  
CAP. L.

**SQVAMAE** ex acie, aut mucronibus decuſſa, quam vocant ſtomomacadem viſ. Lauatur modo ſimili, & reconditur: ſed ad moliendam alui deiectionem inefficacior eſt.

40

**AERIS SQVAMA** malleis ex eo decuſſa, res ſine vulgaris notitiæ eſt: tamen ea præſtantior ſit, quæ ab ære excutitur, quo clauis ſunt, helitis propriē dicta. Siquid cum huiuſmodi æs rude imparūq; ſit, craſſiorē, vegetiorēq; ſquamam reddit, quā id quod pluriē ignem expertū, in varia vaſorū genera conſecturatur. Eius præterea abluendæ ratio adeo Dioſcoridi clara diſtinctaq; traditur, vt nihil addendū ſuperſit. Squamæ omnis in vniuerſum meminit Galen. lib. i. x. ſimplic. med. vbi ita ſcripſit: reliqui. Squama alia eſt æris, medicamen ad multa vtile: alia ferri, & ſtomomatis. Quidā verō nominant & helitin lepidā, ſive ſquamā. Omnes ſanē vehementer deſiccant. At inter ſe diuerſe ſunt, tum quod alia magis, alia minus exiccat: tum quod alia craſſioris, alia tenuioris ſit eſſentiæ: quodq; plus, minusve adſtriſtionis ſint participes. Helitis certē principem in deſiccando

*Squama  
æris, & ſto  
momatis  
meminit  
conſidera  
lib.*



ἀσχυρὸν γὰρ ἐστὶν αὐτῷ, καὶ τὸν αὐτὸν ἐν δόξῃ, ὡς  
 παλαιότερον. ἔστι δὲ ἡ αὐτὴ αὐτῷ ἐν δόξῃ ὡς  
 ἀσχυρὸν ἐστὶν. Quæ Latina redduntur in hunc  
 modum. Porro & ferrum elaboratum lique-  
 scit, ita ut fluxum reddatur, & rursus con-  
 crescant, æque in hunc modum faciunt stomo-  
 mata: siquidem scoria in fundum subsidet, &  
 defæccat ferrum. Cùm verò id sepe factum  
 est, & purum evasit, stomoma efficitur. Hoc au-  
 tem non sepe faciunt, eo quod repurgatum  
 multum deperdat, & pondere imminuat. Atqui  
 ferrum illud melius est, quod minus excremen-  
 ti retinet. hæcenus Aristoteles. Cuius  
 nimirum doctrinam sequuntur in hunc vsque  
 diem, qui ferraris fornacibus, & officinis de fer-  
 ro prius elaborato, chalybem conficiunt in  
 Italia, & in aliis vniuersæ Europæ regionibus.  
 Quapropter eos prorsus hallucinari eviden-  
 tissimum est, qui aliter sentiunt: nempe inter  
 antiquos Plinium, & inter recentiores Marcel-  
 lum, & Brasavolum. His omnibus accedit Se-  
 rapionis authoritas, magni inter Arabes Dio-  
 scoridis interpres: quippe qui quadringen-  
 tesimo tertio sui operis capite de simplicium  
 medicamentorum historia & viribus, id to-  
 tum quod à Dioscoride proditum est de squa-  
 mæ stomomatis, de ferri squama posteritatis  
 memoriam prodidit, ferrum tanquam genus,  
 chalybis loco accipiens. Nec obstat, quod in  
 Dioscoridis codice scriptum reperitur, stomo-  
 matis squamæ vim eandem esse, quæ æris  
 squamæ, quanquam non adeò valenter alium  
 deiciat. Siquidem ego planè suspicor, codi-  
 cem Dioscoridis hoc in loco esse deprauatum,  
 ut in aliis quoque pluribus deprehenditur,  
 præsertim cùm nec à Galeno, nec ab aliis ve-  
 teribus recentioribusque Græcis proditum sit,  
 stomomatis squamam æris squamæ viribus esse  
 similem: hæc namque alium deiecit, illa ve-  
 rò contrà eam cohibet. Ad hæc nequam me-  
 mini apud quemquam legisse, alio metallo ro-  
 borari posse ferrum in aciem vel mucronem  
 elaboratum, nisi chalybe, qui Græcis stomo-  
 ma dicitur. Quo fit, ut illorum perniciam  
 mirari non desinam, qui aliter sentiunt. Ex  
 his itaque haud dubiè credendum arbitror,  
 non aliud esse stomoma, quàm chalybem, qui  
 cùm à primordiis semper fuerit expectus ad  
 ferreorum instrumentorum aciem roboran-  
 dam, quam aciem Græci σίμωνα vocant; pa-  
 riter chalybem stomoma vocant. Quapro-  
 pter dicebat Aetius, sit ferrum, quod in ipsis  
 exinguitur, stomoma. Hoc autem vocabu-  
 lum putauerim ego ortum esse à σίμα, quod  
 Latins os sonat. Acies enim, itemque mucro-  
 nes, gladii, & celsi, aliiisque ferreis instrumen-  
 tis vsum nullum alium præbent, quàm oris.  
 unde Latins quandoque dici solet, eos, qui-  
 bus ob malefacta caput abscinditur, in ore gla-  
 dii perisse. Plinius quoque licet ignorauerit,  
 quid Græcis significet stomoma, chalybem ta-  
 men aciem, quæ Græci σίμωνα dicitur, appel-

laucilib. x x x i i i i. cap. x i i i i. sic in-  
 quiens. Ex omnibus autem ferri generibus Se-  
 rico palma est. Seres hoc cū vellibus suis, pel-  
 libusque mittunt. Secunda Parthico, neq; alia  
 genera ferri ex mera acie temperatur: cæteris  
 enim admisceatur. hæc Plinius. Ex quibus pa-  
 lam est, id hoc loco Plinio aciem vocari, quod  
 chalybem etiam Latini appellant, quodq; nos  
 corrupto nomine ab acie, vel ab aciendo vul-  
 gò vocamus acciaio, quemadmodum & Galli  
 acier, & Hispani aciel suo idiomate dicunt.  
 His igitur tam rationibus, tum auctoritatibus  
 freti. σίμωνα porius à σίμα, quàm à verbo σίμα  
 ortum habere putamus: quanquam etiam eor-  
 um opinio, qui à σίμα σίμωνα dictum existi-  
 mant, non sit omnino improbanda, quod id  
 verbum roborare, durum facere, aciem & mu-  
 cronem inducere Græcis designet. Sed neque  
 illos quoque prorsus aberrare crediderim, qui  
 scobem ab acie, & mucronibus, dum super la-  
 pide rotante acuuntur arma, derasun, stomoma  
 tis squamam esse censent. verumtamen hæc,  
 quod sit lapidis illius ramentis admista, non  
 perinde ac sincera probanda videtur. Squama,  
 quæ Græcis σκάμω, Latins Squama æris  
 appellatur: Italics, Squama del rame: Germanicè,  
 Kupfer schlag; Hispanis, Esquama de cobre: Gal-  
 lis Escaille de Bronze. Quæ verò Græcè σέμα  
 σίμωνα. Latine Squama stomomatis dicitur:  
 Arabicè, Tubel, Baritue sabartani, & Cortex  
 alias: Italice, Squama dello stomoma: Hispani-  
 cè, Esquama de azero, Gallis, Escaille  
 d'Acier.

Nomen.

## AERUGO RASILIS. CAP. LI.

AERUGO ROSA fit iis modis. In cadū,  
 aut aliud consimile vas, acetum quàm  
 acerrimum infunditur: superponitur  
 inde inuersum aeneum vas, præsertim  
 concameratum, sin minus, planum: sit-  
 que obstruendum, nullumque habeat spi-  
 rantium: exempto, quo doliolum  
 obturaueris, operculo, decimum post  
 diè insidens ærugo deraditur. Aut æris  
 lamina in cadis super acetū ita suspēdi-  
 tur, ne ipsum attingat, & totidem post  
 dies raditur. Aut massula æris, aut lami-  
 na vna plurifve vinaculis nō recēribus,  
 sed iā acescentibus conduntur, & simili  
 modo versantur. Quinetiā ex delinata  
 æris scobe æruginē facere licet: nec non  
 è laminis, quibus bractee auri cōclusæ  
 malleo ducuntur, si quis eas aceto res-  
 pargat, & ter aut quater verset, donec  
 æruginē contrahant. Tradunt æruginē  
 in Cy



in Cyprii metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnihil aris habentibus, quibus ærugo efflorescit: additque per Caniculæ ætus est quodam specu manare: sed illâ paucam, & optimâ esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidē, & boni coloris, sed vitiosam, quod lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulterant. aliqui pumice admisso, alij marmore, alij atramento futorio. Sed deprehēdem<sup>9</sup> pumicē, aut marmor, dū pollice sinistrae manus madefacto, æruginis portiunculam altero atterimus: siquidem eam diffundi constat: marmoris autē, pumicisque partes coeunt non dissipatæ, demūque tractatione crebra, & humoris complexu dealbescunt: quin & dentium appressu siquidē sincera cedit, lævis, & sine asperitate. Atramentum verò futuriū igne coarguitur: nāque si fictile, aut lamina adulterata æruginē illinatur & feruētī cinere, aut carbonibus incalcescat alterutrū, mutabitur, rubescētq; id, quod atramentum futuriū accepit: quod id vsum suapte natura talem sortitur colorem.

AERUGO SCOLECIA. CAP. LII.

AERUGINIS, quam vocat scoleciā, duo sunt genera. quādā fossilis est, altera factitia ad hunc modum. In mortario Cyprii æris dimidiā heminā acetī albi acrisque, pistillo cupreo conterito. donec strigimēti crassitudinem imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam vnam, cum salis fossitij translucentis, aut marini quā albißimi, solidiq; aut certē cū nitri pari pondere teritur in sole ætuoßissimis diebus, sub sydus Caniculæ, donec colorē æruginis contrahat, & concretu strigmento sum fiat: vbi autē se in vermiculorū Rhodiacis similitum speciem coegerit, recondito. Efficax, & valde boni coloris redditur, si duas partes vrinæ veteris, cū vna acetī adieceris, & alia, quæ dicta sunt, peregeris. Sunt qui æruginem rasilem,

quæ in apparatu non respondit, gummi misto digerant in formas, & ita vendant. quod genus, vt vitiosum, improbat. Fit & quādā ærugo ab aurificibus, mortario, & pistillo Cyprii æris, cū vrina pueri impubis, quæ aurum ferruminat. Antedicta æruginū genera vsto æri omnino respondent, sed magis effectū valent. Sciēdum fossilem scoleciā præstantissimam esse: derafam sequi: postremo loco factitiam. mordacissima tamen est hæc, & magis adstringēs. Aurificum autem ærugo rase respondet. Aerugines omnes adstringūt, extenuant, exalfaciunt. oculorū cicatrices emēdant, lacrymas cient, nomas sistūt, vulnera ab inflammatione tuentur: vlcera ex oleo ceraq; ad cicatricē perducunt: callos, & sordida vlcera purgant, cū melle coctæ: callum fistularum erodunt cū ammoniaco, collyrij modo in eas adaptæ. ad gingiuarū autem excrescentias, & extuberationem vtilēs. Magnopere extenuat genarum crassitiē, cū melle illitæ: verum post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est. resina terebinthina exceptæ, cū ære & nitro lepras abigunt. Vritur ærugo, quācunque velis, minutissimē fracta, cōminutāq; in fictili patina, flagrantibus prunis superposita: versaturq; donec se mutet, & colorem cinereum concipiat: postea refrigerata reponitur ad vsum. Sunt qui cruda olla eā vrant, vt dictum est: sed non proflus eūdem colorem cremata reddit.

AERUGINEM, quod colore sit viridi, officinae, ac medici in Italia æs viride nuncupant, & vulgari sermone verde rame. Verūm quāuis officinæ eo in vniuersum abundent, synceri tamen parum ostendunt. Scolecia æruginē, ac fossilem destituitur: quod altera, quod sciam, hoc tempore non paritur, altera verò ab æriis fodinis, vbi fortasse plurima reperitur, à fossoribus non deferatur. Proinde cum harum copia non sit, ea tantūm vrimur, quæ ære in acetariis cadis demisso, aut vinaceis iam accensentibus obruto, conficitur. Hallucinantur, qui credunt æruginem, & æris florem vnam, & eandem rem esse, vt superius de æris flore differentes lacius ostendimus. Aeruginum vires reddit

*Aeruginū confid.*

*Aeruginum vires ex Gal.*

reddidit Galenus libro 1 x. simplicium medicamentorum, sic inquit. Aerugo gustantibus acrem qualitatem offert, digerens, detrahens, & liquas, non teneram modò, sed & duram carnem. Porro supra dictum est nonnullos eius generis medicamenta, epulotica, hoc est, quæ cicatricem inducant, appellare, cum iis in tenuissimum polline tritis per specilli cuspidem contigerint vlcera excrefcentia, ac postmodum contracta reperiant, tamen si illos haud lateat, si paulò plus impositum foret, sese vlcus non contrahit, sed erosum inuéturos. Siquidem colligat, & digerit carnem: cum medicamenta epulotica cōtrahant, cōstipent, cōstringant, & calti in morem illam indurent. Quin & gustum mordicac ærugo, non tantum ipsa vlcera, quòd si pauculum eius cerato non paucò admisceas, id quod ex ambobus mistum est, citra morsum extergit. Dictum verò supra est de talium medicamentorum natura, tum vt sese quidam fallunt ex talibus compositionibus, aut sarcopticam, aut epuloticam adferentem facultatem medicamentis, quibus minime oportet vt. pore cum ipsa id præstare nequeant, verum ea, quæ ex ipsis composita sunt. Quæ ærugo *in p. f. v. s. y.* Græcis, Aerugo rasilis Latinis dicitur: Italis, Erugine rasilè. Gallis Verd de gris. Quæ verò Græcis *in e. u. a. h. s. y.* Latinis Aerugo scolécia nominatur: Italis, Erugine scolécia. Arabibus, Zinnar, seu Zengiar: Germanis, Spangruen: Hispanis, Cardemillo: Gallis, Verd de gris Scolécien, & Verdet.

Nomina.

## RUBIGO FERRI. CAP. LIII.

RUBIGO ferre restringit: sistit scæminarum profluuiam admodum, potuq; præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perquam utilis ad scabritias genarum, reduuias, & pterygia. Condylomatosis prodest, gingiuas firmat, podagrae illita lenit, alopecias replet. Vinu aquaue, in qua cadens ferrum sit restinctum, potu celiacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur.

## STERCUS FERRI. CAP. LIIII.

STERCUS ferri, quam scoriam vocant, eadè potest, quæ rubigo, sed inefficacius. Aconito ex acetomulso potum, opitulatur.

Rubigo ferri, quæ est ferri rubigo, vulgaris notitiæ est. Eius similiter scoriam, quæ Latinis & Stercus, & recrementum ferri, & nostris vulgò spuma di ferro appellatur, omnibus notior

est, quam vt maiore indigeat declaratione. hæc namq; prope ferrarias officinas passim in aeruum congesta spectatur ab omnibus. Verumtamen ne aliquis fortasse decipiat, illud nobis indicium non abibit, quòd ferri, aut æris, aut argenti scoriam non est squama, quæ malleo decutitur. Siquidem hæc ferraris fornacibus, quibus ferri metallum funditur, indurata liquefit, & iterum in ferrum coit. Scoriam verò, quòd inutile sit ferri recrementum, inane, & spongiorum modo spumofum, nunquam ferrum effici potest. Scoriam meminit Galenus libro 1 x. *Scoria C. l. res ex C. l. leno.* simplicium medicamentorum, sic inquit. Scoriam omnis resicatoria admodum medicamentum est, potissimum autem ferri. Siquidem læuiorem redigens ipsam in aceto quam acerri-  
mo, posteaque decoquens, ad aures, quæ longo iam tempore pure fluxerunt, ea vtor, medicamento maxime exicatorio, adde vt mirentur, qui præparantem me vident, & ante rei periculum fidem non habent, aures talè posse ferre medicamentum. Porro argenti scoriam propriè helcysina appellant. Verum emplastris quibusdam resicatoria facultatis com miscetur. Rubigo ferri Latinis dicta, *in e. u. a. h. s. y.* Græcis appellatur: Arabibus, Seda alhadid: Italis, Ruggine del ferro: Germanis, Eysen rauf: Gallis, Ruisseure de fer. Quæ verò Græcis *in e. u. a. h. s. y.* dicitur, Latinis, Scoriam, Stercus & Recrementum ferri dicitur: Arabibus, Chab alhadid: Italis, Spuma di ferro: Germanis, Schalken: Hispanis, Mozo de herrera, & Mozo de fragua, Gallis verò Mache-fer, vel Merde-fer.

Nomina.

## PLUMBVM ELIOTVM. CAP. LV.

LOTURA plumbi sic fit. In mortarium plumbeum aquam iniciens, pistillo plúbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassefcat, aut lutulenta reddatur: linteo deinde colato, aquam superinfundens, quòd facilius quicquid est resolutum incerni possit. hoc iteru facito vsq; dum satis tibi habuisse videatur. vbi confederit priore aqua effusa, nouam adiciens, vt cadmiam lauato, donec nulla extet nigritia: postea in pastillos cogens reponito. Quidam scobem mundi plumbi lima quæstram mortariopistillòq; lapideis terunt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat: mox vbi id pessum ierit, effusa aqua, colligunt in pastillos. nam tritum vehementer, cerussæ simile redditur. Alij climata scobi modicâ plumbaginem diutius, affirmantes ita clotum plumbum præstantius esse.

Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, explere caua, fistere oculorum fluxiones, & ulcerum excrescētia. Sanguinem supprimit: prodest cōtra se dis vlcera, condylomata, & hamorrhoidas, ex rosaceo item ad ea, quæ ægrè cicatricem ducunt: & in totum spodij effectus præbet, nisi quòd nō obducit cru-  
 10 stas. Sincerum plumbū affrictu, marini scorpionis, draconisq; plagis auxiliatur.

PLUMBVM VSTVM. CAP. LVII.

VRITVR plumbum sic. Super quàm tenuissimas plumbi laminas, fictili no-  
 uo inditas, sulphur in spargito: additisq; aliis rursus laminis, interiecto semper  
 20 sulphure, vsquedum vas expleueris, succendito. flagrans autem plumbo, ferrea rude versato, donec perfectè redigatur in cinerem, nihilquæ è plumbo non vstum hæserit. tum demum obstru-  
 ctis naribus eximito: alioquin halitus plumbi noxius sentitur. Aut elimatam  
 plumbi scobem in olla sulphure vrito. Alij laminas in fictili crudo, vt dictum  
 30 est, imponūt fornaci, aut foco, & circum linentes operculū, dato exili spiramēto, vrunt. Alij pro sulphure cerussam, aut hordeum in spargunt. Alij integras laminas imponētes, acri igne vtuntur,  
 & rudicula ferrea cōtinuè mouēt, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis hu-  
 iusmodi vstio, & si vehemētius vratur, contrahit spumæ argenti colorem. Ma-  
 40 gis tamen nobis placet prima vrendi ratio. Plumbū vstum lauatur vt cadmia, & reconditur. Eosdem effectus habet, quos plumbū elorū, sed multò acriores.

RECREMENTVM PLUMBI.  
 CAP. LVIII.

RECREMENTVM plumbi, quod scoriam vocant, optimum est, densum, fractu contumax, cerussam planè repræ-  
 sentans, nihil plumbofi habēs, quod ad luteum colorem accedit, & vitri splendorem imitatur. Eadē, quæ plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortariis infusa aqua, & re-  
 50 fusa summa aquæ parte, quæ luteū co-

lorem duxit: idquæ sæpius, dum recrementum absumatur. Dein vbi conserit crassamentum, aqua effusa, digerit in pastillos.

MOLYBDOIDES, SIVE LAPIS PLUMBARIUS.  
 CAP. LVIII.

MOLYBDOIDES lapis à plumbi similitudine dictus, respondentem recre-  
 mētō vim habet, & eodē modo lauatur.

PLUMBI abluendi, atque etiam combu-  
 rendi ratio, adeò lucidè constat à Dioscoride prodita, vt operæ pretium non sit plura de ea  
 10 referre. Veruntamen animaduertendum est, plumbi recrementum, quod Dioscoridi scoriam vocatur, non esse plumbaginem, quæ excrementi instar, vbi plumbum igne liquefit, ab eo  
 20 secedit. Quippe quòd hæc nil aliud sit, quàm purissimum plumbum, quod ignis visione, cineris speciè induit. Hæc enim in plumbariis officinis in purissimum plumbum facillè redigitur, quemadmodum & argenti spuma. Plumbi itaq; scoriam fit tantum in fornacibus, vbi plumbi lapis metallicus funditur. Siquidem hoc probè  
 30 iusto, artifices plumbum, quod inde effluxit in scrobiculam extra fornacem delabi sinunt. Vbi verò adhuc calens concreuit, aqua frigida perfunditur, quousq; scoriam exeat: quæ (vt Dioscorides inquit) densa admodū est, & fractu contumax, colore in luteū vergente, & vitri splendorem præ se ferens. Huius complures vidimus  
 40 acervos in Tridentino agro, ac etiā in comitatu Tirolensī, vbi innumere metallorum fornaces, die noctiquæ ignibus aguntur. namq; in iis locis metallorum recrementum, extra officinas abiciunt, monticulos ex his struentes. Quod si acciderat metallicos lapides ægrè igne in fornace  
 50 liquefcere, scoriam huiusce partem admiscunt, quoniam huius admisculo citius merella ignibus cedunt. Reperi ego sæpius plumbi, argentiq; scoriam adeò versicoloribus lineis intermixtam, pellucidamq; vt id vitri genus, quod vulgò Venetiis appellant Smalto, omni ex parte  
 60 referret. Quare oportet eos, quibus in animo est certā & exquisitam harū rerum cognitionem atsequi, metallorum fodinas, & fornaces adire, non autem ea in pharmacopoliis querere, vbi omnia ferè metallica medicamenta spuria, & adulteris vitia reperiuntur. Ceterum qui Lapidem plumbarium, siue molybdoidem hæc  
 70 die legitimè ostēdat, habeo profectò neminem, nisi fortè fossilis quoddam cadmiæ genus demonstrent, quod plumbum colore imitetur, qualis illa, quam vulgò vocant Marghefita disagno: quanquam hæc equidē molybdoidem esse nō  
 80 ausim affirmare, quòd nullum latius Molybdois dis historiam scriptis mandasse comperim, quàm  
 90

Scoria plumbi confid.

Lapidis plumbarii confid.

*Plumbi fa-  
cultates ex  
Galeno.*

quam ipse fecerit Dioscorides. qui tamen eius historiam tam paucis perstrinxit, ut difficile admodum sit decernere, quinam lapis nobis legitimam molybdoem repræsentet. Esi fortasse non aberrarent, qui dicerent, plumbi lapidem ignem in formicibus non expertum, veram esse molybdoem. quippe quod hic colore, & pondere plumbum maxime referat. De plumbio diffusis facis differuit Galenus libro 1 x. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Plumbum facultatis est refrigeratoriæ. Si quidem non modo multam habet substantiam humidam à frigore congelatam, sed & æream, paucam autem terream. Igitur quod plurimum habet essentia humidæ à frigore coactæ, indicium tibi esto, quod ubi admotum est igni, celeriter fundatur, fluatque. Quod verò & æræ sit particeps, hoc habeto signum omnium, quæ nouimus, vnicum plumbum tum mole ipsa, tum pondere augeatur, si condatur in ædibus subterraneis, ærem habentibus turbidam, ita ut quæcumque illic ponatur, celeriter situm colligant. Tum etiam plumbea statuarum vincula, quibus earum pedes annectuntur, sæpe numero creuisse visum est, & quædam ad eum intumuisse, ut ex lapidibus deperderent crystalli modo. Atque hæc probabiles quidem sunt humiditatis eius, frigiditatisque notæ, priusquam experimentum fiat: ceterum scientificæ, & certæ per experientiam cognoscuntur. Preparato igitur mortario, simulque pistillo, utrisque ex plumbio, infunde quemlibet liquorem: itaque merito, ut & pistillus, & plumbum mortarium succum quandam reddant. Id quod ex utroque consistat, multo erit frigidius facultate, quam liquor ipse fuerat. Licet autem & aquam, & vinum tenue æquum, & olei inmiscere, aut quidvis eiusmodi. At si etiam plus efficere succum volēs refrigeratorium, oleum omphacinum sit, aut rosaceum, aut melinum, aut myrrinum. Porro si succo, qui proveniet, uti volēs, optimum habebis remedium & ad phlegmonas in sede cum vlcere, aut rugis, & ad eas, quæ in pudendis, testibusque, & vberibus consistunt: similiter aduersus cæteras omnes fluxiones incipientes, quæ aut in inguinæ, aut in pedes, aut in alium quemvis articulum decumbunt. Sed & vlcerebus rebellibus vtile est. Nam & ad cancerosa eo utens, virtutem medicamenti mirabere. Quod si celeriter multum plumbei succi colligere volēs, conare in sole terere, aut quocunque certè modo ære exalciato. Ad multa autem vtile habebis medicamentum, si adfuso refrigerantium succorum quopiam teras, cum temperulæ, coryledonis, intybi, lactuæ, chondryllæ, psyllij, omphacis, portulacæ. Porro si qua horum non facile in succum soluuntur, velut portulaca, misceito illis aliorum succorum quempiam, velut omphacis, qui & ipse per sese prædicto mortario inditus, medicamentum efficit refrigeratorium longe pulcherrimum. Quin & in famigam diductum plumbum abiq; alio vilo, ipsum

per sese athletarum sese exercitantium lumbis instauratur, ubi veneris somniis vexantur scilicet: nimirum haud obstruere eos refrigerans. Sed & bractea ex plumbio tenuis facta, probè ganglio illigata, planè ipsum dissipat. Illigabit autem probè quisquis ab Hippocrate didicerit, in ipsam noxam potius firmandum, quam hinc vel inde. Mirum ergo non est, si plumbum crematum, ac rursus ablutum, refrigerantis efficiatur facultatis, cum ante lotionem misce fuerit. Et hoc ipsum medicamen, nempe plumbum combustum, bonum est ad vlcera rebellia. Vbi verò lotum fuerit multo optimum medicamentum est, & ad vlcerum impletionem, & ad eadem cicatrice obducenda. Conuenit & chirones quæ vocant vlcerebus, & cancerosis omnibus, & putredinosis, tum ipsum per sese, tum medicamentum ad cicatricem perducunt quibuscum commixtum, quale est, quod ex cadmia conficitur. Ceterum solendum est principio, si copiosè sit sanies, quoridie sin minus tertio, aut quarto quoque die. Verum fortis spongiam imposito aquæ frigidæ, quæ si deficeat, rursus mergatur. Sed hæc suffus, quam pro instituto diximus, plussculum sermonis assinitate prouecti. At tempus iam est sequentia deinceps persequi, hæcenus Galenus. Plumbum elorum sic Latinis, *πρόλυδο* maxime Græcis dicitur: Italis, *Piombo* lauto. Plumbum verò vltum Latine dictum, *πρόλυδο* maxime Græcè, *Piombo* abruccato Italicè vocatur. Quæ deinde *πρόλυδο* maxime Græcis, Latinis Plumbi recrementum, & plumbi scoria appellatur: Italis, *Spiuma del piombo*. Quæ denique *πρόλυδο* Græcè, *Molybdoides* item, & *Lapis plumbarius* Latine nuncupatur: Italicè, *Pietra piombaria*.

STIBIVM.

CAP. LIX.

STIBI optimum, quod splendissimum est, modoque nitedularum emicat, contractu crustosum, nihil teræ, aut fordidis habens, friabile, quod stibi appellant, alij platyophthalmon. Vis eius adstringere, meatus obstruere, refrigerare, excrescentia in carne cohibere, vlcera ad cicatricem perducere, fordes, & vlcera oculorum expurgare: sistit & sanguinem è cerebri membrana profluentem, & ut in vniuersum dicatur, vis vltio plumbio similis est. Priuatum, ambusta igni in pustulas crumpere non patitur, cum adipe recenti illitum. crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cera, & exigua cerussa. Torretur pinfita farina circumlitum, & carbonibus obru-

tum, donec carbunculetur crusta, exemptumque restinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut vetere vino. Vritur etiam carbonibus succensis efflatum, quoad igni deflagret: si enim paulò magis concremetur, plumbum fit. Lauatur vt cadmia, & æs. Sunt qui vt plumbi recrementum eluant.

*Sibij consideratio.*

STIMMI, siue Sibium, recentioribus medicis, chymistis, ac seplasiarum, qui Mauritiorum doctrinam sectantur, Antimonium dicitur, quòd hoc nomine Serapio, & Auicenna Seibium appellauerint. Huius fodinæ pluribus locis habentur in nostro Senensi agro, sed præstantissimum foditur in maritimis nostris Massino solo, ac Susensii quintetiam in comitatu sanctæ Floræ prope Sydenam oppidum. Venetias adfertur ex Germania, fornacibus prius sumum, & in massas concreturum. Aiuunt artifices, qui campanas constant, has edere sonitum magis, concinnum, magisque auribus gratum, ac sonorum, si sibij nonnihil cæteris admisceatur metallis, dum vna in fornace liquantur. His etiam expetitur, qui vasa è stagno consuecunt: item iis, qui metallica faciunt, & possunt speculariis præterea, qui chalcographis characteres, & typos effingunt. Id tantum differentie esse inter plumbum, & sibium ait Brasauolus Ferrariensis, quòd plumbum ignium vi leuescat, sibium verò nunquam, sed facili teratur in puluerem. Sed eius opinionem falsam esse deprehendit experimentum, quandoquidem sibium igni admotum, perinde ac plumbum colliquefcit, & fluit. Cuius rei nos sæpius periculum fecimus, dum oleum nostrum ex sibio consuecimus, quo quidem magno successu vinum ad contumacia, sinuosi que vlcera sananda. ad id siquidem sibium plures fundere oportet, vt sincerius, puriusque reddatur. Cæterum admonitos lectores volumus, oleum hoc nostrum è sibio paratum, non illud esse, quo chymistæ argentum in aurum mutari fabulantur, sed aliud ab eo longè diuersum: tamen hoc nostrum ex se se pæuri fundat, quam illud chymistarum. Sed vt ad institutum nostrum reuertamur, mihi planè vanum videtur asserere sibium igne haudquaquam liquefcere. Nam cum quolibet metallo, siue ferrum sit, siue chalybs, in sibio fusorio permixtum, ea celerius eliquandi præbet materiam. Quam ob causam qui ferreos, sphericosque globos bombardis immittendos è fuso ferro conformant, nisi sibium ferro admiscerent, nunquam sanè (vt pro certo affirmant) id fluxum facerent. Sibij mentionem fecit Plinius libro x x x i i. capite v. i. vbi ita scribit. In iisdem argenti metallis inuenitur, vt prope dicamus, spumæ lapidis candidæ, nirentisq;

*Brasauoli citatio.*

non tamen transuolentis, stimmi appellant, alij sibium, alij alabastrum, alij iarbafon. Duo eius

genera, mas, & fœmina. magis probant fœminam. Horridior est mas, scabriorque, & minus ponderosus, minùque radians, & areosior. Fœmina contrà nitet, friabilis, fissurisque non globis dehiscens, hætenus Plinius. Sibij vires retulit Galenus libro x. simplicium medicamentorum, his verbis. Stimmi ad faciliorem desiccantem adiunctam habet hoc medicamentum adstrictionem: quamobrem & oculatibus medicinis commiscetur, & illis scilicet, quæ conformantur in collirijs quæ vocant, & fecis, quæ vtique sicca collirijs cognominant. Hæc Galenus. Cæterum sibium vim destrictoriam fortiter præstantissimam: quanquam nullus (quod ego sciam) antiquorum, neque recentiorum, præter vnum Theophrastum Paracelsum, hoc liberis memoriæq; mandauit. Quare non equidem grauabor in studiofiorum gratiam hæc commemorare de huius medicamenti viribus, quæ vidi, atque etiam à medicis quibusdam fide dignis accepti. Etenim Andreas Gallus medicus Tridentinus, qui iandudum honoratissime medicinam facit Serenissimum Ferdinando Archiduci Austria, apud quem me nunc collegam habet, ex multis vigilijs magnique laboribus, quos in studia & seruitium insumpserat, inciderrat in malam valetudinem, nempe in pulmonum, cordis, & ventriculi inflammationem: vnde vehemens admodum sitis consequebatur, quo nullo quidem potu extingui poterat. Præterea epiglottidis tumore, & tanta palati siccitate vexabatur, vt vix loqui posset. Quinetiam cordis palpitacionem patiebatur adeò magnam, vt nocte repente expergefactus putaret per cubiculum aliquem obambulasse. His deniq; malis accesserat capitis distillatio, à qua sæpius suffocari metuebat. Porro metum mortis augebant vires, quæ tot morbis quasi hostibus obfessæ, faciliè poterant deficere & opprimi, ex eo præsertim quòd nullus esset cibus, qui appetitum languescentem excitaret, atque ita vires insisteret, vel saltem conseruaret. Addam quòd os & guttur eius sapore retrum & carbonibus sumi lem reddebant, quæ sanè omnia dictæ inflammationis erant indicium non obscurem. Cum igitur res sua per aliquot dies ita se haberet, atq; in maximo vericaretur discrimine, neque vllum perciperet leuamentum suum ægitudine ex multis medicinis factis, ad Sibium, quod Mauriani Antimonium vocant me resciente, confugit: quoniam sæpe iudicauerat medicamentum hoc sibi mirificè commendatum fuisse à Georgio Hansdeshio medico familiari suo, qui illius experimentum fecerat in morbis difficillimis. Hæc itaque ratione ductus Sibij in tenuissimū puluerè redacti, & rhodofacchari exiguo admixti, tria tantum grana sumpsi, atque paruo post temporis spatio sensie medicamentum illud ventriculi subuersionem moliri, ac leuem quandam calorem excitare. Mox erupit vomitus, quo solam quassā cibi particulas reiecit, etiam superiore die non cœnasset. Hunc paulò post alius secutus est vomitus

*Sibij vires ex Galeno.*

*Sibij vim destrictoriam.*

est vomitus similis: cui succedit bilis flauæ reiectione ad vnciarum ferè quatuor pondus. Hæc autem omnia eueniunt horæ tantum dimidiæ spatio. Ex quibus nimirum illud cepit iuuamenti, quod flauis omnis ventriculi labor sedatus est. Ex eo verò quod hora post ter biliosa infernè excreuit, in quibus crassa quædam residebat (hæc simul duarum librarum pondus æquare poterant) factum est, vt ab illa cordis palpitacione, capitis fluxione, & epiglottidis tumore statim sit liberatus, qui præterea neq; sitim molestam habuit, neq; cibi fastidium perpesus est. Quamobrem si corporis salutem ipsamq; vitam in tot morbis deploratam, Deo primùm, deinde huic medicamento acceptam restitit. Alium quoque Stibij intus assumpti effectum silencio non dissimulandum nisi narrat idem Georgius Hantschius, cuius superius meminì. Is enim cum esset pestilentia correptus, ob idque maxima totius corporis imbecillitate affectus, cordis tremore, spirandi difficultate, capitis dolore, & sinistri inguinis abcessu, circa noctis crepusculū Stibij rhodofaccharo admixti tria grana fumpsit. atque post horæ dimidium vomitionibus refecti magnam pituitæ, bilisq; tum flauæ tum porraceæ quantitatem, cum prospero admodum successu. Siquidem ex vomitu (sic ille dicebat) flauis sublata est spirandi difficultas, ac cordis tremor cessauit. Vomitus deinde subsequens est copiosus alui deiectione sine ulla agrotationis molestia. post quam reliqua pestis symptomata prorsus euenerunt, atque adeo breui is fuit integræ sanitati restitutus. Id quod etiam aliis contigisse scio, qui hoc admirabili medicamento sunt vsi. Præterea Stibium opiculatur omnibus in vniuersum morbis, quos atra bilis excitauit, tisq; præsertim qui hypochondriacam obtinent inflationem. equidem vidi Præz Bohemorum parochum, qui melancholicus factus planè desipiebat, multaq; stulte loquebatur. Huic sanè exhibitum fuit Stibium granorum duodecim pondus: quod paulò post copiose at: am bile per aluum eduxit, cui erant admixta (vt ego, qui vidi vocatus tanquam ad miraculum, testari possum) ramenta veluti carnis, quæ magno varices in particulis d'fectos præ se ferebant. namq; excrementa illa sanguinem nigerimum representabant potius, quam vllum ex aliis humoribus. Hoc vtiq; illi tantam opem tulit, quod postera die visus est bellè pristina mentis suæ sanitate recuperasse. Et quoniam is erat corpore robusto, & animo forti, ideo non est mirum, si facile & sine vllò incommodo tulerit tantam illius medicamenti quantitatem. quæquam auidæ nimis fortè habendus est ille, qui eam exhibuit. Datur etiam Stibium vtilissimè diuturna febre consumptis, & iis qui spirandi difficultate laborant, præsertim asthmaticis. Prodest item conuulsis, & febribus, vternosis, resolutis, & iis qui post dolore cruciantur. Cæterum sunt qui asserunt Stibium sumptum non secus humana corpora ab omnibus

excrementis expurgare, atq; idè reliqua omnia metalli, instumentaq; metallica, quibus addicitur, ab omni sorde purificare. Atqui in eius exhibitioe diligenter animaduertere oportet, vt illud quod exhibetur, sit præparatum. Hinc ob causam nos hic eius parandi rationem subiciemus. Eligito Stibium optimum, quod (vt Dioscorides tradidit) splendidissimum est, modòque nitedularum emicat, contractu crassum, friabile, nihil terræ aut forididi habens. Id primùm in puluerem facto: deinde in fictile vas, quod amplum sit conuicito: tum denum carbonibus succensis ad calcinandum (vt chymlarum verbo vtar) subdio exposito atq; interim cochleari ferreo continè moueto. Hoc verò dum sit, fumus exhalat tenuis, sulphur & auripigmentum redolens, qui si ore attrahatur, crebras interdum (vt audio) excitat vomitiones. quapropter qui versant, ventis terga opponunt. Versare autem assidue expediet: nam si paulisper cesses, vel comburitur Stibium, vel liquefit, atq; iterum coalescit in glebas. Vix tamen fieri potest, etsi perpetuò verset, quin aliquæ partæ glebæ concreuant. quas cum videris, sublato ab igne fictili, quod concreuit, rursus in puluerem redigito, atque eidem fictili impositum carbonibus reddito, assidueq; versato. Id quod toties repetendum est, quoties coalescentes glebæ polluerantur. Ita quoque tandiu versare conuenit, quoad corpusculum illa, quæ emicant, splendorem suum amiserint, vapor omnis cessauerit, foetor obsoleuerit, & Stibium in calcem conuersum subalbicantis cineris colorem contraxerit. perfecti autem operis signum erit, si prunis ardentibus inspersatur, nihilq; prorsus fumi emittat. Post hæc sumito huiusce calces, exempli gratia, libram mediet: sibiij eadē, hoc est, non calcinati, vnciam: chrysocolle factitiæ, semunciam. Deinde chrysocollem & stibium terito in tenuem puluerē. Mox omnia simul misceto, atque in fictili fusorio, quo vntur aurifices, igni vehementi admocto: vas super laterem prius collocatum, carbonibus accensis circumdato. Veruntamen operæ pretium est in hoc magnam adhibere diligentiam, ne res illæ comburantur. Quocirca habenda est rudicula ferrea, & cum vas fictile candefierit, ea immissa, an Stibium liqueat, periculum faciendum est. nam si rudicula aliquid hæserit, certum liquefactionis erit indicium. Hoc cum videris, statim à rude illud quod hæret, abraddito. Id autem primùm esse toler coloris pallidi. Sed paulò post eodem experimento vtendum est, idque repetendum, vsque dum illius, quod abraditur, color appareat flauus, viuidior ac pellucens. Quæ res perfecta nulla est trahenda mora, sed statim vase ab igne exempto cum forcipe ignario, res liquefactæ sunt super lapidem porphyreum vel marmoreum guttatim proliciendæ. quamprimùm enim concreuerint in lapillos, qui colore & nitore chrysoprios, atque etiam nonnunquam granatos referunt.

preparatio

refertur. Hos autem repones in vsum, & cum  
is val volueris, in pulverem redigito, datoque  
arum vel quatuor granorum pondere id tamē  
pōdus in robustioribus nonnihil augeri potest.  
Stibium ita præparatum commodissime admi-  
fctetur rhodofaccharo, cui etiam modicis  
modicum adicitur. Atque hæcenus de Stibij non  
vulgari efficacia ac præparatione: quæ equidem  
omnia (vt ingenue fatear) in primis debeo An-  
dree Gallo viro clarissimo, cuius supramen-  
tionem feci. Stibium quod Latinis, *stibium* Græ-  
cis vocatur *στίβιον*, Aitmad, seu Aitmad:  
Ital. Stibio, & Anrimonio: Germanis, *Spey-  
szglasen*, & *Rohspytel glas*: Hispanis, *Piedra  
de alcohol*, Galis *Antimoine*.

Nomina.

MOLYBDAENA, SEV PLYM-  
BAGO. CAP. IX.

MOLYBDAENA optima est flaua,  
argenteæ spumæ æmula, modicè splen-  
dens, cum teritur rufa, cocta cum oleo  
iecinoris colore trahit. Vtiosa est, quæ  
aërem, aut colorem plumbum refert.  
Gignitur ex auro, & argento. Est etiam  
quædam fossilis, ad Sebastiam, & Cory  
cum inuenta. Quo in genere probatur,  
quæ lapidosa non sit, aut recremetosa,  
sed nitens, & flaua. Vim habet spumæ  
argenti, aut recremento plumbi simi-  
lem. Vritur, lauatürque eodem modo.  
Mifcetur cōuenientissimè medicamen-  
tis, quæ liparas vocant, atq; emplastris  
minimè mordētibus. Carnem recreat,  
& vlcera ad cicatricem perducit: gluti-  
nantibus tamen medicamentis, aut ab-  
stergentibus non conuenit.

Molybda-  
na confid.

MOLYBDAENA, vt Dioscorides testatum  
reliquit, facitior est, & fossilis. Facitior fit  
in fornacibus, vbi auri, & argenti metallum  
funditur. quandoquidem vbi auri, vel argenti ve-  
na, siue materia, plumbi tantum sibi admittit  
non habet, quantum ad eius liqutionem mo-  
lendam facis esset, qui operi præfunt, aut la-  
pidem, a quo plumbum elicitur, aut plumbum  
ipsum superaddunt: quod tamen ignium vi par-  
tem cum admittit metallis: cōt, partim verò ar-  
genti spumæ modo fornacis folio coheret, &  
in molybdænam vertitur. Hoc itaq; cum probe  
nouisset Plinius, lib. x x x i i i i. cap. x v i.  
de hac Molybdæna differuit iis verbis. Plumbi  
nigri origo duplex est: aut enim è sua provenit  
vena, nec quicquid aliud ex se pariat: aut cū argē-  
to nascitur, mistisq; venis conficitur. Eius, qui  
primus fuit in fornacibus liquor, syncerū ap-  
pellatur: plumbum: qui secundus, argentū, qui re-  
manfit in fornacibus, galena, quæ portio est ter-  
cia addita venæ. Hæc rursus cōflata dat nigrum

plumbum, deductis partibus duabus. Idē præ-  
bet argenti spuma, quæ Græcis lithargyros di-  
citur. hæcenus Plinius. quamobrem facile af-  
serere ausim, nil aliud esse Molybdænam, quàm  
lithargyri speciem, quæ postquam è fornace  
fluxere metella, in ipsius fornacis fundo con-  
creta, perustaq; residet. Proinde non ab re di-  
xisse videtur Galenus, quod Molybdæna iisdem  
posset viribus, quibus & argenti spuma. Quæ  
autem in terræ visceribus fossilis nascitur, nil  
aliud sanè fuerit, meo iudicio, quàm metallus  
ille lapis, qui plumbum, & argentum simul con-  
tinet. Hunc equidem tellari possum varia se  
facie ostendi: quippe quod alius sit colore lu-  
teo, alius cinereo, alius verò scintillans cerna-  
tur, atque nitorem præ se ferens, pro variis,  
ac diuersis terræ vaporibus, qui in metallis la-  
pides feruntur. Quod autem eiusmodi sit Mo-  
lybdæna fossilis, testis est Plinius lib. x x x i i i i.  
cap. x v i i. vbi sic inquit. Est & Molybdæna,  
quæ alibi galenam vocamus, plumbi, & argen-  
ti vena communis. Et lib. x x x i i i. cap. v i.  
ita scribit. Argenti metallum terra est, adia rufa,  
alia cinerea. Excoqui nō potest, nisi cum plum-  
bo nigro, aut cum vena plumbi, quam galenam  
vocant. hæc Plinius. Ceterum palam est, mo-  
lybdænam facitiam nihil à lithargyrio differre.  
Hoc non latuisset Galenum, eius verba decla-  
rant libro i x. simp. medic. dum ait. Molybdæ-  
na similem lithargyro vim possidet, tantum à  
media temperie ad frigidum paululum quid  
recedens. Sed nec abstergentis facultatis est  
particeps. Vtræque autem hæc medicamina li-  
quari possunt: ac non vt lapides, & cadmia, &  
arena liqutione respuant, sed celerrimè liqua-  
tur, vbi oleo additum nonnihil aceti est: li-  
quantur tamen etiam admixta aqua, sed diutissi-  
ma coctione. Porro ceu in Cypro cadmiam,  
quæ in montibus, & riuus nascitur accipiebam,  
quæ ipsa lapidis, vt dixi, species est, ad eun-  
dem modum molybdænam multam, cum alia  
proiectam lapidibus conspexi in via, quæ ad  
Ergasteria ducit à Pergamo. Vocatur autem Er-  
gasteria pagus quidam, in quo & metalla sunt  
intet Cyzicum, & Pergamum quadringentis, &  
quadraginta stadiis distans à Pergamo. *Molybda-  
na* sic Græcè, vt etiam Molybdæna Latine dici-  
tur: Italicè, Piembagine.

Molybda-  
na viret  
ex Gal.

Nomina.

ARGENTI RECREMENTUM.  
CAPVT LXI.

RECREMENTUM argenti, quod  
scoriam vocant, aut helycima, aut en-  
cauma, molybdæna vim habet. Qua-  
re emplastris, quas phazas appellant,  
additur, ac medicamentis, quæ cica-  
tricem obducunt, vt pote cum adstrin-  
gat, extrahatque.

COMPLURES argenti scoriz acervi, *Argenti  
scoriz* quam vulgò Loppa vocant artifices, extra-  
ria confid.  
fornacum

fornacum domos vifuntur in agro Tridentino prope Perzenum, & Lauifum, & in comitatu Tirolenfi, vbi perpetuo argenti metallum in fornacibus vritur, vt in precedentibus diximus de plumbi fcoria differentes. Facie hæc vitrum, quod Veneti ab inditis quibufdam vulgo Smalto dicunt, adeo refert, vt perdifficile fit alterum ab altera dignoscere. Variis hæc coloribus confpicitur, pro admittorum (vt opinor) follium varietate. nigricat tamen cum plurimum, & quibufdam exaratur lineis cum æruleis, tum etiam viridibus. Nec deest etiam quæ viridi tantum, & quæ folium æruleo fpectetur colore. Huic vires reddidit Galenus libro 1 x. fimplicium medicamentorum, his verbis. Argenti fcoriam propriè helesymam appellant. Emplaftris quibufdam refecatoriz facultatis commifceatur. Quod Latinis Argenti recrementum, Græcis ἀργύρου σκωρία vocatur: Italis, Scoria dell'argento: Gallis Efcume d'argent.

*Vires ex Galeno.*

*Stemma.*

## SPUMA ARGENTÆ.

## CAPV XLII.

SPUMA argenti quædam gignitur ex arena, quam molybdirin vocant, in fornacibus cõflata, donec perfectè igni incandefcat: altera ex argento: tertiã ex plumbo. Probatiſſima eſt Attica: ſecunda Hiſpanienſis: hæc ſequitur, quæ fit Dicaarchiz, ideſt Puteolis, Baſis, in Campania, & Sicilia. plurima enim hæc locis eſt flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ ſtauo colore ſplendet, chryſitis appellatur, omnium optima: quæ in Sicilia, argyritis: quæ ex argento, calabritis. Vis autem adſtringere, mollire, explere caua, excreſcentia in carne reprimere, ad cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur argenti ſpuma, confractis partibus ad magnitudinem iuglandium prunæ ſuperpoſitis: ita accenſa ſollibus, vt conflagret, abſtergitur inſidens ſpurcitia, & reconditur. Aliqui ter aceto, aut vino reſtingentes, rurfus vrunt, & eadem proſecuti, reponunt. Lauatur vt cadmia. Vt argyritidi nominata, aut, ſi deſideretur, alteri candor detur, ea in partes magnitudine fabarum confracta, chœnicis Atticæ menſura, fictili nouo ſuperfuſa aqua, addito candidi tritici pari pondere, priuatimque pugillo

hordei, linteolo puro, raro, anſulis vaſis alligato, coquitur, donec hordeum fractum diſſiliat. deinde omnia in nouum craterem oris æaspli tranſfunduntur: triticum abicitur, ſpuma argenti vehementer manibus affricando, inſuſa aqua lauatur, aſſiccataque in Thebaico mortario teritur, affuſa ſeruente aqua, donec ſoluta fatiſcat. Excolata aqua, iterum tota die teritur, & veſperi inſuſa calida aqua ſinitur: mane colis excernitur, alia inſunditur, atque ter die excolatur. Id ſeptem diebus minas ſpumæ argenti, quinis ſalis foſſilis drachmis, inſuſa que calida aqua, ter die teritur, & addita aqua excolatur: cumque inalbuerit, calida inſuſa, idem facit, dum nullam prorsus ſalfedinem reſcipiat. demum ardentiffimo ſole ſiccata, ciccto prius humore reconditur. Sin minus mina ſpumæ argyritidis diligenter teritur, addito ſale foſſili trito, triplicato pondere, in fictile nouum conicitur, aqua inſunditur, ita vt ſupereminet: mouetur quotique mane & veſperi, aquaque ſuperinſunditur, priore nequaquam effuſa. hoc fit triginta diebus: nanque niſi moueatur, craſſeſcit vſque ad duritiem reſt. Poſt hæc effuſa leniter muria, in Thebaico mortario ſpuma argenti teritur, coniectaque in fictile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata ſubinde aqua, donec nullum ſalfuginis indicium præbeat. deinde quod ex argenti ſpuma candidum apparer, in vaſ aliud tranſfertur, & redactum in paſtillos, plumbæ pyxide conditur. Alij ſpumam argenti in fabarum magnitudines confractam, in ventre ſuiſto crudo ex aqua coquant, dum viſcus eliqueſcens contabefcat, exemptamque cum ſale pariterunt, & vt ſuprà dictum eſt lauant. Sent qui ſalis libram vnã, & ſpumæ argenti tantundem, in ſole terant, aqua continuè mutata, dum candor ei detur. Alia ratio. Sumito quantam vis argenti ſpumam: vbi lana candida inuolueris, fictili



ficili nouo indita aqua, cum pugilio fabarum recentium, repurgatarumque decoquito: cumque fabæ disrupsæ dehiscant, lanæque non denigretur, exemplam argenti spumam, & altera lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquæ, & parem fabarum modum adiciens. eadem tertio, quæ suprà, facito: in summa tantisper, dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortarium, ad singulas salis fossitij libras, adicio octogenas spumæ argenti drachmas Atticæ, & terito: intermitensq; nitri quàm albissimi cum aqua diluti drachmas quadraginta septem indito: iterum terito, donec satis candoris contraxisse videatur. Ita autem fundens eam ex alto in ficitile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi considerare desierit, colato: tum nouam superadiiciens aquam, manibus probè versatam, finito vt considat, ac rursus per colatum traicito. Alternis eadem proficere, dum pura aqua, dulcisque effluat, & nullam falsedinem præ se ferat. Postremò in ficitile nouum translatam, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus sub Caniculæ sydus exponito, & siccata vitior. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum sceditates tollendas, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasq; & macularum plenas.

SPUMA ARGENTI  
GENS  
CONSIDERATIO.

FIT PLERUNQUE Argenti spuma, quam Græci lithargyrū vocant, æ inquam, cuius hodie apud sephasarios est vñs, in metallorum fornacibus, ubi repurgatur argentum, & plumbo argenti recrementis admisso. Siquidem cum artifices argenti massam à sua vena defluxam à commissis metallis, nempe plumbo, æreque repurgare volunt, in alueum è cinere suo more paratum, plumbi multum coniiciunt, adeò vt vi subditi ignis colliquatum, balnei speciem referat. In hoc demum argentum repurgandum immittunt, quod plerumque (vt diximus) aut plumbum, aut æs habet admistum. Dum autem hæc perscitantur, visitur plumbum in liquefactum metallorum superficie, ignium vi folium statu continuè excitata, olei modo supernatans. quod tandem postquam æs, aut plumbum, quod prius argento fuerat admistum in se contraxit, eorundem folium statu ad cinerei aluci oras pedetentim expellitur. Hoc

cum vident artifices, alueum in latus secant, labique sunt in humum: sitq; hoc modo lithargyrus, coctionis diuturnitate, & metallorum aliorum mistione, ea forma concepta. Huic, postquam refrigit, quandoq; aureus, quandoq; argenteus emiccat splendor. Quo factum est, vt hunc argenteum, illum aureum passim sephasariis ac medicis dicatur, omnino existimantes, alterum ex auro, alterum ex argento constari. Cæterum coloris huius varietatem lithargyrus haudquaquam ex auri, vel argenti spuma contrahit, sed quòd plus, minùsve ærei vaporis ab argento detracti, intra se receperit. Siquidem (vt ego pluries experientia comperi, & ipsi quoque testantur artifices) argentum depurandum si plurimum sului æris contineat, huius & plumbi mistione, lithargyrus aureus redditur: sin minus, argenteus efficitur. Quare nobis affirmare licebit, nil aliud esse lithargyrum, quàm plumbum æris vel argenti vaporibus commistum. Non itaque temerè prodidit Dioscorides fieri argenti spumam aut ex arena, quam molybditi vocant, aut ex argento, aut ex plumbo. Cui subscribit Plinius libro x x x. capite v. i. Meminit argenti spumæ Galenus libro 1 x. simplicium medicamentorum, sic de eius viribus scribens. Lithargyrus deficiat quidem, velut alia omnia metallica, lapidea, terrenæque medicamenta, verum omnium id efficit moderatissimè: & secundum alias cum qualitates, tum facultates, quodammodo in medio est: neque manifestè exalfacient, neque refrigerans: modica tamen adstringendi, abstergendique facultas ei inest. quamobrem inferior est & sarcoticis medicamentis, quæ mediocriter extergentia offendimus, & contrahentibus, atque adstringentibus. Cæterum ad intertrigines femorum vilis medela est: quandoquidem vtriusque iam dictæ facultatis leuiter ei participes. Iure itaque medij ordinis in metallicis habebitur. Proinde ea frequenter vimur cum materialis miscentis, quæ valentem facultatem obtinent, fusc mordicantem, siue adstringentem, vel aliud quippiam efficientem, sicut in liquecentibus ad plerique medicamenta ceram adhibemus tanquam materiam, quia scilicet, quæ ipsa quodammodo medium tenet eorum, quæ valentem facultatem possident. *Αὐδάργυρος* sic Græcè, vt Lithargyrus item & Spuma argenti Latine dicitur: Arabice, Martech, sine Merda fengi: Italice, Spuma d'argento: Germanice, Gletz: Hispanice, Almataga, Litargirio, & Yezes de oro: Gallicè, Litarge.

Lithargyrus  
riferet ea  
Galenus.

Nemini

#### CERVSSA. CAP. LXIII.

CERVSSA fit hoc modo. infuso in vrceum oris lati, aut ficitile labellum quàm acerrimo aceto, laminam plumbæam supra ficitilis spiraculum, subiecta prius arundinea tegete, firmato: super-

iectusque

iectisq; velaminibus, ne halitum expi-  
ret acetū, vbi resoluta fuerit, desluensq;  
deciderit, humorem purum ad sum-  
ma delatum colato, crassamentūque  
transfundito. debet quoque siccari in  
sole, mox trusatili mola teri, aut aliās  
tritum cribrari. postea quod superest  
duri, in tenues partes redigendum, cri-  
brandūque. vicissim eadem tertio,  
quartōque facienda. Melior, quæ pri-  
mō cribrata est, & medicamentis o-  
culorum assumenda. Secundū locum  
tenet sequens, & reliquæ suo ordine.  
Nec desunt, qui ligneas rudes in me-  
dio vase appendant : & derafo ceu situ  
imposito, ita vt acetum non cōtingat,  
inditōq; operculo circumlinentes di-  
mitrunt. Post dies decem laxato ob-  
tutamento videntur : cūque resoluta  
materia fuerit, reliqua, vt suprà dixi-  
mus, exequuntur. Si autem quis in pa-  
stillos velit digerere, aceto acri suba-  
cta, diuiditur in pastillos, qui in sole sic  
cantur. Aestate tamen suprà dictum  
opus obeundum cōstitit enim candida,  
atque efficax redditur. Quinetiā hye-  
me paratur, vrceis supra furnos, bal-  
nea, aut fornaces impositis : ascendens  
enim calor idē, quod sol præstat. Lau-  
datissimam fieri putant Rhodi, & Co-  
rinthi, aut Lacedæmone: proximā Pu-  
teolis. Torretur hoc modo. Flagranti-  
bus igni carbonibus, fictili nouo, ma-  
ximē Attico, tritam cerussam imponi-  
to, & assidue versato: cūque cinereum  
colorem traxit, eximens refrigerato,  
& vtitur. Est & aliud vrēdi genus. Tri-  
ta patinis nouis supra prunas imponi-  
tur, & ferulacea rude mouetur, donec  
colore similis sandarachæ fiat, extra-  
ctaque ad vsus ministratur. Quæ verō  
ita parata est, Sandyx à quidādam di-  
citur. Lauatur cerussa cadmiz modo.  
Vis ei refrigerare, occludere, emollire,  
explere, extenuareque: insuper excre-  
scentia sentier reprimere, & ad cicatri-  
cē perducere. Miscetur ceratis, & em-  
plastris, quæ liparæ vocantur, pastil-  
lisq;. Est autem lethalis eius potus.

CERUSSA medicamentum est omnibus *Cerussa*, et  
notum. Facilita tamen res est. Venetiis plurima *Sandyxis*  
conficitur, sicuti & in aliis compluribus Italiæ *confidera-*  
locis: quod non solum in medicamentorū vsu  
expetatur seplapharis, ac medicis, sed etiam pi-  
storibus, qui ea frequentissime in suis operibus  
vtuntur. Paratur ex cerussa (vt Dioscorides  
inquit) Sandyx, quod officinæ Serapionem se-  
cutæ minium appellant, non autē Sandarachæ,  
auripigmenti genus, vt libro de compositione  
medicamentorū existimat Fuchsius. Siquidem  
Sandarachæ, vt suo loco dixerat, fossilis res est,  
non autem facilitia. Cerussæ meminit Galenus *Cerussa Vi*  
lib. 1 x. de simplic. medicame. facultatibus, ita res ex Ga-  
seribens. Psimmythium, id est Cerussa, & hoc  
leues.

medicamentum testimonium præbet modō dictæ  
facilitati. Nam si ex acri aceto soluatur, gustu  
tamen neq; acre erit, neque mordax, neq; di-  
scussorium, sed emplasticum, & refrigeratoriū:  
facilitatis æugmē dissimilimæ, tameñ & illa  
conficitur aceto ac dissolvente. Porro cerussa  
adusta in Sandycæ, quam vocant, transit, medi-  
camentum seipso tenuius, nondum tamen ex-  
calfaciens, hæc Galenus. Ex quibus liquidō pa-  
tet, Sandycē, & sandaracham maximē inter se  
facultatibus pugnare, hæc namq; Galeni, & Dio-  
scoridis testimonio arsenici modo carnē exur-  
rit, & crustas sua vehementer vredine, ac calidi-  
tate, morsuq; violento excitat: illa verō nulla  
sui parte excalfacit, sed potius refrigerat. Id  
quod in vulgari officinarū minio facili depre-  
henditur. Sandycis meminisse videtur Vergi-  
lius in Bucolicis, dum his versibus cecinit.

Ipse sed in pratis aries iam suæ rubenti  
Murice, iam croceo mutabit vellera luto.

Sponse sua Sandyx pascente vestiet agnos.

hæc Galenus poëta. Cerussa, quæ ita Latinis, *Qu-*  
missus Græcis appellatur: Arabibus, *Affidagi*, seu  
Affidagi: Italis, Cerussa: Germanis, Bley vneis:  
Hispanis, Aluayalde, & Blanquer: Gallis, Ceru-  
se. Quæ verō *arabica* Græcæ, Sandyx item *N omnia*.  
Latinè vocatur: Arabicæ Afrenzi, Sarchon, Sandi-  
con, Sandax, Syregi, siue Serengi: Italicè, San-  
dice: Vulgus, Minio.

## CHRYSOCOLLA.

## CAP. LXIIII.

CHRYSOCOLLA laudatissima Ar-  
meniaca, colorem porri quā similli-  
mē reddens. Secundū locū sibi vendi-  
cat Macedonica: & proximum Cypria.  
quæ in genere præfertur pura: damna-  
tur, quæ terrā, aut calculos collegerit.  
Ratio lauandi hæc est. Tusam infusa  
aqua, mortario expassa manu ad pilam  
vehementer fricato, & statim quā con-  
federit, colato. Alterā infundens aquā,

rumsum terito. hæc vicissim prosequere, donec pura, syncerâque spectetur. dein siccato in sole, & ad usum recondito. Quod si vrere volueris, ex ea terens quod satis esse videbitur, patinis supra carbonibus adposito: & alia facito, quæ suprâ diximus. Dos chrysocolle ad purgandas cicatrices: excrescentem carnem coercet, adstringit, purgat, excalfacit, & modicè corpus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ vomitiones concitant, & necem inferre possunt.

*Chrysocol-  
labifloria.*

CHRYSOCOLLA, vt Plinius est author lib. x. xxi. cap. v. naturalis historiæ, humor est in puteis, per venam auri defluens, crassescens limo rigoribus hybernis, vsque in duritiam pumicis. Laudatior eandem in ærariis metallis, & proximam in argentariis fieri compertum est. Inuenitur & in plumbariis, vi-  
lior etiam auraria. In omnibus autem iis met-  
tallis sit & cura, multû infra naturalem illam,  
inmissis in venam aquis leuiter hyeme tota,  
vsque in Iuniû mensem. Dein siccatis in Iunio,  
& Iulio: vt planè intelligatur nil aliud chryso-  
colla, quam vena putris. Natiua duritia ma-  
ximè distat, luteam vocant. & tamen illa quo-  
que herba, quam luteam vocant, tingitur. Natura est, quæ limo lanæzæ ad succum bibend-  
um. Tunditur in pila, deinde tenui cribro  
secernitur, postea molitur, ac deinde tenuius  
sic cribatur. Quicquid non transineat, reperit-  
ur in pila, dein molitur. Puluis semper in ca-  
rinos digeritur, & ex aceto maceratur, vt omnis  
duritia soluitur. Ac rursum tunditur, dein lau-  
atur in conchis, siccaturq; hæc. Nascentus de chryso-  
colla Plinius. Cæterû sepsalarij, quemadmodû  
aurifices, Chrysocollam vulgò Borraæ vocât,  
Mauritanos secuti: cum tamè pauca admodum  
in officinis reperiatur, quæ syncerissima dici  
possit, & quæ colore sit viridi, porraceoq; vt  
Diochorides inquit, & præstantissima exposcit.  
Siquidè subnigricat hæc, nec vlla ex parte vires-  
cit. Quæ saturato colore vires (vt mea fert  
opinio) in ærariis tantum metallis foditur, quæ  
nigricat, in plumbesque albicat, in argenteis:  
& quæ pallescit, in aureis. Vnde mihi faciliè  
persuasum est, Chrysocollâ sibi variû colorem  
vendicare, pro metallorum, in quibus foditur,  
ratione. Porro facticæ ex alumine rupe, sale,  
nitro, ac etiâ aliis quibuscûq; admixtis, copia non  
deficit. Idcirco aurifices, qui ea ad aurû ferru-  
minandû frequentissimè vtuntur, ipsam magna  
quidem diligentia seligunt, quanquam & ipsi  
plerumq; decipiuntur: tanta in omnibus est im-  
postorû astutia. Præferunt auro ferruminando  
illâ, quæ lutea est: tamen in medicamentorum

usu, præstantior sit viridis. Fit etiamnû chryso-  
colla (vt Dioscorides prodidit libro secundo in  
vriuz mentione) ex puero tum vrinâ in æreo  
mortario, pistillo item æreo sub calenti sole  
tandiu ductâ, vt vnguenti modo crassescat.  
Quod pariter literis memoriae mandauit  
Galenus libro i. x. simplic. medic. sic inquit.  
Chrysocolle, & hoc medicamentum ex iis est,  
quæ carnem liquant, non tamè valenter mor-  
dicat, quanquam sit facultate admodum dige-  
rente, desiccanteq;. Igitur quidam id modû,  
quod in metallis inuenitur, ita nominant: alij  
verò id, quod in æreo mortario, pistillôq;  
æreo, ex pueri vrinâ præparatur: id quod qui-  
dam inter æruginum differentias numerant.  
Sarius verò est ipsum præparare tẽpore æstiuo,  
aut certè ære pro-fum calido, vrinam in mor-  
tario terentes. Præstat autem æs, ex quo mor-  
tarium pistillamq; conficias, rubrum sit. Nam  
quo æs tenerius fuerit, eò plus circumagendo  
pistillo deteritur. Hoc medicamentum apertissi-  
mum est vlceribus contumacibus, tum per se,  
tum aliis mistum, vt in opere de componendis  
medicamentis referetur. Nunc autem id no-  
uisse sit est, quod quanto plus quam Chryso-  
colla metallica deficiat, minusq; mordicat, tã-  
tò etiam ipsum excellit tenuitate. Ipsam tamen  
Chrysocollam illam si vras, multo tenuior em  
efficies. Vt Græcis χρυσόκολλα: ita etiam Latinis  
Chrysocolle, & Auri glutinum appellatur:  
Arabibus, Tincar: Italis, Chrysocolle: Germanis,  
Borraf: Hispanis, Atincar, & Borrax,  
Gallis Borras.

*Chrysocol-  
la vires ex  
Galen.*

*Nomina.*

#### LAPIS ARMENIVS.

#### CAP. LXV.

ARMENIVS lapis præfertur læ-  
uis, colore cœruleo, perquam aqua-  
bilis, calculo carens, & friabilis. Ea-  
dem, quæ chrysocolle præstat, sed in-  
efficacius. Quinetiam usum habet ad  
pilos in palpebris alendos.

ARMENIA, vt lib. x. x. v. cap. vi. te-  
statum reliquit Plinius, lapidè mittit, qui eius  
nomine appellatur. Lapis est hic quoque chry-  
socollæ modo infectus: optimûque est, quod  
maximè viride est, communicato colore cum  
cœruleo. Plinio subscribit Auicenna, sic in-  
quens. In lapide Armeno est aliquantulum  
azuli coloris, non tamen est in colore azuli, &  
non est in eius soliditate, sed est in eo arenosi-  
tas quædam: & quandoque vtuntur eo pictores  
loco azuli, & est lenis tactus. Ex horû sinè ver-  
bis perspicuum sit, lapidem Armenianum colore  
esse viridi, ad cœruleum inclinantem. Talis au-  
tem esse compertur, qui in argenti fodinis, in  
complexibus Germanicæ locis foditur: & quo  
colorem

*Armenij  
lapidis co-  
loratione.*

colorem illum ad pictorium usum parant, quem vulgò vocant verde azzurro, ac si diceret viride cæsum, vel viride cæruleum. Næque is colore chrysocollam refert, sed duritie præcellit. Quamobrè crediderim ego, eos non longè abesse à varietate, qui dicerent, Germanicum hunc lapidem illi congenerem esse, quem Armenia mittit. siquidem patrii Armenij nomen genus non immutat, neque etiam obstat, quin & in aliis regionibus, lapis hic gigni possit. Quippe Phrygijs lapis à Phrygia regione dictus, optimus in Cappadocia foditur, ut Dioscorides est author. Id quod facillè ostendit, Armenium præter Armeniam, alias quoque regio nes gignere posse. Nec refert, quòd scripserit Manardus Ferrariensis lib. 1. 11. epistola 1. 1. Armenium lapidem hodie non facillè inueniri posse. Quandoquidem cum certò sciam, multa in officinis ferè omnibus deesse medicamèta, eaq; præsertim, quæ ex metallorù fodinis expèditur, quo tamen suo natali solo, vbi proueniunt, copiosè reperiuntur, mirum certe non fuerit, si Armenio etiam lapide careant sepalsarij. Hac itaque ratione ductus, haudquaquam dubitauerim affirmare, quin & hic in Germaniæ metallis proueniens, in Armenij lapidis genere legitime referri queat. quemadmodum in Gagas, Phrygijs Asijsq; genere nobis recipiuntur, qui alibi, quàm in Gaga fluuio, in Phrygia, & Asio inueniuntur. præsertim cum notis omnibus ac viribus Armenio per omnia similis hic habeatur. Notis quidem, quòd summè vireat, & ad cæsum colorem proximè accedat. Viribus autem, quòd (vt equidem testari possum) atra bile vexatis maxime conferat, iis vomitum, & aluum ciens. Porò de sepiasæ (vt omnibus constat) non modò multis destituitur fossilibus medicamentis, sed continuè alterum alterius loco supponunt: nempe cædium pompholygis locò spodij vice complura antispodij, & pro flore æris rasilem æruginem subiciunt: cum tamen & pompholyx, & spodium, & flos æris copiosa, legitimq; reperiantur omnibus in fornacibus, vbi argentum, & æs funduntur. Nam ex hoc, quòd in officinis non reperiatur Armenius lapis, quemadmodum alia complura, haudquaquam colligere licet, quòd hæc omnia flos in fodinis fornacibusq; non habeantur. Præstat mirum in modum Armenius lapis (et si id Galeo, Paulo, alijsq; vereribus incognitū existimetur) ad atram bilem ditienda, vt testis est Alexander Trallianus clarissimus author, libro primo capite de melancholia, vbi sic inquit. Quòd si hiera data melancholicis imaginationes nihilominus infestare videantur, tunc sine ulla curatione lapidè Armeniacū dare festinato. Noui enim ex veteribus antiquiores ad ventrū albū prosperasse, vbi affectum ab alijs purgationibus nihil penè imminui conspiceret. Verùm ego lapidem Armeniacū veratò albo præfero, atq; licet vtemen ipso experientia cognoscere, quomodo præterquam efficaciter, etià sine mole-

stia, & periculo purget, quorū nihil albū ventrū habere nouimus. Si igitur res postulat, non modò infra per aluum, sed etià per vomitum purgationem fieri, lapidem illorum exhibere conuenit. Sit autè modus ipsius scrupuli tres, aut quatuor, aut paulò amplius, minùsve, pro viriū simul, & copiz humoris noxij ratione. At si æger purgatione per vomitū non admodum indigere videatur, sed per imum ventrè totum vitiosum humorem exire conuictus, tum lapidem eluere oportet vsq; ad duodenas (vetus legit quinquagenas) vices. Vbi enim sic fecerim, neq; turbationem stomachi, aut compressionem lapidis excitare potest, sed etiam minori cum molestia nigrè terrestremq; humorè vacuabit, vt paucis præteritis diebus adimentū ex eo nobis accessisse percipiamus. Dato autè ex eo scrupulos quinq; aut sex, vt plurimum ex aqua tepida, semper ex cognatis diçitis coëctura deprehendens an plus, minùsve exhibere debeas. Quòd si æger etiam bis adhuc requirere suspiceris, cum fiducia rursus exhibeto. neq; enim calorè habet, aut seccantem admodū, aut aliam quampiā ipsi insidentem, amarā, & venenosam qualitatem, vt æger ideo medicamentū bibere detreçet. Sin autem nonnulli humidum aliquod medicamentum semere aduersentur (multi enim in totum non sistent liquidum medicamentum assumere) in catapotia lapidem redigere oportet. Si verò liber, etiam picræ ali quam insignem partem admisceo, aut etià ex alijs quibusdam, quæ purgationem magis promoueat, & non renitentur. Ne autem is, qui parare veli horum confectiōem, inquirendo laboret, visum mihi est ea de causis etià horum compositionem meminisse. Habet autem in hunc modū. Picræ semuncia, epithymi semuncia, ægæci scrupuli quatuor, scammoniz vicia, garyophyllorum grana viginti, Contusi excipiantur rhodomelo, aut succo citrij, aut rhodomelice. Dentur scrupuli duo, plurimū quatuor. Notandum verò est, præterquam quòd ventriculū corroborant, simul etiam varios humores, præsertim terrestrem, & melancholicum, citra molestiam purgare posse. athenus Alexander. Cæterum Armenium lapidem deiectionia facultate pollere in atrebillariis morbis, nouit etiam Aëtius. quippe qui lib. 1. 1. cap. x l v 11. ex Nicheffonis medici auctoritate, sic de eo scriptum reliquit. Armenium, quo pictores vtuntur, duodecima drachmæ parte melancholicis, & crassum sanguinem habentibus datur. Datur & pueris pectoris morbo infestis: reuomunt enim, nam vomitorium existit. Datur & morbo sacro obnoxii, ac furiosis, hoc modo. Centaurij fasciculos manipulares tres in aquæ marinæ heminis tribus coquito, donec vna supersit, & ex excolato decocto, Armurhei lapidis, què Græci Armeniū vocat, tertiam drachmæ partem terito, & cōfidenter exhibeto: nihil enim periculi est. Itaque nosse operapretium est, quòd Armenium

Armenij  
Lapidis  
res ex Ale  
xandro,

Vires eius  
dem ex  
Aetio.

*Armenii  
Lapidei Si-  
res ex Ga-  
leno.*

penitus reuomitur, nihil memorabile sursum  
effertur, sed & infernè modicum quid paula-  
tim, & in pluribus secessibus effert. hæc Aëtius.  
Nouit præterea Armenij vires defectorias in-  
ter recentiores Græcos Aduarius, vt videre  
est in suo de compositione medicamentorum  
libello. Verùm alias ab illis Armenio lapidi  
vires reddidit Galenus libro 1. x. simplicium  
medicamentorum, his verbis. Armeniaci vini  
talem, cum leuicula acrimonia, &  
leuissima adstrictione. Itaque tale cum sit, ocu-  
laribus miscetur facultatibus. Et ipso per sese  
quoque ad pollinis leuorem reducto, vt mirum  
siccò ad pilorum in palpebris incrementum:  
nempe vbi præ humorum acrimonia partim ex-  
cidunt, partim verò nec crescant, nec aluntur.  
Siquidem depassis his acrimoniis, in bonum  
naturæ habitum pars reducitur: cuius cum alia  
sint munera, tum etiam producendi, incremen-  
tum præbendi, ac corroborandi, qui in palpebris  
sunt pili. quippe cum prima, & ex professo,  
quædam sint medicamentorum opera: quædam  
verò mediante natura, quæ animantium cor-  
pora dispensant, eduntur, velut quæ in his ipsis  
calliblephara nūcupant. Ipsa enim partes mode-  
ratè laxas mediocriter desiccant, pilos corruptum-  
pentem humiditatem absorbendo, quæ vbi abo-  
lita est, tum natura ad proprias redit actiones,  
nimirum sublati, quæ hæcenus ipsi impedi-  
mento fuerant. Lapis, qui Græcis *ἀδὲρ ἀγρίων*  
Latinis Lapis Armenius cognominatur: Mau-  
ritanis, Heger, seu Hagiar Armeni: Italis, Pie-  
tra Armenia.

*Nomina.*

#### COERULEVS LAPIS. CAP. LXVI.

COERULEI origo ex ærariis me-  
tallis in Cypro. copiosior ex arena li-  
torali secundum quosdam subcauatos  
specus maris inuenitur, qui magis proba-  
tur. Eligi debet inebriatus. Vritur vt  
chalcitis. lauatur vt cadmia. Vim ha-  
bet reprimentem, & modicè eroden-  
tem. crustas gignit, & exulcerat.

*Cerulei la-  
pidei con-  
sideratio.*

COERULEVM officinæ Auicennæ doctri-  
nam secutus, lapidem Azuli, vel Lazuli vocant.  
Probatissimus, qui scintillis aureis emicat. La-  
pis hic (ni fallor) eum Armenio non obdura-  
m habet cognitionem, quod non modò vtrique  
simul in iisdem proueniant metallis, promi-  
sueque oriuntur; sed quòd etiam iisdem ferè  
viribus præditi sint ad atram bilem desiccandà.  
quo factum est, vt Mauritanorum quidam al-  
tero cluero ineptissimè confuderint. Cæte-  
rùm quoniam tradidit Auicenna, cui subscribit  
Mesues, ceruleum sine (vt eorum nomine v-  
tar) Azulum septicæ, ac putrescentis, et  
facultatibus, non desunt è recentioribus, qui eum  
deseruerint, quemadmodum & catapotia, quæ

ad atrabiliarios affectus ex lapide ipso ceruleo  
passim in pharmacopoliis parantur: è quorum  
numero est Fuchsius medicus nostræ ætatis ce-  
lebris, in suis paradoxis. Verùm quauis con-  
fusus satis de Ceruleo; & Armenio scripserit  
uerint Mauritan; non tamen obstat, quin ij  
bilem atram pellere queant. Id quod priores  
vereretur Græci, vel ignorauerunt, vel silentio  
dissimulauerunt. Porro Galenus, etsi non ex-  
plicauerit ceruleum ab atramentis humores duc-  
cere; tamen scriptis desiccantem habere facul-  
tem. Quòd cum fortasse perpendere Arabes,  
qui multorum medicamentorum, quæ Græcis  
incognita fuisse videntur, diligentissimi fuerint  
indagatores, inuenere tandem facto pluries  
periculo, ceruleum atram bilem peculiariter  
desiccare. Sed sit (vt in præcedenti capite osten-  
sum est) vsq; ad Alexandri ætatem è veteribus  
nemo nouerat Armenium in detrahenda, citra  
noxam, atra bile facultatem habere albo vera-  
tro parem, mirum quidem non fuerit, si etiam  
longo post tempore, id scripserint Arabes, vel  
quòd ab eo fortasse acceperint, vel quòd ex se  
ipsis id facultatis Armenio inesse adinuenerint.  
Præterea cum Armenium, & Ceruleum non  
modò in iisdem proueniat metallis (vt in plu-  
ribus Germniæ locis nos ipsi vidimus) sed si-  
mil, promiscueque oriuntur, adeo vt Cerulei  
frustum, Armenij non modicè contineat, sicut  
è conuerso, rectè quidè exstimari potest, pari  
ferè facultate, vel non admodum dispari hosce  
lapides esse præditos. Hinc itaq; fit, vt mihi  
planè Mauritani à Fuchsijs, & aliorum calumnia  
vindictam videantur. Quippe cum cernerent  
naturam hos lapides promiscue, indistinctèque  
progignere, quid mirum si ipsam imitari, eorū  
historiam & facultatè indifferetè tradiderint?  
cū pro certo ex his existimandū sit, nil aliud  
esse Armenium, quàm cerulei materiā, non-  
dum à calore in terræ visceribus ad summum  
perfectèque coctā. quemadmodū chalcitis, misty,  
sory nil aliud esse creduntur, quàm chalcanti  
materiā. Hæc igitur cū accuratè perpèdisset  
clarissimus Manardus Ferrariensis, vbi in sim-  
pliciis medicamenta à Mesue conscripta diligen-  
tissimè adnotauit, eorum sententiam resellit,  
quæ cerulei vsum sua tantum ducti opinione  
ta acriter vituperat, his verbis. Ceruleo Græci  
nullam vim defectoriā adscribunt, sed videntur  
hæ vires ab Armenio deriuatæ. Arabes enim  
vtrunque confundūt. Serapio quidem, & Auer-  
roes sub lazuli nomine de Armenio tractantes,  
Auicenna de Azulo scribens, ferè ei omnes vires  
attribuit, quas Græci vtrique. De Armenio verò  
ea scribit, quæ Græci: solum addens, quòd a-  
tram bilem magis purgat, quàm cyaneus. Quæ  
omnia licet vera sint, non tamen ego his acce-  
serim, qui nō secus ac perniciosissimū venenum  
hunc formidant. Experientia enim certa scio,  
quòd si benè abluatur, multū iuuat, & vel nihili,  
vel parum lædit. hæc ille. In cuius certè senten-  
tiā vnusquisq; medicus facillè deueniet, qui pos-  
tius ra-

*Maurita-  
norum in-  
tela.*

tius rationalis sit, quam pertinax. Nā et si dixerit Auienna cœruleū exedentis esse facultatis, hoc quidem non impedit, quin haustum atram bilem deicere possit absq; noxa, si diligenter fuerit ablutum. quandoquidem eius peracuta septicæq; facultas pluribus lotionibus ab eo facile tollitur. Præsertim in hunc usum quod aureis maculis pellucet: namque id, quo seplasis abundat, & quo in Germania pictorios colores parât, tum facultate imbecillius, tum ignobilius, habetur. Memini me ad nonnullas tam xris, quam argenti fodinas accessisse, in quibus & cœrulei, & Armenij in aceruos cōgesti plurimum vidi: attamen nullum mihi in iis locis cœruleum repertum est, quod aureis fulgeret scintillis, eo quod non proveniat hoc nisi tantum in auri fodinis. Idcirco cœruleus ille color, qui vulgō nobis dicitur Azzurro ostromarino ab omnibus magno æstimatur pretio. Fit enim is ex cœruleo lapide, qui tantum in auri metallis in orientibus regionibus foditur, omnium præstātilimus. De illo autem, qui ex arena in maris liquoribus inuenta conficitur, quid plura dicam non habeo, quam scripserint

*Cœrulei vires ex Galeno.* Dioscorides, & Plinius. Cœrulei vires recule Galenus libro 1 x. simplic. medic. sic inquit. Cyanos medicamentum auri scintillare est, tum detrahendi, quam *κατασφινξ* vocant, tum digerendi, potentiore quā cinnabari. Inest quoq; ei nonnulla adstrictio. hæc Galeni verba. Quæ sanè vel non legisse, vel non animadvertisse Manardus ex eo deprehenditur, quod cœruleo Græcos nullam vim deicctoriam tribuisse scriptum reliquerit. *κλυσθαι* sic Græcè, Latine verò Cœruleus lapis vocatur: Arabicè, Hager alazeoard, Lazuard, seu Azul-officinis, Lapis lazuli: Italicè, Pietra cœrulea: Germanicè, Laspur stein: Hispanicè, Azul.

## INDICVM, CAP. LXVII.

INDICI duo genera. vnum sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. Alteri insectoriæ dant officinæ: & est spuma purpurea innatans cortinis, quam detractam artifices siccāt. Optimum existimatur, quod cœrulei speciem præbet, sucum suum sorbet, & læue. Inter medicamenta est, quæ leuiter adstringunt, & inflammationes, tumoresque rumpunt. purgat, & reprimat vlcera.

*Indici color.* INDICI color, quo hodie pictores vntur, tamen in seplasis ubiq; venalis habetur, sit tamen in insectoriis officinis ex glasse cremento, & spuma, cum laxe glasto, ipso

insciunt. Quod autem spôte nascitur, tanquā spuma germinatione arundinibus exiens, quod scia, ad nos non defertur. Plinius lib. x x x v. cap. v r. sacitum Indicum in purpuris officinis fieri ait, ex purpuræ spuma cortinis innatante. Qua in re Dioscoridis verba nō rectè accepisse videtur Plinius. Siquidē author non ex purpurarum spuma fieri Indicum scribit, sed ex purpurea spuma (talis etenim est, quæ ex istate provenit) innatante cortinis in insectoriis officinis. Nulla namq; quod mihi compertum sit, ex purpurarum sanguine, quo regum vestes olim tingebantur, spuma proferebatur. Quod Græci *ἰνδική*, Latini quoq; Indicum vocant: Itali, Indico.

*Nomina.*

## OCHRA. CAP. LXVIII.

OCHRAM leuissimam, & omnino luteam eligere oportet, saturatā, non lapidofam, friabile, natione Atticam. Vritur hæc, & lavatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare. Excrescentia in carne reprimi, caua cum cerato explet, & articularū tofos comminuit.

OCHRA fossilis, qua pictores vtuntur, cur legitima non sit, quid obiter non video: quam hæc (quod sciam) ex Athenis laudatissima non adferatur, quemadmodū nec Vitruuij tempore, qui ochræ Atticæ usum in Italia excoleuisse scribit. Est itaque Ochra terra, quæ in plumbi fodinis aureo colore reperitur. Quamobrem qui rerum causas perscrutantur, arte etiam ochram ex plumbo ipso conficiunt, quæ coloris nitore fossiliam superat. Præstantissimam ochram non longè à Tridento effusam, misit ad me hoc anno Martinus Guidocinus Tridentinus, seplasis harum rerū diligens inquisitor, qua nullam hæctenus vidimus meliorem. Ochra in libris simplicium medicamentorum non reperio meminisse Galenum: tamen eius mentionem fecerit commento 11 in Hippocratis prognostica de vomitione agens, cum inquit. Ochra enim genus quoddam terræ est, cuius possimam Attica probatissima est. Quæ *ἰνδική* Græcè, ochra item Latine, & Italicè appellatur.

*Nomina.*

## CINNABARIS. CAP. LXIX.

HALLVCINANTVR qui cinnabarin minio eandem esse existimant. Minium enim in Hispaniis ex lapide quodam argenteæ arenæ permisto, temperari solet, alioqui nō dignoscitur. Fornacibus autem in florentissimum, flau-

gratissimumq; colorem permuatatur. In metallis verò strangulantes hali-  
tum eructat. itaque facies incolæ vesic-  
is obuelant, vt per illas spectent, nec  
respirando noxium aërem attrahant. Eo  
pictores ad sumptuosa parietū orna-  
menta vtuntur. Cinnabaris verò ex  
Aphrica deferitur, & magno constat.  
hactenus inuenitur, vt vix versicolori-  
bus pictorum lineis satisfaciatur: intento  
colore, nec diluto præditū: quare qui-  
dam sanguinē esse draconis existima-  
uerunt. Vim habet cinnabaris hama-  
titæ lapillo eandem. Conuenit ad oculo-  
rum medicamēta, verū efficacius:  
magis enim adstringit, & sanguinem  
cohibet. Ambustis igni, & papularum  
eruptionibus, cerato excepta medetur.

*Cinnaba-  
ris conside-  
ratio.*

CINNABARIS, qua officina, & pictores  
vtuntur, longè sanè differt (vt planè constat) à  
Dioscoridis Cinnabari. quandoquidem nostri  
vſus cinnabaris res facticia est ex sulphure, &  
argento vino diu arte quadā igne torrefactis.  
Est & aliud cinnabaris genus fossile, & sponte  
per se nascens, vt postea dicitur: verū non  
vt factitium copiosum, nec adeò colore præ-  
cellens. Quæ autem à Dioscoride describitur,  
ex Aphrica deferitur, eadem facultate pollens,  
qua hæmatites lapillus, quem non modò præ-  
tulit ipse foris appositum ad plures oculorum  
morbos, sed etiam intrus assumptum, ad vrinæ  
angustias, muliebrium locorum defluxiones,  
& cruentas expuſiones. Quibus vique affec-  
tibus vulgaris vſus cinnabaris nullo pacto cõ-  
petere potest, quòd propria vi erodat, exulceret,  
& hautum pernecium adferat, & proinde  
fit oculis, & internis viscibus inimica. Cate-  
rū quidnam inter ea, quæ hac ætate in vſum  
medicum veniunt, Dioscoridis cinnabaris esse  
possit, non equidem aſsum decernere, sed po-  
tius quod sentio, adducor, vt coniecturis qui-  
buscūq; æſſequar. quippe quòd Dioscorides Cin-  
nabarin nullis notis descriperit, neq; tradide-  
rit an facticia res sit, aut fossilis, an ex planta-  
rum materia proveniat. Sed antequam conie-  
cturas eas afferā, quibus constare videtur Dio-  
scoridis cinnabari septias nostrates nō deſſi-  
tui, Plinij sententia cognoscenda est, qui libro  
x x i i i. capite v i i. affirmatē scribit, nil  
aliud esse cinnabarin, quàm draconis saniem,  
elisi elephantorum mortuorum pondere, per-  
misſo vtriusq; animalis sanguine: quòd q; nullus  
alius sit color, qui in picturis propriè sangui-  
nem reddat: & quòd ea etiam antiquos medi-  
camētis sit vtilissima. Id quod pariter affirmat  
Lulius Solinus in varia historiarum lectione.

Ad hæc scire conuenit, gummi cuiusdam ar-  
boris in Aphrica nascētis ad nos deferri, quod  
etiam hoc æuo sanguinis draconis lacrymam  
officina vocant, colore sanguinis, pellucidum,  
leue, & fractu minimè contumax. Hoc nostræ  
officinæ vulgò vocant Sanguē di draigo in  
lagrime, alterius differentia, qui pluribus im-  
posturis passim in orbiculos coactus venditur.  
Priorem itaq; non ab re lacrymam appellant,  
quòd scribat Aloisius Mustus patritius Vene-  
tus in suis in Aphricā navigationibus, ex ar-  
bore quadam hoc gummi collacrymare, colo-  
re, & substantia, sanguini simili: incisō tamen ab  
incolis prius arboris cortice, vt fusius inde ef-  
fluat. Hoc (vt idem subdit) æneis cacabis ex-  
cipiunt, & igni resinæ modo decoquant, quo-  
nūq; consistat, draconis sanguinem, nescio qua  
ratione ducti, ipsum appellantes: nisi id eueniat,  
quòd fortasse sua lingua plantā, à qua defluit,  
draconem appellant. Ex his itaque nobis iure  
conſectare licebit, gummi hoc Dioscoridi fa-  
cile cinnabarin esse, quòd primū nō aliunde,  
quàm ex Aphrica deferatur, nec inde copio-  
sum, quòd item pictoribus expetatur, vt in-  
tento eius colore, purpureas, rubetq; coccinnes  
vibras, vbi prius picturas rubro, vel purpureo  
intexerint. quòd deinde ob raritatem, etiam  
hoc tempore, quò frequentius in Aphricā na-  
uigatur, nō vili veneat pretio. quòd deniq; (vt  
Dioscorides inquit) viribus hæmatitæ lapillo  
per omnia respondeat. Nam, vt periculum fa-  
cientibus liquidò patebit, adstringendi vi pol-  
let, & maiore quidē quàm hæmatites. quo fit,  
vt felicius eo vtantur medicī ad muliebres, &  
dysentericas fluxiones, ad cruentas excreatio-  
nes, ad firmandos commotos dentes, & robo-  
randas gingiuis. His accedit, quòd si Dioscori-  
dis ætate nō decant, qui Cinnabarin esse dra-  
conis sanguinē existimarent, mirum sanè non  
fuerit, si per plures ætates producta hæc falsa  
opinio ad hæc vsq; tempora inualuit. Ad ipse,  
ne simplicium medicamentorū doctrinā sectan-  
tes hoc tenerentur errore, inanem eorum sen-  
tentiam silentio inuoluendam non duxit, qui  
cinnabarin draconis sanguinē appellabat, eū  
inquit. Hactenus inuenitur cinnabaris, vt vix  
versicoloribus pictorū lineis satisfaciatur, in-  
tento colore, nec diluto præditū: quare quidam  
sanguinē esse draconis existimauerunt. Ex his igi-  
tū coniecturis, tum rationibus colligendū  
esse putauerim, hanc lacrymā, colore sanguinē  
præ se ferentē, legitimā esse Dioscoridis cin-  
nabarin. Ceterū videtur hac in re manifestè  
aberrasse Plinius. quandoquidem eſſi afferat  
cinnabarin nil aliud esse, quàm draconis fero-  
cissimæ belluæ sanguinē, elisi elephantorum  
morticium pondere, eū tamē dixerit nullū  
aliū reperiri colorē, qui in picturis magis ad  
vium sanguinē reddat, quàm cinnabaris, faci-  
lè deprehenditur error. Quippe necessariū sanè  
fuerit, vt de hac lacrymā ornato intellexe-  
rit, putariq; falsus vulgari appellatione, lacry-

*Plinij et  
ror.*

nam hancillum draconis sanguinem esse, ab elephante (vr referunt) collisi. Nam consentaneum minimè videtur, vr huiusce belluz sanguis extra vasa in terram diffusus, puluere & lapillis commistus, sic & putredine obductus contabescat, viuum, ac verum sanguinis colorem referre possit. quemadmodum nec ille syncerum sanguinis colorem præbet, quem impossibile suo arbitrio faciliat, ex hircino sanguine, rubrica Sinopica, vel fabrilis, confusus lateribus & forbis, diutius in solatis, illius pro posse colorem, & substantiam imitantes, qui ex collisis simul draconibus, & elephanibus (si tamen vera narrare) emanare solet: quique iam longo tempore ad nos aduehi desit. Quo postea factum esse opinor, vr in eius defectu facitum supposuerint impostores, & hanc fraudem excogitauerint: neque solum ea ratione, quam modò diximus, ipsum parant: sed etiam modis aliis compluribus, resinas, rubie insectoriz radices, brisilij decoctum, tragacanthæ lacrymam, rubricas, & alia permulta inmiscuentes, quæ ne longior sit sermo, quàm series ipsa exposcat, silentio duximus inuoluenda. Verum hic fortasse illud quippiam nobis obruderit, quòd cum hoc loco scribat Dioscorides de metallicis tantum, ac fossilibus tantum coloribus, tum medicamentis, consentaneum minimè videatur, vr his inseruerit arborum lacrymas, quarum historias, & facultates, diffusio libro primo pertractauit: & ob id omnino credendum sit, cinnabarin fossile esse medicamentum. Hæc obicienti ita responsum volumus, quòd à cum ea hoc loco recensent Dioscorides, quæ ob eorum nitorem, in pictoribus veniunt vsum, nempe cerussam, chrysocoliam, Armenium, catuleum, Indicum, ochram, & alia pleraque, non mirum, nec præter institutum mihi sanè videtur, quòd his etiam cinnabarin adiunxit, quamquam arboris fuerit lacryma. Videmus enim inter hæc Indicum quoque à Dioscoride commemoratum esse, quod tamen nec fossile, nec metallicum est, sed in India spumæ instar, ex arundinum quarundam germinatione sponte provenit: atque citra arte quadam sit ex ista de herba in insectoriz ossibus. Ex his itaque omnibus palam fieri arbitror, quòd communis vsum cinnabaris, quam Dioscoridis Minium, quòd in fornicibus sùr, & floridissimo, flagrantissimoq; colore spectetur, esse mihi semper persuasi, ab ea longè diuersa sit, de qua author noster hic mentionem facit. Est enim, vr supra dictum est nostri vsum cinnabaris fossilis, & factitia: nota hæc omnibus, & frequens: illa verò rara, nec multis cognita. Fossilem (vr proxima commemoratione laus dicitur) vidimus frequenter nos in argenti viui fodinis, Hydris monte, qui vna tantum distat à Gordia distat, circa Carniolæ fines. Lapis est purpureus ad rubredinem declinans, hæmatitæ lapidi æmulus, non admodum durus, impenitè tamen gravis, tantoque plerumque argento viuo prægnans, vr per sese, nulla igitur vi guttatur. Factitia eodem loco plurimum etiam

tiam paratur ex argento viuo & sulphure, fictilibus quibusdam conclusis, & flagrantissimo igni admotis, donec ad saturitatem rubescant. Id quod fieri à natura crediderim in ea, quæ fossilis fuerit, in terræ viscibus. Nullus harum vsum in medicamentis, quæ intus in corpus sumuntur, quòd perniciosa sint, & venenosa. Hinc fortè factum est, vr existimauerit Fuchsius medicus clarissimus, in Nicolai Myrepsici codice in Damasonij antidoto ab aliquo imperito additam esse cinnabarim. Sed in hoc alia planè à Fuchsi opinio nostra est, quippe quòd putem Nicolaum eo in loco non de fossilita, vel de factitia cinnabari intellexisse, sed de ea arboris lacryma, de qua scripsit Dioscoridem, iam euidentissimum, ni fallor, à nobis factum est. Nam cum cinnabaris hæc, Dioscoridis testimonio, hæmatitæ lapillo pares habeat vires, probaueritq; is hæmatitem ad vinæ difficultatem, dubitandum sanè non est quin consultò antiquorum cinnabarim ea in antidoto addiderit Nicolaus, quam speciatim ad difficultatem, & stillicidium vinæ commendat. Ceterum quauis communis vsum cinnabaris in medicamentis, quæ sumuntur in corpus, omnino lethalis, & perimoris sit, constat tamen his vtiliter admisceri posse, quæ exterius adhibentur, nempe suffimentis, quæ sunt ad delendam Gallicam luem, ubi cætera non profuerint remedia, vnguentis item nonnullis ad idem facientibus, & ad contumacia vlcera, aliisque medicamentis, quorum vires longum essent in præsentia recensere. Porro cum dicat Dioscorides hallucinari eos, qui cinnabarim minio eadem esse existimant, cumque etiam scribat sequenti capite argentum viuum ex minio fieri, quod abusiue cinnabaris dicitur, omnino mihi persuasum volui, nil aliud Dioscoridi esse minium, quàm fossile hoc, quod diximus cinnabarim fossitiam hodie appellari, à quo argenti viui plurimum eliciunt in Hydris fodinis. Auxit præterea opinionem ipse Dioscorides, quippe qui asserat Minium in metallis stragulantem halitum eructare, ob idque fossiores veficis sibi faciem obuolare, vr per illas species, nec respirando noxium vaporem atrahant. Quandoquidem vbi cinnabaris in Hydris monte foditur (vr ego vidi, & testari possum) artifices eam decoquentes fictilibus quicquid ad id consistat, & conuerso simul ore argilla circumlitis, vr inde argentum vitum eliciant, vases, & os ligneis sibi obstruunt, ne noxio vaporì liber pateat aditus: quòd non modò huiusce halitus noxa, anhelosi fiant, qui hauserint, sed plerumque dentes vniuersos amittant, putrescentibus circumquaque gingiuis vr quidam aperiuntissime testantur, qui spectro narium & oris velamento, vr cæteris videtur, fortiores, & centulis prorsus facti sunt, continuo tremore concussi. Accedit huc Vitruuij auctoritas quæ sententiam nostram maxime tuctur. Ipse enim septimo volumine suæ architecturæ, ita de Minio differt. Ingre diat minij rationes explicare. Id autem, agris Epheforum Calbisnis primùm

Obiectio  
nisi dilatio.

Fuchsius e.  
p. m. r. p. p.  
bata

Minium  
Dioscoridi  
quid no.  
bit.



memoratur esse inuentum, cuius & res, & ratio satis magnas habet admirationes. Foditur in gleba, quæ *arsas* dicitur, antequam tractationibus ad minimum perueniat, vena vti ferro, magis subrufo colore, habens circa se rubrum puluerem. Cum id foditur, ex plagis ferramentorum crebras emittit lacrymas argenti viui, quæ à foribus statim colliguntur. hæc Vitruuius. Nos equidem hoc idem vidimus in Hydrizæ montis fodinis: ubi plerunq; euenit, vt vulnera ferramentis vena, argentum viuum fonticuli instat, in substratam defluat humum. Cæterum Plinio minium diuersorum est generum, vt loco superius citato legitur, ubi cuncta eius genera retulit his verbis Inuenitur in argentarij metallis minium quoq; , & nunc inter pigmenta magnæ auctoritatis. Theophrastus tradit inuentum minium à Callia Atheniense initio sperante aurum posse ex coqui arena rubente in metallis argenti: hanc fuisse originem eius. Repertum autem iam tum in Hispanijs, sed durum & arenosum. Item apud Colchos in rupe quadam inaccessibili, ex qua iaculantes decutenter: id esse adulterum. Optimum verò supra Ephesum Cilbians agris. Arenam cocci colore habere, hanc terti, dein lauari farinam, & quod subsidat iterum lauari. Inba minium nasci in Carmania tradit. Hermogenes & in Aethiopia. Sed neutro ex loco inuehitur ad nos, nec ferè altitudo, quàm ex Hispania. Sed adulteratur multis modis, vnde prada societati. Nanque est alterum genus in omnibus ferè argentarijs, iteq; plumbarijs metallis, quod fit ex vilo lapide venis permixto, non ex illo, cuius vomica argentum viuum appellauimus, sed ex alijs simul repertis. Steriles etiam plumbi deprehenduntur suo colore, nec nisi in fornacibus rubescentes, exulsiq; tunduntur in farinam. Et hoc est secundarium minium perquam paucis notum, multum infra naturales illas arenas. Sincero cocci nitor esse debet. Probatur auri modo. Auro candente fucatum nigrescit, syncerum colorem retinet. Inuenio & calce adulterari. Ac similis ratione ferri candentis lamina, si non sit aurum, deprehendi illico. hæcenus de minio Plinius. Hinc igitur palam est antiquis minium & fosile, & factitium extitisse. Nec sane dubitauerim, quin in factitij genere acceperint ipsi cinnabarin factitiam, quæ passim in sepasariorum officinis inuenitur. Id minium hodie appellant pharmacopolæ, tum etiam pictores, quod veteres Græci Sandycem vocauerunt, ex plumbo, aut cerussa in fornacibus perussis paratum, de quo etiam videtur intellexisse Plinius. *Κιννάβαρι* fit Græcis, vt Latini etiam Cinnabaris appellatur: Officinis, Sanguis drago in lagrima: Italis, Cinabro: Hispanis, Sangre de dragon, Gallis, Cinabre, vel Sang de dragon.

ARGENTVM VIVIUM. CAP. LXX.

ARGENTVM VIVIUM fit ex minio, quod abusiue cinnabaris dicitur, patinis

scitilibus imposita, ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succédit. siquidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in argentum viuum coit. Quin etiam inuenitur in argenti fodinarum tectis stillatim concretum. Alij per se in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stagnis, aut argenteis vasis: siquidem aliam materiam omnem exedit, & desfluere facit. Potum vim pernicialē habet: suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum, & vomitionibus reiectum, aut viuum cum absinthio, aut apij decoctū, aut semen homini, aut origanum, aut hyssopū cum vino. Auri limata scobs, id est, ramentum quàm tenuissimum epotum mirabili est auxilio.

ARGENTVM viuum omnibus notissimum, corpus est & fossile, genere, liquidum, & a quæ modo fluidum, colore argenteo, liuescente, pellucidumq; : substantia verò lenta, tenui, in qua tam frigiditas, quàm humiditas exuperat. Hæc igitur symmetria (vt chymistaru, qui se philosophos existimant, fert opinio) res est sanè admodum disposita ad metallorum omnium generationem. Quamobrem ipsum cum originem, tum semen argentum viuum appellauere. Quin etiam non addensari putant, quòd ei non insit caliditas, & siccitas tanta, quæ ad id munus obeundum sufficiant. Addunt temporis defectu id etiam euenire: ideoq; immaturum, indigestum, imperfectumq; reddi. Cæterum relicta chymistis discipendi materia, an ipsum metallorum quorumcumq; prima fuerit materia, an aliter se res habeat, dicam, philosophorum tantum, qui de eo scripserunt, sententiam secutus, facillè Argentum viuum esse materiam ad metallorum generationem proximam. Quippe cum facillimè omnibus se coniungat metallis, palam nimirum sit, ijs gignendis aptissimam esse materiam, ijsq; præsertim, quibus facilius contactu inhaeret: quandoquidem in habentibus symbolum (vt vulgata propositio est) & in consimilibus facillè est transitus. Hanc itaque ob causam eos hallucinari putauerim, qui dicunt, quòd si argentum viuum in terræ visceribus vsque adeò decoctum esset, vt in aliquod fixum, firmumq; verteretur metallum, in ferrum potius, & in plumbum verti deberet, quàm in argentum, vel in aurum. Siquidem certum est, quòd id facilius argento, auroq; contactu inhaeret, quàm cæteris. Hic autem est chymistarum ludus, qui

Argentum  
vivi causæ  
dicitur.

Quorum-  
dā error.

Nemina.

tempus conterunt, & oleum & operam perdūt, id arte rescire exillimantes, in quo natura ipsa defecit: quam (vt liquido constat) nemo vnquā ita ad vnguē imitari potuit, quin ab eius mira solertia aberrauerit. Omnia metalla in argentum viuum coniecta, supernant, vt lignum in aqua, præter solum aurum, quod si iniiciatur, statim petit fundum, quod hoc magis amplexetur, quam cetera. Amplissima argenti viui metalla (vt etiam in superiori capite diximus) videntur in Hydria monte, qui quadraginta millia passuum à Goritia distat, vbi continuo copiosum elicitur: & lapide quodam fragili potius quam duro, colore ex nigro rufescente, & ad purpuram quādamtenus vergente pondoso plumbi instat, & argenti viuo scintillante. Hanc venam postquam effoderunt, conterunt, & in scilla quādam angustis orificij cōficiunt, & recenti arborum musco obstrunt: deinde scille alterum huic simile, latioris tamen oris, in terram sepeliunt, & alterius pleni inuersum orificium, in illud inferunt, & argilla circumquaque muniunt obstruuntque oscula, & vasa simul connectunt, & firmant, adeo vt vaeum scille totum sub terra sitat, plenum verò totum supereminet. Itaque in aperta area quādam plurima sciriatim collocant scilla, & deinde ignem in ambitu succendunt, cuius vi calescens vena, argentum viuum guttatim distillat in substratum scille. Hinc suo tempore exiunt, & in vericulos quosdam reponunt, quōd vasa ferē cuncta exedat, ac dilaceret, præter vitrea, vel scilla vitro circumlita. Quo fit, vt Dioscoridem mirari fubeat, qui argentum viuum in argenteis, aut plumbeis, flagnisue, aut vitreis tantum vasis feruari posse scribit, quōd aliam materiam omnem erodant, nisi codex hic deprauatus sit. Siquidem id falsum deprehenditur: nam argentum viuum exest, ac destruit omnia metalla, quibus inhaerit. Ex quo potius, cum hæc à Serapione non scribantur, qui tamen Dioscoridis omnia ferē scripta bona fide reddidit, planē suspicandum fuerit, huic capiti plura subesse menda. id quod etiam varia in hoc loco Oribasij lectio confirmare videtur. Reperiuntur autē in argenti viui sodinis inter ipsius venam peculiare quædam lapidis illius rufi zone, quem fossiores fossitiam cinabarim vocant, de quo etiam in præcedenti capite diximus. Hic adeo argenti viuo scaret, vt sæpius absque alio igne, inde per sese guttatim defluat. Euenit præterea dum fossiores mucronatis instrumentis, venam effodunt, vt purum proficiat argentum viuum, decurratque celerius, veluti ē fonticulo quodam. Porro rari admodum sunt fossiores, & huiusce materiz artifices, tametsi robustissimi fuerint temperamenti, qui eo in opere ad quartū viginti annū incolumes perdurare valeant: quippe ob noxium metalli halitus, partium omnium tremore concutitur. Cæterum Galenus libro 1 x. simp. mediat, scribit, contra illud quōd experimento comproba-

tur, Argentum viuum ex sponte nascentibus non esse, sed ex iis, quæ preparantur, velut cerussa, ærugo, sporicum, lichargyros: fateorque se nullum huiusce medicamentum scisse periculum, an interimat, si deuoretur, vel vbi foris fuerit admodum. Fit ex argento viuo & sale, quod ammoniacum vocant, lethale illud medicamentum, quod officinæ chymistæ fecuta Argenti sublimatum appellant, vtriusque simul admittis, & in vas vitreum coniectis, ac inde in fornacem deductis, vt hæc ignium vi in vasis sublimē tollantur, vbi falsis modo concreuerint, lapidescuntque sacchari colore. Fit etiam ex Argento viuo, & aqua, quam ex calcantho, alumine, & sale nitro conficiunt chymistæ, arte quādam, & ignium vi, id quod recentiores quidam Præcipitatum vocant. Cui facultas inest sanē admirabilis ad contumacia vlcera sananda, etque præsertim, quæ à Gallica lue emerferunt. Sunt etiam qui dimidij scrupuli pondere deuorandum propinent admittis margaritis, aliois; quibusdam, quæ cor tueri non ambigunt, vbi quis Gallicis doloribus circa articulos conficetur. Datur etiam melancholicis, Armenij lapidis modo, vt libello, quem de morbo Gallico scripsimus, abunde dictum est: namque eosdem præbet effectus, vomitionibus expurgas. Sunt præterea qui purum syncerumque Argentum viuum hauriendum præbeant non modò adultis, sed pueris, & infantibus ætate tenellis. Siquidem Brasauolus Ferrariensis vir sanē hac ætate clarissimus, suo de stiripis examine per certo scribit, sæpius se dedisse Argentum viuum infantibus deuorandum: vt verum semimortuis, qui illico sanati sunt: idque scisse ait in vltima desperatione. Sed quomodo, vel qua mensura, vel pondere dandum sit, silentio inuoluit. Ac Goritenses obstrictes, vbi grauidæ diu in partu laborauerint, statim Argentum viuum scrupuli pondere nullis incommotis potandum exhibent. Quo fit, vt facili mihi persuaferim, Argentum viuum potantes haud necare, nisi pondus, vel mensuram excesserint. Non tamen crediderim, quōd solo pondere interimat, vt quidam putant Dioscoridem tantum securi, vt latius libro sexto differemus. Sed quoniam Argentum viuum nobis in mentem reuocauit A. V. V. M. omnium metallorum pretiosissimum, præstantissimumque, cum eius nusquam, quod exstet, meminerit Dioscorides, crederem proflantia, scdō non paucam naturæ rerum iniuriam à me illatam iri, si huius tam pretiosi metalli, cuius inextinguibili sui vniuersi affluat mundus, historiam, & facultatem silentio præterissem. quandoquidem ob ipsius splendescentem coloris nitorem, opinati sunt naturæ operū indagatores, admirabiles auro inesse facultates, quibus homines non modò incolumes tueri possint, sed & longæuos reddere. Quapropter mirum non est, si ipsius tanti faciat mundus, & ante cetera extollat homines. Auri itaque materiam nil aliud esse scribunt, quā substantiam

Argenti  
sublimati  
confectio.

Auribiffo  
ria, et pro  
flantia.

elementaria sibi inuicem proportionem respondentes. Hæ autem simul commixtæ, cum pari sint virtute conformata, aliud sanè gignere nequeunt, quàm amicabilem quandam, & optimam mitionem, quæ fermentatione, & coctione perficitur, quo fit, vt inde tam indissolubili nexu vniantur, vt permanentes, & ferè indissolubiles fiant, ad eò quòd, siue id eueniat ælestium corporum influxu, aut temporis vi, aut sagacissimæ naturæ opere, aut his omnibus vnà concurrentibus, conuertuntur eadem substantiæ in hoc metallicum corpus, quod vocant aurum. Hoc enim (vt diximus) ob sui tum ingentem temperiem, tum vnicatem, tum optimam mitionem, ad eò densum euadit, quòd non modò quandam communem consequitur permixtionem, sed incorruptibilem ferè temperiem, & causam quandam, ob quam superflui nihil continere possit. Hinc igitur est, quòd quanquam longioribus seculis aurum in terra, vel in aqua sepultum permaneat, nunquam rubiginem contrahit: sicuti in igne diutius permanens, non modò aliqua ex parte non comburitur, sed & depuratus, & splendidus efficitur. Ad hæc ob optimum sui vnitatem, nullo phlegmate, nulloq; pingui redundat: ita vt perpetuò fulgeat, splendidissimòq; perduret. Quin etiam tractatum manus nullo colore tingit, nempe croceo, aut nigro, quemadmodum cætera faciunt metalla, neque etiam aliquo odore, aut sapore gustantium, aut olfacientium tum nares, tum palatum inficit. Aurum intus in corpus sumptum, siue ex industria, siue incisus deoraneibus, nullam penitus infert noxam, vt complura faciunt metalla: sed mirum in modum cor, & vitalem facultatem roborat quod solis influxui acceptum plerique sapientes retulerunt. Quamobrem iure quidem dici potest, aurum omnium metallorum præstantissimum esse, ductile, colore lucido, illique persimili, quo cuncta à sole illustrantur. Insuper propria quadam attractrice vi poller, qua respicientium animos allicit, & disponit, vt ab ipsi illico desideretur. vnde quidam existimauerunt auro proprias quàm plurimas inesse dotes. In Italia propriæ sinceri auri fodinæ (quod sciam) nullibi extant. Atqui in Germania, Pannonia, ac Transilvania earum pluribus in locis habentur. Auri venam iis omnibus locis crediderim gigni, ubi cælum id causæ elementaris insuat, ac disponat, de quibus antea differuius. Huius vena variis lapidibus impacta visui in asperiorum montium visceribus. Verùm ea omnium præstantissima auri vena censetur, cui coruleus lapis fuerit admixtus: tantò enim melior hæc quanto ponderosior, & colore vigentior: ad eò vt illa cæteras præcellat, quæ pluribus auri guttis scintillet, vel in qua plures auri lineæ intercurrentes conspiciantur. Est etiam auri ferax diuersorum fluminum arena. Siquidem proculdubio cõstat in Hispania Tagum, in Thracia Ebrum,

in India Gangem & Pactolium, in Pannonia Istrum, in Germania Rhenum, in Italia Padum & Ticinum, aureas ducere arenas, à quibus arte quadam aurum omnium probatissimum elicitur. veruntamen non omnibus eorum locis aureæ eadem sunt arenas. Auri vires prodidit Auicenna secundo sui operis volumine, sic inquit. Aurum in omnibus suis partibus æquale est. Inferitur cum camentis, quæ atrabiliarijs competunt morbis. Ad hæc vbi actuali cauterio sit opus, ignitum aurum cæteris præstat metallis, quòd vlcus inde exortum citius confanescat. In ore contentum, anhelitus graueolentiam tollit. Auri scobis porphyrite lapide leuigata in ea medicamēta additur, quæ ad alopecias, & lichenas parantur, tam intus in corpus sumptum, quàm extra medicamentis exceptum. Hæc item eodem modo diutius leuigata, ad eò vt tactum ferè effugiat, oculis immittitur ad roborandum eorum aciem. Bibitur autem & ad cordis affectus, & animi morores. Argentum vium quod Latinis, *ὑδραργυρος* Græcis nominatur: Mauritanis, Zaibar, seu Zaibach: Italis, Argento viuò: Germanis, Quecksilber: Hispanis, Azogue. Gallis Vis argent. Aurum verò Latinis, *xyris* Græcè dicitur: Germanicè, Guld: Italicè & Hispanicè, Oro, Gallicè, Or.

*Auri Si.  
res ex Ani  
cenna.*

*Nomina.*

#### RUBRICA SINOPICA.

##### CAP. LXXI.

RUBRICA SINOPIS maximè probatur grauis, densa, ad iecinoris imaginem vergens, calculorum expert, concolor, cum diluitur, impenditò fusilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdam, expurgatq; defertur in Sinopem vrbeem, in qua venditur: vnde cognomentum accepit. Vim habet excitatoriam, quasi inducendo obstruentem, & adstrictoriam. quapropter vulnerariis emplastris, & pastillis excicatoribus, & adstrictoriis commiseri solet. Aliuū sistit, in quo sumpta, aut clystere infusa, datur iecinoris vitio laborantibus.

Hodie professò nēmīnem inuenio, qui doceat, & explicet, quæ nobis legitima sit Rubrica Sinopica. Sed quantum ega coniciere potui (et si id pro certo asserere non ausim) nullum è fossilium genere occurrat, quod magis Sinopicam rubricā nobis repræsentet, quàm vulgarissimus bolus Armenus vocatus, is nimirum, qui in quadras defertur massas, quiq; maximè vulnerariis medicis expetitur ad sanguinis profluuium cohibendum, & fracta ossa

*Rubrica  
Sinopica  
confide.*

*terrumi*

ferruminanda. Hæc rubrica (vt Georgius Agricola maximus fossilium indagator inquit) est iandudum ex Sinope Cappadociæ vrbe, vnde nomen inuenit, tantum importabatur, constat tamen alibi etiam reperiri, non modo in propriis venis, sed in aurariis, argentariis, ærariis, ferrariisque metallis. Hanc omnino mihi opinionem illud auxit, quod certo sciam plurimū pseudoboli Armenij ex ferrariis Iluz Tyrreni insulæ fodinis ad nos quotidie cōuehi: quod deinde colore sit iccinoris, pondere gravis, substantia densus: quod etiam in aquam coniectus facile dissiliat: quod denique fusui excidet, adstringat, & cogat. Hæc enim gleba, cum verus bolus Armenius non sit, nil aliud (meo iudicio) esse poterit, quam rubrica Sinopica, quanquam à Sinope non deferatur. Species Sinopidis (vt Plinius est author libro x x v. capite v i.) tres, rubra, & minus rubens, & inter has media. Quæ sanè differentia videntur pariter in vulgari Armenico bolo. Porro Manardus Ferrariensis libro tertio epistola quarta, Sinopice rubricæ meminit, quæ albo fit colore. Sed in hoc virum aliqui celebrem mirari subit, quod non animaduertit non posse albam quamuis terræ glebam Rubricam appellari. Rubrica, quæ Græcis *μαύρη ορεινιά*, Latinis pariter ac Italis Rubrica Sinopica vocatur: Arabibus, Mogar, siue Magra; Hispanis, Almagra.

RUBRICA FABRILIS.  
CAPVT LXXII.

RUBRICA fabrilis ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia, & Carthaginensis, lapidum experts, friabilis. Gignitur etiam in Iberia, quæ ad occidentem spectat, ochra exusta, & degenerante in rubricam.

Rubrica  
fabrilis est  
derivatio.

RUBRICAM hanc ideo fabrilē appellat veteres, quod ea plerunque vterentur materij fabri ad lineas prorrahendas insectis in ea funiculis. Nasci fabrilē rubricam in Lemno memorie prodidit Galenus, cum libro nono simplicium medicamentorum, tum etiam primo de antidotis, sed à Lemnia sphargide plurimum differre. Verum an communis vsus rubricæ, quæ vulgò Italis propriè dicitur Terra rossa, ea sit fabrilis rubrica, de qua hic meminit Dioscorides, cur pro certo affirmem non habeo. Quæ Græcè *μαύρη ορεινιά*, Rubrica fabrilis Latine dicitur: Arabibus, qui nullam faciunt differentiam inter hanc & Sinopicam, Mogar & Magra: Italis, Rubrica fabrilis: Germanis, Roe tel stein: Gallis A-canne, vel, Craye rouge.

LEMNIA TERRA.  
CAPVT LXXIII.

LEMNIA terra cuniculosa, in specu nata, à Lemno insula, palustri loco de-

fertur, inibi electa & caprino sanguini permista. quam incolæ cogunt in pastillos, & imagine capræ signant: vnde & sphragida ægos, hoc est, sigillum capræ appellauere. Vim antidoti habet contra perniciofa venena singuiarem: pota cum vino, & præsumpta euomi venena cogit. Contra ictus morfusque animalium, quæ exitiale virus ciaculantur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hanc ad sacrificia vtantur, est & dyfentericæ vtilis.

LEMNIAE terræ amplam in Italiani notitiam suo tempore attulit Galenus medicamentorum omnium diligentissimus inquisitor, quippe qui, vt hac syncerissima tandem potiretur, atque vt omnem impostorum fraudem detegeret, qui eam adulteratam vendebant, bis in Lemnum insulam nauigauit, vt eius verba testantur lib. i x. simplicium medicamentorum, vbi ita scriptum reliquit. At alia sunt terræ differentia ex diuersi generis corporum natæ commistione, quæ ratione lapidosæ, & arenosæ habentur: atque adsumit calium substantiam segregant largæ aquæ effusione ac maceratione, dum totum humidum efficiatur. Cum enim id effectum est, id quod deferretur, atque inest lapidosum, atque arenosum, id omne subsidit, & terra exacta supernat. Tale quiddam & in Lemnia terra videtur, quam cognominant: quidam milton Lemniam, id est, rubricam Lemniam, & alij quidam sphragida Lemniam, hoc est, sigillum Lemnium, ob impressum videlicet illi sigillum Dianæ sacrum. Siquidem hanc terram sacerdos cum patrio quodam honore sumens, hand mactatis animalibus, sed tritico, atque hordeo piamenti gratia loco redditus, in urbem comportat: quam deinde aqua macerant, atque in lutum humidum redactam, vbi valenter conturbauit, paulumque inde quiescere sinit, primum aquam, quæ supernat aufert, & mox quod sub ea est lutum tollit, ac reliquū duntaxat, quod ad imum subsedit, lapidosum scilicet, & arenosum relinquit, vt inutile, ac superuacaneum. Porro lutum illud pingue vsque eò defecit, dum mollis terræ consistentiam accipiat: huiusmodi exiguus acceptis particulis, sacrum Dianæ signum imprimit. Ac postea rursum in vmbra seccandum reponit, donec omnè planè humiditatem amittat, hæcque illud medicis omnibus cognitū medicamen Lemnia sphragis, siue sigillum. Sic enim quidam illam cognominant, vt dixi, ob impressum illi sphragida, hoc est, sigillum: ceu etiam nonnulli ob colorem Lemniam milton siue rubricam appellant: eundem enim, quem rubrica, colorem habet. Verum ab ea differt, quod contactu non contaminet atque illa: & secundum collem in Lemno, qui totus colore fuluo est, & in quo neque ar-

Lemniam  
terra bis-  
storia, ex  
Galeno.

Namini.

bor, neque saxum, neque planta nascitur, tantum huiusmodi terra visitur. Porro tres eius signantur differentie: vna quam posuimus terræ sacræ, quam alij nemini præter vnam sacerdotis contingere fas esset: altera verò eius, quæ re vera milto est, siue rubrica, vtuntur autem ea potissimum fabri: demum tertia eius, quæ extergit, qua vtuntur, qui lineæ, & vestes lauant, quibus vtique collibitum est. Cæterum cum & apud Dioscoridem, & alios quosdam scriptum legissem, Lemniæ terræ hircinum miseri sanguinem, atque ex luto, quod ea missione conficiebatur, sacerdotem quas vocant Lemniæ sphragidas tum conformatæ, tum consignare, cupiebam profecto & ipse miltonis modum inspicere, atque symmetriam. Itaque quemadmodum in Cyprum nauigauerim videndum, quæ in ea sunt, metallorum gratia, & in eam Syriam Palestinæ partem profectus fuero, bituminis & aliorum quorundam inspiciendorum causa, ita nec in Lemnum enauigare piguit, vt quantum sanguinis terræ admisceretur, cõspicerem. Nam cum iterum ex Asia Romam pedesstri peterem itinere, per Thraciam, & Macedoniam, prius à Troade Alexandræ in Lemnum adnauigauimus, nactus illic nauem, quæ ad Thessaloniam cursum destinabat. Conueniebam autem cum nauclero, vt in cursu Lemno appelleret. Et sine illi præstiti, sed non ad eam ciuitatem, ad quam oportebat. Antea enim nescieram duas esse in insula ciuitates, sed credebam, vt Samus, Chius, Cos, Andrus, Tenus, & omnes adeo, quæ in Aegeo sunt mari, vnam duntaxat ciuitatem habere, toti insule cognominem, ita & Lemnum vnam nominis sui habere ciuitatē. Porro vt ex naui descenderam, intellexi ciuitatis nomen esse Myrinæ, nec in regione ciuitatis illius aut Philocteris templum esse, aut facrum Neptuni collem, sed in altera, quæ vocatur Hephæstias, nec ciuitatem eam Myrinæ esse propinquam. Cùmque me nauclerus expectare non posset, discessi, vt cum Roma in Asiam redirem, tunc Hephæstias viserem: id quod feci, prout speraueram, & proposueram. Nam vbi ex Italia in Macedoniam traiecissem, eimque penè totam pedesstri itinere pertransissem, peruenissemque Philippos, quæ ciuitas est finitima Thraciæ, inde ad mare descendì, quod proximum aberat centum viginti stadiis: primūque Thalon transiis, distans plus minus ducentis stadiis, atque illuc in Lemno springentis, ac rursum ferme sepeingentis in Alexandræa Troada traieci. Ac proinde sine ex industria tum de nauigatione, tum de stadiis adscripsi, vt si quæ eadē, quæ me caperet Hephæstias visendi cupiditas, cognito eius situ, sic nauigationē institueret. In tota tanq; insula Lemno orientē spectat Hephæstias, occidentem verò Myrina. Et quod à poetâ dictum de Vulcanico est, qui Græcè dicitur Hephæstus, Decidit in Lemnum, propter colles naturam occasione sumpsisse fabulæ crediderim. Apparet enim combustio similis, tum

colore ipso, tum etiam quia nihil in eo nascitur. In hunc itaque collem sacerdos, quo tempore ego ad insulam accesseram, egressus, certo quodam trieci, hordeique numero in terram coniecto, aliisque quibusdam pro religione patria perpetratis, plaustrum totum terra impleuit. Atque vbi in vrbem conuenisset, quo dixi modo, illas fuma hominum adco celebratas Lemniæ sphragidas præparabat. Visum ergo mihi erat percontari, nunquid vquam antea hircinum, aut caprinum sanguinem huic terræ miseri solitum, memoria præditum accepisset. Quo audito, omnes in risum soluti sunt, nec ij sanè quiuis ex vulgo, sed viri oppido quàm eruditi, cum in aliis, tum præcipue in vniuersa partiæ historia. Quin & quodam librum accepit, quondam ab incolarum quopiam descriptum, qui omnem Lemniæ terræ vsum edocebat. Quamobrem nec me quoque piguit huius medicamentum periculum facere, acceptis sphragidum viginti millibus. Sed & his, à quo librum dono accepit, inter principes habitus, ad multa hoc vtebatur medicamine: siquidem ad vulnera tum vetera, tum cicatrici inducendæ contumacia: ad hæc ad morsus viperæ, atque adeo omnes ferarum morsus, necnon aduersus medicamenta lethalia, non antè modò exhibere, sed & post sphragide vti consueuerat. Addebat porro sese periculum fecisse medicamenti, quod quia fructum iuniperi accipit, *ἀνὰ τὴν ἀπερὶ τὴν νῦν ἀποκαλεῖται* nuncupatur, cui vtique debeatur & terra Lemniæ: vomitumque ciere aiebat, siquis cum etiamum in ventre lethale venenum haberet, alexiterium siue amuletum ebibisset. Et sine nos quoque huius fecimus periculum in lepore marino, & cantharidibus, cum sese tale quippiam accepisse homines suspicarentur: verum hausto, quod Lemniæ sphragida habebat medicamento, protinus omne euomuerunt, nec postea vllum illis accidit symptoma eorum, quæ ad leporem, & cantharides comitari consueuerat: tamen coniuncta esset perniciosorum medicaminum exhibitio. Cæterum an ad alia mortifera medicamenta, hæc inquam, quæ vocant deletoria, eandem vim habeat medicamentum, quod ex fructu iuniperi, & terra Lemniæ conficitur, mihi vtique ignotum est. At ille ab Hephæstias profecto asserbat, adeo vt & rabientis fænis morsum eam sanare diceret in vno diluto epotam: ac vltex ex aceto impensè acris impositam. Sed & aliarum ferarum colli, ex aceto sanare ferebat, extrinsecus solius herbarum insuper impositis, quæ putredini resistere didicimus. In primis verò prædica-bat scordium, deinde centaurium exile, inde marubium. Porro si quando nos sine ad vlcera cacoethæ, & putrida terram Lemniam adhibuimus, magnificè profuit. Vtus autem est, pro grauatis vlcibus magnitudine. Quippe id, quod grauiter olet, impenditque la-xum, molleque est, ac fœtidum, sustinet vt

Lemniæ  
terra vi-  
res.

vel per

vel per acerrimum acetum Lemnia terra in luto-  
 sam soluatur confistentiam, alium more pa-  
 stillosum, quorum alius alio vituridico autem  
 Polydæ, & Praxionis, & Andronis, qui nunc  
 dictus est, quem Betinum vocant. Siquidem  
 hi omnes valenter defecates profunt vlceribus  
 contumaciibus, soluti interim quidem in vino  
 dulci, interim sapa, interim ænomelice, non-  
 nunquam etiam alborum vinorum quopiam,  
 aut fuluorum, aut flauorū, prout nimirum vſus  
 postulat. Nam de talibus alibi definitur. Simi-  
 liter verò quandoque soluuntur aut ex aceto,  
 aut vino, aut aqua, aut oxymelte, aut oxycrato  
 aut melicrato. Porro Lemnia terra ex aliquo  
 comprehensorum soluta, medicamentum fit  
 idoneum tum recentibus glutinandis vulneri-  
 bus, tum medendis inueteratis, agrè ad cie-  
 atricem venientibus, & contumaciibus. Hæcenus  
 de Lemnia terra Galenus. Ex cuius quidem ver-  
 bis facile conici potest, Lemniam terram,  
 quàm ad nos hoc tempore conuehant merca-  
 tores Turcicis characteribus obſignatam, ille-  
 gitimam esse, & minime ſynceram. Quandoqui-  
 dem constat Galeni testimonio, Lemniâ sphra-  
 gidem impensè rufescere, non autem subruse-  
 scere, qualis hæc vſitur, quæ pàssim pro legiti-  
 ma, ſynceraque circumferunt impostores.  
 Quamobrem eorum sententiam minime impro-  
 bandam censemus, qui nil aliud esse Lemniam  
 terram putant, quàm bolum Armenium, qui  
 officinâ sephasiariorum Orientalis cognominatur.  
 præsertim quòd certò comperim, bolum  
 hunc non aduehi ex Armenia, vbi legitimum  
 ſyncerissimumque Armenium lutum nascitur,  
 sed tantum ex insula Lemno, ex eode sanè colle,  
 cuius meminit Galenus. Siquidem Armeniam  
 lutum, quod bolum quidam vocant, præter-  
 quam quòd ex Armenia adferri debeat, si Gale-  
 no medicorum principi credimus, colore est  
 pallido ochre insit, non autem impensè rubro.  
 Id quod ipse Galenus libro nono simplicium  
 medicamentorum in Samiæ terræ mentione tes-  
 tatur, his verbis. Cæterum durante hac im-  
 mani, & graui pestilentia, ex Armenia ea, quæ  
 Cappadociæ finitima est, data nobis est terra,  
 etiam ſecantior, colore pallido. Lapidem qui  
 donatur, non terram appellabat: promptissimè-  
 que in læuorem soluitur, ceu etià calx: sic enim  
 videlicet nuncupo petram combustam. Verum  
 vti nec in illa arenosum quippià admittum est,  
 ita nec in Armenia. Nam posteaquam in morra-  
 rio pistillo comminuta est, adeò est læuis, nec  
 plus est lapidea, quàm aut calx, aut Samius as-  
 ter: tunc non rorè vt asper læuis est. Itaque illo  
 etiam magis confissa est, minusque æriæ: quâ-  
 obrem opinionem, ac phantasmam præbet iis,  
 qui negligentius intuentur, quasi lapis esset.  
 hæc Galenus. Ex quibus sanè perspicuum fit,  
 quòd Armenia terra, siue lapis, vel lutum, ab  
 Armenio bolo orientali vulgò vocato, quàm  
 maximè distidet. Atqui, vt fraudes, & impostura  
 detegatur, atque palam fiat, non est silentio

diffimulandum, quòd qui Lemnum incolunt  
 mercatores, cum ſciant Armeniam terram ad  
 nos non aduehi, lucri proinde dulcedine affecti,  
 ex vna tantum terra duas conficiunt. Quippe  
 ſyncerissimum terram Lemniam extra insulam  
 Constantinopolim comportant, & pro Arme-  
 niaca vendunt, emporiis suadentes eandem  
 eò ex Armenia comportari. Quam verò in Lem-  
 no pro Lemnia exhibent, vt colore ab altera  
 differat, tam cuidam albæ terræ inibi nascentis  
 admiscunt: quo fit, vt longè minus quàm ſyn-  
 cera rufescat. Hanc itaque legitimæ sphragidis  
 loco supponunt, hisce adulteris permixta: quam  
 etiam sigillis obſignant, vt inde impostura ma-  
 ius lucrum accedat, signo magis, quàm medi-  
 camento fidentes. Cæterum cum hæc impostu-  
 ra à pluribus modò deprehensa sit, qui fraudem  
 non ignorant, relicta vulgaribus medicis, quæ  
 obſignata conuehitur, vbi Lemnia sphragide sit  
 opus, Armenium bolū falsò vocatum sumunt,  
 præstantissimum scilicet, quòd pro certò ha-  
 beant, hunc legitimæ esse sphragidem Lemniâ,  
 quam miris laudibus exulcere veteres ad vene-  
 na, & venenosum animalium ictus. Quare  
 inuigilent diligentissimi medici, quibus cordi  
 est hominum ſalus, ne hac in re decipiantur,  
 cum perdifficile sanè sit (vt libro primo de an-  
 tidotis memoriæ prodidit Galenus) ſynceram  
 sphragidem cognoscere ab adulterina. Verum  
 quandoquidem in Armenia terre sermone  
 deuenimus, non alienum fuerit, eius  
 etiamnum vires referre ex Galeno, qui eas loco  
 nuper citato in simplicium medicamentorum  
 censu subdidit, sic inquit. Armenia terra,  
 quòd summè defecet, ad dysenterias, & ventris  
 profluvia, tum sanguinis expuitiones, & cathar-  
 rhos, ad hæc ad putrescentia oris vlcera in pri-  
 mis competit. Quin & eos magnificè iuuat, qui  
 bus ex capite in thoracem fluxio decumbit:  
 quamobrem illis, quibus ex tali occasione affli-  
 ctus difficilis est anhelitus, valide prodest. Sed  
 & eos, qui phthoe laborant, adiuvat: vnicui enim  
 eorum defecet, vt haud etiam tussiant, nisi in  
 victu peccetur non leuiter, aut aer ambiens de  
 repente ad intemperiem recidat. Ac mihi vide-  
 tur, quòd sicut in fistulas sæpe confisimus,  
 non in aliis partibus duntaxat, sed in ipso etiam  
 ano, vt citra collyrii immiſsione, quod for-  
 dem, aut callum auferret, ipso duntaxat exi-  
 cante medicamine, contraheretur, ac clauderetur,  
 ita quoque in pulmonis euentat vlcere. Si-  
 quidem & ipsum ab exiccantibus iuuari medi-  
 camentis perinde conspicitur, vtiq; cum me-  
 dioere est, non admodum magnam. Itaque visi  
 sunt quidam eorum, qui talia habebant, prorsum  
 esse liberati. Ac quidam, qui Roma in Li-  
 byam talem ob causam profecti sunt: planè se  
 sanos esse crediderunt: & sanè vſque ad annos ali-  
 quot inculpate transigebant: postea verò cum  
 non pari degerent cura, & cautione, reditus  
 morbi apparuit. Hos ergo, vt dixi, bolus Arme-  
 nia euidenter adiuit. Quin & eos qui Romæ  
 agunt,

Limia ter-  
 ra quid sit  
 sentur.

Armenia  
 terra seu  
 bolus Turcæ  
 ex Gal.

FRAM. 3  
 impostura  
 detecta.

agunt, qui assiduo difficultate spirandi discruciantur, magis etiam. Porro in magna hac peste, cuius eandem facies fuit, arque eius, quæ Thucydides memoria grafabatur, quorū hoc medicamen bibere, celeriter curati sunt. At quibus non profuit, omnes interiere, scilicet eum nec alio quōvis iuauerunt. Vnde colligitur, quod iis dantur non fuerit auxilio, qui planè erant incurabiles. Ceterū bibitur ex vino consistentia tenui, modicè diluto, si aut planè febri careat, aut leuiter ea teneatur: sin grauius febrat, admodum aqueo. Non tamen calore vehemens sunt febres pestilentiales. Porro de vlcibus resicari postulantibus quid attinet dicere, quantum vim habeat bolus hæc Armeniaca? Liberum est autem vtrūque appellare velis, siue lapidem, vt is qui mihi donauit: siue terram, vt ego, quandoquidem humidis rigari patitur. Hactenus de Armenia bolo Galenus. Sed quoniam Lemnia sphragis, & Armenia terra, quod venenis maxime resistat, mihi in mentem redegerunt lapidem, quem Arabes suo idiomate Bezahar vocant, & contra deleteria medicamenta miris admodum laudibus celebrant, hic locus opportunus nobis visus est, in quo de huius lapidis historia, ac virtutibus aliquid disseramus. Lapis itaque ΒΕΖΑΗΑΡ, Mauritanorum testimonio, antidotum est omnium præstantissimum, sua speciali dote, contra omnia in vniuersum venena: vtpote qui non modò haustus, sed etiam adalligatus, ita vt nudam sinistri lateris carnem contingat, omnia superet venena. Lapis hic plurimum est generum, nempe flauus, puluerulentus, qui ex albo virefcit. Præstantissimus est flauus, deinde puluerulentus. Verū enimvero diligenter inspicere oportet, ne impostorum fallacis decipiat, qui hos lapides inquirunt. Sunt enim nonnulli alij lapides, qui hos facie repræsentant, sed virtutibus nullis præditi. Hunc Rafis experimento ductus, miris extulit præconiis, ita de eo scribens. Lapis Bezahar est mollis, coloris flauo, sapore nullo. Cuius peculiaris vis est, vt venenis omnibus aduersetur. quandoquidem ego contra haustum napellum hoc lapide vsus sum felici admodum successu. Erat autè hic colore flauo albicante, leuis, & luminis modo splendens. Equidem cerò testari possum (hoc enim pluribus experimentis compertum habeo) lapidem hunc longè magis præstare aduersus deleteria venena, quàm cætera non modò simplicia huiusce facultatis medicamenta, sed etiam theiaca dista, & alia quævis antidota. Subdit præterea Abdalanarach. Lapidem, quem vocant Bezahar, iam ipsi vidimus apud filios Almiram cuzodis legis Desipro quo lapide is magnificè, ac propè regiam zedem Cordube rependit, initio belli. Lapis hic (vt diximus) sic virtutibus contra venena omnia pollet, vt non solum haustus duodecim granorum pondere, sed vulneri impostus à mortiferis quibuscunq; feris ictos, statim liberet, veneno sudore expulso. Idem pa-

riter iuuamenti adfert, si ore aliquo tempore sugatur. Verū lapis hic inuentu difficilis fuerit, quod non desint paribus notis lapillis, qui tamen nullā vim habent aduersus venena. Sunt etiam, qui memorie prodiderint, in ceruorum oculorum angulis lapidem gigni, viribus Bezahar prædicto haud assimilem. Aiunt enim in orientali plaga ceruos longo senio consecutos serpentes deuorare, quorū esu (si vera scribunt) reiuuenescunt. At veneni superandi causa, serpentes deuoratis, in fluminum aquis ceruos illos mergi tradunt, capite tantum extra aquas exerto. Iis autem sic permanentibus, humorem quandam lentum ab eorum oculis defui, qui tandem solis ardoribus in lapillos subij concrefcit, glandis imaginem referentes. Hic itaque lapis ipse è fluminibus egredientibus, ab eorum oculis (vt aiunt) statim decidit in humum: vbi ab iis facillè reperitur, qui rem omni diligenter obseruauerunt. Sed an hæc historia vel fabula dici mereatur, rerum naturalium studiosis, & peritioribus iudiciū relinquimus. Terra Græcis χαλκίτης, seu χαλκή πύλη, & ὀφθαλμική, Larinis Lemnia terra, Lemnia rubrica, & Lemniū sigillum nominatur: Arabibus, Terimachem seu Thim machitū: Italis, Terra Lemnia: Hispanis, Tierra sellada.

ATRAMENTVM SYTORIVM.  
CAP. LXXXIII.

ATRAMENTVM sutorium genere quidem vnū & idem est molle, & cōcre tum: sed in specie differētiās tres habet. Vnum namq; humoribus stillatim in cuculculos quosdam colatis, cōcrefcit: quare ab iis, qui Cypria metalla conficiunt, stillatitium appellatur. Petesius ipsum pinarium vocat: alij stalafticon, id est, stillatitium. Alterū simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in excavatos scrobes, concrementum capefcit, quod pecton, id est, cōcretitū, propriè nominatur. Tertiū dicitur cōstille, & in Hispania fieri solet: sed inutile, ac inuali dissimū esse constat. Ratiō parandi hæc est. Aqua madefactum decoquit, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus coalescit, in complures formulas digestū, reserarū specie reddentes, quæ racematim inter se cohærescunt. Optimum esse creditur cœruleū, graue, cōcretum, translucent: cuiusmodi stillatitiū est, ab aliis loncho ton nominatum. Proximum concretitium. Cōstille verò ad insectus, & denigrationes, aptius cæteris esse cōpertum est: sed

Lapis  
Bezahar  
historia et  
vires.

Lapis in  
oculis cer-  
uorum  
testis.

Nomina.

est: sed ad medicinæ vsum inualidius esse, experimenta docent. Valet adstringere, calfacere, & crustas inducere. latas ventris tineas necat, drachmæ pondere deuoratum, aut cum melle linctum: vomitus ciet. aduersus hausta fungorum venena, ex aqua potum auxiliatur. purgat caput aqua dilutum, & in velle re naribus infusillarum. Vritur, vt paulò post in mentione chalcitis ostēdemus.

*Chalcanti generis, & historia.*

**CHALCANTHYM**, quod Latini Atramētum futuriorum vocant, quoniam vitri modo pel luceat, Itali Vitreolum nominant. Duo eius genera in Hetruria. Vnum fuisse, per sese in terræ visceribus concretum, quod vulgò appellant Coppā rosā. Alterum factitium, cuius passim est vsum, infectoribus expetitur. Præstat hoc plus, minusve tam pro regionum, locorum, ac cœli dispositione, quam ipsius fossiliis materiæ, à qua arte conficitur. Veruntamen compertum est, Romanum cognomento ( quancumque colore conficit diluore ) cætera facticij genera præcellere. Secundum locum obtinet Cyprium, materiei huic apud antiquos palma. Quod autem è Germania adfertur, omnibus in Italia infirmis habetur: sed quò sit colore cæruleo, nonnullis fallit. Cæterum chalcanti materiam, quoniam gustantibus linguam vellicet, aspero, adstringentique sit sapore, putauerunt quidam sulphureis, ferreis, ac æreis consistere qualitatibus, quinetiam aluminis, nitri, silisque. Chalcanti vena, quæ foditur in agro nostro Senensi pluribus sanè locis, præsertim maritimis in syluestribus plerumque vallibus, terrea potius, quàm faxea visitur, colore subcinereo, maculis nonnullis dispersa, quarum alie ferri rubiginem, alie æruginem, colore referunt. Hæc dum foditur, festidium, graueolentemque halitum eructat, sulphuris fere instar. quam ob causam in conclusis, concameratisque cuniculis nusquam foditur, sed aperto vndique cœlo. Quippe si in subterraneis foderetur speluncis, metallorum modo, ob acerrimum, fetidissimumque vaporem, fofiores noxio concluso spiritu facile interirent. Effossam itaque chalcanti venam in acerrum in longitudinem protrahunt, quandem super arcem exaggerant, vbi aperto cœlo fixa ad minus mensibus, imbris, roribus, prunis, foliisque die noctuque macerandam relinquunt: quo tempore statutis quibuscumque diebus lignonibus, & rassis acerrum dilacerant, subuertuntque & iterum in eandem congerunt aceruationem, vt facilius hæc imbris maceretur, coarcteturque solis ardoribus. Post hæc rectum acerrum superponunt, ne amplius in posterum pluuiis diluatur, neque solibus plusquam par sit, inarescat: & ita alii sex mensibus materiam hanc fermentari patiuntur. Eligunt deinde locum, quò facilius è propin-

quis fluuiis, vel fontibus ducantur aquarumque sub constructo tecto foditur alueus, qui ligneis afferibus, vel lateribus, & calce adeò stipatur, vt indita intus aqua nullo pacto prolabi possit. In hunc igitur alueum purissimam aquam deducunt, cui demum tantum illius chalcantis materiei addunt, quantum huic negotio additi metalli satis esse censent: pollea miscent: Aliqua temporis ligneis quibusdam instrumentis ad id parant, quousque aqua in se omne quod inest chalcanti receperit: deinde excrementa subfidere sinunt, donec aqua chalcanti prægnans claritatem concipiat. His peractis foramina quædam prope aluci fundum in latere facta, recluduntur: & inde exiliens aqua in magnum excipitur receptaculum. Hanc itaque sumunt, & in plumbeos alueos coniciunt ( cætera enim metalla ab ea eroduntur ) fornacibus quibusdam superpositis, & igne subdito feruorem exciunt, facitis horis. Demum ferri frustum immittunt vel aris: siquidem aiunt chalcantum nunquam concrefcere, nisi huiusmodi imponantur metalla, quæ iniecta paruo tempore colliquefcunt in aquam. Postquam autem debito tempore coxerint, ignem quàm primùm è fornace eximunt permittuntque quiescere decoctum, quousque egelidum reddatur, ne plumbeus alueus, eo sub lato, fornacis calore colliquefceret. Omnibus itaque repositis, decoctam materiam eximunt, & in alueos quosdam ligneos digerunt, vbi tandem concrefcit, aluminis rupei modo, siquæ chalcantum. Si verò aliquid superfit decocti, quod concrefcere nequeat, id totum iterum recoquant, eadem seruati ratione. Sed longè aliter quoniam fiebat Cyprium chalcantum, de quo Galenus lib. 1. x. simplicium medicamentorum, in hunc modum scribit. Forte fortuna & chalcantum in chalcitē transire conspexit.

Asportauit enim ex Cyprio & huius medicamenti ingenium copiam. Extimum eius omne post annos plus minus viginti chalcitis effectum est, intima eius parte chalcanti speciem seruante. Quamobrem & vsque in hunc diem quod sic mutatur, asseruo, obseruans dum ad imum vsque vno quoque anno procedat mutatio, ceu chalcitidis in miffy, vt est antè positum. Cæterum mirari subit de hoc medicamento, quo pacto vehemensissimæ adstrictioni admiffa est caliditas non influentia. Constat ergo quòd omnium maxime condire, seruareque carnes humidas potest, nimirum caliditate humiditatem absumens, atque adstrictione substantiam contrahens, atque conspiciens: hoc enim opere non nihil etiam humiditatis ipsius exprimit. Constringit verò, desiccat, atque contrahit in sese totius substantiam carnis. Porro quo tempore in Cyprio diuersabar, hunc in modum medicamentum hoc colligi conspexi. Domus erat magna quidem, non tamen alta, ingressi in metallum obiecta. Ad parietem autem domus fissum, qui erat ingreditibus ad manum dextram, effusus erat specus in continentem collē,

*Chalcanti generis, & historia ex Galeno.*



ea latitudine, vt tres sese viri in eo contingerent, tanta verò altitudine, vt viro summè procerò recto liceret incedere. Specus hic decliuus quidem erat, sed non planus, & multis locis preruptus. Porro ad fucm eius quasi in stadium porrecti, lacus erat aquæ viridis, & crassæ tepentis plenus. At in toto descensu calor similis, qualis in primis balnearum ædibus percipitur: quas, quæd in eis corpora præmolliiri soleant, promolateria appellare consueuerunt. Aqua verò quotidie putratim ex pertuso colle destillans, quatuor & viginti horis diei, ac noctis colligi affloet ad amphoras Romanas quasi octio. Eam aquam vincti quidam in vrnas quasdam quadratas fistiles in domo ad ingressum posita fitas, efferebant, in quibus paucis diebus concrebescere fiebat; chalcantum. Mihi verò vbi ad terminum effossi specus descendissem, vbi videlicet tepida hæc, viridisq; aqua colligitur, æris odor visus est suffocans, & toleratu difficilis, chalcitin, æruginemque redolens. Hæc aqua quoque gustu præstebat qualitatem eiusmodi. Ea propter, & nudi, & cum selinatione amphoras vincti exportabant, nec longiorem illic moram perferre poterant, sed celeriter recurrebant. Accessi autem erant medicoribus in specu interuallis lychni, qui nec ipsi longo tempore durabant, sed celerrimè exstinguebantur. Hunc ergo specum pedetentim excauatū multis annis ab his tunc audiui. Hæc enim, inquebant, aqua viridis, quam vides ex colle in lacum manantem, sensim se ipsa minor efficit solet. At vbi prope adest vt definat, rursum vincti, quod continens est ipsius collis, perfodere pergunt: euenitque aliquando olim, vt subito quicquid perfosum esset, consideret, omnesq; ad vnum occideret, ac totam viam corumperet. Id vbi fit, alio foramini fodiendo consueque insiliunt, quoad rursum aqua illis adsit. Hæc habui, quæ vbi de chalcantio exponenda censerem, & sanè fortasse non necessaria, ceterum quæ scire præstaret, quam ignorare. Memineris autem, quod ad sinistram manum ingredientibus conspectum nobis dixerim metallum foreos, chalciteos, & misyos. vt ex his conciere liceat, aquâ pluuiam totius collis terram illam colluere, atque abluere, ex qua sponte quidem fiebat sory, misy, & chalcitis: & per fornaces æs, cadmia, pompholyx, spodium, & diphryges. Hæc de chalcanti historia Galenus. Ex quibus palam fit, aquam virescentem illam, quæ æ monte in spelancam continuo diluicio desuebat, nil aliud extitisse, quam aquam, annuis imbribus in montem illum delapsam. Quandoquidem cum ob sulphureos, metallicosq; vapores, vniuersa montis moles rara effecta, vndeque innumeris meatibus scateret, non sanè nigrum videtur, si tractu temporis laboraret in imum, secumque deferret tenuior: æs chalcitis, misyos, foreos, tum etiam ærarie materię partes: ibidemque calefieret, ac decoqueretur, sulphureis, bituminosis, alijsq; metallicis ignibus in terræ visceribus.

conclusis: adeò vt tandem in cavernam illâ descendens, naturæ opera id fuerit assecuta, quod factitium chalcantii arte consequitur. Eam igitur ob causam in quadratis vasis extrâ paratis proiecta ea viridis aqua, in chalcantum coibat nulla adhibita conditionis ratione. Quinetiam opus non erat ferrum, vel æs in eam iniicere liquandum, vt concrebesceret, quemadmodum in factitio fit chalcantio. quippe quod dum per ærarij montis meatus laberetur, æris innumera ramenta secum deferrebat, quæ chalcitidis, & misyos, vbi ab ipsa aqua contracta, in eandem liquebant, argumento quod æruginis modo viridi esset colore. Ob id itaque statuerandum fuerit, Cyprum chalcantum concretum esse medicamentum ex chalciti, misy, sory, & ære confectum. Id quod manifestè declarat Galenus, cum ait. Memineris autem, quod ad sinistram manum ingredientibus conspectum nobis dixerim, metallum foreos, chalciteos, & misyos. vt ex his conciere liceat, aquam pluuiam totius collis terram illam colluere, atque abluere, ex qua sponte quidem fiebat sory, misy, & chalcitis: & per fornaces æs, cadmia, pompholyx, spodium, & diphryges. Hoc ego quoque maxime obseruari in quibusdam chalcanti fodinis in Tridentino agro, vbi chalcitin, misy, soryq; non ambigimus reperiri copiosa. Sed cum hæc non animaduertisset Brasauolus, vir alioqui huius ætatis clarissimus, dum imprudentia Galenum accusare contendit, eius sanè seipsum magis acuit. Quandoquidem vbi Galenus sibi examinandum proponit, eo scilicet loco, in quo scribit chalcantum esse Cypro a se aduentum, tractu temporis consensescens, factum esse chalcitin, dicit & factitium vulgare nostrum illud idem efficere: veruntamen si in aqua resoluator, iterum in chalcantum concrebescere, quod manifestè indicat in veram non transisse chalcitin: assensens hoc non expendisse Galenum. Verum in hoc videtur Brasauolus Galeni verba haud rectè percepisse, cum inquit, quod aqua, ex qua Cyprum fiebat chalcantum, terram vniuersam diluebat, è qua chalcitis, misy, soryq; fiebant in terræ visceribus. Siquidem nil aliud dixisse voluit Galenus, quam quod chalcantum esset chalcitis aqua dissoluta. Nam si chalcitis sponte proueniens in aqua soluta chalcantum efficitur, mirum sanè non est, si ex qua tractu temporis fit ex chalcantio, eundem præbeat effectum. Neque his obstat, quod quis dicat Cyprum chalcantum non solum ex chalciti fieri, sed ex misy simul, & sory. Quandoquidem (vt in proximo commentario dicemus) tria hæc chalcitis, misy, sory, ex ipsius Galeni sententia, eiusdem tum generis sunt, tum etiam facultatis. Chalcantum sponte, & per se in terræ visceribus constat, vnde sanè pulcherrimè misy nuper ad me Tridentino Martinus Gudortinus diligens peritissq; pharacopola, in pluribus laminis per vniuersam massam dissectum & misyos laminis ac eis semellitis fulgentibus, ope  
illas

*Brasauo-  
li Vasa ac  
cufatio.*

illas vnam ab altera diuisunt. Quod sanè maximum præbet indicium, chalcanthū hoc nil prius existisse, quā chalcitū, quæ Galeno teste, misy semper superstat. Cæterū illud nil miri nobis addert, quod cōmendauerit Dioscorides chalcanthum potū ac deuoratū ad latus alui tinea, & ad iungorū venena, est medicamentū erodens, & septicæ facultatis habetur. Siquidem ad eisdem, & alios vsus hoc tēpore non modò chalcanthū ipsum quiddā potui exhibent in pestilentia, sed etiā eius oleū, quod chymistæ vitreis organis magna ignium vi ab ipso chalcantho eliciunt, nullo sanè incommodo. Qui illud in peste propinant, quod vulgò vocant Capparosā, in aqua rosarum dissolunt, & iterum coquant, reteratis tribus, aut quatuor vicibus: tantq; obolū, vomitū concitantes. Quod Græci *χάλκανθον*, Latini quoq; Chalcanthū, & Atramentum furiorum vocant: Mauriani, Calcantum, Calcant, Calcand, seu Alcaleadis: Itali, Vetricolo: Germani, Kupfer vasser: Hispani, Caparosa: Galli, Coperose, vel Vitriol.

## CHALCITIS. CAP. LXXV.

CHALCITIS præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercurfantibus oblongis venis, splendentibusq; Huic absterforia vis inest, excalfaciens, & crustas vlceribus obducens: purgat, quæ oculis, & eorūdem angulishærent. In genere leuiter erodentiū est. Ad ignē sacrū, & vlcera, quæ serpūt, efficax est, sanguinē ē vāua, & naribus erumpentem, cum succo porri sistit. Gingiuarū vitia, depascencia vlcera, tonsillasq; eius farina cōpescit. Vltia, & cū melle trita oculorū medicamentis longē vtilior redditur. Cal- lum genarum, & scabritiam absumit, abstergetq; Fistulas tollit, collyrij modo in eas adacta. Fit ex chalcite medicamentū, quod Psoricon vocant, duabus eius partibus, cū vna cadmiæ additis, & ex aceto tritis, oportet autē in fictili obruere fimo diebus quadraginta, per Caniculæ ardores: sic enim fit ac- rius, idem quod chalcitis potest. Alij pares vtriūsq; portiones in vino terūt, & eadē prosequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, viuis carbonibus superposito. Modus autē vsionis in humidioribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare desierit, & perfectē inaruerit: in reliquis verò, dum mutata in floridū co-

lorē fuerit, & sanguineum aut miniatū colorē cōtraxerit, tum demū eximēda est. Insidens autē spurcitiæ statu expellenda, mox reponēda. Torretur etiā, num persatis carbonibus, vsque dū luteo colore palleascit: aut fictili subditis candentibus prunis, subinde versata, donec igni cōflagret, & colorē mutet.

## MISY. CAP. LXXVI.

MISY assumendum natione Cyprum, auri simile, durū, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet, & vsionem, cum chalcitide eandem, præterquam quod psoricum ex eo non conficitur, excessus, defectusque ratione tantum differens. Aegyptium autem cæteris præstat, vtpote quod efficacius habeatur, sed ad ocularia medicamenta multo supradicto inferius.

## MELANTERIA. CAP. LXXVII.

MELANTERIA geminæ est originis. quædam in faucibus cuniculorum, quibus æs eruitur, falsis modo concre- scit. Alia verò in summa facie supradictorum locorum coit, quæ terrena est. Quinetiam inuenitur in Cilicia, & aliis quibusdā regionibus, fossilibus quædam. Præstat quæ sulphuris colorem trahit, lauis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ cōfestim nigrescit. Vim causticam eam obinet, quam & misy.

## SORY. CAP. LXXVIII.

SORY existimantur aliqui melan- teriam esse, aberrantes: siquidē sui generis est sory, ei non ab simile. Verū so- rei virus inest graue, & nauseam mo- uens. Inuenitur etiā in Aegypto, & aliis quibusdā regionibus, vt in Li- bya, Hispania, & Cypro. Præfertur Aeg- yptium, quodq; frianti nigrius appa- ret, in multa foramina dehiscens, sub- pingue, insuper adstringens, & olfactu denotationeque magnum virtus olens, ita vt stomachus in vomitiones effun- datur. Quod autem friata in scintillas misyos modo non emittit, & alterius

Nomina.

Psoricon.



cogitatione repetens, & in metallo ita super chalcitū nasei ipsū misy, vt ærgo super æs, in mentē subit inspicere, quod seruabatur adhuc apud mærelisquū ipsius foreos, nunquid & ipsū vllam accepisset mutationem in chalcitū: & nonnihil cerē apparuit suspitionis vt videretur & ipsū forē longo tempore mutationem in chalcitū posse accipere. Itaque mirum non est tria hæc medicamenta eiusdem genere facultatis esse, sory dico, chalcitū, & misy, tenuitate, & crassitudine partium inter se diuersa. Crassissimū enim est inter ipsa sory, tenuissimū, misy, mediā vtriusque facultatē habet chalcitis. Adurunt vniuersa hæc tria, & escharas quas vocant, efficiunt. Atamen etiā si vrant, nonnihil quoque adstringit. Cæterū misy admorū carnibus duris, minus chalcite mordicat, tamen ea non minus fit calidū: verū id habet, quōd tenuium partium essentia fit. Porro cū vtriusque hæc in decoctionibus fundantur, & magis chalcitis, quā misy, sory tamen non liquefit, nimirum quōd lapidosus sit, ac vehementius compactū: sicut rursū misy, quia a congenito calore elaboratius est, ac proinde siccior chalcite, idcirco merito quoque ægrius liquefit. Et libro 11. de compositione medicamentorū per genera, idem Galenus ita scribit. Misy, & sory, vt didicisti, chalcitūdi genere cognata sunt, ex vna vt dicam radice producta, tenuius tamen apparet misy, ac minus mordax & vrens, crassius sory est, & vtroque siccior imbecillius. *Χαλκίτις* vt Græcis, ita etiam Chalcitis Latinis dicitur: Arabibus, Colchotar, seu Cholehotar: Italis, Chalcitis. *Μίσυ* verō Græcē, Misy item Latīne vocatur: Arabicē, Zeg, siue Zagi: Italicē, Misi. Quæ deinde Græcē *καλάνη*, Melantheria pariter Latīnis appellatur: Arabibus, Bāmiras, & Māldina: Italis, Melantheria. Quod denique *σόρυ* Græcē, sory similiter Latīne dicitur: Arabicē, Surie, Alsurie, seu Alsurī: Italicē, Sori.

## DIPHRYGES CAP. LXXIX.

DIPHRYGIS tria genera esse creduntur. Quoddam enim metallicū est, quod in Cypro sola gignitur: lutosum nanque extrahitur, ex luto cuiusdam inibi specus: extractū sole siccatur, mox circumpositis sarmentis vritur. diphryges, ideo vocatum est, quōd & a sole, & a sarmentis vritur, arescat, & ferme torreatur. alterum perfecti aris quasi subfidens fax est: siquidem post frigida aquæ offusionem, vt supra retulimus, cū de flore aris differeremus, sublato ære, fornacum ima parte coherens id genus inuenitur, & adstrictionem,

& gustum aris habens. Tertium sic fit. Lapidem pyriten, vt calcem multos dies cremant in camino: cūque colorem rubricæ contraxerit, eximentes reconducunt. Quidam tradunt hoc ex sola materia, quæ lapidem aris gignit, fieri: quando in dictis areis assata, & in scrobes tumulata peruritur. tunc enim ambientem scrobis locum comprehendit, & exemptis lapidibus nihilominus inuenitur. Præfertur, quod saporem aris reddit, æruginisque, adstringens, & vehementer excicans linguam: quod sibi exusta ochra non vendicat, quæ cremata diphrygis vice vanit. Vis eius adstringere, perpurigare, extergere, siccare, excresecientia consumere, vlcera serpentina, & quæ coehte vocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes terebinthina, aut cerato exceptum discutit.

DIPHRYGIS generis illud, quod perfecti aris quasi subfidens fax est, post frigida aquæ offusionem, vt Dioscorides inquit, sæpe ac sæpius vidimus in arariis fornacibus, Tridentino agro, & comitatu Tirolensi, ac inde etiam nobiscum deculimus. Sed quod è luto in Cypro illo specu foditur, vtriusque sarmentis: quod item è pyrite lapide calcis modo exustis coëstat: quod demum ex sola aris materia fit, cū in areis assatur, & in scrobes translata peruritur, hæc non mihi videre non liceat: nec eorum, quod sciam, speciatim meminit Galenus.

qui libro 1. x. simplicium medicamentorum de Diphryge in hunc modum differit. Diphryges mistam habet tum qualitatem, tum facultatem: habet enim in sese quiddam & medicocriter adstringens, & medicocriter acre. quamobrem vicerum rebellium optimū medicamentum est. Conuexi autem & huius medicamenti vim ingreditur ex Cypro Solis, vbi metallum ab vrbē atheni, quasi triginta stadiis. Proiectum erat enim in medio spatio ædium, quæ ante metallum extructæ erant, & vici, qui ei subiaceat. Quæ terū præfectus, ac procurator metalli, id quod post caditiam reperiretur, esse dicebat: nuntius itaque abiit, non secus atque vltimum in foco lignorum cinerem. Verū hoc mihi ad multa vltis factum est medicamentum, tum ad purrescentia oris vlcera, siue per se, siue cum melle, cui detracta sit spuma, tum ad anginam, videret vbi iam per adstringentiū medicamentum auxilium coëssit, quod infuscebat. Præterea columellam vbi præscussissem, ipso solo, & statim, & vsque ad cicatricem sum vsus: ac frequenter exactis oculis efficit cicatricem

Diphryges generis illud.

Historia, &amp; Cures ex Gal.

tum huius particulæ, tum omnium adeo exulceratorum: sic in viceribus omnibus pudendum, arque ani. Vfus autem similis est in oris viceribus: siquidem ex partes eisdem ferè medicamentis gaudent, nimirum calidè similitur, & humidè. Et libro 1111. de compositione medicamentorum secundum genera, sic inquit. Porro diphryges appellatur pharmacum, viceribus agrè humiditatis vitio ad cicatricem venientibus aptissimum est: validè nanque siccatur, etsi modicè mordeat. Enimvero id quoque præter acrem tum qualitatem, tum potentiam vim habet adstrictoriam. Quod Græcis *Διφρυγες*, Latinis item Diphryges, Arabibus, Diphrigis, Italis Diphrige nominatur, Gallis Marc de Bronze.

*Nomina.*

AVRIPIGMENTVM. CAP. LXXX.

AVRIPIGMENTVM in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimum existimatur crustosum, aureo calore micās, nulli materia permixtum in squamas fissile: quale in Mysia Hellepontii nascitur. Huius duo genera fluxerunt, vnum supra dictum est. Alterum glandis effigie, pallidum, & colore sandaracham imitans, glebosum ex Ponto, & Cappadocia deferitur, quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testa nona, vinis carbonibus subiectis, assiduèque versatur, donec igne flagret, & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumque reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem. Crustas cum vehementi vredine, & violento morfu excitat. reprimat quæ excresecunt, & capillos euellit.

SANDARACHA. CAP. LXXXI.

SANDARACHA probatur rufa, & saturatior, & aliena materia vacans. friabilis, cinnabaris colore: sulphuris virum redolens. Dos eadem, & vsus, quo auripigmento. Explet alopecias, resina excepta: & scabros vngues cum pice eximit: contra phthiriasin ex oleo efficax est, tubercula cum adipè discutit. Prodest ad narium, orisquæ vlcera, & cæteras papularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata. Datur ex mulso, purulenta extusiscenti-

bus. sufficit quoque cum resina, aduersus veterem tussim, rapto per fistulam nidore: vocem expedit cum melle delincta: suspiriosis cum resina in cataportio optimè datur.

AVRIPIGMENTVM, & Sandaracha, medicamenta sunt eiusdem tum generis, tum facultatis, nec inter se in alio differunt, quam quod alterum magis, alterum verò minus excoctum fuerit in terræ visceribus, ubi gignuntur. Vnde etiam sequitur, quod alterum altero tantum virum tenuitate præstet. Quandoquidem nil aliud est sandaracha, quam auripigmentum, quod maiori naturæ coctione colorem rubrum contraxit, & tenuius effectum est. Id quod periculo arte factio verum deprehenditur. quippe si fictili: vel vitreo vase vratur auripigmentum, substratis candentibus prunis, breui (vt mihi pluries experientia compertum est) flammæ, & summè rubens contrahit colorem, perinde ac sandarachæ: eòque magis, quod plus caloris fieri arte fuerit expertum, quam ipsa sandaracha natura vi fuerit affecta. Sandaracham summè rubens vidimus prænum Venetis in officinis, ubi auripigmentum, & cæteri veniunt colores pictoribus expetiti. Veruntamen animaduertendum est (vt superius libro primo diximus) quod hæc illa vulgaris Sandaracha non est, quæ Vernicè scriptoriam officinè appellatur: siquidè nil aliud hæc est, quam gummi juniperi. Errorum autem fecere neoterici illi, qui Mauritanorum nomina secuti (his enim gummi juniperinum sandaracham dicitur) idem gummi sandaracham nominauerunt: ita nomina turpiter confundentes, vt imperitis sæpe grauitur in rebus ipsis etiam præbeant occasionem. Quamobrem ubi in Arabum monumentis, vel eorum, qui Arabicam factionem in omnibus sequuntur, medicamentum aliquod repertum fuerit, quod Sandaracham excipiat, de juniperi gummi perpetuè intelligendum erit: ubi verò id in Græcis codicibus inuentum fuerit, ea quidem sine controuersia erit assumenda, de qua hic differit Dioscorides. Vocauerunt præterea recentiorum nonnulli Sandaracham quoque Sandyeem, quam è combusta cerussa cōficiunt, quod fortasse hæc colore admodum rubescat. Sed hæc ab illa (vt supra retulimus, cum de cerussa sermonem haberemus) viribus, & qualitatibus plurimum distat. Est & Sandaracha ceruginosi: melius genus, si Plinio credimus, qui libro x. i. cap. v. i. eius meminit. Cæterum illud non est silentio prætereundum, quod Arsenicum officinis crystallinum vocatur, ideo quod crystalli modo pelluceat, nō sit per sese, nec sponte nascitur in auripigmentis fodinis, vt scribit Vannoccus cuius meus in sua pyrotechnia, qui nos alias eius fidem secutos, in hunc suum errorem deduxerat, sed arte ex auripigmenti scobe admixto sale Sumunt enim artifices

*Auripigmentum, & Sandaracha consistit.*

artifices auripigmenti scobem, & cum pari salis pondere miscent, veruntq; simul, & subinde operculatis scitibus huic operi inservientibus, igni vi tandiu coquunt, quousq; id omne in subtile feratur, & operculo adhæreat, concreseatq; in lapidem; toties repetunt, donec adeo purum efficiatur, ut crystallum referat.

**Auripigmentum.** Auripigmenti vires reddidit Galenus lib. 1 x. simp. medic. sic inquit. Arthenicū, siue arsenicum facultatis est causticæ, siue vrentis, idque tam combustum, quam vitionis expertum.

**Sandaracha.** Cæterum id constat vitione reddi tenuiorum partium. Vtuntur porro eo, & ceu adurente ad denudandam pilis partem quavis. Verum si diutius infusetur, nec cuti etiam ipsi parceret. Idē de sandaracha eodem libro scribens, inquit. Sandaracha vrentis est facultatis, ceu arsenicū quod vocant. Merito itaque eam digerentibus facultatibus commiscetur, atque extergentibus. Metallicum, quod Græci ἀρσηνικόν & ἀρσενικόν, Latini Arsenicum, Arthenicū & Auripigmentum vocant; Mauritanii, Harneth, seu Zarnich; Itali, orpimento; Germani Auripigment, & operment; Hispani, Oropimente. Quæ verò sandaracha Græcè, Sendaracha Latine pariter & Italice vocatur; Arabicè, non secus acque auripigmentum, Harneth, & Zarnich.

**Nomina.**

#### ALUMEN. CAP. LXXXII.

**ALUMINIS** omne ferè genus in Aegypto, & in eisdem metallis inuenitur: etenim scissile quoddā, quasi slos glebosi intelligitur. Gignitur & in alijs quibusdā locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, & plerisq; alijs regionibus, sicut & rubrica. Plurimæ eius species: verum ad medendi usum scissile, rotundum, & liquidū expetuntur. Optimū est scissile, præsertim recens candidissimū, gustu perquam adstringens, grave olens, calculorū expertum, nec glebulosè aut assulosè compactū, sed sigillatim in capillamentā quadā canescitū dehiscens: quale est, quod trichites, quasi capillare nominatur, in Aegypto natū. Reperitur quoq; lapis huic alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, quod nō adstringat. Damnatur in rotundi genere, quod manu confectū est: sed ex figura deprehenditur. Assumendum autem snapte natura rotundum, bullis turgens, albo propius, atq; validius adstringēs, præ-

rerea nonnihil palloris cum quadam pinguitudine præ se ferens, sine arenis, friabile, natione Aegyptiū, aut ex insula Melo. Liquidū probatio, ut sit liquidum, lactem, æquale, & semper succo madens, sine lapidibus, atq; quēdā caloris igniculum expirans. Vim habent excalfaciendi, stringendi, & expurgandi, quæ caliginē pupillis oculorū offundunt. genarum carnem, cæterasq; excrecentias extenuāt. Scissile rotundo efficacius intelligitur. Vri, & torreri chalcitidis modo debent. Putrescentia vlcera compescunt: sanguinis fluxiones inhibent: gingivas humore prægnates comprimunt: motus dentiū cum aceto, & melle firman. Profunt cū melle vlcibus oris, eruptionibus popularū, & fluxionibus aurū, cum sanguinalis herbæ succo. Lepris conueniunt cum brassicæ folijs, aut melle coctis ite pruritui, & vnguim scabritiis, pterygiis, & pernionibus, aspersa cum aqua. Valent cum aceti facie, & galla, pari pondere cremata, ad phagedænas vlcerū: & cum salis duabus partibus, ad vitia, quæ pascunt. furfures, cū eruo, & pice illita absterguntur: lentes, pediculos, ambausta, cum aqua illita auxilio sunt. Contra tumores, & graue alarū, inguinūq; virus illinuntur. Ex Melo antè aduectum, mulieribus capiti ne concipiant, ante coitum ori vuluæ inditū: partus quoque extrahit. gingiuis, si caro excreuit, vis ac tonsillis accommodantur: ori, auribus, & verendis, cum melle illinuntur.

**TAMETSİ** scripsit Dioscorides plurima esse Aluminis genera, non tamen plura, quam tria hoc loco statuere cecenda, nempe scissile, rotundum, & liquidū: quod fortassis suo tempore iis tantum vterentur medici. Veruntamen hac ære officina complura habent genera, quauis rotundo, & liquido careant: nimirum Rupicum, quod vulgè vocant Alume di rocca: squamiforme, quod vulgè dicunt Alume scagiolotem: & vini siccæ confectum: nec non illud, Catium isdem vocatum: quibus accedit, quod plumeum appellant. quod tamen legitimum scissile non est, et si iandum cum cæteris rei metallicæ studio crediderim scissile

scissile alumen nil aliud esse, quam quod vulgo officinis vocatur Alumē di prima. Sed hoc (vt postea dicitur) nil aliud nunc esse censemus, quam lapideū amianum, quod gustu non sit adstringens, sed acri, quodēque igne nunquam comburatur, quod est amianci lapidis propriū. Legimus alumē scissile Piss. mītē ad me hoc anno clarissimus medicus Lucas Ghinius, notis omnibus referunt, quas illi reddidit Dioscorides, & gustu admodum adstringens. Quo postea factum est, vt diligentius exploratis plumei aluminis tum noris, tum qualitatibus, facili deprehenderim plumeum hoc non esse scissile. Ceterum Brasauolus de alumine differens in suo simplic. medicament. examine, nil aliud liquidum esse contendit, quam rupeum. Sed ab eo, licet viro eruditissimo, variat opinio nostra. Nam quod ego in

*Brasauoli  
opinio re-  
probata:  
item Fuch-  
sy error.*

Alumeris Pontificis maximi in Romano agro prope Tolsan per biennium moram duxerim, eo nimirum tempore, quo Augustinus Chisus opulentissimus mercator ciuis meus, illas aluminis fodinas à Pontifice emerat, æmula sanē mihi fuit facultas tum videndi, tum etiam discendi, quo artificio, quāue ratione, rupeum conficietur alumen. Quamobrem facili testari possum rupei aluminis materiam liquidam, fluxilemque non reperiri, sed lapideam: quin etiam non exponi æquis solibus excicandam, vt putat Brasauolus, quod sic (vt ipse inquit) scripserit Plinius liquidum fieri, & addensari. In eodem Brasauoli errore versatur etia Fuch-

*Aluminis  
rupes fa-  
ciat se ra-  
tia*

sus medicus aliqui eruditissimus: quippe qui putat libro de compositione medicamentorum Alumen liquidum esse illud, quod officinis rupeum, vel roche vocatur. Fit itaque Rupeum alumen ex durissimo quodam lapide, cuius duo obseruauimus genera: alterum durius, & rufescens: alterum vero mitius, & candidius. Quod autem est candido, fit lapide, albedinem feruat & crystalli instar translucens conspicitur. Alterum vero contrā rufescit, & maiore acrimonia pollet, visciatque solidius. Expectat candidum fericeorum staminum infectoribus: item iis, qui præstantiora lanozum vellera coccineū colorem tingunt, quod altero nitidius, minusque acre habeatur. Foditur aluminis lapis in rupe quadam aperto vndique caelo, non autem in concaueratis cuniculis. Ingens ibi fossorū caterua perpetuū commoratur, qui partim mucronatis lignonibus ex validissimo chalybe temperatis, partim ferreis malleis, ipsique ingenuibus, partim acutissimis cælis, cuneisque hunc lapidem frangunt, lacerant, scindunt, conterunt, ac diducunt, ea demum ratione, qua lapideæ operantur in ingenuibus lapidum, marmorumque fodinis, quæ ad magna effodiuntur ædificia. Transferuntur deinde confracti lapides in fornaces calcariis similes, ubi validissimis ignibus, eo sanē modo, quo calx, nocturno præsertim tempore iurantur duodecim, aut ad summum qua-

tuordecim horarum spatio: quippe si diutius vrentur, cuncta aluminis materia inaresceret. Postquam autem refrigerint, planstris in amplissimas areas sub dio, & solibus eos comportant, ibique in planos componunt acervos, hortorum toris persimiles, sed longē, lateque grandiores, latiore fundamento, quam veritice. Compositisigitur hoc modo in areis acervis, aquam quæ vtrinque continuè excurrit, in lapidum acervos mittunt, quibuidam excavatis instrumentis, è ligno constatis, his perquam similibus, quibus natæ suis è scaphis aquam eximunt, id tribus, aut quatuor vicibus quotidie repetentes, donec diuturna aquæ affusione, perusti lapides vsque adeo macerentur, vt in terram quandam lentore madidæ argille similem, permittentur: quod tamen non fit, nisi aqua perfluant, ad trigessimū sextū, aut quadragessimū vsque diem. Excavat præterea lignonibus terram hanc, & ad fornaces cortinisque, quas caldarias vocant, curribus item conuehant. Sunt autem caldaria sic dicte cortinæ admodū capaces, & super amplissimum æneum fundum patinæ instar, suppositam fornacem prius extructā vndique operientem, ex lateribus, & calce fabricatæ, & crusta quadā pertinaci vndique circumlitæ. Has itaque aqua replent, aquæ ductibus eò deductæ: deinde in subsidentem fornacem, validissimā succedunt ignem, vt demissa feruat aqua. Hoc cū factum fuerit, comportatam ex arenatæ ram in feruentem aquæ alumen coniciunt. Astant vtrinque bini robustissimi artifices, qui veluti remigantes, magis quibuscūque lignis instrumentis (pales vocant) continuè immisam terram aquæ commiscunt, quousque aqua omne aluminis materiā in se cōceperit. Subinde terræ recrementū, instrumentis, iam digitis trahunt ex alui fundo, & per propinquam ibi fenestrā in quandam aquæ riuulum proiciunt aliò deducendū. Quo facto iterū nouam superindunt terram, modo quo diximus commiscentes, & recrementum auferentes. quod tandiu proficiunt, quousque intelligant aquam tantū aluminis materiæ sibi adieuisse, quantum sar fuerit. Demum parumper quiescere dimittunt, vt si quid recrementi sit, in inum descendat. Mox calentem aquā alumine referant extrahunt, & suis æqueductibus ad id paratis in magnas quoddam capias ex querna materiæ fascias transferunt. Ibi enim octo dierum termino alumen conficitur internis parietibus inhaerescens adamancinis mucronibus simile, & crystalli instar pellucidum, ad quatuor, aut quinq; digitorum crassitiem. Alumine porro ita concreto, lixiuij reliquum (sic enim vocant decoctum) à quo secessit alumen, isdem aqueductibus è capis illis eximentes, ad caldarias ita ite vocatas, remittunt, id scilicet, quod clarū defæcatumque situm turbidum, & recrementum, aperto foramine in receptaculi fundo, tanquam inuile per riuulum defecit, & delabi sinant. Post

hæc aluminofum recrementum, quod minutis particulis granorum tritici inflatur ad fundum refedit, ad cortinas illas magnas iterum discoquendum comportant. Demum capſe fundo ſcopis omni ex latere mundato, quibuſdam ferreis, ligneisque inſtrumentis concretum in parietibus alumen deducunt, diductumque eximunt, & exemplum in vineis ſcissillis conſiciunt, & in quodam aqua alueo lauant, ſcissillis in aquam demerſis. Eximunt poſtea, & aqua excolata in acervum domibus aſſervant, ſalis modo. Ex his itaq; omnibus apertissime cognofci poteſt, rupeum alumen nullam habere cum liquido cognationem. Quandoquidẽ aſſerit Plinius libro x x v. cap. x v. ſieri liquidum ex aqua limoque, hoc eſt terræ exudantis natura: corruatũ hyeme, aſſitui ſolibus maturari. probari autem quod ſimplicium lacteumq; ſit, ſine offenſis ſiſcanum, cum quodam igniculo caloris. Si verò adulteratum ſit, deprehendi ſucco mali punici: quod ſyncerum ea miſtura nigreſcat. Sed hæc non inveniuntur in rupeo, vt quod magis glaciẽ, cryſtallumq; referat, quàm lacte fiat item ex durifſimo lapide, non ex limo: nec aſſitui punici ſucco nigreſcat, ſed longẽ magis pelluceat. Hinc igitur ſit, vt nõ modo a Braſiuolo diſſentiam, & a Fuchſio viris alioqui citra controuerſiam doctiſſimis; verum etiam a Cornario, quod & ipſe in commentariis in Galeni libros de compoſitione medicamentorum ſecundum locos, Braſiuolum fortaffe ſecutus, ſcripſerit, Rupeum alumen, quod vulgò vocat Alume di rocca, eſſe liquidum Græcis vocatũ. Verum eniuero liquidum Alumen, quin & ſciſſile, rotundum, placent, & plinthites nuper ad me miſit Bartolomeus Maranta Apulius, me dicus apprime eruditus, & medica materie ſtudioſus, atq; diligentifſimus inquiſitor, qui ex ſeſe Puteoliſ Campaniæ ſimpridẽ hæc omnia aluminum genera comperit, quæ ſine nullis, ni me fallit iudicio, notis à legitimis diſſident. Huic ergo viro torum aluminum cognitionẽ libentiſſimẽ acceptã reſero, & quas poſſum ago gratias. Scio tamen iſe ingentes deberi, qui vt ipſe ſua inuenta cum alijs quoq; communicare non grauantur. Liquidũ nem Alumen ex Ilia Tyrheni inſula aduectum, quodque manibus duſum lenteſcit, antea ad me miſerat clarifſimus medicus Lucas Ghinus, Pliniani deſcriptioni notis omnibus reſpondens, addeq; adſtringens, vt nunquam mentierem medicamentum ali-quod deguſtaſſe, quod guſtũ tantum addiſſectionis rectingeret. Porro quod rotundum Græci vocant, tamenſi non deſint, qui ſibi perſuadeant, id eſſe quod officina à facchari effigie zuecharinum appellat, ex crudo alumine rupeo, ouorum albo, & ſtillicitia roſarũ aqua paratũ; cum tamen non inueniatur rupeũ veteribus cognitum fuſſe, cur eorũ iudicio ſubſcribam nõ habeo. præferam quod legitimum nunc apud me ſit. Quod præterea Catinũ appellant, ex cuiuſdam placentiæ cinere, chali Minoritani vocatæ, co-

*Alumina  
cognita.*

hectur ad vitra in fornacibus expurgata. Plantã hæc nos vulgò vocamus Soda. Prouenit hæc (vt alibi ſcripſimus) in litoribus maris, ſaſſo admodũ ſapore. Cæterũ quod ex vini ſacce paratur, ſit cõformatis & ſacce panibus, deinde ſole ſiccatis, & igne tãdiu peruſis, quouſq; candor conceperint. Poſtẽmo Squamofum (ſic enim voco alumen illud, quod vulgò dicitur Alume ſcagliola) ex ſquamofa quodã ſit lapide, & vitri modo pellucido, qui nonnullis ſpecularis appellatur, quod fortaffe ſelenitis modo ſpeculi præbeat effigiem. nos Afni ſpeculũ dicimus. Hinc itaq; in igne conſiciunt, aut ferri laminis igne cãdentibus ſuper imponunt. Inefſus enim illico claritate deperdit, diſſilique in tenuiſſimas laminas, & gypli modo albefcit, cuiuſq; induit ſpeciem. Quãobrem maxime falluntur, qui ſibi perſuadent, inter lapidem ſpecularem, & Talcum vocatum nullam intercedere differentiam. Quippe (vt mihi quidem experientia compertum eſt) non ſine magno labore, & flagrantifſimo fornacis igne, Talcus inuri poteſt. Specularis lapidis puluis nondum ignem experti, miris laudibus quibuſdam effortur ad dyſentericos, in vino auſtero potus: exuſum enim non probauerim, quod gypli ſpecie induta, ſumentes ſtrangulat. Aluminũ vires paucis perſtrinxit Galenus lib. i x. ſimplicium medicamentorum, ſic inquires. Scepteria, huius medicamenti nomen ab adſtrictione deductum eſt: nam adeſt illi vehementiſſima. Cæterũ cum ſit craſſarum partium, tenatur quodammodo eſt aliis aluminum generibus, quod vocatur ſchiſſile, hoc eſt ſolilis: proxima eſt ſirongile, id eſt roſada, & aſtragalote. Admodum autem craſſa eſt tum liquida, tum placent, & plinthites appellata. Et libro i i i. de compoſitione medicamentorum ſecundum genera, idẽ ait. Omnes aluminis differentia vicia ſaris excoctæ generoſe adſtringẽtes, quare nemo ſolis iſis ad vicia vitatur. hæc Galenus. Sed non deſunt, qui Dioſcoridem ſecuti, alumen omne non parum excaſſare opinentur: contra verò qui cõcedant id omnino eſſe falſum, potius frigefacere ipſum exiſtimant. Galeni auctoritate freti, quippe qui libro i i i i. ſimplicium medicamentorum ſcripſerit, omnia quæ adſtriſſiora ſunt facultate, eſſe frigida, ac terreſtria. Verũtamen ſi rectẽ diligenterq; expendantur aluminum quorũcunq; effectus, & facultates, quibus in corpus noſtrum agunt, nemo quidem inſicias ire poterit, quin aluminis omne genus nõ obſcure excitat, quemmodum chalcanthum, chalcitis, & miſy: quæ eũ valde adſtringant, non tamen refrigerant, ſed maxime excaſſant, vt idẽ teſtatur Galenus libro primo de ſimplicium medicamentorum facultatibus, dũ inquit. Quin verò & Aſclepiades Metrodorus tanquam illum etiam lupere contendere aſſerendis de ſenſu medicis, cũ alia quædam, tum reſinam, & bitumen excaſſare nos denegat, atq; adſtringente omnia refrigerare dicitur, cũ ſi nihil aliud ſaltem

*Aluminũ  
vires ex  
Gal.*

*Opinio  
quædam  
diſtuta.*



chalcitis, chalcanthos, & misy, quæ valenter adstringunt, tantam affecta sint caliditatem, ut nos etiam exurant. Nihil est ergo mirandum, si prolixa quædam nugentur, seipsumque nonnulli fallant, cum de manifestis apparentibus, verum fateri non vident. Et libro 1111. de compositione medicamentorum per genera capite primo illud idem affirmavit, his verbis. Porro diphryges appellatum pharmacum vlceribus ægre humiditatis vitio ad cicatricem venientibus aptissimum est: valde namque siccit, et simodice mordeat. Enimvero id quoque præter acrem tum qualitatem, tum potentiam vim habet adstringentiam, quas tamen ambas fortiores, & chalcitis cruda, & chalcantum representat. Quin & alumen quodlibet vlcera satis exicat generose adstringens. Ex quibus locis citatis palam est, etsi Galenus lib. 1111. de simplicium medicamentorum facultatibus, scribit omnia adstringentia esse frigida, non tamen cum inter ea recepisse chalcanthum, chalcitiam, misy, diphryga, æruginem, & alia quædam, ut alumen omne genus: præsertim quod facile compertum habet, aluminis cuiuscunque dissoluciam aquam, maxime rupei, non modo carnem exedere, sed etiam metalla. Alumen quod Latinis, *gussapia* Græcis appellatur: Arabibus, *Seeb*, siue *Seb*: Italis, *Alume*: Germanis, *Alun*, & Alauu: Hispanis, *Alumbre*, Gallis, *Alun*

*Nemini.*

SULPHUR. CAP. LXXXIII.

SULPHUR optimum existimatur viuum, quod apyron vocant, nitedula modo splendidum, perlucens, minime lapidosum. Probatur in genere sulphuris ignem experti, quod viret, ac præpingue spectatur. Plurimum in Melo, & Liparagignitur. Supradictum sulphur calcfacit, discutit, & celeriter concoquit. Prodest tussibus, suspiriosis, purulenta exussientibus in ovo sumptum, aut suffitum: præterea partus vsti nidore extrahit. Lepras, lichenas, scabros vngues, cum resina terebinthina mistum auferit: cum aceto autem illitum, ad lepras efficax est: vitilignes tollit. Scorpionis ictibus, addita resina, medetur: cum aceto verò, draconis marini, scorpionisque plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpentes, cum nitro detersum sedat: regium morbum emendat, insparsum fronti cochlearis mensura, aut in forbili ovo sumptum. Facit ad grauedinem, & destillationes: sudores

quoque conspersum inhihet. podagricis cum aqua & nitro illitum, conducit. grauitatem auditus, suffiti nidore raptim per fistulam hausto, sanat. Lethargicos sufficit excitat: erumpentem vnde canque sanguinem sistit. Contusis auribus, cum vino & melle illitum, medetur

SULPHUR tam sponte & per se nascens, quod viuum appellant, quam arte in fornacibus factum, frequentissimum habetur in Italia: sed non omnibus vnus tantum color. quippe aliud viride, aliud luteum, aliud cinereum, aliud pallidum spectatur. Quod autem sponte fit, viuum appellatum, exterius colore est subcinereo, interius verò cum tangitur, subluteo, nitedula modo splendens, ut Dioscorides inquit: isdemque oritur locis, ubi facticij vena foditur. Est autem Sulphur fossicium medicamentum è pingui quadam terre substantia prognatum, ut in compluribus visitur locis, quæ impense calida sit, & secca: adeo ut à chymistiarum authoribus, igni natura simile Sulphur dicatur. Vocant id ij masculum semen, & primum naturæ agens ad omnia metalla procreanda. Cum autem calidum sit, & siccum, quincetiam pingue (ut diuturna constat experientia) maxi-

*Sulp. luvu  
considera-  
tio.*

mam cum igne trahit cognitionem: siquidem non flammæ ignium modis, sed penis quoque admodum, statim accenditur, nec vnquam accensum extinguitur, quousque pinguis, & oleosa eius substantia in vniuersum igni absumitur. Verum cuiusmodi est præ se ferat Sulphur temperamentum non obscure cadit, & siccitatem tamen credendum fuerit tam puram, synceramque id esse materiam, ut per se tantum consistere queat. neque etiam cogitandum, ei non esse necessarium, ut sibi humiditatem asificat, qua formam congruam suscipiat, quemadmodum mista quælibet exposunt. Id enim nobis indicat eius ve locissima, ac facillima diffusio, cum statim igni admodum colliqueat, metallorum modo. Foditur aperto vndique celo, non autem in cuniculis, & subterraneis specubus. In his namque tum vehementi calore, tum fecidissimo terræ halitu, fossiores illico deperirent. Porro effusa Sulphuris vena, scitilibus quibusdam magnis imponitur Romanis hydris non absimilibus, longo ab ore dependente rostro, intus vacuo, ac in humum spectante, vitrei pilei instar, quo stillacitæ aquæ conficiuntur. His itaque scitilibus sulphurea vena repleta, scitilibus pariter operculis ad id dirigenter collatis, conteguntur, stipanturque tenacissimo luto, creta, & equino stercore composito, ne tancillu quidè expirare possit sulphureus vapor. Hisperactis in formam crates duas ferreas intus habentem scitilia deferuntur, & in superlorè cratè firmantur, eodè luto vndique stipata, adeo ut ignis flamma, qui in infima accenditur cratè sub scitilium

*Sulphuris  
facienda  
ratio*

fundo,

fundo, nullo pacto in sublime ferri possit. Ad hæc scitilium rostrum in aliud vacuum scitile inferunt, per quoddam in latere orificiū, & eadem creta quā diligentissimè circumstant, obducuntque maximè. Denum ignem succendunt sub scitilium fundo, cuius vi depuratum sulphur in sublime scitilium fertur, & per rostri concavitatem in vacuum sibi adnexum descendit receptaculum, à quo tandem fluens eximitur, aperto in fundo foramine, & aliis vasis excipitur, ubi in magnos coit globos. Hac sanè ratione Sulphur fieri conspeximus in agro nostro Senensi in montibus non longè à balneis diui Philippi, & in maritimis apud Petriolum.

*Sulphuris vires ex Galeno.* Sulphuris vires memorie prodidit Galenus libro 1 x. simplicium medicamentorum, sic inquit. Sulphur omne trahedi vim possidet, effiq; temperamenti calidi, atq; essencie tenuis, adeo vt ad multa venenatorum animalium resistat. Siquidem ego aduersus pastinacam marinam, & draconem sexnumero eo sum usus, & cum id piscatores quosdam docuissim, reuer so post aliquantum temporis magnificè medicamentum hoc commendarunt. Vfus eius est, vt & sicum istui inspergatur medicamentum, & cum salina miltum: nam cum & hoc excogitissim, ab experientia comprobari reperi. Sed & vrina maceratum idem esse scitum excogitauit. Docebam enim piscatores medicamenta maxime parabilia, effiq; pulchre illos & cum oleo veteri, & melle, & resina terebinthina vsuros. Et sine horum omnium experientia iudicium præstitit. Quin & pforas, & lichenas, & lepras, non raro hoc medicamento cum resina terebinthina sanauit. Extergit enim omnes id genus affectus, absque vt in profundum repellat, cum alia multa medicamenta, quæ illos curant, miltum habeant potentiam, nempe vt aligerant pariter & repercutiant. Præterea, vt idem Galenus inquit lib. v. i. cap. 11. de compositione medicamentorum per genera, in compositione emplastris sic existat. Sulphur tanto calore prædictum est, vt ubi diutius inhaereat, procul dubio exulceret. Sulphur siue Sulfur Latinis dictum, Græcis *thio* appellatur: Arabibus, Cribrit, & Rabrie: Italis, Sello: Germanis, Schuebel, & Lebendiger: Hispanis, Piedra azufre, Gallis Soulfre.

*Nomina.*

PYMEX. CAP. LXXXIII.

PYMEX probatio, vt magnopere leuis, spongiosus, scissilis, nec arenosus, item teri facilis, & candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus, & ubi canduerit, extractus, vino restinguitur odorato: iterumque incensus, restinguitur: & tertia vitione exemptus, & per se refrigeratus, ad vsus conditur.

Vis eius adstringere ginginas abstergere, purgat cum calfactione, quæ pupilis caliginem offundunt: explet vlcera, & ad cicatricem perducit: exrescentia cohibet. Fit ex farina eius diffusivum. Corpori crustam obducit: auellendis capillis aptus. Theophrastus auctor est, si quisquam in bullientem vream vini pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

PUMICEM ambustum esse lapidem in montium concavitatibus, omnes ferè facientur naturæ operum exploratores. Ob id enim pumices sepius erudat mons Aetna in Sicilia, & in Campana Vesuvius, qui hoc tempore, annis nuper elapsis, non secus quā Plinius xrate, ingentibus flammis exarsit, cum magno Puteolorum, & adiacentium locorum detrimento, igne in terræ visceribus genito, & sulphureis vaporibus, & bitumine, quo quā plurimi referti sunt montes, eaq; præsertim, quod Græci pithulaphum dicunt. Pumicis vires duobus locis reddidit Galenus libro 1 x. simplicium medicamentorum, ubi de eo primum ita scribit. Si pumex inter lapides recenseri potest, & ipsæ eiusdem est facultatis, quod ceræ ad absterionem attinet, velut etiam singula testa, ac multo magis ea, quæ fornicium est. Sed siniris acrimonia quiddam obtinet: proinde causticis, & defecantibus facultatibus quiddam ipsum mi sent, effiq; quæ curant gingivas laxas, ac mollicie fluidas. Pumex autem si comburatur, haud erit inferior eosdem ad vsus sinire. Secundo autem loco idem de pumice disserit his verbis. Pumicem si inter metallica recensitas, calumnia buntur, quibus animus prurit accusandi libidine: celi inter lapides ponas, lapidem esse negabunt: ac multo minus terram esse concedent, nec marinorum haberi quodpiam. Atqui alicubi tamen de illo dicendum est: quippe qui in sarcocolla indatur medicamenta, & ea quæ dentes extergunt, partim vitione non expertus, partim etiā vsus, quando videlicet alius omnibus combustis similiter substantiæ efficitur tenuioris. Ceterum vitione quiddam acquirit acrimonia, quā rursus lotionē exuit. Videri autem poterit splendorem conciliare, non tantum faculata, sed etiam asperitate, velut etiam si sinirin, aut testā, aut hoc genus quippiā tritum admoucas. Quæ ceræ & ipsa splendorem afferunt, fortè etroque, tum quia detergendi habeant facultatem, tum quia asperitatem. Eundem in modum cornua densa dentes splendidos efficiunt. Pumex qui Latinis, & Græcis *thio* vocatur: Arabibus, Fanech: Italis, Pumice: Germanis, Eubins: Hispanis, Piedra pomez, Gallis, Pierre Ponce.

*Pumicis vires ex Galeno.*

*Nomina.*

## SAL. CAP. LXXXV.

SAL fossilis efficacior est communi ter, si est candidus, calculis vacans, & perspicuus, densus æquali compage. Peculiariter Ammoniacus natione laudatur, si modò findi facillè possit; & in recta segmenta diduci. In marino sale eligendus est candidus, æqualis, densus. Probatissimus in Cypro fit, & Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia, & Aphrica. Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur: sed multò validissimus est Phrygius nomine tapeus, aut tritæus, aut gantæus. Salis natura in commune perquam utilis est: adstringit, absterget, expurgat, dissipat, reprimat, extenuat, & crustas inducit. sed hoc interest, quòd alius alio sit præstantior. Quin & à putredine vindicat. Admiscetur medicamentis pforas abstergentibus. excrescentia in oculis reprimat, & pterygia consumit, ceterasque carnis extuberationes tollit. Clysteribus infunditur: discutit lassitudines ex oleo illitus. Contra hydropicorum tumores auxiliatur: dolores in oculis fortiter mitigat: & pruritus sedat, ex oleo & aceto infriçtus ad ignem, donec sudent: item lichenas, lepras, pforasque. Anginam ex melle, aceto, & oleo illicus leuat: tonsillis, uaque cum melle coctus. Vlcerebus in ore manantibus, gingiuis, quas humor vexat, & phagedanis vlcerebus, cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum iactus cum lini semine: contra serpentium morsus, cum origano, melle, hyssopo: aduersus cerasentum cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur: contra scolopendræ morsus, cum melle, & aceto: aduersus vesparum iactus, & teredines, albidasque capitis pustulas, thymos, & tubercula, cum seuo vitulino: furculos, cum uua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit: testium tumores, cum origano & fermento maturius concoquit. Crocodilorum morsibus auxiliatur, tritus in linteolo, & intinctus aceto, ita ut vinculis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, & ad sugillationes in

facie ex melle. contra haustum opium, & fungos, cum aceto multo bibitur. Lixatis imponitur cum farina, & melle: ambustis igni cum oleo impositus, pustulas erumpere non patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium doloribus, cum aceto. ignes factos, & vlcera, quæ serpunt, cum aceto, aut hyssopo illitus sistit. Vritur fistili, diligenter operatus, ne exiliat, conditusque prunis, vsquedum effervescat. Aliqui fossilem subacto polline obliniunt, & carbonibus subiciunt, vsquedum eius crusta exuratur. Solet & sal communis hoc modo vri. Aqua semel abluitur, & siccatus in ollam coopertam mittitur subdito igne, moueturque, donec iam nõ exiliat.

## SALIS SPUMA. CAP. LXXXVI.

SPUMA salis spumiosi maris lantigo, siue ramentum est, in exilibus petris inuentum. cui vis eadem quæ salis.

## MYRIA. CAP. LXXXVII.

MYRIA effectus salis præbet, abstergitque: dysentericis infunditur, etiam si nome intestina corripit: & ischiadicis veteribus. Ad forus, aquæ marinæ usum præstat.

## FLOS SALTIS. CAP. LXXXVIII.

FLOS salis flumine Nilo desinit: sacculus tamen quibusdam innat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari. interdum longè magis virus olet, gustusque mordacior, & pinguis lenius. Fecatus autem rubrica, aut scrupulosus, improbat. Præterea syncerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte, etiam aqua, diluente facitui colorem. Ad vlcera, quæ cacœthæ vocantur, & phagedanas, genitalium nomas, & purulentas aures, efficax est: oculorum hebetudines, cicatrices, albuginasque tollit. Emplastris, vnguentisque coloris causa,

vt rosaceo, miscetur. Sudorem cit, aluum turbat, in vino aut aqua sumptus: stomachum male habet. Additur acopis, & smegmatis, quæ albandi capilli gratia componuntur. Et in viuium acris est, & feruentis natura, vt sal.

*Salis vitæ  
nisi grauiter  
est coagulatus  
ratio.*

**SAL**, quo frequentissime in omnibus ferè  
citius vitur, & sine quo viuere nescimus, quo  
item ad annos asseruntur carnes, pisces, aliâq;  
complura, nullis sanè non cognitus est. Plures  
tamen in salis genere sunt differentie: quando-  
quidem præter marinum, fluuiatilis, lacustris,  
fossillique reperitur. Marino vitur vniuersè fe-  
rè Italia, exceptis Calabris, qui fossitum quam  
pulcherrimo abundant. quo etiam vitur vni-  
uersa Pannonia. In Germania hauritur è salis  
quibusdam fontibus, quorum aqua diu ignium  
vi excocta in salem cogitur. Fossitum officinæ  
Arab. secuta salem gemmæ vocant. Huius so-  
dinas vidimus apud Calabros agentes, loco, qui  
vulgò dicitur Altomonte, vbi lapidum modo  
exciditur, translucidus crystalli modo. Hic in  
igne concitatus præter cæterorum naturâ nec dis-  
siliat, nec exipit, sed vt ferrum ignescit. Lacu-  
strè hæcenus non vidimus, nec fluuiatilè, quan-  
quam Plinius libro x x x i. capite v i i. tra-  
dit plures haberi lacus, ac fluuios, qui salem co-  
piosum reddunt, vt eius verba, quæ subiiciam,  
aperitè testantur. Sal omnis, inquit, aut fit, aut  
gignitur. Vtrunque pluribus modis, sed causa  
gemina, coactio humore, aut siccato. Siccat in  
lacu Tarentino alius salibus, torridumque sta-  
gium in salem abit, modicum alioquin, altitu-  
dine genua non excedens. Item in Sicilia in la-  
cu, qui Cocanicus vocatur, & alio iuxta Gelam.  
Horum extremitates tantum inarescunt, sicut  
in Phrygia, Cappadocia, Aspendi, vbi largius  
coquitur, & vsque ad medium lacum. Aliud  
etiam in eo mirabile, quod tantumde noctu sub-  
uenit, quantum die aufertur. Omnis est talis sal  
minutus, atque non gleba est. Sunt etiamnum  
naturales differentie tres. Nanque in Bactris  
duo lacus valli, alter ad Scythas versus, alter ad  
Arios, iste effluat, sicut ad Citrium in Cypro,  
& circa Memphin, extrahunt lacu, deinde sole  
siccant. Sed & summa fluminum densantur in  
salem, amne reliquo veluti sub gelu fluente, vt  
apud Caspias portas, quæ salis flumina appel-  
lantur. Item circa Mardos, & Armenios. Præ-  
terea apud Bactros tamis Ochus, & Oxus ex  
appositis montibus deferunt salis raveria. Sunt  
et in Aphrica lacus, & quidem turbidi, salem  
ferentes. Ferunt quidem & calidi fontes, sicuti  
Pagasæi. Et hæcenus habent se genera ex aquis  
sponte prouenientia. Sunt & montes natui sa-  
lis, vt in Indis Oromenus, in quo lapidearum  
modo ceditur renascens, masculique regum ve-  
stigia ex eo est, quam ex auro, & margaritis. Ef-  
foditur & è terra, vt palam est, humore densa-  
to, in Cappadocia. Ibi quidem caditur specu-

larium lapidum modo. Pondus magnum gle-  
bis, quas micas vulgus appellat, Carrhis Arabiæ  
opido muros, domosque massis salis faciunt, a-  
qua ferruminantes. Invenit & iuxta Pelusium  
Ptolemæus rex cum castra faceret. Quo exem-  
plo postea inter Acgyptum, & Arabiam cetera  
squalentibus locis corpus est inueniri, & detra-  
ctis arenis. qualiter & per Aphricæ Scitania, vs-  
que ad Ammonis oraculum. Is quidem crescens  
cum luna noctibus. Nam Cyrenæici tractus no-  
bilitantur Ammoniaci, & ipso, quia sub arenis  
inueniatur, appellato. Similis est colore alumi-  
ni, quod schiston vocant, longis glebis, neque  
perlucidis, ingratus sapore, sed medicinz utilis.  
Hæcenus de sale Plinius. Cæterum Ammonia-  
cus sal, qui legitimus sit, ad nos conuehi desit:  
quippe facilius, ad æternitatemque est, qui passim  
in sepasariorum officinis venditur, plerumque  
è Germania allatus, nigricantibus exterius gle-  
bis. Non desunt tamen, qui credant constari  
hunc ex camelorum urinis, ærificio quodam  
concretis. Sed cur his adspicari debeam, non  
equidem video, præsertim cum Germania, vnde  
Venetias conuehitur facilius, camelos non  
habeat. Sepasarii, pariterque chymistæ sal Ar-  
meniacum appellant, quod forsasse exilliment  
ex Armenia adferri, vbi innumeri sunt camelo-  
rum greges. Sed isti, mea quidem sententia, hal-  
lucinantur. Serapio (Iach Arabici testimonio)  
scribit Salem Ammoniacum fieri è lapidibus  
durissimis, & translucidis. Sed & is fallitur, meo  
iudicio: siquidem Ammoniaci nomen non aliud  
de sibi comparavit, quam ab arenis, quæ ἄμμος  
Græcis dicitur, sub qua in laminas concretus,  
inuenitur in Cyrenæica regione. Venit præter-  
ea in medicorum vsum sal, quem Arabes Al-  
chali cognominant, item Alumien catinum, de  
quo superius in alumine diximus. Sal autem  
Indus appellatur (vt libro secundo retulimus)  
nil aliud antiquis extitit, quam saccharum in  
sacchariferis arundinibus in India gemmæ mo-  
do concretum, cuius nunc loco vitur suppo-  
sitio, quod Sepasæiæ zoecharum canditum vo-  
cant. Verumtamen animadvertendum est, quod  
quancum Paulus, & Auicenna cum fortasse  
fecutus, concretum natura saccharum salem  
Indum appellant, non tamen fuerit putandum,  
quod Indi legitimum salem non habeant. Quan-  
doquidem (vt Plinius est auctor) in Oromo  
Indi monte lapidearum modo fuditur  
ingentibus glebis, proinde dicebat Mesæus  
de sale scribens, Naphthicom, & Indicum cæte-  
rosales præcellere. Quod autem Salnitrum  
vocat, tormentorum bellicorum pulueribus  
experitum, vulgaris notitæ est, de quo tamè  
latius sequenti capite sermonem faciemus. Cæ-  
terum salis spumam pluries legi quibusdam in  
scopulis Tyrrenici maris. Cum enim procella  
exoritur, tumescitque pelagus, spumantes  
aque in altum sublatæ, scopulorum cavitates  
replent, quo fit, vt ibi sub diu remanentes soli-  
bus, & rore, æstiuis caloribus, in salem album  
concreta x

*Sal Aræ  
770 G. 7. 142. 144.*

concreſcant. Muria porrò, qua innumera aſſeruantur edulia, nota omnibus res eſt, vt quæ ſale tantum, & aqua conſtituat. Sed quidam veteribus ſlos ſalis fuerit, decernere non auiſim, neque plura quod ſcribam habeo, quàm quæ à Dioſcoride produntur. Eius tamen meminit Plinius loco ſuprà citato, ſic inquit. Salinarum ſinceritas ſummiſſim facit ſuam differentiam. Quidam enim ſauilla ſalis, quæ leuiſſima ex eo eſt, & candidiſſima ſlos ſalis appellatur. Et ſlos quidem ſalis, in totum diuerſa res, humidioriſque naturæ, & crocei coloris, aut ruſi, veluti rubigo ſalis. Odore quoque ingrato, ceu gari, diſſentiens à ſale, non modò à ſpuma. In Aegypto inuenitur, videturque Nilo deſerri, & fontibus tamen quibuſdam innatât. Optimum ex eo, quod olei quandam pinguitudinem reddit. hæc Plinius. Porrò quod ruſe rubiginis inſtar piſcoribus expectitur, è Germaniæ ſalinis ad ueſus, qui fortaiſe ſlos ipſe ſalis fuerit: nam colore, & ſapore illi non obſcurè reſpondet. vulgò appellant Morello di ſale. Verùm cur non hoc planè aſſirime, illud mihi obſcurè video, quòd color is non ſit liquidus, neque oleoſus, ſed aridus. quare potius inclinat animus, vt ipſum credam eſſe ſalis rubiginem, de qua ex Plinio paulò ante mentionem fecimus. Fuchſius medicus ingenio & eruditione clarus, in libro de compoſitione medicamentorum, quem auctum ſecundo edidit, nihil aliud eſſe putat florem ſalis, quàm Dioſcoridi *ἁλὴ ἄρτερ* dicitur, quàm balenarum ſemen, quod Germanis medicorum officiis Sperma ceti nominatur. Qua in re is fortaiſe ſecutus eſt ſententiam Georgij Agricolæ re metallicæ acerrimi indagatoris. Sed vtuncque ſit, non equidem poſſum horum quantum eruditorum viroꝝ iudicio ſuſcribere, nam res illa tantum abeſt, vt ſit crocei aut ruſi coloris, vt etiam candida conſpiciatur. Adde, quòd ſlos ſalis Dioſcoridi & Plinio flumine Nilo deſuit, & Iacubus ſeu fontibus quibuſdam innatât: hoc autem Sperma ceti vocatum in mari colligitur, atque etiam in paludibus maritimis inuenitur. Id forè à maximis illis piſcibus effunditur: quod tamen non ita liquidum præparat, vt de flore ſalis Galenus memoria pro dicit. Salis autem meminit idem Galenus tum inter ſoſſilia medicamenta, tum etiam inter ea, quæ in mari naſcuntur, libro 1 x. & x i. ſimplicium medicamentorum, ſic inquit. Sal eiſdem genere ſciculatilis eſt, ſiue ſoſſilis ſit, ſiue marinus: verùm hoc differunt, quòd ſalis e terra eſſoſſi ſubſtantia magis ſit compacta: ac proinde in hoc maior eſt, & partium craſſities, & adtingendi potentia. Itaque marinus aſſuſa ipſi aqua protinus liqueſcit, ac ſoſſili hoc non euenit. Porrò eiſdem ſpeciei cum marino eſt, qui in ſtagnis quibuſdam falſedinem habentibus naſcitur, ætate videlicet aquis ætlu ex iis abſumptis, cuiuſmodi eſt Tragafus non procul à Sminthio. Conſiuit enim illic ante aquas ſpontaneas, quæ admodum ſunt calidæ, copio-

ſa aqua ſtagnans, non amplo in loco: & ea, æſtate omnis abſumitur, à ſole videlicet æreſcât. Porrò quoniam locus ipſe falſedinem natium continet, quod reliquum eſt eius omne, ſal eſt, cognominationem à loco pariter & aquis fortitus. Nam ſpontaneæ & ipſæ illis in locis aquæ Tragafæ nuncupantur, potentia ſummè excitatoria: & ſanc, qui in ea regione ſunt medici, ad hoc illas accommodant. Porrò dictum eſt & de Sodaminis in mari mortuo proueniuntibus in quarto libro, quoniam ſiquis librum diligenter perlegerit, illi tantum reſcribere memoriam nunc opus eſt, vt expoſita guſtus qualitate, ipſe medicamenti facultatem cognoscat. Igitur cum qualitas ſalſa digerat, ſimul & contrahat contactum ab ipſa ſubſtantia, vocatum aphrolitron in hoc diſert, quòd in ipſo vnum modò ſaporem exuperantem expreſſè ſit videre, quem vocant amarum, vim habentem digerendi, hand etiam contrahendi, vt ſal. Nam hic quicquid in corporibus humidum ineſt, id totum quoddammodo abſumit: & quod reliquum eſt ſubſtantia ſolidæ, adſtriſtione contrahit: ac proinde etiam conditura ſua corpora ſeccat, & à putredine tuerit. Quippe quæ patreſcunt, excrementitium continent humorem, ſubſtantiamque tum diſſolutam, tum minime compactam. Quibus ergo corporibus nulla proriſus eſt humiditas ſuperflua, ceu melli optimo, & corpus ſolidum, & compactum eſt, ceu lapidibus, ea vt putreſcant eſt impoſſibile: ac proinde in iis ſalis non probatur vſus, veràm in iis, in quibus ſuſpecta eſt putredo. Spumofa autem ſalis effloreſcentia multò tenuioris naturæ eſt, quàm ſal ipſe, quare & extenuare, & digerere multò plus ipſo poteſt: verùm quod ſubſtantia eſt reſliquorū, contrahere vt ſal nequit. Cæterum ſlos ſalis medicamentum liquidum eſt, tenuius etiam, quàm ſal vſuſtrum: acris qualitatis, & admodum digerentis facultatis. hæc tamen de ſale Galenus. Sal Latinis dictus, ἀλὴ Græcis appellatur: Arabibus, Melech, ſeu Melha: Italis, Sale: Germanis, Salz: Hiſpanis, Sal: Gallis, Sel.

Nemina.

NITRUM, SPUMA NITRI.

CAPVT LXXXIX.

PRAEFERTVR Nitrum leue, roſeo colore, aut candido, in foramina dehincens, perinde quaſi ſpongioſum quiddam, quale ex Bumis adfertur. Humores euocat, qui in alto cōcreuerunt. Spuma nitri optima eſſe putatur leuiſſima, gleboſa, friabilis, colore penè purpureo, aut ſpumofa, & mordens, qualis ex Philadelphia Lydiæ deſertur. ſecunda eſt Aegyptia. quin & in Magnesia Cariae gignitur

Fuch. opinio improbat.

Sals. Gal. res ca. Gal. iena.

gignitur. Vim, & vitionem salis, habet, tam nitrū, quam spuma eius. Præterea nitrū tormina sedat, si tritum cum cuminobibatur in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus, quæ inflationes discutere possunt, vti ruta, vel anetho. Febribus circuitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accensionē. Miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutunt, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua autem calida, aut vino infusum, inflationes, purulentas aures, & sonitus earum dem sanat: sordes expurgat, cum aceto distillatum. Canum moribus ex asinino adipe, aut suillo medetur. resina terbinthinæ admistum furunculos aperit: aquæ inter cutem cum fico illinitur: oculis ad claritatem visus cum melle succurrit: & venenis fungorum, ex posca potum: aut si buprestis momorderit, ex aqua: iis verò qui taurinum sanguinem biberint, ex laserpitio: iisq; qui cibum non sentiunt, vitiliter obducitur: opisthotonisq; iam remissioribus, & luxatis cum cerato: in linguæ resolutione, pani commodè permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus vrunt, subiecta prius testa noua, donec incandescent.

*Nitri, & spuma nitri confid.*

**NITRUM**, & nitri spuma, quorum antiquis maximus fuit in medicamentis vsus, diu sanè est, quòd ad nos conuehi desierunt. Proinde hallucinantur, mea quidem sententia, qui putant Salnitrum vocatū, quòd ad tormentorum belliscorum pulueres vruntur, & ad fortissimas aquas coñficiendas, quibus argentarij fabri aurum ab argento separant, verum ea legitimum esse nitrū, cuius meminere Theophrastus, Dioscorides, Galenus, Plinius, & antiquorum alij. Siquidem id manifestè demonstrat Plinius lib. x. c. x. cap. x. vbi de nitro ita scriptum reliquit. Non est differenda & nitri natura, nō multum à sale distans, & eo diligentius dicenda, quia palam est & medicos, qui de eo scripsere, ignorasse naturam, nec quoniam Theophrasto diligentius tradidisse. Exiguū sit apud Medos, canescensibus siccitate conuallibus, quod vocat halmirhaga. Minus etiam in Thracia iuxta Philippos, sordidum terra, quod appellant agrium. Nam quercu clementa, nunquam multum saturatum est, & iampridem in totum omissum. Aquæ verò nitrosæ pluribus locis reperiuntur: sed sine viribus desunt. Optimū copiosumq; in Clysia Macedoniæ, quod vocant calatricum, candidum, porumq; , proximum salii. Lacus est

nitrosus exiliente è medio dulci fonticulo. Ibi sit nitrū circa Canis ortum nouenis diebus, toridemque cessat, ac rursus innatit, & deinde cessat. Quo apparet soli naturam esse, quæ gignat: quoniam compertum est, nec soles proficere quicquam, cum cesset, nec imbres. Mirum est & illud, scatebra fonticuli semper emicante, lacum nec augeri, nec effluere. Iis autem diebus, quibus gignitur, si fuerit imbres, salius nitrū faciunt, aquilones deterias, quia validius commouent limum. Et hic quidem nascitur. In Aegypto autem conficitur multò abundantius, sed deterius: nam fuscum, lapidosumq; est. Fit penè eodem modo, quo sal, nisi quòd salinis mare infundunt, Nilum autem nitrariis. Excedente Nilo siccantur, decedente madent succo nitri quadraginta diebus continuis, non (vt in Macedonia) flatis. Si autem imbres adfuerint, minus de flumine addunt, statimq; , vt densari est coeptum, rapitur, ne resoluatur in nitrariis. Sic quoq; olei natura interuenit. Ad scabiem animalium vtilis. Ipsum autem conditum in aceris durat. Mirum in lacu Ascanio, & quibusdam circa Chalcida fontibus, summas aquas dulces esse, potariq; , inferiores nitrosas. In nitro optimum, quod tenuissimum, & ideo spuma melior. Ad aliqua tantum sordidum, tanquam ad inficiendas purpuras, instecturasq; omnes. Manus & nitro vsus, qui dicitur suo loco. Nitraria egregie Aegyptiis: nam circa Naucratin, & Memphim tantū solebant esse. Circa Memphim deteriores: nam & lapidescit ibi aceris, multique sunt tumuli ea de causa facti. Faciunt ex iis vasa, Necnon frequenter liquatum cum sulphure coquentes in carbonibus. Ad ea quoq; , quæ inueterari volunt, illo nitro vuntur. Sunt ibi nitrariae, in quibus & rusum exit à colore terræ. Spumam nitri, quæ maximè laudatur, antiqui negabant fieri, nisi cum ros cecidisset, prægnantibus nitrariis, sed nondum parientibus. Itaq; non fieri incitatis, etiamsi caderet. Alij operimentorum fermento gigni existimauerunt. Proxima æras medicorum Aphronitrum tradidit in Asa celis in speluncis mollibus distillans, specus eos Calycas vocant: dein sole siccant. Optimum putant Lydium. Probatio, vt sit Minimè ponderosum, & maximè friabile, colore penè purpureo. hoc in patellis affertur. Aegyptium in vasis picatis ne liqueat. Vasa quoq; ea sole inarescentia persiciuntur. Nitri probatio, vt sit tenuissimum, & quim maxime spongiosum, situlosumq;. Adulteratur in Aegypto calce. Deprehenditur gustu: syncerum enim faciliè resoluitur: adulterum pungit. Calce aspersum, reddit humorem vehementem. hæc Plinius. Ex quibus liquido constat, nostri vsus Salnitrum, antiquorum nitrū non esse, est inficius eundem non sit, quin aliquas nitri habet qualitates. Veruntamen nemini vnquam persuasum velim, vt medicamentis, quæ intus in corpus sumuntur, nitri loco Salnitrum absque noxa imponi possit. Et quantis

*Alomach-  
rū error.* contrarium afferant, scriptisq; tradant Mona-  
chi illi reuerendi, qui Mesuem commentati  
sunt, non tamen credo, hoc id prius in se ipsis  
expertos esse. Quod nihilominus eos facere  
decebat, si fraterna charitate ducti sunt, ut aliis  
sunderent salnitrium euto assumi posse, cum pri-  
ma charitas (quod dictum frequenter usurpant)  
incipiat a seipso. Nitri meminit Galenus libro

*Nitri, &  
aphroni-  
tri error  
ex Gal.* 1 x. simplicium medicamentorum, sic inueniens.  
Nitrum dictum est supra in medio esse aphro-  
nitri, & salis virium: ceterum vsum proprius  
ad aphronitrum accedit, ut ipse exustione re-  
nuius redditum. Desiccatur itaque, & digerit: & si  
introd in corpus sumatur, secatur, & extenuat cras-  
sus lentosq; succos potentius multo quam sal.

Aphronitrum verò nisi grauis urgeat necessitas,  
nemo deuorabit, nimirum inimicum stomach-  
o: quandoquidem plus etiam litro incidit.  
Sed ad fungos suffocantes, rusticus quidam eo  
uti affollet, & semper profusius probatum est.

Ceterum nitro vsto, simul & nō vsto, & multo  
etiam magis eius spuma, & nos in talibus vti  
consecuimus. haecenus Galenus. Qui tamen  
videtur iis, qui codicis mendam non animadu-  
uerunt, maximam facere differentiationem inter  
Aphrolitrum, & Aphronitrum, licet hæc re di-  
uerfa non sint. Nam vbi de Aphrolitro libro  
citato differt, vulgata exemplaria habent. *appi-  
-tū, angustius distans.* hoc est. Aphrolitrum  
ab aphronitro differt. Verum in altera dictione

laet vilius, ut quæ *appi-ritus*. hoc est, a spu-  
ma nitri, duabus vocibus legenda sit. Ita fiet, ut  
Galeno non aphrolitrum ab aphronitro, sed  
vtrunque a spuma nitri aptè distinguatur. Id  
quod & Augustinus Ricchus Lucensis, & Leo-  
nardus Fuchius, medici ætatis nostræ celebres,  
doctissimè adnotarunt. Ceterum cum Galeno  
aphrolitrum, siue aphronitrum spuma nitri  
non sit, quid aliud sit, ingenue fateor me igno-  
rare: neque id aliis, quod sciam, hæcenus ex-  
plicauit. Quod Græci *strep*, & *strep*, Latini  
Nitrum nominant: Mauritanii, Baurach: Itali,  
Nitro. Quod verò Græcis *strep* vno verbo  
dicitur: Arabibus, Baurach Africa: Italis, Nitra  
di Africa. Quæ deinde Spuma nitri Latine,  
*strep* vno verbo Græcè vocatur: Arabicè, Aphro-  
nitrum.

*Nitru.*

F A E X.

C A P. X C.

ELIGENDA Fæx maximè à vino  
vetere, Italico: sin minus, ab alio con-  
simili. Fæx aceti viribus longè acior  
est. Crematur, ut aleyonium, antè di-  
ligèter siccata. Sunt qui noua testa igni  
largo vrant, vsquedum penitus incen-  
datur. Alij viuis carbonibus fæcis gle-  
bam obruunt, & idem opus proseguunt.  
Experimentum est legitimæ vstio-

nis, ut aërio nitore inalbescat, linguam  
que tactu vrere videatur. Eadem vren-  
dæ fæcis aceti ratio. Vis ei supra mo-  
dum vrens, & abstergens. vlcera ad ci-  
caricem perducit, adstringit, vehemen-  
ter exest, siccaturque. Sed recenti vren-  
dum est. quoniā celeriter exanimatur:  
proinde non nisi in reconditorio, & va-  
se aliquo reponi debet. Lauatur ut pō-  
pholyx. Quæ vstionem experta non est,  
tumores & per sese, & cum myrtho co-  
hibet. ventris, stomachique fluxiones  
illita sistit: muliebre profluuium imo  
ventri, aut genitalibus imposita miti-  
gat: panos discutit nondum exulcera-  
tos, & tubercula: rigentes mammas,  
suique lactis impatientes, cum aceto  
peruncta extinguit. Cremata verò, vn-  
gues scabros cum resina aufert. Addito  
lentiscino oleo. illita nocte tota, rufat  
capillum. Elota oculorū medicamen-  
tum, ut spodos, adiicitur: cicatrices eorū,  
& caligines eadem abstergit.

F A E X vini vulgaris notitiæ est, quin &  
ipsum adueniendæ ratio nota, iis præsertim, qui  
ex hac alumen, quod vocant fæcis, conficiunt. *Fæcis, &  
ceteri di-  
sti confi-  
et error.*  
Porro vini recrementum, quod vinariis cadis  
agglutinarum, crustæ lapidose instr inuenitur,  
officinarum vocabulo Tartarum vocatum, alu-  
men nō obscurè subducit. Proinde nō desunt,  
qui sibi adstrictam alumen dicant, hausto tartari  
pulvere ex gallinaceo iure, addito mastichei  
momento, & saccharo: nihil enim incommodi  
adfert hac ratione paratum. Additum in deie-  
ctoria diluta, quæ ex sena, vel polypodij radi-  
cibus, vel epithymo parantur, vim eorum de-  
iectoria adauget. Sunt qui album Tartarum  
faciant, diu ipsum in aqua decoquentes, atque  
subinde despumantes. *Tps* sic Græcè, Latine  
verò Fæx dicitur: Arabicè, Durdi: Italicè, Fec-  
cia: Germanicè, Hefen, & Vucin szin: Hispa-  
nicè, Rasura de vino, Gallicè, Lye, vel, Tarr-  
de Vin.

C A L X V I V A.

C A P. X C I.

CALX viuæ hoc modo fit. Marino-  
rum buccinarum testas igni condito,  
aut seruēti clibano, nocte dimittito: po-  
stera die, si cādidissimæ fuerint, extrahi-  
to: sin aliter, iterum vrito, vsquedum  
vehementer inalbuerint. Dein vbi in  
aquam frigidam demersæ fuerint, in  
fauile

facile nouum conicito, & exactè pan-  
nis operiens, noctem vnā conqueſce-  
re ſinito: mane eam extrahens, vbi per-  
fecto omni opere elaborata, fuerit calx,  
recondito. Fit & è litoribus calculis  
igne crematis, necnon è vili, & fuſaneo  
marmore, quæ cæteris præfertur. Vis  
omni calci in cōmune ignea, mordens,  
adurēs, & cruſta inducens: quibuſdam  
aliis immiſta, vt ad ipi, oleo, concoquen-  
di vim aſſumit, molit, & diſſipat: vlcera  
ad cicatricem perducit. Efficacior exiſ-  
timatur recens, nec aſperſa aquis.

Calx con-  
ſideratio.

CALX, cuius paſſim vſus ad ædificiorum  
muros ſtruendos, nota omnibus eſt. Præter hanc  
fit etiam priuatiu ad varia medicamenta è pur-  
purarum, buccino-um, cochlear-um, oſtreorum,  
ouorumq; teſtis. Non deſine tamen, qui etiam  
eam, quæ ſic ex calcario lapide, vnguentis, &  
emplatris admiſceant, eam primum demergen-  
tes in aquam, vſquedum proſuſ diſſiliat, ac  
ſubinde lauantes diebus pluribus, aſuſa ſapius  
recenti aqua pluuiali, vel fontana. Valet enim  
ſic clota ad contumacia vlcera, quòd abſque  
moſu valenter ſiccet. Ob id itaque vnguentis  
experitur, quibus viuuntur ad pendendorum vl-  
cera, & quæ præſertim, quæ venerea lue  
contrahuntur. Quinciam prodeſt ad ambuſta, &  
alia, quæ non facile curationem admittunt.  
Sunt etiam qui extinctam prius calcem, lauent  
deinde diutius roſarum ſtilliciti aqua, ita va-  
lentius effici medicamentum exiſtantes. Cal-  
cis vires deſcripiſt Galenus libro i. x. ſimpli-  
cium medicamentorum, his verbis. Calx, viua  
quidem, quæ æſet, & Græcè dicitur, vehemen-  
ter vrit, adeò vt cruſtam efficiat: extincta verò  
proſinus etiam cruſtam molitur & ipſa: ac poſt  
diem vnum, aut alterum minus vrit, minùſque  
inducere cruſtam poteſt. Ac verò temporis pro-  
greſſu proſum nec cruſtam quidem gignit: ta-  
menſi etiā minum calcſcit, carnemque liquet.  
Porro ſi lauetur in aqua, ſuam mordacitatem  
exuit, efficitque nuncuparam *καπνίον*, hoc eſt li-  
xiuſimum ipſa abſque moſu ſeſſicat. Ac ſi bis,  
terque aut amplius abluta fuerit, planè morda-  
cinitis experti conſtituitur, ac ſtrenuè abſque  
mordacitate exiccat. Calx viua Latinis dicta,  
æſet, & Græcis appellatur: Arabibus, Horach,  
Nura, ſeu Nure: Italici, Calcina viua: Germani,  
Vngeſchier, & Kalk: Hiſpanici, Cal, Galli  
Chaux viue.

Calx vi-  
ui ex Ga-  
leno.

Nomina.

GYPſVM.

CAP. XCII.

GYPſVM vim habet adſtringendi,  
obſtruendi: ſanguinis eruptiones, ſu-  
doréſque cohibet, ſed potum, ſtrangu-  
lationis modo ingulat.

GYPſVM quid ſit, nemo eſt qui neſciat. *Gypſi hi-  
ſtoria.* Abundat gypſo vniue: ſa ſerè Hetruria, ibique  
commodè frequentèrque expetitur camenta-  
riis ad ædium fabricas. Fit gypſum è quodam  
candido lapide, in laminas facile ſciſſili: qui ta-  
men non longa ignium vi torretur, & excoqui-  
tur. Quandoquidem in calenti furno conie-  
ctus, quatuor, aut ad ſummum quinque hora-  
rum ſpatio perurit. Tunditur deinde in pul-  
uerem, & incerniculis excutitur. Preſtantissi-  
mum eſt recens: nam diu aſſeruatum, aquæ im-  
miſtum ægrè lapideſcit, ac coit. Fit etiam Gyp-  
ſum è ſpeculari lapide, qui Græcis *καλινός* dicitur.  
Item ex alio quodam lapide niuei candori-  
s, è quo in Hetruria terno patinæ, & alia va-  
ſorum genera conſciuntur. Hunc alabaſtrum  
appellant, ſed perperam. Gypſo vires reddidit  
Galenus libro i. x. ſimplicium medicamentorum,  
ita diſſerens. Gypſum & ipſum ad commu-  
nem omnium terrenorum, lapidoſorumq; cor-  
porum facultatem, qua deſiccare dicitur, in-  
ſuper hoc adiunctum habet, quòd eſt facultatis  
emplaſticæ. Vnitur enim ipſum ad ſeſe, & cogit-  
ur, lapideſcitque inaceratur. Quamobrem hec  
cis medicamentis, quæ ad ſanguinis eruptionem,  
accommodantur, commiſcetur. Nam ipſum per  
ſe lapidoſum fit, & durum coactum, ac conge-  
latum. proinde rigare, diuereſq; illud excogita-  
ui, tenui alioque oui liquore, quod ad opthal-  
mias vile eſt, admiſſo quod in farina triticea  
eſt puluiſi tenuiſſimi, qui in parietibus molen-  
dinorum reſidet. Excipere verò, quòd ſic ſub-  
actum eſt tenellis leporis piſis, aut qui perinde  
ſunt molles, expedit. Gypſum combuſtum non  
æquè emplaſticam vim habet: cæterum tenuio-  
rum eſt partium, & valentius deſiccet. Quin &  
repercuſorium eſt, maximè ſi maceretur oxy-  
erato. *νύξ* ita Græcis, vt Gypſum pariter: *Nomina.*  
Latinis appellatur Arabibus, Gephim, ſeu Giephin:  
Italici, Geſſo: Germanici, Gyps: Hiſpanici, Yeſo,  
& Alges: Galliſ, Platre.

SARMENTIV CINIS.

CAPVT XCIII.

SARMENTVM cinis vendi vim  
habet: cum auxungia autem, vel oleo il-  
litus, fractis neruis, articulorum colli-  
ſionibus, & neruorum nodis prodeſt:  
cum nitro, & aceto eſcreſcentias car-  
nis in ſeroto reprimi. Serpentium, can-  
nūque morſibus illitus ex aceto me-  
detur. cruſta obducentibus medica-  
mentiſ admixcetur. Fit ex eo lixiuſium  
contra præcipitationes, & ſingulorum  
venena, cum aceto, ſale, & melle.

CINIS omnis quid ſit notius eſt, quàm vt *Cinere a-  
pluribus explicari debeat.* Quare ad eius vires *maius Ga-  
propereamus:* de quibus in vniuerſum diſſerens *reſet ex Ga-  
Galenus libro v. i. i. ſimplicium medicamen- leno.*  
torum, ſic inquit. Cinis combuſtorum lignorum  
reliquæ



reliquæ sic nuncupantur, compositæ ex contrariis cum qualitatibus, tum substantiis. Habet enim in se partem terrenam, partem velut fuliginosam, quod Græcè dicitur *athalodes*, siue *hygiodes*, siue quomodocunque quis appellare volet: atque hæc sanè partes sunt tenues, & quæ maceratis aqua cineribus, & percolatis, vna asportantur, atque abeunt. Quod verò reliquum est, terrenum est, infirmum, & morsu carens, calida facultate in lixivium deposita. Sed non omnino cinis eadem temperatura præditus est, sed pro combustæ materiæ diuersitate variatur. At nescio quo pacto Dioscorides omnes cineres adstringendi habere vnum proderit, cum ficulneus eiusmodi omnis qualitatis sit expertus, utpote cum & ipsa arbor nulla sui parte acerbam qualitatem præferat, ceu quercus, ilex, arbutus, fagus, lentiscus, hederæ, & hoc genus alia: verum plena succo valido tota sit eorū acris & calida. Ergo ex acerbis utique lignis factus cinis, non parum adstringit meminitque me quandoque, cum aliud ad manum non esset medicamentum, per hunc sanguinis suppressisse eruptionem. Verum nullus vnquam ad tale uti ficulneo audeat. Siquidem hic acrimonia multum, adurentisque facultatis obtrinet, mixta absterfenti: & utroque differt ab eo, qui ex quercinis lignis conficitur, tum quod in eo fuliginum multo est acrius, tum quod in illis terrenum quodammodo subadstringens est, in hoc abstergens, velut in cinere rithimalorum. Est & calx cineris quædam species, cæterum tenuioris essentia, quam qui ex lignis fit: nimirum quantum lapides exactius torreti, ut cinis fiant, posulant: non tamen multum reliquum in se habet, velut natura ignis, quod vocant *luxivium*. Proinde elota medicamentis est citra morsum desiccans, magisque sibi bis terve lauetur. Cæterum si marina aqua abluta sit, admodum digerit. Dicitur porro de ea, ubi de metallicis sermo habebitur. *Tlegæ* Græcè dicta, Cinis Latine vocatur: Arabicè, *Chamad*, siue *Ramed*: Italicè, *Cenere*: Germanicè, *Aeschen*: Hispanicè, *Ceniza*: Gallicè, *Cendre*.

*Nomina.*

ALCYONIUM. CAP. XCIIII.

ALCYONII quinque esse genera comertum est. Vnum enim spissum, acerbis saporis, spongiosa facie, ite tectri odoris, ponderosum, & piscis olens, quod plurimum in litoribus inuenitur. Alterum pinnula oculorum, aut spongiæ simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. Tertium vermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Miletium quidam vocant. Quartum succidis velleribus non dissimile, multis inanitatibus hians, leue. Quintum

figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris læue, acre, quod plurimum in Proponitide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur, patrio nomine halos achnen vocant. Duo priora in feminarum smegmata assumuntur, contra lentigines, lichenas, lepras, vitiligines, nigritias, & maculas in facie, reliquæque corpore. Tertium iis, qui difficili vrina vexantur, aut areulas in vesica colligunt, idoneum est: item renibus affectis, aquæ inter cutem, leni. Vltimum autem, & ex vino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est. In alia smegmata, psilothracæ assumitur, cum sale mistum. Si quidem alcyonium cremare velit, cum sale in crudum fictile mittat, & obliens vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum siglinum percoctum fuerit, extrahens ad vsus recondat. Lauatur ut cadmia.

ALCYONIUM (ut Plinius est author lib. x x x i i. capite v i i i.) fit in mari ex nidis, ut aliqui existimant, alcyonium, & cæcum: alij ex foribus spumam cæssefentibus: alij è limo, vel quadam maris languine. Quatuor eius genera. Cinerem, spissum, odoris asperi. Alterum molle, lenius odore seie algæ. Tertium candidius vermiculi. Quartum pumicosum, spongiæ putri simile, penè purpureum: quod optimum, hoc & Miletium vocatur. Quomodo autem candidius, hoc minus probabile est. hæc Plinius. Qui tamen quintum fungi figuræ, cuius meminit Dioscorides, & Galenus, silentio præterit. Sunt præterea, qui Alcyonium ita appellari tradunt, non quod ex alcyonium nido fiat, ut Plinius scribit, sed quod alcyones super illud marinis vndis simul congestum nidificent. Quorum sententiam magis probandam censemus. Alcyonium officinæ spumam maris vocant: quod sic idem vocant Arabes, Dioscoridem secuti, quippe qui præstiterint quintum Alcyonii genus in Besbico halos achnen, hoc est, maris spumam vocari. Cæterum rufum Alcyonium corallij instar, coaceruat in globum veluti vermiculis, lapidosæque materie, Venetiis primum vidimus. Quartum vero reperimus copiosum in Tergesino litore velleribus simillimum, album, ac lentissimum. Piscatores hoc cochlearum marinarum, quæ aculeis rigent, & vulgo appellatur: Gauise, nidum esse affirmant. Primum, & vltimum genus pluribus in seplasis inuenitur. Porro in hoc capite in vulgatis Dioscoridis exemplaribus.

*Alcyonij  
historia,  
& conside  
ratio.*

*Locum  
scilicet  
exemplar*

exemplaribus nonnulla (vt planè suspicer) verba desiderantur, eùm de viribus quarti alcyonij nihil in iis scriptum legatur. Auger suspitionē Oribasius, cuius lectio hoc loco habet. *νῆξ ἰσχυρὰ, ἡδὲ ἰσχυρὰ*, hoc est. Quartum, & postremum &c. Idem confirmat Serapio, qui ex Dioscoride transcribens vtriusque speciei meminit. De Alcyonio distinxit Galenus lib. x i. simplicium medicamentorum, his verbis. Alcyonia omnia detergunt, ac digerunt, qualitatem habentia acrem, & calidam facultatem: verum aliud alio non parum plus minusq; & in his ipsis, quæ diximus, secundum partium essentia totius tenuitatem. Est autem eorum vnū densum, & graue, odoris prauiolet enim pisces putres, spongiæ in specie simile. Secundum verò aliud figura longiore, leue, & rarum: odorem habens similem phyciis. Aliud tertium verni simile est specie, colore purpureo, consistencia molli: vocant id Milesium. Post quæ quartum secundo quidem iam posito similiter & leue, & rarum, verum lanis succidis simile. Denique & quintum extrema superficie leui, cæterum interna substantia asperum, nullius odoris, gustu tamen apparens acre: & sine omnium alcyoniorum est calidissimum, adeo vt & pilos vtire possit. Itaque cum duo prima lichenas, alphas, pforas, lepraque adiungunt, præterea cutem splendidiorem competentia virium efficiant, idem præstare non potest hoc vltimo loco positum. Nec enim perinde vt illa, cutē duntaxat summam extergit, sed etiam excoriat, vsque in profundum cutis penetrans, vt etiam vlcera moliat. Porro quod tertio ordine recensimus, omnium est tenuissimum. Itaque vltum alopecias curat illitum cum vino, colore quidem fuluo, tenui tamen essentia. Quartum autem eiusdem cum hoc speciei vires obtinet, verum haud parum imbecilliores. Quod Græci *ἀλκυονίς*. Latini quoque Alcyonium dicunt: Arabes, Zebothalbahar, seu Zebd albahar: Itali, Alcionio: Galli, Escume de Mer.

## ADARCES.

## CAP. XC.V.

FIT IN Cappadocia, quod adarces appellatur. Est autem tanquam concreta salislag, humidis & palustribus locis ficitare emergens, & harundinibus, ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Afij similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, vt videri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, similia, accommodatur. Et in summa

vis ei acris. Humorem euocat, qui in alto concreuit, & ischiadiaci prodest.

LEGITIMAM Adarcem, quæ Dioscoridis, & Plinij placitis respondeat, hæcenus non vidimus, essi in Italia nasci tradidit Plinius libro x v i. capite x x x v i. Quam postea libro x x x i i. cap. x i i. vocauit calamochnum, sic inquit. Incer aquatilia dici debet & calamochnum, Latine adarca appellata. Nasctur circa arundines tenues, è spuma aquæ dulcis, ac marinæ, vbi se miscent. Vim habet causticam, ideo acopis additur contra perfrictionum vitia. hæcenus Plinius. Porro verò eos hallucinari crediderim, qui sibi persuadent id esse Adarcem, quod vulgò Italis dicitur Palla marina. Siquidem hæc in mari tantum nascitur, non in paludibus aquæ dulcis: & ibi non arundinibus, neq; herbis inherens visitur, sed in sicco reperitur litore, vndis simul cum alga proiecta, pilæ omnino similis, quæ in lactentium hædorū ventriculis, ex exutiis vnâ cum lacte pilis, plerunq; reperitur. Adde quòd hæc, quantum gustauerim, nec acris, nec caustica (vt Plinius inquit) deprehendatur: neque etiam, quod sciam, in paludibus inueniatur. Huius tamen meminit Galenus libro primo de cõpositione medicamentorum secundum locos, referens quæ Crito ad conseruandos, augendos, itemq; ad defluuio præseruandos capillos scripsit. Vbi cum interpres Cornarius vt aliqui doctissimi, ignorasset quid Critoni & Galeno intelligeretur per *σπάργανοι θανάσιμοι*, forrè suspicatus, locum hunc in Galeno esse deprauatū, spongiam marinam perperam interpretatus est: quandoquidem lectio illa vera est, & vertendum erat pilam marinam. Id quod etiam Fuchsius doctissime adnotauit in suis de cõpositione medicamentorū libris. Marinam pilam addit Nicolaus Myrpesius in quodam vnguento ad lumbricos, vbi sic habet. Pilæ marinæ, quæ reperitur in mari rotunda, vt lana congesta. Cæterum Adarcæ vires retulit Galenus lib. x i. de simplicium medicamentorū facultatibus, ita scribens. Adarcion aliqui masculino genere adarcion, alij fœminino adarcen dicunt, essentia quidem sua velut spuma esse falsæ concretæ, circa arundines, & farragines cõcrefcentes. Acerimū hoc est, simulq; calidissimū medicamentum. proinde & per se inutile est, verum commiscetur iis, quæ vim eius retundūt, itaque fit admodum vtile in iis affectibus, qui exalferi possunt. idq; foris impositum, nam intrò in corpus ipsum sumere est impossibile, nimirum ob virium vehementiam. hæc Galenus. Ex quibus liquidò apparet, Adarcium à marina sphaeraplutimum facie, & vitibus differre. Id Græcis *ἀδάρκη* & *ἀδάρκην* vocatur, quod Latinis item Adarces: Arabibus, Adarchi, Atharachi, seu Adarçai: Italis, Adarce.

Adarca  
considera-  
tio.

Cornarij  
lapsus.

Adarca  
vires ex  
Galeno.

palluina.

E SPONGIIS alias mares appella-  
uere, tenui fistula, spissas: quarū durio-  
res tragos nominarunt. Fœminas au-  
tem, quæ contrarias dores habent. V-  
runtur eæ, vt alcyonium. Recentes sine  
pinguitudine vulnerariæ sunt, & tumo-  
res reprimunt. recetia vûnera ex aqua  
poscæve conglutinant: veteres sinus ex  
decocto melle iungunt. Vetusstæ autem  
inutiles. Aridæ ligatæ lino, si penicilli  
modo adigantur, occlusa vlcera, callôs-  
que laxant. Siccæ recetæ, & vacuæ, se-  
nilia vlcera, & que fluxione laborant,  
aut cuniculatim exedunt, impositu sic-  
cant. sanguinis profuuium sistunt. Cre-  
matarū cinis ex aceto, aridæ lippitudi-  
ni auxiliatur: & vbi quid abstergere, aut  
adstringere opus est. Vitiluis in oculo-  
rum medicamentum lauare cinerē. Om-  
nium cinis cum pice crematarum,  
profluentem sanguinem sistit. Candi-  
dæ cura sunt, è mollissimis recetæ per  
æstus tinctæ salis spuma, quæ petris  
coheret: insolantur inuersæ, hoc est,  
parte caua sursum spectatæ, & qua ab-  
scissæ fuerunt, deorsum. Si verò æstiuâ  
serenitate ad lunam sternantur, per-  
fusa salis spuma, aut maris aqua, maxi-  
mum candorem referent.

*Spongia-  
rum his-  
toriam ex A-  
ristotele.*

SPONGIARVM genus (inquit Aristote-  
les lib. v. cap. xvi. de historia animalium) tri-  
plex statuitur: nam alix raræ, alix spissæ, alix  
quæ nominantur achilles. Tenuissimum genus  
id tertium est, & spississimum, & validissimum,  
quod galeis oceis: infertur, eoq; minus cie-  
re strepitum posse notatum est. genus hoc inuen-  
tu perquam rarum est. Quæ autem in genere  
illo spisso prædura sunt, atque asperæ, nomine  
hirci nuncupantur. Quæ quidem omnes aut ad  
faxa nascuntur, aut iuxta litus, lutoque alunt-  
ur. Cuius rei argumentum est, quod capta  
limo refertur omnes cernuntur, quod certè hi-  
dicat cæteris quoque adherentibus cibum per  
ipsum adnexum hauriri. Imbecilliores prop-  
terea sunt spissæ, quàm raræ, quia minus albo  
radicis hæsi inaniunt. Sensum etiam spon-  
giis esse aiunt: argumento quod ad euulsoris  
accessum cõtrahuntur, ita vt euelli difficile sit.  
quod idem etiam faciunt, quoties flatus, tem-  
pestasq; vrget, ne sua de sede pellantur. Sed  
sunt, qui de hoc dubitent, vt qui Toronā in-

colunt. Narrant tamen procul dubio bestias  
quasdam velut tines, lumbricofve, & eiusmodi  
alias consistere inra spongiar, atque aliquas &  
euulsis spongiis, pisciculi faxatiles deuorēt, qui  
vel radices absumunt totas, quæ inhærentes sa-  
xis remanserint. Si eueniret fortè, vt spongia  
abrumpatur, residuo item renascitur, & cõple-  
tur. Magnitudine amplissima soluta illæ, & ra-  
ræ spongiæ, augentur plurimæ, quæ circa Ly-  
ciam sunt. Sed mollissimæ quæ spissæ: nam a-  
chillæ torosiores his cõstant. Omnia quæ al-  
tis, tranquillisque insunt gurgitibus, mollissimæ  
sunt: status enim, ac tẽpestates spongiar quoq;  
vt cætera altitia reddunt duriores, & incremẽ-  
tum impediunt. Quamobrè spongiæ Hellespõti  
spissæ, ac duræ sunt, & omnino quas maris vi-  
tra Maleæ promontoriū, citraq; refert. Differunt  
inter se mollietie, duritiæq; nec calorẽ immo-  
dicum spongiæ patiuntur: sic enim eo, vt more  
pullulantū putrescāt. Quocirca optimæ iuxta  
oras cõperiuntur spongiæ, si gurgite alto de-  
mersæ sunt: commodè enim temperantur pro-  
pter altitudinẽ gurgitis. Color illicis, viuisq;  
nigricans est. Adhærent nec parte, nec toto: in-  
terfunt enim fistulæ quædam inanēs, sed pluri-  
bus passim particulis hæsitant, & quasi mēbra-  
na extensa subesse radicibus earū videtur. su-  
pernè autè cæteri meatus concreti propemo-  
dum latent: at verò quaterni, aut quini patent,  
per quos pasci existimatur. Hactenus de spon-  
giis Aristoteles. Cui quidem Plinius suam de  
spongiis historiam acceptā referre potest, quā  
lib. i. x. cap. x. l. v. scriptis tradidit. Spongia-  
rum vires memoriam prodidit Galenus lib. x. l. i. *Spongia-  
rum vires  
ex Gale.*  
simpli. medic. his verbis. Spongia vîla acris est,  
& digerentis potentia. Vtebatur ea præcepto-  
rum meorū quidam ad sanguinis eruptiones,  
quæ manuali opera indigent. In quẽ vsum sem-  
per eam paratā habebat siccā, & exaresactam:  
cũ verò res posceret, bitumine in primis im-  
buebat, sin eo careret, pice. Porro ad mouebat  
eam paribus sanguine profluētib; etiānum  
ardentem, vt & crusta parvi induceretur, &  
ipsum spongiæ vîlæ corpus, ceu operculum  
quoddam acciperet. Cæterum spongia ipsa noua  
per se, non sicut lana, aut linamentū (quod  
iussu iussu, id est, carpinatum vocant) mate-  
ria duntaxat est, quæ humores infundendos  
excipiat, sed etiam manifestè desiccet. Id quod  
scies, si ea sola vtaris in vulnere, cum aqua, aut  
oxycrato, aut vino, pro diuersitate videlicet  
corporum, vt est antè dictū. Glutinat siqui-  
dem ea similitur: atq; medicamenta, quæ vocant  
enema. At si non noua sit, sed vsui accommo-  
data, palam cognosces, quantū à noua superet,  
siue vultribus eam imponas, siue aqua  
proluens, siue oxycrato, siue vino. Nec mirum  
est, cū in spongia noua seruetur etiānum  
ea, quā à mari accepit, facultas modicè cor-  
pora excicandi. Atque hæc quidem prestare  
potest. cū etiānum seruatur maris odorem.  
Nam temporis spatio, etiāsi nunquā vsui ac-

NOMINA.

commodata sit, tamen & odorem maris amittit, neque æque desiccare potest. Spongia quæ Latine, *enysis* Græcè dicitur: Arabicè, *Asfengi* albai, seu albi: Italicè, *spogna*: Germanicè, *Badschuam*: Hispanicè *Spongia*: Gallicè, *Eponge*.

## CORALLIUM. CAP. XCVII.

CORALLIUM, quod aliqui lithodendron appellant, marinum esse fruticem constat, qui alto extractus, duratur statim atque emergit, tanquam offuso aere protinus concrescat. Plurimum inuenitur ad Syracusas, in promontorio, cui Pachyno nomen est. Laudatissimum rubens, colore antherici, aut sandeicis saturate, nec fuscis terenti facile cedens, æquabili vsque quaque concremento, rursus algæ, aut phuci marini odore, quam ramosissimum, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod autem in lapidis duritiam coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, vitiosum existimatur. Adstringit, & refrigerat mediocriter: excrecentia coerces: oculorum cicatrices abstergit: vicerum cana, & cicatrices explet. Contra sanguinis reiectiones magnopere efficax est: yrinæ difficultati auxiliatur. quin & potum ex aqua liennem absument. Quod autem tipathes vocant, corallium esse arbitratur, specie tantum distans. Est autem colore nigro, arboris figura, ramosum magis. Vires supradicti habet.

CORALLIUM, quo vsque adeo abundat Italia, ut fere nulli ibi reperiantur infantuli, nulla: puellæ, quibus non gesserint corallij mollia aut collo: aut brachijs suspensa, quo item videntur feminae in templis ad suas praes numerandas. ex Tyrreno, & Siculo mari extrahitur, atque inde ad nos deferunt. Cæterum etsi rubri tantum, & nigri meminerint Dioscorides, reperitur tamen quod nives sit candoris in iisdem pelagis, non autem virubrum compactum, ponderosumque, sed tenuissimum, & spongiarum modo inane. Creditur hoc rubro longe magis refrigerare: proinde eo videntur medici, ubi opus est maiore refrigeratione. Corallij meminit Plinius lib. x. x. l. cap. 11. ubi de eo ita scripserunt reliqui. Quantum apud nos Indies margaritis pretium est, tantum apud Indos in Corallio: namque ista persuasione gentium constat. Gignitur quidè, in rubro mari, sed nigrius. In Por-

seo vocatur Iace. Laudatissimum in Gallico sinu, circa Storchadas insulas, & in Siculo, circa Heliam, & Drepanum. Nascentur & apud Graucasas, & ante Neapolin Campaniæ, maximeque rubens, sed molle, & ideo vilissimum Erythis. Forma est ei fruticis, color viridis. Baccæ eius candidæ sub aqua, & molles, exemptæ confectum durant, & rubescunt, quasi cornu satia, specie, atque magnitudine. Aiunt tarta protinus lapidescere, si vint. Itaque occupari euellique retibus, aut acri ferramento præcidi. hæc de causa corallium vocatum interpretantur. Probissimum quam maxime rubens, & quam ramosissimum, nec scabresum, aut lapideum, vel rursus inane, aut concavum. Authoritas baccarum eius non minus Indorum viris quoque pretiosa est, quam feminis nostris vniones Indici. Aruspices eorum, vatesque in primis religiosum id gestamen amolientis periculis arbitrantur. Itaque & decore, & religione gaudent. Galli gladios, futa, galeas adornabant eo nunc tanta penuria est vendibili merce ut perquam raro cernatur in suo orbe. Sarcocollis infantie adalligari, tutelam habere creduntur. hæc Plinius. Quem tamen mirari sibi, quod tam facile sibi persuaserit, corallium per se baccas ferre, quasi cornu satia specie atque magnitudine, perinde ac cæteræ arbores suos proferunt fructus. Quandoquidem, ut faterentur, qui corallia expulcantur, & in ijs mercaturam exercent, nullas per se baccas edunt. Baccæ enim, quæ in coralliorum monilibus cornis, ac ceratis similes videntur, ex ipsorum truncis toro, & lima prius paratur: mox smyridis lapidis pulvere, & terra quadam, quæ è Tripoli aphrica adfertur, expoliuntur, & lucidum laeuorem contrahunt, cum ijs diutius fricantur. Ad hæc Corallia è mari circumquaque mulsca eximuntur, nec tunc illa ex parte rubescunt, verum inde artificibus tradita, deraso cortice rubent, & perpolita nitescunt. Nigrum Corallium, quod Dioscorides Anipathes vocari ait, primum vidi ego Neapolibeni colore referens. Corallium comitalibus commodè adalligatur, hauriendumque præbetur. Corallium ædes (ut aiunt) à fulminum iniuria tuetur. Idem mensum abundantiam cohibet, dentes comotes firmat, desquamatas gingivas emendat, itemque oris vlcera sanat. Potum dysentericos iuuat, seminis profluuium in viris, nocturnasque pollutiones, & in mulieribus albos veteri fluore reprimat. Recensetur inter ea (Aucenna teste) quæ cordi hilaritatem adferunt. Auxiliatur præterea (ut Plinius inquit) contra torminum ac vesicæ calculi mala in pulcre igne redactum, & cum aqua potum. Simili modo ex vino potum, aut si febris sit, ex aqua somnum conciliat. Verumetiam ignibus diu reputat. Sed eodem medicamine sæpius potum, tradunt, quam plurimi lientem quoque penitus absumi. Sanguinem quoque reicientibus aut excreantibus medetur. Cinis eius misceatur oculorum medicamentis: ipsæ enim ac refrigerat, vlcere causa explet, cicatricesque extenuat. Cor-

Plinius inquit fuit.

Corallij fructus.

Corallij consideratione.

meminisse Galenum in libris legitimis de simplicium medicamentorum facultatibus, hæcenus non reperi: tamen libro septimo de compositione medicamentorum plura describat medicamenta ad incipientem phthisin, hæmopticos, & suppuratos, quæ corallium excipiunt. Quod Græci *καλλιόρυς*, & *καλλιόρυς*, Latini Corallium nominant: Mauritanie, Bassad, Mergen, Beld, siue Morgiam: Itali atque etiam Hispani, Corallo: Germani, Coraln: Galli, Coral.

## LAPIS PHRYGIUS. CAP. XCIII.

PHRYGIUS lapis, quo infectores in Phrygia vtuntur, à qua nomen accepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmentis, vt in cadmia. Vritur autem vino optimo perfusus, viuisque carbonibus obrutus: perflatur assidue follibus, donec mutato colore rufescat: rursus extractus eodem vino restinguitur. Hoc iterum, & trinis vicibus faciendum: attendendum tamen ne minutim confringatur, & in fuliginem euanescat. Viscrudo, vsquoque adstrictoria, expurgans: vlceribus crustas quadantenus inducit: ambugis cum cerato medetur. Lauatur vt cadmia.

*Phrygiæ lapis cognoscitur.* QVI mihi Phrygium lapidem ostenderit in Italia, hæcenus neminem inueni, quippe cum nec nostratibus medicis, nec lanarum infectioribus. vilo sit vsui, ex Cappadocia ad nos deferri desit.

*Phrygiæ lapis cognoscitur ex Galeno.* Plinius, cum ignorasset, Phrygium lapidem medicamentis etiamnum expecti, tingendis tantum vesibus commendauit. De huius lapidis viribus differit Galenus libro. x. simplicium medicamentorum, his verbis. Pyritæ facultatem habere existimatur & Phrygius, quem vocant.

Sed eo semper vtor combusto quidem ad vlcera putrida, idque aut ipso per se, aut ex aceto, aut cenomelite, aut oxyurato: ad oculos verò medicamentum sicum efficiens: quod multi nunc acceptum à me obtinent. Miltentur ei & alia quæpiam. Dicitur autem de ipso in opere de componendis pharmacis. Nunc scitis est de generali eius facultate explicuisse: valide enim defecit, habens quiddam adstrictionis, simul & mordicationis. Dictum verò superius est, ea esse omnia optima medicamina, plurimique vsus, quæ missas in sese hæc duas facultates, habent, nempe percutientem, & digerentem. *Ad Phrygiæ Græcis, Lapis Phrygius Latinis appellatur: Italis, Pietra Phrygia Gallis, Pierre Phrygienne.*

## LAPIS ASIUS. CAP. XCIX.

ASIUS lapis assumi debet pumicis colore, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles venas lutei coloris ad imum actas habens. Eius flos falsugo subflaua est, summo lapide insidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in aliis pumici simili, ad luteum vergente, admotus linguæ aliquatū mordet. Vim habet vtique adstrictoriam, & modicè erodentem. admistus liquidæ pici, aut terebinthinæ tubercula discutit. Longè validior flos existimatur. De cætero siccatus flos vetera vlcera, & cicatrici repugnancia sanat: excrementa cohibet, tetra vlcera, & fungis similia, cum melle expurgat: vlcera caua explet, & expurgat cum melle: depascentiaque cum cerato sistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomento: & lienosis ex aceto, & viuæ calce. Prodest flos ex melle phthisicis linctus. Podagrici iuuantur, pedibus in folio ex eo lapide excavato inditis. Fiunt quoque ex eo loculi, qui corpora erodunt: & luxuriantem carnem, & corporū crassitiem absument, cum vice nitri in balneo sparguntur. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

TAMETSÌ in commentariis nostris superioribus annis Italica lingua conscriptis, Asium lapidem mihi ingenuum esse ingenue confessus fuerim, legitimum tamen nuper Tridento ad me misit Martinus Guidotinus seplasiarius diligens æquè ac peritus: qui quidem lapis, ni fallor, nullis prioribus notis ac viribus Dioscoridis descriptioni reclamation. Foditur in tridentino agro quibusdam chalcantibi fodinis, quodam in monte non procul à pago, quem Leuigum nominant. Est enim hic pumicis instar leuis, fungosus, friabilis, lutei coloris intercusantibus venis. Hoc quòd carnes assumat, vebatur antiquitas ad defunctorum sepulchra, vt assumptis ab eo carnibus, corpora non computrescerent: ob idque Græci appellauerunt sarcophagum. Quod manifestè declarat Dioscorides, cum inquit, *ἀπὸ τοῦ ἀσίου πέτρας γίνονται*, id est loculi defunctorum carnes absorbentes ex eo sunt. Hunc locum nullus, quod sciam ex interpretibus ita vt nos accepit: sed omnes ad aliud respicientes vocem *πέτρας* puluerem verterunt. In quo mihi planè non videntur mentem Dioscoridis assēcuti. Quam probè assēcutus, nostræque sententiæ adimplari cognoscitur Plinius lib. x. x. x. v. i. cap. x. v. i. v. bide

*Asij lapidis hystoria, et eius res ex Galeno.*

vbi de lapide Asio sarcophago ita scribit. In Asio Troadis lapis sarcophagus fissili vena scinditur. Corpora defunctorum condita in eo absumi consuevit intra quadragessimam diem, exceptis dentibus. hanc Plinius. Ceterum Asij lapidis hystoriam, & vires descripsit Galenus lib. 1. x. simplicium medicamentorum, sic inquit. Est & alius lapis in Asio proueniens, quem ob id ipsum Asion cognominant, non durus vt petra. Siquidem color illi est, pariterq; consuetudo cen topi, friabilis, & laxus. Innuitur ei quiddam farinae tenuissimae ad simile, qualis in pistrinorum parietibus adherere visitur. Appellant hoc medicamentum petrae Asiae florae. Est verò & subtilius partium, vt sine morfu nimis molles carnes, ac fluidas eliquet. Petra verò, in qua nascitur, tamen vim habeat illi similem, actionis tamē vehementia inferior est. Hoc enim ea potior est flos, non tantum quod magis colligat, ac digerat, & velut sale condita seruet, sed & quia haec praestet absque vehementi mordicatione. Habet & falsedine quandam in gustu hic Asiae petrae flos: vt coniectura sit, illius nasci ex eo quod ros ex mari in petram residens, postea a sole desiccatur. haec enim Galeni verba. Quae quidem si paulò diligentius examinasset Fuchsius medicus aliqui nostrae aetatis celebres, non tam facili fortasse suam promissilem sententiam libro de compositione medicamentorum: quod scilicet Asiae petrae flos sit illa mollis, alba, & tenuissima materia, quam farinae, quae parietibus molarum inheret, similem exudant veteres muni, rupes, saxa; montium: ex qua fit quod Salnitru vocant. Porro quod haec non verè sit Asij lapidis flos, omnibus is perspicuū fiet, qui rem hanc accuratius expendunt. Nam praeterquam quod ea diuersorum lapidum flos est, nullam habet cognationem cum Asio lapide, qui solus, Dioscoridis & Galeni testimonio, florem sui nominis gignit. Lapis, qui *Asio* & *Asio* & *Asio* Graecè, Lapis Asius, & Asius Latine vocatur: Arabicè, Hager Afos: Italicè, pietra Asia.

*Nomina.*

#### LAPIS PYRITE. CAP. C.

PYRITE s lapidis genus est, à quo res confatur. Eligi debet aeris similitudine, facile scintillas edens. Vritur sic. Melle irrigatus, molli pruna continuè fiatut solibus, donec rufescat. Alij in multis carbonibus igni candentes, lapidem copioso melle perfusum deiciunt, & vbi ad fuluū colorem vergere coeperit, extrahunt: efflatosq; cinere, rursus madefactum cremant, donec aequabiliter asiccatus, friabilis reddatur: siquidem saepe facies summa solum vritur. ita crematus, siccatusq; recondi-

tur. Si cloto opus sit, lauari debet, vt cadmia. Tam credi, quàm vlti vis est excalcascere, abstergere, offusam oculis caliginē expurgare, duritias cōcoquere, & concoctas discutere. Refina exceptus excrefcentia in carne cohibet, sed calorē quandam, & adstrictionē parit. Ita vltu nonnulli diphryges appellant.

LAPIDEM, quem Graeci Pyriten dicunt, Pyrite la. officinae cum Mauritanis Marchesinam vocant. Verū quoniam vniuersi lapides, à quibus ignis chalybe excutitur, pyritea appellari possunt, cū tamen Marchesia appellata ceteris magis scintillet chalybe aut ferro percussa, per antonomasiam ipsa sola vocatur Pyrites, tanquam ceteris praestantior. Foditur haec in omnium metallorū ferè fodinis, genere, & colore diuersa, plerūq; tamē (vt Plinius inquit lib. x. x. v. i. cap. x. i. x.) aureis scintillis, vel argenteis respersa. Gignitur, vt res metallicae periti tradūt, ex impuro metallorū halitu, quo fit, vt ferè semper reperitur in montium cacuminibus, vbi auri, & argenti vena, in profundo delitescit. Sterilis haec magna ex parte, quod (vt chymistae existimant) ex impurissimo sulphure, aliusq; inconcoctis partibus metallorum sit conficta. quomobrem fossiores in Germania, extra caueras Pyriten tanquam inutilem proiciunt. Veruntamen quondam Pyriten inueniunt, qui aurum, argentū, vel aes intra se continet. Idcirco rectè prodiit Dioscorides. Pyriten lapidis esse genus, ex quo aes confatur. Quod cum ignorasset Albertus, omnem Marchesinam inutilem esse asseruit. Pyrite vires reddidit Galen. lib. 1. x. simplic. medic. his verbis. Vnus corū, qui validam facultatē possident, est & pyrites quē vocant, quo vltimur digerenti emplastro adinfunditur ei & sphisos. Ab hoc medicamine, & pus sapenumero, & consuetudine grumosa in spatiis intermedii muscutorū nata, per halitum digesta sunt. Ceterum vbi in vltu vocantur lapides omnes admodum vehementer contusi, atq; ad leuorem redacti sint oportet, similiter atq; ea, quae in ophthalmicis facultatibus admiscuntur. Enim nisi pollinis instar cōminuantur, adeo vt in profundū corporū, quibus applicauer, subeant, affimiles manent istis marinis, & fluuiatilibus arenis, quae & ipsae cōmunem omnium lapidum vim possident. Si quidem exicant tumentē ex hydrope carnē, videlicet laborante in eis excalcascere decumbente. Non tamen ad aliud quippiam eis vimur, tanquā praedictis, ad ophthalmicas, & sistentes tum sanguinē, tum muliebri profluuiū facultates, praeterea ad glutinanda vlcera, cicatrice claudenda, carne implenda. Nam qui ex eis acres nō sunt, ad haec omnes sunt viles, velut & acres, quorū posterius mentionē faciam, ad detergendū, abstergendūq; tum detrahen-

*Pyrite Gi res ex Galeno.*

Nemina.

duc, extenuandum, digerendum, valenterque  
secundum, & colloquendum. Qui lapis Græcis  
*lapis pyrites*, Latinis lapis Pyrites nominatur:  
Arabibus, Hager al, siue Alrusenai: Italis & of-  
ficinis, Marchesita: Germanis, Kis, & Ertz fluoß:  
Gallis, Marcallis.

## LAPIS HÆMATITES. CAP. CI.

HÆMATITES optimus habet  
friabilis, saturato colore niger, durus, & suopere ingenio æqualis, nulla  
forde admista, nullôq; zonarû discursu. Vim habet adstringentem, & exca-  
storiâ aliquantû, extenuantemq;. Ocu-  
lorum cicatrices, & scabritiâ cû melle  
purgat: cum lacte autê muliebris, lippitu-  
dini, fractis, & oculis cruore suffusis  
conuenit. Bibitur contra difficultatem  
vrinæ, & fluxiones mulierû in vino: &  
ab iis, qui sanguinem reiecerunt, cû succo  
punici mali. Fiut ex eo coticalæ, & col-  
lyria oculorum vitiis apta. Vritur vt  
Phrygius, sine vino duntaxat. Modus  
vstionis est, vt modicè leuis fiat, & bul-  
lis quibusdâ incumescat. Sunt qui hæ-  
matiten ita adulterât. Densam glebâ,  
rotundamq; schisti lapidis, cuiusmodi  
sunt, quæ eius radices vocantur, in vr-  
ceû figlini operis, qui feruentem cine-  
rem cõtineat, condunt: paucâq; inter-  
iecta mora eximunt, experiunturque si  
trita ad cotem hæmatitæ colorê red-  
dat. quod si ita res se habet, reponunt:  
sin minus, iterum obruunt, & subinde  
cõspicientes, periculum faciunt: siqui-  
dem in cinere diu dimissus, colore mu-  
tato diffunditur. Coarguitur malè con-  
fictus, primû scissilibus venis: quippe  
in rectos venarum discursus refringi-  
tur. At hæmatites longè secus se in co-  
lore habet: nanque hic floridum red-  
dit, hæmatites verò saturatiorem, atq;  
cinnabarin imitantem. Inuenitur in  
Sinopica rubrica. Fit & è magnetela-  
pide, vehemèter ambusto. In Aegypto  
sponte naturæ cum metallis enascitur.

citius est, ex vilissimo vulgari Armenio bolo,  
aliisq; admistis imposturis. Legitimus enim fos-  
silis est, & sponte naturæ nascens in metallorû  
cuniculis: qui fractus, sanguinè colore imitatur,  
vnde & nomê, cû Græcis sanguis dicitur dica-  
tur. Huic per similes est, quæ Schistum vocant,  
cuius historiâ, & vires statim post hunc scribit  
Dioscorides ob cognationis vinculu. Foditur  
hæmatites non modò in Aegypto, sed in pluri-  
bus Germaniæ, & Bohemiæ motibus, præser-  
tim in Hercynia sylua: quin & in Italia Brixiens  
agro, sed peregrinis bonitate cedentes. Variat  
tamen huic lapidi color, quoniam & niger, &  
flauus, & ferruginis instat, quibusdam insit, vt  
peritissimus æquè ac doctissimus Agricola in  
suis de fossilibus natura libris diligenter adno-  
tauit. Hæmatitæ vires memoriæ prodidit Ga-  
lenus lib. 1 x. simplic. medicam. vbi sic inquit.  
Portò talium quosq; vnus est hæmatites, quem  
vocant, à coloris similitudine id appellacionis  
fortitus: sicut & galactites, quando & ipse in  
succum solutus, lacti similis conspicitur. Habet  
lapis hæmatites tantum frigiditatis, quantum  
habet adstrictionis. Merito itaq; ausi sunt me-  
dici ocularibus facultatibus lapidem miscere  
hæmatitè. Ac solo eo vti possis palpebris exa-  
speratis: si quidem cum phlegmone asperæ sint  
reddite, ex quo ipsum diluens: ac si magis etiâ,  
per fœni græci decoctum. Sin verò citra phle-  
gmone, ex aqua. Incipito verò semper à mo-  
dicè humidis, per specillum infundens. Vbi  
autem, quod vires eius ferat, conspexeris, ma-  
gis ac magis crassum efficies, ac tandem adde-  
crassum facies, vt specilli nucleo inungas, se-  
cundum subiectionem, aut eersionem palpebræ.  
Hic idè lapis similiter in core cõtritis, sangui-  
nis expuicioni conuenit, omnibusq; vlcibus.  
Porro siccus, si ad tantû redactus fuerit leuo-  
rem, vt puluillum referat, repermittit excre-  
scencia, atq; eo nullus solo, atq; per sese vritur. Ego  
verò ad ea, quæ dixi, vsus sum facultate eius ex  
gustu qualitate comperci, cûm mox experien-  
tia periclitari vellem, nunquid rectè conieciss-  
sem. Et ipsa quidem oculorû vlcera, solus per  
se cicatrice includit, (vt paulò antè compre-  
hensum est) attritus, ceterum aut assusus, aut  
inunctus. nam & id experientia exploratum  
habeo. hæc tenus Galenus. Miris item laudibus  
extulit hæmatiten lapidem Alexander Trallia-  
nus, sic inquit. Ego sanè noui frequenter me  
sine theriaca, aliisq; pretiosis antidotis multos  
curasse, lenibus vsu medicamentis, & præ-  
sertim lapide hæmatite. Vfus autem eo sum in  
his, qui largius sanguinè reiciebant, cum suc-  
co punici mali, & grani, vel cum succo poly-  
gonij: in quibus autem sanguis non copiose  
euacuabatur, etiâ ex aqua sola egelida. At læ-  
uigare ipsum curiosè oportet, vt in tenuissi-  
mo puluere redigatur, itq; æreus, & vento  
perissimilis. Dedi ego ex eo scrupula quatuor,  
& paulò amplius minussve. Exhibui etiam iis,  
qui pus expui inceperat, ac mirû est, quomodo  
vltus

Hæmati-  
ta vires ex  
Galeno.Hæmati-  
ta vires ex  
Alexan-  
dra.

Hæmati-  
ta lapidis  
uersum medicæ officinæ abundant, quosq; pi-  
ores, & lignarij fabri vtuntur, vulgò voca-  
tus Lapis, legitimus non est, de quo memine-  
runt Dioscorides, & Galenus. Quippe hic fa-

vlcus exiccatit sanaueritq; , vt non amplius pus generaretur, neq; æger tulli infestaretur. Spectari autem & alium quendam ex his, quibus vas exesum erat, nō modō particulas quasdam ex faucibus, sed etiam asperam arteriam expuentem, ac mirum quomodo in hoc quoque lapis hic maximam efficaciam indicauerit. Nam & hic curatus est nobis non admodum etiam spernentibus. Exhibui autem ægro potui medicamentum frequētius, vt commodius distribueretur. Quare cū crebrō ipsum bibisset, tandem sumere ipsum fastidiuit. Excogitauit autem huiusmodi rationem, redactum in tenuissimum puluerem pāniculo lineo imposui, & diligenter ipsum vndiquaq; confectum, colligatumq; in poculo, quod vinum odoratum modicum habere, suspendere permisi, idq; per totā noctem iam inde ab ipso vespere: extraxi autē tenuem, aëreamq; eius partem, vt æger solam vini qualitatē perciperet. Ex hoc bibere quantum mane libenter habebat, ei præcepi, atque hoc sanē agendo, bibendōq; continuē, sanitatē recepit. Hoc autem morbo liberatus, idem præseruationis causā facere pergebat, bibebatq; , donec etiam corpore probē permutato, consuetā agendo viribus se constare sentiret. Hæc de lapide hæmatite à me visa, & vsu comprobata conscripsi, hæcenus Alexander lib. v. 1. cap. primo. Hic lapis Græcè *αἰματὶς* dicitur vocatur: Latine, Lapis hæmatites: Arabicè, Seedenigi, Sadeneigi, seu Aisdeneigi; Italicè, Pietra hæmatite: Germanicè, Blutstein, Gallicè, Pierre Sanguine.

Nomina.

## LAPIS SCHISTVS. CAP. CII.

SCHISTOS lapis in Iberia Hispania gignitur. probatur maximè, qui croci colore æmulatur, friabilis, suapte natara fissilis, concremento, & alterno coherentium venarum discursu, pectinum modo, Ammoniaco sali similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmiorum. quin & caua replet muliebri lacte persusus. ad prociencia, rupta, item genarum crassitiem, & vnas oculorum, magnopere efficax est.

Schisti lapidis consideratio, &amp; vires

SCHISTVS lapidem, quem tradidit Dioscorides gigni in Iberia, hæcenus allaui in Iran non vidimus. Fodit tamen hunc in pluribus Hecycia sylvar locis in Germania, quā & in Bohemia auctor est clarissimus Agricola. Cæterum cum de viribus cum hæmatite ceteris, hic eius vires nobis supplere poterit. Mominus Schisti lapidis Galenus lib. 1. x. simplicium medicamentorum, sic de eius viribus differens. Lapidis hæmatitæ perissimè vim obtinet, verū infirmiorē, is qui vocatur schistus, ac post eum galactites. At meliores caliditatis

etiam nonnihil, vt dixi, adiunxit. Vt itaque vnusquisque ipsorum leuiter, ac sensim ab hæmatitæ facultate recedit, ita ad oculos similiter in vsu ducitur: est tamen misior. Porro meliora remedia partibus etiamnum phlegmone afflictis semper graviora sunt, atque iucundiora: cæterum liberis iam phlegmone partibus infirmiora, quā quæ persanare valeant. *Ad id expe* *Nomina.* ita Græcis, vt Latinis Lapis schistus, & Italis <sup>10</sup> pietra scissile appellatur.

## LAPIS GAGATES. CAP. CIII.

INGAGATARVM lapidū genere. præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit. Niger est plerunq; , & squalidus, crustosus, perquam levis. Vis ei molliendī, & discutendi. deprehendit fonticū morbum suffitus: recreatq; vulnū strangulationes: fugat serpentes nidore. podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, quā influens amnis in mare effunditur, proximè oppidū, quod Plagiopolis dicitur. vocatur autem & locus, & amnis Gagas, in cuius faucibus ij lapides inueniuntur.

LAPIDEM, quem Gagatem vocant, in comitatu Tirolensi Germaniæ non longè ab Aeniponte (Germani Ispruch dicunt) in quodam torrentis alueo reperiunt, ostendit mihi primum clarissimus medicus Ioannes Petrus Merenda Brixianus, nullis prius notis à Gagatæ historia dissidēt. Nā præterquam quod igni admotus confectum accenditur, flamamq; contrahit, ac bitumē redolet, squalidus est, & niger, crustosus, & perquam levis. Hoc solet in vniuersum Flandria, Cimbriaq; vbi hgorū penuria incolæ hoc tantū lapide igeam sibi comparant. Fodit hoc tempore etiam in Italia Brixiano agro, è cuius fodinis nuper ingentem glebam misit ad me Tridento Santus Santinus diligens pharmacopola ad Corallij insignium. Fuchsius vir aliqui eruditissimus magno errore putat (vt libro primo retulimus, cum de pissalphaltō differeremus) Gagatem in Tirolensi comitatu reperiunt, esse pissalphaltum. Verū cum ego in hoc ab eo dissentiam, citato, nuper loco latius ostendimus. Porro idem in libro de componendis medicamentis, quem nuper auctum edidi, Gagatem censet esse succinum illud nigrū, quod nobis vulgō Ambra nra vocatur. Sed in hoc similiter eum (pace sua dixerim) hallucinari clarius esse opinor, quā vt pluribus demonstretur. Nam vt omittam absurdum mihi planè videri, quod succinum lapidis nomine dignetur, illud non est squalidus, <sup>50</sup> necq;

Gagatale Plin. conscribitur.

Enchelis en. var.



neq; crustosum, sed in superficie potius læue, & lucidum facis apparet. Sunt qui existiment fossiles quosdam carbones, quos in pluribus locis effodi in Germania tradidit Georgius Agricola vir doctissimus, & in fossilibus medicamentis indagandis hodie facile princeps, esse lapidē Gagatē, quod carbones ij non aliter quam ē ligno parati igne accendantur. Veruntamen cum hi flammam non edant, nisi fossilibus excitetur, nec vllum bituminis odorem spirent, eorum opinio planē refellenda videtur. Siquidem Gagates adeo bitumine prægnaus est, vt accensus picis ferē modo flagret, & nigerrimum emittat fumum. Quin & oleum copiosum reddit, vbi vireis organis conclusus, ignem vi perurit. Hęc commendaui Mefues demoniacis, epilepticis, paralyticis, spasmodicis, teranicis, arthriticis, ab vtero suffocatis, & conceptum non admittentibus. Quod tamen à carbonibus iis elici non potest, cum omni penitus humore destituantur. Gagatē historiam, & vires tradidit Galenus lib. 1. x. de simplicium medicamentorum facultatibus, his verbis. Est & alius lapidis colore atro, qui vbi igni admotus fuerit, persimilem bitumini odorem exhibet, quem Dioscorides, nonnulliq; alij in Lycia inueniri prodiderunt, ad fluuium nomine Gagatē, vnde & ipsi lapidi nomenclaturam inditam dicunt. Ego tamen eum fluuium non vidi, tamenq; parua nauicula totius Lyciæ litora legerim, quod videlicet, quæ in ea sunt, inspicerem. Crustaceos verò lapides nigros, & qui in ignem additi exitum flammam ederent, complures Cæle Syriæ asportauit, natos in colle, mari mortuo, quod vocant circum dato, quā orientem spectat, vbi & bitumen est: eratq; lapidum odor similis bitumini. Vrebatq; eis ad flatuosos tumores in genu diuturnos, & agrē curabiles, mistis videlicet facultatibus, quæ ad hoc symptoma probatæ fuerant. Planēq; visum est mihi euidentiorē earū facultatem reddidisse. Miscui verò ipsū & Barbaro quam vocant, & palam medicamentū effectum est exicantius, adeo vt & sinus contraheret, nedum cruenta vulnera glutinaret, ad quæ competere maximē creditur. hactenus Galenus. Cæterum Plinius lib. x. x. v. cap. x. x. i. existimasse deprehenditur, quod quemadmodū in medicamentis sibi viribus mutuis respondēt Thracius lapis, & Gagates, ita vterq; in aqua demersus accendatur, & conflagret, restinguatur verò in oleo. Quod tamē falsum est: quādoquidē Dioscorides vbi memoriæ prodidisset Thraciū lapidē liqdē viribus esse præditū, quibus & Gagates, subdidit Thraciū illud peculiare adscribi, quod aqua demersus accēdatur, & oleo restinguatur. quod tamē in Gagatē nō accidit vim Gagatē admittandā esse Actius testis est lib. 11. cap. xxxiii. quippe si igne insillatur, merōq; restinguatur, exhibeturq; id vinū cædiacis potandū, confestim leuantur, respuo fudore, excitatoq; arteriarum pulsū. Nonnulli Gagatē ad pollinis tenuitatem te-

runt, septemq; continuis diebus colicis ē vino propinant drachmā vnius pondere, & integrā restitunt valetudinē. poculum interim, quo laborantes bibunt, eiusdem calore suffientes. Sed quoniam Gagates ob quādam nominis similitudinē, lapidē ACHATEN ita veteribus appellatum, nihi in mentem redegit, cum is laudetur ad varia humani corporis incommoda, meritō hic aliquid de eo nobis dicendū 10 esse duximus. Repertus primū Achatēs est in Sicilia, iuxta Achatē fluuiū, à quo nomen sibi vendicauit. Lapis hic variis constat coloribus, & se inuicem incurfantibus zonis, lineisq; adeo vt quandoque varias effingant imaginū formas, naturæ tantum penicillo. Id quod maxime testatur Plinius lib. x. x. v. i. capite primo, vbi sic habet. Post hunc annulum regia fama est gemæ Erythrī illius, qui aduersus Romanos bellum gessit. Nanq; habuisse traditur 20 Achatē, in qua nouem Musæ, & Apollo citharam tenens spectarentur, non arte, sed sponte natura, discurrentibus maculis, vt Musis quoq; singulis sua redderetur insignia. Hinc igitur credūm est antiquos vocasse Achatē variis, ac diuersis nominibus. Vocatur enim phasachates, cerachates, dendrachates, leucachates, hamachates, corallachates, & id genus aliis: quod quidam columbos, quidam cornuæ, alij arbores, alij sanguineus, nonnulli corallum coloribus præ se ferant. Prodest Achatēs (vt Plinius est author) contra scorpionum ictus. Quod in Siculis vtique crediderim, quoniam primum eius provincię afflatus scorpionum pestis extinguitur. Et in India inuenti contra eadē 30 pollent, & aliis magnis miraculis. Spectasse etiam prodest oculis. Sirim quoque sedant in os additi. Leoninæ pelli similes, potentiam ceteris validiorem habere contra scorpiones dicuntur. In Persis verò suffitu, earum tempestates auerti, & præterea flumina sisti. Argumentum est, si in feruentes cortinas additi, resisterent. Sed vt pro sine, leoninis iubis alligandos. Abominantur hyenæ pelli similes, quod domibus discordiales sint. Sed qui vnicō tantū colore notatur, inuictos athletas reddit. hactenus Plinius. Lapis, qui Græcis λέγει γαγάτης, Latinis lapis Gagates vocatur: Italis, Nomina. 40 pietra Gagatē.

#### 50 LAPIS THRACIUS. CAP. CIIII.

LAPIS Thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythiæ, cui Ponto nomen est. Vis ei gagatæ. Traditur aqua accendi, & oleo restingui: quod in bitumine accidit.

QUI THRACIUM lapidē ostenderet in Italia, ætenuis profectō neminem inueni: nec qui illum aliis in regionibus se vidisse, aut inuenisse testetur, compertum habeo. Eius mentionem fecit Galenus vni cum gagatē lib. ix. de simpl.

Gagatæ  
floræ, &  
vires ex  
Galen.

Plinij lap-  
foss.

Achatē  
pidē histo-  
ria, & Si-  
ren.

Nomina.

Thraciæ  
pelli mē-  
tio ex Ga-  
leno.

simplicium medicamentorum, facultatibus, ubi ita scribit. Est & alius lapis, cuius meminit Nicander hunc in modum.

Si lapis vratur candenti Thracius igne, & post madefiat aqua, flagrabit totus: idem Mox oleo affuso, penitus resinguitur. adfert Thracius hunc ad nos pastor de flumine, nomē Cui Pontus.

Verum nullus eius in medicina vsus: neque Nicander præter graecolentiam, quæ sustinuit feras fugat, quicquam ei adscripsit. hæc Galenus. Cæterum nos Thracij lapidis hostiorum potius fabulosam, quam veram censemus. Eius nomen Græcum *λίθος θρακίος*: Latinum, lapis Thracius: Italicum, pietra Thracia.

Nomina

LAPIS MAGNES. CAP. CV.

MAGNES lapis optimus est, qui ferum facile trahit, colore ad cæruleum vergente, densus, nec admodum gravis. Datur cum aqua mulsæ trium obolorum pondere, ut crassos humores eliciat. Sunt qui magnetem crematum pro hæmatite vendant.

Magnetis lapidis historia.

MAGNES lapis Heraclius, & Sideritis quoque dicitur. Magnes quidem ab inventore (ut Nicaner est author) nomine Magno, qui primus in Ida monte lapidem hunc adinuenit: aut à Magnesia regione, ut Lucretius suis in poematibus scribit. Heraclius verò, vel ab Heraclia vrbe, vel ab Hercule: enim Hercules immanes domuit belluas, viribusque subegit, ita Magnes ferrum victicem rerum materiā ad se trahens, subigit, & tenet. Quas ob vires Sideritis quoque dicitur. quippe ferrum Græcis *σίδηρος* appellatur. Nos autem vulgari idiomate appellamus pietra Calamita. Foditur in Cantabria Hispaniæ, & in variis Germaniæ, ac Bohemiæ locis, cæsi sæpe casu inueniuntur in ferri fodinis. Præstat, qui ex Macedonia, & Magnesia illi contermina conuehitur: sed omnium præstantissimus est Indicus, & Aethiopicus. differunt Magnetes colore, qui in iis aut niger est, aut cæruleus nigricans, aut in nigro rufus, aut contrā. Optimus est mas, qui non modò celerimè trahit ferrum, sed etiam vim suam in id adeò transfundit, ut possit alterum inherens ferrū ad se trahere. quo fit, ut sæpius acus acum trahat, adeò ut altera alteri suspendeat, nullis appositis adminiculis, ad duodenum vsque numerum. Quod item ferreis sit anulīs, qui alter alteri inherentes catenæ inflat dependent, tamen postremus non tam perniciter inhaereat, uti primus, & secundus. Ratio autem cur Magnetis tantum facultas in se trahendi ferrum, nulli sanè, quod sciam, adhuc comperta est, nec vlla eam philosophorum inuestigatio vnquam assequi potuit. Proinde necessarium fuerit di-

cere, illi vim hæc peculiarem tribuisse cælum, & rerum omnium parentem naturam, ut Rhobarbaro vim detrahendi bilem, & Torpedinæ marinæ stupidam reddendi manum, quæ ipsam viucentem tegerit. Nec sanè aliud quicquam inueniri putauerim, quod viribus Magnetem magis æmuletur, quam Torpedo piscis. Quandoquidem vi Magnetis admiranda facultas ex una pendente acu in aliam transit acum, & ex anulo in anulum, idem similiter efficit Torpedinis virtus. Quippe hamo capta, obliques faciens eius facultas adeò cõfessim per fetas virgams excurret, ut statim piscatoris manū miro sanè stupore corripiat. Idemque efficit retibus comprehensa, vi per funem auxi inflat excurrente. Cæterum Dinocrates Alexandrinus (Plinius author est lib. xxxi. tit. cap. xlii.) Arfinoës de Magnete lapide templum concamerare inchoauerat, ut in eo simulacrum eius è ferro pendere in aëre videretur. Cuius forsitan rationem secuti Arabes, Turcarumque sacerdotes (si tamen vera referunt, qui talia scribunt) Mahumeti sacellum è præstantissimo Magnete concamerari iusserunt, ut imposita in eo Mahumethi arca è purissimo ferro constaret, tanquam diuino quodam miraculo in aëre penderet, ita deceptis populis. Trahit itaque Magnes propria vi ferrum, excepto eo, quod rubiginem contraxerit, vel ubi lapis in alio fuerit confricatus, aut ubi adamus propè adheratur. Magnetis vim sanè contrariam habet Thæmedes lapis in Aethiopiæ montibus nascens, non procul à monte magnetis: quippe quod appositum sibi ferrū cõfessim abigit respuatque. Quo fit, ut qui calcis ferreis per magnetis mōtem peruenit, pedes submouere nequeat per alium verò ambulantes, nunquam pedibus consistant, & veluci tripudiantes fiant. Magnetis breuiter meminit Galenus libro i. x. simplic. medic. sic inquit. Ex lapidibus vnus est & magnetes, & heraclea, quos vocant, ad similem hæmatitæ vim obinens. Lapis, qui Græcis *λίθος μαγνήτις*, & *ήρακλέας*, Latinis lapis Magnes, Magnetes, & Heracleus appellatur: Arabibus, Hager almagritos, seu Magnathis: Italis, pietra Magnete, & Calamita, Gallis Aymant, vel, Calamite.

Theam. des lapis.

Magnetis vis ex Gal.

Nomina.

LAPIS ARABICVS. CAP. CVI.

ARABICVS lapis maculoso ebori similis. Is tritus illitus hæmorrhoidas exiccat. Eius cinis dentifricio optimus.

NVLIVM hætenus vidi, nec reperi lapidem, qui eburneam mihi offenderit faciem. quapropter nec crediderim Arabicum lapidem hoc tempore conuehi in Italiam. Eius tamen nomen Græcum est *λίθος ἀραβικός*, Latinum lapis Arabicus: Italicum, pietra Arabica.

Nomina.

LAPIS GALACTITES. CA. CVII.

GALACTITES appellatur, quod

Λακτεum lacteum

lactem succum refudet: cinerei tamen est coloris, & gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones, & vlcera conuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pyxide plumbea recondere, propter vim glutini, quod ei obhæret.

LAPIS MELITITES. CAP. CVIII.

MELITITES omnia galactitæ simili, hoc tantum interest, quod dulciorum succum remittit. Eiusdem ut galactites effectus.

*Galacti* ostendit, hæcenus non reperi. Alter tamen *Galacti* (ut Galenus inquit lib. 1. x. simplicium medicamentorum) Galactites vocatur, quod in succum solutus lactis speciem reddat. quemadmodum alter melitites. quod succi dulcedine mel gustu repræsentet. Galactitæ nemini Plinius lib. x. x. v. 11. cap. x. sic inquit. Galactites ex vno colore lactis est. Eandem dicunt leucam, & leucographiam appellant, & synepithen: tritam lactis succo, & sapore notabilem. In educatione nutritibus lactis secunditatem: infantium quoque adalligata collo, salivam facere dicitur: in ore autem liquefcere. Eandem memoriam adimere dicunt. Mittit eam & Achelous amnis. hæc Plinius. Catechizans, ut testatur Agricola, non solum reperitur Galactites in quibusdam Saxoniz montibus, in Germania, sed etiam in quorundam fluminum alueis, pariterque Melitites. Lapis ille Græcè *λίθος γαλακτικός*, Latine lapis Galactites: Italicè *pietra Galactite* vocatur. Hic verò Græcis *λίθος μελιτικός*, Latinis lapis melitites: Italis *pietra Melitite* nominatur.

LAPIS MOROCHTHVS.  
CAP. CIX.

MOROCHTHVS lapis, quem aliqui galaxiam, aut leucographida vocauerunt, in Aegypto nascitur. quo, utpote molli, & facili liquefcente, linteo nes dealbandis vestibus vtuntur. Spira cula corporis obstruere videtur: conueniens iis, qui sanguinem expuunt, cælicis: & vesicæ doloribus, cum aqua potus. itidem fluxionibus vulnū, & impostus velleri. Mollihus oculorū collyriis miscetur: explet enim caua, arque delacrymationes sistit. Idem cerato exceptus, vlcera: quæ sunt in teneris partibus corporis, ad cicatricem perducit.

MOROCHTHVM lapidem nonnullis galaxiam vocatum nasci, fodiq; in Saxonia Germaniz testis est Georgius Agricola maximus fossilium indagator. Veruntamen cum nec inde, nec ex Aegypto, quod sciam, in Italiam deferatur, cur plura de eo dicam, non habeo. *Moro* *rochthi* meminit Galenus vna cum scissili lapide lib. 1. x. de simplicium medicamentorum facultatibus, sic inquit. Sunt & alij lapides in succum solubiles, ut qui in Aegypto nascitur, quo vtuntur ad splendorem linteis conciliandum. Est autē omnium dictorum minimè qualitaris participes, nec adstrictionem, nec morbum, nec absterionē præ se ferēs. quocirca hoc ipsum duntaxat lapidi huic inest, quod deficeret videlicet: proinde cerato eum miscentes ad cicatricem vlcibus inducendā in mollihus corporibus vsurpant. Sed & ocularibus miscetur facultatibus, perinde ut modò dicti. At quāto est maiore emolliendi vi, quā prædicti, quod nullam videlicet effectricem qualitatē habeat, tantò etiam moderatio est, magisq; dolorem leuat. Hunc lapidem quidam morochum, nonnulli leucographida nuncupant. hæcenus Galenus. Sed certè nescio qua ratione, aut auctoritate ductus sibi persuaserit Plinius lib. xxvii. cap. x. 1. hunc non esse lapidem, sed herbam, vbi vna cum leuca de leucographide disseruit. nisi fortasse fuerit vocabulorum similitudine deceptus. Lapis Græcis *λίθος μοροχθός*, Latinis *Nomina* Lapis morochthus appellatur: Italis, *pietra Morochtho*.

LAPIS ALABASTRITES.  
CAP. CX.

ALABASTRITES vocatus onyx, crematus, resina aut pice exceptus, duritias discutit. stomachi dolores cum cerato leuat: gingiuas comprimit.

ALABASTRITES notissimus lapis est iis, *Alabastr* qui Romana inuenerunt adificia. Hallucinantur tamen, qui credunt lapidem illum Alabastriten esse, quo hac tempestate torno varia finguntur vasa, quibusdam subnigricantibus venis discurrentibus, pellucido laeure, materia verò adeo imbecilli, ut parum collisa facili frangantur. Quandoquidem lapis hic Alabastritæ species non est, sed potius gypsi materia. Alabastrites enim, quem antiqui ad vasa vnguentaria cauebant, quò durius vnguentis a rancore vindicarent, nascitur (ut Plinius inquit lib. x. x. v. 1. cap. v. 11.) circa Thebas Aegyptias, & Damascus Syriæ. Hic cæteris candidior. Probatissimus verò in Carmania, mox in India, iampidem & Syria, Asiæq; Villissimus autem, & sine vilo nitore in Cappadocia. *Alabastr* *ta confid.* Probanur quam maximè mellei coloris in ver ex Gal. rice maculosi. hæc Plinius. Huius facultates memoriz prodidit Galenus lib. 1. x. simplicium medica

medicamentorum, sic inquit. Et alabastrites vocatus vnguis in medicinz vsum ingreditur combustus. Quidam eum bibendum dant stomachicis. Is Græcè *ἀλαστρίτης*, Latine Lapis alabastrites dicitur: Italicè Alabastr.

Nomina.

LAPIS THYITES.  
CAPVT CXI.

LAPIS nomine thyites, in Aethiopia gignitur, subuiri colore iaspidem imitatus: cum diluitur tamen, lacteum succum reddit. Vehementer mordet: tenebras, quæ pupillis obuerfantur, expurgat.

THYITES lapidem neque ipse hactenus inueni, neque ab alio compertum scio. Qui fortasse ex Aethiopia tantum petendus est, ubi eum gigni prodidit. Dioscorides. Verumtamen

Fuch. opinis representat.

Fuchsius medicus singularis doctrinæ, libro illo de compositione medicamentorum, quem collocupletatum secundo edidit, lapidem Dioscoridi Thyiten dictum, nihil aliud esse censet, quam lapidem illum cœruleum, qui Italis vulgo Turchina, aliis verò Turcius lapis appellatur, vt eius verba, quæ subiciam, aperte declarant. Iaspis, inquit, Galeno duplex est. Vna subuiriidis, quæ Dioscoridi Thyites, vt alibi diffusè monstrauimus, dicitur. Thyites autem non est nisi ea Iaspidis species, quæ quoddam aëri & cœlo matutino autumnali similis sit, hoc est, cœrulea, lacteque suffusa, *ἰασπις* Græcis, Iunioribus Turcica, Germanis Turckes nominatur. Quam certè appellationem verisimile est ex Thyitis deprauata voce promanasse, originemque suam duxisse. Altera viridis, quæ sic dicta est, quia virer. Eius duodecim sunt genera, quæ alibi à nobis sunt ordine explicata. Quintum autem genus est Turcica vocata Iaspis, de qua iam diximus. Hægenus de Thyite lapide Fuchsius sententia. Quæ sanè mihi nonnullis rationibus refellenda videtur. Primum nanque non inuenio, quod Galeno Iaspis in duo genera digeratur, in viridem scilicet, & subuiriidem, vt illi Fuchsius adscribit. Sed ipsam viridis tantum meminisse constat libro 1. x. simplicium medicamentorum, ubi de eius facultatibus differuit. Nec obstat, quod Galenus eodem libro in commemoratione Thyitis lapidis ex Dioscoride, hunc coloris esse scribat subuiriidis quodammodo, vt iaspis. siquidem Galenus eo in loco Dioscoridis verba refert, vt ex capitis illius titulo quisque certior fieri potest: id enim ita inscriptum legitur, *ἰασπίς ὁ αὐανήσας λίθος*, hoc est, de Dioscoridis Thyite. Præterea equidem nescio, quo pacto lapis ille Turcius possit esse Thyites: quoniam hic tum Dioscoridi, tum Galeno coloris est subuiriidis, non autem saturati cœrulei, vt ille. Ad hæc si lapis, qui *ἰασπίς* Græcis vocatur, & qui verò Turcius est, Iaspidis generibus assignetur (quod ipse quoque Fuchsius asserit) non video, quo modo fieri possit, vt idem sit Dio-

scoridi Thyites: qui à nemine, quod sciam, inter iaspidum genera recensetur. Postremo mihi quidem non videtur verisimile, quod Turcius lapis à Thyitis deprauata voce nomen acceperit. quam enim, quæso, illæ voces habent inter se similitudinem? certè nullam. Quare potius adducor, vt credam eum appellationem fluxisse ab Italica nostra lingua. nam quemadmodum in Italia cœruleus color, quem propriè cœli colorem esse volunt, vulgo turchino vocatur, ita etiam inibi lapis is, de quo sermo est, a colore, quem cœruleum habet, Turchina nominatur. Ex qua nomenclatura postea facillè factum esse arbitror, vt eundem lapidem iuniores Turcicum appellauerint: atque adeo simili imitatione fortasse dacti Germani ipsum Turckes dixerunt. Lapis, qui Græcis *ἀλάστρίτης* dicitur, Nomina. Latinis item Lapis thyites appellatur.

LAPIS IYDAICVS.  
CAPVT CXII.

IYDAICVS lapis in Iudæa nascitur, glandis effigie, candidus, scita admodum configuratione, lineis æqualiter inter se distantibus, quasi industria detornatis. Solutus nullam qualiteram manifestam gustui repræsentat. Potest ciceris magnitudine tritus ad cotem, vt collyrium, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati vrinæ auxiliari, & calculus in vesica comminuere.

LAPIS è Iudæa allatus, vnde & illi nomen, *Lapidis* passum in officinis habetur, vtuntur eo medici Iudæici *Iudaici* non modo ad vesicæ calculos, sed etiam ad eos, *res ex Galena.* qui in renibus sunt, Galenum secuti, qui libro nono de simplicium medicamentorum facultatibus, eius faciem ac vires descripsit, his verbis. Est & alius lapis viribus valentioribus in Palestina Syria proueniens, colore candido, specie concinna, lineas habens cœli torno ductas. Appellatur eum à loco, in quo nasci consuevit, Iudaicum, vtunturque ad vesicæ lapides in core soluentes, & ex aquæ calidæ tribus cyathis potui præbentes. Sanè in quibus nos experti sumus, profecit nihil, quod ad lapides vesicæ pertinet: verum ad eos, qui in renibus hærent, efficax est. *Nomina.* *ἰουδαϊκός* Iudæicus ita Græcis, Latinis verò lapis Iudaicus nuncupatur: Arabibus, Hager alyeudi, seu Hagiar alifeud: Italis, pietra Giudaica: Germanis, Iudenstein.

LAPIS AMIANTVS.  
CAPVT CXIII.

AMIANTVS lapis in Cypro nascitur, scisso alumini similis. quo, vt pote flexili, telas & vela tantum spectaculi gratia texunt, quæ ignibus iniecta ardent quidem, sed flammis inuicta splen didiora exeunt.

*Amiantum  
lapidis co-  
sideratio.*

**LAPIDEM Amiantum** (vt in alumine re-  
tulimus) officinae ac medici Alumen plumeum  
vocant, id esse existimantes, quod Græcis scis-  
sile dicitur. Sed, meo quidem iudicio, fallun-  
tur, cum plumeum alumen iis vocatum nulla  
adstringendi vi polleat, sed acri, nec in ignem  
coniecitur comburatur, quod Amiantum est pro-  
prium. In hac vulgari opinione, ego quoque vna  
cum plerisque rei metallice studiosis ismipri-  
dem versatus sum, donec clarissimus medicus  
Lucas Ghinus legitimum alumē scissile Pisis ad  
me misit, facie adeo Amianto simile, vt nisi ad-  
strictiora vis, qua pollet, ipsum ab Amianto plu-  
mum differre gustui indicasset, alterum sanē  
ab altero discernere nescissem. Nihilominus  
& ex eo discrimen cognoscitur, quod hoc in  
ignem proiectum statim exurit, ille vero ne-  
quaquam. Hinc itaque fit, vt haud dubie cre-  
dendum sit Alumen plumeum vocatum legiti-  
mum esse Amiantum. Cæterum non desunt im-  
postores (vt auctor est Erasmius Ferrariensis)  
qui lapidem Amiantum simplicibus mulierculis  
obstant, vendant; Depenimero pro signo  
Crucis Seruatoris nostri. Id quod facile cre-  
dunt, cum igne non comburatur, quodque li-  
gni modo plurimis conster lineis intercurstanti-  
bus. Meminit Amianti Plinius libro x x x v i.  
capite x i x. vbi se inquit. Amiantus alumini  
similis nihil igni perdit. Hic veneficis resis-  
sit omnibus, priuati in maiorum. Eius nomen  
Græcum *ἀμιαντός* Latinum, Lapis Amian-  
tus: Italicum, pietra Amianto: Gallicum Alun  
de Plume.

*Frax im-  
positum.*

*Nomina.*

**LAPIS SAPPHYRVS.**  
**CAPVT CXIII.**

**SAPPHYRVS** lapis percussis a scor-  
pione, potu prodesse existimatur. Contra  
intestinas exulcerationes bibitur. Excre-  
scentia in oculis, vnasque, & pustulas in-  
hibet, & ruptas membranas cogit.

*Sapphiri  
considera-  
tio.*

**SAPPHYRVS** gemma colore constat cya-  
neo, perquam translucido. Lapis est omnibus  
notus, quod annulis, & torquibus, quæ collo  
gestantur, frequenter inferatur. Plinius Sapphi-  
ros aureis punctis collucere scribit lib. x x x  
vii. capite i x. Veruntamen hac ætate nul-  
lum hæcenus vidi Sapphirum, qui aureis col-  
luceret scintillis, sed colore tantum cyaneo,  
adamantis modo translucido. Quo fit, vt putan-  
dam sit aut nostri vsus sapphirus esse cyanos  
gemmas sapphiri æmulas: aut hac in re errasse  
Plinium sciendum, quod fortasse cœruleum la-  
pidem peculiariter vocatum, quem Mauritani  
azulum, vel lazulum dicunt, pro Sapphiro ac-  
ceperit. Nam nullus præter hunc inter gem-  
mas aureis emicat scintillis. Sapphiri vres per-  
quam breuiter perstrinxit Galenus, cum tantum  
ad scorpionum ictus haustum prodesse scrip-  
sit. Cæteri in adduntur hoc tempore in medi-  
camenta ad cor facientia, & in antidota, quæ ad-

uersus venena, & pestiferos affectus parantur,  
non modo sapphiri, sed smaragdi, carbunculi,  
granati, sardonij, hyacinthique: tamen præter  
medicorum spem, potantes plerumque fallant:  
quod raræ admodum sint seplaxæ, quæ huius-  
modi gemmas agnoscant, & legitimas habeant.  
Caveant itaque medicæ, ne decipiantur. Id enim  
fiet, si vbi iis opus fuerit, periculosissimos probata-  
que fidei consulerint gemmarios, quippe gem-  
marum ramenta, quæ in seplasis habentur,  
adulteriis, & impossuris non vacant. Adde,  
quod plerumque alterum alterius vice suppo-  
nunt. Putant enim chrysopatos aureo colore  
nudentes hyacinthos esse, qui tamen amethy-  
stum colore referunt. Præterea obseruandum  
est, vt gemmarum ramenta, si quæ legitima, præ-  
claræque inueniantur, quin & margaritæ, &  
corallia super lapide porphyrite tantia acce-  
rantur, vsquedum redigantur in puluerem tenuis-  
simi pollinis instar. Et sine aduertant medi-  
ci, quibus curæ est, vt plus honoris, quam auri  
lucentur, ne corallia in æneis mortariis con-  
terantur. Nam si id inconsulte fiat, derasis deli-  
matique æneis mortariis, ferreisque pistillis,  
æris, & ferri scobis corallia admista, noxiom, &  
venenosum reddet medicamentum, magna  
agrotantium iactura. Quandoque dem vidi ego  
sepius mulierculas, quæ corallia & margaritas  
in æneis mortariis contriuerunt, & sabinde suis  
agrotantibus proponant, qui iis degustatis in  
maximum deducti sunt discrimen. Qui lapis  
*ἀμιαντός* Græcis, Lapis sapphirus item Latinis  
dicitur: Italis, Saphiro: Gallis, Sapphir.

*Cautione  
quadam.*

*Nomina.*

**LAPIS MEMPHITES.**  
**CAPVT CXV.**

**MEMPHITES** in Aegypto iuxta  
Memphim inuenitur, calculorum mag-  
nitudine, pinguis, versicolor. Tradunt  
trito, & illito, quæ vrenda, aut secanda  
sunt, sine periculo obstupescere, ita vt  
non sentiant cruciatum.

**LAPIS SELENITES.**  
**CAPVT CXVI.**

**SELENITES** lapis, quem aliqui  
aphroselenon appellant, quoniam  
noctu inuenitur lunæ imaginem red-  
dere, quæ cum ea quidem augetur, &  
decrescit. Nascitur in Arabia, candidus,  
translucens, levis. Huius ramenta com-  
mitialibus in potu dari iubent. Eo ceu  
gestamine ad amuleta mulieres vtun-  
tur. Arbores adalligato eodem fragife-  
ræ redduntur.

**MEMPHITES** lapis hodie, quod sciam, Aegypti  
ad nos ex Aegypto non adferunt, tamen vul-  
neribus medicis sepiissime desideretur, vbi in-  
tegra parum secūdo sit opus. Selenites  
verò est antea non videram, emi tamen hoc  
anno.

anno à peregrino quodam, qui è Galitia Hispaniæ, vbi dñi Iacobi templum inuiferat, in patriam reuertebatur. Hic lapis vitri modo transluet, & facillè in tenues finditur laminas quo fit, vt iis in locis, vbi frequentissimus habetur, vitri vices expleat, ad concludendas ædificiorum fenestras. Quidam, quod speculi imaginem reddat, Specularem lapidem vocant. Cæterum quoniam hic translucidus lapis Crystallum nobis in mentem redegit, cum expectatur id stupendum in medicum vsum, silentio inuoluendum non duximus. CRYSTALLVM itaq; (vt Plinius inquit libro x x x v i i . cap. i i .) gelu ve hementius concrefecit, nec aliubi certè reperitur, quam vbi maximè hybernæ niues rigent, glaciemq; esse certum est, vnde & nomen Græci dedere. Hæc Plinij de crystallo sententia. Nos verò contrà rationibus non obscuris innixi (quod etiam peritissimus Agricola sentit) Crystallum censemus nec glacie, nec niue fieri vnquam: sed eo ipso humore, quo in terræ visceribus gignitur beryllus, adamas, & alij id genus lapides. Gigni autem crystallum ex humore omnium purissimo sanè constat, quod omnium gemmarum clarissimum, translucidissimumq; sit. Probat ur scilicet gigni, non autem (vt Plinius inquit) ex glacie, vel niue: quoniam vna quæq; glacies quātūvis longo tēpore cōcreta in algidissimis montibus, à quibus nec hyeme, nec æstate nisi vnquā recedit, etiam à profundis partibus eruat, liquefit tamen in calidis locis reposita, non modo ignis, sed solis etiam calore. Nanque id ipsum Crystallo eueniret, igni vel solibus admoto, si è niue aut glacie concrefecer: reperireturq; tantum in montibus perpetuò niuosis. Verum enimvero cum reperitur etiam in marmorum, aliorumq; lapidum, & metallorum fodinis in Hispania, Germania, Seythia, Cipro, Carmania, & in Nerone, & Chiti rubri maris insulis, quin & in agris, vbi seges feritur, vbi aratro sepius magnas crystalli glebas fodere bubulci, liquido sanè constat, ex alia materia gigni crystallum, quam glacie. Si quidem id, quod in præruptis montium scopulis inuenitur, superficie tenus cohzrens, ex purissimo lapidescente humore in visceribus terræ concrefecit non dubitauerim: quod tamen tractu temporis à pluuiarum impetu, quæ in præruptis montium vniuersam deradunt terram, denudari crediderim. Quapropter non temerè dixit Plinius, liquidò se affirmare posse in cauitibus alpium nasci adeò iniui, vt plerunquæ fune pendentes id extrahat homines. Huic alia accedit ratio, quod glacies per aquas innatet, crystallum verò illico subsidat. Præstantissimum illud existimant, quod album & aquæ clarissimum modo pellucidum visitur. Vis crystallo adstrictiora: proinde datur in puluerem tenuissimum tritum vtiliter dysentericis ex vino austero. Alba vteri profusa sistit, lac verò nutritibus augeat, quod à Tridentinis mulieribus didicimus. Fiebat quondam antiquis è Crystallo

Crystalli  
historia.

Plinij sen  
tentia ex  
plosa.

Crystalli  
vires.

pila, qua aduersis solis radiis exposita medici corpora vrebant, igne inde concitato. Sed iis tantum id cauterij genus admovebant, qui cadente ferrò perterriti curati reformidabāt. Sed & nos huiusce cauterij periculum fecimus, non sine ægotantium, & adstantium admiratione. Lapis, qui Græcis *λίθος ιασπιδος*, Latinis lapis Memphis, Italīs pietra Memphis vocatur, Qui vero *λίθος σελήνης* Græcè, Lapis selenites Latine, Pietra selenite Italicè appellatur.

Nomina.

LAPIS IASPIS. CAP. CXVII.

IASPIDVM quædam smaragdum imitatur: alia crystallum, colore similis pituitæ: alia non dissimilis aëri, ob id vocatur aërizusa: alia veluti fumo infecta, quæ capnias ex argumento vocatur. quædam lineis albis resplendentibus præcingitur, Assyrios appellata. alia terebinthinæ similis, quæ terebinthizu fa dicitur. alia colore callaida gemmam æmulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum femoribus appensæ.

IASPIDVM genera longè plura recensentur, quàm quæ à Dioscoride describuntur. Quamdoquidem quædam visitur cæruleo, copioso, aut glauco pingui similis, id est viridis læte suffusa. Alia purpurea, qualis nascitur in Phrygia. Alia rosea, & quasi floribus tincta, qualis in Ida monte profundissimis specubus foditur. Alia ex purpura cærulea, qualis inuenitur in Cappadocia. Alia ex rubro nigra. Alia icoris imitatur colorem, quæ si saturatiore colore reperiat, lineis eiusdem coloris diluti, & nigri cingi solet. Quædam niuem imitata rutilis punctis respergitur. Quædam onyche pungitur, aut ex altera parte iaspis est, ex altera onyx, proinde iaspionyx vocata. Alia cuius altera parte sit purpurea, altera viridis, nec vtrinq; perlucens, sed qua parte virefcit. In summa varia est Iaspidium natura. Suspendas ad plura valere aiunt, nempe ad omnem sanguinis fluxum, ad protegendum conceptum, & partum iuuandum, veneremq; inhibendum, & febrem, & hydropem fugandam. Nec desunt superstitiosi, qui dicant Iaspidas homines reddere gratos, potentes, ac tutos, si quibusdā magicis verbis adnummurentur, priusquam suspendantur. Ex tot Iaspidis generibus viridis tantummodo meminit Galenus libro i x . simplicium medicamentorum, vbi de facultatibus eius rati differunt. Proprietatem nonnulli Iaspidibus quibusdā testimonio suo adscribunt talem, qualem re vera habet Iaspis viridis, nempe stomachum, ventrisque os adiunans appensa. Ac nonnulli quosque ipsam anulis inferunt, scalpuntq; in ea dra

Iaspidium  
genera.

Iaspidium  
natura.

Iaspidis  
res ex Gal.

conati

conem radios habentem, velut rex Nechepfos scripsit in quarto decimo libro. Sanè huius ego quoque lapidis abunde periculum feci. Torquem enim ex huiusmodi lapillis confectum à collo suspendi, ita ut lapides os ventris cōtingerent. Apparebat autem nihilominus prodesse, etiam si sculpturam non haberent, quam descripsit Nechepfos, hæcenus Galenus. Qui lapis Latinis Iaspis, Græcis *ἰάσπις* dicitur: Italis, Diasprio: Gallis, Iaspe.

Nominis.

## IASPIS ARTITES.

## CAP. CXVIII.

**ARTITES** lapis est veluti pragnās, cum quatitur, alio in vtero sonante. Grauidis continet partus, cum lubrica sunt vuluæ, & parum tenaces, sinistro brachio adalligatus: sed parturientiū ē brachio amoueatur, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditum offerat: fur enim mansum deuorare non poterit. Quinetiam concoctus furem coarguit: quippe decoctā cum eo deuorare non poterit. Tritus, & cerato exceptus, cyprino, aut gleucino, aut alio excalfaciente, comitiales magnificē iuuat.

*Actitis la-  
pide hys-  
sio, & si-  
nile*

**ARTITES** Græci, Latini Aquilæ lapidem dicunt, quod aliquando in eorum reperitur nidus. Variat lapis hic tum colore, tum magnitudine. Meminit huius Plinius lib. x x x v i. cap. x x i. his verbis: Actitis lapides ex argumento nominis magnam famam habent. Reperiuntur in nidis aquilarum, sicuti in decimo volumine diximus. Aiunt binos inueniri, marem, & feminam: nec sine iis parere, quas diximus aquilas, & ideo binos tantum. Genera eorum quatuor in Aphrica nascentem, pusillum, & mollem intra se, ac velut in aluo habentem argillam suauem, candidam: ipsum friabilem, quem feminei sexus putant. Marem autem, qui in Arabia nascitur, durum, gallæ similem, aut subrutilem, in aluo habentem durum lapidem. Tertius in Cypro inuenitur, colore illis in Aphrica nascentibus similis, amplior tamen, atque dilatatus. cæteris enim globosa facies. Habet in aluo arenam iucundam, & lapillos: ipse tamen mollis, ut etiam digitis frictur. Quartus generis Thaphiusus appellatur, nascentis iuxta Leucadem in Thaphia, qui locus est dextra nauigantibus ex hac ad Leucadem. Inuacatur in fluminibus candidus, & rotundus. Huic est

in aluo lapis, qui vocatur callinus, nec quicquam cenerius. Hæcenus de Aquilinis lapidibus Plinius. *ἄσπις ἰάσπις* Græcis dicitur, lapis Nominis. Actites Latinis vocatur: Arabibus, *ἰάσπις* achтамач: Italis, pietra d'Aquila: Gallis, Pierre d'Aigle.

## LAPIS OPHITES.

## CAP. CXIX.

**OPHITAE** genera multa. quidam ponderosus, & niger. alter cinereo colore spectatur, pūctis distinctus. tertius lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omnes alligati contra capitis dolores, & serpentium ictus profunt. Feruntur, qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari.

**OPHITAE** lapidis meminit Plinius libro *Ophite la-  
x x x v i. cap. v i i. sic inquit. Ex ophite co-  
lumnæ, sed paræ admodum inueniuntur. Duo  
eius genera, molle candidum, nigricans du-  
rum. Dicuntur ambo capitis dolores sedare  
adalligati, & serpentium ictus. Quidam phrene-  
ticis, ac lethargicis adalligari iubent candican-  
tem. Contra serpentes autem à quibusdam lau-  
datur, præcipue ex his quem tephriam appel-  
lāt à colore cineris. hæc Plinius. Verum Ophi-  
tes marmor, quod vulgò vocamus Serpentinum,  
porphyritæ ferè lapidis instar durissimum est,  
colore minimè nigricante, nec candido, nec  
cinereo, ut in suo requirunt Dioscorides, &  
Plinius. sed viridi saturato dilutis eiusdem co-  
loris maculis resperso. Ex quo sine constar an-  
tiquorum Ophiten à nostrate maximè fuisse di-  
cendum. Ophitæ lapidis vires tradidit Gale-  
nus lib. i x. simplicium medicamentorum, ubi  
sic inquit. Ophites quem vocant lapis vltus ex-  
tergendi confringēdiq; vim possidet, ceu etiam  
vitrum. Admodum enim & ipsum ex vino al-  
bo ac tenui epotum lapides vesicæ committunt.  
Verum ipsum in lapidibus quipsiam fortè non  
numeret. Et infra in Iaspidis viridis mentione  
de Ophite ita scribit. Porro lapidem ophiten  
(deprauati sunt Græci codices, qui habent,  
*ἰαπρίτης*) vir fide dignus re vera iuuare mor-  
sus à vipera suspensum retali. Sed eiusmodi  
faciles extra vsum sunt methodo constan-  
tem: velut etiam Hieracitis, & Indici, cum  
profluxum ex hæmorrhoidibus sistunt singui-  
nem. Lapis Græcis *ὀφίτης*, Latini Lapis Nominis.  
ophites: Italis pietra Serpentina vocatur: Gallis  
Pierre Serpentine.*

*Ophites  
marmor*

## LAPIDES IN SPONGIIS.

## CAP. CXX.

**LAPIDES** in spongiis inueniuntur, quiescunt calculos rupunt, in vino poti.

LARI





NAXIVM lapidem, itemque Geoden, nullus est, quod equidem sciam, qui hodie cognoscatur ostendatque in Italia vel ibi inuentos, vel aliunde allatos: tamen in Misina, & Saxonia nasci hos scribat Agricola. Naxius autem, Galeni testimonio, non solum virginibus mammarum incrementum prohibet, sed & pueris testes crescere non patitur, tanquam videlicet parti cepit facultatis refrigeratorio. Lapis, qui *Andri naxia*, Græcis, Latine lapis Naxius, ut etiam Italice pietra Naxia nominatur. Qui verò *Naxia* Græcè, lapis Geodes Latine, pietra Geode Italice dicitur.

*Nomina.*

TERRA OMNIS.  
CAPVT CXXVII.

OMNIS terra ad medendi usum recepta, summam & primam vim habet refrigerandi, meatusque obducendi, occludendique: sed specie distat, cum alia adiunctis quibusdam ad alia sit utilis.

TERRA ERETRIA.  
CAPVT CXXVIII.

ERETRIADES duæ sunt, una vehementer alba est, altera cinericia. Optima habetur ad cinereum colorem vergens, perquam mollis: quæ si per æramenta tractum ducatur, lineam violaceam refert. Lauatur ut cerussa, aut hunc in modum. Teritur seorsum, & cum aqua. & ubi pessum iterit, humor leuiter excolatur: siccata solibus, iterum teritur interdum, adiecta aqua, ut vespere confidat: antelucanis colo excernitur, & demum in sole trita, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si postea desideretur, pastilli magnitudine ciceris in fictile perforatum coniciuntur, oræque vasis diligenter obturato, supra carbones candentes continenter follibus persilantur: ubi verò cinis in fauillas se conuertit, aut æcreum colorem contraxit, exempti reconduntur. Vim habet adstringentem, & refrigeratorem, leuiter mollientem: caua explet, & sanguinolenta conglutinat.

TERRA SAMIA.  
CAPVT CXXIX.

SAMIA præfertur candida, levis, tan-

genti linguæ glutinis modo adhærens, mollis, succosa, friabilis: cuiusmodi est, quam aliqui collyrion vocant. Duæ enim species eius: vnam antè diximus: altera alter appellatur, crustacea, & cotis modo prædens. Vritur, ac lauatur, ut eretria, vimque consimilem habet. Sanguinis reiectiones sistit: foeminis fluxione vuluæ laborantibus, cum flore syluestris punice datur. Testium, & mammarum inflammationes, illita ex rosaceo, & aqua, refrigerat: sudores arceat. contra serpentium morsus, & venena pota ex aqua auxiliatur.

LAPIS SAMIUS.  
CAPVT CXXX.

SAMIUS lapis in Samia terra inuenitur, quo aurifices vtuntur poliendo auro, ut resplendeat. Probarur candore, & duritia. Visi adstrictoria, & refrigerans. prodest stomachicis potus, sensus hebetat: verum ad fluxiones oculorum, & vlcera, cum lacte efficax est. Partus, ut tradunt, adligatus accelerat, & conceptus foeminarum custodit.

TERRA, quam Samiam vocant, an ex Samo defertur in Italiam, non equidem ausim affirmare: tamen hæc usum in medicina maximum præstiterit Galeni tempore, qui ea, quæ asper appellatur, tanquam præstantiore semper usus est: huic tamen Dioscoridi præfertur illa, quam aliqui collyrion vocant. Sunt qui putent Samium altera illum esse lapidem, quem seplasia Talchum nominant. Sed ij, meo quidem iudicio, hallucinantur. quandoquidem Talchus linguæ contactu nunquam glutinis modo adhæret, acriter cotumax est, nec cotis insar prædatus vultur. Adde quod Talchus non sit crustosus, sed squamosus, translucentus, ut vitrum, ac levis: & quod non nisi magno labore, & diutino igne comburi possit: nec id quidem per se fieri potest, nisi quibusdam adiunctis, quod tamen Samio asperi non euenit, ut vapore qui facile, teste Dioscoride, cretræ terre modo comburatur. Ad hæc sciunt medici Talchum ebibitum stragulare, non secus ac gypsum: cum tamen Samius asper perinde atque Lemnia terra, contra venena, & venenosorum serpentium ictus maxime auxiliatur, & ut illa labijs & lingue inhæreat. Id quod aliquando animum crexit ad credendum, eam terram vel Samiam, vel Samiam similem esse, quam magnificum circulatorum, qui serpentes circumferunt, à Melita insula

*Terra Samia consideratio.*

fuia allatam: quamq; vulgò vocant Pietra di san Paolo. Siquidem hæc colore candida spectatur, linguæ tangenti pertinaciter adhærescit, mollis est, & succosa, facileque friabilis: & aduersus venena, & serpentium istus Lemniæ vicem explet. Cæterum neq; illud ausim asserere, quòd lapis Samius vocatus ad nos conuehant mercatores, quo aurifices aurum, & argentum antiquitus pollebant: etsi hunc quoq; in Germaniâ reperiri scribat Agricola. Terra Samia sic Latinis, acque Italis, vt *γῆ samia* Græcis appellatur. Lapis verò *ἀλφειοειδής* Græcè, Lapis Samius Latinè, & pietra Samia Italianè nominatur.

## TERRA CHIA. CAP. CXXXI.

CHIA eligi debet candida, vergens ad cinereum, Samiæ similis. Est autem crustosa, albaq; sed scititiis formis differens. Vis eadem, quæ & Samiæ. extendit faciem, & erugat, atq; splendidâ reddit: colorē in facie, & corpore toto commendat. in balneis pro nitro deterget.

TERRA SELINUSIA.  
CAP. CXXXII.

EADEM præstat Selinusia. maxime laudatur, quæ vehementer resplendet, candida, friabilis, & humore diluicelerrima.

TERRA CIMOLIA.  
CAP. CXXXIII.

CIMOLIAE duo genera, candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur, quæ innatam habet pinguitudinem, tactuque frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit. Ambusta igni, si statim cimolia oblinantur, pustulas non sentient: testium duritias, & totius corporis collectiones cohibet: igni sacro imponitur. In summa, vtraque multum in medicina commendatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur.

TERRA PNIGITIS.  
CAP. CXXXIIII.

QVÆ pnigitis dicitur, colore ferè eretriæ similis est, grandioribus tantû glebis: manû si quis admoueat, refri-

gerabit: tactu linguæ vsque adeò glutinosa, vt pētilis hæreat. Cui effectus idē, qui cimolia, paulò tamen infirmior. Hanc aliqui pro eretriade vendunt.

TESTAE FORNACEAE.  
CAP. CXXXV.

FORNACEAE testæ vehementer tostæ, crustas vlceribus obducunt: quare prurigini, & papularum eruptionibus, medentur. Podagricis profunt: strumas discutiunt, cerato exemptæ.

TERRA FORNACVM.  
CAP. CXXXVI.

FORNACVM terra, quæ retorrída fuluescit, eiusdem cum testa effectus,

TERRA MELIA.  
CAP. CXXXVII.

MELIA colore cineream eritream imitatur, aspera tactu: ea digitis friata, derastris pumicis modo crepitat. Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur: modicè linguam siccatur: purum corpus reddit, & colore commendat: pilos extenuat: vitilignes, & lepras abstergit. Picioribus vsum præbet, vt colores diutius perennet. Emplastris viridib; quæ chloræ dicuntur, efficaciter inferitur. Ex omni melia terra, & omni alia in vniuersum, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit, faciliè resoluitur.

QVÆVNIS terra Eretria, Chia, Selinusia, Cimolia, Pnigitis, & Melia antiquis notissimæ fuerint, & in vsu medico frequentissimæ, vt author est Galenus, tamen ab his, qui nos præcesserunt, adeò neglectas fuisse constat, vt nulla amplius, quod sciam, ad nos adieratur. Quâ obrem non operæpretium duxi, vt in singulis moram traheremus, ac de earum historia & viribus latius differemus. Quæ terræ *γῆ χία*, Nomina. *ἀλφειοειδής*, *ἀλφειοειδής* *πνιγίτις* Græcis, Latinis, terra Chia, Selinusia, Cimolia, Pnigitis, Melia: Italis, terra Chia, Selinusia, Cimolia, Pnigite, Melia vocantur: Arabibus verò terra Cimolia Teri chimolea, seu Thid chimulia: Pnigitis, Terihanem.

TERRA AMPELITIS.  
CAP. CXXXVIII.

EX AMPELITIDE terra, quæ pharmacitis nomine in Seleucia Syria nascitur, laudatur in primis nigra, piceæ longos carbonēs referens, modicè asulosa, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim eliquescit. Vitiōsa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi, & refrigerandi habet. ad calibephara additur, tingendis capillis idonea. Vſus eius ad illinendas vites, sub germinationis tēpus, vtpote cum innascentes vermiculos enecet.

*Ampelitis  
de terra  
considera-  
tur.*

AMPELITIS, vt author est Galenus libro nono simplicium medicamentorū, hoc sibi nomen iure vendicauit, quod antiquis in frequēti haberetur vſu, ad præseruandas ab erucis vitium gemas prima carū germinatione, quemadmodū nos viſco carumſito nostras tuemus in Hetruria. Pharmacitis verò dicitur, quod medicamentosa maximè sit. Siquid non modò vermiculos ad vites ascendere inhibet, sed etiā eos interficit. Hæc vsque adeo bitumine reſerta est, vt Plinius, & Possidonius, bitumini similē ipsam fecerint. Cuius experimentum est, si facili in olea imposita, liqueſcat. Quamobrē credere nonnulli Ampelitim terram crustosum illum fuisse lapidem, quem scribit Galenus se inueniſſe in Lyciæ litoribus, & in Cœle Syria, qui in ignem coniectus leuiusculā edebat flammam. Hoc argumento nixi, quod idem scripserit se reperisse lapidem illum in quadam colle omni ferè ex parte circumdato ab Asphaltite lacu, quem Sodomæum vocant: ex quo bitumen in ipsum labitur lacum. Quapropter non desunt, qui dicant, Galenum haudquaquā nouisse, eos lapides nil aliud esse, quā terrā ampelidem. quæ cum piceum referat carbonē, vt Dioscorides ipse testatur, non mirum, si potius lapidis, quā terræ speciem præ se ferat. Non ab re itaq; credendum fuerit, Ampelitim terram non admodū à Gagete lapide differre, quippe quod vtræq; ex terra & bitumine suā traxerint originem. Ampelitis nuperrimè è Carniolā, vbi foditur, ad me allata est, nullis reclamantibus notis. Hæc, quæ γῆ ἀμπελίδος Græcis, Latinis terra Ampelitis appellatur: Arabibus, Thū alcharin: Italis, Terra ampelite.

FULIGO PICTORIA.  
CAP. CXXXIX.

FULIGO, quæ pictores vtuntur, ex vitrariis officinis colligi solet: siquidē ei palma tribuitur. Vis ei ad adstringendum, & erodendum efficax. fracta, cū rosaceo cerato ad cicatricē pducit.

ATRAMENTVM LIBRARIVM.  
CAP. CXL.

ATRAMENTVM, quo scribimus, fuligine de tedis coacta colligitur. In singulas libras gummis, ternæ fuliginis vnciæ adiiciuntur. Fit etiam è resinarum, & pictoria fuligine, de qua paulò antè diximus. Assumitur autem fuliginis mina, gummi fesculibra, glutinis taurini, atramenti sutorij, singulorum fescuncia. Additur conuenienter erodentibus medicamentis. ambustis, ex aqua commodè crassius illinitur, sed non antè soluatur, quā cicatricē induxerit: sanatis siquidem viceribus, sua sponte decedit. Cæterum habes, amicissime Arce, ferè quæ tradenda duximus pro operis modo, quem destinaueramus, & materia, auxiliorūque medicinalium copia.

DE FULIGINE pictoria, atq; etiam de Atramento librario latius & apertius à Dioscoride scriptum est, quā vt de his plura nobis supersint dicenda, vel declaranda. Quare iam vni cum authore nostro, huc quinto libro finem imponamus. atque insuper nō o, cui omnia, quæ à nobis sunt, aut dicuntur, accepta ferre par est, immentas agamus gratias. Ea fuligo, quæ ἀσβήνη πυρρῆς Græcè, Latine Fuligo pictoria dicitur, quemadmodum Italis Fuligine de pictori. Quod verò μίανον γραφικόν Græci, Latini Atramentum librarium, Itali Atramento librario, aut Inchiostro nominant: Galli, Encre à écrire.

*Nomina.*

## LIBRI VINTI FINIS.

# PETRI ANDREAE MATTHIOLI MEDICI Senensis Commentarii,

## IN LIB. SEXTVM PED. DIOSCORIDIS

### ANAZARBEI, DE LETHALIBVS.

#### VENENIS, FORVMQVE PRÆCAVTIO- NE, ET CVRATIONE.

\*\*\*

### Præfatio Dioscoridis.



**S**UPERIORIBVS, amicissime Aree, libris tradidimus de aromatibus, oleis, vnguentis, arboribus, & carundē fructibus, lacrymisque: item animalibus, melle, lacte, seuo, frumentis, oleribus, herbis, radicibus, li-<sup>30</sup> quamentis, vinis, metallisque. In hoc verò toxiū operis vltimo, facultates medicamentorum recensēbimus, quæ prodesse nobis, aut officere possunt. Vitata igitur orationis prolixitate, opus institutum prosequamur. Huiusmodi autem tractatus cū bifariam distributus sit, in partem venena præcauentem, ita vt ne fallant sumentes, aut si quando per imprudentiam den-<sup>40</sup> tur, vt tūc quoque innoxia fiant, irritaque: & in rationem iis succurrendi, qui iam noxam sentiunt: primū differram de præcauendi modo: quem esse difficillimum plerique maiorum arbitrantur, quòd dantes clam venena ita insidias temperant, vt peritissimum

quēq; decipiant. Siquidem venena sua amaritudine, permittis dulcibus, spoliant, & graue odoris virus mistura odoramentorum eximunt. Aut medicamenta immiscent, quæ tuendæ sanitatis gratia dari putantur, & præsertim in valetudine, vt absinthium, tragoriganum, satureiam. aut hyssopum, quin etiam thymum, irim, organū, abrotonum, castorium, aut si quid medicamentis purgatoriis cognatam habere qualitatē videatur. Aut potionibus in ferunt, vt vinis asperis, iuribus, passo, mulsæ aquæ, musto: succis, vt in cremore ientis, polentis: aut medicaminibus, aut aliis, quæ assumuntur, edulij speciem referentibus. Quare qui in ea suspicione sunt, conditos cibos vitare debent, omnique intenso sapore dulcium, aut salforum, aut acidorum abstinere: nec sitibundi affatim bibere, aut esurientes voraciter comesse, semperque ad saporem horum diligenter attendere, præsertim; potu frigidam aquā præsumere. Satiato enim appe-  
titu,

ticu, qualitates ægerrimè postea con-  
coquuntur. In agris quidem faciliè caue-  
re potiones auxiliij prætextu dari so-  
litas, quas offerunt improbi veneficio-  
rum artifices: itaq; ob id laborantes  
morbo non perinde audentiù iniuriis  
patent. Et hæc quidem ne faciliè incau-  
ti seductique homines capiantur dolis  
veneficorum, ratio est, & facultas. Sed  
alia superest expeditior, vt suspiciosi  
aliqua præsumant, quæ venenorum vi-  
res hebetent, & inefficaces irritasque  
reddant: cuiusmodi caricae sunt cum  
iuglandibus nucibus māducatae, & quæ  
cedromela vocant, id est citria, semi-  
nisq; napi drachmā cum vino. Item so-  
lia calaminthæ, aut creta, quæ Lem-  
nia sphragis appellatur, pondere pari  
cum vino: aut rutæ folia, & nucis iu-  
glandis nucleum: aut caricas duas, &  
salis callum ieiuni sumāt, & nullo vene-  
ni genere lædentur. Antidota ex vino  
sumpta, eundem effectum præbent: in-  
ter quæ intelligitur magnum Mithri-  
datium, & quod scinco, & quod san-  
guinet temperatur. Quin & sæpe ven-  
enis obstant peculiare quidam cor-  
porum affectus certo quodam modo  
constitutorum, cum quadam cibi, po-  
tusque qualitate, tū vinicopia ita tem-  
peratorum, vt cum venenis dissentiat.  
siquidem ingestiveneni vires frangunt,  
arque iam priore alimento sarsitis, præ-  
clusisque meatibus, obstant, ne mem-  
bratim per digestionem insinuetur.  
Verum enimvero, quoniam fortunæ  
necessitas interdum similia discrimina  
peregris agentibus adfert, absque ullis  
insidiis hominum, non nihil differendū  
mihi de hac re necessarium duco. Iam  
primū igitur culinam apparere loco  
subdiali conuenit, cibosque & potus ia  
huiusmodi loco struere. Si id fieri cō-  
modè nequit, secūda erit cōditio hæc,  
apparandi, apponendi que sub tecto.  
Sed tū diligenter laquearia animadu-  
tenda: frequenter enim à superioribus  
contabulamētis animalia decidunt exi-  
gua quidem, sed quæ non modicā per-

niciem moliantur, vt phalangia, stellio-  
nes, & alia quædam reptilia. Porro vi-  
naria vasa diligenter intueri oportet:  
nanque reptilia odore vini illiciuntur,  
quæ interdum forbendo, noxium virus  
eruſtarunt, interdum verò delapsa im-  
mersaque expirarunt, & exitij causas  
haurientibus attulerūt. Sed hæc hæc-  
tenus dicta sint, ne cauti, & providi insi-  
dijs pateant. Quod si qui sua sponte,  
aut ex quorundam insidiis semperit,  
auxiliari primo quoque tempore opor-  
tebit. siquidem dum comites singulo-  
rum venenorum notæ expectantur, im-  
medicabile fit venenum, & paulisper  
neglectum, medicamentis ægrè cedit.  
Quare si qui pro cōperto se virus sum-  
sisse intelligit, & fateatur, aut eorum,  
qui aderāt, testimonio cōstet, protinus,  
ad idonea remedia transeūtes, faciliè pe-  
culiari, nativæque constitutioni resti-  
tuemus. Neque enim iis assentimur,  
qui prorsus auxilia in huiusmodi fru-  
strā adhiberi contendunt. Quo enim  
modo morbi, quorum causæ cæcæ, la-  
tentisque corporibus insident, medi-  
cinam admittunt, & quæ forinsecus  
incurrunt venena, medendi rationem  
aspernantur? Acquæ verò omnes mor-  
bi pro causarum ingruentium magni-  
tudine, proque antecedentibus affec-  
tionibus, qualitatibusque, quibus sit  
oportunum corpus, vel medicabiles  
sunt, vel nullis cedunt medicamentis.  
Quod si qui forsā obmutescens, aut  
temulenti, aut nolentes alioqui vene-  
num à se egeri, nullam nobis eius co-  
gnitionem præbeant, tum protinus ac-  
cedendum ad ea, quæ communiter e-  
potis quibuscunque venenis opitulari  
consueverunt. Atqui nullum magis in  
omnia valens auxilium dari potest,  
quàm vt proximo loco virus foras ex-  
hauriatur, priusquàm inualeſcat. Qua-  
re sine mora calidum oleum ex aqua,  
aut seorsum vt vomitare cogātur, dari  
conuenit. Aut si oleum naturæ loci ne-  
gat, butyrum cū aqua calida, aut ma-  
lua, aut lini semine, aut trago, vrtica,

sceno græco, aut halicæ decocto, vicem eius exhibebit. Hæc enim nō modò vomitionibus exigent villa sua laxatrice, aut nausæam ciente, sed alium quoq; subducent, & corporum inanitione ita aduersabuntur, vt acrimonias venenorum hebetent. Id quod euidenter huiusmodi argumento deprehendere licet. Esto, vt quisquam viua calce, vel fæce, aut cantharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationem non accipiet. Atqui neque vehementer adstringi corpus, neq; refrigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiam vomitus non ob id modò, quòd vacuet, & noxium humorem excernat, iuuamentum adfert, sed quòd assumptum virus nonnunquam odore, coagulatis grumis, aut colore prodatur. quippe cum odore, & amaritudine, meconium: colore, cerassam, gypsumve: grumis, lac aut sanguinè animalis recens iugulari ostendit. Nam grauis odor regestorum, leporis marini, aut rubetæ veneficia deprehendit: ita vt nonnulla ab iis remedia peti possint, ad idonea singulorū auxilia transcurrentibus. Oleo etiam malæ decoctū admiscetur, aut glauciū, aut adeps anserinus, aut pinguium carnium iura, aut lixiuium lignorum cinere factum. Vbi verò vomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in ventre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquæ, clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum cum hydromelite sumptū, & vina vetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues pisces, vetusta carnes pinguesque, & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Aluum nanque subducent, vt diximus, & stomachum resoluentia, prouorem ipsum ad vomitum reddunt: & venenorum acrimonias hebetant, atq; meatus obstruentia, celerem virum penetrationē inhibent. Quinetiam medicamēta dantur, quæ cōmuni dote profunt, vt Lemnia terra, agaricum, abrotonū, itio, radix

eryngij, semen paltinacæ, & calaminthæ, nardum Gallicum, castorium, ferulæ virentis medulla, flos rhododendri, succus marrubij, laser, aut laserpitium, sagapenum, peucedani succus, aut panacis, & radix, quam magdaram appellant, aristolochia longa, syluestris rutæ semen, & betonica, quæ cestron nominant, folia. singula cum vino drachmæ pondo sumi debent. Effectum præbet polij decoctum, & fesele, & liquida pix linctæ. Magnificè ferunt opem antidota, quæ in calce operis scripta reliquimus. Communis ratio præstandi auxilij ita se habet. Ceterum ab iis, quæ consueuerunt euenire, cōmunia remedia sumptitari possunt. Ferè enim vires venenorū quàm plurimorum in affectus consimiles corpus tandem redigunt. Quam ob causam plerisque communia conducunt auxilia. varia etenim sunt venenorum genera, communes tamen, nec multiidem affectus oriuntur. Neque fieri potest, vt omnes concurrentesque casus, quæ symptomata vocant, vñ venenum sequantur. alioquin supernacanea fuisset venenorum singulorum traditio, cum suis remediis ab authoribus descripta. Neque verò in vno eodemque promptū est inuenire, vt quis stomachi, alui, intestinorum, iecoris, renum, & vesicæ dolore vehementer crucietur, vt singuliat, erodatur, contremiscat, refrigeretur, obmutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, spiritus difficilis fiat, veterno prematur, vertigo obuersetur, caligent sensus, stranguletur, sitiatur, sanguis erumpat, febre cōsistatur, ægrè lotium reddat, torminibus vexetur, crebrò vomitet, nausea prematur, rubescat, liuore singilletur, palleascit, desipiat, stertat, viribus deficiatur, & pleraque alia faciat, patiaturque. singula enim in generales affectus deducta, pauca numero, & communia ea demonstrant, quæ euenire consueuerunt. Quare in singulis, quæ suprà diximus, non facile

fuere deuoratum virus cognoscere. Nam oris & linguæ erosio, stomachi, ventris, vesicæ ac renum inflammatio, vehemens vrinæ difficultas, & interdum cruoris cum eo exitus, lancinatio, & in pluribus partibus quidam aduersionis sensus, non in cantharidibus modò potius reperiuntur, sed in erucis quoque pinorum, & bupreste, & salamandra. Porro non modò eos, qui meconium hauserunt, veterino, aut fopore premi, stertere, liuore sugillari, torpere, refrigerari, stupefcere, toto corpore pruritus sentire, sensu priuari constat, sed eos etiam, qui mandragoram, aut cicutam deuorauerunt. Delirium non hyoscyamus tantum infert, verum etiam, quæ toxica appellantur: itidem aconitum, & mel, quod in Heraclea Pontica gignitur. Strangulatio non minus in fungis, quam in sanguine taurino, lacte, aconito, cerussa, gypso conspicitur. In summa, difficile vnum vni veneno proprium inuenire signum, quod haustum, gustatumque virus prodere possit: maximè, quod hæc cæterorum etiam vitiolorum, quæ in corpore exoriuntur, communia sequi solent. Cæterum in his, quæ celeriter enecant, noxam signis forsitan indicare possis, si ad ea respexeris, quæ sumus dicturi. Sed in iis, qui ad longas ægritudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, duntaxat quod pertineat ad indicia noxæ, vtpote cum venena statim, atque præsentaneam vim illam perdiderunt, transmutata in longos affectus, cõmunia reliquorum vitiolorum remedia, compositionesque flagitent, cum venefica proprietates non amplius insit. Si verò longa sit affectio, in aliquod diuturnorum morborum genus reciderit, à quibus facile fuerit medendi rationem assumere. Sed de iis, quæ generaliter auxiliantur, hæcenus. Consequenter quæ priuatim singulis profunt, scriptis mandabimus, si prius sigillatim exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem, aut malefi-

cam vim fortiuntur, vt medicinæ studiosi ea cautè obseruent, quæ ad rationem salutis scripta inueniuntur: quod nõnulla eorum, quibus vtuntur, venenis sint commista. Incuria enim magnas adfert noxas, & sæpe continuo vsu eorum, homo in perniciem agitur. Proinde animalia, quæ exitiosam vim habent, hæc sunt: cantharides, buprestis, salamandra, pinorù eruca, lepus marinus, rubeta, & rana palustris muta, deuorata hirudines. Semina sunt, hyoscyamus, coriandrù, cicuta, gith, psyllion. Liquamenta, meconium, opocarpason, thapsiæ succus, elaterium, mandragoras. Radices, quas mittit chameleo, aconitum, thapsia, veratrum, ixia, agaricum nigrù, ephemerù, quod aliqui Colchicum vocat, quod in Colchide nascitur. Arborea, herbæ, oleræque: smilax, quam aliqui tithymalum appellant, Romani taxum: solanum manicum, quod & dorycnium dicitur: fardonia herba, quæ rauunculi genus est: corniculatum papauer, pharicum, toxicum, ruta syluestris, fangi. Ab animalibus, taurinus sanguis recens, lac intus coagulatum, mel Heracleæ in Ponto genitum. Metalla, gypsum, cerussa, calx, auri pigmentum, duo sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum viuum dicitur. E liquoribus domesticis, vinù abunde post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

## COMMENTARIVS

MATTHIOLI.



MAGNUM GANE, & immensum beneficium acceptum referre debet sapientissimo Dioscoridi non solum medicis orbis vniuersi, sed etiã vniuersa simul humana natura: quippe quod is ætenu medicam illustrauerit quinque superioribus libris, in quibus insinctorum simplicium medicamentorum historiam, ac facultates miro ordine tradidit sine quibus nullo quidem pacto ægritudines propelli possent, nullæ; earum noxa deleri, quibus vita postea cõ-

*Beneficium  
à Dioscorido  
posteros  
collatum.*

afficitur, ac tollitur. Sed longe plura adhuc beneficia eidem accepta referri debent, quod deinceps in hoc sexto volumine, exactissima scientia, mirabilique doctrina, ac ratione explicaverit, & quomodo quisque lethalia omnia venena præcauere possit, & que etiam ratione succurrat, ne eadem perniciem, vel aliquam inferant ~~noxiā~~, quæ prius per imprudentiam, aut malitiam, vel dolum intus in corpus assumpta fuit. Nam est: medicamenta tam ad vniuersales, quam ad particulares morbos, qui quotidie inuadunt, affliguntque humanum corpus, necessaria plurimum semper extiterint apprimere vtilia, innumerati tamen habentur morbi, qui seruata tantum victus ratione, naturæ duntaxat ope pel-  
luntur. Secus autem euenit ijs, quibus venenum exhibitum sit. Quandoquidem nisi prius haustis præstantibus admodum antidotis veneno præuenerint, vel post ipsum assumptum remedia non admiserint, rarissime vel nunquam naturæ viribus seruantur. Quin potius eos plerumque vita desinit, qui venenum hauserunt, nisi quam primum succurratur remedijs. De quibus ita abunde accurate scripsit Dioscorides, vt Galenus & grauitissimus author, & medicorum facile princeps, necnon tota posteritum Græcorum & Mauritanorum schola, ipsum in hoc adeo diligenter sint imitati. vt ab eo omnem humane facultatis doctrinam didicerint. Cuius rei amplissimus testis est Galenus libro primo de antidotis. Quamobrem omnibus perspicuum esse potest, Dioscoridem in hac venenorum, aquæ ac in illa medicamentorum facultate, omnium facile principem, & magistrum extitisse. Itaque cum in alios eius quinque superiores libros, commentarios (vt puro) non inuiles conferissem, me equidem operæpretium facturum putauit, si libro quoque sexto commentarios addiderem: præsertim cum nouerim quam utile sit, ac necessarium homines in vniuersum assequi tum modum, tum rationem tant præcauendi, quam curandi venena, non solum ea, quæ intus in corpus sumuntur, sed etiam quæ venenosorum animalium morsu, vel ictu circūuolant, & relinquuntur. Siquidem malefacta venenosorum vis, adeo grauis, & potens humane naturæ semper exitit iocunda (huc enim magis, quam exteris aduersatur) cunctaque velocitate suam exequitur motus, vt sæpe numero eundem præstet effectum in corporibus nostris, quem præstat voracissimus igitur, si quando ad antitissimas peruenerit paleis. Fritenim, vt plerumque venena, dum iudent qui sumpservnt, vel ictu languent, medicos accessit, eosque corporis humores inficiant, atque etiam principes partes, vt subinde nihil, vel parum profint remedia, & quæ præstantissima antidota. Quapropter rectè Galenus lib. 1. 1. de simplicium medicamentorum facultatibus cap. x. 1. 1. scriptum reliquit, quod quando venenum putredine, & erosione enecans, grauem corpori intulit noxam, fieri quidem non potest, vt amplius vincatur, supero-

turque vel victus ratione, vel generosorum medicaminum ope. Ex hoc itaque accepi, clarèque cognoui, quod si in hunc quoque librum sextum commentarios non scripsissem præstantiorem, magisque vitæ humane necessariam medicamentorum partem, intantam silentio præterissem. Quæ quidem pars, cum præterea à nobis ex Dioscoride pluribus antè annis in Italicam linguam versa habeatur, ac etiam his nostris commentarijs enarrata, causa nimicum erit, quæ potissimum intrinseci homines, non modò à mortiferis se tueantur venenis, sed à morte quoque liberentur. Nam quicumque in hos nostros incidit commentarios, qui Italici, aut Latini sermonis non fuerit proflus signarus, quantum non fuerit medicus, non tantum sibi ipsi, verum etiam alijs adiuuamento esse poterit. Nempe quod vis medicamenti à simplicibus, tum compositis ad venenosorum noxam facietibus, quorum inferius præstantiora, valentioraque relegam: quinetiam convenientius vltus cautionibus, facile aliquando veneno proflus medebitur, aliquando autem tandè agros vixos traducet, quandiu diligentissimis medicis accessit, qui non semper præstò sunt, sed magna ex parte vel longe distant, vel absunt, integrum medendi locum relinquit. Sed antequam modum, ac rationem præcauendi veneni in medium asseram, non alienum duxi ad ampliorem huius rei doctrinam, nonnulla in vniuersum præmittere scitu, vt arbitror, necessaria, vt sine quibus tractatio hæc diminuta, & imperfecta videri posset. Primum itaque dixerim (vt erim Conciliator Veneni inquit in libro, quem de venenis edidit) venenum omne intra corpus nostrum assumptum omnibus suis facultatibus proflus opponi cibo, quo nutimur. Nam quemadmodum cibus in nostri corporis sanguinem vertitur, sitque in omni sui parte membris, quæ præcipue nutrit, finis, locum illius, quod continuo in nobis exsoluitur, subintrans, ita venenum contrario modo se habens, corpus, ac membra, quibus primò adheret (vt infra latius dicetur) in sibi perquam venenatam naturam transfert. Vnde quemadmodum animalia omnia, omnesque fructus, quæ terra parès gignit, quæque in nutrimentum verti possunt, si à nobis edantur, in nostrum trāsunt alimentum, sic per oppositum modum, venenata intus in corpus sumpta, vniuersa corporis nostri membra venenata reddunt. Quippe cum omne agens suo passio sit fortius, venenata sua agendi valida, nostram vincit substantiam, vertitur in suam venenatam naturam, ea sanè ratione, quia ignis sua vi agendi potentissima paleas celerrime in se ipsum conuertit, & conficit. Ob id itaque dicere antiqui rerum naturalium exploratores, quod venenum homines interficit corrupta corporis temperie, & compositione. Id quod maxime comprobatur Galenus lib. 1. 1. de simplicium medicamentorum facultatibus, vbi in hoc, inquit, dissertalissimum à medicamento, quod hoc nostrum corpus alterat suis qualitatibus, illud

*Ratio cō-  
muni in libro  
sextimo.*

*Veneri  
operatio  
quali.*

50



Venenorum  
genera sex  
de.

verò conuertitur, fitque substantiæ corporis simile. Porro scire conuenit (vt Auicenna, & Auerroes posteritatis memoriæ prodiderunt) venena in vniuersum trium esse generum: vt enim aut à plantis, aut ab animalibus, aut à metallicis exitiosam vim habent, ita inde discrimina fortuantur. In plantis igitur ex omnes inter venenata recensentur, quæ ciborum naturæ omnino repugnant, & aduersantur: quæ natura non eiusmodi sunt, vt citatè in alimentum conuerteri possint. Quinimo contrariam obrintent facultatem, ita vt membra iam nutrita in seipsis conuertant. Cuiusmodi est elleborus, aconitum, cicuta, napellus, Sardonina herba, nerium, & alia quam plurima plantarum genera, de quibus in processu pluribus scorsim agemus. In animalibus ex omnia veneno insciantur, cuius natura humanæ prorsus aduersatur. Paret in viperis, aspidibus, basiliscis, lepore marino, rubeta, scorpio, phalangio, salamandra, rabidis quadrupedibus: item in morticinis carnibus, aut à fulmine occisis, aut à venenosis, & rabidis animalibus. Cæterum hac in re, licet nonnulli dicant venenum cum vita animalis consumi, eo ducti exemplo quod cerui, lupi, apri, & reliquæ feræ, quæ venenatis sagittis conficiuntur, innocuè comedantur, scire tamen oportet, hanc regulam deficere in his, quæ pestis, aut rabies, aut fulminis ictus, aut venenosorum morsu enecat. Quandoquidem complures vidi mortuos esse, qui tantum boues peste confectos exorauerant, haud aliter toto corpore tumentes, ac si in hydropem incurrisissent. In metallicis denique illa omnia produuntur venenata, quæ malefica, ac lethali constant facultate. Qualia sunt argentum viuum, auripigmentum, falsum datarcha, magnes, & similia. Ad hæc tamen quod modum est venena non solum interficere per os, sed interitum etiam extrinsecus applicata, varijs ac diuersis rationibus. Porro quæ per os sumpta venena vitam adimunt, sub ciborum, aut medicinarum specie plerumque propinantur. Quæ verò exterius tantum admota insciant, vt plurimum à venenatis, & mortiferis animalibus desumuntur. Siquidem hæc homines non morsu modo, vel ictu necant, sed visu quoque, sibilo, & tactu (vt quidam scribunt) interimunt. Quinetiam non desunt venena, quæ gustatu olfactuque, tantum statim hominem in perniciem agant nulla temporis mora. quæ quidem inter cætera malitiæ, & atrocitatis principem locum obrintent: quippe quod secum deferant præstantium interitum, ex quo nullum subinde fiat reliquum infelicitibus moribundis succurrendi tempus. Cæterum morsu ictuque interficiunt viperæ, aspidēs, scorpiones, phalangia, pallinacæ pisces, rabidi canes, & alia id genus plura. Visu autem, & sibilo (vt auctor est Galenus libro de theriaca ad Pisonem, si tamen Galeni legitimus est liber) statim inscit basiliscus. Tactu alius serpens enecat, de quo agens Auicenna lib. 1. c. 1. fen. v. 1. narrat,

quod is à milite quodam hasta infixus virolentam vim per hastam transfudit ad manum, quam primum inscit, & deinde totum corpus corruptum. Ad huiusce rei comprobationem illud sanè compertum habeo, quod in agro Tridentino euenisse scio. Nempè cum rusticus quidam suis esset in vineis, paruum quendam collem sæpius ascendebat, vbi viuarum custodiam ageret. Hinc quadam die ad collis pedem, magnum & horrendum vidit serpentem, cuius capiti superne hastam satis longam infixit: at dum fixam feram se hinc inde fortiter contorquentem, & hastæ circumuolutam, pro viribus teneret, magno statim tremore correptus est, quo maxime deterritus vociferans, viatores, & circumstantes colonos ad se ire rogabat. Quam vociferationem audientes qui non longè aberant rustici, eò cursu velociter contenderunt, & ipsum ferè semimortuum inuenerunt. Cognita tamen ex occiso serpente sui infortunij causa, ad theriacam, & alia antidota confugerunt, quibus eum ad vitam reuocarunt. Veruntamè duobus annis postea is vniuersi ferè corporis stupore in lecto semper decumbens agrotauit. & eo præsertim brachio, quo perniciosum animal hasta occiderat. Nec admodum mirari rem hanc nobis licet, cum videamus (vt etiam literis mandauit Galenus lib. 1. de locis affectis) torpedinem marinam decerpente piscatoris manum obstupescere ac torpidam reddere, vbi primum is tridente eam tetigerit. Id quod similiter efficit, transfusit per funem retis qualitate, dum trahitur in litus, Proinde id experientia docti piscatores, si dum retis trahunt, manus torpescere, tremereque persentiant, certò torpedinem capram sount, etsi longè admodum sane trahatur. Vnde illud perspicuum est, quod si huiusce piscis qualitates per tridentis hastam, & retis quàm longissimum funem transfusæ ad manum, insciant, & corripunt homines, eò magis id ipsum fieri poterit, si animalia ipsa, aut nuda manu, aut alia corporis parte tangantur. Idcirco manifestè constat nullum esse brachium tam validum, & robustum, quod torpedinem aduc viuentem diutius sustinere possit. Quare admirandum sanè non erit (vt testatur Galenus libro nuper citato) quod spiritum canis rabidi, si humanum corpus contigerit, perinde ipsum rabie afficiat, ac si ab ipso cane esset demorsus: nam & huiusce effectus hæc nostra ætate plura afferri possent exempla. Neque etiam alicui mirum esse debet, quod spiritum aspidis cognomento Peyas, omnes veneno inficiat, quos contigerit. Hoc idem similiter efficit quædam seuissima venena arte confecta, tanta permeandi & penetrandi vi prædita, quod illitis (vt ferunt) sellarum pediferis, infellorum ocreas penetrant, donec ad nudas pedis plantas peruenta, & inde per cutis spiracula in corpus ingressa, vniuersa eius membra corrumpunt, & absumunt. Horum usus (vt audio) frequens apud Turcas, & alias ferinas gentes. Ex hac autem re nullam quis capiat admirationem oportet, siquidè

arteriæ

arteria corporis nostri (teste Galeno lib. 111. de simp. medic. facultatibus, ac aliis in locis) ad se intus trahunt quodcumque proximè circumdat eas, dum continuè dilatatur. Id quod quotidie liquet ex inunctionibus, ac suffribus ad morbum Gallicum paratis. quippe eadem ab arteriis attractæ, ubi argenti viui, cinnabaris, vel sublimati officinis vocati plurimum admiserint, seu illima sepe parit symptomata. Sunt & alia venena, quæ olfactu tantum (vt quorundam fungorum meminit Rasis) præsentaneam afferunt mortē iis, quæ ab naribus admouerint. Huius summæ malitiæ sedem illud sanè tenere debebat, quo florem recentioris vetonicum vocatum, Senis quidam circumforaneus infecerat, ex his qui innocuè venenum deuorare proficentur. Quem cum olfactu dum exhibuisset suo concurrenti in publico Senensi foro, is ex solo olfactu de repente còcidit mortuus. Præterea venena quædam sunt, quæ solo gustatu, quanquam non desoluntur, perimunt: idq; præstat apicidii surdi spurii. Quo memini quosdam imprudenter insectos esse. Inter quos vidi ego rusticum in valle Anania, qui dum fœnum secaret in pratis, feram fœce per medium secuit, & cum postea capitis truncum manu cepisset, vt locis alantibus ostenderet, vapore qui iam feram demortuam fortasse censebat, suspensa manu truncus caput retorit, & rustici manu seuiens momordit. At ille credens suctu vulneri succurrere, os statim mortui admonit. Quo pacto de repente in terram cecidit, ubi illico mortuus factus deperiit. Insuper sciendum est, quòd venena nō vno eodemq; modo, neq; ab vna eademq; causa suis parient effectus. Siquidem (vt sapientes quidam memorias prodiderunt) quædam agunt excessu qualitatum elementorum, quarū missione constant. Quædam verò propria tantum qualitate aut formā, quam occultam proprietatem medicorū quidam appellant, in mistis inferioribus introducta ex influxu linearū rectarum radicalium, quæ ex syderum fixorum splendore proueniunt, pro materiz mistorum proportionē sine constitutione. Aliæ denique vtroque modo simul agunt, nempe & qualitate elementari, & propriā, quā formam specificam nominant. Porro venena, quæ excessu tantum suarum qualitatum operantur, suas variat actiones, pro varietate ipsarum qualitatum, quippe quòd vnum sit calidum aliud frigidum, aliud siccum, aliud humidum. Quæ igitur caliditate excedunt, duobus modis perimunt. Vno, quòd intus in corpus sumpta, exal faciant, vrant, corrodamq; vsque ad cor. Alio, quòd extrinsecus apposta corrodam, & exedat carnes vsq; ad ossa: id quod lepori marino ascribitur. Vel quòd summe calefacta tā intus, quam extra corpus adurant, quemadmodū euphorbiā, & elleborus, donec inflamato tandem corde interimant. Frigida similiter bifariā necem adferunt. Vno modo, quòd exuberant frigida-  
tate sua, vsque ad corpus gelidum, stupi-

*Venenorum  
effectus a  
diuersis  
causis.*

*A qualitate  
sua excedentibus.*

dumq; reddunt, quòd simul etiam cor congelascit, vt iis euenire sepius compertum est, qui opium deuorant. Altero, quòd obstruētis ingenti frigida-  
tate meatibus, anhelitus intercipiunt, & proinde suffocant, & strangulant: id quòd præstant exulum plumbum, & fungi venefici. Duplicem & siccum venenū habet operandi modum. quandoquidē vel humidum san guineum cordis absorbunt, vt calx viuæ vel separent ac diuidant partes abingicem, quousque omnia membra ad cor vsq; in minimas diuidantur partes: quem effectum præter risgallum vocatum. Humidum postremò, etsi aliqui tradunt non inueniri, quoniam nullum sit humidum reperire, quòd ad quartū humiditatis excessum perueniret, oppositum tamē declarat exemplo illius, qui nocte dum dormiret, à serpente quodā demorsus (vt Gilbertus Anglicus narrat) mortem obiit: cumq; mane à puero per brachium traheretur (sic enim arbitrabatur dominum à somno excitare) caro iam vniuersa putredine confecta, tractu illo concidit, ossibus remanentibus carne proflus exiit. Quod certè non alia de causa contigisse potuit, quam ab excedente veneni humiditate, quæ summā sanè inerat feræ illius dētibz. Eundem effectum præstat etiam salamandra, si in puluere redacta bibatur, vt in processu suo loco docebit Dioscorides. Nec secus filii accidunt, quem cenchris serpentis momorderit. Quocirca recte proditum est à Galeno ex autoritate Hippocratis libro primo de temperamentis, quòd cum anni constitutio pluuialis, humida, & australis fuisset, ea potissimum humiditas fecit, vt succedēte æstate carbunculi orirentur: quibus ob corruptum venenatamq; humiditatem eosq; in aliquibus brachia putruerunt, quòd deniq; tota hæc ipsa putredine correpta à cubitis diuisa deciderunt. In aliis verò tantam coxarum, crurium, & pedum caro putredinem sensit, quòd planè ossa carne destituta remanserunt. In aliis denique non caro solum cōputruit, sed simul etia nerui, ossa, eorum compagine, nexuq; cōtabuerunt. Ex hoc itaq; apertè ostenditur reperiri venena, tanta humiditate exuberantia, vt homines interimere possint, vt potè quæ membra putrida efficiunt: sicut argētum viuum, quòd sua humiditate modum excedente, insitum cordi natura humidū sepe corrumpit, vt quotidie videmus in iis, qui eo vnguentis excepto se inungunt ad lueem Gallicā delendā, in quibus præterquam quòd semper gingiuas, dentes, palatum, aliasq; vicinas partes putredine afficit, sepe etiam ubi vberius quam par sit inunctum fuerit, eos in perniciem ducit: quippe quod vniuerso sanguini putredinem inferat. Idq; extrinsecus duntaxat adhibitur quanquā id ipsum intus assumptum occidit, si modum quendam excesserit, vt libro superiore tradidimus. Siquidem præ nimia sui frigida-  
tate vitales spiritus cordisq; substantiam congelat, quod cuiusdam seplasarior, qui illud imprudētè biberat, euenisse narrat Con-

*A forma  
propria.*

ciliator Petrus Aponensis. Hoc igitur modo, aliisq; prædictis suos venena præstant effectus, quæ suis modis excedentibus qualitatibus mortem hominibus adferit. Cæterum venena, quæ propria sui facultate, vel (vt dicunt) propria forma enecant, id non efficiunt, quòd caliditatis, frigiditatis, humiditatis, aut siccitatis modis excedant, sed quòd id peculiare à natura habue-  
rint ex influxibus à radiis ( vt supra diximus) quorundam syderum fixorum proueniens, quæ ea humanæ naturæ proflus aduersa genue-  
runt. Hæc propterea etsi tant paucæ quantitate sumantur, vt vix sentiantur, tanta tamen est eorum maleficia, atroxq; vis, vt breui tēpore tantum augeatur, in seipsa corporis humiditatem conuertendo, quòd postea quasi horæ momento dissoluant, & ad mortem trahunt homines, à quibus hausta fuerint, quemadmodum acenitum, napellus, & toxicum facere consueverunt. Id quod optimè nouit Galenus lib. primo de semi-  
ne, vbi rem explicauit his verbis. Qua ratione etiam minima particula humoris lethaliū venenorum, quæ deleteria appellant, vbi in anima-  
lis corpus ingressa fuerit, totū id momento tem-  
poris immutat, sibiq; simili affectione alterat. Nec secus fit curatio, quæ per venenorum remedia, & antidota adhibentur, quæ alexipharmaca nuncupant, quæ contraria lethaliū altera-  
tione totum etiam ipsa corpus immutant, non sanè quòd substantia ipsorum per totum pene-  
tret corpus (neq; enim potest tam paucus succus tam breui tempore corporis interdum maxi-  
mam molē replere) sed qualitatē diffusionē, qualis & extra nos à solis fulgore in ambiētē aërem, & in nobis tum à corde in arterias, tum à cerebro in nervos fieri conspiciunt. Et lib. v. cap. x. 1. de simp. med. facul. idem inquit. Ad medicamenta sunt quæ tota essentia nobis contra-  
ria sunt. Proinde si vel minimum eorum assump-  
tum fuerit, omnino lædatur necesse est. hæc Galenus. Ex quibus constat, ipsum velle quòd antidota non secus atq; venena agant in corpora nostra. Idem Galenus tertio simplicium medicamentorum censu cap. x. 11. in prædictorum testimoniu ita scriptum reliquit. Medicamenta erodentia, & putrefaciencia etiam si quantitate minima sumantur, omnino tamē cor-  
rumpit, quia videlicet, quæ putredini obnoxia sunt, calore, humiditateq; putrescere solent. Atqui calidos, humidusq; sanguis est. Itaq; putrescere nunquam cessare possunt. Proinde long-  
go etiam pōt tempore, à quo sumpta sunt, nonnulla interirunt, potissimum quæ crassa, terre-  
nq; essentia sunt. Hæc Galenus. Sed ad antidota redeamus. Vbi sciendum est, quòd ex his ea tutius operantur, quæ præcauendi gratia antea assumuntur, quàm quæ pōt: nam vt venenum, quācumq; efficax, nihil aut parum nocet illis, qui prius se antidotis munierunt (vt configit Mithridati) ita pari ratione nullum, aut paucum adferunt auxilium, quæ postea exhibentur, nisi sepius, maioriq; quantitate su-

*Antidota  
vniuersalia.*

mantur, vt in corporibus maius eorum vis capiat incrementum. His adspulatur Galenus libro primo de antidotis à principio, sic inquit. Mithridatica antidotus, itemq; theriaca non eam vim habent post venenum accepta, quàm antè sumpta habuissent. nā portio antidoti quæ prius, & semel hausta tutum à morte quempiam præstifficit, ea venenum subsecuta nisi ob quadruplum, quinuplūmne aucta, non iuuabit: neq; id semel tantum, sed bis, singulis quibusq; diebus hausta, faciet. hæc Galenus de his differens. Cæterum venena, quæ & manifestis, *Ab Strif. que simul.* & occultis simul qualitatibus agunt, id præstant veròque modo, quo prædicta duo, quemadmodum agit euphorbium, quod licet venefica sit, quam ab excessu caliditatis obtinet, inficit, inficit tamen & vi alia, quæ à propria sui forma, & latente qualitate procedit. Cuius rei illud indicium est, quòd exhibita theriaca, cuius proprium est ea omnia superare venena, quæ propria forma & tota specie operantur, efficacissimè valet aduersus euphorbium haustum. Quòd si sola excedente caliditate euphorbium noxam inferret, tantum abest, vt theriaca, quæ non parum caliditatis obtinet, auxilio futura sit, vt etiam illius noxam foueat, & augeat. quod tamen non facit. Scire etiamnum conuenit non omnia venena cor primū petere, & illi noxā inferre. Siquidem reperitur, quibus ita natura comparatū est (id enim claret experientia) vt intus assumpta separatim noceant vno tantū corporis membro, alia verò alteri, quemadmodum etiam sunt medicina, quarū alie præcipue cordi opulantur, vt crocus, hyacinthus. alie cerebrum, & caput iuuant, vt sinaragus, stachas, betonica. alie ventriculo præcipuam opem ferunt, scuti coralium, cinnamomū, ginger. alie denique aliis corporum membris auxiliantur. Idcirco Galenus libro de theriaca ad Pisonem: Sunt (inquit) plura medicamenta, quæ quibusdam corporis partibus eximie curandis sunt idonea. Patienti igitur iecinori saepe eupatoria herba auxillata est: glans vnguentaria (myrobala-  
non vocant) lienem adiuuat: saxifraga, & betonica renibus pulchre faciunt: similiter alia aliarum (vt experientia obseruauimus) propria sunt medicamina. Tales igitur proprietates in venenis quoq; reperiri affirmauerim, quandoquidem planè constat cantharidas præcipue noxam inferre vesicæ, cicutam cerebrum, lepori: marinum pulmōi, & alia item aliis corporis membris particularibus, vt in hoc lib. melius, latiusq; ostendemus, vbi de singulis forsum agemus. Id quoq; non latuit Goleum, vt loco iam citato eius verba aptè testatur, dum ait. Sunt nonnulla venena, quæ partes etiam quasdam corporis priuatiū viuante. Nara lepus marinus pulmōnem exulcerat, cantharis vesicam peculiariter afficit. Porro nō ignorandum, quòd etsi veneni hæc (vt adnotat Gentilis) natura infusa habeant, vt forsum vnum quodq; membrum determinatum lædant, non tamen

*Venenæ ad  
se sē mē-  
bra petūt.*

*venena  
vniuersalia  
ad omnia  
membra*

tamen propterea sic, quin noxam etiam cordi communicent, nam si secus esset, neminem sanè interimerent. Quamobrem haud mihi displicet eorum sententia, qui ideo volunt omnia venena perniciosà esse, quòd cordis facultatem opprimunt. Siquidem parum refert, an illud efficiant, quòd primo cor ipsum opprimant, aut ali quo alio mediante. Huius rei manifestam fidem facit Galenus lib. v. capi. i. de locis affectis, ubi sic habet. Quoniam ipsi cordi propriè vel primariò affecto superueniant accidentia, quoniam verò ipso cæteris partibus consentiente, id ex iis intelligi potest, quæ prius in aliis libris demonstrauimus, ubi iam declaratum est innati caloris cor velut fontem esse, neque animal mori omnino posse, nisi cor afficiatur. hæc Galenus.

*Venerum & venena in statu diuturno interuenire possunt.*

Cæterum illud etiam in disputatione venie, nunquid fieri possit, ut venena in diem exhibe ri possint, & certis occidere temporibus, hoc est, quòd certo, & præfixo tempore mortem adferant: exempli gratia in vno mense, vel pluribus, vel ad annum vsque, non celerius, neque tardius determinato tempore. Quia in re in primis auscultandus est Theophrastus grauissimus, & antiquissimus author, qui lib. i. x. ca. x. v. a. de historia plantarum de acconito differens, ita scriptum reliquit. Componi autè ita ferunt, ut certis occidere temporibus possint, videlicet bimæstri, trimæstri, semæstri, anno còpore, nonnulli etià biennio. Pessimè illos de vita discedere volunt, qui plurimum temporis resistere possint: paulatim enim tabescit corpus, & languore pereat diuturno esse necesse. Facillimè illos, qui confectum obeunt, hæc Theophrasti sententia. Veruntamen omnes ferè rei medicæ studiosi in hanc conclusionem conuenire reperio, quòd quauis in venenorum numero inueniantur (ut Theophrastus inquit) quæ celerius, & quæ tardius interficiant, non propterea tamen præfieri potest terminus certus, & dies, quo mortem inferre debent, ut quidam existimant. Nam quòd venena citius, aut ferius occidant, non tantum ex innata & propria eorum vi prouenire censent, sed etiam quòd magis, vel minus resistat eius natura, qui venenum assumpsit. Id autem planè docet experientia: si quidem constat idem venenum eodem pondere, vel eadem quantitate diuersis natura exhibitum, alios in aëre tantum perimere, alios in quatuor horis, alios in die, & nonnullis nisi paruum afferre noxam. Id quòd etiam quotidie experimur in medicamentis, quæ ad deiiciendum aluum exhibentur, quandoquidem idem medicamentum eodem pondere, vel quantitate à diuersis hominibus acceptum, in aliquibus fusi celeriter præstare effectum, in aliis tardius, in aliquibus parum efficere, in aliis plurimum, in aliis nihil, in aliis quibus citrà omnem molestiam deiecit, in aliis verò magno cum labore. Neque tamen id alia de causa accidere manifestum est, quin ex vario, disoriatque ægrotantium temperamento: quòd non ita ad inguem deprehendi potest, ut certò

fieri possit, quandiu innatus eorum calor veneno resistere valeat. At quauis concedi possit, quòd quis adeò peritus veneficus reperiat, ut ex longa experientia, ac pariter scientia tam exactè naturam, & robur vitalis facultatis calcet in vnoquoque homine, ut coniciere possit, quotusque perdurare valeat, ubi venenum illi sua arte præparatum exhibuerit, non tamen propter hoc is determinatè scire poterit diem, neque horam mortis illius, qui venenū assumpsit: non enim fieri potest, nisi diuino iudicio, sicut afflatu, ut aliquis medicus, vel philosophus adamussim expèdere possit, ac metiri, quantum humidi substantiæ, quantumque caloris innati in quocunque sit corpore, præsertim quòd non semper in eodem statu persistant principes facultates: quò sit, ut quispiam modò plus, modò minus fortis appareat, tum etiam quòd corporis temperamentum plurimum immutet: causæ extrinsecæ, quas Græci *υποστασεις* vocant. Adde etiam num quòd antidota, quæ à medicis huiusmodi venenatis continuè propinantur, et si veneni vim ob sui consumaciam superare nequeant, impediunt tamen, ne id tam breui tempore perimat. Vanum igitur crediderim esse, quòd internas nostræ corporis facultates, ac functiones possint (ut quidam rentur) iudicio duntaxat ita exquisitè expendi, ut lance expenditur crocus. Atqui scire etiam oportet, quòd et si hoc magna ex parte evenire possit nature ipsius robore, in hoc magis, in illo minus existente, eo etiam tamen prouenit, quòd aliqui consent arteriis, qui bus venenum in cor fertur, admodum angustis, alij contrà admodum amplis. Nanq. venenum ubi vias lætas expeditasq. inuenit, non solum celeriter peruenit, sed longè etiam facilius vna cum aëre provehitur, qui cordis refrigerio continuè ingreditur. Id quòd iis minime contingit, qui propterea quòd cor minus calidum obtineant, arteriis potiuntur longè angustioribus, quin & spirituum vitalium facultatem valde imbecilliorè habent. Quocirca Galenus tum tertio simpl. medicamen. censu, tum libro secundo de alimentorum facultatibus, tradidit curam hominibus in cibo lethalem esse, sumis ac vni utrumque. Quandoquidem hi arteriis adeò angustis præclusisq. constant, ut nullo pacto per eas ad cor lethalis citata vis, progredi possit, quanquam hoc de frigidis potius, quàm de calidis venenis intelligi debeat. Huc illud scitu dignum accedit, quòd persuasum difficilissimum est, venenæ, quæ ab impis veneficis in diè exhibentur, aliter generis esse ab his, quæ sanarum tantum qualitatum excessu perimunt. Nam quæ propter caliditatem vi necant, in minima etià quantitate exhibita (ut Galenus inquit) difficillè cohibentur, quin brevissimo tempore lethale munus obeant suum. Non desunt tamen, qui pro certo asserunt, quæcumque venena aëre temperari possent, ut illa celerius, hæc tardius interficiant, quibus equidem refragari non possum, cum scierim admiranda admodum esse rerum naturæ.

*Verū quā* Quæri præterea solet, num fieri possit, ut quis affueſcit ita veneno affueſcat, minimū quid de eo quoposſit. Et tūc affueſcit, ut eo tandem innocuē nutria-  
*Genena in* tur, quemadmodum Ruſi teſtimonio ſcribit Aui-  
*menē ſa-* cenna, olim puellam nutritam eſſe veneno, ea-  
*nat.* tantū ratione, ut reges quoſdam, & principes  
 (quod ſormoſiſſima eſſet) qui ſecum rem habe-  
 rent, inſiceret. Quā ſi re dixerim ego, quod etſi  
 non deſinit, quī hoc fieri poſſe aſſerant: nunquā  
 tamen ipſe adduci poterō, ut credam humanū  
 corpus nutrirī poſſe veneno, & præſertim na-  
 pello, quo plerique rem exponentes eam puellā  
 nutritam eſſe interpretantur. Siquidem ea  
 hiſtoria Arabicas potius fabulas imitatur, quā  
 rem aliquam, quæ omnibus naturalis philoſo-  
 phie rationibus comprobari poſſit. Quamobrem  
 conſtat Gentilem Fulginate in hoc Aui-  
 cennæ loco adnixum quidem fuiſſe, ut hanc opi-  
 nionem ſervaret integram. quod nimirum fide-  
 lis cuiuſq; expoſitoris eſſe debet. Nā poſtquam  
 eam ſententiam validis, veriſq; rationibus pri-  
 mūm improbaſſet, denuo (ut aſſolent) Auerrois  
 Diniq; autoritate innixus Auicennæ, & Ruſi  
 opinionem probare non dubitavit quibuſdam  
 argumētis, quanvis nudis, & infirmis. Quorum  
 illud videtur fortius eſſe, vbi authoribus magis,  
 quam rationibus addiſtus inquit, Aequum  
 non eſſe, quod autores tam graues, tamq; ſa-  
 pientes, mendaces vocentur, vaniq; habeantur.  
 quippe quod certō crediderit ipſe Gentilis Ru-  
 tum, itemq; Auicennam in veram hiſtoriā hanc  
 rem recepiſſe, non autem in fabulam. Sed quoniam  
 ſuperuacaneū duco in hoc conterere tem-  
 pus, longa contradicenti oratione, præſertim  
 quod venenorum medix ea nullam aut par-  
 uam aſſeret vtilitatem: ideo reſiſtis aliis, in Ga-  
 leni ſententiam facili deuenio. Qui tertio ſim-  
 plicium medicamentorum cenſu ca. x v i i t.  
 tradit venena calida, & ſicca (qualem eſſe na-  
 pellum, quo puellam illam nutritam voluit,  
 non ambigo) nullo modo poſſe in nutrimentum  
 redigi, etiam quōd in quantitate minima  
 fumantur: tamen ſi quiddam venena quandoq; et  
 in alimentum vertantur. Quandoquidem hæc (ut  
 idem author eſt exēplo cicute, papaueris, hyo-  
 ſcyami, & mandragoræ) non ſui natura interfici-  
 eunt, ſed qualitate duntaxat frigida. Quibus  
 addicit ipſe Galenus hiſtoriam anus cuiuſdam  
 Athenienſis, quæ cicutam in cibo ſumebat nullo  
 ſine detrimēto accepto. Ea enim (ut idem  
 ſcribit) modicæ primū quantitatē affluevit, mox  
 multas pari, donec ex magna etiam quantitate,  
 quæ illi in nutrimentum conuertebatur, nullā  
 percipiebat noxam. Ex quo palam fit, Galenum  
 non admittē, quod venena calida nutrimento  
 eſſe poſſint. Id quod minus etiam illis conce-  
 dit, quæ propria ſpecie, aut occulta cauſa, vene-  
 ni naturam loſuntur. Inter quæ principem lo-  
 cum obtinet napellus. Quare longē aberrant  
 nonnulli interpretes, vt potē qui illud napello  
 tribuant, quod planē cicuta reddidit Galenus:  
 itaq; fit, vt (quæ eorum inſictia eſt) hiſtoriam

hanc confundant, Galeni verba peruertant, at-  
 que rem malè interpretentur. Quo etiam in er-  
 rore deprehenditur Auicennæ: niſi interpreti er-  
 ror fuerit adſcribendus. Quōd poſtremo ve-  
 neni facultas (vt quorundā opinio eſt) iam con-  
 cocta, & in illius adoleſcentulæ ſubſtantiā con-  
 uerſa, potuerit ex anhelitu in alios tranſire, ac  
 eos ſubinde inſicere, ſanè perdidiculus videtur,  
 atque euidentius falſum, quam vt pluribus  
 explodi mereatur. Cæterum quoniam non de-  
 ſunt animalia, quæ natura cibis viſitant vene-  
 noſis, atque ex eis nutrimentū capeſcant, ſicut  
 (Galeno auctore lib. i i. de alimentorum ſacul-  
 tatibus, & i i i. ſimp. med.) ſturni cicutam ſacu-  
 paſcuntur, & coturnices veratrum, & vt nos  
 quoq; quotidie videmus, anates, quæ in ſtagnis,  
 & paludibus viuunt, buſones aquaticos deuorant,  
 & ſiſdem nutriuntur, ciconiæ venenoſis,  
 & mortiferis ſerpentibus, & gallinæ interdum  
 ſcorpionibus, araneis, ſerpentibus, & aliis id  
 genus venenatis animalibus, ideo inuile non fue-  
 rit ſcire nunquid huiuſmodi animalia, quæ ve-  
 nenofis veſcuntur, ab hominibus cibo accepta,  
 inde venenum inferant, eoque inſiciant. Hæc in  
 re pleoſq; inuenio, imò ſerè omnes recentio-  
 res, qui de venenis ſcripſerunt, ſimiles aſſerere  
 quōd ſi huiuſmodi animalia edantur, non modò  
 veneno non inſicere poſſunt, ſed nullam proſus  
 inferre noxam: inquit potius corpus nutrire,  
 non ſecus atq; alia. quippe quod conſtat (vt di-  
 cunt) ea in ſuam naturam venenatos cibos re-  
 dere. Quæ ratio, & opinio eſt nō abſurda, neq;  
 incōgrua videatur, tamē crediderim, quod licet  
 venenū concoquantur, & tranſiuntur in eorū  
 animalium ſubſtantiā, quorum id perpetuū  
 cibis eſt, non tamen eſſe poſſit, quā corū quæ  
 ex eiſmodi ſit alimento, ſi edatur, omni proſus  
 careat nocumēto. Quinimo putauerim,  
 quōd ſi ea in frequentiore cibum venierint,  
 poſſint quandoq; morbos ſeu iſſimos excitare,  
 & ſubinde necem inferre. Siquidem huius rei  
 nobis teſtimonium præbent Dioſcorides, & Ga-  
 lenus. quippe qui pariter aſſerunt lac, quod nā  
 aliud eſt, quam ſanguis bis coctus, ex animali-  
 bus emunctum, quod ſcammoniam, aut veratrū,  
 aut tiſhymalum depaſcantur, potum miſcific  
 ventrem deicere. Ex quo omnib; perſpicuum  
 eſt, quōd omnes in vaiuerſum plātæ, quibus vis  
 deiectoria, & pernicioſa ineſt, quāvis ſæpius co-  
 coctæ fuerint, non proſus tamen ſuam deicien-  
 di, ac necandi facultatem deperdunt. Id quod  
 ſimiliter maniſeſtum deprehenditur in turdis,  
 qui iuniperi baccis veſcuntur: item in gallinis,  
 quæ deuorant abſinthium. Quandoquidem il-  
 loſum caro iuniperi nō mediocriter redolet  
 guſtari: harum verò non parum abſinthij ama-  
 ritudinem reſert. Ab his itaq; edocti medici di-  
 ligentiſſimi mandant nutrienti eſſe cape-  
 las herbis accommodatis, vbi animus fuerit eare  
 lac exhibere heceticis, aut aliis alio morbo af-  
 fectis, quibus tamē conueniat. Hoc quoq; teſtatur  
 Galenus de viperæ ſermonem habens li. x i. de  
 ſimplicium

*Verum  
animalia,  
qua cibum  
venenosis  
viſitant,  
exitiolum  
ſim retineant.*

simplicium medicamentorum facultatibus. Ibi enim de diplade differens, se non ignorare memoria prodidit, enimattentius carnes alterari à cibo, & alimento, quod capiunt. Quare vt summatim quod sentimus dicamus, nullo modo huiusmodi animalia in cibos admittenda esse putauerim, quanuis à nonnullis frequenter recipiantur. Illud porro sciendum relinquatur, quod nonnunquam venena, quin & medicamenta venenata tam interius sumpta, quam exterius apposta morbis succurrunt, qui aliud currationis genus non adiungunt, interdum etiam aduersus alia venena theriace vicini supplent. Nancq; aperte videmus, quòd vbi quicquam afficiatur diuturnis vigilis, aut suffocanti destillatione, aut mensium profluuiò, aut dysenteria, aut coli dolore, aut renum, aut vteri, vbi alia non conulerint medicamenta, si opium, mandragora, hyosciamus, vel antidota aliq; composita medicamenta, quæ hæc exceperint (sunt enim talia in officinis semper parata) exhibeantur, sepe numero agros à morte vindicant. Quemadmodum etiam si scammonium, colocyntis, turpetum, veratrumq; & alia id genus deficientibus pharmacis addantur. Nam quanuis hæc omnia malefica qualitate polleant, in contumacibus tamen morbis & curationi refractantibus, tantam afferunt utilitatem, vt agris deperditam ferè salutem reuocent. Cantharidis præterea ad morsus canum rabidorum vtilissime exhibentur. euphorbion Scorpionum ictibus medetur, & scorpiões ipsi suis ictibus remediò sunt. Sicut etiam viperar, denpro capite, & cauda, confusa, & imposita suis sanar morbus, vt lacus infra suis locis dicemus. Sed proutquam ad particulares curationes descendamus, differens Dioscoridem secuti, quomodo, quòue artificio à veneno iji præseruari possint, qui perpetuò veneni timore premuntur. Quin & rationem docebimus succurrendi iis, qui iam venenum haussissent. Atq; huc omnia præstantiora remedia afferemus, tam quæ simplicia sunt, quam quæ composita, non solum à veteribus inuenta, atq; experimento cõproba, sed etiam à clarissimis quibusdam recentioribus. De quibus probatis antidotis, etsi polliciter sit Dioscorides se omnino traditum in vltima huiusce voluminis parte, polliciter tamen non sletic, vt x. x. x. i. i. huius libri capite conspicitur, vbi excoctatione vsus, mutati consilij rationem reddit. Verum vt iam ad rem nobis propostã accedamus, primò modum aperiam, quo homines suspiciosi venenicia præquare possint. Pleriq; igitur sunt, qui putant, nõ parum esse principibus cautionem, mandare ministris, vt edulia, quæ præponuntur edenda (mos iste hodie frequentissimus est) prius degustet. Quæ ramen res in suspitione veneni tribus manifestis de causis nihil, aut parum æstimanda videtur. Siquidem si pincerna, siue qui cibos suis do minis apponit, veneficium committere decreuerint, se ipsos facili prius præparare possunt.

valentissimis antidotis, veneno illi accommodatis, quod exhibere in animo est. Vnde sibi ipsi præcauebunt, dominum autem interficiētes. Ex quo satis liquet nihil prodesse ad præcauendum, quod pacillator in seruaturæ fidei signum dominum præbat, & eduliorum disfector præcomedat. Adde deinde, quod quanuis ille, qui edulia ministrat, monstra; apponit, à coquo veneficium faciente deceptus, cibos venenosos prægaudentem assumat, eorum tamen adeo modicum quantitatem prægurat, vt nulla, aut paruum eo temporis momento possit molestiam percipere. Vltima accedit ratio, quod ferè omnia venena, quæ vt interimant cibariis admiscuntur, ea arte, eoque ingenio parata sunt ab impiis, & scelestis veneficis, vt non nisi temporis intervallo suum trister perficiant opus. His igitur de causis illud liberè proferre non dubitauerim, quod nullam meliorem, & ac tutiorem præcautionem sibi comparare possint principes, quam curare, vt vitam christianam, & integram ducant, iustitiamque regant, ita vt populi eos venerent, pariter, & timeant. Curret deinde, vt ministris habeant, quorum manibus edulia administrantur, non ignobiles, nec obscuro loco natos, & ferè præcæra è stupe genitos; fideles, nec avaritie addictos, neque inuidos; & qui diu antea vitæ ac moribus probati sint. In quos præcæra debent frequenter noua parua conferre beneficia: ita enim semper gratos & fideles ministros habebunt. Quin & medicos sibi adiungant, qui medicæ materiæ peritissimi habeantur, vt antidota, quæ contra venena parantur, quemadmodum sunt theriaca, & antidota Mithridatica, ex legitimis, non ex adulterinis simplicibus medicamentis, per se ipsos (vt ipse faciebat Galeus) componere valeant: nam si hæc legittimè parata fuerint, haud dubie poterunt vniuersisque facillè venena præcauere. Ex his certè maius percipient emolumentum, quam si mille alii præcautionibus vterentur. Nec minor finè cautio adhiberi debet, vt vasa ex auro & argento conflata, munda, nitida; seruentur, & hominum fidelium manibus committantur, quod quidem in eiusmodi pretiosis vasculis, quorum apud principes quosq; precipuus est vsus, venena facillè abducunt, sunt in vitreis aut fictilibus vitro circumfusa. Quam nõnulli ex recentioribus, rerum profusè imperiti, qui (si verum fateri liceat) eò demeritis deueniunt, vt præceperint in liquatum igne aurum, vel argentum, ex quo vasa confici debent, theriacam, aut Mithridaticam antidotum, & alia adiungi debere, vt asclepias inde antidoti fuscitate, venenis repugnent. Sed quàm absurda, ridenda; sit horum opinio, ij diu dicent (ea enim est, quæ non indigeat clarior probatore) qui mediocrem etiam rerum naturalium, & ac metallorum præcipue peritiam sunt affecti. Cæterum fuscellum, autium non negligenda cura, vt scilicet vasa, quibus ciborum condimenta reponuntur, clausa, & cooperta seruentur, vt neq; aranei, neque

Absterge  
guarantid  
opinio.

Scorpio

scorpiones, nec aliquod virulentum reptile, vel infectū ingredi possint. Admonet Dioscorides, ut etiam vasa vinaria diligenter clausa custodian-  
tur. namque viperæ fummo vini amore alliciū-  
tur, quæ si vasa aperta offenderint, eò facile  
contendunt. Quo fit, ut interdum bibendo ex-  
tiosum virus eructent, interdum verò in vino  
immersæ expient. Quamobrem Aristoteles  
lib. v. 111. cap. 1111. de historia animalium,  
quosdam vipersas vino in scitibus ad spes di-  
sposto venari, & eas ebrias capere, memoriæ  
prodidit. Galenus item lib. x. 1. simp. med. eam  
narrat historiam, quam nos libro secundo in vi-  
perarum mentione retulimus. nempe de illis  
viperis, quæ sponte se vino immerferunt, unde  
etiam sibi mortem conscuerunt. Quo vino  
duos homines elephantu affectos sanitati res-  
titutos esse, idē est author. Quibus ex verbis pa-  
lām est Galeni testimonio, vinum in quo sint  
extinctæ viperæ, noxium non esse, quin potius  
adeo salutiferum, ut efficacissimè elephantia-  
curetur. Quod tamen Dioscoridis sententiæ refra-  
gari videtur. nisi dicamus viperæ venenum  
elephantu laborantibus præstans esse auxilium,  
cæteris autem exitium. Quicquid in veneni su-  
spicione versantur, cibos vitare debent, qui can-  
dido, vel oleraceo colore fuerint: necnon etiam  
ab his abstinere, quæ ex animalium sanguine pa-  
rantur. Siquidem albedine, venena quædam me-  
tallica facile occultantur: cibus herbaceo colo-  
re, variz lethales plantæ commodè admiscen-  
tur: sanguini etiam animalium, quibus vescu-  
mur, commodissimè venenatorum sanguis in-  
seritur. Illud etiānum apprime vile atque  
necessarium esse duco, ut coqui, & reliqui cu-  
linæ insensientes, non modo fides sint, & in-  
corrupti, sed etiam mundi, cauti, ac providi,  
ne yllus veneficorum insidiis relinquantur lo-  
custum etiam ut sciāt rectè diligenterq; custo-  
dire cibaria, vel aliud vnumquodq; quod in ci-  
borum usum reponitur. Sed præcipuè diligen-  
ter animaduertant, ne in culinaria vasa, quæ  
super, vel circa focum eduliis referta resident,  
venenatū aliquod animal à testō per caminum  
decidat, ut quidam exigui aspidēs, qui sub te-  
storum tegulis, & contabulamētis se recipiunt,  
phalagia, stelliones, scorpiones, & similia. Nan-  
que Florentiæ (vt Nicolaus est author) ceno-  
bium monachorum veneno infectum est, quod  
araneus niger admodum in olla decidisset, dum  
coqueretur iuscula. Ad hæc principes maximè  
curent oportet, ut perquam fideles habeant cu-  
bicularios. Nam (vt superius dictum est) quo-  
dam veneni genere cubilia, interculæ, cæteraq;  
vestimenta infici possunt. Quare nonnulli facie  
vere solent, vt diu, priusquam vestes induant,  
eas manibus pertractare ferui. Quin & pueris  
similiter iubent, vt saepe equis insident, iis su-  
per sellis, quibus ipsi vti consueuerunt. Tum  
etiam stabuli præfectis mandant, vt tā cautè sel-  
las, habenasq; recondant, vt ignotis, & his qui-  
bus fidendum non sit, eas non intueri, ne dum

tangere liceat. Insuper illud scire cōuenit, quòd  
quædam res simplices sunt (vt plerique incul-  
patæ fidei medici fuerunt) quæ sua peculiari  
naturæ dote præfens venenū signis manifestant.  
Inter quas cornu, seu lingua, quæ serpentis lin-  
guam vocant, refertur, quæ (vt Cōciliator Pet-  
rus Aponensis tradit) præfente napello, aut vi-  
pera, aut pardi felle, exudat: quod tamen non  
prodit, cæteris venenis præfentibus. Sunt alij,  
qui pro certo tradunt, prassium lapidem, quem  
Plasma vulgus appellat, sicut splendorem amit-  
tere, vbi in præfentia veneni cuiusq; fuerit. Ad-  
dunt præterea, quòd si lapis ranæ terræstris  
anulo aureo inseratur, ita vt è digiti carnē con-  
tingat, quā primum præfenderit adesse venenū  
(si credimus his, qui hoc scriptum reliquerunt)  
tanta digiti afficit caliditate, vt carbonē accen-  
sum, ipsumq; digitum vrentē præ se ferat. Qui-  
bus sanè etiam parua, mea quidem sententia, sit  
adhibenda fides, ea tamen, quod omnibus satis-  
facere quantum potest, non duxi silentio dissimu-  
landa. Non desunt etiam, qui contra lethalia  
venena pollere contendunt figilla quædam, siue  
characteres, siue imagines, quomodo docuim; eas  
appellare liceat, præcipuè si collo suspensæ ge-  
stentur, vel digitorum anulis inserantur. Quo-  
circa prodidit Albertus libro imaginibus dica-  
to, quòd si Serpentarij imago cum suis stellis  
cuius lapidi pretiosio insculpatur, eam vili-  
ssimè gestari aduersus omnia venena, & quæ  
præfent, quæ venenosorum animalū ictu vel  
morsu relinquuntur. Proinde Petrus Aponensis  
scriptū inuenisse tradidit in quodā libro, quem  
reges Persarum olim habuisse refert, quòd si in  
hæmatite lapide sculpatur homo genibus fle-  
xis serpente cinctus, cuius caput dextra teneat,  
caudam verò gēstrā, & lapis ille anulo ex auro  
purissimo confectio inseratur, gestatu hominem  
a quocunq; veneno tutetur. Quæ imago si mo-  
do aliquem præberet effectum (non enim hæc  
in re certi quicquam proferre ausim) mea ferè  
opinio, quòd tēpore, quo sculpsit, necessaria sit  
quarundā stellarum observatio, à quibus ea vis  
influat in sculptā imaginem. Porro tradidere fa-  
pientū veterū nonnulli, reperiri pretiosos lapi-  
des, quibus solis à natura largitū est, vt veneno-  
rum malitiā efficacissimè dissoluāt, & destruāt.  
Ob id itaq; scriptū reliquit Albertus cognomē  
to Magnus adamantē orientālē gestari brachio  
sinistro inter humerū, & cubitū adnexū, omnū  
venenorum vim de nolliri. Id quod etiā idem  
tribuit achate, hyacyntho, & sapphiro orientali.  
Alij eandē facultatē assignāt smaragdo, aliij lapi-  
di, quē in capite draconū inueniri tradūt, unde  
draconis nōmē accepit. Cæterā (vt ingenuè fa-  
tear quòd sentio) parū fidendū esse crediderim  
his suspensioibus, quippe quòd nunquā viderim  
huiusce rei experimentū tam clarū, vt sincere  
fides adhiberi possit: quauis illud facilius per sua  
deri possim, quòd smaragdu, hyacinthu, achate,  
sapphirus lapides in tenuissimū puluerem  
reducti, possint per os sumpti veneno infectos  
sepe libe

Quare se  
nena pro-  
dant que  
que sub  
sa eis  
aduersu  
tur.

*Præcantia  
ex medica  
mentis.*

sepe liberare: vixitque qui eam fortiantur natu-  
ram, ut cordis viribus subueniant. Sed quod ge-  
stati lapides veneni assumpti vim, atque ac-  
tione inhiere valeant, non ita facile adduci po-  
tero, ut credam, sicut credunt aliqui, & ita ima-  
ginantur esse, nisi prius notabile ex his experi-  
entiam viderim. Nemo præterea non poterit  
(ut in hac præfatione scriptum reliquit Diosco-  
rides) innoxia irritaque venena reddere, si me-  
dicamenta tam simplicia, quam composita præ-  
sumpserit: quod viribus præstantissimis possent,  
quibus post assumpta venena facile valeant su-  
perare. Simplicia autem medicamenta Diosco-  
ridi comprobata, sunt carice cum iuglandibus  
nucibus essitate, citria mala cruda manducata,  
napique semen ex vino potum. Item calamita-  
thæ folia, & Lemnia spargis, quam summis lau-  
dibus extulit Galenus: sed quæ pro singula vice  
drachmæ pondus non excedant. Idem similiter  
summis laudibus commendavit rutæ folia, cum  
nucis iuglandis nucleo accepta: quæ & duas ca-  
ricas, siliisque momentum. Ex compositis autem  
non immerito ceteris antidotis Mithridatium  
antecehere scribit, quandoquidem ex frequen-  
tius usu (ut ex antiquorum monumentis ac-  
cepimus, atque etiam à Galeno libro primo, &  
secundo de antidotis memoria proditum est)  
vsque adeo fæ innoxium præbuit veneno Mi-  
thridates Ponti rex, ut cum vellet sibi nocem  
veneno conficere, ne fæ Romanis dederet, nul-  
lum ex assumpto veneno percepit incommodum.  
Qua in re postea Galenus theriacam præstantio-  
rem esse tradidit, afferens fieri non posse, ut iis  
venenum vllum noceat, qui eam quotidie fabæ  
Ægyptiæ pondus sumere consueverint, quomo-  
do suo tempore Aurelius Antoninus Impera-  
tori facere solebat. Ceteri posteriores, qui Dio-  
scoridem, & Galenum secuti sunt, præsertim  
Arabes, & ipsi ad idem casaneas plurimum va-  
le traxerunt: quæ & mespila, pistacia, alliū,  
raphanum, & nuces Ponticæ addiderunt, om-  
nibus his tamen optimam theriacam præferen-  
tes. Et hæc hæstus dicta sufficiunt de modo  
præcauendi venena. Reliquum est, ut curandi  
ordinem, ac rationem ineamus, qua iis succur-  
re possimus, qui cibo aut potu venenum sum-  
pserint. Primum igitur (ut paucis etiam superius  
dictum est) scire convenit, quod ingestum  
intus venenum, non statim, ut quidam volunt,  
ad cor ipsum contendit, quin prius alias inter-  
nas partes percurat, & lardas, & sanguinem in-  
ficiat. Sed quia maxima pollet agendi vi ob  
proprium sui formam, vel temperamentum, quam  
obinet atrocissimam, cunctaque corporis hu-  
mani partem congerit in suam virulentiam con-  
uerit naturam, & ita eoque procedit multi-  
plicando, inficiendo, atque sanguinem cum reli-  
quis humoribus in venenum vertendo, quous-  
que accessoris quantitate aduocum, cor ipsum  
ateingat, quod tandem breui tempore in vene-  
natam speciem transmutat. Hinc deinde fit, ut  
spiritus vitam fontes, loco proprio ac natu-

*Ratio cu-  
randi ve-  
nena.*

rali expulsi, suam sedem cedant venenatosque ita  
subinde corpus spiritibus, & vita simul destitua-  
tur. Illud præterea non ignorandum, quod ar-  
teriarum una cum cordis ventriculis (quibus natu-  
ratus est motus dilatationis, & contractionis,  
ut ex illo quidem attrahatur aer circumdatus, quo  
indiget cor ad refrigerandum summum spiri-  
tuum vitalium calorem: ex hoc autem pars aeris  
fuliginosa expellitur, pro cordis item refri-  
gerio) quemcumque statum extrinsecus offenderint, in-  
tus attrahunt, ita ut arteriarum, quantum minui soli-  
maz, quæ per totum corpus dispersuntur etiam  
sub cute, per meatus quos habet, aerem nos cir-  
cundantem attrahat, ipsamque prouehant ad cor,  
quod quidem postea per eandem vias calorem  
summumque superfluum reiciit. Quo fit, ut si nos  
circundans aer fuerit infectus, venenatus, & per-  
niciosus, ea ratione dicta cor ipsum inficit, atque  
corruptum. Idem non euenit propterea quod ar-  
teris atque cordi natura infitum sit, ut venenum  
attrahat, sed quod aerem continuo inspirant, quo  
mediante natura etiam repugnante sua, vene-  
num quoque trahunt. Hinc itaque est, quod quidam,  
dum (ut contingit) somnum caperent sub arbo-  
ribus venenatis, cum taxo ac nerio, vel humi cu-  
barēt super plantis noxiis, velut napello, & aco-  
nito, vel propter virulentorum serpentium spe-  
cus quiescerent, imprudenter venenum cōtra-  
xerunt, non alia de causa, quam ex aere lora il-  
la ambiēte, plantis illis venenatis infecto, & spe-  
cium virulentum spiritu. Ceterum iam tempo-  
ralium erit ad generalem eorum curationem ac-  
cedere, qui veneno infecti sunt, eorumque præci-  
pue, in quibus non adeo manifesta signa conspi-  
ciuntur, ut quodnam sit assumpti veneni genus,  
dignosci possit. Nullus itaque medicus ingenio  
præditus est, qui non protinus videat & intelli-  
gat ex sevis accidentibus incommunis, quæ se-  
quuntur, cum quis venenum cibo, aut potu sum-  
pserit. Siquidem iis, quæ propria forma agunt  
(quam etiam proprietatem oculum appellare  
liceat) statim semper succedit virium & roboris  
totius corporis proflatio: atque magna cordis  
molestia frequenter animo deficient: facies li-  
uescit: et lingua, & labia nigricant: item ex-  
trema corporis, præsertim vngues, plumbeo co-  
lore luescunt. Ad hæc qui hauserint, vertigi-  
nosii sunt, vocem edunt cum murmure, & oculos  
toruē mouent. His frigides accedit sudor  
citra frontem, & tempora erumpunt. Quæ om-  
nia assumpti veneni manifestissimum præbent  
indiciū, maxime autē si statim sequantur post  
assumptum cibum, iisque contingant qui sibi  
rectam quotidiani victus rationem adhibeant.  
Quandoquidem tam mala esse posset in aliquo  
victus ratio, quod humores inde geniti, tractu  
temporis vsque adeo corrumpere, ut contra-  
cta veneni natura, vim naturæ inferent, &  
eadem iam dicta dicerent symptomata. Id quod  
maximè testatur Galenus libro sexto de fociis  
affectis, tum etiam libro de cibis boni ac ma-  
li nutrimenti. Quapropter medicos cautos, ac  
prudentes

*Indicia in  
commune  
veneni  
sumpti.*



prudentes esse oportet, quo in huiusmodi accidentibus diligenter singula perquirant. Sua similiter accidentia inferunt, quorum etiam manifesta præbent indicia, venena illa, quæ suis manifestis qualitatibus agunt. Nam quæ caliditate excedunt, omnia membra interna celeriter inflammant, scilicet inpenissimam excitant, oculos inflammatione male habent; inquietudinem continuam inducunt, & continuum sudorem cient. Si verò præterquam quoddam calido excessu pollescant, excellant etiam vi tum erodendi, tum putrefaciendi, vt arsenicum sublimatum, auripigmentum, sandaracha; & id genus alia, punctione, atque dolore intolerabili ventriculū & intestina afficiunt, in quibus etiam frequenter murmura sentiuntur. Hæc autem accidentia sæpe sequuntur vomitus, fastidia, sudores modò calidi, modò frigidi, variz deniq; coloris mutationes. Quæ verò nimia frigiditate excellunt, plerumq; somnum inferunt adeò profundum, vt sæpe non sine magno labore excitari possint affecti. Nonnunquam verò cerebrū obloquescent, ita vt affecti cogantur quàm plurimos incompositos edere motus, tum corpore toto, tum etiam oculis, ore, manibus, reliquisq; corporis partibus, non secus ac si stulti facti essent, vel temulenti. Huc illa præterea accedunt, frigiditas scilicet totum corpus occupans, frigidi sudores, & color in facie luidus admodum, & terrificus. Ad summum totum corpus torpidum efficitur. Ex fecis autem venenis lingua arefcit, gurgur sit inextinguibili afficitur; alius adstricta redditur, agrè redditur urina: omnia denique membra sunt arida, & vigiliz instant longissimæ. Postremò humidà inexpugnabilem somnum adferunt, alui fluxiones, articulorum, nervorumque luxationes. Ita quòd quandoque oculorum nervi, ac nexus in tantum laxantur, vt sponte sua è cavitatibus exeant, capitiq; propendant. Plerumq; etiam extremæ corporis partes putrescunt, vt in præcedentibus dictum est. Porro & illud adnotandū est, quòd venena, quæ & manifesta, & occulta qualitate agunt, si fuerit hæc viribus altera inbecillior, in fine suæ actionis eadem patiunt accidentia, quæ proueniunt ab his, quæ occulta duntaxat proprietate munus suum obeunt. Vis etenim qualitatū elementarium, quæ illis inest, vim illam propriam occultamque, quam hæc pariter fortiuntur, antecellit. Proinde primū qualitatū elementaris excedentis effectus præbent, eosque subinde, qui propriæ eorum formæ attribuntur. Sed huius rei clariorem notitiam trademus, vbi speciatim singulos meminerimus. Hæc igitur sunt omnium venenorum indicia vniuersalia, cæteris quæ explicari possint, certiora, ac manifestiora, quibus peritissimū medicū tutò diiudicare possunt. Nam cum constet accidentia prædicta non solum perdurare, sed etiam augeri, ac continuè in deteriora labi, nullo modo auxiliis cedere, neque naturæ repugnanti obsequium præstare, clarum profectò

mortis indicium est. Contrà salutis, si quando remitti accidentia, & agri melius habere videntur. Ceterum eorum, qui venenum sumpsierint, cibus esse debet (vbi tamen remedia, quæ postea dicuntur adhibita fuerint) ex his rebus, quæ non solum vim habent nutriendi corpus, sed quæ etiam venenorum noxiæ resistere valent. Quo in genere lac asininum summopere laudatur: item caprinum, ouillum, bubulum, atque etiam humanum, præsertim si recenter emundum bibatur, quāquam lac omne efficacius exhibetur cōtra venena calida, & erodentia, quàm ad reliqua veneni genera. Ad hoc & butyrum facit. Faciat & iuscula tum carniū pinguium, tum piscium, quibus addi possunt, vt pinguiora reddantur, butyrum crudum, & pinguedo animalium, quorum est usus. Siquidem pinguius hæc ideo conueniunt, quòd vias obstruant, ex quo veneni transitus inhibetur. Quinetiam vbi venena excalciant, & erodunt, pinguis hæc acrimoniæ eorum hebetat. Ideo hoc in casu, animalium cerebrum, atq; ossium medullæ apertissimè pariter censentur. His similiter herbæ quàm plurimæ opem ferre possunt cibis admixtis: quarum numero probatur calamintina, origanum, serpyllum, silybryllum, ruta, buglossum, echium, silipendula, sonchus, pimpinella, aliæq; quàm plurimæ: quarum vim venenis, superioribus libris, aduersari retulimus, quarum etiam catalogum paulo infra recensebimus. Locus deinde, in quo residere debent, qui venenum sumpsierint, lucidus sit oportet: vbi aer quoque sit nulla mala qualitate affectus. Paretur autem eorum cubiculum odoramentorū suffitu, quibus vis inest propulsandi venena. Id enim præstant santalum omne, myrrha, styrax, aloë, laserpitij lacryma, agallochum, scordium, cassia odorata, citrei mali cortex, iuniperi bacca, eiusque lignum siccum, & id genus plura. Insuper affecti veneno ( Galeno auctore libro 1. de antidotis) nihil aut parum dormire sinantur. Somnus namque venenum retinet in internis partibus, & facilius ad cor deducit. Contrà verò vigiliz, quippe quæ id centro ad corporis superficiem nempe ad externas partes, retrahunt. His ita institutis in primis omni industria, ac diligentia curandum est, vt denotatum venenum foras exhauiatur. Quia in re nullum sanè valentius auxilium perhibetur, quàm vt sine ulla mora agri vomitum ciere cogantur: si tamen venenum adhuc in ventriculo residet. Quòd si iam in intestina descendit, illud quàm primū clysteribus infusus extrahatur. Atqui in hoc omni diligentia ordinem ac modum inire debemus, quem in huiusce voluminis præfatione nobis reddidit Dioscorides. Siquidem si de hac re ita exquisitè differuit, vt postea ornes omnes omnia ferè quæ de ea scriptis tradiderunt, illi accepta referre possint. Verum hoc vnum ipse addiderim, quòd si fortè is, qui venenum sumpsisset, ex omnibus vomitum ceciderit auxiliis vomere nequiret, tunc (vt Rasis auctor est) medicamen-

Vicinus va-  
tio eorum  
qui venen-  
a sumptis  
runt.

Remedia  
contra ve-  
nena.

tis solventibus, itemq; clysteribus erit procedendum. Medicamenta autem, quæ deiectionia potiuntur facultate, ad hoc idonea sunt agarium & rhabarbarum. Quandoquidem utrunq; præterquam quòd deiectionia vi præditum est, facultatè etiam venenis maxime repugnantem forsitur. Id quod etià quidam minori centaurio attribuit. Neq; propterea ab re esset ad idem Aegyptiæ siliquæ atram medullam, aloëmq; vsupare. hæc namq; præter deiectioniam facultatem, seorsum plurimum pollet aduersus humorem putredinè, quæ semper, vel plerumq; ingesta sequitur venena: illa verò quòd alui mirifice emolliat, venenum ventriculi tunicis adherens abluit & abstergit. quin & erodentium acrimoniam obtrudit, & ea deniq; per aluum secù educit. His autè præterea, ea certè clystina còpetere videntur (vt Dioscoridi placet) quæ acria sunt & trahendi vi prædita. Quibus si ea successerint, quæ è iuribus pinguibus, adipe, aut pinguedine, aut butyro, aut lacte parantur, ne vltierus venena penetrèt, vt in dysenteria fieri solet, nequaquam ea iniuncta fore putauerim, præsertim vbi compertū haberetur, venenum intestina exulcerasse. Quamobrè hæc copiosius epotum post vomitiones, & clystera vtilissimum esse prodidit Auicenna: nempe quòd veneni noxia frangat, & sanet. Quinetià summo opere profunt, præmissis tamen vomitionibus, & clysteribus, fortè, ac valide diuersiones: vepote quæ non modo prohibeant ne venenū petat cor, sed etiam ipsum trahant à membris nobilibus internis, ad ignobilia externa. Ob idq; plurimū prodesse crediderim cucurbitulas, si ex iugè naribus, & crurium pulpæ applicentur. Ferunt similiter opem frictions ex asperis linteaminibus, quin & fibulæ strictim factæ, ita vt do'orè excitet, manuum, pedumq; digitis, item brachijs, & cruribus. Mirificè etià venenum aueritit à partibus intrinsecis, si patientes in balneo aquæ calidæ ex medicamētis accommodatis confectio, vel in laconico sicco sudorem ciente imponentur. Quandoquidè huiusmodi calor extraneus efficacissimè venenū ad cutim trahit. Balnei ac laconiciuicè illud sinè supplere poterit, si dissecto viui muli, aut equi aluo exerts statim intestinis, æger in animalis cadauer intronitur: & cū refrixerit cadauer, idem etià de alio fiat, quousq; sat fuerit. Ad hoc autè muli, mulæq; (vt vulgi fert opinio, fortasse quòd, hæc animalia plurimū caloris habent) ceteris præpollent animalibus. Hoc enim auxilio à veneno liberatum narrat Valentiū Alexandri sexti summi Pontificis filiū. Is enim (vt ferunt) cū in quadam cœna aliquot Cardinalibus venenū exhibere veller, sibi ipsi, ac patri id imprudētè exhibuit. Cæterū scire etià conuenit, quòd quauis prædicta remedia omnia cōmuniter venenis optulerint, non propterea est dimittendum, quin continuè infectis propinentur omnia probata antidota, tam simplicia, quā cōposita, quæ cu-

iuscunq; veneni noxiā auferre possunt. Simplicia quidè medicamēta, quæ ad hoc idonea Dioscoridi, reliquisq; Græcis posterioribus celebrantur, sunt vinum vetus copiosius epotū, Leonia sphaeragis, agariū, abrotonū, iris, eryngij radix, napi & pallinacæ semen, calamintha, nardum Celticū, castoriū, ferulæ virētis medullæ, flos rhododendri (quanquā in Galeno, alijsq; ipsum secutus in antidoto minime recipitur, sed potius inter venena annumeretur) succus marrubij, laserpitij, & panacis, figapentū, aristolochia longa, semen rutæ syluestris, beronica, pilis liquida delincta, polij, & seselis decoctum, phu, cinnamomū, cassia, iuniperi bacca, citria mala, & quæ limonia, & aurantia vocant, & eorum semina. Per glandes, præsertim quæ ex humano lacte eporæ, quinquefolij radicis succus, leporis coagulum: mullelæ caro sale inueterata, & in vinbra siccata, cū vino pota. lac canis ex primo sætu acceptū, capparitis, chamæleonis albi radix, apij decoctū, polemoneæ radix, tribuli terrestris succus, simlacis asperæ acinis, scordium, thlaspi, & Cretense dictamni. His Arabes, & recentiorū nonnulli castaneas addunt: item ponticas nuces, mespila, pistacia, zedoariā, lauri bacca: gentianeæ radicē, quin & dictamni albi, tormētillæ, iridis Illyricæ, halsatæ regiz, helenij, & millefolij: rhabarbarum, hederæ corymbos, bolum Armeniæ, hyperici, fibinam, muniam, pimpinellā, Imperatoriū, centauriū maius, angelicā, verbenacæ succum: mures, qui napelli radices depascitur, & muscas grandiores, quæ eius folijs viciant, silipendulam, carpobalsamū, muscum odoratum, ambartū, os in corde cerui reperiū, & ceruinū cornu, quin & monocerotis, vrsi testes, & arietis, origanum, smaragdum, lapidem bezahar, & carduū, quem sanctum, vel benedictum appellant. Ex hæc de censu omniū simplicium medicamentorum, quæ cōtra venena pollent, quæ nobis tum veteres, tum recentiores scripta reliquerunt dixisse sufficiant. De cōpositis autem medicamentis illud proferre nō dubitauerim, quòd si theticia legitime parata reperiretur, nō essent aliunde petenda auxilia contra venena. Sed quoniam mihi planè difficillimum esse videtur, vt ea reperiatur, quæ quoadmodum eius exigit apparatus, confecta sūt, cū nobis desint cinnamomum, balsamum, petroselinum, Macedonicum, myrrha, folium, chalcitis (quam tamen iam nobis compertam putamus) amomū, aspalathus, & calamus odoratus, quæ omnia perquam maximi tunc moment, idcirco nunquam adducar, vt erant venalem theticiam posse sibi locum & vsum illius antiquè legitime vendicare: præsertim cū conflet tempore vsq; Galeni, quæ Romani summo imperio poterantur, theticiæ omnibus numeris absolūta confici non potuisse (vt ipse Galenus testatur libro primo de antidotis) nisi ab Imperatoribus, quoniam non deessent tempore Antonini Cæsaris diuites primates, qui eam confice-

*Simplicia medicamēta, quæ pōt diſta remedia omnia cōmuniter venenis optulerint, non propterea est dimittendum, quin continuè infectis propinentur omnia probata antidota, tam simplicia, quā cōposita, quæ cu-*

*Composita medicamēta*

rent, etiā quod multa eis desiderarentur. Quare illud dixerim, quod si vlla theriaca ex iis, quæ nostra ætate conficiuntur, in vsum admitti debet, deat operam medici diligentissimi, vt illa saltem vtantur, quæ omni studio ac diligentia parata sit, clarissimorum & peritissimorum viro-  
rum testimonio: quæque eo modo experientia comprobata sit, quo docet Galenus libro quæ ad Pissinem scripsit: facit & alio, quæ Pamphili-  
ano dicitur. Hoc item facit de Mithridatio, quod nihil minus quæ theriaca præstat aduersus venena, quodque & facilius parari potest. Qua in re caueat homines ab adulteratis theri-  
aciis, quas in publicis foris vendunt circula-  
tores, etsi plerunque ab his, quos eorum adul-  
teria fraudesq; latent, cæteris meliores, atque  
efficaciores habentur: quippe quod nihil vltra  
videant altantes, quam quod ij frustum inter-  
grum arsenici, vel risagalli officinis vocati, deu-  
orant: quodq; subinde deuorata theriaca, quæ  
postea circumstantibus vendunt, nullum vveni-  
ni incommodum sentiant. Quod cum Galenus  
optimè nouisset, libro Pisoni dicato, ita scriptū  
reliquit. Multæ à subdolis improbisq; in hoc  
quoque fraudes sunt, ac vulgus sola antidoti  
opinione deceptum, ab iis quibus ars est mer-  
cenaria, plurima pecunia medicamentum, vel  
fraus præuocatum conuenit. Cæterum vt quisq;  
flagitiosorum impostorum fallacias, & dolosas  
tentas euitare possit, & debeat, nunc mihi in-  
cipiamus. animo est ad commune reipublice beneficium  
corum ingens, ac scelestum facinus posteritati  
prodere. Nam cum illi suggesta ascendunt co-  
ram populo, quæ dolis capere intendunt, ostē-  
suri quod venenū aquæ ac panem innoxie su-  
munt, multis cauationibus, atq; insidiis vtun-  
tur. Inter quas has duas habent fraudes, quas  
modo omnibus aperiam, quasq; retinent illi in  
suis chariores (vt ita dicam) senones. Primus  
itaque dolus, quo nituntur huiusmodi frau-  
dulenti impostores, est quod cum sciant vene-  
na non posse nisi parum nocere, vbi ventricu-  
lus fuerit cibus valde repletus (vt in præfatio-  
ne huius libri tradidit Dioscorides, & libro  
quarto sen sexta retulit. Auicenna) priusquam  
suggestum ascendat, ad saturitatem vsq;, præ-  
ferunt æstate, lactus crudas deuorat sale,  
aceto, & oleo conditas: verum olei tantum im-  
ponunt, vt ferè in eo innatent lactucæ. Et quia  
hæc maxime vigente bruma, tenellæ lactu-  
cæ difficile passim inueniri possunt, ideo earū  
vicem his præbere interanea boum præpin-  
guum, quorum tantam comedunt copiam, quod  
ventriculus veluti tympanum extendat-  
ur. Id autem eo consilio faciunt, vt hæc qui-  
dem iurum pinguedine, eorumq; substantiæ  
crassitudine, illæ verò frigiditate sua, oleisque  
multitudine, quam illis adiungunt, præterquam  
quod veneni penetrationem inhibent, cum in-  
ternas vias obstruere possint, erodent quoq;  
ingesti arsenici, vel risagalli seplasis vocati,  
acrimoniam obtundunt, & hebetant. Cum igitur

tur venenum sumpserint, quod illis ob præ-  
sumpti alimenti vim, nullam, aut paruā noxam  
adfert, nempe quod ventriculus sit repletus, &  
pinguedine imbutus, mox sumum adulteratum  
antidotum, quod omnino legitimā theriacam  
mentitur, assumunt, idq; impune. Quo fit, vt  
facile postea populo affanti persuadent, id esse  
antidotū omnium præstantissimū cõtra omnia  
venena, quod in vniuerso orbe reperiri possit.  
His leues vulgi animi persuasi accensiq;, maiori  
multitudine, ac impetu feruntur, vt adultera-  
tam, inualidam, veramq; mentientē theriacam  
emant, quā ij qui in maxima annonæ penuria  
et cæternam concurrunt, vbi plurimū panis  
gratis omnibus exhibetur. Itaq; cum temporis  
momento capsulā hac impostura exhauserint,  
statimq; è suggestio descendit circumsoranei,  
seleq; in hospitij recipiunt, vbi cū primū fue-  
rint, arsenicū paulo ante sumptū vnā cū lactu-  
cis aut bubulis increaneis arte quadā euomit,  
neq; aliud illa die assumūt, quā lac, quod tamē  
sepius alternatim potant, vomuntq;, & reuo-  
munt: tantū potest in improbis hominibus auri  
cupiditas, vt sponte cõsultorū in manifesta vi-  
tæ discrimina ferantur. Fraus altera, quam isti  
facinorosi perpetrant, ita se habet. Ii vnā, aut  
duabus horis antequā suggestū ascendant, in  
foro pharmacopolij petū, illudq; foro, in quo  
sermonē populo habere volunt, propinquius  
eligit. Atq; vbi iusserint pharmacopolæ sibi  
arsenicū capsulam addere, eius duo aut tria fru-  
sta seligunt, prout sibi miq; expedire videtur.  
quæ postea charta inuoluit, & in eadem capsula  
reponi mandant. Quo facto pharmacopolæ ro-  
gant, vt cum in suggestū ascenderint, arsenicum  
illud repositū dare velint puero, quem ad eum  
miserint. Porro in forū abeunt verba facturi,  
vbi eorū spuriam theriacam, ad cælum vsq; ne  
miris laudibus essentur admentientes. Ad hæc  
vt rem magis verisimile reddant, puerum vel è  
circumstantibus quempiam ad pharmacopolij  
mittunt, qui venenum antea ab ipse selectum  
deferat. Interea ingentē capsulam in suggesto  
stantes aperiunt, quā habent vasculis præuæ il-  
lius theriacæ plenius refertā, cuius operculo in-  
tus adherent cera subposita, varia cuiusdā mis-  
cellæ frusta ex saccharo, quod candiū vocant,  
amylo, alijsq; innoxijs medicamentis miro qua-  
dam artificio cõfectæ, quæ proflus & facie, &  
magnitudine referunt illa veri arsenici frusta,  
quæ prius ij in pharmacopolio selegierant. Le-  
uant autē isti hominū proditores operculum à  
capsula, quod fraudē melius occultent, in sugges-  
to stantes, siquid summo cum artificio inter-  
næ operculi partē, cui adhærēt illius miscellæ  
frusta arsenici mentientiā, verius se trahunt, ne  
quis suā fraudē deprehendere possit. Deinde  
statim in manu socij, aut pueri, quos doli mini-  
stros habent, capsulæ operculū collocant: quod  
eorū alter aperta manu perquam eleganter sus-  
linet, parte pseudoarsenicū continente cælum  
versus respiciente: idq; ne quis dolum intueri  
possit.

*Fraus  
quæ  
cir-  
cumsoranei  
animo est  
ad commune  
reipublice  
beneficium  
corum ingens,  
ac scelestum  
facinus  
posteritati  
prodere.*

*Alteram  
postquam  
in foro  
pharmacopolij  
petū, illudq;  
foro, in quo  
sermonē populo  
habere volunt,  
propinquius  
eligit.*

possit. Interea redit nuncius arsenicum legitimum à pharmacopolio deferens. Atqui istud accipiens artis capiosè magister, statim illud populo ostentat longa atque mendaci oratione. Qua perfectà ad experimentum transit, perpetuò dolosè, procedens. Quandoquidem simulans sibi opus esse expeditis manibus, manicas ex murice, vel serico proditore, quo plerumque vestiuntur, ad cubitum vsque cōsoluit, ea tantum ratione, vt arsenicum verū, dum hæc agit, super operculo prædicto pseudoarsenicum continere, reponat, abdatis; quod ob operculi circuli altitudinē nullo pacto infernè à circumstantibus videri potest. Obuoluit itaque manicas, brachij; denudatis, ac tenui linteolo humeris imposito, iubet aquæ vel vini poculū adferri, & relicto in operculo arsenico vero, sacrificium innoxium fraudulenta manu capit. Quod gladio minutim incidit, & vino, vel aquæ parati cyathi commiscet, & denique turissimè bibit. Atque ita fraudē hîc coloribus exornatam speciantibus persuadet, vt nullus dubitet, quin ille mortiferū arsenicū hauserit, quod ex medica officina delatū fuerat. Memini me olim vnum ex his vidiſſe, qui venenum simili modo adulteratū puero exhibuerat suo: cū simularet se ei op. ferre nolle, donec pulsum amississet, & in mortis discrimine versaretur, vt suæ falsæ aquæ adulterinæ theriacæ maiore compararet exsultatione: cū præterea prius versutum puerū admonuisset, vt anhelitū compesceret, idēq; vt facies eius colore mutaretur quin & interim oculos obturteret, & os ac ceruicē contorqueret; ad se vocatū astantē medicum haud acris calliditq; ingenij, in ea cluitate, vbi id mihi contigit vidiſſe, receptum habentem, qui pueri pulsum tangeret, vt omnibus testaretur, quod pulsum amississet. Quod cū fecisset bonus ille medicus iam imprudenter factus circulatoris leno, omnibus testimonium perhibebat, se nullum pulsum in eo inuenisse: quippe qui nusquam fortè legerat, quod arte etiam posset intercepti pulsus, cum tamen id scriptum reliquerit Galenus lib. v. 1. de placitis Hippocratis, & Platonis, vbi sic inquit. Eadē natura in arterijs cernitur, nā et ipsæ perinde ac nervi, aut incisæ, aut laqueo interclusæ pulsu omni, ad rationē; orbantur. Ex quibus sanè verbis tunc cōmisiſſi potuisset, quod facile huius puero laqueata essent brachia, & proinde interceptus arteriarum pulsus, quæ per brachium ad manū excurrunt. Si quidem adtingentes laquei ab his nebulonibus adeo callidè subdoleque aptantur, vt versuto quodam ferro globulo supra cubitum extra manicas latente, stringantur ad modum, ac relaxentur. Id quod facillè ab eo fieri potest, qui puerum semimortuū se simulantem, brachijs ad speculaculum sustinet. Tali signum fraudē adtingebatur subula, vbi pulsum interceptare animus esset, hæxabatur autē lente, cū iam versutissimus puer ex theriacā illa assumpsa, in pristinam suā constitutionē restitui

simulasset. Hæcenus de fraudibus horum canonicum, quas pluribus prosequi libuit, vt quisque eas euitare sciat, ac possit. Quæ de re morbo Gallico quàm plurimum certe debeo: siquidem vnus, isq; insignis, ex his qui venenum innocuè deuorare prostentur, cuius ossa lues illa non immerito depascēbatur, cū à me in sanitatem redigi exoptaret, inter curandū, mihi id ab eo experienti, omnes has fraudes, quibus hoc flagitiosum hominum genus vitur, vt pecuniam extorqueat, libitissimè patefecit. Cæterum fraudes, ac mendacia, quibus ipse pariter vitur, quæ est diui Pauli profapia ortos se prædicant, quæ tamen de re mentiuntur, hic consulo dimittam. verū intractas eas nō relinquo, vbi in processu de his differemus venenis, quæ morsu, vespitu relinquūt innumera exitiosa animalia. Sed ne aliquod præstans antidotū desideretur in his nostris commensariis, ne prohibi, ac fidelis medicum numerare functū existimauerim, si hoc in loco quædam antidota mihi longo labore comparata, magni ad venena momenti, describero. quæ nō modo iis, quæ per os assumuntur, sed iis etiam, quæ animalium morsu, vel ictu eiiciuntur, summo, ac præsentaneo fuisse remedio cōperi. Licet autē hæc attare rari admodū habeantur medici, qui sua pandere arcana velint, si quod nacti sunt pulchrum & singulare auxilium; tamen cū mihi consilium ab initio fuerit, mea opera quantalacumq; sit omnibus generatim prodesse, alienū quidē inhumanitq; foret, si modo vel inuidia vel avaritia compulsus, aliquid silentio inuoluerē, quod in arte medica vsui futurū putē. Primū igitur antidotū, cuius admiratō in venena vires sapius expertum sum, hoc modo cōficitur. Recipit enim rhabbari, rhabarbari, & Poto aduerti, radicis plus, acoti, quem falsò calamum odoratum vocant, cyperi, quinquefolij, tormentillæ, aristolochiæ rotundæ, pæoniæ, helenij, costii iridis Illyricæ, chamæleonis albi, cuiusq; drachmas tres. Itē galangæ, Imperatoris, dictamni albi, angelicæ, millefolij, filipendulæ, doronicis, zedoariæ, gingiberis, singulorum drachmas duas: agriæ drachmas tres: libanotis maris, gentianæ, morfus diaboli sic herbarijs dicti, cuiusq; drachmas duas & semis. Ad hæc seminis citrei mali, viticis, cocci insectorij, fraxini, oxalidis, pallasicæ hyæstis, napi, nigellæ, prœniz, octim, iris, thlaspis, feniculi, ammi, singulorū drachmas duas. præterea baccarū lauri, iuniperi, hedere, asperæ similitacis, cubebræ, singulorū sesquidrachmam. Fohorum scorodij, chamædryos, chamæpityos, centaurij minoris, stoechadis, nardi Celtici, calaminthæ, rutæ, mæthæ, betonicæ, verbenæ scabiosæ, carui benedicti, melissophylli, singulorū sesquidrachmā: dictamni Crætici drachmas tres. samphysij, hyperici, iunci odorati, marrubij, galegæ, fabinæ, pimpinellæ, cuiusque drachmas duas. Caricarum, nucū iuglandiū pistatorum, singulorum vncias tres: myrobalariorū empelicorum drachmas quatuor. Florum vtrius-

Antidota  
nostra præ  
stantissima  
contra Venena.

Primian  
tidoti de  
scriptio.

rum vtriufq; bugloffi, rofarum, lauendulæ, faluæ, totis marini coronarij, cuiufq; fcrupulos quatuor: croci drachmas tres. Caffiæ odoratæ, quam hodie cinnamomum vocant, drachmas decem. Caryophyllorum, nucis myfticæ, macis, fingulorū drachmas duas & femis. Piperis nigri, ac longi, fantalorum omniū, agallochi, fingulorū fequidrachmam. Cornu cerui crudi drachmas quatuor: vnicorni drachmam vnā. offis cordis ceruini, ramentorum eboris, virgæ ceruinæ, callorij, fingulorū fcrupulos quatuor: terræ Lemniæ drachmas tres: opij fequidrachmam. margaritarum orientalium, ramentorum finaragdi, hyacinthi, corallij rubri, fingulorum fequidrachmam: caphuræ drachmas duas maffiches, thuris, fyracis, myrrhæ gūmi Arabici, refinæ terebinthinæ, fagapeni, opopanax, laferpitij, fingulorū drachmas duas & femis. moffhi odorati, ambari, cuiufq; drachmā: olei de chalcantho confecti vnciā mediā. Pulueris cordialis tēperati, diamargariti, diamoffhi, diambari, electuarij de gēmis, paffillorū caphuræ, feillæ, fingulorum drachmas duas & femis: paffillorum viperæ vncias duas. Succo oxalidis, foncei, fcordij echij, bugloffi, meliffophylli, fingulorū felibrā: hypociftidis drachmas duas. Theriacæ electæ, Mithridati optimi, cuiufq; vncias ſex. Vini veteris albi odorati libras tres: facchari de Medera ſexula, vel optimi mellis libras octo & vncias ſex. Ex omnibus his ſumma diligentia, & ratione inqueſtitæ, atq; ſelectis fiat electuarium, eo modo quo theriacæ, aut Mithridatis antidotum conficiuntur. Sumendi quantitas eſt à drachma vna vſque ad tres pro ætate, & conſtitutione patientis. Atque ita omnibus perſuadere poteris, antidotum hoc non ſolum præſtantiffimum eſſe (vt antè diximus) contra omnia venena, quæ per os ſumuntur, icq; aduerſus ea, quæ morſu vel icū relinquuntur: verum etiam in peſſilentia, cui mirificè opitulatur, quotidie aſſumptum, & præcipuè ad præſeruandos ſanos. At ſi cui in animo fuerit, vt præſentaneum adferat auxilium, hæc faciat oportet. Antidoti præſcripti libram accipiat, libram item ſyrupi de citrei mali cortice parati, & libras quinque aquæ vitæ vocatæ, ex optimo, odoratoꝝ vino confectæ, totieſq; vitreis organis repurgatæ, vt quintæ eſſentiæ ſpeciem præ ſe ferat. Deinde omnia hæc in vas vitreū inciſat duplicè à rebus inditis capacitat. poſtea vaſis ore ita obturat, vt nullas ſpirandi meatus relinquantur, magis cum dexteritate aquam in vaſe cum electuario tandiu agitet, donec totum diſſoluatur. Atque tum vas ore cera, vel pice obducto in menſem integrum reponat. Quod tamen bis in hebdomada agitari conuenit eo modo, quo antea dictum eſt: ſic enim, vt electuarium facile reſidat in fundo, ſi dimittatur. Exaſcio denique menſe clarā aquam aureoq; colore nictentem, electuario ſuperſtare inueniet, & quæ iam omnem illius vim in ſe contraxerit. Tum itaque vas ipſum ape-

Potio ex prædicto antidoto.

riat, & in vas aliud item vitreum lympidam aquam paulatim effundat, cuius os cum cera, & membrana accuratiſſimè obturet. Nam ſi illud diei ſpatio apertum ſineret, omnis conſuſa aqua in auram euaneſceret. Tanta hæc aqua virtute pollet (quod millies expertus ſum) vt quatuor drachmarum pondere pota vel per ſe, vel cum pari odorati vini quantitate, vel ſtillatitiæ cuiuſuis aquæ ad cordis robur facientis, vbi quis icūſus vel demorſuſus quocunq; venenato animali, in tanto mortis diſcrimine verſaretur, vt vocem, viſum, ac reliquos ſerè ſenſus amiſſiſſet, ægrum ingenti adſtantium admiratione à longo veluti ſomno excitat. Quin & vomitione plerunq; plurimam inſectorum humorum copiam exhaurit. Cuius rei exemplo (præter alia innumera) nuper mihi fuit præſecti oppidi Vipaci vxor, quam à vipera in dextra manu demorſam, & iam de naulo rationem cum Charonte inituram, hæc aqua in vitam à morte reuocauit. Id quod etiam paulò poſt contigit cuidam miſeræ Sclauæ ab alia diſſimili vipera in manu demorſæ. Hæc idem ſimiliter præſtat contra venena, quæ per os ſumuntur: ſiquidem ea adeo tenuis eſſentiæ, effica, & penetrans eſt, vt momento vi ſua in omnes corporis venas permeet. Quin & eodem præbet effectus in alios quam plurimos morbos, quos breuitati alios denique prætereo. quādoquidem prudentes, & periti medici, habita huiuſce virum exacta ratione, eam adhibere poterunt, vbi legitimè conuenire cenſebunt. Porro antidotum alterum generoſum, pariter & ſingularè, oleum illud eſt, cuius ſuperius libro ſecūdo capite de ſcorpionibus, item quarto capite de acronito à nobis facta ſuit mentio. Id pulſibus extrinſecus patentibus illitum, nempe temporum, manuum, ac pedum, quietatim extimæ cordis parti ad ſiniſtram mamillam, repetita alternis tribus horis illinitione, efficaciffimè ſuccurrit omnibus venenis per os ſumptis, quæ tamen ex erodentium genere non fuerint. Similiter viperarum, aſpidum, & cuiuſcunq; deniq; venenati animalis morbiſus ſingulari auxilio eſt, vt in proceſſu latius explicabimus. Vt autem omnes intelligant quā maximum ſit in me iuuandæ poſteritatis ſtudium, modum, quo illud conſcitur, hic deſcribere non grauabor. Sumantur itaq; inuente menſe maio, quo tempore conſici debet, olei communis centum annorum, ſin minus ſui temporis veruſtiſſimi librz tres: ſoliorum hyperici virentis manipuli tres. Oleum in vas vitreum duplicè à contēto capacitat is imponatur, in quo hypericum aliquantulum antea contuſum inſundatur. deinde vas cera, & membrana obturetur, & medium in tenuiſſimā arenā cōdatur, loco vbi tota die inſolari poſſit, atq; imbi ſinatur ad decimū, vel duodecimū diē vſq;. Quo exaſcio tempore, mergatur vas in calentis aquæ balneo ad viginti quatuor horas: mox oleū ab herba exprimitur. Hoc factio ſumatur hyperici, chamædryos,

Alterum antidoti deſcriptio & ſynec.

oleum  
hyperici  
ex annis  
thio lo

chamaedryos, calamintae, cardui benedicti, singulorū manipulos. Quae omnia prius diligenter contrita oleo admisceantur, ac subinde vas in praedictum mergatur balneo tribus continuis diebus. Extrahatur deinde, & ab incocctis herbis exprimatur. Post haec accipiantur florū hyperici manipuli tres, qui à caulibus probe repurgati, & contriti in praedictū oleū infundantur, ac in idem balneum per tridū reponantur. Post id tempus eximat, & vt prius exprimantur. Idem fiat iter, aut quater, vsquedum oleum sanguineū colorem referat. His peractis fumatur hypericū, quod iam defloruerit, & ab eius cacumine grana illa viridia excerpantur, quae hordaeae granis similia deprehenduntur, in quibus semen continetur. Ex his itaque tres cocterim manipuli decerpantur: qui postea rursi, & vino merato albo aliquantulum perfusi in oleum praedictū infundantur, & cum eodē vitro, in arena sepulto, octo diebus continuis insolentur. Quo tempore transacto tridū spatio in balneo immittantur, post colesant, & modo praedictū exprimantur: tertio, aut quarto similiter distilla semen in oleo macerari debet, donec id obscuri sanguinis colorem repraesentet. Ad haec fumatur scordij recens, calamintae, centaurei minoris, cardui benedicti, verbenace, distamidi Cretenfis, singulorū medius manipulos: tundantur omnia, mergantur in oleū praedictum, & vas in balneo iterum imponatur per biddum continuū, dein colesant, & exprimantur, vt suprà. Postea fumantur zedaira, radicis distamidi albi, gentianae, tormentillae, aristolochiae rotundae, singulorū drachmae tres, scordij manipulos. Tundantur item omnia, infundantur, & immittantur in balneo, ibiq; permaneat tribus diebus cōtinuis: scolentur deinde, & exprimantur. Infundantur deniq; styracis calamitij, laferis, cuiusq; drachmae sex, baccarū iuniperi drachmae quatuor, melanthij drachmae duae, cassiae odoratae (cinnamon officina vocant) drachmae nouem: iunci odorati, cyperi, singulorū sesquidrachma: singulorū alborū semuncia. Tundantur omnia (vt pluries de aliis dictum est) & in idem oleum infundantur, & per triduum continuū in balneo maceantur, demum colesant, & exprimantur, modo quo antè dictū est. Postmodò adinstat oportet crecti scorpones viui diebus canicularibus collecti. Ii in vase vitreo conclusi, cineribus calidis superponantur, & cum eos per calore fudare, atq; irasci consensuerint, oleū distū oleum calidum superinfunditur. Sed aduertendū est, ne id adeo feciens fiat, vt vas iturpant obstruat factū vasis ore in balneo tribus cōtinuis diebus continetur: deinde colesat, & exprimatur. Profecti interea scorponibus, rursum in oleū infundantur rhabarbari laudatissimi, myrrhae communis vltis, aloes hepaticae, singulorū drachmae sex: nardi Indici drachmae duae, croci drachmae tres: rhaetica electa, electioe Mithridatij, cuiuslibet semuncia. Quae ex his rursusenda sunt, et

rantur, mox vitimò infundantur in oleù, quod per triduum continuù contineatur in balneo. Quo factò oleum non amplius percoleatur, sed deinceps recondatur, perinde ac opobalsamù, quippe quod mirandù fìt remediù ad iam dictà venena, & præcipuè còtra napellù, quo infecti fuere, vt experientium fieret. Corsi illò duo viari obfessores, quorum historiam suprà retulimus libro quarto in aconiti mentione: ad cuius lectionè, ne idem bis repetamus, eos reitricimus, qui eius desiderio capiuntur. Præter autem Mithridatium, antidota alia duo generosa D'scorid' probantur in præsentì præfatione, vnum scilicet quod è scinco, alterù quod è sanguine nuncupat: sed quod is eorù conficiendorù rationem tradiderit, nusquam hætenus reperi. Quamobrem illa duo in multorum gratiam hic adscribere, non alienù fore duximus, eo tantè modo, quo lib. i. de antidotis à Galeno feriatim describuntur, vbi hæc scripta reliquit. Antidotus *Αἰα τῶν ἀνιδρωπῶν*, id est, ex sanguinibus, ad venena, venenatorum: omnium morfus idonea, scilicet habet. Piperis longi, piperis albi, acori, croci, phi, mei, distantini Cretici, ammoniaci, agarici, singulorù drachmas duas: amomi, opobalsami, feminis rutæ syluestris, cymini Aethiopici, anisi, sanguinis anatis maris, & femine sicci, sanguinis hædini, sanguinis asnerini, feminis napi syluestris, singulorum drachmas tres; gentiane, trifolij, florum iunci odorati, thuris, rosarum siccarum, singulorum drachmas quatuor, petrosilini drachmas quinque, polij Cretici tāunde, cinnamomi drachmas sex, florum scordij drachmas octo: myrrhæ, nardi, singulorù drachmas decem, croci drachmas duodecim, castis drachmas octo. Omnia hæc diligenter confusa, ac per excussorij cribri triecta mell'e Attico depumata, commiscebis, committas: in argentea pyxide repones, atq; hæc vt maximo medicamento vteris.

*Antidoti  
è sangui-  
nibus de-  
scriptis.*

*Antidoti  
è cinque de  
criptio.*

& oboli tres. Construitur autem hoc modo. Cypis, hypocistis, sagapenum, gummi, opium, styrax, opopanax, vino Chio macerantur die noctuq, quoad penitus dissoluta sint. Reliqua verò interim confusa tenui cibrio excutiantur, illisq; iam maceratis, ac dissolutis commiscuentur, commistisq; Attico melle ad crassitiè vsque desumpato excipiuntur, opobalsamoque superimmissio. demum in vas argenteum transferuntur, atq; ad multos vsus reponuntur. Datur autè ex hac antidoto quantū aeger tolerat. Hæc de duabus antidotis, quas non immerito quidem probauit Dioscorides, quasque vt efficacissimas in aliarum censum reculit Galenus, atque descripsit. Sed quoniam (vt supra in theriacæ mentione dictum fuit) multa nobis desunt simplicia medicamenta, quæ in eis expectantur, idcirco non video quomodo possint legitimè confici, nisi iis vti velimus, quæ eorū vicem suppleant, ita vt vnum simplex medicamentū in alterius locū succedat. Id quod medicorum, ac seplasiariorū plerisq; fieri adsolet.

*Succedanea quantitas admittenda.*

Quorū sententiæ est cuiuspiam videretur Galenus adscriptum, quippe quod scriptis tradiderit in cinnamomi defectu duplū cassiæ substitui posse, non tamè propterea inde colligi potest, quod idem fieri possit de quocunque aliquo simplici medicamento, quod desideretur, vt quidam existimant, nō rectè, meo quidè indicio, Galeni mentè affecturū. Si quidè si fecus de hac re differit lib. 1. de antidotis, vbi sic inquit. Quod ad cassiā verò attinet, ea me commemorare nunc opus est, quæ in multis de medicina libris scripta sunt, duplū cassiæ siquis cinnamomo egeat, iniciendū. Hoc dictū irridens Satyrus magister meus, vnam ex Quinti facietis ipsum esse dicebat, asseuerans eos, qui duplum cassiæ imponere iubent, si cinnamomo careamus, similia illis facere, qui nos censent, si quando Phaleron carcerimus, illius quod in cauponis venditur, duplicata mensura bibere; siq; panis siliginis desit, surfuracis duplum comedere. Mihi verò hæc Quinti faceria, si de re vna quapiam, quæ per se sola vti velimus, asseratur, vera irreprehensibilisq; videtur: sin de re, quæ in societate multorū veniat, non est eodè pacto vera. Nam cuiuscūque, quod solū corpori admodum debet, vt puta rhus abinthii, iris, gentiana, vel id genus alia aliqua mediciorū, siquis ininus boni duplū loco præstantissimum desit, peius nihil erit vti duplo illius, qui propter eas. eiusdem generis habeat, etiam si deterius hoc illo videatur. Cassiā quidè cinnamomo genere proxima vsq; adeo est, vt ex ipsa quandoq; cinnamomū oriatur, speculandūque nonnunquam cassiæ arbores integre, in quibus aliqua cinnamomi virgulta è cassiæ ramis prodeant. Simile autè istud est non vino aut pani, sicuti Quintus dicebat,

sed vitæ functionibus in extruenda domo, in fabricanda nauis, in tollendis, & transponendis oneribus, in omnibus deniq; vitæ actionibus, in quibus quod peragendū erat ab vno homine robusto, si absit, a duobus imbecillioribus perficiatur. hæc Galenus. Ex quibus verbis omnibus palū est, Galeni nō assentire, vt in cōpositis medicamentis vnum simplex pro alio supponatur, nisi ex iis sint, quæ eandè naturam sortiuntur, vt cassiā, & cinnamomū. Quare illud inde colligendū esse putauerim, quod perperā faciant ij, qui rem hanc aliter intelligunt. Porro & illam antidotū, quæ iuniperi baccas, terramq; Lemniam recipit, summo opere laudauit Galenus, eamque lib. 1. de antidotis memoriæ prodidit, hisce verbis. Antidotus, quæ exhibita accipiente tutum à venenis reddit, sic habet. Baccarum iuniperi drachmas duas, terræ Lemniæ drachmas duas & obolos duos. Hæc vbi in puluerē redegeris, oleo, aut melle commiscebis, & repones: atque cum opus fuerit, ex aqua mulsæ cyathis duobus quantū est auellana dabis. Hac antidoto Nicomedes rex utebatur, si quando suspectos habuisset, qui se vocarent. Nam si venenum non subit, quæta manet: sin adsit, nauisem concitat, & euomere cogit, ita vt venenum quoque cum antidoto reiciatur. Sed hæc hæctenus dicta sufficiant, quantum ad venenorum omnium in vniuersum rationem, quandoquidem de iis priuati, eorūque auxiliis, & antidotis in singulorum mentione diffusius agemus.

*Antidoto ex ter-  
ra Lemniæ.*

# CANTHARIDES.

## CAP. I.

QVI BVS data sunt cantharides, signa eueniūt grauissima. Ab ore enim ad vesicam vsq; cuncta erodi sentiuntur: picem, aut simile quiddam cedriæ respicit: dextra præcordia inflammatur. vrinam agrè reddunt, & subinde cum lotio sanguinē emittunt: strigimētum secus atq; dyseatericis, aluo deserūt: salidia vrgent: animo linquuntur, obortaq; vertigine concidunt. postremò mente abalienantur. Ergo antea quàm tale nōnihil accidat, dato oleo, aut supradictorū aliquo vomere cogatur. mox vbi vomitione plurima reiecerunt, halicæ aut oryze, tragi aut ptisanæ cremor, aut decoctū maluæ, aut seminis lini, aut feni græci, aut radicū althææ, quam Latius sermo ibisicum appellat, clystere infundatur. Præterea nitrum eisdè dandū, ex hydromelite,

vt quæ

vt quæ stomacho adhuc, aut intestinis adherent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluum exnitro aqua malsa, vacuari debent. Deur deinde vinum, aut passum, in quo pineoli nucleï, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut malsa, aut asnerinis adeps in passio liquefactus. Inflammata autem partes, hordei farina cum malsa decocta perungantur. Ab initio admota cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsum virus ita remoratur, vt in principis se partes insinuet: ipsa tamen interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulantur, vt pote quæ dolores & permulceant, & leniât. Tum vbi corpus callescente oleo inustum fuerit, in solum descendere oportet, ac lauare, vt per cutem summam, quæ corpori noxia inhaeserunt, etiam excernantur. Et deiectionis multifariâ moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capeßat. Gallinaceis carnibus, & hœdinis, aut fauillis catulis, maxime pinguis, & tenerimis, ac cum lini semine coctis, vesci debent: siquidem aluum cient, atque venenorum acrimonia heberant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, quæ aster appellatur, si quaternæ singulorum drachmæ cum passo sumantur. item pulegiû ex aqua tritum, iurinum, aut rosaceû, cum ruta decocto & recentes viris ramuli cum passo detriti. Longè omnium potentissimè antidota auxiliantur, cum aqua malsa, drachmis quatuor pota.

CANTHARIDUM tum historiam, tum etiam facultates superius libro secundo, vbi & earum picturam exhibuimus, adeo diffusè lateque tradidimus, vt superuacuum ducere hoc in loco plura de eis rememorare, nisi nunc de earum maleficia & noxia vñ nobis differendum esset. Cum igitur Cantharides ex cathartico recessu quarto, & exicent secundo, in quædam fuerit, si erodant, vicerent, & deinde fragmentes interitum. Nocent, principium vesicæ, omniobusq; vrinæ inseruentibus membris, non modo haustæ; sed quandoque etiam exterius lixæ, vbi exulcerare sit opus: præsertim cum amplius admiscetur cataplasmata, locisq; illis

tur vesicæ propinquioribus: nempe coxendicû articulis dolore diutius tæatis, vel pubi, vel renibus, vel testibus. Quo fit, vt qui has hauserint, exulcerent inde vesicæ, magnus in vrina red denda excrucietur doloribus. quanquæ præter id omnia in vniuersâ lædât viscera, quod suapte natura erodant, & postremo necem inferant. namq; sua venefica, & perniciofa vñ deradunt internos meatus omnes, quibus obuiât. Proinde nec mirum si cum lotio sanguinè extrahit, è rosis ab eis vasis neque si quidam (vt receptori quidam dixerunt) penis ipse, testes, pubes, & vesicæ ceruix intolerabili inflammatione veretur. Hinc enim plerunq; euenit, vt qui hauserint, vñ maleficio afficiatur non sine intolerabili ardore angustiaq;. Cæterum picis, & cedrix odor, quæ à cathartidibus male affecti gustu, & olfactu percipiunt, aliud, meo quidè iudicio, non promittit, quam à vaporosis humoribus in vetriculo, & iecinore adultis, interstia huiusce venenali dilatare. Ab ea siquidè dum exurantur humores, quædam inuicem se cômistio, quæ propriâ tû gustum, tum odoratum inscindi facultatè adipiscitur. Inflammantur præterea dextri lateris præcordia. quippe cum veneni vis in iecur facilius, quam in lienem excurat, mirû utiq; non est, si concitatis ibi inflammationibus, potius dextrû, quam sinistrû reprotet latus. Nec alia ratione fit inde fluxio dysentericæ similis, secum deferens intestinorum ramenta, quam quod cantharides ipse ad intestina descendentes acerrima sua vi, ea exulcerent, & abradant. Defectus verò animi, ingens anxietas, cordisq; angustia partim eueniunt, doloris, ardoris, intolerabilisq; inflammationis exuperantia: partim verò delectari vñ pharacæ, quæ vsquæ adeo resoluunt vitales spiritus, & imbecillos reddit, vt inde affecto corde, hæc tam sæua oriuntur symptomata. Quin & ob id vertiginosi sunt, delirio, ametiæque capiuntur, qui eas sumperint, quod venenose exhalationes, quæ à colligatis humoribus in inferioribus membris sursum in cerebrum feruntur, adeo ipsum insciant, vt facile animales facultates corrumpanitur, ratiocinatio ipsa pereat. Sed vt his omnibus securatur incommodis, primùm si necesse fuerit (vt etiam Dioscorides inquit) cantharides ipsas extra corpus ducere, crebris excitatis vomitionibus, his nimirum medicamentis, quorum in huius libri præfatione meminist Dioscorides, atq; etiam nos mentionem fecimus in nostra in eam longa commentatione. Quintam acerbis clysmatis opus est, vt per hæc deuocetur, quæ ad intestina descendere vñ. Fit enim vt exhaustus è corpore cathartidibus, non magno postea negotio accidentibus, in incommodisq; præfidia adhibeantur. Quod quidè exulcerat vesicæ, cui suapte natura plus nocet cantharides, quam ex ære internis visceribus. succurritur refrigerantibus, leuiss, & pinguis simul mistis medicamentis. frigida namq; inflammationes extinguunt, mulcèq; earû dolores: pinguis

Sympt.  
matura  
causa

Canthari  
dam Vene  
maturatio.



veneni acrimoniam obtundant: lenta verò, ac viscosa cum internis partibus pertinaciter inhæreant, non modo diu medicamenta in exulceratis retinent locis, sed etiam sanas partes muniunt, ne veneni vim admittant. Idcirco ad hoc mirificè præstat lac humanū ab ipsius vberibus exutum, crudum, recens; butyrū elegantis modo linctum: psyllij, cydoniorum malorum, & malux feminis spissamentum: item serapim ex nymphææ floribus, & purpureis violis, quim & quod ex papaueribus conficiunt: nec non la stuce, & portulacæ, & cucumeris, & cucurbitæ succus: præterea cremor, lactis speciem referens, qui è papauerum, melopeponum, cucurbitæ, cucumeris, anguriæ, & lactucæ semine exprimi solet, affusū violarum aqua, aut radicis althææ, aut solani, quod vesicarium, & halicacabum vocant. cuius etiam rubentes bacce decem, vel duodecim numero fractæ, & ex aqua portulacæ, vel ptisanæ hordeacea potæ, hoc in negotio præsentaneo remedio prosunt. Facit ad hoc & amygdalinum oleum, quod scilicet ex dulcibus elicitur nucibus, vnciarum sex pondere haustum. Huic autem præfertur, quod è recentibus pineis nucibus exprimitur. Sed omnium præstantissimum est, quod è semine albi papaueris eximitur. quandoquidem hoc præter id quod tanquam pingue plurimum conuenit, potest sapienter naturæ inflammationes extinguere, veneni acrimoniam retundere, & dolores quātissimos uehementes sedare. Sunt etiam qui præferant aquam, quæ feruentis balnei calore vireis instrumentis elicitur è malux folijs, ibisci radicibus, & recentibus cucurbitæ ramentis: quod propria vi vrinæ ardoribus opem ferat, & intestinorum inflammationes repellat. Porro succurritur exulceratis intestinis, isdem facit medicamentis, quibus ad dysenteriam vimur: nempe pinguium carnū iuribus clystere infusus, addito hirci, ceruique adipe: & omphacino rosaceo, plantaginis aut portulacæ aqua prius eloto. Prohibentur halitus cerebrum penitentes, dissoluunturque assumptis antidotis, quæ venenis resistunt, & humores putrescere non sinunt. quænetiam cataplasmati ex frigidis, repellentibusque succis, scincipi, & coronali futuræ illitis. In summa frangitur, atque demolitur veneni vis, Dioscoridis testimonio, valentibus antidotis, veluti theriacæ, aut Mithridato, aut (vt scribit Galenus libro 1 x. simplicium medicamentorum, capite de terra Lemniæ) eo antidoto, de quo & nos superius locuti sumus, quod fit ex ipsa Lemniæ sphaigide, & iuniperi baccis. Prostant insuper epithemata cor roborantia, iteq; inunctiones, quæ ex odoramentis consistant valentioribus: præsertim oleum nostrū de scorpionibus superius descriptum aduersus venena. Refert Galenus libro secundo de antidotis Alespiadis auctoritate, cantharidas proprio veneno remedium & antidotum esse, si earum pedes, & alix tritæ cū melle elegantis modo papulim affluantur. Id quod

etiam asseruit libro x i. simplicium medicamentorum, vt superius libro secundo in earum quoque mentione retulimus. Hoc idem scribit Aetius à Galeno fortasse mutatus lib. x 11. cap. x i i x. sic inquit. At verò cōtraria affectionis ratione, quantum nihil aliud his auxiliantur cantharidū alæ, & pedes cum pulso pota. Hæc Aetius. Veruntamen cum huiusmodi remediū suspicione non vacet (non propterea Galeni testimonium reiiciendū putauerim) cumq; à multis improberetur, atq; ipse nullū adhuc eius periculum fecerim; ideo nec ipsum dammare, nec probare ausim. Arabes nanq; pro certo habent, omne venenū, quod cantharidibus insit, earum tantū alis, pedibus, & capitibus inesse. Quare cū cantharidas suis immiscet medicamentis, tam intus sumendis, quā extrā adhibendis, iubent contra Græcorum sententiam, vt capita, alæ, ac pedes absindantur. quanquam credēdū arbitror Arabas Hippocratem perperam intellexisse, vt vltimo commentario de ratione vitus in morbis acutis scribit Galenus. Sed quoquomodo res se habeat, ambarū partū placita in mediū attulimus, vt vnuquisq; suū ac re sequatur sententiam. Nos tamen suspecta medicamēta semper dimittenda iudicauimus, atq; his vtrūq; de quibus inter probatos auctores, & doctos viros cōuenit. Sicut è vulgaribus, qui ad epotas Cantharidas acutū commēdēt. Sed id equidem probare non ausim, quod antiquorum, recentiorumq; repererim neminem, qui scripsit tradidit acetum contra cantharidas auxiliari. Quinetiam medentur vrinæ ardoribus, & pudendorum inflammationibus, non tantū ea medicamenta, quæ per os sumuntur; sed ea quoque, quæ exterius illiuntur. Præstant igitur ad hoc rosaceum, omphacinum oleum, violaceum, & quod fit ex nymphææ floribus: item quod ex papauerum semine conficitur, quodq; ex ijs paratur fructibus, quorum plantam appellant aliqui Balsaminam, alij verò Caranzam, cuius historiam, ac facultates superius libro quarto descripsimus. cū de vite nigra differeremus. In quæ vsum hæc non modo exterius illiuntur pubi, peni, & testibus; sed etiam in pudendi meatum clystere iniunguntur, præsertim addito oui albo diutius rudicula agitato, aut sedi succo, aut hyoscyami, aut portulacæ, aut lactucæ. Maximè etiam prodesse compertum est, si ad vmbilicum vsque duabus aut tribus horis sederint patientes in aquæ tepentis balneo, cui ibisci radices, malux folia, & femina violarum flores, psyllij, cydoniorum malorum, tæni-græci, & lini semen, hordeum, & hyoscyamum, & id genus alia fuerint incocta. Postremò ad omnes huius veneni reliquias, quæ corpori hæssent, e adicidas, iasq; membra roboranda, & ad pristinum temperamentum restituenda, probatissimum est medicamentum bis in die mane, & vesperi, electarium mox describendum, vaciæ pondere ex humano, vel caprillo, vel asinino lacte potum. Fit autem

*Electarij* autem hoc modo. Accipe nucleorum pineo-  
rum vncias tres: nucis Indicæ recentis vncias  
duas: pistaciorum fescunciam: seminum melope-  
ponum, cucurbitæ, cucumeris, papaueris albi,  
maluæ, singulorum vncie dimidiæ: corticis ar-  
boris thuris, drachmas tres: margaritarum, cor-  
ralliorum amborij, fantulorum alborum, singu-  
lorum sesquidrachmam: succi glycyrrhizæ dra-  
chmas duas: baccharum iuniperi drachmā vnam:  
gummi Arabici fescunciam: terræ Lemniæ drach-  
mas sex: succi baccharum halicacabi, portulacæ,  
singulorum vncias sex. diluci violarum vncias  
octo: spissamenti est seminum malorum coto-  
neorum, aqua violarum maceratis, vncias sex:  
Serapij violacæ vncias quatuor: de floribus  
nymphææ, de papauere, cuiusque vncias de-  
cem. Quæ terenda sunt, conterito, deinde  
commixtis omnibus secundum sepiariarum  
regulam, electarium facito: quo vitor, vt  
antè diximus.

PINORVM ERVCAE.  
CAPVT II.

Itis qui erucas pinorum hauserint,  
illico dolor in ore & palato exoritur:  
vehemens alui, linguæ, ac stomachi, in-  
flammatiō torquet: intestina dolor ex-  
cruciat, ita vt pruriginē sentire videan-  
tur: corpus torum exæstat: fastidium  
vrget. Quibus est succurrendum reme-  
diis, quæ denotatis cantharidibus dan-  
tur. Peculiariter tamē pro simplici oleo  
& irino, melinum, quod ē cotoneis po-  
mis & oleo temperatur, accipimus.

BUPRESTIS. CAP. III.

Qui buprestin biberunt, non dissi-  
mile nitro virtus sapiūt: stomachi, ven-  
trisq; vehemens dolor insequitur: tam  
venter quā stomachus mirum in mo-  
dum, vt in aqua inter cutem, diffilatus,  
inturgescit. vniuersa corporis facies cō-  
tenditur: vrina suprimitur. Quibus ca-  
dem, quæ potis cātharidibus auxiliā-  
tur. Priuatim post vomitus, & vacua-  
tiones, quas clysteribus molimur, ari-  
dæ ficus profunt: item earum deco-  
ctum, ex vino. Vbi verò iam ferè peri-  
cula inclinantur, Thebaicarum palmu-  
larum cibo, aut earundem critarum in  
mulso, aut lactis potu, iuuantur. Pyro-  
rum etiānum omne genus esse, & lac  
humanum bibere, conuenit.

DE BUPRESTIVS, & pinorum eru-  
cis superius libro secūdo satis differuimus, quā-  
tum ad earum historiam attinet: nunc harum  
vim veneficam prosequimur. Hæc igitur ani-  
malia est pota, aut aliās in ventriculum inges-  
ta, quædam symptomiata, & incommoda pa-  
riant, ab his planè diuersa, quæ ab epotis can-  
tharidibus inferuntur, tamen & ipsa eandem  
expetunt curationem, eadēque postulant me-  
dicamenta, quibus in epotis cantharidibus vri-  
mur. Verū aduersus hæc quoque nonnulla  
propria, peculiariāque habentur antidota, quo-  
rum cum latius meminerit Dioscorides, non est  
cur nos de iis plura dicamus.

SALAMANDRA. CAP. IIII.

Si Salamandram hauserunt,  
linguæ inflammatio cōsequitur: mens,  
& sermo prædeditur: tremor cum tor-  
pore, aut horrore quodam, ac exolu-  
tione accedit: partes nonnullæ corpo-  
ris liuoribus circumquaq; sugillantur:  
sapeq; diutius immorante veneno pu-  
trefcentes desluunt. Quibus præstabi-  
mus cuncta, quæ potis cantharidibus.  
Peculiariter verò remedia, resina pinus,  
aut galbanum ex melle linctum, & aiu-  
gæ decoctum, in quo nuclei pinei con-  
terantur: vrticæ quoque folia, cum li-  
liis & oleo decocta. Profunt etiam oua  
testudinis marinæ, aut terrestris cocta:  
item ranarum ius, cum quibus cryngij  
radix incocta sit.

Non solum veneno inficit, & necem ad-  
fert Salamandra sicca, & in puluerem pota, vel dra Gene-  
clam cibis admixta, sed etiam morsu, viperarum sic natu-  
modo, cæterorumq; serpentium venenum eia-  
culantium. Quin & fructus, & herbas inficit  
tum salua quadam, tum mucosa specie, quæ ē  
toto eius corpore sudat, magno degustantium  
discrimine: siquidem pleriq; reperti sunt, qui  
hoc tantum veneno perire. Proinde mirū non  
esse videtur, si recentiorū quidam tradiderunt,  
integras quodq; interiisse familias: quod aquas  
bibissent in quorū puteos forte Salamandra ce-  
ciderat: vel quod panē tantum comedisent fur-  
no incoctum, qui lignis ea infectis concaluerat.  
Quibus tamen non vsquequaq; credendū exi-  
stimo, cum ignium vi venena omnia absumun-  
tur. Sed potius adipsaludum fuerit Plinio, quā  
lib. x x i x. cap. i i i i. non ex pane furnis in-  
cocto, in quibus ligna salamandræ veneno in-  
fecta, accessu fuissent, quosdam iam fuisse necatos  
prodidit, sed ex panis crusta lignis inasata pede  
tantum salamandræ contactis, vt eius verba

resistant, cum inquit. Inter omnia venenata salamandra scelus maximum est. Cetera enim singulos feriunt, nec plures pariter interimunt, ut emittant, quod perire conscientia dicuntur homine percussio, neque amplius admitti ad terras. Salamandra populos necare imprudens potest: nam si arbori inest, omnia poma inficere veneno, & eos qui ederint, necat frigidum, nihil acronito distans. Quinimo si contactu ab ea ligno vel pede, quo crulla panis incoquatur, idem veneficium est, vel si in puteis cadat. Quippe cum salina eius quacunque parte corporis, vel in pede imo resperisa, omnis in toto corpore defluat pilus. haec sentit Plinius. His igitur, qui hauserint (vt Aëcius est author lib. x. r. r.) præter ea quæ à Dioscoride scribuntur, maculae in totum corpus exoriantur atque, deinde vabeat, postremo nigrae, quæ tandem putrescentes, vniuersum deglabrant corpus. Sic venenatis succurrit (vt Dioscorides ait) iisdem remediis, quæ ad cantharidas præstant. Quod tamen aliquibus minimè videtur rationi consonum. quandoquidem cum salamandra venenum maximè frigidum, humidumque sit, cantharidum contra calidissimum, & exiccans, nullo quidè pacto consentaneum censent, quod iisdem vtrisque succurratur medicamentis. Verum his illud rectè, mea quidem sententia, responderi potest, quod vbi Dioscorides salamandras cantharidam commendat medicamenta, de generalibus, quæ in vniuersum sunt, duntaxat intelligit, nempe ut quam cito fieri possit, venenum è ventriculo, & intestinis extrahatur crebris vomitionibus, & clysmatis acrioribus in cordisq; presidium dantur theriaca, Mithridatium, aliæque generosa antidota, quæ pota cor ipsum à venenatis omnibus tuerent. Siquidem in cantharidum capite, quod omnium primū habeatur, generalis methodus Dioscoridi tradenda fuit, ne eadem per singula capita sæpe frustra & inepte repetere tur. Quare scitè cum ad cantharidum remedia legentes reiecit de generalibus tantum intelligit. Autem na eandem salamandris adhibet curationem, quam opio, quod tam hoc, quam illa frigidissimo sine temperamento. præsertimque cetera theriaca, Mithridatis antidotum, resnam teretechinam, hyracem, vtrique semen, & cupressi frondes. Ceterum quoniam salamandra sui corporis forma stellionis mortiferi etiam morsus animalia mihi in mentem reuocauit, cum eorum peculiarem mentionem non fecerit Dioscorides, non alienum fore diximus, eorum primum historiam describere, deinde venenati morsus remedia in medium adducere. Sed an lacertarum generi legitime stelliones adscribi possint, profecto non ausim decernere: quamquam non desunt, qui asserant, maiores lacertos, quos vulgo appellamus Ramarri, alij Liguri, alij verò Luceri, veros esse stelliones. Quorum tamen sententia non possum subscribere, quandoquidem Plinius lib. x. r. cap. x. v. & x. x. v. i. Stelliones inquit esse lacertarum fi-

*Salamandra venenata*

*Stellionis*

gura, & chamaeleonum quodammodo naturam habere, vt qui rore tantum viuunt, præterque araneis. Ex quibus fateri licebit, stelliones non esse nostrates lacertos, nãq; hi cochleas, cicadas locustas, & papilionis deuorant, & id genus animalia. Ad hæc copiosius in venis continent sanguinem, & amplo referri sunt secinore, hominibusque haudquaquam inimicantur, quin potius eos amant. Contra verò illi adgerantur stelliones, Plinio auctore libro x. x. cap. x. vbi nullū animal fraudulenter insidare homini tradidit. Præterea (vt idem eodem loco scribit) stelliones hyemant in domibus in locis ostiorum, & fenestrarum, aut cameris, sepulcris, quapropter venatores obseruant cubile eorum æstibus. Ibi vere incipiente fassis harundinibus textas opponunt casus decipularum modo, quarum angustias etiam gaudent. Venantur autem eos, vt eorum senectia, qua vt serpentes quoniam exuuntur, facillè consequantur, quod nihil ei remedio in comitialibus morbis præstat: rex more enim exutam senectia illico deuorant. Hinc igitur sine perspicuum fuerit, stelliones à maioribus Italicis lacertis differre: hi siquidem in cæpistris, in frutetis, sepibus, & maceris degunt, illi verò in sepulchris, & domibus nostris oberrant. Proinde iubet Dioscorides, vt qui in venenorum timore versantur, & culinarum subdiali loca apparare nequeat, sub tecto apparent. Sed tū diligenter laquearia antmauertenda, quod frequenter à superioribus contabulamentis animalia decidunt, exigua quidem, sed quæ non modicam perniciem molantur, vt phalangia, stelliones, & alia quædam reptilia. Quod autem stelliones in Italia proueniunt, testis est Aristoteles lib. v. r. r. cap. xxix. de historia animalium, æfferens in quibusdam Italiæ locis stelliones morsu homines perigere. Sed quid sit, nullam habeo historiam clariorem. Quanquam his coniecturis iandiu existimauerim ea lacertarum genera esse stelliones, quæ in Hetruria in nostris morantur domibus, præsertim quibusdam prope terram foraminibus, à nobis vulgo Terranola appellat, de quibus superius libro secundo latius diximus, de lacerta Calcidica differentes. Quandoquidem hoc animal lacertis persimile visitur, & araneos maximè vgnatur, vt Plinius inquit, item Aristoteles lib. r. x. cap. r. de historia animalium. Dorsum præterea maculis quibusdam nites stellatum modo radiantibus, vnde & fortasse nomen. Quinetiam quod venenum nostris relinquant, cum è cameris exeat, statim in Hetruria necatur. Hæc (vt audio) abundat Syria in caminis portus, quam alijs commorantibus. Varia sunt hæc huiusmodi animalium genera, de lacerta, chamaeleonibus, stinxis, crocodilis, stellionibus, & salamandris loquentes: quippe quoniam in vnoquoque horum genere habentur differentie tū forme, tum coloris, tum magnitudinis. Obseruauit ego salamandras in quibusdā Germaniæ syluis vniuerso dorso nigerimas, pectore

pectore verò, & ventre admodum rubentes. Sunt & in Vinentibus aquis degentes, cauda angustarum modo lata, & rotundo rostro, alio admodum rubente, nigricante dorso, nullis maculis resperso. Quod etiam scincis euenit: nam & hi in Italia habentur Vicentino agro, parui & nigricantes, iis vique ab similes, qui ab Alexandria Aegypti Venetias comportantur. Sicuti & in Arabia laeetæ sunt bicubitales. In Nisi Indis monte x x i i i i. pedum longitudine reperiuntur. Et in ea fortunatarum insula, quæ Capraria nuncupatur, magnæ admodum, & copiosæ. Sed vt ad stellionem iam nosse redeat sermo, eorum moribus succurrendum est theriaca, Mithridatis antidoto, & aliis, quæ in vniuersum venenosorum animalium moribus opitulantur. Imponuntur priusimò maximo præsidio, demorosis iam locis contiti scorpiones. Proinde oleum nostrum de scorpionibus, de quo abunde in prima huius commentatione diximus, iis præcipuum fuerit antidotum. Si verò quis venenum hoc in potu cibove sumpsit, primum tum vomitione, tum clysteribus extrahendum erit: mox valentioribus antidotis cordi succurrendum. Illud postremò non ignorandum est, quod (vt Plinius inquit) ex stellionibus fit malum medicamentum: nam cum stellio immortuus est vino, faciem eorum, qui biberint, lenigine obducit. Ob id in vnguento necant eum insidantes pellicum formæ. Remedium est oui luteū, & mel, ac nitrū.

EPHEMERVM.

CAP. V.

**Sympto** ephemero, quod aliqui Colchicon, aut syluestrem bulbum appellant, pruritus in toto corpore excitatur, non secus atque iis, qui vrtica, aut scilla laceffuntur: interna rosionem sentiunt: stomachus cum ingenti grauitate exstuat. cæterum inualefcence morbo, cruor strigmentis admistus, per aluum exigitur. Quibus, vt iis qui salamandram hauserunt, vomitione aut clysteribus auxiliari conueniet: sed antea quam venenum inualefcat, dandum est decoctum frondium quercus, aut glandium, aut malicorij: lac bibere prodest, in quo serpyllum sit decoctum item succum sanguinalis herbæ, aut ramorum vitis, aut rubi, aut medulla recentis ferulæ, aut myrti cum vino. Bacæ autem myrti rusæ tritaq; & aqua macerata, vt liquor inde sumatur, opè ferunt. Media castanearum tunlicula, similem effectum præbet, si cruda in aliquo supradictorum succo sumptiretur:

origanum quoq; cum lixiuio epotum, eximiè iuuantur asinini lactis, aut bubuli calidi potu etiam si in ore contineant: ita vt quibus copia lactis huius adfit, non aliud desideretur.

**Colchici** Ephemeri historiam picturamque reddidimus libro quarto, vbi et attulimus, quæ in ipso consideranda nobis occurrerant. Eius autem veneno medendi rationem hoc loco adeò diffusè tradidit Dioscorides, vt plura ab aliis, qui post ipsum clauerunt, consequi nihil non liceat. Danda igitur opera est, vt primum (quod in aliis quoq; sepeuenor dictum est) crebra vomitione, & clysteres suum præstent auxilium, deinde propria antidota exhibenda sunt, præsertim humanum lac, asinum, bubulūque. Nec tamen omittenda, quæ in vniue sum omnibus venenis resistunt, de quibus iam sepius diximus. Sed quoniam inter venenata recentur Anacardiæ sic Mauritanis vocata, forma ephemero quadantenus proxima, quantum colore dissimilis: itemque Staphis agria, quæ & perniciofa habetur, & eiusdem ferè cum anacardiis temperamenti, cum hæc Dioscoridi prætermissa videantur, sintque medicamenta, quibus quotidie ad varios humani corporis morbos vntur medici, ab instituto nostro desecisse putarem, nisi horum quoque natura veneficæ propria assignassem remedia. Præsertim cum sæpe contingat, quod hæc medicamenta (quæ crassa quorundam circumspectorum ignorantia est, qui non modò non mederi, sed vix etiam legere sciunt) propinantur, nullis seruatis ponderibus, nec mensuris, nullisque additis medicamentis, quæ illorum vim maleficam frangant: unde nonnunquā miseri ægrotantes in tam magna incidunt discrimina, & tam seuæ sequantur symptomata, vt nisi postea à peritis medicis remedia & antidota adhiberentur, facile deperirent: id quod plurimis euenisse scimus. **ANACARDIA** igitur tam in potionibus hausta, quam alias ingesta præter quàm quòd fauces, guttur, & ventriculum iurant, & rivos adeò vniuersum exaltescunt corpus, vt inde febres orientur, excitant & paralyfim in quibusdam corporis membris, & ratiocinaricem facultatem corrumpunt, quod sua calorisca vi aerum succum exurant. Quibus sit succurrendum, facili antea vomitionibus ac clysteribus, oleo amygdalino dulci, aut è pineis nucleis, aut è nucibus Indicis, aut è papaueris semine, aut recenti butyro, & bubulo lacte. Dantur hæc affam in potu, magno sanè iuuamento. Quin & alia pinguium medicamenta conueniunt nempe pinguium carnum iura, suillus, & aseruius adeps liquefactus, quadrupedum, & volatiliū cerebrum, & ossium medulla. quandoquidem his amplissima inest facultas (vt pluries diximus) qua venenosum calidorum omnium feruor extinguitur, recunditurq; acrimonia.

Ephemer  
Veneni cu  
ratio.ANACAR  
diæ vni  
veneni signa  
& curatio.Stellionem  
morbus re  
mediis.

10

20

30

40

50

Præterea

Præterea iis auxiliantur omnia, quæ suapte natura refrigerant, vel quæ arte fuerint refrigerata. Proinde Auicenna Anacardiorum feruori extinguendo cæteris prætulit bubulum lac ace-  
scens, violaceum oleum, & hordeaceam pristinam, prius tamen glacie, vel niue frigidatam. Veruntamen proprium Anacardiorum antidotum sunt Iuglandes, & pinorum; nuclei aliquan-  
tilper torrefacti. Cæterum *STAPHIS* *AGRIA*, anacardiis (vt paulò superius diximus) temperamento respondet, quòd admodum calida sit, ac vrens. Quare eadem sanè adfert incommoda, quæ anacardia, & cantharides. Adurit enim fauces, & palatum, vomitiones commouet, ventriculi erosiones facit, & dysentericos fluxus ciet, postremò strangulat, nisi statim succurratur. Sed cum hæc sua sponte & propria facultate vomitiones molitur, non aliter est prouocandus vomitus. Verùm animaduertendum est, an ipsa reiciatur, quod ubi non euenierit, dulce amygdalinum oleum in potu fuerit dandum, admissio hydromelicis plurimò; atque interim cogantur ægri, vt continuo inambulent, namque hoc tantum medicamento valentissimè per vomitum exigitur. Nec tamen ob id negligantur clysteres, quorum pluries meminimus, vt si rarentum ipsius aliquod ad intestina descendit, his extrahi possit. Reliquum verò curationis fumatur è cantharidum curatione, non omisissis vniuersalibus antidotis.

*Staphidia*  
*agria no-*  
*xa, & tu-*  
*ratio.*

## DORYCNIUM.

## CAP. VI.

DORYCNION, quod aliqui manicon solanum appellant, epotum, lactis saporem in gustu refert: continentes singultus ciet, hemor linguam vexat, sanguis consertim reicitur: mucosa quædam perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaque antequàm aliquid ex iis eueniat, auxilio sunt antedicta, vomitus, clyster, & quæcunque potum venenum expellere possunt. Priuatim iis opitulatur, aqua mulsæ, lac caprillum, aut asininum, dulce vinum, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdalæ amaræ, gallinæ pectora decocta, quinetiam conchyliæ omnia, tam cruda quàm tosta esse, salutare est. conueniunt & locustæ marinæ, & gamma-  
ri, & pota eorundem iuscula.

*Dorycnij*  
*Generis co-*  
*sideratio.* DE DORYCNIO satis differuimus libro quarto, quantum quæ nostra esset de eo sententia, ingenuè dicendum erat. Hoc tamen loco non tacebo, quòd idem esse non arbitror Dorycnium, & manicum solanum, quandoquidem duobus capitibus libro quarto, de his tanquam

de diuersis differuit Dioscorides. Verùm enim uero etsi hoc in loco dixerit is, reperiri quosdam, qui Dorycnium manicum solanum appellant, non tamen id esse verum asserit, sed aliorum tantum refert opinionem, quam nec probandam censet. Cæterum Solano manico veneficam vim inesse constat, vt pote quod eos, nisi veneno, qui ipsum hauserint, maximè efficiat incommodis, vt ipse Dioscorides testatur loco citato, *Solanum*  
*veneni*  
*Generis*  
*noxa,*  
*& cura.*  
quòd inquit. Solani manici radix drachmæ vius ponderare pota ex vino, facit species vanas, imaginæque non inuicundas obuersari: sed duplicatus hic modus, ad tres vsque dies mentis alienationem adfert: quadruplicatus verò interimit. Remedio est aqua mulsæ copiosius pota, & vomitione reiecta. Has perniciosas facultates, earumque remedia loco dicto reddidit Dioscorides Solano manico: cuius tamen hic inter venenatas plantas postea non meminit. Ibidem libro quarto non aliam vim maleficam Dorycnio assignauit Dioscorides, quàm quòd copiosius haustum morem adferat. Hinc itaque conicere ausim, quòd eadem vtrisque medicamentis facile competere possint. Dorycnium Auicenna vnum vulpinum vocat, nec tamen plura de eo resultat, quàm scripserint Dioscorides, & Paulus. Idcirco hoc in negotio à Dioscoride minime discendum erit, nec ab iis præterea medicamentis, quæ a nobis inferius in opij curatione describentur.

## ACONITUM.

## CAP. VII.

ACONITUM statim in lingua interbibendum, cum adstrictione quadam dulcescit: & subinde, potissimum cum exurgere conantur, vertigines offundit: lacrymas ciet: grauitatem pectori, & præcordiis adfert, simulque crebri spiritus desistant. Quare venenum vomitione abigi, aut clystere per aluum egeri opus est. Vtimur inter propinandum, origano, ruta, marrubio, vel absinthij decocto, cum vino absinthice, vel serperuino, vel abretono, chamæla, aut aiuga. Prodest etià mnum opobalsami drachma, cum melle aut lacte cum castorio, pipere, & ruta, aquis ponderibus ex vino, coagulum hædi, leporis, aut hinnuli cum aceto: ferri quoque stercus, item vinum in quo aurum, ferum, argentumve cædens restinguatur, potum: lixiuque cum gallina, & vino decocta, aut carniū bubularum præpinguium iura, cum vino sumpta. Fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire.

*Aconiti* TAM ET SI plura sint, vt superius libro  
*Generis* quarto retulimus, Aconiti genera: nempe tria,  
*federatio.* quæ cynochona, lycostonaq; appellantur, &  
 quartum pardalianches vocatum, quæ omnia  
 veneficam vim fortuntur, vnam tamen, & ean-  
 dem exposcit curationem. Refert Aërius, præ-  
 ter Dioscoridem, eos qui hauserit, post dulce-  
 dinem, & adstrictionem amaritudinem perci-  
 pere adstringuntur deinde maxillæ, subsequen-  
 tur morbus, & erosiones stomachi. Quibus nisi  
 illico succurratur, caligant oculi, & subruenti  
 visuntur. Oboriuntur tremores, corpusq; vni-  
 uersum intumescit, fiuntq; ægri hydropicis si-  
 miles. Medendi ratio à Dioscoride petenda: qui-  
 pe qui vsque adeo præstantia descripsit medica-  
 menta, vt Aëcio. & Auicennæ plura non reli-  
 querit addenda. Attamen Conciliator Aponen-  
 sis, qui inter recentiores de venenis luculenter  
 scripsit, aconitum bibentibus sphragidem Le-  
 mniam commendauit drachmarum duarum pon-  
 dere ex calida potam: dein vomitum excitari  
 iubet à vomitu theriacam eodem pondere ex-  
 hiberi, ex vino in quo incocta fuerit gentiana.  
 Atque adeo putat Aconiti præcipuum esse an-  
 tidotum longæ aristolochiæ radicem. Cæterum  
 dum hæc scriberem, mihi in mentem venit nõ-  
 nunquam inter venenatas plantas haberi scillã,  
 flammulam, vrticæ, & dracunculi semen, quæ  
 cum hic silencio prætermissa fuerint à Diosco-  
 ride, optimum institutum esse putauit, nunc de  
 singulorum veneno, eiusq; remediis nonnulla  
 commemorare. Sunt igitur in SCILLARVM

*Scilla Ge-  
 nerosæ no-  
 xa, & cu-  
 ratio.*

generis, quæ suapte natura venenosa proue-  
 niunt: sunt etiam contra quæ nullo imbutæ ve-  
 neno in medicum veniant vsus. Hæ potæ, vel  
 aliis ingestæ, nullam pariunt noxam, nisi earum  
 plus, quam par sit, assumatur. Illæ verò sua ma-  
 lefica vi, ethi quam parce deuorantur, illico ra-  
 men hominem torquent, quemadmodum fungi.  
 Venenosa autem scilla (vt Mesues, ac cæte-  
 ri Mauritanorum tradidere) sola nec alteri an-  
 nexa prouenit, locisq; oboritur sedis, ac gra-  
 uolentibus, vt apud thermas. Distant igitur di-  
 ligentissimi seplasiarij iis vt scillis, quæ simul  
 conascuntur, sapore amaro, acri simul & dulci,  
 splendentibus vndiq; laminis. Quandoquidem  
 nulla his facultas inest, quæ corpus lædi possit:  
 nisi fortasse, vt dictum est, plus earum assu-  
 meretur, quam ferre possit natura. Quamobrem  
 de his differens Auicenna inter venenatas plan-  
 tas seu septima quæri voluminis, sic inquit.  
 Scillæ malæ, aut probatæ longior vsus, quam  
 par sit, ventriculū exulcerat, & intestina, ipsasq;  
 mæstacæ venas, aliosque meatus, qui è ventri-  
 culo in iecur permeat. Quo fit, vt in visceribus  
 oriuntur punctiones, acutiq; cruciatus, & inde  
 dysenteria. Quibus incommodis succurritur  
 lactis potu, in quo ferrum, quod Graeci stomo-  
 cha, nos verò chalybem appellamus, pluries re-  
 finctum fuerit, deuoratisq; ouorum vitellis, in  
 aceto decoctis. Quincient iis friza cibaria con-  
 ferunt pinguis carnum iura, recens, crudumq;

butyrum, & extrema iuuenum quadrupedum  
 membra, aliâq; permulta de quibus lacus egis-  
 mus, cum de cantharidibus seimo haberetur.  
 Nec minora facit incommoda FLAMMVLA  
 vocata, cuius historiam scripsimus libro quarto  
 in alterius elematidis mentione. Ipsa enim præ-  
 ter venenosam, quam possidet facultatē exal-  
 facit ordine quo, adeo vt valentissimè cor-  
 pus exulceret, vbi fuerit imposita. Ingesta verò  
 fauces, guttur, ventriculum, & intestina magnis  
 afficit ardoribus. Quin & intolerabilem excitat  
 sitim, & aridam reddit linguam: intestina deradit,  
 & ardentem pellit vrinā. nam quandoque tam  
 altè excoriatur, vt erosus vasorum tunics, mictū  
 sanguis reddatur intolerabili sanè dolore. Ad  
 hoc facit, auxiliaturq;, excitatis prius vomiti-  
 bus, & clysteribus infusus, lac bubulum suo cum  
 butyro potum, aut alio recenti admistum, item  
 amygdalinum oleum, aut e pineis nucleis, aut  
 Indicis nucibus, aut papaueris semine expres-  
 sum. Quippe (vt iam sæpenumero diximus) hu-  
 iusmodi acutorum curatio, non est aliunde  
 petenda, quam à pinguibus, & seminum quo-  
 rundam crassamentis præstat hoc in negotio &  
 iecur fouere, lactucæ, portulacæ, & intubi hoc-  
 tensis succo: item sanialis aqua rosacea inacerata  
 sitis: quin & haliacabai baccas deuorare prodest.  
 Quod si cruenta cum lorio reddantur, illinan-  
 tur statim renes, pubes, testes, & ipsa demū vi-  
 rilia, rosarum, polygonij, plantaginis, cynoglos-  
 si, papaueris, lactucæ, & hyoscyami succo. Opit-  
 ulantur etiam clysteres è bubulo, aut caprino  
 lacte, aut è pinguibus carnum iustulis infusi,  
 addito rosaceo, & vino è myrtinis bacis con-  
 fectis, vt diffusus in cantharidum curatione re-  
 tulimus. Sequitur VRTICÆ SEMEN, id præ-  
 fertim, quod lini semen refert, quo exciandæ  
 veneris gratia quidā vtuntur. Sed cum & ipsū  
 in medicum veniat vsus, quæ etiam quorundam  
 cibis admisceatur, animaduertendum est, ne  
 largius ingeratur, præsertim solum, sed iis ad-  
 diat cibus, vel medicamentis, quæ eius acri-  
 moniam excedentemq; feruorē obtundere, &  
 extinguere queūt. cuiusmodi sunt pistacia, nu-  
 clei pinci, dulces amygdalæ, nuces Ponticæ, &  
 priuatim deglubitum sebum semen. Nam cum  
 vrticæ semen affatim deuoratur, non solum (vt  
 Auicenna est author) omnes scillæ males præ-  
 bet effectus, sed priuatim etiam continentem  
 excitat rufum. Curatio cadē quæ scillæ, verū  
 ad finiendam tussim, quæ priuatim ex vrticæ  
 semine prouenit, ea non sunt omittenda, quæ  
 suapte natura pectoris asperitates mulcent: qua-  
 lia sunt amygdalinum oleum, serapiū violae-  
 ceum, & ex zizyphis, saccharum quod candi-  
 tum vocant, diatrachacanthum frigidum, hor-  
 deacea ptiſana saccharo inspersa, & id genus  
 alia. Præstant præ cæteris (vt scribit Concilia-  
 tor) ad eptorum vrticæ semen, malorum cydo-  
 niorum semina contusa, & ex calida aqua po-  
 ta. Calidissima potior, acerrimæq; facultatis  
 est etiamnum DRACUNCULI semen, vt. m. d. s.

*Flammula  
 la Generis  
 mæx. &  
 curatio.*

*Vrticæ se-  
 minis no-  
 xa, & cu-  
 ratio.*

*Dracuncu-  
 li semini-  
 ta. Calidissima  
 potior, acerrimæq;  
 facultatis*

pote quod potum, aut in cibis sumptum, gurgur asperitate afficiat, adurat, ac pungat: linguam item, gingivas, & dentes vexat: quin & corpori vniuerso ingentem calorem inducit. His noxiis auxiliatur recens buryum haustum. Priuatim tamen præcipuum remedium adfert hordeacea farina in pulmentum conformata, additis pinidiis, aut saccharo, amygdalino oleo, vel recenti buryo.

MEL HERACLIAE.  
CAP. VIII.

MEL IN Heraclia Ponti, vbi aconitum gigni solet, inuenitur. quod qui edunt, bibuntque, non secus affligitur, quam qui aconitum ebiberunt. Iis eadem, quæ poto aconito conueniunt. Adiunantur in primis continuo vini 20 mulsi potu, cui rutæ folia sunt adiecta.

MELLIS Heracleotici historiam, & vires fusius libro secundo retulimus. Quo in loco tradidit Dioscorides (cui id postea hic silentio inuoluerit) eos mente abalienari, ac sudore diffinere, qui illud comederint: remedio autem esse rutam escitatum, & salsamenta, aut epotum mulsum. Sed cum iandiu in Italiam non adferatur, ideo nec curæ eius insilendum est, præsertim quod eandem cum aconito venenatam sotiatur facultatem, & curationem.

CORIANDRVM. CAP. IX.

CORIANDRVM ob odorem latere non potest. epotum autem vocem exasperat: infaniam adfert, à temulentius non obhorrentem. qui sumperunt, pu- 40 denda dictu blaterant, totiusq; corporis odore, venenum fatentur. Quibus post vomitionem irino oleo concitata, vti retulimus, merum, & per sese, & ex absinthio potum auxiliatur: itent oleum: nec fecus oua in eodem exinanita, si liquefacta in muria forbeantur: 50 & epota muria, & ius salsum ex gallina, & anfore: passum quoque cum lixiua sumptum.

DE CORIANDRO libro tertio abunde disputauimus. Et quia non solum de facultatibus coriandri, quæ humano corpori prodesse possunt, controuersia est inter auctores medicinz, sed etiam de iis, quæ eidem officere possunt, idcirco loco antedicto quid de prima difficultate sentirem, & cui potissimum adhæressem, dixi. Ceterum de secunda difficultate

nunc equidem secus sentio, atque olim. Aliis enim multorum sententiam secutus, coriandrum ab vsu prorsus abdicandum esse scripsi, quod omnem eius vsum nocuū esse existimarem. Nunc verò eius vsum tantum immoderate (quod ita mentem commoueat, & mortis periculum adferat) euitandum censeo idq; non leuibus, vt puto, rationibus. Quas quoniam libro superius citato retulimus, ideo ab eis hic superflue debemus, & ad remedia accedemus. Iis igitur, qui Coriandrum largius sumperint, præter illa quæ à Dioscoride produntur, opitulatur theriaca ipsi ex mero potasquin & herba vincecoxicum vulgò vocata, de qua libro tertio scripsimus in Asclepiadis mentione: namque hæc proprium coriandri antidotum est. Subueniunt præterea raucedini, vociq; exasperatæ gargarizationes ad id expertæ: item ea, quæ pectori conueniunt. Ad cerebri verò noxam præstat d'amoschum, & diambaram, & id genus alia, quæ cordi, & cerebro auxiliantur.

Coriandri  
Genere  
media.

PSYLLIUM. CAP. X.

PSYLLION epotum, corpori toti frigus, & torporem cum exolutione, & mœrore quodam adfert, ita vt animum despondeant. Cui omnia, quæ exhan- 30 slo coriano auxiliantur.

PSYLLIUM, & eius semen, cuius in pharmacopoliis frequens est vsus (vt superius libro quarto diximus) notum omnibus est. Hoc in portionibus hausto præter ea, quæ à Dioscoride illi assignantur indicia, consequitur anhelitus difficultas, alui tumor, & tanta denique cordis anxietas, vt plerumque oborto sudore frigidò commoriantur agri. Curantur qui hauserint, primùm vomitionibus, & clysternis. Post hæc antidota illa exhibenda sunt, quæ in vniuersum omnibus venenis aduersantur. Sed & ea omnia iis maxime subueniunt (vt Dioscorides est auctor) quæ & iis, qui coriandrum exhauserint.

Psylli Ge-  
neris  
curatione.

CICUTA. CAP. XI.

CICUTA pota vertiginem excitat, oculisque caliginem offundit, ita vt ne minimum cernatur: singultus ciet, mentem turbat, extremi artus gelantur: denique conuulsi, suppresso arteriarum spiritu, strangulantur. Quare inter initia, vt in reliquis, cicutam vomitu, excutimus: postmodum deiectionem molimur, vt quod ad intestina prolapsum sit, excernamus: tum demum in meracam 60 pote

Coriandri  
Genesi  
naturæ.

portionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus. repetendum per interualla, in quibus proderit, lac asinum, aut bubulum potui datum, vel absinthium cum pipere & vino, castorio, ruta, mentha cum vino, aut amomi, cardamomi, aut styracis vicia, aut piperis, cum semine vrticæ, & vino, aut lauri folia. Item laser ex oleo, & passio, & passum per sese largius potum proficit.

*Cicutæ & nescia vni.*

CICUTÆ historiam, & facultates, quibusque in locis magis exitialis proueniat, ita copiose retulimus libro quarto, vt opus non sit, ea hoc loco repetere, nec plura nobis restent addenda. Sed iam ad vires eius veneficas transiendum est. Poti hæc, vel in cibis sumpta (vt Dioscorides inquit) vertigines excitat, visum adimit, oculis caligine obsita, & mentem vsque adeo perturbat, vt in furorem agi videatur, qui hauserint. Quæ omnia experimento nobis

*Historia cuiusdam casus.*

comperta sunt. Quippe cum rusticus quidam magnifici Ioannis à Turri vinitor non longè à Goritæ arce suas coleret vineas, ligone forte fortuna erutis cicutæ radicibus, secumque domum delatis, pastinacæ radicis loco decoxit, eo meditare in cœna vna cum vxore: mox statim (quæ rusticorum consuetudo est)ambo iuere cubarum. Media autem nocte, à somno expergefacti, omni penitus amissa ratione, huc atque illuc per domum in tenebris vagabantur, amentia, & furore ducti: vnde adeo caput, faciem, & oculos in parietes percusserunt, vt mane accurrentibus vicinis, partim percussionibus tumidi, partimque effuso sub cute sanguine liuentes, tumebantibus admodum oculorum palpebris, horrendam ac monstruosam ostenderent faciem. Vocor ego statim ad curam, percontatusque domesticis, quibus edulcis in cœna victi-  
cassent, reperi hos cicutæ effuisse radices, quas pastinacæ esse crederant. Quandoquidem mihi in propinquam vineam adueni, ostenderunt alij locum, vbi rusticus ille radices effoderat, ibique inueni alias cicutæ radices, quæ iam folia emittere incipiebant. Qua re perspecta celeriter ad agros redij, quos quidem non multo post tempore, Deo adiuvante, in pristinum mentem & sanitatem restitui. tametsi percussio num curatio multo longior fuerit, quam veneni. Decepta quoque hisce radicibus est superioribus annis quædam nobilis matrona à Coloretto Vinensis, quæ cicutæ radices proprio in horto effossas toti familiæ decoxit, præbuitque estandas carotarum loco. Quin etiam monachum Franciscanum curauimus, qui pluribus mensibus modo amentia, modo furore agebatur, quod cicutæ folia hortensis petroselinij vice piscium quorundam iusculis imposita comedisset. Caueant igitur omnes, ne in hæc veniant discrimina. Exhibet

Aërius, præter Dioscoridis antidota, cicutam haurientibus apij semen, ex vino potandum, aut iridis radicem, aut fesei Massiliense: item nitrum ex aqua copiosiore potum. Totum præterea corpus calefacere conducit, & præsertim præcordia, quæ morbum ad vehementiorem motum, ac cursum (vt ipse inquit) cogendi sunt ægotantes. Conciliator tamen theriacam maximopere commendat, duram drachmarum pondere, ex dictamini decocto potamur: gentianæ radicem ex vino. Nanque hoc cicutæ verum esse antidotum putat.

TAXUS.

CAP. XII.

SMILAX, à quibusdam tithymalum, à Latinis taxus appellatur. frigus vniuerso corpori, strangulatus, & celerrimè interitum infert. Cui eadem, quæ cicuta conueniunt.

TAXUS arbor, cuius historiam superius libro quarto retulimus, vbi & eius plantæ piscium adiecinus, non solum eos perdit homines, qui folia & fructus escitauerint, vel biberint foliorum succum, sed etiam (vt aiunt quidam) quadrupedum omne genus, quod præsumptum pabulum non ruminat: cuiusmodi sunt equi, asini, muli, & id genus alia. quanquam scribit Plutarchus, tertio symposiorum coenatario, Taxum eo tantum tempore noxiam, quo iam florere inceperit, quod succo sit maxime prægnans. Dioscorides libro quarto de taxo agens, inquit. Narbone tam præsentis est veneni, vt si qui dormiant sub ea, aut in eius vmbra subsideant, lædantur, & sepe numero moriantur. Id quod Sestius (auctore Plinio libro x. i. capite x.) in Arcadia quoque euenerit scribit. Vast etiam vitoria ex ea vitis in Gallia factis mortifera fuisse compertum est: & in Hispania lethales esse baccas. Proueniat bor hæc frequens in Tridencinis montibus, præsertim Ananiz vallis, & Elenarum, vbi ea inter ingentes abietum, picearum, pinorum, & laricum sylvas, numerosa conspicitur. Is in locis nobis compertum est, quod non modò iumenta, quæ non ruminant, deuorata taxo, moriuntur, sed etiam quæ ruminant, quandoquidem boues complures vidimus à rusticis deploratos, qui taxum de palti tuerant. Quapropter etiam in montanæ, syluosi que pascuis boues morbofi sunt, conclamant rustici, animaduertendum esse, ne Naxum degustauerint: ita enim taxum corrupto vocabulo nuntiant. Nihil minus eius baccæ iisdem in locis noxiæ ac perniciosæ deprehenduntur: quippe quod curauerim ex passiores, aliocumque in sylvis ligna exdentes, qui saporis dulcedine allecti, baccas ipsius comederant, ex quorum esu non modò in ardentis febres inciderant, sed & in alui profluium, adeo vt in maximo versarentur discrimine. Cæterum non parum dubitauit





*Carpasi.* QVODNAM hodie plantæ genus nobis  
*Es opocar* Carpasum dici possit, omnino fateor me igno-  
*pasi consi* rare: nec quinquā reperiri crediderim in Ita-  
*deratio.* lia, qui plura quā nos de Carpaso referre pos-  
 sit. Quandoquidem etsi hic inter venenatas  
 plantas illud descripserit Dioscorides, nusquā  
 tamen in præcedentibus libris quicquam de  
 Carpaso retulit, quemadmodū nec posseri tam  
 Græci, quā Arabes, ex quo coniectari possit,  
 quidnam antiquis fuerit carpasum. Hoc Paulus  
 10 Dioscoridē secutus lib. v. carpasum vocat.

*Vana quo* Quamobrē credere nonnulli carpasum, car-  
*rumdam* pepasum, & carpesū, de quo primo libro latius  
*opinie.* diximus, vnam & eandē esse plantam. Sed va-  
 nam prosus horū sententiam esse arbitror. Si-  
 quidem à nemine posteritatis memoriæ proditum  
 inuenitur, deleteriam vim vllam carpeso  
 inesse, verū eandē (vt Galenus, & Paulus tes-  
 tificantur) quē ipsi phu. quimmo ita aduersus ve-  
 nena commendari compertū est, quod Quintus  
 carpesum cinnamomi loco in theriacā ad-  
 20 dere non dubitauerit, quod tantū id præstare  
 existimauerit, quantū potest laudatissima cas-  
 sia. Verū si quis fortasse afferret opocalpa-  
 sum, de quo scribit Galenus, dum probatissi-  
 mæ myrrhæ notas expendit, lib. i. de antido-  
 tis, & opocalpasum hoc loco à Dioscoride de-  
 scriptū vnum & idem esse medicamentum, is  
 meo quidē iudicio, rem (vt aiunt) acu terigis-  
 set, quod opocalpasum Galeno mortiferum om-  
 nino sit & lethale. Licet idem Galenus non  
 30 opocalpasū, sed *hæc nupentæ*, hoc est, succi car-  
 pasi mentionem faciat tum lib. i. de compo-  
 sitione medic. localū, vbi ex Archigene ea recē-  
 set medicamēta, quæ capillos crispos reddunt  
 tū etiā lib. v. de cōpos. eorundem in quodā mo-  
 lari emplastro. Cæterū q̄ huius vsus, & noti-  
 tia apud omnes penitus exoleuerit, nō est cur  
 alia à nobis frustra de eo sit institueda curatio.

SARDONIA HERBA.  
 CAP. XIII.

SARDONIA ranunculi herbæ ge-  
 neri assignatur, quæ vescentibus men-  
 tem adimit, & quadā neruorū disten-  
 sione labia in rictū contrahit, vt risus  
 speciē præbeāt. à qua quidē affectione,  
 de Sardonio risu adagiū in vulgus in-  
 faulto omine manauit. Post vomitū pe-  
 50 culiariter conuenit aqua multa & lac,  
 liberaliū epota: irrigatio, perunctioq;  
 à pinguibus medicamētis, totum cor-  
 pus excafcientibus: in calidam aquā,  
 oleumq; descendant, sed tum multum  
 perfricare, & inungere expedit, & in  
 summa, curam omnē, quæ conuulsioni  
 neruorum adhibetur, exequi oportet.

QVOD inter Ranunculi genera ea annu-  
 meretur planta, quæ à Sardina, vbi plurima  
 nascitur, nonnullis vocatur herba Sardonis,  
 abunde docuit Dioscorides libro i. Tradidit  
 huiusce curationē Aëtius lib. x. i. i. qui præ-  
 10 ter ea medicamēta, quæ huic curationi à Dio-  
 scoride reddūt, declarat quibus auxiliis hoc  
 conuulsioni genus priuatim curari debeat.  
 Quippe cū diuersa sint conuulsionū genera,  
 diuersa etiā exposcunt remedia. Præter tamen  
 castoreū in puluerem contritum aut per se, aut  
 è dulci vino potum. Cæterum, vt Conciliator  
 est author, adiunātur qui hauserint Apium ri-  
 sum (sic enim Sardoniam herbā appellauerunt  
 Mauritani) vino dulci potentique adeo largē  
 epoto, vt inde ebrii facti diutius dormiant: itē  
 melissophylli succo, ex aceto sumptis: enim,  
 vt idem ait, Sardonis herbæ verū ac singulare  
 est antidotū. Sed quoniā (vt Dioscorides pro-  
 didit) in hac cura, balnea, & Iaconica admodū  
 20 profunt, & ea vitæ parandæ sunt medicame-  
 ntorum decoctis, quibus vis infit excafcien-  
 tum etiam desiccans, & quæ propria facultate  
 neruorum roborem, tum iuuent. Cuiusmodi  
 sunt, stæchas, hyssopum, saluia, ruta, beto-  
 nica, chamæpitys, amarus, origanum, calamintha,  
 pulegium, dictamnū, anthemis, satueia, aco-  
 rum, Syriaca & Cælica nardus, asarum, plu-  
 cyperus, rosmarinus, & id genus alia. Adhæc  
 præstat inungere occipitum, ceruicem, & vni-  
 30 uersam spinālē medullā, fusino oleo, aut è ca-  
 storeo, aut è terrestribus lumbricis, aut è casto,  
 aut ex hyperico, aut vulpino, aut vnguento ara-  
 gone, aut agripino, aut deniq; aliis his similib.

HYOSCYAMVS. CAP. XV.

HYOSCYAMVS potū, aut come-  
 sum, similem ebriis abalienationē mo-  
 40 uet: sed facili medicamentis cedit. Au-  
 xiliatur aqua multa copiosè data, lacq;  
 præsertim asininum: si id desideratur,  
 caprillum, vel bubulum, vel aridarum  
 ficuum decoctum. Faciunt ad id etiā  
 nuclei pinei, aut cucumis semē ex pas-  
 so sumptum, & vinū falsum, cum adipe  
 suillo recenti, passioq;: itidem vrticæ  
 50 semen, aut nitrum ex aqua, & intubus  
 erraticus, & sinapis, & nasturtium, ra-  
 dix, cepa, & allium: hæc singula cum  
 vino fumantur. Postea sinendi quie-  
 scere, quemadmodum qui vinum bi-  
 berunt, vt excoquant.

SVCVRITVR facili Hyoscyami no-  
 xia, cuius historiam cum Dioscoride tradi-  
 60 mus libro quarto, vbi eius quoq; effigiem de-  
 pinxit. *Hyoscy-*  
*mi vene-*  
*nosa vis.*  
 D d dimus.

dimus, si antea, quam venenosâ vis inualeſcat, superetq; corporis vires, conferentia propinen-  
tur medicameta. Sed præter indicia, quæ epo-  
to, vel comesto hyoscyamo à Dioscoride assi-  
gnantur, alia plura eidem reddidit Aetius lib.  
xiii. nempe quòd inſequatur iactatio corpo-  
ris cum diſtortione: quibus ſuccedit exolu-  
tio, animi deliquio ſimilis, oculorû rubor, pru-  
ritus, deinde tremor: præterea omnino delirât  
ægrî, & putât ſe flagris corpore cædi. Proinde  
merito Ananienſes hyoſcyamum vulgò vocant  
Diſturbio, vtpote quòd mentê, & omnes corpo-  
ris ſenſus diſturbat. Meminit vtriuſque hyoſcy-  
ami inter deleteria pharmaca etiâ Auicenna,  
ſic inquiens. Epoto hyoſcyamo albo, oſſium  
compagineſ luxantur, lingua in abſceſſus tran-  
ſiſ, ſpumât os, caligant & ruſcunt oculi, ſpiri-  
tus diſſiciliter redditur. Hinc ſunt vertigines,  
ſurditas, gingivarum, & totius corporis pruri-  
tus: ebrietas, amêtia, furor, comitalis morbus,  
voicis: diuerſitas: nam quandoq; rudunt affe-  
cti, aſſinorum mulotumque more, & equorum  
modo hinniunt. A nigro autê corporis extre-  
ma conſrigeſcunt, obtenebrantur oculi, obori-  
tur delirium, atq; adeò conſtringitur pectus, vt  
impedita proſus reſpiratione, ſuffocentur, cõ-  
uellanturq; ægrotantes. Verû hæc omnia cicu-  
tam facere tradiderunt Dioſcorides, & Paulus.  
Quo fit, vt ſuſpicari liceat, in hoc cæciſſe, et  
raſſeque Auicennam, quemadmodû & in aliis  
quàm plurimis ſimplicibus medicamêtis, quo-  
rum nomina ab eo ſepenumero confundun-  
tur. Cæteri in albi hyoſcyami curatione idem  
Auicenna præfert cæteris medicamentis the-  
riacam, & Michridatis antidotum. Sed iis, qui  
nigrum hauſerint, poſt vomitum, & clyſteres,  
meracum præbet potandum: quin & bubulum  
lac, abſinthium, caſſoreû, rutâ, laſeris lacrymâ,  
baccas & folia lauri, deſrutum, vtiçæ ſemen,  
magदारम, cardamomum, & ſtyracê: ſed quæ  
ſingula ex vino ſumantur. His præterea addit  
mori radicis decoctum, & opoballamû ex lacte  
poſitû. Ad hæc inſuper farinâ triticeâ vino ſuba-  
ctam, emplaſtri modo ventriculo vtiliter im-  
poni promittit. Sunt porò ex recentioribus  
nomine præclaris, qui longû piper in hoc ma-  
gnopere commendat, atq; etiâ piſtacia lar-  
gius manducata, cæteris præferunt antidotis.

## MANDRAGORA. CAP. XVI.

MANDRAGORA ſi bibatur, con-  
feſtum ſopor inſequitur, exolutio, ac  
vehemens veternus, nihil temerè di-  
ſtans à lethargo. Cui, antequàm ali-  
quid ex iis accidat, vomitus & aqua  
mulſa proderit: poſtea nitrum, & ab-  
ſinthiû, ex vino dulci, aut paſſo ſuman-  
tur. caput roſaceo, & aceto perfunda-

tur. Proſcitur excitatio, & motus corpo-  
ris, & olfactus eupatorii, & piperis, ſina-  
pis, caſtorij, & rutæ, tritorû in aceto: &  
liquida picis, & odor è lucernarû exu-  
ſtione, & extinctio. Quòd ſi ægrè ij re-  
uocentur, ſternutamenta mouere, ali-  
iſq; communibus auxiliis vti cõueniet.

10 QVANDOQV IDEM Mandragoræ hiſto-  
riam latius proſecuti ſuimus libro quarto, vbi  
vtrunq; eius genus depinximus, ideo nûc tan-  
tùm indicia primùm, & accidentia referâ, quæ  
ab epotis vel deuoratis eius tum radice, tum  
fructu euenire ſolent: deinde horum curatione-  
nem aggrediar, quoniam ſi diutius maleſtica viſ  
ſerpere, augeriq; negligenter dimittatur, nul-  
lis adhibitis remediis, facilè ij qui hauſerint,  
emori poterunt. Quamobrè dixerim, Aetium  
ſecutus, eam vix fallere bibeat, aut comede-  
tem poſſe, quòd odore ſit admodum graui, &  
nauſeabundo, amaro, iniucundisq; guſtu. Cer-  
ta itidem copia, & menſura ad lædendum re-  
quiritur. De cætero verò moleſtias quidem fa-  
cit, ſed ſerius interimit. Huius potu facilè ægro-  
tantes (vt Dioſcorides inquit) in veternoſum  
ſoporê delabuntur: quin & ſegnes, & languidi,  
& triſtes, & exoluti ſunt, adeò vt clamoribus,  
ac torſionibus excitati, repente rursus tanquàm  
amentes recidunt. Remoueri noxam ſcribunt,  
præter ea quæ Dioſcoridi prodantur, corian-  
dri ſemine, aut pulegio ex calida aqua, aut alui  
deiectione cum deiectorio medicamento, quo  
ad veternoſos vitmur. Quòd ſi à vomitu, qui  
malè habent, non exiſtentur à ſomno, organû  
potandum ex frigida, tanquam expertiſſimum  
medicamentum offerri volunt. Proſunt item  
acria clyſmata, friſtiones aſperis linteaminibus  
in totû corpus extenſæ: cucurbitulæ ignis flam-  
ma appoſitæ tum occipitio, tum ſcapulis, tum  
etiâ naribus: ſibulæ extrema corporis mem-  
bra torquentes: quin & ſternutamenta, quæ ve-  
ratri albi puluere naribus indito cienda ſunt:  
& ſeptica medicamenta veſicas excitantia, vt  
cantharides, & ranunculus, occipiti, & poſt aures  
emplaſtri modo impoſita, maximopere au-  
xiliantur. nanq; hæc omnia valentiſſimè reuo-  
cant, quæ cerebro officiû. Porò animaduertendû  
eſt, quòd iubet Dioſcorides ægrotantiû  
caput ad repellendû vapores eò petentes, ro-  
ſaceo, acetoq; perfundi. Id quod etiâ Galenus  
lethargicis cõmendat ſe videtur lib. xiii. me-  
thodi medendi. Sed hoc certè, ſi quis rē accu-  
ratè expendat, rationi refragari deprehenditur.  
Vnde nil mirum, ſi Paulus, Aetius, Alexander  
Trallianus, & alij, qui Galeni veſtigia ſequun-  
tur, cum rectè nouiſſent veternû morbû à fri-  
gidis tantùm humoribus prouenire, & roſaceû  
cû aceto illi hauſdaquâ cõuenire, quòd magis  
refrigerare valcant, caſtoriû, chamæpityn,  
pulegium, calamintham, ſerpyllum, thymbam  
& thy

Auicenna  
erratum.

Hyoscy-  
ami ſtri-  
go: cõ-  
tra-  
ſio.

Mandra-  
gora Ven-  
etica natu-  
ra.

Mandra-  
gora noxa  
remedia.

Roſaceû  
ſtrum hiſ  
cõmendis.

& thymum huic medicamento addiderint, ne solo admoto, morbum fouerent, atque deum aegris mortem afferrent. Verum enimvero putandum est, Galenum rosaceum ex aceto tantum imponere, ubi frigidus humor, quo ueternus excitatur, bili (ut plerumque accidit) fuerit admixtus, quæ tamen bilis maxima ex parte in ipso duntaxat morbi principio vexare solet: nam cum tenuis sit, faciliè resoluatur, & superatur à frigido. Hinc itaque quisque expendere & cognoscere potest, an iis, qui à deuorata mandragora ueternosi sunt, purum illud medicamentum ex rosaceo: & aceto admouere liceat, nullis additis exaltescentibus, cum (ni fallor) ab assumpta mandragora caput nullo afficiatur calore. Ad hæc tametsi mandragoræ poma matura comedantur à nonnullis detracto semine, citra ullam proflus molestim, immatura tamen, & cum semine deuorata, mortifera sanè inferunt symptomata. Siquidem exoritur intolerabilis ardor, qui uinuerfam corporis superficiem adurit: lingua, & os ardescunt, quam ob causam ore perpetuo hiant cernuntur affecti, frigidum trahentes æthera. Quibus nisi illico succurratur, conuulsi pereunt: contra uero faciliè liberantur, si statim hauserint, quæ opem ferre possunt. Id autem commodè, & efficaciter præstat Andromachi theriaca, ex aqua pota: quippe hæc sola momento omnem aufert molestim. Curantur (ut Conciliator inquit) qui huiusce radicem, vel posumam, vel succum sumperint, uinius tantum diei inedia, si tamen subinde præstantissimum meracum uinum largius bibant aegri, & acetum ossificant, cui admixtum sit castoreum. Sed horum omnium peculiare scribit esse antidotum domestica radix triduo cum pane, & sale deuorata. Cæterum cum mādtagoræ poma METELLAS

*Metellæ  
rū nucum  
Genesii.  
Es reme  
dia.*

NUCES quas uocant, nihil in memoriam reuocauerint, quarum huiusmodi superius libro primo descripsi, seu: rimque non modò, si edantur, 40  
suapte natura canes necare, sed etiam homines, cum nihil de his, quod extet. pollenitatis memorie prodiderint Dioscorides, nec antiquorum ceteri, non alienum duxi hoc loco earum indicia retere, atque etiam medicamenta commemorare, quæ harum veneno opitulantur. Ex nuce igitur cum intus in corpus sumuntur, vertigines, & facie ruborena inducunt: quin & oculorum cæcigines, temulentiam, inexpugnabilemque somnum: postremo oboritur frigidus sudor, uicinæ 50  
moris præsalium. Auxiliatur noxæ excitatus pluries vomitus aqua calida, & oleo: post vomitum datur conuenientissimè butyrum, & uisum meracum copiosum, additis pipere, pyrethro lauri bacis, cinnamomo, & castoreo. Prodest, & ægrotantium extremas corporis partes, nempe manus, & pedes calida aqua fouere, ac inde si iæctioribus rudi linteamine factis calorem in uinuerfum corpus excitare: cum eo tamen ut subinde balanino aut collino oleo perungantur affecti. Præstat item exercitatio, proinde ad celerem gressum cogendi sunt, ut uinuerfum corpus incalescat

seat: & pinguibus postea cibis, dulcique uino refocillandi. In summa & his ea maxime conueniatur curatio, quam eptorum requirit opium, de quo proxima commentatione differemus.

## MECONIUM. CAP. XVII.

ERGOTO papaueris succo, quem meconion uocant, consequitur ueternus cum perfrictione, & pruritu uementi, ita ut sæpe inualescente ueneno, tanta erumpat prurigo, ut hominem excitet: corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo vomitionem, acres clysteres auxiliantur, acetumque multum cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido: merum cum absinthio aut cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetum: nitrum ex aqua, & origanum cum lixiua aut passo: & rutæ syluestris semen cum pipere, uino, & panace: pipérque cum castorio, & aceto multo, vel cum saturcia aut origani decocto cum uino. Hi olfactibus excitandi: & ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foueantur. Post lauacrum prodest iurium pinguium usus, cum uino, aut passo: medulla etiam ex oleo pota.

## PAPAVER CORNICULATUM.

## CAP. XVIII.

QVON corniculatum papauer appellat, & potu, & cibo eadem inferre consuevit, quæ papaueri succus: nec alius expugnat auxilium.

INGRATVS Opii odor, perinde atque mandragoræ, faciliè oblat, ne in cibis, aut medicamentis inferri possit, quin ueneficium pateat gustantibus, præsertim cum necem non infestat, nisi certa quadam sumatur quantitate. Quamobrem raro contingit, ut homines uenefici opio uentur, ubi quenquam ueneno tollere uolunt, nimium ueritatis ne fraus odoris grauitateprehendatur. Tametsi quandoque acidat, aut foris medicorum imperitia, aut pharmaceopolarum negligentia, ut exhibitis medicamentis, quibus opium admixtum sit largius quam par sit, sumentes in ea incurrant discrimina, quorum meminit Dioscorides. Atque illa quoque sequuntur, quæ in suis alexipharmacis Nicander

deritis verbis representavit. Animaduerte, inquit sumpto papaueris in capite suo femina generis liquore dormientes: nam illi in summa corporis cute frigent: nec oculi eis aperiuntur, sed enim palpebrarum eorum immobiliter colligantur, & eque labore eo, odoratus sudor distillat vna collectus, adeoque ipsum corpus pallescit ac labia ardent, & eque generis nexus demittunt, id est flaccidæ maxillæ sunt. Languidus item & frigidus est gutture anhelitus expirat: sæpe & liuidus vnguis, vel obortus natus mortem non procul abesse nuntiant. ipsique oculorum, qui in caua recesserunt, radij. Nicandro subscribit Aetius lib. x i i i. ybi sic inquit. Quando voluntariè meconium aliqui biberint, siue id manifestare noluerint, siue volentes non possint, his cognoscentur indicis. Sequitur enim eos, qui opium acceperint, in somnum grauem collapsio cum frigiditate & pruritu intenso, vt aliquando ob ipsum excitentur: odorque opij per totum corpus effertur, & exhalat: inferior maxilla laxatur, tumescunt labra, irruit singultus, distorquetur natus. pallor adest, liuor vnguim, præcordiorum diuulsio, respiratio parua, & frigida, oculorum offusatio, & ad postremum mortifera conuulsio. Hæc de notis, quæ opium sumptum consequuntur. Quibus valentissimè illa remedia auxiliantur, quorū hic meminit Dioscorides. Neque enim plura apud posteriores Græcos reperi. Auicenna autem præter laserpitij lacrymam, & calloreum. Sed præstantissimum dicit esse medicamentum, theriacam, sagazeam, & Mithridatis antidotum ex vino potum. Excitandi etiam sunt ægrotantes sterutamentis, sibilis, frictionibus, odoramentis, nempe moscho, castoreo, lasere, ambaro, nariibus inditis, quin & sulphuris fumo. Succurritur conuulsioni, si vniuersum corpus perungatur susino oleo, ac etiam costino, aliisque remedijs, quorum in præcedenti capite meminimus. Verum longe omnium potentissimè proficit antidotus nostri vsus. scilicet quinta essentia theriacalis, de qua superius in præfationis commentatione diximus, quod præsentaneo remedio non modò his omnibus opituletur, sed etiam omnibus in vniuersum venenis, que frigiditate nimis interunt. Nec aliter curantur, qui cornicularum papauer deuorauerint.

## PHARICVM.

## CAP. XIX.

Quod Pharicon vocant, sapore syluestre nardum imitatur. Resolutione nervorum potum adfert, cum conuulsione & delirio. Oportet autè post vacuationes vinum absinthiten potui dare, cum cinnamomo, aut myrrha. aut nardo gallico, quod ferinen aliqui

vocauerūt: aut spicæ nardi duas drachmas, & myrrhæ totidem obolos, cum passo: aut irim cum croco ex vino: de rasumque caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

Non equidem hætenus apud quenquam scriptorem consequi potui, quid Pharicum antiquis fuerit, an simplex, aut compositum medicamentum. Quin neque etiam certò inuenire licuit, vnde id nomen traxerit, cum varia sit de nomine eius apud auctores sententia. Porro is, qui in Nicandri alexipharmaca scholia scripsit, hæc protulit. Praxagoras memoria prodit pharicum lethale medicamentum sic vocatum à Phario venefico quodam Cretensi. qui hoc reperit. Sunt qui primum pharis Arcadiæ repertum velint: appellant autem etiam Medicum. Nec desunt qui in Thessalia in Pheris, alij Lacedæmone, quod ibi fortasse proueniat. hæcille. Cæterum cum iam id meritò perditum sit, neque hoc tempore à nemine, quod sciam, cognoscatur, superfluum sanè esset plura de eo scribere: nam institutum nostrum non est, in re incerta diutius immorari.

Pharicæ  
nomen conf.

## TOXICVM. CAP. XX.

Toxicum ex eo nominari videtur, quod barbarorum sagittæ eo illinebatur. Qui biberint, labiorum, & linguæ inflammatione torquentur. Incoercitus furor varias iis imagines obuersat: quare vix medicinæ locus est. raroque qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, aut vinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur: rapi semen bibendum cum vino. Priuatim iis conuenit quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus, roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus: malaque cotonea trita esse, aut cum pulegio, & aqua bibere, conueniet: amomum & balsami semen ex vino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu læticis decumbunt: & vbi surrexere, stupidi reliquum vitæ tempus degunt.

Quod antiquis fuerit Toxicum, quo Barbari sagittas inficiebant, vt iis vulneratos inimicos haud dubiè perderent, nec à Dioscoride, nec ab alio aut Græcæ, aut Arabicæ familie auctore memoriæ proditum esse, mihi hætenus comp

Toxi  
fideratio

Opij Gene  
necuratio.

comptum est. Ideoq; difficile admodū fuerit  
decernere an Toxicū hodie sit, vel cognosca-  
tur in Europā, cū propriē hi Barbari antiquis  
dicantur, qui Troglodyticā Aethiopiae regio-  
nem incolunt, apud quos forasae tantū na-  
scitur. Verū enimvero putauerunt quidam, vt

*Manardi  
opinio re-  
probata.*

Manardus Ferratiensis vir nostrae ætatis cele-  
bris, id antiquū fuisse Toxicum, quod Arabes  
Napellum vocant. Quæ quidem sententia non  
omnino iis videtur resellenda, qui plura de  
Toxico non inuestigant, quandoquidem (vt  
Auicenna est author) non defuere, qui sagit-  
tas napello infecerent: constatq; napellum hau-  
rientibus linguæ, & labiorum inflammationem  
excitari, & raras admodum esse fumentes, qui  
eudant: id quod omnes Græci toxico adscri-  
bunt. Ad hæc cū asserat Auicenna, quod si qua  
cura toxico adhiberi possit, ea fiat vomitioni-  
bus, hausto antea rapi semine, & sumptis sub-  
inde glandium putaminibus, hoc omnino illo-  
rum opinionem auget. Siquidem Dioscorides  
quoq; iis, qui toxicum hauserunt, rapi semen  
ad ciendum vomitū ex vino potandū præbet,  
ac deinde quercus, fagi, aut ilicis corticē, arbo-  
rum nimirum, quæ omnes glandes proferunt.  
Quæ sanè omnia faciliè ad credendum trahunt  
Græcorū toxicum, & Arabum napellū vnum  
& idem esse venenum. Sed diligenter rem ex-  
pendentibus contrariæ profecto sese offerunt  
rationes. est enim ex notis prædictis toxicum,  
& Napellum vnum & idem esse videntur, tot  
tamen alia habentur notæ, quæ alterum ab al-  
tero discriminant, & contrarium arguunt, vt  
aliter existimandum non sit, quàm quod dele-  
teria hæc medicamenta plurimum inter se dis-  
sident. Nam nupquam, quod legerim, tradi-  
dere Mauritanos eos, qui Napellum hauserint,  
in tantum furorē agi, vt vinculis sint coër-  
cendi, quemadmodum eos, qui toxicum deuo-  
rauerint. Equidem illud pro certo testari pos-  
sum, quod Corsi illi latrones, scitiorū, nequis-  
simi, quorum historiam libro quarto prodidi-  
mus, cū de aconito differeremus, quanquam  
ab assumpto Napello ea omnia dederint indi-  
cia, quæ ab Auicenna napello assignantur, in  
nullum tamē furorē adducti fuere, neq; vllum  
etiā sentire delirium. Præterea Auicennæ,  
nostrorū testimonio, qui experimentum vidi-  
mus, epoto Napello, oculi exterius prominēt,  
oboriuntur vertigines, animi defectus, & in-  
gens crurium imbecillitas. Quorū tamen sym-  
ptomata nihil de toxico agens meminit Dio-  
scorides. Quæritur vbi ipse perhibet Auicennā  
qui Napelli pericula euadunt, plerumq; aut ad  
hecticam febrem, aut ad tabem, aut ad comi-  
talium morbū desciscunt, id quod Toxicum  
fumentibus non euenit: horū siquidē qui su-  
peruixerint, stupidi tantum reliquū vix tem-  
pus ducunt. Ex his itaq; omnibus liquidū ap-  
paret, quod hæc inter se maximè differūt. Lon-  
ge enim æuiora sunt Toxicū incōmodo, quàm  
Napelli, vt abunde cōstat ex Nicædo in alexi-

*Toxici mo-  
tae Ni-  
candro.*

pharmacis, vbi Toxicum descripsit iis notis.  
Protenus etiam lethalis toxici dolorē, & ma-  
lum abigere discas, quādo suis cruciatibus ho-  
minem comprehenderit. Lingua eius, qui To-  
xicum hauserit, infernē crassior redditur. Sed  
labia intumescunt, os planè pondere suo de-  
grauant, ac aridum proflus spūm regerit, in-  
ferioriq; parte gingivæ diffunduntur, & è suis  
itacionibus mouentur. Sæpe etiam cordi stu-  
porem iniecit, omnisque sensus confluentum  
est, fontico isto malo perturbatus. Ac labo-  
rans eo, & balat, & mugit, innumeras nugas fa-  
bulasq; præ infania edens: ac sine intermissione  
dolens, vehementer vociferatur, instar homi-  
nis, cui caput, totum corpus compingens, ense  
amputandum sit. Vel quemadmodum crateri-  
fera sacras res tractans ipsa Rheæ sacerdos, no-  
na mensis publico appropinquans itineri, lon-  
gum ore suo rumorem, & clamorē edic, quem  
horrendum in montanis latratum audientes  
sibi meruunt. Sic ille rabie, mente sua turba-  
tus errans eiulat, ac lupi instar fugitiuē vlulat,  
obliquisq; pupillis taurino more inspicens, al-  
bum dentem acuit, dentibusq; suis despumat.  
hæcenus Nicander. Cæterum differant toxicū  
& napellus in curandi quoque ratione.  
Toxicum nanque Dioscoridi curatur rosaceo  
ex passo poto, quinquefolij radicibus, caprillo,  
& hircino sanguine, cotoneis malis, amomo,  
& balsami fructu. Auicenna verò Napello suc-  
currit cum viui potu, butyro, moscho, capparis  
radice, & eo denique iure, qui napelli  
ipsius radices depascitur. quæ vtique medica-  
menta omnia ab iis admodum discrepant, quæ  
in Troxici curatione commemorauit Diosco-  
rides: quem tamen penè ad verbum reddidit  
Auicenna in cæteris venenorum auxiliis. Hæc  
igitur apertissimè ostendunt, conuincuntque  
Napellum & Toxicum esse diuersa venena.  
Nec illa obstant sententiæ nostræ, quæ sape-  
rius in Manardi fauorem adduximus. quando-  
quidem (vt faciliè colligi potest) ex vniuersa  
huiusce libri materia) alia etiam habentur ve-  
nena, quæ quod eadem existant accidentia, &  
paribus curentur antidotis, videntur vnam, &  
eandem rem esse, cū tamē longè diuersa cer-  
nantur: cuiusmodi sunt mandragora, opium,  
hyoscyamus, coniculiurum papauer, & id ge-  
nus alia. Sed vt iam de Toxicō meam in me-  
dium proferam sententiā, eam haudquaquam  
falli crediderim, qui dixerit, id esse Auicennæ  
Toxicum, quod idem Tusum appellat. Nemp-  
e quod asserat eo epoto laba, & linguam in-  
flammati, sequi delirium, & incoercitum fu-  
rorem: quæ propria toxici sunt indicia. At-  
tamen hoc videtur illi omnino fuisse incogni-  
tum, quod nec minus forasae Dioscoridem la-  
tuit. Nam si toxicū nūquidē Dioscorides, eius  
certè historiam libro quarto silentio non dissi-  
mulasset, vbi de cæteris mortiferis dissi-  
micamentis. Illud porrò indicium quodam-  
modo facit, Mauritanorum tusum esse Diosco-

*Napelli  
menū  
que reme  
dia.*

ridis toxicum, quod nomen illius licet corrupte, ab hoc Arabes traxisse videantur, quasi toxicon tulum nominauerint. Verum cum toxicum de *NAPELLO* loquendi nobis occasionem dederit, non alienum fuerit, ut nostrum sequamur institutum, hoc loco eius tum venenum, tum remedia describere, præsertim cum nascatur in Italia. Napellus itaque, ut Mauritanorum testantur monumenta, & nostra ad stipulatur experientia, si potu vel cibo in corpus ingeratur, seu statim adfert discrimina: nempe illico labia inflammantur, & aded intumescit lingua, ut exeri extra dentes, & oris amplitudine capi non possit: oculi item pariter intumescent, ita ut prominent vertiginæ, & animi deliquia frequentissimè innadunt, & crura imbecillitate affecta immobilia redduntur: subinde vniuersū huiusce corpus, intumescitq;, & confestim malo occupatur habitu. Quo fit, ut breui temporis spatio, qui sumpsit, miserabiliter intereat. Sed id mirum non est: quippe quoniam tanta est huiusce lethiferi veneni vis, ut nisi statim propriis antidotis succurratur, nullis subinde expurgatur medicamentis. Imò quauis etiā in ipso principio valentiora dentur remedia, pauci tamen superuiuunt, qui aut hæcica febrī (ut diximus) aut tabe, aut comitiali morbo tandē non conficiantur. Succurrendum igitur illico fuerit, excitationis prius vomitibus (ut Auicenna inquit) epoto rapi, aut napi femine. Prodest deinde buriarum bubulum coctum, & sæpe ac largè cū vino sumptū: item glandium putaminum decoctum ex vino potum. Auxiliari diambari, & diamoschi pulis: quin potius amburum & moschus præ cæteris per se, & cū Lemnia terra, ex vino pota. Quod si hæc non proficiant, nihil sanè præterea sperandū relinquitur, quod parum, vel nihil possint in huiusce veneni noxa theriaca, & Mithridatis antidotis. Proinde dicebat Auicenna, theriacam Napello non prodesse, nisi certo tempore, & termino. Faciunt ad hoc & capparum radices, quod dixerint quidam antiquorum, hæc verum Napelli esse antidotum. Conciliator sinatragdi puluerem duarum drachmarū pondere magno remedio ex vino potandum pollicetur. Sed hoc dari tantū potest Pontificibus, Imperatoribus, Regibus, aliisq; opulentis principibus. quandoquidē parua, vel nulla est adhibenda fides pretiosorum lapidum fragmentis, quibus hæc ætate seplaxia vtuntur. Ad hæc recentiores ferè omnes, qui venenorum materiam pertractantur, Auicennam secuti, verum securantq; Napelli antidotum putant murem quandam, qui Napelli radices depascitur. Hūc vidimus nos, cepimusq; in quibusdam alioribus vallibus Ananiz montibus. Sed non omnibus datur ipsum inueniendū, venandūq; modus: ad hoc ætate multa patientia, & vigilancia opus est. Quamobrè mihi mirum non est, quod scripserit quidam recentiorū clarissimus, magnificū quandā virum ac

principem, philosophum tamen, & medicum, cum diu hos mures quæsiuisset, neq; eos inuenire potuisset, ut demum suum cōficeret antidotū, horum vice magnas quasdam cepisse muscas, quas foliis, & floribus Napelli victitate obferuauerat. Eo autē antidoto, quod cōstabat ex prædictis muscis numero viginquatuor, vnciis duabus Lemniæ sphragidis, & pari pōdere hæccarū lauri, atq; Mithridatis antidoto, omniūbus oleo & melle sufficienti exceptis, admirādos fecit effectus, non solum aduersus Napelli venenum, quod ve periculum faceret, diuersis dederat animalibus, & ipsemet experiendū antidoti gratia sumperat, sed etiam in omni alto veneno. Sed quid dicam (si tamen licet sine vitio sua quæq; laudibus efferre) de admiranda vi olei nostri de scorpionibus, cuius cōponendi rationem tradidimus in præfationis huius libri commendatione, cum a tam seuo extialiq; veneno, qui biberint, breui admodum tempore liberentur, eo tantūm exterius inuncti: nihil certè aliud, nisi quod aduersus hoc venenum, & cætera quæ viscera non erodant, sicut & venenosorū omnium morsus & ictus, inter omnia remedia (pace aliorum dixerim) id primum sibi locum vendicat. Vbi enim vehementissima, ferociorque fuerint venena, singulis horis iungi postulat: vbi verò minus vehementia, minusq; seuā fuerint, interposito trieni horarum spatio, pluribus continuis diebus. Inungi autem debet non modo cordi ad sinistram mamillam, sed temporum quoque, manuum, & pedum arteriis.

# IXIA. CAP. XXI.

**I X I A.** quæ vlophonon appellatur, inter potandum aliquid ocimo simile gustu & odore redolet: vehementē linguæ inflammationē excitat: mentem mouet: omnes excrementorum exitus suppressit: strepitum cum animi deliquio ciēt: iisq; intestina latrāt, nec egeritur quicquā. Post vomitionē aluiq; resolutā, auxilium præstat aqua, in qua absinthiū maduerit, ex vino largiore, aut aceto mulso pota: rutaq; syluestris semen, aut laseris radix. Itē tragorigani decoctū, cū aliquo supradictorū, aut lae, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpitio, quorū singuli oboli cōueniunt. quin & nuces iuglandes ex vino, cū resina, castorio, & ruta trita, ita vt singula drachmæ pondus æquent. Iridē chamelæ, aut thapsiæ, aut absinthij succi sicilicus cum aqua mulsa, & acetū calidum potum.

*Ixiæ Genera  
fina natura  
ra.*

**I**XIÆ, ut superius libro tertio vetulimus, lenta, & visci modo tenax est lacryma, quæ in chamæleonis albi radicibus agglutinata reperitur. Hæc (ut Nicander, quem Dioscorides est secutus, in alexipharmacis inquit) gullata oculi finem saporem præbet: hausta extremam linguæ tractum exasperat; interiora adurens: quinetiam corde suo turbatur ad insaniam usque qui fumperit, ac linguam penitus dentibus lacerat. Porro mente attonitus redditur, aliusque temere ambos utrinque meatus & liquidorum, & esculentorum obdurans, quæ & intrinsecus spiritum satocæs, suburnumrat, ac modo dicto tractu volutat. Qui item hoc malo angitur, ægre magnæque difficultate respirat, adeoque venenata illa ixiæ potio protenus excrementa eiicit ouorum similitudine. hæcenus Nicander. Cæterum Mauritiæ ixiæ alababæ vocant, quod propriè viscum significat. Cuius nimirum incommodis in primis succurrit, Auenenna teste, excitatæ vomitiones, & insusceptiles, qui iis maxime opem auxilium: sed mitiores lenioresque esse oportet. Præstant deinde auxilium theriaci, & Mithridatis antidotus, ex abstinij Romani, aut sanctonici decocto pota. Profunt item epichemata, quæ cordis imbecillitati dicantur: quin & vtriusque hyssopi flores saccharo asseruati, additis margaritis, coralliis, pretiosorum lapidum fragmentis, moscho, ambato, & aliis quæ cordi opem ferunt. Conuenit insuper rosaceum aceto admixtum, & sincipiti ubi futura intersecat, linteis illitum. Quæ sanè remedia non modo remouant, franguntque veneni vim, sed omnibus etiam incommodis ab eo excitatis mirifice subueniunt. Porro cum in frequenti recentiorum medicorum usu sit albi chamæleonis radix ad arcendam pestilentiam, & ad interaneorum tineas necandas, ideo caueant qui ea videntur, ne agglutinatam lacrymam, si qua fortè fortuna inhaerescit, præbeant deuorandam, quod facillè cauere poterunt, si cum primum radix è terra fuerit effossa, eius corticem cultello derauerint, & vino subinde lauauerint. Verùm ego in radice albi chamæleonis, qui in Italia prouenit, nullà hæcenus Ixiæ reperi. Attrament quidam Cretensis rei herbariæ studiosus mihi pro certo affirmavit, è carlinæ vulgò vocatæ radice in Creta Ixiæ ab iis colligi, qui fugitas consuevit, ut pennas fugitis conglutinent. Nec modò eam reperi mihi retulit in eo carlinæ genere caule viduo, sed etià quædam in altero, sed rarius. Quæ certe omnia opinionem auxerit, ut hoc obiter dicamus, carlinas vocatas Dioscoridis esse chamæleones. Quod autè plus veneni insit CHAMELEONIS nigro, quam albo, ut Galenus scriptum reliquit, & post ipsum Paulus, & Aëtius eius doctrinam secuti (de qua re superius libro tertio differuimus) non ita facillè crediderim, cū albo tantum Ixiæ insuæci scribat Dioscorides. Non ob id tamen præteribis, quin hoc loco ea referam, quæ de Chamæleonis nigri veneno, & eius re-

*Chamæleo  
nis nigri  
venenum  
& remedia.*

mediis memoriæ prodiderunt Paulus, & Aëtius: ita enim scribunt. A chamæleonis nigri potu morsus ventris, & linguæ tumor, cum rugitibus intestinorum sequitur: facies discoloratur, & vomitus spumofus, tremores, concussiones, & totius corporis conuulsiones, ac vocis interceptio conomicantur. Cæterum curantur ex his, quæ ad fungos sunt relata. Datur eis & thlaspius, & betæ succus, & triticæ præstans cremor ex passo, abstinij dilutum, & nitrum cum aceto mulsu. Vbi verò euomerint, lac recens multum sape exhibeto, & aluum cum lubricis infusus eluito, vel ut fœni græci & althææ decoctum. Præcordiis etiam fomenta, ac calidioria adhibeto.

## CERVSSA. CAP. XXII.

**C**ERVSSA suo colore proditur: sumpta enim, mox palatum, gingiua, lingua, & commissura dentium, candore quodam inficiuntur: singultus, tussim, ac linguæ ariditatem excitat: iis extrema frigescent, mens labat, membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficuum, aut malæ decoctum, aut lac calidum, aut sesamæ ex vino tritam, vel lixiuiam ex farmentis factam, amaracinum oleum, aut irinum, persicorum ossa cum hordei decocto: columbina oua cum thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gūmi, quod vltimo plorauit: aut humor, quæ vltima folia reddiderunt, cum tepida aqua: sed tum quoque vomant. Conuenit etiam thapsiæ succus, aut scamoniæ, cum aqua mulsæ potus.

*Cervssa le-  
thalis na-  
tura.*

**C**ERVSSAE faciendæ rationem tradidimus superius libro. Hæc tametsi ad vlcèrum medicamentum, quæ exterius illinuntur, salubre plerumque sit medicamentum, si tamen sumatur intus in corpus, interfecit, quemadmodum cætera deleteria pharmaca, de quibus iam plura vetulimus. Epote cerussæ incommoda pluribus notis, quam fecerit Dioscorides, eleganter carminibus reddidit in alexipharmacis Nicander, quoru carminum hæc erit paraphrasis. Cerussa per omnia sumant adhuc lacti, cum verno tempore, pingue & recens in multam emulsam fuerit, colore similis est. Porro cerussæ spuma super gingiua stringente vi scandit, quæ spumosi medicamenti frigore arescit, & contrahuntur in rugas. Lingua, & fauces asperitate languent. Vexantur ob id, qui hauserint, arida tussis, oculisque



nutantes grauitate, dum crebros ructus egerunt, non sine labe fatione sui oppellunt. Hinc fit, vt capite non parum turbentur: quinciam animo suo naufcabūdi præ trifti labore gemūt. At fæpiſſime in ipſa luce vanum phantaſina, quod re ipſa nullum fit, cernunt, aliàs ſomnolenti toto corpore frigunt, neq; vt antea membra, poſſiſſimum maſus, & pedes, ſuum officiū faciunt, adeo vt ni eiſ ſuccurratur, eo tandem dolore læſiſſi, ſuccumbant pereantque. hæcenus Nicander. Cæterū Auicenna teſtimonio ceruſſam hauriētib; alia adueniunt incommoda, nempe animi deliquiū, faucū aſperitas, ventriculī, & alui compūſiones, præcordiorum tenſio, anhelitus diſcultas, præcatio ſpirituū, & albedo totius corporis: quin & vrina modò nigra, modò cruenta redditur. His auxiliū præſtant (vt ipſe, & Aëtius tradidere) ſcā monium ex mulſa potum, aliq; medicamenta, quæ ſuapte natura vrinam valenter pellunt. Poſt hæc clyſteribus vri conueniet, ac ſubinde providere, ne dormiant affecti, ſed vigilantes ſepius euomat potu prius hydro-melite, ſuſino, & narcifſino oleo admiſtis. Præſerunt quidam vomitiones ab æriplicis, & rapi ſemine concitata: itē clyſteres ex braſſicæ decocto cum oleo, abſque ſale: inſuper theriacam ex vino, & Mithridatis antidotum, & album ineracum vinum largiū potum.

## FVNGI. CAP. XXIII.

FVNGORVM alij genere, alij copia lædunt, omnes tamen ſtrangulatus ſuſpendio ſimiles concitant. Quibus conſeſtim ſuccurrendum: communiter ex oleo vomere cogendi: mirificè iuuat lixiua ex ſarmentis, aut pyraſtri ſurculis, epota cum ſale, poſca, & nitro. Fruſus, aut ſolia pyraſtri cum fungis decocta, ſtrangulantem illam vim auferūt, eſtātque eiſdem auxiliantur. Aduerſus fungos gallinacea oua cum poſca proficiunt, adiecta ariſtolochiæ drachma: item abſinthium cum vino mellèque ſumptum, & ex aqua porum apiaſtrum ex nitro: panacis radix, & ſemē in vino: ſex vini cremata, cum aqua: atramentum futorium ex aceto: radix. vel ſinapis, aut naſturtiū eſu proſunt.

Non modò nocent in vniuerſum Fungi, quod in eorum genere aliqui habeantur lethales, & ſuapte natura veneno imbuti: ſed etiā quod ex his, qui perniciōſi nō ſunt, plus quim ventriculī robur ferre poſſit, quandoq; ingratum, ita vt tunc non malefica vi: ſed copia lædāt. Quippe cum natura humidī admodū, & fri-

gidi ſint, & lētoꝛe non modico ſcateāt, ſuperato ſua quantitate corporis calore ſuffocant, ſtrangulant, & deniq; interimunt, niſi citius remediis ſuccurratur. Cognoscuntur qui mortiferi ſunt (vt ſuperius libro quarto tradidimus) ſi ſtrangantur, quod illico varios mutant colores, ſtatimque computreſcant. Proinde dicebat Auicenna, in fungorum genere eos eſſe lethales, qui virides, & cæſi deprehenduntur. Sed cerē magnopere admirari licet, quod tanta in hominib; inualuerit gula libido, vt eſiſciant fungos eſſe plerunq; necis hoſpitium; tamen ſui ipſos obliui, magno ſanē apparatu eos in cibis auidiſſime deuorent. Verū poſtquam tantam cum palato fungi iniere gratiam, vt ab his abſtinere homines non poſſint, ſaltem diſcant velim, vt ſe ipſos à morte vindicent, fungos nunquam eſſe ſumendos, niſi prius cum ſylueſtrib; pyris decocti fuerint. Quod ſi ſylueſtria pyra deſiderentur, ex domeſticis ea ſupplere poterunt, quæ cæteris auſteriora habentur. in quem uſum adhiberi poſſunt tam recentia, quàm ſole ſecata. Præſtant idem arboris tam ſolia, quàm cortex, præſertimque ſylueſtris: ſiquidem fungorum antidotum pyra ſunt. Dioſcorides libro quarto præter medicamenta hic ad fungos aſſignata, prætulit origani, & ſaturei decoctum, gallinaceorum ſumum, ex aceto aut melle potum: quod tamen (vt Philagrius explicat) album eſſe oportet. Sed primum medicamenti ſepius enarratis eliciendus eſt vomitus, & ſubinde acia inſundenda clyſmata, vt extra corpus trahatur virus. Cæterū ignorandum non eſt, eos incommoda aſſerre longè maiora, qui propria natura venenati naſcuntur, quandoquidem non modò ſuffocant, ſtrangulantque comedentes, ſed etiā inteſtina exulcerant, ventriculum inſtant, ſingultum, & punctiōnes excitant, corpori vniuerſo pallorem inducunt, & vrinam remorantur. Præter hæc alia verenda, & leſiſſera oriuntur ſymptomata, nempe frigus, tremor, interceptio arteriarum, animi deliquium, perfrigidus ſudor, & mors ad poſtremum inimatura. His primum auxiliantur vomitiones omni celeritate excitatæ: quibus itaq; conuenit epotus domeſtici raphani ſuccus, aut deuorata rutæ ſolia, aut origanum, aut mel. Prodeſt deinde mirum in modum theriaca, & Mithridatis antidotus ex acerrimo aceto pota, aut ex oxymelite, aut ex aqua vitæ vocata, quamobrem quanta eſſentia noſtra theriacalis, in his fungorum malis mirificè fert opem. Prætulit ad hæc Auicenna calida quæcūq; aromata: cuiusmodi ſunt diſipereos, diacyminum, diagalanga, dyamoſchum. Cōciliator potandum exhibet magno iu uamento vinum optimum, in quo conſeruetur piper, offeratq; ſubinde alium crudū deuorandum. Id quod facit vniuerſa ſerē ruſticorum turba, qui (vt Galenus inquit) alio the-  
riacæ vice plerunq; vtuntur.

Ceruſſa  
mali au-  
xilia.

Fungorum  
prepara-  
tio.

Fungorum  
venenosa  
medic.

Fungorum  
hoc ſic  
naturæ.

GYPSUM. CAP. XXIII.

LAPIDESCENS gypsum strangulationem creat. Quare eadem profrenda sunt, quæ manfis fungis, auxilia: & ad hæc malux decoctum, quod etiam olei vicem pensat: vtpote cum pingue sit, euomendo lubricas vias, & faciles reddit, deradiq; corpora nō finit. quod vbi duratur in lapidem, gypsum efficit. Quin etiam prodest oleū ex aqua mulsa, aut ficorum decocto: & lixiuia è ficulneo cinere, aut farmentis facta, cum vino copiosiore pota: & origanum, aut thymum cum lixiuia, aut aceto, aut passo: hiq; decocto malux proluendi.

*Gypsiuene* GYPSUM omnibus notum, si bibatur, aut *ficiu, etisf.* comedatur, strangulat (vt Dioscorides inquit) quodd respiratiōis meatus valenter adstringat, & obstruat. Meminit huius inter venenata medicamenta Auicenna, sic inquit. Eadem sunt gypsi indicia, quæ & cerussæ, præterquam quod illud citius, & atrocius strangulat. quamobrem iis, qui hauserint, ea conuenient medicamenta, quæ cerussæ, & fungis opitulari diximus. Postea lubrica danda sunt, cuiusmodi est malux, alchæz, sæni græci, & lini seminis decoctum. Conciliator: egelidam aquam cum buryo primū potandam iubet, & deinde vomitum excitandum, à vomitu calidam item cum melle præbet, vt iterum vomant: postremū Mithridatis antidotum vino meraco mistum, drachmarum duarum pondere. Quod si alius ab hoc adstricta fuerit, citetur oleo, & anatis adipe clystere infusus, & illinatur venter ricinæ oleo. Quia & muriæ sterus (vt ipse ait) ex vino potum, proprium est gypsi antidotum. Auicenna autem vltimū purgari iubet scammonio, & aliis pharmacis, quæ aliū deiciendo ad rem faciant.

SANGVIS TAVRINVS.

CAP. XXV.

TAVRI recēs iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem, strangulationq; concitat: sancium, consillarumq; meatus cum nervorum distictione præcludit: lingua rubescit: dentes inficiuntur, & quædam concreti sanguinis vestigia, inter eorum commissuras restant. Quare vomitum vitabimus: sanguinis enim globi attractu illo in sublime relati, magis gulæ inculcantur. Dari ergo

opus est quæ concretum sanguinem disturiant, & alium subducunt. Grossi lacteo succo turgentis ex posca, & nitru per sese, auxiliantur: nec secus coagulum omne cum aceto, & laserpitiæ ra dice, aut lasere: itidem: & brassicæ semine, & è cinere ficulneo lixiuia: conyza folia cum pipere, & rubi succus ex aceto. alius resoluenda. Iis qui seruauerunt, stercoreosa, & fluida per sedem egeri consueuerunt. Stomachum, aliumque hordeacea farina ex aqua mulsa perungere oportet.

NEMO tauri sanguinem clam potandum exhibere potest: nam vniuersis sanæ mentis sanguinem cognoscat. quare, mea quidem sententia, fieri non potest, vt veneficio quenquam decipiant: quippe nisi largius bibatur, & adhuc calens ab ipsis defluens veniat, autem quam crescat, noxam non inferat, aut lenem. Quo fit, vt eos tantum taurino sanguine interire crediderim, qui aut atra bile tenati, aut cacodemoniis irritati, vel vt aliquod seuū mortis genus ab legibus pro suorum facinororum pœna luenda institutū effugiant, vel vt immedicabiles & grauissimos morborum cruciatu finiant vitæ periculi (quod Plinius lib. x. x. cap. x. v. i. fecisse ait epoto opio Licini) Cecinæ patre ciuē Romanum mortem sibi voluntariam consciscant. Proinde sitit Nicæder in alexipharmacis ita scriptum reliquit. Si ex insipientia quispiam atrium tauri sanguinē hauserit, mœrore adeo ingemit, vt nimio cruciata tandem conficiatur, quando cordi appropinquans sanguis ille condensatur, ac in medio alui receptaculo in grumos coagulat: thine & meatus spirituum obdurantur, & halitus suffocatur impleto guttore. Atqui tractibus, & singultibus iste afflictus, crebro humi spuma coinquatus palpitat. hæc ille. Ceterum si forte fortuna euenierit, vt quis tauri sanguinem potauerit, & ad eum domesticis, quibus factum consuet, medicos aduocent, tunc medici iis vt poterunt remediis, quorum hic abunde meminit Dioscorides. Sed quoniā taurinus sanguis menstruum sanguinem mihi in mentem redegit, atq; etiam hic nobis occurrit fel pardi, viperæ, & canis piscis: ite cerebrum felis, quem Græci ælurum vocant, cerui extrema cauda, quorundam quadrupedum sudor, & malum de nique improbatumq; castoreū, quæ omnia loter lethalia medicamenta annumerantur, cū hæc Dioscoride in hoc venenorum celsu prætermissa deprehendantur, & nobis propoſitum sit, singulorum vires maleficas, earumq; auxilia describere, hic locus opportunus visus est, in quo de iis differeremus, & nostrum institutum, quantum possumus exsequeremur. Sanguis itaque MENSTRUUS mulierum, præteritūq;

Sanguis tauri venenatus.

Sanguis menstrui venenatus.

biliola sum, & facillè rixantium potus, adeò bipentes effascinat, & inficit, ut lunaticos & amētes efficiat. Id autē detestabilis facinoris quandoque perpetrat malefica veneficā; mulieres cacoethonibus dūctæ ipsū exhibendo propriis maritis, vel aliis, quos odio prosequuntur. Huius tamen noxæ succurritur contritis margaritis drachma pondere ex melissophylli aqua potis: auxiliatur & tepidæ balneū. Confert ad hæc (ut Conciliator inquit, si tamen id absq; diuinæ legis iniuria fieri possit) ut affecti hilari frequentiq; mulierum consortio latentur, cum eisq; coeant, præcipuè cum iuuenibus, quæ rarè nuptias celebrant. Prodest & theriaca drachma pondere ex fumariz aqua quotidie pota. Profunt & viperæ passilli scrupuli pondere, additis cum margaritis, tum theriaca eodem pondere. Epoto autem

*Paradi si  
lis Gene  
ris eiusq;  
remedia.*

PARADI  
felle excitatur vomitus, ceu aloës amarore, os & nates inficiens: post vomitum vniuersum corpus flauescit, ictericorum modo: postremò ea omnia consequuntur incommoda, quæ ab assumpto napello, & à viperarū moribus eueniunt, cum tam scruum lethiferumq; sit, ut tribus tantum horis potantes perimat. quod si hoc temporis spatio non interficit, prorsus desperandum non fuerit. Expugnat primum vomitionibus illico excitatis, subinde iis vtq; antidotis, quæ napello, vel viperæ morfu infectis opitulantur. Aucienna huic veneno peculiarem conficit theriacam ex Lemniæ terræ, & lauri baccharum, singulorum drachma vna: capreoli coaguli drachmis quatuor myrrhæ, & rutæ seminis, cuiusque semidrachma, quæ omnis melle excipit. Hanc inglandis quantitate exhibet, excitatis deinde vomitionibus, ductisq; demū laborantibus in calidæ aquæ balneum, cui interseruierint odorata medicamenta. Sed v

*Pipra fel  
is Venefi  
ca Cui  
auxilia.*

PIPRÆ  
fel adeò perniciosum existit, ut statim animi deliquium adserat: quare rarissimè antidotis succurri potest, quòd nullū datur ea præparandi spatium. Veruntamen si quid est, quod tam breui temporis momento quicquam opis ferat, id erit quàm celerim excitatus vomitus, epoto prius cocto butyro, igne collicato: quo vomitiones iterum, atq; iterum mouere oportet. Post vomitus nihil salubrius, quàm theriaca, & Mithridatis antidotum, moschus, amburum, & eorum composita medicamenta, quæ diamoſchum, & diamburum appellantur. Vbi autem animi deliquia persequantur, & corporis vniuersi angustia, vinum quidem offerendum est, aut capponum, & gallinarum carniū faccus, aut aquæ feruentis balneo in vase vitreo distillatus. Huic equidem noxæ crediderim magnificè aduersari oleum nostrum de scorpionibus, cuius componendi rationem tradidimus in huius libri præfationis commentatione: itidem & quatuor essentiam nostram, quòd ictu oculi suis perquam tenuissimis partibus in totum deferatur corpus. Porro fel, quod à e a

*Canis pi  
sæ felis  
Genium,  
Cura.*

NÆ pisce eximitur, lethiferum est. quippe quòd potum, vel essatum lentis tantum quantitate, septenis diebus interfecit. Curantur tamen qui hauserint, epoto bubulo butyro cum gentianæ radice, cinnamomo, & leporis coagulo. Prodest & corpus vniuersum odoratis oleis illinere, & victu tenuissimo vti. Ceterum qui FELIS CEREBRUM in cibis ederint, crebris afficiuntur verriginibus, 10 hūntque subinde stolidi, & amentes. Quibus etsi subueniri possit, id tamen non nisi temporis tractu, & admodum difficulter fieri potest. His danda est Lemnia sphragis, & vomitiones inde sunt excitandæ, hæque id oportet, aut quater in mense. Præstat item auxilium, si quotidie mane fument ægri diamoschi confectioem, tribus vel quatuor horis ante cibum. Quinimo moschus per sese sufficiens auxiliatur: namque ut quidam tradiderunt, moschus tantum huiusce cerebri proprium est antidotum, si dimidij scrupuli pondere ex vino bibatur. Sed illud non est ignorandum, quòd non modò Felis deuorat eorum cerebro homines inficere possunt, sed pilis quoque respiratione, & oculorum incuitu. Nam etsi pilis omnes imprudenter in cibis sumpti, præfocare possunt, anhelitus meatus obstruentes, tamen felium priuatim exitialiter censetur. Eorum præterea spiritus tabifico quodam veneno infectus deprehenditur. Etenim noui ego quosdam, qui cum felibus adeò delectarentur, ut nunquam sine ipsis dormituri peterent, attracto inde diutius aeris vehiculo eorū spiritus, in tabe, & marasmo incidere, quibus postremò cōfecti diem suum obie-runt. Nec diu est, quod in quodā monachorum cœnobio vniuersa peritit familia, magno felium numero, & contubernio. Laudeo item suo (ut diximus) oculorum incuitu, adeo ut quidam reperiantur, qui his visis, aut auditis, 40 pauore quodam illico capiuntur, terreanturque maximè, quòd non modò ex eorum veneno provenire existimauerint, sed etiam propria eorum natura, qui eos vel intuentur, vel audiunt, quandoquidem ij sua natura talia à cœlo qualitate infusam habent, quæ nunquam ad propriam mouetur actionem, nisi obiciatur id, quod natura sibi contrarium fuerit. Horum plures in Germania duntaxat vidimus, & quosdam ex ea natione Goritiæ commemorantes. Quòd autem verum sit id aliunde euenire non posse, quàm à congenita qualitate, quæ paucis admodum inest, aperte sanè ostendunt eorum aliqui. Quippe cùm huius generis quidam hyemis tempore in hypocaustum nobiscum cœnatus intrasset, quòd plurimum amicorum sodalitis conuenerat, mulier quædam huius viri naturæ conscia, ne is, viso felis catulo, quem educauerat, iratus discederet, illum in arcula quadam eodem in cœnacula concluserrat. Sed quannus nec vidisset ille, nec audisset 50 catulum,

*Felis cere  
bri malefi  
cium, et re  
media.*

catulum, cum paucis post tempore aërem felis  
halitu infectum inspirasset, irritata statim ea  
temperamenti qualitate felium inimica, emissio  
sudore, pallida admodum facie, omnibus sanè  
admirantibus, tremebundus conclanare cepit,  
hic aliquo in angulo later felis. His autem ea-  
dem opem ferre putauerim, quæ cerebrum co-  
medentibus remedio esse diximus. Inuenitur  
etiânum in *CAVDA CERVI* extremis  
partibus porraceus quidam humor, fellæ bili  
admodum similis, qui si fortè deuretur, præ-  
sentaneum est venenum. Adfert enim illico  
intolerabiles angustias, animi deliquia, & om-  
nia tandem symptomata, quæ epotum na-  
pellum consequuntur. Succurritur his, ut cæ-  
teris, primum vomitionibus, epoto, butyro  
excitatis. Postea dandus sinaragdi pulvis ex  
vino dimidij scrupuli pondere. Quin & pista-  
cia profunt, & pontica nuxes in cibis largius  
sumptæ. Ad hæc vniuersum corpus inungi præ-  
fatis, oleo è citri semine expresso. Item the-  
riaca proficit ex vino pota duarum drachma-  
rum pondere. Migna quoque insert incom-  
moda quadrupedum quorundam *S V D O R*,  
præsertim equi, asini, & muli, quibus etiam  
cæterorum sit malus. Is igitur potus viridem  
rumidamque reddid faciem: sudorem fati-  
dum in vniuersum excitat corpus, præsertim  
sub alis. Perturbat præterea tum ventriculum,  
tum alium vniuersam, genitis excitatisque  
flatibus in intestinis. Quod si bibatur ex vino,  
desiderium facit. His repidam largius præben-  
dum feribunt, ut concitato inde vomitu pul-  
uerulentus sudor reiciatur. Post vomitum con-  
fert vinum cum rosaceo potum: item rhabar-  
barum semidrachmæ pondere sumptum, ad-  
ditio fossitij salis momento, tamen si propria hu-  
iusce sudoris antidotus ea sit theriaca (ut Aui-  
cenna est author) quæ ex Lemnia sphragide,  
& lauri bacis conficitur, cuius componendæ  
rationem paulo superius retulimus, de Par-  
di selle differentes. Venenosum aquæ ac lethi-  
ferum aiunt esse etiam *CASTOREVM*,  
quod iam putredine nigredinem contraxit, vel  
illud potius, quod è Ponto fuerit allatum.  
Hoc enim (ut Strabo inquit) venenosum est  
propria sui natura. Animaduertant igitur tum  
seplasiarj, tum medici, cum plurimi vsus sit  
medicamentum, ne malum exhibentes casto-  
reum, aliquem interimit. Quandoquidem  
non modo iure aguntur, qui hoc medica-  
mentum hauserint, sed etiam intumescentem  
linguam exerunt, æque tam sæpe febre cor-  
sipiuntur, ut vix tantum ferè die intereant.  
Aduersus hoc venenum mirum in modum iu-  
uant vomitiones, quas toties butyro, & hy-  
dromelite epotis citare convenit, quod nul-  
lum ea, quæ reiciuntur, castorei odorem re-  
ferant. Post vomitiones conducit diaphanum  
potum, aut simonum, aut citrei mali succus  
saccharo admixtus. Verùm peculiariter huic  
castorei antidotum est coriandri semen to-

stum, drachmarum duarum pondere sum-  
ptum.

EAC INTVS COAGVLATVM.

CAPVT XXVI.

Eos, qui coagularum lac hause-  
runt, frequens illico strangulatio inua-  
dit, quod in globulos quosdam lac coa-  
lescat. Quibus iuuandis pro antidoto,  
coagulum ex aceto damus, & bibere  
sæpius cogimus. Damus & calaminthæ  
folia arida, item succum: aut laserpitij  
radicem, aut laser cum poscat'hymum  
quæ ex vino, & cum luto suo lixiuiam.  
Sed nulla falsitago obiciatur: quoniam  
magis lac coiret, & in cascum densare-  
tur. Neque illos vomere conuenit: si-  
quidem concretum lac sese in gulæ an-  
gustias insinuans, strangulat.

CREDIDERE quidam Dioscoridis inter-  
pretes, authorem hoc in loco de eo coagulo *gulas* com-  
lacte differere, quo frequenter in cibis vitmur, *sideratio*.

E quorum numero fuit Ruellius, & Man-  
dus Ferrariensis ea epistola, in qua vniuersam  
Marcelli interpretationem corrigid. Sed ij alio-  
qui viri eruditissimi, in hoc hab dubie fallu-  
rur, meo iudicio. Siquidem lac ea ratione coa-  
gulum, nutrit, non autem strangulat, ut om-  
nes in vniuersum homines testari possunt, sed  
præsertim ij qui in montibus degunt, cum Ma-  
io, & Iunio mensibus huic semodi lactis plu-  
rimum deouent. Ideo nil aliud nobis asseren-  
dum esse putauerim, quam quod de eo tantum  
lacte intellexerit Dioscorides, quod cum ad-  
mixto coagulo bibitur, antequam coalescat, ita  
ut intus, non extrâ coagulum sit. Quo factum  
est, ut in hoc à Ruellij interpretatione in aliam  
desiuerimus & hic, & in huius libri præfatio-  
ne prope calcem. Magis enim Dioscoridis sen-  
tentiam exprimi censemus, si lac intus coagu-  
lum, vel (ut Marcellus) lac cui coagulum  
admixtum sit, vertantur verba illa *gulas* *intus*  
dic. Nam quod iam coagulum esset, non mag-  
no labore coquatur, ac digerunt, transijt in  
nutrimentum. Illud verò, quod ubi coagulum  
ei admixtum sit, subinde hauritur, prusquam  
coalescat, cum aliquantisper in ventriculo refe-  
derit, vi admixti coaguli illico inibi concreuit,  
sitq; concoctis facultati adeo contumax, ut su-  
perato caloris robore strangleat, non secus ac  
taurinus sanguis. Proinde affert Dioscorides,  
tauri sanguinem minime suffocare, nisi recens  
calidusq; è iugulati tauri venis defluxus biba-  
tur, antequam concreuerit. quandoquid è non  
crecat

*Cauda cer-  
ui Vene-  
num, &  
cuius cura-  
tio.*

*Sudor in  
animali-  
bus Vene-  
num, &  
remediu.*

*Castorei  
Virus, &  
cuius cura-  
tio.*

enecat aliqua propria veneni facultate, sed concretionem tantum, quam in ventriculo consequitur. Id quod evidentissimum est in epoto lacte, cui admixtum sit coagulum: aut in eo quoque, quod sine coagulo bibitur, & per se aliis de causis in ventriculo coalescit. Euenit enim quandoque hoc, cum lac bibitum crassius fuerit, & ventriculi, & icoris temperatura calida, & sicca nimis. Nam ingens horum viscerum tum caliditas, tum siccitas, consumpta breui lactis humiditate, reliquum, quod crassum est, facile coigit, & conpissat. Quinetiam illud idem ingenti fit frigidityte: nimirum expresso ab ea, quod tenuius est partium, reliquum, crassioris substantie facile congelascit, haud secus quam de glacie, & niue fieri libro quarto meteororum tradidit Aristoteles. Quamobrem est Galeni consilium libro tertio de alimentorum facultatibus, vt nemo lac potaturus ipsum bibat, nisi mellis, aut salis tantillum prius admisceat, ite in ventriculo concreseat. Sed non propterea mirari licet, quod Dioscorides scripserit, lac concretum in ventriculo habentibus nihil salis salisve esse offerendum. Quippe quemadmodum coagulum primo lac coagulat, contrariumque deinde efficit, si iam concreto lacti superaspergatur, ita sal prius lacti commixtum, id concretum prohibet, mox contrarium effectum præbet, si iam concreto aspergatur. recens enim caseus sale resperfus, illico duritiem contrahit. Sed iam ad curationem accedamus. Eadem autem erit lactis in ventriculo coagulati curatio, quæ sanguinis tauri, quando is tantum sit vtendum medicamentis, quæ suapte natura concreta liquant, & discutiunt. Qua in re auxilium præstant ipsa coagula, acetum, præsertimque feicillum, lixiuium, & ea omnia, quæ incidunt, & disgregant. Porro illud non prætereundum, quod lectio esse arbitror, quod vbi in hoc capite legitur *castigata. regis tibi videtur in scriptis non esse*, id est, & figlinam lixiuiam, Gesnerus in primo suo de animalibus tomo, de taurio agens, legendum rectius putat *regis tibi videtur in scriptis non esse*, hoc est, & pilopceorum lixiuiam: reprehenditque in hoc Cornarium, quod putauerit figulos ad lutum lauandum sibi lixiuiam conficere. Sed mihi, vt ingenue dicam, magis placet Gesneri, quam Cornarii opinio. siquidem cum figlinum lutum nunquam lixiuiam lauari aut parari audierim, viderim, aut legerim, veritati consonum non videri, vt de figlina lixiuiam intellexerit Dioscorides: sed de ea potius, quæ ad lanam expurgandam, vt in insectis magis idonea reddatur, vtuntur pilopcei, hi sunt, qui pileos conficiunt. Eorum nanque lixiuiam, quod est combusta vini fæce plerumque fiat, ea quæ ad caput capillosque abluendum communiter paratur, acrior, fortiorque efficitur: & proinde ad lac dissoluendum in ventriculo coagularum, est longe valentior. Error præterea facilis esse potuit librariorum, ex vnius duntaxat literæ variatione, pro scri-

bentium. *videtur enim per scriptum*, lutum significat, vnde *καταλάβω*, & *καταλύω* aliqui figulum interpretantur: *καταλύω* autem per *τ*, artifex est, qui pileos ex lana conficit. Hac itaque ratione putandum fuerit, *καταλύω*, non autem *καταλάβω* in Dioscoride hoc loco esse legendum. Cæterum Fuchsius in suis doctissimis annotationibus in Nicolaum Myrepticum ea sectione, in qua de vnguents tractat, capite x x v i i i. nil aliud hanc lixiuiam esse putat, quam aquam quæ lutum lauerit, vel per lutum transferit, non autem cum cinere, & calce factam. Sed cum figlinum lutum potius adstringat, contrahatque, quam laxet, ac digerat, nesciuerim profecto, qua ratione is eam lixiuiam esse tali luto confectam, iis potandum daret, quibus lac in ventriculo concreuisset.

# ARGENTI SPUMA.

## CAPVT XXVII.

SPUMA argenti pota, stomacho, ventri, & interaneis grauitatem cum magnis torminibus adfert, & nonnunquam pondere suo intestina vulnerat, vrinamque suppressit: corpus intumet, plumbeamque deformitatem concipit. Quibus subuenit secundum vomitionem, potum syluestris hormini semen, myrrhæ drachmæ octo, absinthium, hyssopum, apij semen, aut pipper, aut ligustri flos ex vino: aridum palumbis simum, cum nardo & vino.

POTA argenti spuma, cuius historiam libro *Spuma argenti* quinto tradidimus, lethifera (vt Dioscorides inquit) adfert incommoda. Sed præter hæc, Aëtio, & Auicenna authoribus, alia etiam eueniunt mala. nempe compaginum, & articulorum incendium, seu ardor: alui suppressio, quam uis quandoque ex accidenti alius ipsa deiciatur: sermo item præcipitur, & sedis intestinum prominet: postremo inualecente malo ægri suffocati moriuntur. Nicandro verò in alexipharmaco auctore, iis qui argenti spumam sumperint, alui molestia accedit: quin & status sese reuoluentes per medium ventrem, & iuxta umbilicem marmurant, instar torminum curato difficiliorum, quæ hominem affligant duris eum cruciatibus impetentes. Nec iam vrinæ eiciendæ patet exitus: membra totius passim corporis ardent, planæque iam plumbeum, seu liuidum colorem induerunt. hæc ille. Cæterum illud animaduertendum est, quod vbi in hoc capite legitur, dandam esse myrrham octo drachmarum pondere, non deest suspicio, quin ea lectio sit deprauata, quod hæc myrrhæ nimia videatur esse quantitas. Auget suspensionem Nicæder, qui duos tantum myrrhæ obolos exhibet, toridem

Lactis in  
ventriculo  
coagulati  
siccuratio.

Dioscorides disgregant. Porro illud non prætereundum, quod lectio esse arbitror, quod vbi in hoc capite legitur *castigata. regis tibi videtur in scriptis non esse*, id est, & figlinam lixiuiam, Gesnerus in primo suo de animalibus tomo, de taurio agens, legendum rectius putat *regis tibi videtur in scriptis non esse*, hoc est, & pilopceorum lixiuiam: reprehenditque in hoc Cornarium, quod putauerit figulos ad lutum lauandum sibi lixiuiam conficere. Sed mihi, vt ingenue dicam, magis placet Gesneri, quam Cornarii opinio. siquidem cum figlinum lutum nunquam lixiuiam lauari aut parari audierim, viderim, aut legerim, veritati consonum non videri, vt de figlina lixiuiam intellexerit Dioscorides: sed de ea potius, quæ ad lanam expurgandam, vt in insectis magis idonea reddatur, vtuntur pilopcei, hi sunt, qui pileos conficiunt. Eorum nanque lixiuiam, quod est combusta vini fæce plerumque fiat, ea quæ ad caput capillosque abluendum communiter paratur, acrior, fortiorque efficitur: & proinde ad lac dissoluendum in ventriculo coagularum, est longe valentior. Error præterea facilis esse potuit librariorum, ex vnius duntaxat literæ variatione, pro scri-

*Spuma ar-  
genti con-  
ratio.*

totidem exhibet Aëtius, Auicenna verò tres drachmas non excedit. Curatio in vniuersum fit citatis primùm vomitibus, & infusus deinde clysmatibus (vt Conciliator tradit) ex hydrome lre, galinarum, & anatum adipè. Post hæc prodest amygdalinum oleum potum è dulcibus nuciis expressum. Conferunt item caricæ in cibis sumptæ: præterea vètriculum apij succo, & alium butyro illinire vtile est. Proprium verò huiusce veneni antidotum (vt idem ait) est lachryis semen duarum drachmarum pondere potum. Veruntamen cùm hoc facultatis admodum deiectionis sit medicamentum, drachmam ego non excederem. Eadem quoq; infert mala

*Plumbi co-  
bis noxa, & re-  
crematio.*

PLUMBI SCORS tenuissimè contrita, & iisdem pariter curatur medicamentis. Siquidem argenti spuma nil aliud est, quàm plumbū argenti, aut aeris recremento cōmixtum. Nec delecteria vi vacant (vt auctor est Auicenna)

*Ferri sco-  
bis, & qua-  
ma, & re-  
crematio no-  
xa, & con-  
ratio.*

FERRI tum scobis, tum squama, tum recremento, tamen omnia hæc prius diutius acetō macerata nulla prorsus molestia in medicum veniant vsū, denturq; potanda dysentericis, mulieribus vteri defluxione tentatis, & in ele- gmate ad lienis infarctus, itemq; ad enterocelas.

Sed de his vel nō inframatis, vel plusquàm par sit sumptis, fortasse intelligit. Auicenna. Itaque excitatur ab his intestinorum cruciatus, oris & lingue scabrities, aestuatio vniuersi corporis, capitis dolor, marasmus, & membrorum omnium arefactio. Succurritur noxæ potu lactis recenter multum subinde dactis alui valenter soluentibus medicamentis, secundum quæ butyrum tandiu potandum dare oportet, donec intestinorū dolores amoueantur. Hæc dum fiunt, perfundatur eorum caput oleo rosaceo, violaceo, & è nymphææ floribus parato. Tollitur deinde adueniens marasmi intèperies, & corporis vniuersi arefactio, demersis in balneo laborantibus, in quo testudines, ranæ, & malux folia inferuerint: quinetiam clysteribus ex pedum hædorum iure, aut alexææ radicum decocto: item butyro largiùs in cibis fumoro, & epotis pinguium carniū iuribus. Sed (vt idem Auicenna scribit) proprium huiusce ferrei pharmaci antidotum, est lapis magnes drachmæ pondere potus, ex mercurialis, vel betæ succo. Veruntamen hoc haudquaquam fieri posse videtur absq; manifesto fumumzūm discrimine. quod quidē et si magnes suapte natura ferrum trahat, nō tamen affirmauerim, quod hanc ob causam eius quoq; destruat facultates, & impediat noxam, sed potius quod eam augeat crediderim. Quippe cū magnes sit facultatis, adeo vt eos, qui hauserint, lunaticos, & melancholicos efficiat, eum haudquaquam ore sumendum esse duxerim. His itaque, qui Magnetem sumperint, commendant quidam auri tenuissimam scobem ex vno potam, & sinaragdorū ramenta eodem pondere.

*Magnetis  
venefica  
vni, & au-  
xilia.*

Laudant etiam clysteres ex lacte, & dulciū amygdalarum oleo infusus. Sed cæteris præferunt sinaragdam ter nouem diebus potum, tribus semper intermissis diebus. Lethifera & non parum formidanda est etiam AERIS SQUAMÆ vis. Ea siquidem pota, intolerabiles alui defluxiones mouet, aut noxias vomitiones concitat, obortis inde molestissimis alui, & ventriculi punctiōibus. His auxiliantur citatæ primùm vomitiones: deinde ægri in balneū mittendi sunt, in quo hircorum confuerint capita, aut ingens coctilearum numerus. Prodest & menhæ succus potui datus: insuper aluum, & ventriculum calido rosaceo perungere expedit. Verum ad hoc præ cæteris pollent acori radices trium drachmarum pondere potæ, aut earum succi tantandē. Sed nobis acori succum dare perdifficile fuit, cū legitimum in nostris nō proueniat regionibus, nec nisi siccum afferatur. Lituanii tamen, & Tartari eo abundant, vt superius libro primo prodidimus.

ARGENTVM VIVIUM.  
CAP. XXVIII.

ARGENTVM viuū potum eadem quæ spuma argēti infert, eisdemq; vt eadem auxiliis. Iac copiosè potum auxiliari constat: sed postea euomant, qui hauserunt.

VRAM omnino & exquisitam argenti viui cognitionem non habuisse Dioscoridem & Galenum, illud maximo indicio esse videtur, quod hic paucis, ille verò perplexè eius historiam, & facultates tractauerit. Hoc, vt in præfationis huiusce voluminis commentario tradidimus, interimit, si largius bibatur, excessu sum me frigido & humido. Putrefacit enim hoc exuperante temperamento innatum cordis humorem, ac subinde congelat sanguinem, vitales spiritus, & ipsam denique cordis substantiam, quandoquidem id medicis experiētia comperit est, vt Conciliator testatur reliquit. Nam cū seplasiarius quidam ardentissima febre correptus, sibi intolerabili vexaretur, & delirio oberrans in pharmacopolium descendisset, vt aliquid ad potandum inueniret, fortè fortuna in argenti viui vas incidit, multumq; ex eo potauit, aquæ fortasse vice: postea statim in itum cubiculū se recepit, vbi paucis post horis cōgelatus interit. At cū eius domesticus sui cadauere magnam argenti viui quantitatem inuenisset, iam per sedem egressi, aduocarunt medicos, vt eius rei, quam miraculū existimabāt, diligenter causam inuestigarent. Ii statim ex pharmacopolio argenti viui vas adierit iusserunt, quod vbi ferè vacuū reperissent, rem vti se habuerat deprehenderunt: auxitq; fidem, quod euiscerato homine, adhuc argenti viui libram in eius ventriculo inuenerunt: quin & sanguinem

*SQUAMÆ  
arui lethi-  
fera & cū  
remedia.*

*Argēti vi-  
ui pernici-  
cia nō  
trahit.*

circa cor concretum. Quo argumento palam fit, magno admodum recessu frigidum esse argentum vivum. Verum enimvero in eius curatione illud inquirendum est, an purū sit quod potū fuerit, an salua alioue liquore extinctum, aut acerrima aqua, qua chymistæ vtuntur, aut per se tantum præcipitatum, aut vnā cum arsenico, vel chalcantho sublimatum, cum enim aliud alio perniciosius habeatur, propriū quodlibet exig' remedium. Perniciosius est sublimatum: secundum hoc præcipitatum: proxime sequitur quod salua, aut aliquo liquore fuerit extinctum: minus verò cæteris nocet, quod purum, viuūque fuerit: vt ipote cum fluidum admodum sit, & ponderosum, non difficiet clysteribus extrahitur. Id quod cæteris generibus non euenit, quæ cum ventriculo inhæreant, illum facili erodunt, & exulcerant. Argento viuū puro, aut extincto, aut præcipitato epotis, eadem consequuntur symptomata, quæ argenti spuma pota infert, sed cum magno anhelitu, foetore, quem & ij respiciunt, qui Gallica lue affecti eo illinuntur. Quod maximum præbet indicium, quod sua exasperante humilitate, omnes humores, qui ventriculo aliisq; circumstantibus partibus hæserint, computrescere faciat. Cæterum epoto sublimato, illico lingua, & fauces non aliter exasperantur, quàm si quis immaturorum sorborum succum hauserit. Quod sane incommodum nullo lenientiū gargarizatu, nisi difficilē, & longo tempore tolli potest. Id enim quam primum in ventriculo descendit, ej perinatior inhæret, quæ & statim erodit exulcerat: tum inextinguibilem scitum excitat, & inexplicabilem angustiam inducit. His succedit lingue tumor, animi deliquium, vrinæ suppressio, anhelitus difficultas, & vetriculi, & intestinorum tormina, tam vehementi erosione, vt nisi confestim succuratur, pereant affecti, erosio, perforatisq; ventriculo, & intestinis. Purum curatur (vt Dioscorides, Aëtius, & Paulus memoriæ prodiderunt) auxiliis, quibus argenti spuma: nam nisi copiosius ebibatur, non interficat, quod ob sui tum pōdus, tum fluxilem substantiam facili per inferna secedat, nulla in ventriculo, & intestinis protrahat mora. Ex quo nil mirum, quod scripserit Auicenna, nō deesse qui bibant argentum viuū, & nullam inde sentiant noxam, quod facili labatur ē corpore, dūmodo qui hauserint, continuē huc atque illuc deambulent. Goritenses mulieres agrę parturientibus vltimo remedio, argētum viuū potandum præbent, scrupuli pondere. Nec desunt qui ad intermedas aluitineas, pueris etiam propinet, ad duorum granorū nulliq; quantitatē, citra nullam molestiam. In aliorum autem curatione alia requiruntur remedia, nempe clysteres, vomitiones, pingua in potu sumpta: & vt in viciū sum dicam, his opem ferunt omnia medicamenta, quæ venenis erodentibus cōueniunt, quorū latus superius me minimis in cantharidum curatione, ad quam breuitatis studio

lectorem relictimus: namq; iis efficaciora nō plura hæctenus nobis comperta sunt. Nec aliis vtrūq; est remediū, vbi quæ cinnabarin sumpsisset,

CALX, SANDARACHA,  
AURIPIGMENTVM.  
CAP. XXIX.

CALX, sandaracha, & auripigmentum, pota aluum, & intestina cum vehementi erosione excruciant. Præbenda cuncta, quæ suo admistu illorū acrimoniam hebetar, ac soluunt, & facilem lubricamque aluum reddunt, cuiusmodi ibici. & malux succus est: natura enim vtriq; perlubrica. Dandum decoctum seminis lini, vel semen tragi herba, vel oryza, lācque cum aqua mulla copiosum, iura pingua, & boni succi.

No s modò Calx, Sandaracha, & Auripigmentum, quorum historiam superiore libro tradidimus, hausta vehementissimos ventriculi, & intestinorum cruciatu, & erosiones excitant, vt Dioscorides inquit, sed etiam sitim inexplicabilem, faucium, & gulæ asperitatem, tussim, spirandi difficultatem, vrinæ suppressionē, & dysenteriam. Cæterum hæc omnia adiuuantur (vt scit docet Dioscorides) pinguius acrimoniam obtundentibus, & potionibus lenientibus, aluumque lubricum reddentibus, tum etiam cremoribus, atque seminum quorundam spissamentis, vt in cantharidū curatione latus, diffusiusque prodidimus. quadoquidem medicamentorum omnium erodendum curatio à cantharidum curatione non differt: neque iis sanē valentiora nobis sese offerunt remedia. Quare ex eo loco illa medicamenta petenda erunt iis, quibus vsurata sunt. Eisdem quoque effectus malos, & noxios præbent ARSENICVM sublimatum, Aerugo, & quod officinæ Risgallum appellant: quin & Saponis lixiuium, quod vulgō vocant Itali la matra, & Aqua ea omnium acerrima, qua aurifices, ac chymistæ aurum ab argento separant. Sed aqua huius, & lixiuij difficilis est cura, quod illico in totum diffundantur corpus. Vniuersis tamen curandi ratio eadem erit, quæ calcis, & auripigmenti: tamen alterum altero sit vehementius, & erodentius. Qui autem prius Arsenicum sublimatum hauserunt, eos frequenter vomere oportet, poto semper prius butyro, aut per se tantum, aut addito rapifemine decocto. Pro sunt his & clysteres ex pingui iure, aut præsente alitacū cremore, aut spissamentis ex psyllij, malux, & cydoniorum semine factis. Auxiliatur amygdalinum oleum, & ius pinguium gallinarum in cibis sumptum.

In præ

Argenti  
vivi sum-  
ptura.

Arsenicū  
sublimatū.  
& aliorū  
quorundā  
venenorum.

Arsenicū  
sublimatū  
curatū.

In præstantissimum verò antidotum censetur  
fossile crystallum, in tenuissimum puluerem  
contritum drachmæ pondere, ex dulci amy-  
gdalyno oleo potum. Porro **AER YGO**, præ-  
ter alia eius mala antè dicta, adeò spirandi me-  
tus occidit, vt magno impetu suffocet affec-  
tos. Succurritur noxæ crebris cum butyro, &  
calida excitatis vomitibus, vt in arsenico, & in-  
fusus subinde clysteribus ex asinino lacte, & dul-  
ci amygdalino oleo. Prodest & Lemnia sphra-  
gis drachmæ pondere ex vino albo pota. Præ-  
stat item in olei baineum laborantes ad ventri-  
culum vsque demittere. Sed proprium huiusce  
pharmaci antidotum (vt ait Concliator) est,  
vt qui hauserint, bibant ex vino corallia rubra  
in tenuem puluerem contrita fenorum scrupu-  
lorum pondere. Cæterum **RI SAGALIO**  
vulgo dicto, quod quidam Realgal appellant,  
cùm maximè extremæque siccet, & nervos con-  
trahat, non alia conuenit curatio, quàm quæ  
argento viuo, & arsenico sublimatis, & ærugi-  
ni adhibetur. quanquam priuatim non obscurè  
inuaz vniuersum corpus dulci amygdalino illi-  
nere, & violaceo iulapio, & pitana hordeacea  
sicim extinguere. Proficet & pinorum nucleo-  
rum oleum, aut è magnis nucibus, quæ ex In-  
dia aduehuntur, expressum, semilibræ pondere  
potum. In summa ea omnia efficaciter adhi-  
bentur, quæ cantharidibus conferre diximus.

**LEPVS MARINVS.**  
**CAPVT XXX.**

**QVI** leporem marinum biberunt,  
piscium virus olent: procedente tem-  
pore, alius dolore afficitur, & vrina si-  
stitur: & si quando eam reddere con-  
tingat, purpureum colorem referet. o-  
mne piscis genus auersantur, & odio  
habent: foetidus, ac graui sudore ma-  
nant: biliosus vomitus, interdum san-  
guini promiscuus, subsequitur. His  
dandum lac asininum, vel passum con-  
tinuè, aut radicis maluæ foliorumque  
decoctum, aut trita cyclamini radix  
cum vino, aut veratri nigri, aut scam-  
monij succi drachma, cum aqua multa,  
punicique mali acinis. Cedria contrita  
cum vino efficax est: asnerinus sanguis,  
vt tepebit, potus. Sed cùm pisces om-  
nes respuant, aspernenturque, solis flu-  
uiatilibus cancris vesci possunt, bibunt  
que eos admisto vino, adiutique ab his  
percoquunt, cùmque appetere & com-  
esse pisces cœperint, suæ salutis indi-  
cium habent.

**DIXIMVS** de Lepore marino libro *Leporis*  
cundo, de quo ita scribit Nicander in alexi-  
pharmacis. Sin marini leporis malè perdentis *marini*  
potionem deprehenderis, perniciosè afferen-  
tem, odorem eius senties, qualis est squama-  
rum, & piscium purgamenti. Porro gustus, &  
sapor eius pisciosus est, qualis putrescentium  
piscium esse solet: vel cùm nondum abluorum  
squamæ polluant corpus. Sequitur huiusce po-  
tionem viridis fellis suffusio, cùm obtenebra-  
tione visus: & caro paulatim in homine conta-  
bescit. Accedit his ciborum omnium abomina-  
tio, malus habitus, & talorum ardor: oculi in  
concauum occultantur, & genæ ac maxillæ flo-  
rido colore rubent. Vrina ægerrimè redditur:  
quæ tamen si reddatur, purpurea appareat, & plus  
æquo sanguinea. Ad hæc si pisces agris offeran-  
tur, eos illico nauseabundi execrantur. hæc ille.  
Cui subscribunt Aërius, & Aëuenna, qui præ-  
ter relata indicia, alia adhuc lepori marino epo-  
to assignant, his verbis. Marinus lepus adeò icte-  
rum inducit, vt totius corporis habitus croceo  
admodum colore inficiatur. Postea facies liuens  
intumescit, pedum plantæ incendantur, adeò  
spirandi difficultas, pectoris & pulmonis angus-  
tia, rufescentique oculi. Dehinc tussis emergit  
seca, spiritus eruentus, renum dolor, virilium-  
que inflammatio, adeò vt perpauci eudant, qui  
non labantur in tabem. Quare Galenus libro  
de theriaca ad Pisonem, proprium marini le-  
poris esse ait, vt pulmonem exulceret, & ero-  
dat. Succurritur noxæ (vt Dioscorides inquit)  
asinino lacte ex passo potu, & maluz decocto.  
Neque id aliam ob causam, vt Aërius declarat,  
quàm ad eliciendum vomitum, & veneni acui-  
tatem recundendam, quemadmodum esse bo-  
rum, cyclaminum, & scammonium exhibet, par-  
tim ad citandas vomitiones, partim ad alium  
deiciendum. Cætera verò, vt incommotis sub-  
ueniatur, quæ internis insect particulis. Præ-  
fertur quibusdam aduersus hoc malum huma-  
nus sanguis caleas è venis potus: humanum  
item lac, ab ipsis vberibus exuctum, & vulpis  
caro inassata: quin & theriaca diatesseron tri-  
bus diebus pota.

**RVBETA, ET PALVSTRIS RANA.**  
**CAPVT XXXI.**

**RVBETA**, aut rana palustris assum-  
pta tumores ciet: pallor corpus vehe-  
menter decolorat, vt planè buxum  
spectetur: spirandi difficultas torquet:  
& grauis halitus oris, singultusque, in-  
uita interdum genituræ profusio con-  
sequitur. Adiuuantur secundum vomiti-  
onem multo meri potu, & arundinis  
radicis binis drachmis, aut cyperi tori-  
dem. Breuiter, cogendi sunt, vt vehe-  
ment



menti ambulationi & cursui se credât, ob torporem, quo corripuntur. quin etiam quotidie lauari sunt.



*Rubeta.  
palustris.  
quo rana  
venenosa.*

**RUBETA** Ranz, quam quidam bufonem vocant, diuersa reperiuntur genera. Terrestris tamen, quæ Græcis phrynos dicitur, Latinis vero rubeta, quod in frutribus & sepibus inter rubos degat, nocentior, magisque lethifera est, quam quæ in paludibus, & aquis serobibus viuit (id quod non rectè, meo iudicio, intellexit Aloysius Mundella, Brixianus octaua sui voluminis epistola, tantoque magis noxia, lethiferique fuerit terrestris, quanto in opacioribus, frigidioribusque locis vitam duxerit. Quamobrem in hoc genere ex omnium pessimæ creduntur, quæ in vmbrosis conuallium syluis, & in harundinetis morantur. Adultæ crassa tenacique continguntur cuti, adeo vt acutissimo palo quandoque difficile à rusticis, qui ita eas interficere solent, perfodantur. Hæc cum circumnascens herbas, siue aliquod depascens animal, veneno inficere volunt, contrahunt sese in tumorem, vt venenum per vrinam longius eiaculentur in plantas, & circumstantes quadrupedes. Quare admirari non licet, si nonnunquam repente interimant homines, qui frage, fungos, aliisque plantas harum veneno infectas inscijs deuorauerint. Quippe quod non modo veneni mîxi hæc omnia inficiunt, sed etiam salua ea sæpius conspuunt: quæ sanè non minus mortifera est, quam napellus, quoniam earum sanguis viperæ scæret veneno. Proinde mirum non est, si in puluerem potæ mortifiera inferunt incommoda, quemadmodum & morsu. Nam et si dentibus careant, tamen compressa scabris gingiuis particula, & subinde ingressa per curis pericula salua, demorfo venenat, vt in præfationis huiusce libri commentario tradidimus. Sicca & in puluerem potæ, vt Auicenna refert, præter mala quæ à Dioscoride redduntur, faucium, & gutturis tum inflammationem, tum scitatem excitantem oculorum caliginem, vertigines, cõuulsiones, dysenteriam, fistidum, vomitus, animi deliquium, delirium, amentiam & plerumque edentulos faciunt homines, quam uis euadant, qui hauserint. Nec minima etiam pericula adferunt fructus, & herbe earum veneno infectæ, & epocus earundem sanguis. Cu-

*Rana m.  
leuca si-  
gilla & m.  
rasp.*

rantur iis malis affecti theriaca, vel Michridatis antidoto tribus continuis diebus ex vino potis. Idem præstat testudinis marinx sanguis, additis cumino, leporis coagulo, & vino. Datur potanda præsentaneo remedio quinta essentia nostra theriacalis. Quin & oleum nostrum de scor pionibus exterius commodè inungitur. Præfert Conciliator smaragdî puluerem ex vino potum scrupuli pondere, cum eo tamen, vt subinde intret ager nudus in muli recenter exenteratum, inibique conclusus moretur, donec deferuescat cadauer, totisque sic exenteratum mulum aut equum, si mulus non addit, permuet, donec effuso diutius sudore cedat noxa. Acutus mulis, & equis parcens, in clibano, quantum tolerari possit, calidissimo affectos, vel alio in loco arte calefacti deimendos ad sudandum iubet, quemadmodum curantur aqua inter ceterum laborantes. Quorum medicamentum curatioque, vt Auicenna est author, hoc in negotio non parum conueniunt. Proinde prodest iis maxime rhubarbarum, diacurcum, & dialacæ confectio: tamen conciliator lapidem his omnibus præferat, qui in eorum capite reperiri solet.

## HIRUDO

## CAP. XXXII.

**DEVORATAE** cum aqua hirudines, si ori ventriculi adherent, tractione partium, nonnullam suctionis imaginem præbent: eo enim argumento hausta hirudo deprehenditur. Has muria sorbitione excutit, & Cyrenæicus succus, aut laserpitij folia, aut betæ, cum aceto, aut pota niuis glebula, cum posca, nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum sutorium aceto dilutum. Si faucibus hæreant, in aquam calidam ingressis, aqua frigida ore contineatur, & ad eam hirudines exilient.

**HIRUDINES** raro in aliis aquis inueniuntur, quam in palustribus, lacustribus, & stagnantibus: quandoquidem in probatissimis fontibus, & arenosis, & fixosis fluuiis non nisi rarissime viuunt, cum suapte natura cæno, ac limo delectentur. Quamobrem caueant, qui palustres, vel stagnantes aquas bibunt, ne hirudines simul ingerant, quemadmodum inexpertis viatoribus nonnunquam euenit. nanque æstatis tempore calore, & siti defatigati, dum aquam, cuiusque in itinere obuierint, auidè potant, sæpe imprudenter hirudines hauriunt. Quo fit, vt subinde non modo sibi sanguinem exugî sentiant (vt tradidit Dioscorides), sed etiam (vt Auicenna inquit) cruenta expuant, ac præ timore melancholici fiant. Verum an

*Hirudinum densitas noxa.*

*Hirudinis curatio.*

teaquam aliquod offeratur medicamentum, inuestigandum est, an animal ori ventriculi, an gulae adhaerit, an ipsis faucibus. Id quod facile intelligi potest ex eorum, qui hirudines hauserint, relatione: quoniam ubi suctionem sentiunt, nimirum ibi hirudinem fixam esse significatur. Quod si ori ventriculi affixa fuerit, auxilium praestat muria leniter epota, foetida item laserpitij lacryma, quin & lixiuum cum sale & aceto, aut raphani domestici succus cum aceto, aut oleum crudum haustum, quod per se tantum hanc interficit animalia. coferunt insuper ea omnia, quae alui tineas, & lumbricos necant. Si vero guttur mediū ab hirudine obfideatur, proderit acris lixiuum gargarizare, aut aquam, in qua alumen cum aceto infuerint, vel calchanthum, aut muriam cum lixiuo, aceto, & sinapi simul commistis. Sed si ea faucium ambitui haereat, opem mirifica feret (vt Dioscorides docet) casidæ balneum, aqua frigida in ore contenta. Si quidem hirudo ab aquae calore propulsata, ad frigidam in ore contentam decurrens, facile vna cum ipsa aqua expuetur. Interdum contingit, quod statim sub linguae radicibus, vel in primis faucium partibus adhaerescit, ita vt depressa lingua videri possit: tunc rostratis forcipibus facile extrahi poterit, vel quouis alio instrumento, quod cuique in promptu fuerit.

VERATRVM ALBYM, THAPSIA,  
ELATERIVM, AGARICVM  
NIGRVM. CAPVT  
XXXIII.

PROVIDENDVM etiam iis, quae etsi ferendi auxilij gratia tradantur, non minora tamen ceteris venenis pericula sapius adferunt. Qualia sunt album veratrum, thapsia, elaterium, agaricum nigrum: siquidem ea strangulatus concitant, aut immodicas deiectiones mouent. Quibus ea medentur, quae in fungorum mentione, & similibus retulimus. Nimios autem deiectionum imperus, medicamentis, quae excrementa supprimunt, coerebimus. Neque negligenda quae parum quidem nocere videntur, interim verò vitam in discrimina agunt. Quo in numero sunt syluestris ruta, gith, nouae glacies, pappi recentes: flores autem sunt eius spinæ quae cactos dicitur. Eos qui sumperint, sola vomitio recreat.

EXTANT quàm plurimi Dioscoridis codices, in quibus caput hoc de Veratro albo, Thapsia, Elaterio, & Agarico nigro, à præcedenti capite seiunctum, non legitur. Verum cum antiquissimus manu scriptus codex, hæc proprio, & peculiari capiti dicauerit, videaturque absurdum de his dissuasis Dioscoridem vnâ cum hirudinibus, cum quibus nullam habent cognationem, neque isdem curantur remediis, non temere facturos duximus, si illa à nobis seorsum proprio capite ab hirudinibus distincto, tractarentur. Sciendum itaque est, quod cum hæcenus scripseret Dioscorides omnium venenorum indicia, quæ pota, vel deuorata homines necant, vel saltè agros efficiunt, quin & vniuersalia & particularia antidota tradidisset, quibus illorum vis frangi, ac destrui posset, cum præterea sciret aliqua in medicum vsum haberi medicamenta aluum ducentia, quæ simpliciter pota, & nullis antidotis infranata, vel maiori mensura, vel pondere, quàm par sit sumpta, non minus homines interimunt, quàm quæ propriè venena vocantur, medicos illud hoc loco admonere voluit, quod in propinandis hisce medicamentis minimè cæcutiant, sed in hoc omne suum studium, omnemque diligentiam impendant. Verùm quauis, inter ea omnia, quæ in medicum vsum veniunt, paucorum tantum meminerit, nempe thapsia, albi veratri, elaterij, & agarici nigri, non tamen ob id fuerit insimulandus, quod nesciuerit præter hæc, alia plura esse medicamenta, quæ noxam inferre possunt, aut maiorem quàm illa, aut æqualem. Quippe quod illi satis visum sit, si tantum horum exemplo imperitos medicos discrimen, noxamque docuisset, quæ omnia in vniuersum medicamenta aluum cum labore ducentia plerunque sumentibus adferunt, cum (vt modò diximus) vel largius quàm deceat, vel suis antidotis exuta sumuntur. Sed vt harum rerum studiosis in omnibus, quantum possumus, satisficiamus, præter ea quæ à Dioscoride tradita sunt, nos alia quoque plura addere decreuimus, quibus quotidie passim vtuntur medici. Cuiusmodi sunt cyclaminus, veratrum nigrum, euphorbium, turpetū, richiama omne genus, scammonium, colocynthis, bryonia, lathyris, ricinus, thymelæa, & chamelæa. Quandoquidè cum hæc omnia medicis in frequentissimo sint vsu, ad corporis excrementa exigenda, & ad vomitum quandoque ciendum, in quàm plurimis hominum affectibus, mihi sanè negligentia adscribi posset, si hæc prorsus silentio inuoluissim, præsertim cum sæpius eueniat quorundam circumsoraneorum imperitia, ac temeritate (pharmacopolas nunc præterea, quod eorum errata sæpe, ac sæpius improbauerim) vt vulgaribus, & rusticis, necnon & quandoque nobilibus, innumera propinentur pharmaca aluum ducentia, quæ plerunque

E e sumen

Hirudinum  
curatio.

fumentes in magnum discrimen ducunt, quoniam nec medicamenta ponderant, nec infracturam exhibent, nec ad ægrotantium temperatam, ætatem, sexum, consuetudinemque respiciunt. Quo fit, ut ægrotantes, qui in eorum manus incidunt, præcipue ij qui natura sunt imbecilles, magnis nonnunquam afficiantur incommodis, quibus nisi periti propriis succurrerent remediis, facile interirent. Albi itaque Veratri potionem, aut Thapsiæ, aut Elaterij, aut Agarici nigri, aut Cyclamini sequuntur vomitus, ingentis alui profluvia, intestinorum tormina, strangulationes, & respirationis angustia, quibus dehinc tanta succedit principum facultatū imbecillitas, ut paruo temporis momento ægi animi deliquio corripiantur, grauius spirent, & frigido sudore madescant. Postremo, nisi citius succurratur, oborto singultu, illico vel suffocati, vel consensu intereunt. His primū auxiliantur vomitiones (vt multoties diximus) crebrè concitatz, & infusa clysmata, quorū sepius superius meminimus. Post hæc remedio sunt antidota, quæ in vniuersum omnibus aduersantur venenis, præsertimq; theriaca, cui (vt Galenus pluribus in locis testatur) vis peculiaris inest, modò adulterio vacet, ut sumpta possit medicamenta deiectionis, adeo eorū superet vires, vt nihil per aluum exigant. Cæterum priuatiū Albo veratro confert aqua mulla largius sumpta, & nymphææ flores duarum drachmarum pondere poti, vel deuorati, traduntq; hæc propria albi veratri esse antidota. Cyclamino deinde conducunt lauri baccæ, duarum drachmarum pondere, sed propria facultate nigrum piper in puluerem contritum, & eodem pondere potum. Elaterio præterea opem fert Andromachi theriaca ex baccarum lauri decocto, aut melle pota senum scrupulorum pondere: verum proprium eius remedium est menthæ succus. Thapsiæ deniq; & nigri agarici noxa tollitur, iis medicamentis, quibus albo veratro subuenimus, cum eadem sint huius, quæ illorum incommoda. Fiunt quoque à N I G R O veratro (vt scribit Auicenna) interdū horrenda symptomata, nempe intolerabiles alui fluxiones, suffocationes, consensiones, animi deliquia, palpitatio cordis, linguæ arefactio, dentium contritio, frequentissimi ructus, & vniuersi corporis inflammatio: & nisi illico succurratur, tremor consequitur, vniuersum occupans corpus, cum quo postremo commoriuntur ægi. His auxilium præstat abstinentium ex vino potum: quin & cumini, & anisi semen, nardus, caltharumq; æquis ponderibus in puluerem contrita & ex vino potatissimis, ubi intumescit venter, linteolis igne calefactis, iteq; fasciulis statim discutientibus. Cibandi autem sunt ægi recenti casio, melle, butyro tam crudo quam cocto, pinguium carnum iuribus, ac etiam passo. Sed non propterea parcendū suc-

rit antidotis in vniuersum iuuantibus, nec etiā nymphææ floribus, vt pote qui non modò albi veratri vires demoliantur, sed etiā nigri. Porro EUPHORBII fauces, & guttur vehemētī admodum incendit vexat. Corpus vniuersum inflammat, ventriculū, & intestina magno dolore erodit, singultū excitat, & continuas alui fluxiones. Quæ itidem omnia mala inducunt TURPETVM, Scammonium, Colocynthis, Bryonia, Tithymali omnes, Lathyrus, & Ricinus. quāquam non tam acriter nocent, veluti euphorbia. A T H M E L A E A autem, & Chamelæa pituitosæ spumantesq; excitantur vomitiones, alui profluvia, intolerabiles intestinorum, & ventriculi erosiones, angustiz, inflammationes, & vniuersi corporis cruciatus: quin & sitis implacabilis, singultus, consensio, præpedita locutio, & alia sæua accidentia, quæ quandoq; ea excedunt, quæ ab epoto euphorbio proveniunt. His omnibus in vniuersum primū opitulantur vomitiones & clysmata, seruata vniuersali methodo, ac etiam cōmuni vsus antidota. Priuatiū verò profunt oleosi, ac pinguiorem quæ valenter sunt frigida, vt hæc ingentem feruorē exinguant, illa verò vt exuperantem acrimoniā obtundant. Proinde præstat Auicenna acidum lac, capsuram ex rosacea aqua potam, puniceorum austerorum vinū, anguriz, cucumeris, cucurbitæ, & acidorum malorum succum: item hordei præsanam niuem, vel glaciæ refrigeratā. Sed propriū (vt auctū) euphorbij antidotum est citri semen ex vino, in quo helenij radix inferbuerit potiū. Scammonij verò lac, à quo demptum fuerit butyrum, malorū, cotoneorū, rhois, ribisq; succus. Colocynthidis deinde antidotum fuerit sanè bubulū lac, & butyrū recens, Lemnia sphragis, & smaragdī puluis, pluries pota. Turpeti præterea, & Tithymalorum omnium, Andromache theriaca ex vino pota, in quo Cretense distammum incoctum fuerit. item mumia sepulcrorum in puluerem ex vino meraco pota drachmæ pondere. Bryoniæ porro, theriaca ex vino hausta, in quo helenium conferbuerit, itemq; nigrū piper contritū. Lathyrus ad hæc, & Ricini proprium antidotū est hyperici succus, aut herba ipsa in puluerem pota. Thymelææ deniq; & chamelææ rosaceum serapiūm, ex hordei præsanā potura, & subinde origanum Cretense igni tostum. Sed hæc omnia præstant tantū ad supradictorū medicamentorū vim deleteriam superandam. Cæterū cum plerūq; eueniat, vt hæc, quæ modū excedunt medicamenta, varia ac diuersa adferant incommoda, quæ etiam ob sui repentinā vehementiam præstantia exposcunt remedia, nempe continentes vomitus, perpetua alui profluvia cum cæterorum humorū, quā puri sanguinis, tam vasorū oscula veneni vi referantur, consensiones, præfocationes, animi deliquium, & vniuersum omnium imbecillitatē, idcirco non modò

Albi Veratri, albo, rumq; no xa, & an xilia.

Nigri Veratri no xa, & an ra.

Euphorbij, et quæ rursus de horemia & remedia sū t.

Euphorbij, et quæ rursus de horemia & remedia sū t.

Remedia ad varia symptomata.

attendendum fuerit, vt medicamenti vis antidotis superetur, sed etiam vt ipsis grauibz symptomatis omni diligentia succurratur. Quod quidem hæc sæpius tanti sunt ponderis, vt maiorem, celeriorēq; expectant curationē, quam cætera. Inhibentur itaq; vomitus modum excedentes (si tamen medicamentum cum humoribus reiectū sit) adstringētibz medicamentis, quæ ventriculum roborant, exterius præferim illis: quin & vinctis, ac fibulis extremis membris obtortis. Faciunt ad hoc in corpus sumpta flaua myrobalana, tam sicca, quam saccharo asseruata. Item nuces cum putaminibus saccharo similiter conditæ, diacynones, saccharum rosaceum diutius inueteratum, addita Lemnia sphragide: præterea cydoniorum, & puniceorum malorum vinum, slyuestrum prunorum succus, myrti bacæ, thus, rosa sicca, slyuestrii rosarum semen, cornu ceruinum combustum, fantala, corallia, omphacium, acetum, & id genus alia. Sed eorum quæ exterius illita profunt, hæc sese offerunt, indica videlicet, & Celtica nardus, mentha, glandes, lenciscina, resina, hæc, flaua myrobalana, myrti folia, & bacæ, thus, melinum, nardinum, lentiscinum, & myrrinum oleum. Nec tantum possent hæc ad vomitiones compescendas, sed etiam pari facultate valent ad sistendas alui fluxiones, quæ modum excedant: verum iis vniuersi alius est illinenda, ab ipso ventriculi ore ad pubē vsque. Præstat & brachia ab scapulis ad minus, & crura à coxendicis articulo ad pedes vsque fasciis constringere, offusis subinde austeris plantarum succis. Conferit item sudoris excitatio, aut decenteris ægris in calido cubili, aut laconicis arte calefactis in quibus ægros capere emittere oportet, aut brachiis, & cruribus, in calidæ balneo demersis. Ab his dare conuenit, quæ adstringunt, & roborant. Principes in vniuersum facultates roborant odorata medicamenta, cuiusmodi sunt rosæ sicca, caphura, garyophylla, assalochum, styrax, laserpitij lactyma, iuniperi bacæ, fantala omnia, & id genus plura. Præcise in luyustemodi alui fluxionibus Aucenna nasciturij semen tostum, trium drachmarū pōdere, ac subinde in lacte decoctū, quousq; lac cōcreuerit, & postremo potū. Si verò hæc non profuerint, soporiferis vt licebit, nimirū Philonis medicamēto, athanassa, requie, & aliis quibuscunq; quæ opii, aut meconij exceperint. Nam et si hæc quoq; noxa haud vacent, tantū tamen adserunt iuuamenti (si tamen recta ratione exhibeantur) vt iis tūto in tā magno discrimine medici vt possint. In summa si opimā haberemus theriacā, quæ ex adulterinis & suppositis non esset cōfecta medicamentis, omnibus præponeretur antidotis in superanda vi medicamentorum alium ducentum. Si quidem testatur Galenus (vt paulo superius diximus) pluribus in locis, suis in libris de theriaca ad Pisonem, & Pamphilianum, illud optimæ

theriacæ indicium esse, vt à præsumpto deictorio pharmaco pota humorum deiectionem impediatur, citra vllam ægotantium noxam. Id quod nobis experientia compertum est præstari ab antidoto nostro, cuius descriptionem tradidimus in præfationis huius libri commentario. Prodest non parum præter hæc vomitionibus, & fluxionibus prædictis etiam vilius regimen ex adstringentibus & austeris insititū, quæ deinde niue vel glacie refrigerari conuenit, aut in alium aquæ putrum fume suspēdit. Adiuvantur conuulsiones, quæ ab ingentibus, laboriosisq; alui pressuibus eueniunt, iis duntaxat cibis, quibus ad rescillanda exanimata corpora, viresq; roborandas vtuntur medici. Quo in negotio præferat humanum lac ab ipsis exudum vberibus: quin & dulcium anygdalarum cremor, & earum pariter oleum, & ciborum condimentis adiutum. Profunt & nuclei pinei, pistacia, Indica nuces, & melopeponum semen, omnia in mortario confusa, & caporum iure colliquata, addito candidiori saccharo. Opem similiter fert caporum, & phasianorū exenteratorū carniū eliquatus succus, carnis ipsis tenuiter incisis, viro vase cōclusis & in aquæ balneū eodē in vase decoctis, quousq; vniuersus ab his exudauerit succus, is namq; frequenter potus cochlearis mensura (vt libello de viribus cordis prodidit Auicenna) magis succurrit imbecillitati cordis, quam alius quouis cibus. Conducunt præterea recentij quorum vitelli carniū iuribus admisti, & saccharo respersi, insuper caporum, phasianorum, perdiciū, & atragenarum pulpa in mortario confusa, & iure, & saccharo temperata. Præfationibus porro subuenimus iisdem tum auxiliis, tum medicamentis, quorum superius mentionem fecimus, cum de mortiferis fungis differeremus. Ceterum meminit hoc capite Dioscorides præter prædicta, melandij, slyuestris rutæ, & earum plantarum lanuginis, quæ in aculeatarum genere quibusdam casti vocantur. Quorum omnium historias, & facultates superius propriis locis tradidimus, quæ tamen non semper nocent. At si noceant, curantur excitatis vomitionibus, cubito prius malux decocto, aut recenti crudo butyro. Post quæ proficiunt pingula iura, & cætera, quæ alium emolliunt. Dent igitur operam, diligenterque animaduertant sepiassarij probi, ac fideles, ne in ponderandis hisce medicamentis, aut manu aut oculis imprudenter decipiantur. Quinetiam eos admonitos velim, vt imperitos, ac temerarios circumforaneos à pharmacopoliis suis excludant, reprobent, & missos faciant: ac si opus fuerit, protomedicis & rectoribus ciuitatum eos denuncient, ne miselli ægotantes sub publica omnium fide ab hoc improbo ac pessimo hominum genere prodantur, atque in perniciem agantur.

*Remedia  
ad conuulsiones.*

AQUA frigida abũde pota, aut meracum vinum liberaliũs epotum, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut vehementi exercitatione, strangu-  
latus, & dolores infert. In quibus san-  
guinis misio protinus, & vacuatio, im-  
minetia soluunt pericula. Sed de no-  
tis veneficiorum, ac remediis, & cauendi modo, hætenus dicta sint. Subiun-  
geremus etiã antidota necessaria, quæ præclarè auxiliantur, quibus vtimur,  
quale Mithridatium est præsertim, &  
quod sanguine, & quod scinco tempe-  
ratur. Verũ quoniã aliis in locis dili-  
gentissimè scripta sunt, hic ab eorum  
descriptione supersedemus.

Rerũ do-  
mesticarũ  
noxa.

NON modò aqua frigida, & vinũ meracum, aut passum inter ea, quæ nobis domestica sunt, & quotidianò vsu alimentũ præbent in huma-  
næ vitæ subsidium, eo modo pota, quo Diosco-  
rides scribit, maxima adferunt discrimina, sed  
etiã carnes, & pisces. Etenim hæc vtraq; co-  
cta, & adhuc feruentia humidis locis diutius as-  
seruata, subindeq; frigida deuorata, eosdẽ ma-  
los pariũt effectus, quos à maleficis fungis crea-  
ri tradidimus: tamen quadoque non nisi duobus,  
aut tribus post diebus appareat noxa. To-  
tæ præterea carnes, venenatorum subeunt natu-  
ram, si calidæ inter duas suffocentur patinas,  
obuoluanturq; linteis, ne exhalare possint. Eadẽ  
etiã manna mala inferunt morticinæ carnes  
esitæ, quemadmodum & eæ, quarum ani-  
malia aut à venenatis serpenticibus, aut à rabidis  
brutis demorsa, aut fulmine idæ interiere. Quã-  
doquidem sæpius harum esu colicoritur inflam-  
matio, mæror, alui profluvium, furor, obliuio,  
veteris morbus, & ad postremum mors inse-  
quitur. Quamobrem hæc sanè negligenda non  
sunt, quin potius summa cura vitanda. quippe  
aliquos nouit, qui his deuoratis nullo medica-  
mento adiuti, intumescere inde toto corpore,  
tandem vitam miserè finiuerũt. Nec minus eui-  
tare oportet oua barbi piscis: nam adde venena-  
ta sunt, vt si largius sumatur, eos qui hauserint,  
in magnũ periculũ adducant. Piscũ curatio eadẽ  
est, quæ fungorum. quãquam non existimat  
Conciliator, vt piscibus sicut mortiferis fungis  
cõueniant syluestria pyra. Carnũ verò suffoca-  
tarũ malis succurritur excitatis prius vomiti-  
onibus, & infusis clysteribus: mox vini optimi &  
odorati potu, admisso cydoniorũ malorũ succo.  
Præstat à vomitu Lemniã sphragidem bibere,  
vnã cum agallocho, & mastiche, quanuis eadẽ  
sit harũ cura, quæ coli affectibus adhibetur.

Piscũ  
et carnũ  
noxa  
medic.

## De venenatis animalibus.

VENENATA. CAP. XXXV.

DEBESTIIS, quæ virus eiaculari-  
tur, & exitalibus venenis, ideo  
scribere aggredimur, vt tota curatio-  
nis remediorũque ratio ad vmbilicum  
perducatur. Siquidem pars hæc nõ mi-  
nus quàm cæteræ aliæ, necessaria est ijs,  
qui artem medicam exercent, vt pote  
cũ adminiculo eorum, quæ inibi tra-  
duntur, doloribus, periculis, & crucia-  
tibus, plurimisque aliis malis homines  
liberari conueniat. Hæc autem in sum-  
ma fastigia duo, sicut ab initio relatũ  
est, distribuitur. Nam qui de feris virus  
inspicientibus sermo differit, theriacus  
dici solet, qui verò de amolendis vene-  
ficiis, alexipharmacus: quo prius tradi-  
to, simul quæ sequi signa consueuerũt,  
præmonstrabimus, tũ quæ nonnihil au-  
xilij ferũt. Omnia autẽ in promptu, &  
ad manum habere artificem oportet,  
propter vrgentem sæpenumero neces-  
sitatẽ. Siquidẽ pauca è venenis & vi-  
rulentis animantibus, tarda & grassan-  
tia sensim pericula cient, ita vt dilatio-  
nem admittant: pleræq; verò præsentia  
neam perniciem afferunt. Hominum  
autem partim malè aliis cogitantes, in-  
genita prauitate maleficium ita tempe-  
rant, vt spatium curanti liberum non  
relinquant: partim sceleris admissi con-  
scientia, aut tristiti aliquo euentu oppres-  
si, hausto spõte veneno, mortẽ sibi con-  
sciscere conantur. qui postea deprehẽsi,  
aut resipientes, & vitæ cupidi, præsentia  
neam opẽ possũt. Non desunt qui ho-  
stiles sagittas illinẽtes, aut fontes aquarũ  
que puteanas hac labe polluentẽs, certã  
& ineuitabilẽ aduersarii perniciẽ mo-  
liuntur. In quibus ipsi etiã maleficium  
non subitò sed aliquantò post grassari  
natura sua comparatum est, tamen nisi  
primo quoque tempore coërceatur, &  
remediis subinde excipiat, frustra tã-  
dem succurritur, occupatis iam corpo-  
ribus exitali vi veneni. Proinde non  
vulgari industria diligentiaque in eã re  
vtendũ

utendum est, ut quod in aliis incommodis ars consuevit, in his quoque salutem mortalibus præbeat. Quin & apud præcos genus hoc unum existimabatur esse eius partis, quæ medicamentis pugnaret: sed recentiores id ipsum discernerunt, nominantes præcautionem, & modum præcauentem, salubris sanantisque medium statucentes, parua & leui supra modum persuasione decepti. Siquidem tres in humanis corporibus constitutiones esse contendunt. vnam, qua sani degimus: alteram, qua sinistra valetudine corpora laborant: tertiam, quæ medium inter vtrasque locum sibi vendicat. In qua positi, sanitatem specie mentiuntur, facileque in morbos & pericula concidunt, ob vim corruptricem, quæ corporibus nostris incumbit: quemadmodum in iis videre licet, quos excandescens rabie canis momorderit, necdum tamen aquam horrent: in iis quoque qui cantharidas hauserunt, sed nondum vrinæ tormento cruciantur. Tripartitò igitur artem digerere, triplicique corporis constitutioni merito respondere tradunt. Salubrem partem esse volunt, quæ sanitatem tuetur: præcauentem, eandemque prohibentem, quæ obstat, quo minus in morbos incidunt: & sanantem, qua vitia discutuntur. Quibus ita responderi potest, quòd primò ex ista ratiocinatione non tres corporis tantum, sed quatuor haberi constitutiones fatendum esset. quippe ut aliqui sunt, qui necdum morbo laborant, morbo tamen maximè ob impendentem causam sunt obnoxii: ita sunt, qui iam priore morbo defuncti, nondum tamen secundæ valetudini restituti sunt. id quod in iis qui à morbo proximè sese recolligunt, cernere licet, qui virium recreationem & robur desiderant. Sed quemadmodum curandi ratio ad partem medicamentariam pertinet, ita præcautione eidem subiaci par est. Ad arcendas enim valetudines vehemētibus utimur auxiliis, altiore scarificatione, vitionibus, amputa-

tione, derodontibus epithematis, potionibus perniciosi occurrētibus, & plerisque aliis. Verum enimvero sunt vsque ad rudes nonnulli, ut ne remedia quidem appellent, quæ morbos arceant. Cuius sententiæ inire rationem haud promptum est: etenim cum verbum ipsum, præcauere, tum agendi modus, omnino auxiliare remediariamque vim præseferunt. Mirum verò nisi etiam sua illa distributione partium eos complectuntur, qui in pestilentis cæli statu morbo nondum correpti sunt: pesti tamen, propter obuersantes aëris occasione, opportuni, & in morbum proni redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quam arcendorum morborum ratione: quippe cum firma reddere corpora, & minus vitii obnoxia nitamur, ut inoffensa valetudine degant, nec morbis conficiantur. Neque id silentio prætereundum, quòd maximè præcipuum, & tanquam caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis constitutionibus respondere, sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari, ac explorare, ut suis locis ostendimus. Cum iis igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare conuenit, affectus, qui à virulentis animalibus, venenisque contrahuntur, vocari cacos, id est, quorum ratio minimè iniri potest. Quin & ea, quæ eisdem auxiliantur, nulli pariter sunt addicta causæ. quapropter questionibus obseruatoriæ artis, & eius quæ ratione fulciatur, annumerari solet. Neque prorsus verum deprehenditur, affectus huiusmodi cacos esse, nam quod semper se protrahit, & nullum in quibusdam necessariis usum exhibet, haud facili coniectura colligi potest: etsi nature proprietate prorsus cacos eos affectus concedimus, qui ab exitialibus venenis, & animantibus, quæ virulento morfu faciunt, contrahuntur. Nam quod ad opus nonnullum usum præbet, datque medendi occasionem, neque imperceptibile, neque

cæcum, nullive causæ obnoxium reputatur: sed magis ab ipso quis impulsus, demonstratione se habere, & opinionem de abditorum cognitione confirmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt, quæ ut sensibus percipiuntur, euidenter tamen ex ipsis inter se collatis deprehenduntur. Diocles autem in eo commentario, quæ Plislarcho dicauit, satis modos perstrinxit, ad verbum ita scribens. Nosse quis hoc potest cum in aliis non paucis, tum in viperis, & scorpiionibus, & reliquis id genus, secum animo reputans, ut quauis exiguo sint corpore, vixque conspectui subiiciantur, magnorum tamen discriminum ac dolorum causas inferunt: quorum nihil præter quandam corporis exiguitatem, vimque præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim ea moles corporis est, quæ à scorpij ictu, & aliorum id genus venenatorum, quæ nos morfu conficiunt, attingitur? quorum aliqua vehementes cruciatus excitant, alia erodunt, & putredines cient, nec desunt quæ præstantaneam perniciem moliantur. Aut quantum est quod à phalangij morfu ingeritur, & vniuersum corpus excruciatum? neque enim quis magnitudinem ipsorum deprehendere posset, cum profuse exigua mole constet. Ergo quod hæc ad affectus referantur, consistit inter omnes. Verum quod exacte deprehensum sit, vim quandam ipsis inesse mortiferam, quæ insinuata corporibus, molestiarum, quæ exoriantur, nobis causa sit, in confesso est, & omnium consensu persuasum. Nec quisquam inuenietur, ysq; adeo contentionis studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias asseueret. quæ à materia mortifera parte corporis attingente. Porro id erat, quod inter vtilia artis opera in omni opere dicere oportuit, quamnam res opus hoc efficiat, ut nihil profus nos lædat, incomprehensa communis causæ quæ propriis inest ratio: quandoquidem tum euidenter indicari possit, cum deprehensa est.

Ideo Erasistratus empiricorum pertinnaci graui cauillatione incessens, cæcis affectibus causas assignauit, inficiatus his communem, & supremam morborum causam incomprehensibilem esse: & hanc in eo, quem de causis scripsit, commentario aptissime prodidit, candido signatam lapillo. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, ut in venenis, serpentium ictibus, & cæteris id genus trita medendi ratione contentos esse. neque satisfacturam sibi obseruationem eam, quæ à causarum comprehensione separata est: primum enim genere comprehendendi facile possunt. Quod autem sit lethifera vis, corporaque permutans, ita ut perimat, ex iis quæ per genus, non per speciem vagantur, curationem indicat, quæ hæc hebetare, & profus expugnare liceat. Cum verò subiungit, Ad aquam dulcem, & potui idoneam venit quis, & ante obseruationem ad vomitum, ad vulneris dilationem, ad demorsæ partis suctum, cucurbitulas adfixit, partem incidit, vrentia medicamenta, aut ea quæ vim eandem adipiscuntur, admouit, postremo partem amputauit: secum reputauit medicamina, quæ per summam cutim ferre, & applicari solita, immissa ad intima pernicii repugnarent. Hæc itaque, quæ disseruit Erasistratus, veritati consentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam vim corporibus illapsam, negotiorum, quæ ipsa facessit, esse causam diffiteantur: verum rudiusculè nomini attendunt. Nam apud ipsos palam immissa vis φθοροποιος, id est mortifera, nominatur: φθοροποιον autè nullius officij alius esse potest, quam causæ. Aiunt hæc nomina, μαρτυρον, & ἀπακλειπτον, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro virtute, sed nuda enunciatione comprehenduntur. Enimvero quæadmodum in his vocibus μαρτυρον, & ἀπακλειπτον, partes neque

certos, neque principes retinent significatus. sic in hoc verbo *φθοροποιός*, partes productionis gratia, non pro virtute coaluerunt. Hinc ad causarum differentias transiunt, affirmantque causarum aliquas evidentes esse, quæ dum aduersam valetudinem creantur, separantur: cuiusmodi sunt frigus, labor, æstus, & similia. quasdam continentes, quæ permanent, postquam morbus excitatur, hoc est, quibus præsentibus, & effectus eorum adsunt: incrementibus, affectus augentur: decrementibus, minuitur: & cum desinunt, iidem finiuntur: quibus solis ac per se manentibus, effectus quoque ipsi manent. Talia quidem receptissima sunt causarum discrimina, quorum nulli phthoropœon subici potest. Evidens enim causa non est, quoniam morbus ipse permanet, nec ipsa à corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hæc adsit: quemadmodum accidit iis, qui à rabioso cane sunt demorfi. Quod si neque evidēs, causa, neque cōtinēs fuerit, neque per se neque alterius confortio causa erit. Quod si à nulla causarum differētia phthoropœon deducere possumus, cōsequitur, ut neq; causam esse fateamur. Quod autē asserūt, vocabula quædam in se non habere partes rerum significatrices, sed nuda & simplici pronuntiatione ficta esse, fateri necesse est. Verum non omnia, sed perpauca talē nancisci conditionem existimandū est: neque enim *πρωτοί* in hoc nomine *φθοροποιός*, perinde atque assumptitia profertur, sed lōgē principē obtinet significationē. Quemadmodū enim *φθοράς*, id est corruptionis, nomen mutationē in peius significat, sic hoc verbū *πρωτοί* sumi debet, ut nihil amplius ex eo quod hanc dictionem *φθορά* secum habeat, declaret. neque prorsus id significat, quod omnes palam audiunt, & huic simile redditur, *παι Αβρύς* *δ* *ι* *λ* *θ*. Si dant à corruptione sanis fieri morbum, concedunt utique vim in huiusmodi verbo *πρωτοί* subesse: siquidem

aliquid est, quod corruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per singulas causas, quæ corporibus subiciuntur, idque tam in lethaliibus venenis, quam in iis quæ corporibus ingeruntur. Verum nonnihil subiacere causarum differentiis produnt. Quinetiam aberrant, non exactam diuisionem assumentes. Qui verò se dogmaticos profiteantur, causam esse partim præparantem, partim continentem asserunt, ut inguinum vlcus & inguinariam febrem, & quæ effectui tum assiat, etiam separatur, ut à fractis præcipitatio. In summa quoties quidpiam sapte natura causa fuerit, nec vlla diuisione comprehenditur, vitiosum est, neque causæ adscribitur, eorum quæ idem genus sortiuntur. Sed quod phthoropœon causa sit, nomen ipsum argumento est, & in iis quæ contingunt, apertius ostenditur. Quid aliud causæ arbitrantur esse post impressum à serpentibus ictum, quam ex animante vim, & illapsam in corpora virus? Neque enim frigus, neque æstus, neque sectionem corporis, neque cruditatem, neque aliud quicquam simile causari possunt. Verum quoniam causarum differentiis gaudent, & aliquas continentes, alias evidentes appellant, ipsis dicendum, utroque istorum modorum eundem quidem causam esse, quod affectum præcedit, & quod corporis substantiā præoccupat: continentē verò, quod morbis præsentibus adest, quæ separata recedunt, quæ cum ipsa euenerat. Sed de iis hæcenus. Statuendū itaque mortiferā vim intrinsicus manifestissimā esse causā, ipsamque principē facere scōpū oportet. Et antequam ad ima decumbant morbi, variis modis est certandū, donec vis tota corporibus excutiat. Modò enim reuocari debet ea parte, quæ pestis intrauerit: modò aliqua alia, præsertim principatū nō obtinente, antè coercetatur, quàm altius irrepens viscera cāzaretur.



eius pernicies eluatur, retundaturque, cum iam membratim peruagatura est. Itaque venena si hausta sint, crebris vomitionibus: si morsu impressa, sacificatione, affixis cucurbitulis, exueto, carnis circumscriptione, nonnunquam amputatione extremæ partis, euocantur. Retinetur verò infusione, & imposito medicamentorum acrimia cohibentur. hæc simul vtique arcere virus, & eluere possunt. Restinguntur, & euincuntur meraciore potu, aut passo nulla aqua diluto, vel contrariorum escu, quæ acrimonia sint prædita. Postremo deiectione alui, euocatur sudor, & alia quædam in commune, quæ membratim demonstrabimus, auxiliantur. Verum enimvero non lethiferam modò materiam, sed & magnitudinem, & tempus, pro scopo considerare oportet. etenim ab iis remedia quàm plurimum discrimen capiunt. A magnitudine quidem, cum nonnulla ex venenis, & virosis animalibus pericula minantur: alia putredines altas, aut exteriores excitant: alia vehementissimos dolores, aut cæcos cient, alia vix medicamentis cedunt, & magis insinuse molestias excitant. Oportet autem ea quæ pericula ferunt, peruicacioribus auxiliis expugnari: & minus infesta, mitioribus. Quippe absurdum fuerit in grauioribus, segnioribus medicamentis homines in discrimen adducere: in minoribus verò, vehementem auxiliorum iniuria corpus lacerare. Finitio à temporibus in promptu est: hoc enim subito in pericula, & præsentis molestias adducit: illud verò sensim & dilatas in diè longâ, aut breuiorè producit. Itaq; in acutis quidem conseltim multa simul auxilia representari oportet: reliquis, paulatim. Hæc quadâ artis formula breuiter definita sint. Iam membratim rem prosequamur.

Ratio tra-  
ctatus de  
Venenis  
animalibus  
inueni-

C v s. hæcenus tradiderit Dioscorides de his primariis venenis, quæ epota aut in cibis sumpta corpora nostra permittunt, corruptunt, destruunt, & denique in perniciem agunt, ve

hac in re nihil amplius desiderari posset, statuit deinceps de his etiam sibi esse discernendum, quæ violenta animalia ista, vel morsu relinquunt. Quòd vtique probè sciret hæc nò minora, quam illa repræsentare discrimina, imò etià maiora: quandoquidem eueniant hæc ex tempore, & præter opinionem, plerumque in campetribus, & montibus, vbi nullum auxilium, nullaque vel rara remedia. Quamobrem de his non minus diligenter discruit quàm de aliis, quæ corporibus ingeruntur, argumento satis manifeste, quòd vniuersalia horum remedia non vna tantum præfatione, sed pluribus scriptauerit. Quod cum animaduertent recentiorum quidam, haud dubie existimauerunt, hoc sextum volumen in quatuor libros esse diuidendum, nempe in sextum, septimum, octauum, & nonum. Veruntamen i mihi non rectè (pace semper eruditiorum dixerim) ea expendisse videntur, quæ in huiusce libri præfationis initio à Dioscoride scribuntur: is enim pertissimè hunc sextum librum totius operis vitium declarauit. Quapropter ipse Dioscoridem secutus relictis aliorum opinionibus, asserere non dubitauerim, hunc vniuersum de venenis & venenatis animalibus tractatum, vnum tantum, non plures esse libros: tametsi pro cuiusque arbitrio in plures sectiones diuidi possit. Quingram prima iis dari poterit, quæ ore sumuntur in corpus: secunda canis rabidi moribus: tertia indicia ac symptomatibus, quæ à venenatis moribus oriuntur: postrema verò eorum curationi. Verum enimvero cum hæc diutius examinauerim, vt Dioscoridis doctrina ad maius omnium commodum in vnum congeratur, & ne tot huius libri sint sectiones, venenosorum animalium tum indicia, tum accidentia, quæ propriis capitibus tradidit Dioscorides, iis coniunximus, quibus ipse egit de eorundem curatione, & remediis, vt vniuersique iunctim nulla temporis iactura, vno tantum capite indicia, accidentia, & curationem consequatur. Quod & ipse fecit Dioscorides, vbi superius de venenis discruit, quæ in corpus sumuntur. Ibi enim indicia à curationibus non disiuxit. Nam si in vno tractatu indicia, in altero, verò curationes quarantur, maius temporis dispendium fieret, maiorque menti molestia inferretur, quàm si hæc omnia in vnum redacta legentibus sese offerant. Neque hoc nobis vitio adscribendum esse putamus, quando res eò magis placere soleant quò commodius fieri possunt, cum præterea illud (vt aiunt) frustra fiat per plura, quod fieri potest per pauciora. Neque etiam ob id quis calumniari poterit, quòd Dioscoridis codicem aliqua ex parte deprauauerim: quòd nusquam à me deprauatum sed tantum in meliorem formam, & ad priorem authoris doctrinam ipsum ipsum relictum, & restitutum putem. Porrò non aliud super hæc præfatione nobis dicendum videtur (quæ multis intellectu difficilis exitit, vt Marcellus ipse fateatur, quòd fortasse Dialecticam ignorauerit) nisi si quòd aliud sanè hæc præfatio non sit, quàm Dioscoridis Aristotelem secuti disceptatio, ad

uersus

Notum op-  
da huius  
libri.

uersus eos omnes, qui superficie tenuis in medica facultate, super nuda ac simplici vocabulorum interpretatione altercantur, eorumque præsertim, quæ ex variis, ac diuersis vocibus componuntur. Quandoquidem hæc interpretationis vocabulorum distractio, potius ad sophistas, & nugatores attinet, quam ad expertos, & probatos medicos, ut facile videre est in pluribus irreprehensibilibus vocabulorum exemplis ex pluribus vocabulis compositorum, quæ in libri hermenias ab Aristotele assignantur. Quippe quoniam nouerat ipse Dioscorides, quod tam methodicorum, quam dogmaticorum quidam in ipsis compositis vocabulis declarandis expertorum, exercitatorumque medicorum sententia, propriis vocabulis denominatam, haudquaquam secuti fuerant. Caterum & eos non parum reprehendit, qui absque aliquo Dialecticæ fundamento, diuisiones in causis facere audent. nam cum in diuisionibus errorem committant, in iis quoque quæ sequuntur, errent necesse est. Proinde qui hæc latius vberiusque noscere cupiunt, Aristotelem consulant libro secundo physicorum: illis siquidem inibi amplissimè satisfiet. Potuissimus quidem & nos rem hanc pluribus prosequi: sed cum nostrum institutum non sit, nunc in aliam materiam digredi, hæc silentio prætereunda duximus.

## CANIS RABIOSVS.



## SIGNA RABIOSI CANIS

ET DEMORSORVM

AB EO. CAP.

XXXVI.

DE RABIOSI canis morfu sermo ne aliis præposuimus, quod id animal domesticum, ac frequens esse cōsuevit, & in rabiam sæpius agit, ac perit, ab eoque cauere difficile: inde periculum ineuitabile hominem manet, nisi multis utatur auxiliis. Canis plerumque flagrantissimis æstibus in rabiem effertur: interdum quoties frigora incesseuerunt. Rabiosus autem potum & escam auerfatur: largam spumantemque piritam

natibus, & ore proicit: toruè & solito tristius intuetur: in omnes passim sine latratu irruit, & æquè feras hominesque, tam familiares, quam ignotos mordet: nec protinus infestum quicquam insiggit, nisi, ut vulnus, dolorem: exinde morbus ille, qui ab aqua metu hydrophobicus Graia est voce appellatus, contrahitur. Euenit autem cum distentione neruorum, totiusque corporis rubore, præsertim faciei, cum sudore, & languore quodam. Aliqui auræ splendorem fugiunt: alij sine ulla doloris intercapedine vexantur. Sunt etiam qui canum more latratu addat, & obuiam factos morfu adoriuntur, ac mordendo simili vitio labefactant. Proinde ex iis, qui hoc vitium fenserint, neminem seruatum vidimus, nisi forsitan ex historia vnum aut alterum euasisse audimus. siquidē Eudemus superasse quendam affirmat. Themisonem aliqui demorsum in hunc furorem incidisse, & euasisse fatentur. Alij ipsum cum amico aquam expauescenti morem gereret, & officium exhiberet, quadam naturarum concordia, similem contraxisse affectum: sed post multos tandem cruciatus seruatum extitisse. Molestissimum itaque genus morbi, à quo multos, antequam ipsum experirentur, vindicauimus, & complures ab aliis medicis seruatos nouimus.

NVLVM in vniuersum animal homini *Canis p-* tam domesticum, familiareque: reperitur, nullumque *bijsi Gene* quod tam multiplex, variisque genere constet, *fla natu-* quam canis. Hinc est, quod viri, mulieres, *acra, Es-* pueri iis, magis delectantur, quam cæteris ani- *malib.* malibus, quæ in domibus nostris aluntur, tanta, quidem intercedit canibus cum homine societas. Qui tamen in rabiem acti, quos morore derint, in maximum discrimen plerumque deducunt. Cum itaque canes à continuo hominibus confortio nunquam absint, qui propterea illorum moribus magis subiiciuntur, quam cæterorum, quæ morfu pariter, vel sic venenum eiulantur, ideo merito quidem de his prius, quam de reliquis bestiis venenatis tradidit Dioscorides. Cæterum quanquam ipse causas non scribit, cur magis æstate Canicula ardoribus, itidē hyeme frigidibus vehementissimis in rabiem aguntur, quam reliquis anni temporibus, cum tamen palam sit, canum rabiem non aliunde provenire

quam ab atrabiliariis extremis, facili cognosci potest, id æstate euenire perulto à caloribus eorum sanguine, hyeme verò frigidibus concreto. Rabidi canis describit Galenus libro de theriaca ad Pisonem (si tamen liber is Galeni legitimus est) his verbis. Si audieris canem, qui aliquem momorderit, gracilem corpore, & secum, oculis rubetibus, cauda demissa, spuma ex ore fluente, præterea lingua foras porrecta, & tanquam bile colorata, obuium quenuquam insiliisse, citraque rationem cucurrisse, deinde rursum subito consistentem cum ira quadam magis furenti non ipsi præuisos momordisse, hæc inquit si in eo sic habere audieris, statim rabiosum canem fuisse intelligas. hæc ille. Incedunt præterea (vt quidam asserunt) lento gradu, demissis auribus, abscessa voce, stupida capite, & obuios non modò homines nullo delectu, sed & bestias demordent. Nec mirum si proprium mordeant dominum, aliosq; domesticos omnes, nullius habito discrimine, vel ratione. Siquidem cum proprium atræ bilis sit sensus omnes inficere, omnium & sui ipsius obliui, domesticos ipsos cognoscere nequeunt. Id quod etiam pluribus hominibus accidit, qui melancholici effecti, non modò patrem, matrem, uxorem, & proprios filiosq; etiam se ipsos quandoque occiderunt. Verum enimvero non tantum æstius caloribus & hyemis frigore canes in rabiem aguntur, sed etiam morticinarum putridarum, vermibusque scatentium carnum esuquin & marcescentis earum sanguinis. Quod si fuerint hæc canes eorum animalium, quæ pessilientia, aut ictu fulminis, aut venenosorum morbus interfecerint, eò facilius maiorique afficiuntur rabie. Quæ etiam excitari solet computrescentibus aquis frequentius ebibitis, quod hæc omnia atrabiliarios succos augeant, & putredine corrumpant. Eoque magis his de causis in rabiem aguntur, quanto alter altero suapte natura magis atræ bili obnoxius fuerit. Adneant præterea nobiles mulieres, ne suis catellis, quos in deliciis habent, & quibus maxime oblectantur, cibum vel fuscum edendum præbeant, quibus aromata, præsertimq; piper & ginger, fuerint admixta. Quippe cum hæc caliditatis, siccitatisq; modum excedant, eadem ratione, qua ingens æstatis seruos, canes rabidos efficiunt. Caveant ideo eas libenter moneo, ne ipsi forte fortuna id mali accidat, quod Triden euenisse scimus clarissimo Baldo vniuersi, legis doctiori. Si siquidem inter ludendum cum quodâ suo castello iam rabie affecto, leuiter in inferiori labio demorsus fuit. Sed ipse huius rei ignarus quæto post mersu rabidis factus, & tandem hydrophobicus miserabiliter mortem obiit, nullo adiutus medicamento. Ad hæc sciendū est, quod non canes tantum (quanquā ijs magis, quam cætera animalia in rabie agantur) rabidi sūt, sed etiam alia pleura animalia, nempe vulpes, musculi, vierræ, martes, finis, & id genus alia. Quapropter nescuerim, quo argumento dixerit Galenus libro

sexto de locis affectis, solum canem inter cætera animalia corripit rabie: nisi voluerit dicere (vt equidem reor) canes cæteris animalibus rabie magis esse obnoxios. Refert Aristoteles libro octauo de historia animalium, camelos etiā, & equos in rabiem agi. Id quod ego quoq; asserere possum: etenim meminī, cum ruri degerem, me vidisse equum rabie furentem, qui fracto capistro obuiam quindam vetulam per capitis, & crinium vittam morsu comprehensam, decem pluresq; passus à terra suspensam pertulit, nullo tamen vulnere illato, sed magno sanè terrore. Hoc affectu capiuntur (vt Auicenna est author) etiā muli, qui suis aliquando moribus dominos, & stabularios rabidos, & veluti arripitios reddiderunt. Verum huiusmodi animalia non nisi rarò, vel nunquam per se rabie tentantur, quandoquidem ferè semper id illis eueniat, cum à canibus, seu lupis, aut vulpibus rabidis mordentur. Cæterum (vt ipse Dioscorides inquit) rabiosorum canum morsus infestum quicquam protinus non insigit, nisi vt vulnus, dolorem. Sed neglecta curatione, demorsus aliquo post tempore rabidi sūt, & aquam expauescunt. quod etiam faceret Galenus libro de theriaca ad Pisonem, aliisque in locis. Idcirco diligenter aduertant, si à canibus mordentur, si aliqua sese offerant indicia, quibus conici possit, canem, qui momorderit, rabie laborasse. Siquidem neglectis remediis (vt modò diximus) in id discriminis demorsus adducuntur, vt nullus sub inde relinquatur salutis locus. Tradidere Orbasius, Paulus, Aëtius, Auicenna, alijsq; probatissimi auctores, quod illis per integram noctem contritis iuglandibus canum moribus, & postmodum gallis, aut gallinis in escam exhibitis, gallinaceos ipsos sequenti die interire, si à rabido cane illatum fuerit vulnus. Sunt etiam qui asserant, si panis emanante è vulnere sanguine inficiatur, & cuiuscunque cani quantumvis famelico offeratur, canem non modò illum non mandare, sed ne oliscere quidem. Attamen his tantum experimentis (meo consilio) non planè fidendum fuerit: quanquam ea à probatissimis prodantur authoribus. Quapropter alia indicia iam dicta diligenter fuerint perquirenda. Cum autem rabidorum canum morsus negliguntur, post aliquod temporis spatium demorsus præter morem cogitabundi sūt, & eque mente reuolunt, quæ illis infusa sūt, quod iam veneni vis in cerebrum repens imaginariem occupet facultatem. Si verò aduc in longum protrahuntur nullis remediis adiuti, his frequentius nocte interrumpitur somnus, sæpiusque pavore expergiscuntur exinde hominum, & domesticorum consortia vitant, & cum seruo quodam aspectu secum submurmurant: solitudinem deligunt lucem & candida omnia odere maxime, rubent quandoq; facie, ipsis extremarum partium nervi conuelliuntur: postremò eò

Canes qui  
bus canis  
rabie exa  
gitantur,

Animalia  
quæ aliia  
in tenen  
tur.

Neglectis  
morsus de  
ferimus  
et canis

dedu

deducuntur, vt aquam expauescant. Quod certissimum mortis, & inexpugnabilis veneni præbet indicium. Proinde dicebat Dioscorides ex iis, qui hoc vitium senserint, neminem seruari posse. Allata itaque in eorum conspectu aqua, cuius potu facile sanarentur, si tamen bibere possent, ingentissimis clamoribus, & canum latratu astantes terrent. Quod si diutius ante eos aqua ipsa dimittatur, tremunt, sudant, deficiunt animo, delirant, paurore concutiantur, ac si in ignem illico se proiciendos cernerent. Id vero accidit, quod melancholici effecti, corruptis, insectisque inde animalibus facultatibus, recusant missili, metuuntque aquam, qua sola sanari possunt. Nec alia de causa id euenire censent medici, quam huiusce inexpugnabilis veneni prauitate. Nam cum humor omnium, & totius corporis principalium facultatum, functionumque imperium venenum ipsum susceperit, cumque iam omnes corporis dispositiones sibi similes reddiderit, mouentur vniuersi corporis vires, irruuntque contra id, quod sibi contrarium existimant, hoc est, contra ipsam aquam, si ea in medium afferatur. Quocirca Galenus libro de theriaca ad Pisonem, ita scribit. Non enim corpus duntaxat ipsis inarescit, & conuellitur interdum, febrique acri intus viritur, sed animus etiam delirat, & grauissimum ipsis affert symptoma. Quippe aquam timet, ac propter multam siccitatem humidi tenetur desiderio, & à potu abstinet, quia mente alienati, id quod auxiliari possit, non considerant. Fugientes enim aquam, pauentesque miserrimo mortis genere intereunt. hæc Galenus. Hæc itaque rationabiles sunt causæ, quibus in aquæ timorem deueniunt. Veruntamen quidam testantur vt Aëcius, Posidonius, & Rufus, id etiam accidere posse, quod rabidi canis imaginem videre in aquis imaginentur, cuius speciem recolentes, protinus ingenti terrore corripuntur. quod quidem nimiam ob siccitatem perpetiuntur. Nam philosophus quidam (vt Aëcius refert) morsus à cane rabido, & egregia animi virtute affectioni resistens, dum phantastici canis imago sibi obieceretur in balneo (ea enim ipsi quoque quemadmodum & reliquis eodem morbo affectis apparebat) diu intra se meditatus, eoque tandem inquit commune est cani cum balneo? quod effatus balneum intrauit, & imperterritus bibit, atque ita morbum superauit, & incolumis euasit. Vnde postea in proverbium manauit, quid cani cum balneo. Refert Auicenna quod si quis à cane rabido demorsus, aquam timens in speculo respiciens, se ipsum cognouerit, huius salutis spem non deesse. Quod utique arguit hydrophobicos quoque sanari posse, cum veneni vis non adeo vniuersum occupauerit corpus, & cerebri facultates, vt omnino ratiocinatrix facultas ablata sit. Quamobrem mirum non est, si philosophus ille, cuius historiam refert Aëcius, curatus euaserit, cum manifestò appareat eius ratiocinatricem facultatem parum

fuisse affectam. Ad hæc scribit Auicenna euenire interdum, vt à cane rabido demorsus quidam frustra carnis ingenti cum dolore mingant, quæ forma propè canes paruulos referant, quod etià ab aliis recentioribus accepimus, quin & ab iis, qui huiusmodi catulos se minxisse fateantur. Cæterum cum hoc potius fabulosum, quam rationi consentaneum videatur, atque ab ipsa natura penitus alienum, si qui id verum esse rationibus, & autoritatibus comprobatum videre cupiunt, Genilem Falsipiam consulant Auicennæ interpretem: item Conciliatorem differentia 179. Quandoquidem ex iis nimirum intelligent, quo pacto hæc præter naturæ institutum quandoque eueniant. Postremo asserit in hoc capite Dioscorides fateri aliquos Themisonem, cum amico aquam expauescenti morem gereret, & officium exhiberet, quadam naturarum concordia similem contraxisse affectum. Sed id potius ego euenisse crediderim, quod Themison medicus amicum laborantem excitandi causa ad aquam, & cibum, secum manducasset, aut bibisset, ex eodem sanè poculo, eius fortasse salua infecto, aut alio quouis modo oris spumam contigisse. Nam si, vt Galenus tradit libro sexto de locis affectis, rabidorum canum salua, nuda corporis membra contingens, non aliter homines rabidos efficit, quam si demorderentur, quid mirum, si rabidi hominis salua id ipsum effecerit? Proinde eos admo-  
net Auicenna, qui rabidorum curam agunt, ne eorundem ciborum reliquias comedant. Nec parupendat aliquis spumæ contactu insci posse homines: quippe quod duos viderim ego, qui spuma tantum perfusi, nullo quidem ex morbu accepto vulnere, rabiem contraxerunt. Legitur in Aristotele lib. v. i. i. cap. x. x. de historia animalium, quod omnia animalia à cane rabido demorsa rabiunt, excepto homine. Quæ tamen sententia aperte falsa deprehenditur, vt milles experimento compertum est. Quamobrem potius adducor, vt credam Aristotelis codicem eo in loco deprauatum esse, quam vt in re clara, & omnibus cognita, ipsam Aristotelem ignoratæ accusare velim.

REMEDIA DEMORSOEVM  
A CANE RABIOSO.  
CAPVT XXXVII.

RATIO medendi duplex. vna communis, qua vtendum in omnes morsus, quos virulentæ animantes, imprefserunt: alia peculiaris priuatæque, eorum duntaxat quos rabiosi canes demorderint: quæ nonnullis quidem summam opem ferre consuevit: aliis verò inutilis, maxime qui ex multo iam tempore ictum acceperunt. Quæ ad hanc pertinent, primum, exponemus, deinde

Saluti in  
docum.

receptus  
de salum  
aperi

deinde cursim perstringemus, quæ ad communem medendi rationem pertinent, Cancros itaque fluuiatiles in famentis albæ vitæ cremare oportet, & cinerem eorum, quàm minutissimè tritum habere reconditum: itidem gentianæ radicem tusam, cribratamque reponere. Quoties autem canis rabiosus morsum intulerit, in quater nos cyathos meraci vini, bina cineris cancerum cochlearia, vnamq; gentianæ conciliantur: hæc cin polenta dilutioris modo dum subacta, quatrduo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo datur. Atqui si ab illato morsu bini ternive dies fluxerint, curationem aspiciabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium, quod & plerisque vnum satisfecit, eoque cum fiducia uti licet. Sed ut aliis etiãnum auxiliis contra inuitabile periculum muniamur, nihil ceteris uti prohibet. Satiùs autem multò fuerit, etiãsi in vanum recidat, medicamentorum in humanos tolerare cruciatus, quàm per inertiam, ac desidia in discrimen adduci. Nec ita in de morsu rabioso animali maiora vulnera vereri oportet, uti minora, & vlcusculis cutis similia: quippe maiori vulnerere confertim copiosus sanguis emanans, potest nonnihil virulentis liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit. quin à maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpelli circumscribere, & prehensam hamulo aut vulsella carnem amputare oportet. In vtriusque circumstantia loca altioribus vlcusculis scarificanda, ut copiosior sanguinis vacuatio arceat, ne venenum membratim insinuetur. Curcubitula cum multa flamma agglutinata id iuuamenti præstant, ut veneni vis extrahatur.

*Ceratio*  
*d' morsu*  
*rum à canis*  
*rabio-*  
*so.*

TAM accuratè exquisitèque tradidit hoc capite Dioscorides rabidi canis curationem, nihil planè silentio præteriens, ut mihi superuacuum esse videatur quicquam addere. Verùm ut nostrum sequatur institutum, utq; etiãnum le-

storibus fiat satis, qui nouis semper rebus inhiant, non alienum fuerit hic nonnulla commemorare, quæ multos fortasse delectabunt, quòd ea in hac re non inutilia, neque scitu inuicunda putem. In primis itaque illud animaduertendū est, quòd alia vitæ ratione cancerorum fluuiatilium cinerem præparabat Galenus, quàm Dioscorides, ut constat aperte ex verbis ipsius Galeni libro x i. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Ad fluuiatilium cancerorum cinis, quantum similiter prædictis excicatorius est, substantiæ tamen totius proprietate, mirificè contra rabiosorum morsum efficax est, isq; tum solus, tum cum gentiana & thure multò præstantior. Thuris sinè partem esse vnam oportet, quinque autem gentianæ, porro cancerum decem. Et ita equidem aliter illis vltis nos sumus vsi: ceterum ad eum modum pieruinq; quo vtebatur Aesculion empiricus, medicamentorum peritissimus senex, conclusit, ac præceptor meus. Patella erat æris rubri, in quam impositos cancos viuentes, hætenus vtebas, donec in cinerem redigerentur, ut faciliè ad leuiorem redigi possent. Hic Aesculion sic paratum promptum semper in edibus hoc habebat medicamen, tempore æliuo vrens cancos ipsos post ortum Canis, quando sol in Leonem transisset, luna decima octaua. Porro bibendum hoc medicamen iis, qui à cane rabido fuissent morsu, præbebat quotidie vsque ad diem quadragesimum mensura cochlearij satis magni, aquæ infersum. At si non protinus ab initio, verùm aliquot post dies à morsu curam cepisset demorsus, tunc quotidie duo cochlearia aquæ inspergebat. Ad ipsum verò vulnus emplasticum applicabat medicamentum, quòd ex pice brutia, & opopanax, acetodj conficitur, habens picis libram vnam, vnum aceti acerrimi sextarium Italicum, opopanaxis verò vncias tres. hæc Galenus. Cæterum sciendum est, eos maxime, meo iudicio, hallucinari (vt latius libro secundo prodidimus) qui gammarum Latinis vocatos, cancerum fluuiatilium loco, à cane rabido demorsis potui exhibent. Nanque aliud Græcis animal esse celsum *scorpionis*, aliud verò *scorpionis*, & *canis rabio*. Scripsit & Democritus carminibus huiusce cancerorū antidoti componendi rationem (vt libro secundo de antidotis refert Galenus) eo sinè modo, quo ipsum fortasse secutus eam reddit Dioscorides. Atamen antiquorum quidam etiam tunc terebinthinam inposuerunt thuris vice, quòd Aesculion Galeni præceptor huic semper inseruit medicamentum. In summa huius antidoti vires miris laudibus ab authoribus celebrantur, adeo ut scripserit Galenus, neminè iniquè mortuū esse, qui hoc antidoto rectè fuerit vsus. His nō dissimiles vires vteret assignat Alysso, si fecit quadraginta diebus consuius decur ex hydromelide porandū: sed à prima statim die incipiendū erit. Huius experimenti meminit Galenus libro i. i. de antidotis, ubi alia quoq; valèntiora remedia ad rabidorum morsum.

*Multum error.*

*Curatio  
ex Aërie.*

morbus ex Asclepiade retulit. Verum nobis difficile admodum fuerit decernere, quoniam hodie planta sit, quæ veterum Alysson præsentat, ita ut potius de hoc diuinandum esset, quam aliquid certi statuendum, ut latius superius libro tertio differuimus. Commendauit Aërius secundo, & sexto volumine, ad morbus rabidorum canum bitumen Iudaicum, siue Asphaltitis lacus, asserens si drachmæ pondere ex aqua bibatur, non id modo aquæ pauorem arcere, sed & eos sanare, quos iam primum timor inuaserit. Memorauit etiam marinos hippocampos ex aceto nigro & melle subactos, tam potu haustos, quam vulneri illitos. Confert præterea his maximè acutus rumex: quare idem scripsit se nouisse senem quendam, qui demorsus à cane rabido hoc solo tumice curabat. Primum enim vlcus eius decocto fovebat: deinde herbam ipsam illinebat, eandemque potidam exhibebat. quod quidem medicamentum tanquam efficacissimum summopere commendabat. Plurima autem, & turbulenta qui illam assumpserint, mingere solent: id quod maximè hac in curatione confert. Quo fortasse argumento exulit Auicenna propria quædam medicamenta, quæ cantharidas admixtas habet, ut valentissimè non modo urinam excernerent demorsis, sed etiam sanguinem ipsum, asserens paulò post securum esse salutis indicium, cum post medicamenta sanguinem mingunt affecti. Porro Galenus libro de theriaca ad Pisonem, theriacam præfert tam intus in corpus sumptam, quam exterius supra morbus illitam. Sed cum hæc, quæ nostro tempore conficitur, non adeo præstet, quemadmodum ea, quam ipse cõficiet Galenus, illi sanè fidere non possumus, nisi factò prius de ea periculo in gallis à vipera demorsis, ut ipse docet Galenus. Prodest item potamogetum cum sale exterius illitum: itidem caprifici cortex contusus, & ex aqua potus: quin & absinthium, & alium, minus centaureum, aristolochia, artemisia, scordium, chamædrys, bryonia, pulegium, & laser, tam exterius illita, quam interius sumpta. Sunt qui credant securissimum esse remedium ipsius rabidi canis, qui momorderit, iecur tostum, & à demorsis in cibis deuoratum. quod etiam scribit Dioscorides: quanuis id non affirmauerit, ut libro secundo capite de diuersorum animalium iecinoribus legitur. Proinde scribit Galenus lib. x. i. simpl. medic. iecur canis rabientis aliis valentioribus antidotis admistum quam plurimos sanasse, sed eos tamè interiisse, qui solum nullis aliis adiectis medicamentis illud esciarunt. Sunt etiamnum qui credant, ut loco antè citato tradit Dioscorides, acce- & aquæ pauores dente eo, qui caninus dicitur, si is à cane, qui momorderit, exeprensus, & folliculo inditus pro amulero brachio adnectatur. Sed nemi nisi his fidendum esse persuaserim, ut in nostra huius sexti libri præfatione de pretiosorum lapillorum suspensione diximus: scilicet enim esse semper existimaui certis ac tutis vi medicamē-

*Remedia  
suspecta.*

tis. Ceterum curationis summa manuum maxime operam exposcit. Quandoquidè vlcus deducere oportet, saniatamque per ambitum carnem rescindere: ita enim lator sit veneni exterius euocandi aditus, demitur quod tabefactum est, & ex languinis fluore ab exciditibus cultris excitato, repens affectio non parum reuellit. Quod etiam facere expedit scalpello circumquaque profundius adacto, & subinde appositis scilicet pro loco cucurbitulis sanguinem forriter extrahentibus, aut hirudinibus. Medicamēta autem, quæ alium citant, & humores deiciunt, in principio omnino vitanda sunt, sicuti etiā sanguinis missio. quippe cum hæc à circumferentiis ad centrum trahendi facultatem habeant, facillè ægros in mortis traherent discrimen. Tamen in curationis processu, & ubi præsertim medicorum negligētia citius quam expectat ratio conclusum fuerit vlcus, irreperitisque venenum (ut postea dicitur) medicamēta alium decentia, pariterque sanguinis missio in sanguineis temperaturis admodum quandoque proficiant. Verum enimmurò perpauci nostra hæc ætate habentur à rabioso cane demorsis, qui medicos cõsulant. Nam tanta est religionis vis, ut omnes, quos canes rabiosi momorderint, partim ad diui Donini templum confugiant, partim verò ad diui Bellini facellum, ubi quibusdam exorcismis, & panibus characteribus obsecratis à sacerdotibus perquam facillè curantur, ut plurimorum testimonio equidem fateri possum. Sed cogitanti mihi quoniam pacto hoc ita facillè eueniat, nonnullæ sese obtulerunt rationes, quas liberè dicam. Haud dubiè in primis diuina auxiliatur gratia: quippe cum non parum moleste sitque morbus canis rabiosi affectis inferre possint cacodemones, ut qui in atrabiliaris humoribus suam habeant sedem, ij quidem exorcismis cedentes abeunt, & afflictiorum corpora munda relinquunt, sublato secum veneno. Illud præterea addiderim, quòd fortasse sacerdores ipsi aliquod nobis occultum habent antidotum, quod panibus illis admiscentes, ægris deuorandum: vel id aliquo in potu bibendum exhibent. His denique accedit magna laborantium fides, quam suscipit Deus optimus maximus, cuius solius munere omnia nostra delentur incommoda, & atque omnes auferuntur ægritudines.

*Auxilium  
religiosum.*

VSTO DEMOREORYM A  
CANE RABIOSO. CAP.  
X X X V I I I.

CONTRA VIRULETOS ICTUS, vltio expeditissimū est auxilium, utpote cum ignis cætera viribus præstet, simul quòd virus domet, & ferri penitus nō patiatur: simul quòd pars ignem experit, postea non vulgare fundamentum curatio

curationi futuræ præbeat, manente diutius exulceratione: Animaduertendum ex eo tempore, cum crustæ decidit, ne viceris oræ coalescant, & cicatrice induatur, sed si fieri potest ad multum, idque præstitutum tempus, vlcera-  
 10 tionem, & sordidas adhuc & inflammationem minantes prorogari conuenit. Quod inditum iis falsamentum optimè præstabit, & syluestre allium detritum, itè cepæ, succusve, præsertim Cyrenai-  
 cus, aut qui Medicus, aut Parthicus ap-  
 pellatur. Tritici granata mansa, quam  
 20 nō mansa imponantur: siquidē subacta  
 pistāte à persusione vulnera dilatant.  
 Sunt qui à mandentium ieiunio, sibi ali-  
 quid asciscere arbitrentur, quod suapte  
 natura resistat: verum id certū non est.  
 ceterum tēpestium corū vsus minimè  
 est cōtēpnēdus. Si verò, quod persæpe  
 accidit, ante dies præfinitos cicatrices  
 coirent, committerenturque, manum  
 postulabunt: namque eas diducere, car-  
 nēque scalpello circinare, aut iterum  
 inurere expediet. Vbi verò propositum  
 tempore præterit, vlcus ad cicatricem  
 ducendum, & emplastro, quod è sali-  
 bus conficitur, locus comprehendendus:  
 nec multo pōt sinapismo vtendū.

*Uisionis, sine caute-  
 riq. vtilitas* **CAUTERIVM**, quod ferro igne candē  
 40 ti, aut auro, aut argento fit, non modò saluti-  
 ferum est ad rabidi canis morsum, sed etiam  
 aliorum quoruncunq; animalium virus eiacu-  
 lantium, quin & ad alios insaniabiles ferē mor-  
 bos. Proinde mirum non est, quod hoc loco  
 dixerit Dioscorides vñtionem, siue cauterium  
 cōtra virulētos iētus aut morsus expeditissimū  
 esse auxilium. Fiat itaq; cauterium intrepidē,  
 tantæq; amplitudinis, vt vlcis cicatrices breui  
 committi non possint. Quod si timidus quispiā  
 vñtionem ignis terrore recuset, septicis & exul-  
 cerantibus medicamentis vtendum erit. Qua-  
 45 liu re cæteris præstat, quod vocant argentum  
 sublimatū. admiscetur id vnguentis refrigeran-  
 tibus, vt minus doloris inferat. Probatum hoc,  
 quod non modò valentissimè inurat, sed quod  
 etiam exusta ab eo caro, obductaq; crusta duo-  
 bus tantum diebus pōt decidat, si tamen recen-  
 ti buryo assidue illinatur. id quod in aliorum  
 exulceratione non euenit, nisi quod iore temporis  
 tractu. Quod si signe, aut adurent medicamen-  
 ta ( vt multis de causis quandoque accidit) id  
 effici nequeat, diligenter providendum est, ne

vulnus coctat, sed diutius maneat diductum &  
 apertum, superimpositis emplastris validè attra-  
 hentibus, cuiusmodi sunt quæ è brutia pice,  
 resinis, vario gummi genere, & id genus aliis  
 parantur. Si verò cauteria fiant, diligenter pro-  
 curandum, vt relicta quā primum excidat  
 crusta, quò veneno pateat exitus. quippe ea diu  
 in vulnere retenta, omnes obducit meatus ma-  
 gno ægrorum detrimento. Porro non magno  
 quidem negotio decideret apposita continuè li-  
 quida vernice oui vitello, & recenti buryo  
 10 permixta: quin & buryo solo igni liquato, &  
 madefactis in eo splenis superimposito: præstat  
 enim hoc cæteris. Vbi verò è vulnere crusta  
 deciderit, salutariferum quidem fuerit remedium  
 plagæ quotidiè puluerem præcipitati (sic enim  
 vocant chynissæ argenti vium in puluerem  
 rubicundum conflatum) inspergere: siquidem  
 id eximium præstabilissimūq; medicamentum,  
 præter id quòd vulnus occludi prohibet, diuq;  
 20 patens feruat, attrahit etiamnum ex alto ad su-  
 persiciem potentem venenum. Qua in re cætera  
 huiusce facultatis præcellit medicamenta. Cō-  
 mode etiam, nec minus efficaciter idem pulvis  
 attractorius emplastris, siue vnguentis admisce-  
 ri, & subinde vulnere admoeri potest. etenim  
 iandudum certior sum, in vniuersa medicæ fa-  
 cultatis materia, nullum haberi medicamentum,  
 30 quod valentius ab alto reuocet extrahatq; vi-  
 rus, quā præcitarum dictum. Ad hæc tamen si  
 ( vt omnibus ferè placet ) in quadragesimo  
 diem apertam vulnus dimittere sit satis, non  
 tamen errauerit, qui diutius prorogauerit, vt  
 quicquid mali residuum fuerit, exhauriatur.

**RATIO VICTVS IN MORSV  
 RABIOSI CANIS. CAP.**

**X X I X.**

**QVÆ** AD partem istam pertinet  
 40 præsidia, ita se habent. Cæterum victus  
 rationem ex iis, quæ veneno aduer-  
 santur, coniectura quadam colligere  
 oportet, simul vt veneni vires hebetet  
 restinguatque, simul vt arceat, quò mi-  
 nus ad intima perniciēs illabatur. Et-  
 enim assumpta perniciosarum virium  
 50 penetrationi resistit. Quorum vtrunq;  
 præstare potest vini meracioris, passī,  
 & lactis potus. quippe qui hæc omnia  
 capiunt ad curam, nonnihil veneno ob-  
 iiciunt, quod omnem eius acrimoniam  
 obundat. Simili modo aliorū, porro-  
 rum, ceparūque cibus: quòd ea diffi-  
 culter conficiantur, vixq; abolerantur.  
 Nam multos dies huius cibi qualitates  
 remanēt, quo tempore nec euincitur,  
 nec permutantur à mortifera vi, sed

*Præcipim  
 si Vocat  
 Vñ.*

contrariis illa vis expugnatur. Cui rei antidotorum vsus accommodatur, & theriaces, Mithridatij, & eius quod eupatorio temperatur, denique omnium quæ magnam aromatum partem sibi vendicant. quippe aromata omnia viribus & substantiis ægrè permutantur: quare in corporibus euincunt. Vicitus ratio hoc modo se habet. Nosse conuenit, pauiorem aquæ non flatu, definitoque tempore exoriri: plurimum tamen ad quadragesimum vsque diem neglectis differri consuevit: post semestrem etiam nonnullos inuadit: quendam post annum aquam horruisse constat, quæ nobis visu comperta fuere. Narrant & aliquos post septennium aquæ metu fuisse tentatos. Inter principia demorforum à cane rabioso curandi ratio talis est. Verum enim vero si ea quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermissa fuerint, nec scalpro carnem circinare, nec vitionem experiri operæ pretium est. non enim quod pertransit, satis euocare possent. Nulla uti que istius rei occasio aut utilitas, sed in cassum corpora doloribus sternentur. Alter verò curationis modus accedat. Deiectio magnum præbet iuuamentum, utpote cum mouendo, corporis habitum transmutet: & quæ colocynthidem recipit hiera, item lax schistum, quod simul deiectionem moueat, & venenum domare possit. cibi acres, & me raculi potus, quibus vis veneni vehementer retunditur, quotidie sumi debent. Cæterum sudores ante cibos, & post etiam ciendi. Dropacismi sinapismique alternatim per corpus totum adiiciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium helleborismus cognoscitur: quo cum fiducia non semel atque iterum, sed frequentius ante quadragesimum diem, vel post hoc tempus uti licet. Tantam enim vehementiam hoc auxilium habere fertur, ut qui dam qui iam aquæ metum sentirent, sumpto helleboro, simul ac primum morbi impetum experirentur, fuerint

seruati. nam & iam vitio tentatos nemo vnquam seruare potest. Itaque primum curam contra rabiosi canis morsus breui sermone exposuimus. iam ad alia, quæ venenatis moribus scuire cōsueuerunt, transeundum. Notas vno contextu, deinde communem medendi locum, qui omnibus conuenire possit, explicabimus. Cursim deinceps subiungemus ea, quæ sua proprietate non nullis auxilium præstare possunt. Postremò subnectentur etiam venenata, quæ nullis cādunt remediis.

INSTITVENDA demorsis à cane rabioso diligentem est ratio vicius, nec ea tantum regula, cuius hic meminisse Dioscorides, sed etiam ut ea sit ciborum quantitas, quæ iis rectè conueniat. Siquidem huiusce curationis regimen tenemus vicius non expedit, sicuti nec pleniorē, ut Aëlius est author libro v. i. ubi sic inquit. In victu indigentia, & sitietas euitanda, magis tamen indigentia: hæc enim succorum prauitatem adauget, quod nequaquam expedit malefico vlceri. Ergo alimentum moderari oportet, ut rectè concipiatur, & optimum succum corpori præbeat. Nec minus egestionis, & vinarum pro uocationi studendum. quod quidem tum ea, quæ prædiximus, tum fœniculum, & scandix comesta efficiunt. Plus verò simul & alium, & vrinam ducit, ac cichorium agreste crudum oblarum stomacho confert, quem nonnulli ferim, nonnulli ab amaritudine picris appellant. Pro sunt & brassicæ cimæ, & palustris asparagus, & hortensis, & agrestis rumex: & è piscibus qui carnem teneram habent, & cammari, cancri, & erinacei recentes cum vino mulso: & carniū extremitates, auiculæque omnes montanæ, quæ facillè coquantur, bonique sunt succi. Vinum album tenue, neque valde antiquum. hæc ille. Ex quibus conici potest, hæc in curatione ea plurimum conferre, quæ vrinam valenter mouent. Idcirco Auicenna (ut proxima commentatione diximus) quædam profert medicamenta, quæ cantharidas excipiunt, per vna cum lotio sanguis etiam reddatur. Proinde mirum non est, si quandoquæ prævalens natura, per instrumentum vrinæ, magno cum dolore parua veluti liquida carnis frusta catulorum forma, venenum propellat. His itaque ea vicius ratione uti licebit, quæ vrinam ægrè excernentibus à medicis institui solet. Verum si fluicillies cancri, quibus vniuersa abundat Herruria, haberi poterunt, iis tam in prædio, quam in cœna vescantur demorsis: quod iis mira instat facultas, aduersus rabidorum canum venenū. Præbet Auicenna præter dulce vinum etiam aquam, in qua candens ferrum, vel chalybs resincta fuerint. Cæterum nosse conuenit (ut scribit

*Ratio vicius demorsis à cane rabioso institvenda.*



*Aqua pa-* scribit Dioscorides) aqua pauorem non stato  
*ner ad* definitoque tempore exoriri: plurimum tamen  
*quod Ef-* ad quadragesimum vique diem neglectis differ  
*que tem-* ri consuevit: post semestrem etiam nonnullos in-  
*pus ex-* uadit: quendam post annum aquam horruisse  
*uident.* constat. quæ nobis visu comperta fuere. Nar-  
rant, & aliquos post septennium aquæ metu  
fuisse tentatos. Sed cogitant mihi vnde id eue-  
niat, nulla sanè alia hætenus sese obtulit ratio,  
quàm quæ ex demorsorum temperamento, ac  
viribus sumi potest. Quandoquidem nonnulli  
habentur, qui viribus validissimis præstant: qui-  
dam qui debiles, & infirmi sunt: alij qui corporis  
meatus angustissimos habent, alij verò con-  
tra: quidam syncerissimis referti sunt humoribus,  
nonnulli verò succis ichoribus scatentibus,  
ac facillè putredini obnoxii. Ex quo fit, vt  
in his citius, in illis verò ferius hæc appareant  
symptomata. In Heruria abibunt demorsi per  
integrum annum à quorundam lignorum con-  
tactu, præsertim corni arboris, & sanguineæ vir-  
gæ vocatæ. Siquidem ( vt testantur ij, qui rem  
experimento compertam habent) si harum ar-  
borum virgæ tandiu manibus teneantur, quo-  
usque concalescant, illico demorsi rabie exagi-  
tantur. Quod cuiquam minimè fabulosum vi-  
deri debet: etenim meminì me viderisse in ciui-  
tate nostra Illicienis amicum quendam meum  
rabie correptum, quod corni arboris virgis (da-  
bat enim lanificio operam) lanam diu excussis-  
set, qui eorum oblitus, quibus sibi à medicis in-  
terdictum erat, rabidus interiit. Postremo scien-  
dum est, aquæ pauorem hauquaquam curari  
posse, cum veneni vis omnes corporis occupa-  
uerit facultates: quauis in ipso pauoris initio,  
aut anteaquam venenum illapsum fuerit in vni-  
uersum corpus, aliqui curati euaserint, vt phi-  
losophus ille, cuius historiam superius enarra-  
uimus, præsertim cum pro viribus in morbum  
nitiuntur malè affecti, & qui eorum curationem  
agunt. His adimplari videtur Dioscorides: qui  
pe qui quosdam asserit, qui iam aquæ metum  
sentiebant, sumpto cum fiducia helleborismo  
non semel atque iterum, sed frequentius ante  
quadragesimum diem vel post, fuisse seruatos.  
Proinde scribit Auicenna eos, qui aquam ex-  
pauescunt, deploratos non esse, quousque in  
speculo inuentes seipfos cognoscunt, argumen-  
to quod non adhuc venenum vniuersas insecere  
cerebri facultates. Hoc igitur tempore me-  
dicamentis vtendum est deiectionis, & si nihil  
obiter, sanguinis missio non aspernanda. Ex me-  
dicamentis autem in hoc ceteris præstat a'bium  
vel nigrum veratrum, iis adiectis, quæ eorum  
infruant feruorem. Conuenit etiam epithy-  
mum, fena, fumaria, myrobala, elaterium, aga-  
ricum, rhubarbarum, centaarium minus, geni-  
stæ semen, thapsia, confectio Amecæ, & hiera  
colocynthidis: & Armenias lapides: quidem hæc  
in atra bile deicienda principem tenent locum.  
Proderit item Syriacum bitumen frequentius  
ex aqua potum: quin & Mithridatis antidotum.

& ipsa theriaca, & cancerorum fluuiatilium com-  
bustorum puluis, Galeni modo paratus. Con-  
fert præterea his leporis, vulpis, & capreoli coa-  
gulum. Sed semper in primis omni studio cu-  
randum, vt aquam malè affecti bibant. Verùm  
ne ipsam intuentes paor inuadat, longissimis  
tenuibusque metallicis fistulis & longinquo du-  
cenda erit, aut ex superioribus contabulamen-  
tis: nanque ipsa sola seruari poterunt. Refert  
10 Aëtius, quod si catuli coagulum ex aceto semel  
tantum ederint hydrophobici, statim eos capit  
porus aquæ cupiditas, & bibunt: obidq; medi-  
camentum hoc miris laudibus extulit. Sunt qui  
nigrum cicæ aquæ incoquendum esse velint:  
sic enim aqua claritatem amittit, nigræque effi-  
citur: & præter id quod haurientibus pauorem  
non adfert, quemadmodum quæ sincera, pellu-  
cidique spectatur, viram valenter ducit. Nec  
desunt qui suadeant vrentia cataplasma occi-  
piet esse apponenda, pariterque post aures. Quæ  
etsi ad rem facere non videantur, quod valen-  
tissimè exiccent, vbi tamen deplorati sunt ægri,  
valentissimis etiam medicamentis vti licebit.

COMMVNIS CVRATIO IN  
OMNES ICTVS VIRV-  
LENTOS. CAP. XL.

*Aqua pa-* scribit Dioscorides) aqua pauorem non stato  
*ner ad* definitoque tempore exoriri: plurimum tamen  
*quod Ef-* ad quadragesimum vique diem neglectis differ  
*que tem-* ri consuevit: post semestrem etiam nonnullos in-  
*pus ex-* uadit: quendam post annum aquam horruisse  
*uident.* constat. quæ nobis visu comperta fuere. Nar-  
rant, & aliquos post septennium aquæ metu  
fuisse tentatos. Sed cogitant mihi vnde id eue-  
niat, nulla sanè alia hætenus sese obtulit ratio,  
quàm quæ ex demorsorum temperamento, ac  
viribus sumi potest. Quandoquidem nonnulli  
habentur, qui viribus validissimis præstant: qui-  
dam qui debiles, & infirmi sunt: alij qui corporis  
meatus angustissimos habent, alij verò con-  
tra: quidam syncerissimis referti sunt humoribus,  
nonnulli verò succis ichoribus scatentibus,  
ac facillè putredini obnoxii. Ex quo fit, vt  
in his citius, in illis verò ferius hæc appareant  
symptomata. In Heruria abibunt demorsi per  
integrum annum à quorundam lignorum con-  
tactu, præsertim corni arboris, & sanguineæ vir-  
gæ vocatæ. Siquidem ( vt testantur ij, qui rem  
experimento compertam habent) si harum ar-  
borum virgæ tandiu manibus teneantur, quo-  
usque concalescant, illico demorsi rabie exagi-  
tantur. Quod cuiquam minimè fabulosum vi-  
deri debet: etenim meminì me viderisse in ciui-  
tate nostra Illicienis amicum quendam meum  
rabie correptum, quod corni arboris virgis (da-  
bat enim lanificio operam) lanam diu excussis-  
set, qui eorum oblitus, quibus sibi à medicis in-  
terdictum erat, rabidus interiit. Postremo scien-  
dum est, aquæ pauorem hauquaquam curari  
posse, cum veneni vis omnes corporis occupa-  
uerit facultates: quauis in ipso pauoris initio,  
aut anteaquam venenum illapsum fuerit in vni-  
uersum corpus, aliqui curati euaserint, vt phi-  
losophus ille, cuius historiam superius enarra-  
uimus, præsertim cum pro viribus in morbum  
nitiuntur malè affecti, & qui eorum curationem  
agunt. His adimplari videtur Dioscorides: qui  
pe qui quosdam asserit, qui iam aquæ metum  
sentiebant, sumpto cum fiducia helleborismo  
non semel atque iterum, sed frequentius ante  
quadragesimum diem vel post, fuisse seruatos.  
Proinde scribit Auicenna eos, qui aquam ex-  
pauescunt, deploratos non esse, quousque in  
speculo inuentes seipfos cognoscunt, argumen-  
to quod non adhuc venenum vniuersas insecere  
cerebri facultates. Hoc igitur tempore me-  
dicamentis vtendum est deiectionis, & si nihil  
obiter, sanguinis missio non aspernanda. Ex me-  
dicamentis autem in hoc ceteris præstat a'bium  
vel nigrum veratrum, iis adiectis, quæ eorum  
infruant feruorem. Conuenit etiam epithy-  
mum, fena, fumaria, myrobala, elaterium, aga-  
ricum, rhubarbarum, centaarium minus, geni-  
stæ semen, thapsia, confectio Amecæ, & hiera  
colocynthidis: & Armenias lapides: quidem hæc  
in atra bile deicienda principem tenent locum.  
Proderit item Syriacum bitumen frequentius  
ex aqua potum: quin & Mithridatis antidotum.

ADVERSUS quidem omnem ani-  
malis ictum, quod venenum vibrat,  
oris suctione conuenit. Sugentem verò  
oportet ieiunum non esse, sed & cibum  
sumpsisse, & vino os abluisse: postea exi-  
guum olei in ore continens plagā exu-  
gat. Locus ipse spongia fouendus, de-  
inde scarificandus: sed vlcuscula alius  
imprimere expedit, quod virofa mate-  
ries profundo euocetur. Circinatio au-  
tem carnis, & sectio, scarificatione lon-  
gè potentius opitulantur: nanque ab  
iis duo peculiaria præsidia sunt. vnum,  
quod virus è loco tollitur: alterum, quod  
eius veneni pars, quæ ad interiora graf-  
satur, cum multo copiosiusque sanguine  
excernitur. Quod si locus sectionem  
non admittat, curbitula cum largio-  
ri flamma adigenda sunt. Sed iam de  
vitione supra in rabiosorum morfu dis-  
seruimus. Si verò ista pars, vtpote ex-  
trema, eam sectionem commodè non  
respuat, præsertim in omnibus serpen-  
tium ictibus, vt aspidis, cerastæ, simi-  
liumque, procul dubio amputanda est.  
Conuenientiora supra dictis auxilia  
sunt, quæ epithemata vocant. Impona-  
tur

tur farmentitius cinis, aut ficulus, cū  
 lixiuo stillatio subactus, garo, & acri  
 falfamento: porri, cepæ, & alia modò  
 minutissimè cōtrita illinuntur, modò  
 cremata vulneribus iniiciuntur. Quin-  
 etiam dissecti gallinarū pulli, cū ma-  
 ximè tepent, percusso loco applicētur.  
 Nec defunt qui hisce tanquam discor-  
 dia quādā naturali pugnātibz vtan-  
 tur: verūm huius rationem inire facil-  
 limum fuerit. Gallinæ enim calida na-  
 tura præditæ sunt, argumento, quòd  
 deuoratum insigne virus conficiunt, &  
 aridissima quæq; semina consumunt:  
 item nonnunquam arenas lapillósque  
 ingluvie sua deuoratos, dissoluūt. Ita-  
 que animantis admoti calore adiutus  
 spiritus, ab ic̃ta parte impetum cape-  
 sens exiliensq; secum venenum exigit.  
 Nec me fugit, quid in Aegypto fieri so-  
 leat. Cū spicas Aegyptij metunt, ol-  
 lam picis paratā habent, & appensam  
 fasciā. tunc enim maximè serpentium  
 iniurias expauescunt, tum propter spi-  
 cilegij tempus, tum quòd opacis simul  
 abdita speluncis, & cauernis, densoq;  
 aruorum cespice delitescunt. Molestif-  
 sima enim animalia, & virus eructan-  
 tia, Aegyptus in campis ferre consue-  
 uit. Vbi ergo aut in pedem, aut partē  
 aliam, morsum intulerunt, qui adsunt,  
 fasciam in ollam picis coniiciunt, & se-  
 mel aut iterū brachium aut crus pau-  
 lum supra vulnus obligant, & arctissi-  
 mè duò è præsentibus distringunt, lo-  
 cumq; secantes qua circumactus est la-  
 queus, picem instillant: cūque satis  
 vulnus excepisse videtur, laqueum re-  
 soluunt, & cepis aliisq; suprā memo-  
 ratis illinunt. Præterea pix liquida cū  
 sale trito & feruente illita, præsentan-  
 tio est auxilio, si iugiter innouetur.

discutere possunt. Cuiusmodi sunt quæ  
 ex sale, aut nitro, sinapi, & cachrye  
 componuntur, de quibus consequen-  
 ter erit tractādum. Erasistratus autem  
 non iniusta reprehensione eos incelsit,  
 qui incognitas ad hunc vsum faculta-  
 tes conscripserunt, vt elephanti fel,  
 crocodilivē sanguinem, ouaque testu-  
 dinis, & consimilia. Nam cū iuuan-  
 tia quādam literis tradidisse videntur,  
 planè in hæc sola incidentibus impo-  
 fuerunt. Quare talia deuitanda sunt,  
 cū difficile, nisi regia facultate, per-  
 uestigare possint: neque, quòd nostra fi-  
 des iis obstringatur, frequenti obser-  
 uatione, sufficiens experimentum præ-  
 stiterint. Quæ autem ad communem  
 omnium vsum pertinent, quæque fa-  
 cile suppeditari, & omnibus à serpen-  
 te percussis auxiliū ferre queunt, sub-  
 iungenda videntur. Intubus itaque, &  
 erica, & astragalus, cū aceto pota con-  
 tra omnes serpentū morsus auxilian-  
 tur. Item bitumen, & virentes platani  
 pilulæ in vino diluto coctæ, & paliuri  
 decoctum: radix aristolochiæ, & cryn-  
 gij: decoctæ etiam lauri bacæ, & deu-  
 oratæ, pipérque largius esitatu, ruta,  
 anethum, & cyclaminus: coma porro-  
 rum prinatium ex pane, aut allium, aut  
 cepæ, falfamentaque quā acerrima:  
 origani decoctum cum vino potum,  
 fœniculi, pulegij, calaminthæ, porro-  
 rumque succus cum melle desorptus,  
 hæc quidem à plantis conquiruntur.  
 Ab animantibus verò quædam vtiliter  
 peti solent, gallinaceorum cerebella  
 in cibo, leporinum coagulū cum vino,  
 iidem castorei sextantes testes marinæ  
 testudinis sumpti multū prodesse tra-  
 duntur: mustela sale inueterata inter  
 auxiliaria medicamenta est. Commen-  
 datur in primis exenterata, quæ sale  
 siccescens inueteratur: ex qua binas  
 drachmas cum vino bibisse satis est.  
 Sed de simplicibus, quæ dari solent, ha-  
 ctenus. Percussis à serpente prodest alui  
 deicctio, difluens sudor, vrina copiosè  
 reddita. Sunt & composita quædam

poriones, quæ mira remedia polliceri traduntur, vt & opij & myrrha singuli oboli, piperis sicilicum: ea melle excipiuntur, & instat Aegyptiæ fabæ dantur cum vino. Itidem syluestris rutæ seminis, gith, cumini Aethiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum pares portiones tritæ, & cum erucæ succo fortibactæ, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquent. dantur ex iis terni cyathi cum vino. Hæc habui de communibus auxiliis quæ dicerem. De peculiaribus remediis contra bestias, quæ venena vibrant, consequenter est dicendum.

*Ordinâ  
discor-  
dis immu-  
tativatio.*

**VENENOSORVM** animalium ictus, mortuusq; doctrinam, curandiq; rationem, duabus sectionibus tradidit Dioscorides. In quarum altera cuiuscuq; ictus indicia exposuit: in altera verò curationes diligentissimè conscripsit. Ceterum præfationem hanc illi sectioni præposuit, quæ curandi rationem doceat in qua præfatione omnium virulentorum ictuum curationem in vniuersum profectus est. Verùm quoniam (vt superius diximus in commentatione, quâ in caput x x x v. huius libri conscripsimus) rati sumus illud non parum legenti negotiû facessere, quod ex diuersis locis indicia, & curationes conquirantur, vt id molestè quisq; effugeret, utq; citius cōmodiusq; nulla temporis iactura omnia in vnum redacta haberentur, vbi prius illa in duobus locis legebantur, nos omnia in vnum locû congestimus, atq; ex duobus capitibus vnum tantû fecimus, singulis virulentorû ictibus sua præfatoria remedia subicientes. Hanc verò Dioscoridis præfationem præfiximus, in qua tametsi ad eodẽ exatẽ docteq; tradiderit in vniuersalem virulentorum omnium animalium ictibus medendi methodum, vt nihil planè addi possit: tamen ne ab instituto nostro defecisse videamur, in eorum gratiam, qui semper plura proferri expectant, nonnulla modò differam, quæ, vt arbitror, non inuicula, neq; scitu inuicula erunt. Dicam itaq; primû animalium, ferarumq; virus, non in omnia bus esse idem, sed in hoc vterq; diuersi hementissimû, & omnium perniciosissimû, adeo vt vna tantum hora hominem consiciat, vt in aspidè, cerastè, & bassiliscotin alio verò minus vehemens minusq; letale, vno vel duobus diebus interimens. vt in viperâ: in alio denique his longè imbecillius, vt in scorpione, & phalangio, longiore tempore necans. Verùm quauquam id plerunq; euenit, quod animalia quæ mordent, vel ictum, diuersorum sint generum, & proinde diuersi etiam eorum venenâ, accidit tamen, vt ab aspidè, vel viperâ de-

*Venenosus  
est diuersi  
gradus, et  
effetus.*

mors quandoque tribus tantum horis, interdum vno duntaxat die, nonnunquam pluribus diebus superuiuat. Quod à diuersis causis provenit: siquidem in aspidum, & viperarum genere longè perniciosiores sunt femine quam mares, iuvenes quam senes (quanvis non desint, qui contrariû putent) adultæ quam adolescentæ. Quinetiam feræ omnes, & insecta in montibus, & aridis locis inter vepres, & saxa degentes, iis citius hominem perdunt, quæ palustres, vliginososq; tractus incolunt. Citius præterea necant, quæ orientalem, & meridionalem inhabitant plagam, quàm quæ septentrionalem. Ad hæc famelicæ depauperiores sunt, & irritatæ venenosiores sunt, quàm dimissæ. quanvis omnium in vniuersum ictus perniciosiores sint æstate, quàm hyeme. Hæ itaq; causæ esse possunt, cur citius, vel serius demorsus intereat. Id tamen etiam plerunq; fit ex fortiori, vel imbecilliori demorsorum temperamento, aut valoris latitudine, vel angustia. quandoquidem (vt superius pluribus in locis diximus) veneno non tam facilis patebit aditus, vbi vasa suapte natura angusta fuerint, quàm vbi latiora. Cæterum errant, Auicennæ testimonio, qui serpentium venenum frigidum esse statuunt, quod ab iis demorsus illico frigidus fiat, quodq; serpentes ipsi, vt frigoris impatientes, apperente hyeme in subterraneis cauernis latitent, vel sublapidibus, sub quibus priuatim se condunt viperæ, vbi nonnunquam adeo frigore correptæ reperiuntur, vt stupidæ & immobiles reddatæ, tanquàm congelatæ persistant. Frigiditas enim toti corpori ex ictu vel morsu adueniens, non vtiq; euenit ex veneni frigiditate, sed quod innatus calor ab extremis, & vltimis corporis partibus ad cor se conferat, quodq; etiam veneno superetur, & extinguitur. Nec eo argumento frigidi temperamento serpentes sunt iudicandi, quod scilicet hyeme immobiles, & ferè exanimis suis in cauernis reperiuntur, quippe nulla alia de causa id illis accidit, quam quod eorum natura, quæ calidissima est, id maxime refugiat, quod sibi contrarium sentit. Visitur hoc pariter in piscibus, qui cum frigidi natura sint, quàm primû ex aqua extrahuntur, aeris calore necantur. Quin & vespæ, quæ temperamento calidæ sunt, & siccæ, eadem ratione hyeme coasciuntur, nisi calidissimis recondantur locis. Sed iam ictuum, vel morsuum virulentorum curationẽ aggrediamur. In quâ Dioscoridẽ, Paulum, Aetium, & alios æterni nominis scriptores imitati, dicimus efficacissimû esse remediû, morsu vel ictu illatum vulnus continuè ore sugere (sugentem tamen prius præparatum esse oportet) & subinde venenum, vel venenatum sanguinem expuere. Veruntamen id opus, meo quidem iudicio, perfici non potest, absq; magno sugentis discrimine. Nam si in aliqua oris parte, aut gingiuarum, linguæ, palatq; vltimūculum aliquod fuerit, quaquàm ad eodẽ insensibile, vt cutis tantum

*Quorum-  
dam epim.  
explosa.*

*Venerunt  
rati istum.  
Vel mor-  
sum can-  
ratio.*

tantum occupet, ubi venenum in os fustione reuocatum viceris locum configerit, & sanguini se admiscuerit, qui forti fustione facile & gingivis per dentium connexus manat, dubitandum non est, quin illico fugenti perniciem inferat: itaq; fiat, vt qui alteri mederi velit, sibi ipsi necesse pareat. Quin nec minus periculi immineret, si venenata saluæ tanillum in stomachum descenderet. Neq; temere hæc dicimus, etenim iam nos vidimus vt superius in nostra in primâ, & vniuersalem huius libri præfatione commemoratone retulimus) vultum, qui cum scenum quodâ in prato fecaret, fortè fortuna falce mediam secuit: videram: & cum à trunco, quem manu imprudens sustulerat, in digito morsus esset, os vulnere statim admoit, & venenatâ exiit sanguinem, quo facto repente mortuus incidit. Proinde scite admonet. Aëtius, vt caueat, qui fugiunt, ne os habeant viceratam. Porro ad hæc vitanda discrimina, recentiores galli vel gallinæ sedem plumis exuunt, & vulnere confusissimè applicant, & denotuo primo, alterum substitunt, idq; tandem prosequitur, quousq; vniuersa veneni vis extrahatur. Cuius rei certum indicium habent, cum gallus postmodum appositus nō moritur. Aëtius Dioscoridem secutus, non modò gallinaceos, gallinasq; viuentes dissectas, & adhuc palpitantes his moribus commodè applicari tradidit, sed etiam quodlibet volatiliū genus, item iuuenum, tennellorumq; quadrupedum. Dehinc idem iubet, excitatis calidæ aquæ potu vomitibus, valentiora dari antidota, nempe theriacâ, & Mithridatis antidotum. Mirificum vim in curatione habent, quantum eisdem experientia comperi, quanta nostra essentia, pariterq; oleū de scorpionibus, quorum parandi rationem in præfationis huius libri commentario tradidimus: quidē hæc tantum antidotis, imò nonnullum solo oleo, nonnullis à viperis demorsos sanauimus, paucis admodum horis, qui cum nullū vitæ signum præberent, tanquā deplorati iacebant. Nam tanta est horum partium tenuitas, vt momento vniuersum corpus percutiant, & subinde omne superent venenū. Protulit Aëtius fragmentorū, & sculneæ cineris vice, eam quæ elaurinis conficitur lignis. Cuius sententiæ magis probandâ censuimus, quod hæc arbor superæ naturâ polleat aduersus venenâ. Vbi verò veneni vis cōtempax reperitur, & non nisi longo tempore euinci possit, est diligenter animaduertendū, ne isti vnaquā die ac nocte dormire sinatur, donec veneni vis euaserit, quippe quod sonitus (vultus in locis superius dictū est) venenū maxime ad cor, & cerebrū ducat, & secum trahat. Mala præter hæc habentur remedia vulnere illinenda, vt calx viua, oleo & mellē subacta, hæc enim (vt Aëtius est author) omnibus venenatis moribus opert, præterquam ab aspidē illatis. Sunt & qui nigri veratri recentem radicem in vulnus ligendam consulant, quod hæc (vt equidem me experientia co-

gnouisse fateri possum) virus valētissimè extrahat. Quamobrem Tridentina rura cum iuuenum aliquod à serpente icitur, statim perforato ibidem corio, præstantissimū remedio essebori nigri radices in vulnus inserit. Prostant etiamnum magno iuuamento cepa, allium, porrum, asphodeli, & dracunculi radix elixa, conuulsi, & subinde theriaca, aut Mithridatio, & oleo de scorpionibus subacta, & illita. Non secus auxiliantur, iris, ari, pbu, vtriusq; chamæleonis, lilij, hemerocallis, helenij, fonsiculi, fanyrij, gladioli, stellæ, sparganii, cyclamini, bryonix, vtriusq; raphani, & bulbaceorum omnium radices, concisæ, ac decoctæ, & moribus illitæ: quæ omnia sæpe à nobis experta sunt. Conferunt præterea bdellium, Siriacum bitumen, pix liquida, castoreum, montanarum caprarum simum, euphorbium, sulphur viriæ admixtum, sal, nitrum, taurinum fel, oleraceæ, crucæ, vtrumq; laser, galbanum, sagapenum, panacis lacryma, erica, hyssopum, origani omne genus, dictamnium Cretense, & Italicum, calaminta, conyza omnis, verbenaca, halicacabum, satia, & agrestis ruta, soncus tam aspera quàm læuis, silymbrium, sinapi, nasturtium, lepidium, iberris, thlaspi, aut in emplastris, aut in fomentis exterius adhibita. Quæ verò pota, vel deuorata valētissima censuntur, ea omnia erunt, quæ in nostro in huius libri præfationem commentario longiori catalogo recensimus. tamēsi priuatim ad venenatos iūs præferantur Medica mala, & eorum simen: quin & echij, & viticis, & ligustici, & pæoniæ, & hyacinthi præterea virides platani pensiles pilulæ, iuniperi bacæ, conyza, chamædris, scordium, chamæpytis, echini terrestres caro, gallinaceorū & galbanarum cerebrum, leporis & equi coagulū ex vino potum, maxime testudinis sanguis cum cymino, porri succus ex melle, nasturtium, maioris centaureij, gentianæ, albi dictamnii, & superior gladioli radix, thlaspi, pulegium, Cretense dictamnium, elichrysi coma, rana oleo incoctæ, & sale confectæ, earundem ius, oleo & sale adiectis, & cerui genitale siccum, & in puluerem potum. Mirificum ac singulare remedium præstat illius herbaræ radix, quam Gortienfes, ex eo quod serpentum moribus celeriter, & efficaciter medentur. Serpentinum vocant, cuius historiam descripsimus libro secundo in coronopi mentione: hæc liquidè in puluerem ex vino hausta cochlearis mensura, a venenosis quonvis serpente demorsos breui tempore sanat: neque ea solum valet aduersus virulētos icūs, sed etiā cōtra eptora venena. Is ferè viribus pollēt (vt quidā recentiores fatentur) hostili illi syneustres raso colore micantes, quos nonnulli fibulæres, garophyllos vocant. Porro Theriaca Galenus libro de Theriaca ad Pisonem, cæteris laudatissimis antidotis tam simplicibus, quàm compositis à Galeno ad virulentorum morbus Andromachii theriacam prætulit his verbis. Theriaca est procul dubio apud vniuersos homines celebratissimâ

antidotum, tum quod pollicito neminem frustretur, tum ob ipsius actionis efficaciam. Siquidem nullum unquam a feris, quæ hominē solent interire, commorlūm, hac statim epota perisse memoriæ est proditum. Nullus eadem præsumpta haud mulo post morsu impetitus, belluæ veneno ceu illā superāte interiit. Quod subinde nonnulli prætores etiam, penes quos vitæ, & necis potestas est, experiuntur: atque medicamentū probare volentes, an quod promittat præstare quoque possit, in omnibus iam ob praua quædā, & illegitimā facinora ad mortem iudicatis, de ipsa faciunt experimentum. Nos autē cum in hominibus id non possumus, in aliis quibusdam animātibz idem facientes, veram medicamentū probationem inuenire conemur. Nanque gallis, qui domi non enutriti, neque nobis sunt cōtubernales, sed potius agrestibus, & sicciorē præditis temperamento, capris, feris obicimus, & qui inter illos non bibeant ex medicamento, prætius intereunt: qui verò biberint, conualescunt, & à morsu vitam retinent. Interdum verò medicamentum num adulteratū sit, hoc quoque modo probare conuenit. Si epota theriaca, non purgetur, qui purgans sumpsit medicamentum, hoc ipso iudicamus antidotū esse præstantissimum, quoniam purgationem, ei qui medicamento vsus sit purgantē, impeditur, vt tali experimento ē veri medicaminis inuestione nūquā aberrauerimus. hæc tenet Galenus. Cuius nimirū ætate qui prætorū in facinorosos exercebat iudiciū, facillē probare poterant num theriaca probata esset facultatis, an adulterina. Nāque pluribus in locis qui ob sua facinora mortis supplicio damnabantur, non semper capite, aut laqueo, aut quouis alio pœne genere necabantur, prout leges statuēbant: sed sæpius in theatrum ducti, vt mitiori supplicio ē medio tollerentur, aspidibus, & viperis offerebantur demordendi. Huius rei testis est Galenus eodem libro ad Pisonem, vbi post enarratum Cleopatraz interitū sic inquit. Pluries in magna Alexandria sum contemplatus, quā celeriter aspides homines perimant. Cum enim aliquem hac pœnz lege damnatum, humaniter, citōque voluit occidere, adicientes ipsius pectori ferā, iubentēque paululum ambulare, ita sine mora hominem tollunt ē medio. Probādā igitur fuerit theriaca, præsertim quæ sit hoc tēpore, antequam ematur, vel aliquid propineret, in gallis agrestibus à feris sæpius enarratis demorlīs, vt docet Galenus, aut in alio quouis animalē: etenim in simiis (vt opinor) tutius & certius id experiri possent. Quod simiz magis ceteris hominem referant. Narrant quidam antiquitus fuisse gētes in pluribus orbis partibus, quæ suapte natura cū serpentibus degebant, traditāque manibus, nullo vnquā ab his morsu acceto. Cuius rei testis est Plinius libro v. c. 1. cap. 1. vbi ita scripserunt. Crates Pergamenus in Hellespōto circa Parium genus hominum fuisse tradit, quos

Ophiogenes vocat, serpentum ictus contactu leuare solitos, & manu imposita venena extrahere corpori. Varro etiā nunc esse paucos ibi, quorum saluæ contra ictus serpentum medetur. Similis & in Aphrica gens Pysyllori fuit, vt Agatharchides scribit, à Pysillo rege dicta. Horum corpori ingenitum fuit virus exitiale serpentibus, ex cutis odore sopientes eas. Mos verò liberis genitos protinus obiciendi seuissimis earum, cōque genere pudicitiam coniugū experiendi, non profugicibus adulterino sanguine natos serpentibus. Hæc gens ipsa quidē propē interemptione sublata est à Nallosomionibus, qui nunc eas tenent sedes. Genus tamen hominum ex his, qui profugerāt, aut cū pugnatum est, & abfuerant, hodiēque remanent in paucis. Simile & in Italia Marsorum gente durat, quos à Circes filio ortos ferunt, & ideo in eis vim naturālē eam, hæc Plinius. Veruntamen, vt author est Galenus libro de theriaca ad Pisonē, Marsi qui suo tempore extabāt, contra serpentium venena nullā vtiq; propriam habebant facultatem, sed fraude quadam vniuersam decipiebant plebeculā. Ipse enim loco citato ita scribit. Circulatores hi nunquā congruo tempore viperas venantur, sed multo post venationem, cum non amplius vigent. Capras autem ipsas crebrō sibi ipsis assuefaciunt, & cibis non solitis enutritur, imō carnes ipsis permittentes, & continuē mordere cogentes, vt virus ex earum ore vacuetur efficiant, quinetiā mazas quasdam obiciunt, quæ dentium foramina obstruant. Atque hac ratione morsus sunt imbecilles, vt videntibus magnū sit miraculum, talis ipso: cum ad fraudem parandā artificij impperitis. hæc Galenus. Ceterū id fraudis dolice genus, nostro etiam tempore locū habet, in his præsertim circulatoribus, & circulatorais, qui ex diui Pauli stirpe (quod tamen planē mentionitur) se prognatos prædicant. Quippe quod ferē omnes Apuli sint ex Lecce vrbe oriundi, aut ex circūstantibus locis, quonquā facillē possunt originē duxisse à Maris eorum vicinis, qui sexcentenis, aut fortasse millenis annis ante diuum Paulum exire. Cauendum igitur fuerit ab eorum nugis: nam quicquid loquantur, polliceanturq; id omne fraudulentē, & dolose agunt. Captiui enim viperas abeunte iam hymenē, & vt magis ab earum morlībz se tuteant, manus sibi perquam diligenter inungunt quodam vnguento hac in venenatione ab ipsis experto. Vnguentū illud cōficitur ex oleo syluestris raphani semine expresso, dracūculi radicis, & asphodeli succo, leporis cerebro, fibinz, foliis, lauri baccis, & aliis quibuscūq; additis. Affirmant ex vnguento percutōs à serpentibus icti nō posse. Quod ego facillē crediderim, cum etiā apud Nicandrum in theriacis vnguentū reperitur, quo qui fuerit percutus, ferisicū nō possit. Nicandri verba subiiciam, quæ soluta oratione ita redduntur. Quod si in triuiis milia reptilia iam recēs generantia sese, & rē secum habētia, dri-

Franciscus  
confusus  
necrum,  
qui diui  
Pauli stirpe  
mentionitur.

Vnguentum  
tam Nicandri

in ollam

roba suo  
generale

Generatio  
ta a serpenti-  
bus. co-  
rumpit, esse  
huius mede-  
ci.

in ollam mittas, repones aduersum perniciosas  
noxas remedium. Incipies autē in ollam illam  
cerebri, seu medullę cerui recens casti drach-  
mas triginta, corylas quatuor rosacei, cuius pri-  
mae, mediae, & tertiam expressiōē inuen-  
tarij præcipuas, & solas numerant. Olei splen-  
dentis erudi toridę corylas infunde, & corylam  
ceræ vnam, atq; hæc in rotundo vase celeriter  
calefacito, donec liquefactę serpentium squa-  
mę mollescant, postea arte paratā molam re-  
cipies, & hæc omnia in vnum mista turbabis, 10  
teretq; cum serpentibus. Longē autem spinas  
separa, quandoquidem malefici illis venenum  
adhæreat. Omnia porrō membra ex hoc in-  
guenue inunge, tumq; vel in quāuis viam, vel  
grabatū eam te tutō cōferes, vel cū aren-  
tis æstatis tempore ad aræ opera cinctus, tri-  
dentibus profundum manipulorum acernum  
disquisueris, hæc ille. Capient igitur qui Mar-  
sos se faciunt, viperas, aliudq; quoduis serpen-  
tium genus hoc modo: capisque statim caput  
salua persundunt, cuius contactu non parum  
vilescunt, & veneni feratitate deponunt, quod  
hominis salua facultate sit illis prorsus con-  
traria. Cū autem in foro, vt miraculosum de  
se spectaculum præbeant, ab his nullo veneni  
incommodo demordi se facere volunt, ob aro-  
prius illis duræ carnis frustū, id dentibus dilan-  
tari cogunt, vt virtus, quod prope dētes quo-  
dam vesiculis continetur, in mansam effunda-  
tur carnē. Non desunt tamen qui etiam vescu- 30  
las illas forcipibus abscedant, ne amplius ve-  
neno repleantur. Itaq; hac fraude vniuersam  
gentem decipiunt. Verū pulcherrimē horum  
fraus quandoq; detegitur, cū simul in eodem  
foro plures eiusdē prauī generis homines con-  
tendunt, vt alter alteri primum locum præ-  
cipiat, & summam apud populū auctoritatem  
consequatur. Nam ij, vt quisq; se legitimē ex  
diui Pauli familia ortum ostendat, viperis, qui-  
bus venenum exemptū non sit, seinuicem di-  
lacerant, præsumptis tamen suis fallacibus an-  
tidotis quibus tandem frustrati, a veneno victi  
relictis vexillis, tanquam moribundi, suis ē pul-  
pitibus in terrā cadunt. Et certē nisi statim periti  
medici illis opem ferrent, mortē sæpe immatu-  
ram oppeterent licet etiam interdū occum-  
bant, & animam cecidamoniibus, corpora verō  
suis serpentibus denoranda relinquunt. Equi-  
dem memini, cū essem Perusis, me duos hu-  
iusc generis circūforaneos vidisse in foro, 40  
qui in tribus corporis partibus a viperis de-  
morsi erant, & ij sanē ambo perisissent, nisi Ca-  
rauitus ille Bononiensis chirurgus, & præcep-  
tor meus, oleo nostro de scorpiōibus eos in-  
unxisset, nec suis illis profusisset lapis, quē ven-  
duat, & omnibus præferunt, aduersus omnia  
venena. Quemadmodū idem non profuit iis,  
qui Tridenti inuicem in fora demorsi, & ve-  
luti mortui in hospitium delati, prædicto oleo  
sanitati restituti fuere, magno quidem ambo-  
rum discrimine, ac dedecore. Sunt qui dicant

eum lapidem, vel potius terram obfiguram a  
Melite insula allatam, quam omnibus præpo-  
nunt antidotis, vim omnino aduersus serpen-  
tium venena efficacē habere, quemadmodum  
& ea, quæ a Lemno insula Lemnia vocatur.  
Veruntamē vbi ab aspidē, vel viperā quis fue-  
rit demorsus, parum vel nihil proficit, quam-  
obrem credendum minimē fuerit, panem vel  
vinum, quibus suas ij admurmurant cantile-  
nas, eos qui sumplerint, tutos a serpentibus, &  
aliis id genus venenum etiaculantibus, ad inte-  
grum & sive annum seruare posse. Quando-  
quidem nouimus nos, qui hoc pane deuorato  
se tutos a serpentibus existimantes, serpentium  
venationi se dederunt ab iis tandem demorsi  
huius admurmurati panis opinione falsi inte-  
riore. Non tamen eam inficias, quā aliqui re-  
periantur, quibus quædam ea a cælo facultas  
tributa est, vt a serpentibus non mordeantur.  
Siquidē noui ego plures, qui simpliciter, nul-  
lōque artificio aut verbis aspidēs, & viperas 10  
quotidie capiebant, nec vnquā ab iis icti fue-  
re, quanuis serpentes ab iis modo pedibus cal-  
cati, modō manibus compressi fuerint, ac diu-  
tius in nudo eorum sinu gellati. Neq; præte-  
rea negauerim, serpentes non posse camini-  
bus, & incantationibus compelli, quod pluri-  
mis id constat experimentis. Cæterum, vt ni-  
hil quod ad curationem ictum viulnorum  
facere possit, a nobis prætermittatur, qui om-  
nia quæ scimus, ingenue docemus, non ve-  
rebor prodere memoriæ (etsi id sciam ad me-  
dicos non spectare, neq; ab ipsis recipi) quonā  
pactō in Romano agro fenex quidam eremita  
amicus meus, a feris ictus sanabatur, ipsis absen-  
tibus agris. Cū enim quis ē circumstantibus  
populis a serpente demordebatur, id per nun-  
cium eremita significabant: tum is interroga-  
bat nuncium, an medicamentum icti loco ebi-  
bere vellet. Quod si id se facturū respondebat  
iubebat ille, vt dextro pedem calceo denudatū  
solo sisteret, & cultello totius pedis vestigio li-  
neam circumducebat: deinde iubebat pedem  
auferrī, & intra spatium lineæ signatæ culcelli  
cuspidē hæc verba inscribebat. CARO CA-  
RYZE, SANVM REDVCE, REPV-  
TA SANVM, EMANVEL PRAESEN-  
T V S. mox terram eodem gladio abraadebat,  
ita vt omnes abolerentur characteres: abrasum  
puluerem sitili quodam paruo aqua pleno ex-  
cipiebat, ibique tantisper dimittebat, donec  
terra subsideret: demum nuncij interula a-  
quam percolabat, & cruce signatam illi bibend-  
am præbebat. Sed certē mirum est, quod  
eodem hora ictus sanabatur, qua nuncius po-  
tionem illam sumperat, vt mihi planē com-  
pertum est, & omnibus illius regionis incolis.  
Hæc est curatio in viulnorum ictus, qua vre-  
batur ille eremita, qui mihi sæpius dixit, hoc  
esse maius secretum, efficaciusq; remedium,  
quod habeant ij, qui sum originem in diui  
Pauli familiam falso referunt.

Curatio  
secundum  
quendam  
eremitā.

VESPÆ, ET APES. CAP. XII.

INTER ferientium venenatorum notas, nihil de vespis, & apibus articulatim digestissimus, quod conspicuæ omnibus sint, & nihil excellens, aut notatu dignum in his obseruetur: inter remedia tamen earum meminisse non fuit alienum. Igitur aduersus verarumque ictus prodest illita malua, & hordeacea farina cum aceto, ficulneum lacin vulnus instillatum, & muria, aut aqua marina fots.

*Vesparum.  
& apum  
ictus. &  
remedia.*

ET si vesparum, & apum ictus nemini vquam attulerit necem, cum tamē dolores molestissimi inde quandoque oriantur, non alienū, neque inutile fuerit ea nosse medicamenta, quibus facile iidem mulceri possint. Quamobrem iam dictis à Dioscoride remediis ea addenda duximus, quæ priuatim scribit Aëtius lib. x. 111. sic inquit. Si quis ab apibus, & vespis illisus permanere velit, cum malux folia cum oleo illita, & eruca, siue bruchus cum oleo illitus asseruabunt. Quandoquidem verò quidam ab his clanculum percussi, ob dolorem perturbantur, putantque se à maligno aliquo animante petitos esse, necessariū existimo prius ostendere quæ signa horum ictus comitentur. Hos itaque, qui ab apibus punguntur, dolor ictus consequitur, & rubor loci, cum tumore partium in ambitu sitarum: stimulus autem omnino in percusso loco reperitur. Eadem etiam hos, quos vespa pupugit, concomitantur, sed intensiora: verum stimulum vespa in percusso loco non relinquit. Auxilium autem vtriq; ferunt luto, aut stercore bubulo eis illito cū posca: aut malux foliis impositis cum posca: aut cimolia cum ma'ua & posca: aut fossamo cum posca. Naturaliter autem opitulatur veneranda, & viuifica strombi conchylij imago in sigillo ferreo exculpta, & loco ictus appressa: non enim permittit amplius inflammationem generari. In potu præterea ipsis foliorum lauri tenerorum drachmas duas cum vino austero præbero. hæc Aëtius. Cæterum compertum est, dolorem statim sedari illitis muscis prius coniectis. Id quod similiter præstant thymbra, melissophyllum, & sylsymbrium.

PHALANGIA. CAP. XIII.

DE MORBIS à phalagii locus quidem ipse, quasi ab imphalag aculeo rubet, nō intumescens, nec per ambitum calidus est, sed mediocriter humefcit: vbi verò contrariorū occurssu refrinxit, consequitur corpore toto tremor, distentiones poplitū, & inguinū, cōuul-

sionibus non dissimiles. in lumbis collectio exoritur, & perpetua vrinæ libido lacescit, multa; reddendis excrementis colluctatio. vniuersa cute frigidus sudor emanat, collacrymant oculi, offusisq; nebulis caligant. Horum ictibus ficulneum cinerem adiecto sale trito, & vino imponere oportet: aut radicē syluestris punice quā tenuissimē tritam: aut aristolochiam cū hordei farina, & aceto subactam. Vlcerā aqua maris proluēda, aut apiastrī decocto, folia; eiusdem illinenda. Lauacris perpetim vtendū, & propinandum abrotoni semen, anisum, aristolochiā, cicer syluestre, cuminum Aethiopicū, cedrides tritas, platani corticē, & trifolia herbæ semen: priuatim autem, singulorum ex iis binas drachmas dare cum vini hemina cōuenit. item myricæ fructus, & chamapityos, & viridium cupressi pilularum decoctum, admisto vino. Sunt qui fluuiatilis cancri expressi succum cum lacte, assumpto apij semine, confestim molestiis liberare prodant.

PHALANGIORVM genera quāquā plura à veteribus describuntur, tamē Aëtio libro *giorum* *ge* x. 111. cap. x. viii. sex tantū numerantur, *nera ex* his verbis. In phalangiorū genere primū quidem rhagium, alterū lupum, tertium formicariū, quartū cranocolaptes, quintū sclerocephalum, sextū scolecium appellant. Ac primū quidem Rhagium, id est acineū, figura rotundum est, colore verò nigrū, acini vix nigra similitudine, vnde etiā appellationē accepit: & os quidem iuxta mediū ventrē habet, pedes verò ex vtraq; parte quā breuissimos. Alterū verò Lupus appellatū, multas perdit, eisq; pascitur: ac corpus quidem habet latū, & volubile, partes verò circa collū ipsi incisæ sunt: amplius autē & os eius eminentias tres habet. Tertiū autem Myrmecium, hoc est, formicarium dictū, formicæ maximæ assimilatur, colore fuliginoso: corpus verò eius velut astris quibusdā insignitū est, maxime circa dorsū. Quartū deinde Cranocolaptes, sublongū est, & viride, stimulumq; iuxta collū habet, atq; si in quē irruat, locos circa caput petat. Quintū Sclerocephalum dictū, caput habet fixum, & obduratū: lineamēta verò per omne corpus similia animalibus illis, quæ circumuolitāt noctū lucernas. Sextū autē Scolecium siue vermeariū appellatū, sublongū est, & submaculosum, maxime circa caput. Atque hæc quidem

*Phalang.  
genera.  
C. mor.  
f. nota  
ex Nicam.  
dio.*

quidem species phalangiorum enumerantur. ha-  
cenus Aëtius. Qui tamen cuiusque phalan-  
gij notas, & indicia seorsum non descripsit,  
(genus enim diuersum diuersa quoque parit  
symptomata) sed omnia in commune simul col-  
legit. Quamobrem si particulatim cuiusque pha-  
langij indicia per se scire cupimus, Nicandrum  
consultamus. Is siquidem in theriacis præter id  
quod plura, quam fecerit Aëtius, phalangio-  
rum genera reddit, singulorum etiam priuatiu  
indicia describit suis verbis, qui ita paraphra-  
sticè in Latinum vertuntur. Quæ iam nunc  
noxij considera phalangij, signaque eius mor-  
sus. Primus itaque splendidus Rhox appellatur,  
niger planè, accumulatis pedibus prærepens,  
medium ventrem ore, & dentibus septum ha-  
bens. Cui ab hoc infictum fuerit vulnus, per-  
inde corpore appareret atque si nihil quicquam lau-  
ciatus foret: oculi verò inferiori parte rube-  
scunt, frigus iuxta in corpore adhæret, insigni-  
tur, statimque color, & membra hominis à su-  
pernalis ad ima vergere videntur: neque penis se-  
mine vidus demittitur, sed lumbos occupans  
ita frigus genium nexus dissoluit. Attention iam  
secundum obserua, in cuius dorso pingua quæ-  
dam relucet, ac lucida in corpore virgula. Percus-  
sum ab hoc inexpectatus horror cum flamine  
quodam adoritur, caput verò somnus grauat,  
genium & membrorum nexus, & imbecillitas fit.  
Cyaneum aliud sublime, erinitum, & asperum  
æqualiter est. Difficilem corpore inferi illud pun-  
cturam, quodcumque labefactauerit, cõrque  
grauil languore succumbit. Nox & caligo tem-  
pora circumstant, vomitumque edit & collo lubri-  
cum, ab araneis telis non multũ distantem, adeo-  
que tandem interitum subministrat. Ab hoc a-  
lius est Agrostes, qui specie sua lupulo similis est,  
muscarum interemptori, qui apum obscurator  
est, culicem qui plenes dicuntur, & cæstrorum,  
& omnium quæ ad telam ipsius peruenerint. 40  
Hic imbellem plagam, & vanum vulnus homi-  
ni infligit. Quod autem Dyfieri, siue sphe-  
cerum appellat, rutilum satis, vespæ crendis ve-  
scenti persimile. Hic si quempiam vulnerarit,  
ingens è vulnere tumor erigitur: morbi etiam  
quidam ad genua, alias etiam neruorum cor-  
dis, & venarum languentium trepidatio, alias  
virium destitutio, vt percussum sæpius docet,  
atque interminat. Extremi masculij animal som-  
nus adferens, qui hominem quiescere ab huius  
seculi laboribus faciat. Est præterea fornicarium  
dictum, quod fornicis planè simile sit. collo  
quidem rutilum, reliquum corpus nigredini ex  
putredine factæ, par est, vndique latum, stel-  
larum dorsum, punctisque distinctum genus,  
cui subineritum tempus ad modicam ceruicem  
attollitur. Atque ex hoc phalangio dolores pri-  
orum similes venenatorum veniunt. Sunt & alia  
parua phalangia scarabæis similia, quæ in agris  
inter legumina sua carpunt pasceat. Horum circa  
cruciantem morsum tubercula, & pustule exur-  
gunt, cor oberans furit, lingua incondite ob-

murmurat, oculi etiam subvertuntur. Educa-  
tur in Aegypto in perlicæ foliis, quem Crano-  
colapten dicunt, phalanx similis, quæ circum  
lucernas cum imperu volitat nocte. Eius horri-  
bile semper caput incessanter nutat, vterus au-  
tem grauat. Hic vbi cuiquam stimulum infixe-  
rit, quem ceruice tenet gerit, facile sanè citra  
omnem laborem ad interitum ducit. hæc Ni-  
cander. A quo tamen in hoc dissensit Aëtius,  
quod sclerocephalum his simile fecerit bestiolis,  
quæ noctu lucernas circumuolant, Nicander  
verò huic cranocolapten comparauerit. Sed iam  
ea prosequamur, quæ de phalangiorum ictibus  
tradidit Aëtius, qui loco superius citato se ha-  
bet. Quæ percussos à phalangis concomitan-  
tur, communia sunt iuxta magnitudinem, &  
paritatem discreta. Morsus porro tenuis est, vt  
vix conspici possit: tumor autem liuidus, qui-  
busdam etiam rubicundus: frigiditas adest circa  
genua, lumbos, & scapulas, nonnunquam ve-  
rò totum corpus aggregatur, amplius & dolor  
assiduus adest, pallor, tremor vigilæ. Quibusdam  
verò pudendi tentigo, & circa caput pruritus, ali-  
quando etiam circa furas: oculi humecti, & lac-  
rymantes, ac rari, & venter inæqualiter ele-  
uatur. Intumescit autem vniuersum corpus, fa-  
ciæque, & maxime circa linguam partes, adeo  
vt impedito sermone balbutiant demorosi. Qui-  
busdam verò vrinx emittendæ difficultas adest,  
cum pudendi tentigine, & dolore. Si verò min-  
xerint, aquosæ ipsorum sunt vrinx, quædam  
araneorum telis similia in se habentes, & vomit-  
us quoque similis, aliquando verò & per vomit-  
um, & per ventrem talia exernuntur. Cate-  
rùm in calidam aquam demissi, dolore leuati si-  
bi videntur: post verò è balneo egredientibus in-  
tentum dolet pudendum. Seniores verò pu-  
dendum plurimum laxatur, ac minime intendi-  
tur. Atque hæc quidè cõmuniter ad omniũ ictus  
sequuntur. Si verò cranocolaptes aliquè percusse-  
rit, caput magis dolet, & vertigines cõsequuntur,  
frigus continens, delirium, corporis iactatio, &  
ventriculi puñctiones. Omnes autem à pha-  
langiis percussi iuuantur assiduis balneis: ictus  
etiam locus ex trifolij bituminosi decocto, cum  
oleo proluiatur, totum verò corpus ex cerato  
liquidissimo pinguefcat. Iuuantur etiam fomen-  
to spongiarum in calido aceto tinctarum, &  
plagæ continuè adhibitarum. Cataplasmata  
autem eis conueniunt: bulbi, singuaria, por-  
rum, fursares aceto incocti, hordeacea farina  
incoctis cum ea in vino aut melle lauri foliis,  
ruta, grossi, caprinum fiterum cum vino, ama-  
ricum cum aceto, syluestris ruta cum aceto, & cy-  
perus. Hactenus Aëtius. Cæterum Dioscori-  
des variis in locis huius totius operis de medi-  
ca materia plura alia medicamenta intus in cor-  
pus sumenda diuersis phalangiorum morsus cõme-  
morauit, præter ea quæ hoc capite speciatim re-  
tulit. Ea autè sunt, si summam colligatur, myr-  
ticæ acris succus ex vino potus, succus item folio-  
rum mori oxyathri mensura, lixiuũ è fici vel caprifici

*Phalan-  
giorum  
ictuum si-  
gna. C.  
curatio ex  
Aëtio.*



cinere paratum, asparagi radicum decoctum, agrestis lactuca, coris semen, hederæ succus ex aceto potus, ruta ex vino hausta, hieracium, dauci semen, melathium drachmæ pondere ex aqua potum, aparine, melissophyllum, & phalangium herba ex vino pota, penthaphyllum, hyacinthi radix, & sedum minus. Quæ verò ad idem exterius illinenda commendauit, hæc sunt, nullus piscis dissectus, malux decoctum, aqua marina, & marinorum iunconum tenella folia. Nec desunt composita medicamenta ab auctoribus tradita. quæ si quis videre & habere cupit, Galenum consulat libro secundo de antidotis vbi valentissima describuntur antidota ad phalangiorum ictus, è pluribus veterum clarissimorum medicorum monumentis excerpta. In summa tamen legitima theriaca, & Mithridacium contra phalangiorum venenum cæteris præstantiora censentur. Sunt etiamnum in phalangiorum genere recensenda, quæ nobis in Hetruria TARANTULÆ vocantur. Quorum historiam, & administranda symptomata superius libro secundo abundè reculimus, cum de phalangii differeremus. Quinetiam inibi docuimus, quo modo ab iis ictu cidentur muscis instrumentis, ductisque quàm longissimis tripudiis. quare eò se conferre poterunt, qui hæc scire desiderant.

## SCOLOPENDRA. CAP. XLIII.

SI SCOLOPENDRA, aut dicta ophioclene, morsum intulit, locus per ambitum liuore sugillatur, & computrescit: interdumque licet rarò, scabulentus, atque ruber cernitur. A mor sui ipso exulcerari locus incipit, vleusque id negotium exhibet, ferè remediis inuictum: præterea toto corpore prurigo sentitur. Hæc vbi morsum infixit, sal quàm leuissimè tritus, ex aceto vulnere inspargendus, aut ruta syluestris superponenda. Locus acida muriæ fouendus, & danda in potu aristolochia cum vino, aut serpillum, aut calamintha, aut ruta syluestris.

*Scolopendra Genensis consideratio.*

TERRESTRES Scolopendras Hetrusci centipedas vocant. Sunt enim in Hetruria omnibus vulgaris notitiæ vermes, innumeris vtrique pedibus refertæ, colore subrufo: diuerso quoque genere constant. Cæterum ea tantum ictu venenum relinquunt, quæ quòd morsu serpentes interficiant, ophioclonæ, appellantur: quarum tantum existimamus hoc loco meminisse Dioscoridem.

Veruntamen quæ in vniuerso genere ex sint hæcenus compertum non habeo. Quibusdam in regionibus tanta copia increvere scolopendræ, vt fugatæ ab eis populi, proprios deseruerint lares quod Aterietis contigisse scribit Theophrastus. Progreditur scolopendra tam in anteriorem, quàm in posteriorem partem. Idcirco scribit Aristoteles libro 1111. cap. v 11. de historia animalium, quòd dissecta Scolopendra altera parte in caput, altera in caudam mouetur, & serpit. Vnde videtur exstimaſſe Nicander, hanc bicipitem esse, vt eius verba in theriacis innuunt, cum inquit. Modicaq; pemphredon, bicepsq; scolopèdra. Cuius eûis alæ, vt remi nauis, festinant. Non inepta quidè Nicædri cõparatio: nã scolopendræ pedum multitudine velocij motu triremem representant. Harum morſibus (vt Dioscorides ait) auxiliantur asphodeli semen, & flores ex vino poti. Quinetiam (vt scribit Aetius) ea omnia scolopendræ ictibus medetur, quæ priuatim muris aranei morſibus conueniunt, de quorum curatione paulò inferius dicemus. Præterunt antiquorum nonnulli cinerem aceto subactum, & vulneri illitum, item scillam: præterea pulegium, rutam, & mentham ex vino potam. De marinis Scolopendris tradidimus superius libro secundo. Nec tamen mihi compertum est, aliã noxam ab iis inferri, quàm ingentem pruritum iis tantum partibus, quibus inhæserint (vt scribit Aristoteles, & Dioscorides) earum erucarum more, quæ pilis horrent, & quæ præterea in pinu vitam agunt.

## SCORPIO. CAP. XLIIII.

SCORPIONIS morsu inflammari statim incipit locus, & indureſcit, ac intentus rubet, vicissimque dolore premitur: modò siquidem exaſtuat, modò frigore occupatur. Labor repente fatigat, & aliquando meliusculè habet, aliquando recrudescit. Consequitur sudor, horroris sensus, & tremor. Extremitatè corporis partes refrigerant, inguina extolluntur, per sedem flatus exeunt, capilli eriguntur, pallor membra decolorat, & dolor, tanquam ex pungente acu, per vniuersam cutem sentitur. Percussis præſenti est auxilio ſiculneum lac in vulnus infiltratũ. Scorpions ipſe, qui ictum vibrauit, tritus, & percussio loco impositus, suæ plagæ remediũ est, ob cæcã quandã naturarũ (vt constat) discordiam, quæ antipathia ap

*Scolopendra morſus sui remedia.*

thia appellatur. Præterea tritus, & impositus cum sale, lini semine, & althæa, scorpius conuenit. Sulphur ignem non expertum, resina terebinthina exceptum, & emplastri modo adiectum, auxiliatur. Idem galbanum ad splenij formam ductū, & calamintha, quæ trita illinatur, & farina hordei in vino parata, in decocto rutæ. Semen trifoliz herbæ tritum, & vulneri iniectum opitulatur. Hæc ad affectum locum pertinent. Post hæc quàm efficacissimis portionibus vtendum, cuiusmodi sunt aristolochiz, præsertim corticis binæ drachmæ cum vino, rufa gentiana, & pulegium decoctum, & bacæ lauri paucio numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua magnopere discoqui debet: cupressus cum vino, & ruta, nec secus ficulneum lac: laferpitium, si adsit: sin desideretur, peucedani succo vtendum. efficax est potum trifolij, & ocimi semen. Horum autem omnium vicem pensat iugis lauacri vsus, euocatus sudor. & dilutæ vini potiones.

*Scorpionum genera ex Nicædo.* PLURA, ac varia antiquis numerantur Scorpionum genera, vt latius libro secundo diximus, quorum alij multum, alij parum suo ictu offiunt. Porro Nicander in theriacis scribit eorum octo reperiri genera, his verbis. Agedū aculeo dolorifico armatum scorpionē canam, eiusq; tetricum genus. Quorum primus albus, neque fonticus, neque lethalis est. Sed cui rutile genæ micant, calorē flagrantemq; mortaliū furorē iniecit, quo mala homines horrore concutiuntur, & frigore, perinde ac qui febre diuexantur, & acri sibi incenduntur. Qui liuidus est, malam trepidationem, & motionem tribuit hominibus, quos perculserit, qui ceu ætoniti, & vani, & stulti ridet. Alius viridante colore, qui simul ac corpus hominis cōculserit, tremores. & frigora illico admittit, acrisque grando talibus videtur circumstare, etiam si sol ardentissimè radijs suis flagret. Talis tantaque eius stimuli afflictio, cuius vertebæ nouem (lego septem, cum non plures scorpionum caudis inesse comperiantur) iuncturis connexæ apice suo nocent. Alius liuidio colore, ingentem aluum gestat, latumq;: herba enim vefcens, semper insatiables manet, corpus etiam hominis exedens, inguini insolubili ictu nocens: tam vehemens eius generis & ori morsus infusus, infixusq; est. Deprehendes idem similem scorpionem litorali seu marino cancro, qui alben-

tes algas fluctumq; maris decerpit pascendo. Alij rursus incuruis æquales planè paguris videntur, corpore grandes, chelis, & forcipibus æquè solidi, atque paguri, qui in saxosis cauernis demorantes sibi timent. quinciam è paguris tales scorpiones, genus & ortum suum ducunt. Nam cum rupes, & tenuesq; multum strepentis maris reliquerint algas, eos ex mari inescantes piscatores extrahunt. At paguri se peti ea venatione sentientes, murum rimas, & nidus subeunt, vbi prolem perditicem habent, ibiq; è mortuis tandem paguris scorpionj nocentes per foramina ista generantur. Postremò melichlorus tibi animaduertendus, cuius summum verticillum prænigum est, inexcitantq; noxam infligit, hominibus certè insensibilis ille obliquo gressu corpus flammæ simile commoueat: pueris verò, & naru minoribus celerrimè interitum adduxit: quibus & circum teiga den se alæ expanduntur locustæ fruges rodētī non dissimiles. hæc tamen Nicander. Cæterum scorpionum ictum indicia, & curationem confici pōt diligētissimè Aëtius lib. x. cap. x. sic inquit. A Scorpio percussus vehementissimū plagæ dolor consequitur, frigiditasq; ac tensio, & stupor: circæque plagæ, & totum corpus frigidus sudor: & his, qui iuxta infernas partes percussi sunt, inguina excitantur, ac intumescent: qui verò circa supernas, locus sub alis. Et hæc quidem leuiter percussis adiunt. Validius autem ictis ardor circa plagam adest, quemadmodum in ambustis, & verrucarum instar formicarum eruptio circa labra, & totum corpus, vt grandine se impeti putent. Facies disforquetur, sordes circa oculos adsint glutinose, & lachrymæ viscosæ: durities articulorum, anusq; procidit, cum egerendi cupiditate: spuma circa os est, & vomitus largus, singultus, cōuulsiones opisthotonicis similes. His igitur serpyllum, althææ radicem, & elephobosum bibendum præbeto. Præter opinionem autem facit elephobosus, cum viridis comesta, tum sicca pota. Cochleari item hortulanam maximè accipito, eamq; vnā cum opemito tritam, plagæ imponito, & confestim sedabis dolorem. Idem etiam vermes terreni facere dicuntur. Prodest præterea fluuiatilis cancer tritus, addito lafore, in vino potus. Cōfert verbenacæ recta, aut viridis cataplasmatris modo imposita, aut sicca in puluere pota. Cōducit etiam puluis ex æqualibus partibus camlini, melanthij, & viticis feminis confectus, & drachmæ pondere ex vino potus. Datur & pæstinacæ semen quin & ponticæ nucis: quippe hæc non modo in cibum sumpta, sed in singulo quoque gestatæ, gestantem ab omni scorpionum ictu tutum reddunt. hæc ex Aëtio. Comune & vulgare remedium est plagam perungere ipsorum scorpionum oleo. Proinde oleum nostrum de scorpionibus, cuius antea supersumero mentionem fecimus, hæc in curatione alia ex maximopere conueniet. Scorpionum ictibus Dio-

Dioscorides præter ea medicamenta, quorum hoc capite meminuit, hæc quoque sparsim in superioribus libris mederi tradidit: nempe amomum melle subactum, fluviatiles cochleas, mulum piscem recentem, sinaridem muria asseruatam, diuulsas lacertas, domesticos mures concisos, tritici farinam vino aut aceto subactam, sonchi & intubi succum, ocimum polentæ admissum, amaracum ex sale & aceto, hieracium, laserpitij lacrymâ, melissophyllum, chamæpityn: vel baseli illius folia, quod tantum aureum florem gerit, leucioij aurei semen: & polemoniz radicem, cui tantâ vim contra scorpiones inesse quidam tradunt; vt ij ab his non feriantur, qui eam gesserint: quos, si forte percussus fuerint, nihil tamen molis passuros affirmant. Et hæc omnia profunt tantum vulneri illita. Quæ verò pota, vel deuorata auxilium præstant, eiusdem testimonio, hæc erunt: fluuiatiles cancri tritici, & cum asinino lacte potati, asinorum & equorum, qui in pascuis degunt, simum: quantum in vino, & potum: oxylapathi, & oxalidis semen ex vino aut ex aqua potum, agrestis lactuca: abrotoni hortensis, pastinacæ, hyacinthi, & vrticæ semen: quin & olusatrum, & heliotropium, & cardamomum, & myrrha, & myrthi baccarum vinum. E quibus omnibus cum plura possint confici antidota, pro varia medicorum intentione, non operæpretium puto, nos hac in re longiorem moram ducere, vt quæ potius peritissimi cuiusque iudicio sit relinquenda.

PASTINACA MARINA, SCORPIO ET DRACO MARINI.  
CAPVT XLV.

SI MARINA pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assidua conuulsiones, lassitudo, & imbecillitas, mens percussis labat, postea obmutescunt: oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum vicinis partibus denigratur, & ita obducescit, vt tangentem non sentiat. hunc si quis premat, atra sanies, crassa, & male olens excernitur. Ei qui marina pastinaca ictus, omnia, quæ de viperarum morsu paulò post referemus, simili modo conueniunt. Peculiariter autem ictus à marino scorpione, & dracone inferentur, qui molestos cruciatus cient: interdum autem, sed raro, nomas excitant. Quibus absinthij, saluæ, aut sulphuris ex aceto triti potio subuenit.

Ipsi etiam disseci, vulneribusque impositi, sui cuiusque ictus remedio sunt.

QVI à marina Pastinaca percussus sunt (vt testatum reliquit Aëlius) his vulneris locus manifestè apparet. Sequitur autem dolor pertinax, & torius corporis stupor. Acutum enim, & firmum habet aculeum, quo vehementissima vi in alium impulsus, nervi sauciantur: quapropter in aliquibus mors deperente totum conuellens corpus comitatur. Narrant quidam, quòd si quis caudam pastinacæ, quæ ictum intulit, auferat, & in arborem maximè quercum, suspendat ac figat, ipsam quidem arborem arescere, ægrum autem sanari, atque id iuxta contrariæ affectionis, & remedij rationem contingere. Id quod etiam asserit Nicander in theriacis, his planè verbis. Trygonem, hoc est, pastinacam, eisdem maleficum, mareq; vastantem draconem arcere noui. Doloire autem sic hominem afficit trygon, cum oblongis sagenis defatigatum piscatorem aculeo suo ceciderit: vel etiam ramis arboribus infixus fuerit. nam tum arbor ea sit obscurior, ignobiliorque. Siquidem ab huius morsu, ceu solis æstu, eius & radices perditæ vnâ cum foliis flaccidæ redduntur, & arescunt: homini verò caro putredine immittitur. hæc Nicander. Cæterum auxilium sentient percussus, vt Aëlius inquit, ubi stupor, & refrigeratio totius corporis consequatur, ex calidis illitionibus, & confimilibus cataplasmatibus. Propriè autem furfures aceto incocti, & pro cataplasmate impositi eis auxiliantur, & ipsum adeo aceti pro focu assusum maximè prodest. Magis autem conueniunt eis attractoria, & quæ tenuium partium sunt, ac calida. quo nimirum per attractoriam facultatem venenum ex profundo attrahatur, & per calorem frigiditas mitigetur, & quæ tenuium sunt partium, in alium proreptent. Ad hanc igitur rem in promptu habebis apta, sulphur viuum vrina veteri subactum, marubium, lauri folia, echium, radicem pznacis, saluam, & similia. At verò si hæc desiderentur, fermentum acidum cum liquida pice emollitum imponito: mirabiliter enim auxiliatur. Dato item lauri decoctum, aut succum Cyrenaicum cum myrrha magnitudine fabæ, ac modico pipere terito, ac dato cū vino: aut sylphium, aut laser ex vino: aut succi helictæ quinq; cum tribus serpylli granis bibendas præbe. Hæc Aëlius aduersus pastinacæ maris ictus auxilia reddidit. Ad quos præterea commendatur saluæ decoctum continuè pluribus diebus potum: quin & scordij in puluerem tritum, & ex sui ipsius decocto potum, itemque verbenacæ. Non tamen ob id prætermittenda est theriaca, au Mithridatis antidotus, aut quinta nostra essentia, cuius iam saepe meminimus. Tardè Nicander quoque nonnulla remedia protulit, quæ hæc sunt. Anchusæ folia, quin

Pastinaca marina insignita.

Pastinaca ictus remedia.

lia, quinquefolium, rubi flores, arctium, oxalis, lycopsis, tordilū, chamæpitys, fagi cortex, agrellis pastinacæ semen, terebinthi fructus, phycus marinus, adiantum, sinyrnium, eryngium, libanotis, cachry, & vtrunque papauer.

## MYS ARANEVS.

## CAPVT XLVI.

A MURE araneo percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigræque pustula, diluta sanie turgens, exurgit: proximæ partes liuent. Rupta pustula, depascens vlcus, non ei dissimile, quod serpit, occupat. Intestinorum quoque termina, difficultas vrinæ, & frigida asperginis offusio consequuntur. Huius moribus auxiliatur ex galbano splenium, per se vulnere exterius impositum, vt medicamenti modo aceto tritum, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quinetiā mus ipse, qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus sui veneficia luit. Resistunt quoque acini dulcis punici decocti, & illiti: item porri, & allia contrita, necnon aquæ calidæ fots: sed hæc ad locum pertinent. Prodest potum abroroni decoctum, maximè si in vino detur. præterea serpyllum, & galbanum, & erua vino madefacta: recentes cupressi pilulæ cum aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrum cum vino, & chamæleonis herbæ radix. Nec defunt, qui literarum monumentis tradiderunt, tritum murem araneum contra suos ictus commodè bibi. Quam historiam apud alios inuentam, dignam duntaxat censuimus, quæ adnotaretur. Alij asseuerant, demorsum non aliàs exulcerari, nisi prægnans mus araneus fuerit: tum sanè auxiliari ferunt.

ordine illita vulnera conspiciuntur: & sanguis quidem primum purus promanar, paulo post verò saniosus. animal enim ipsam putrefactione occidit. Consueuerunt etiam bullæ insurgere, quis si quis disrumpat, carnem subiacentem fœulentam offender, & fissuris dispartatam. Inflatio autem sequitur demorsos. Cæterum hoc animal frequenter ad testes insilire solet, eosque verbere impetere, non hominibus modò, sed etiam fœcibus bruti animantis. Auxilium autem ferunt cum ob putrefactionem periclitantur demorsu, post prædicta communia remedia, lauri tenella folia, vnius aut duarum drachmarum pondere, trita & ex vino pota. Conueniunt etiam ipsis omnia communia venenorum remedia è vino dulci in potu sumpta. In pecoribus verò & iumentis illa ipsa cum aqua trita, naribus infundit: est enim ipsa præfens remedium. Vnde etiam hominibus similiter in potu exhibeto. Morfus porrò cumino, & allio, puramine extrinseco non abiecto, contegatur. Eadem etiam cum oleo trita assidue ac diligenter locis circumfictis illantur. Si verò ruptæ fuerint bullæ, & vlcera oborta, acidia muria proluatur locus, aspergatque subinde vili hordei puluere. Verum non rumpentur, nisi prægnans fuerit mus araneus, qui morsum inflixit. Quod si exulcerentur, mali punici dulcis putamen costum tritum erit imponendum, & vlcera ex eodem decocto, aut magis myrti decocto proluenda, fœuendaque. Strato verò inquit, in muris aranei morfu primum scalpello, circumquaque vulnerandum esse locum, & murem subinde araneum vsum cum aceto imponendum, aut sinapi tritum, & aceto exceptum. In potu verò opem ferunt panax, eruca, capparis cortex, gentianæ radix, & recta verbenaca, omnia ex vino pota, aut in cataplasmate conformata, & moribus illita. Prostant & raulæ folia imposita, & magna antidota potui data.

## VIPERA. CAP. XLVII.

SI VIPERA momordit, corpus intumet, vehemèter arescit, sabalbidumque colorem concipit. Sanies à vulnere profunditur, primum subpinguis, mox cruenta. pustulæ adustis similes erumpunt: & antea depascens vlcus, quod in proxima repens, non summa modò corporis, sed intima quoque corripit. Gingiua iis cruore suffunduntur: inflammatio circa iecur erumpit: tormina, & biliosi vomitus sequuntur. Sopor, tremor, & vrinæ difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur. Vbi verò vipera morsum impressit, sinum caprinum cum vino, studiosè impositum

opistula

*Muris araneus* mus, qui quoddam colore nausæ sit similis, Græcis *μυρμήκων* dicitur, seu *μύρμηκας*, ab omnibus inter venenata numeratur, attrahit in agro Tridentino in nullam morfu inferit noxam, quemadmodum nec scorpio. Historiam eius superius libro secundo retulimus. quare iam ad eius morsum notas, & remedia progrediamur. Demorsus itaque ab eo (vt Aëtius inquit) vulnera manifesta sunt, quadrisdo enim

opitulatur. item laurus & abrotonum, & galbanum splenij loco superiectum, & origanum, viride indurum. pulli gallinarum discerpti, & confestim admoti: erui farina vino subacta: radices cortex vsque eò tusus, vt in puluerem solutus abeat, & scilla tosta: detritum chamamelum, hordeacea farinae ca-  
 10 taplasma in aceto mulsio præparatum, sed locus antè eo calido foueatur. hæc loco imponuntur. Contra viperinos ictus rubus cum vino prodest. Aliqui Anchusam tenui folio constantem auxiliari produnt. Leporini coaguli in vino terni oboli bibuntur, & porracei succi hemina in mero, & foliorum apia-  
 20 stri succus, & sylvestris ruta. hæc in vino potari debent. Vinum frequenter bibendum, allia mandenda, & cepæ, & porri recentes, salsamenta accerrima, & opipara simplicia hæc sunt. Percussis à vipera præclare auxiliatur medicamen-  
 30 tum, quod myrrha, piperis, castorij, storis portulacæ seminibus, dimidio acetabulo constat: hæc omnia in Cretico passo teruntur, aut in alio probato. Erassistratus in eo libro, qui *περί σκευ-  
 40 μων*, id est de viribus, inscribitur, ple-  
 raque alia tradidit, quæ ictis à vipera auxilium ferre possunt: inter quæ talia maximè laudantur. Gallinacea cere-  
 40 bella cum vino pota, semen sativæ bras-  
 sicæ tritum, & acetabuli mensura cum vino potum. Quinetiam bonum est di-  
 gitum in liquidam picem intingere, de inde vinum, quo digitus fuerit elutus, bibere. Hæc sunt quæ contra viperæ ictus auxiliantur.

mens inest ori, ardor, exolutio, & frigidi hor-  
 50 roris insultus, aliquando & bilis vomitus, tor-  
 mina, capitis grauitas, vertigo, pallor, singultus, febris, spiritus & anhelitus celer, color plum-  
 beus, & frigidus sudor. Mors in horis septem, aut vt longissimè absit, tertia die, in his qui non  
 55 seruantur, & maximè his, qui à vipera femina sunt icti. hæc ille. Quæ omnia Nicandro acce-  
 pta referri possunt: siquidem in theriacis ita ad Latinum sensum scribit. Hinc luctum à vi-  
 pera manantem viatores diuulgant: duos enim  
 60 instar nerui acutos masculi dentes in ore suo vi-  
 rus eructantes, ostentant: vipera verò femina  
 semper plures exerit, pernicioso suo ore insul-  
 tans. Atqui in carne icti facillè latos dentes per-  
 pendas. Porro è vipera inflicta plaga sanies aliàs  
 65 pinguedini similis, aliàs cruenta, interdum sine  
 vilo colore conspicitur. Sed quæ vlcus ipsum  
 caro circumdat, germinans graui offert sese tu-  
 more: interdum rubens, tumque palam liquida  
 cernitur: quandoque etiam aquosum onus con-  
 70 cipit. Frequentes præterea bullæ, ceu vacui per  
 ignem tumores, perinde ac corpus igni sit am-  
 bustum, in cute supernè ebullunt. Illic subinde  
 putredines circumcirca accurrunt, aliæ quidem  
 75 seorsum à vulnere, aliæ circa plagam veneno  
 non dissimilem mortem edentes. Aspera itaq;  
 noxa, vehementerque ignescens totum corpus  
 exedit: hic per guttur, atque collum coeunt  
 80 sonitus, agminatim strepunt: quinetiam oculo-  
 rum vertigine moeret. Illicoque membris gra-  
 uans imbecillitas, & lumbis anxietas ventrici in  
 capite caliginosum onus consistit. Atqui labo-  
 rans ille aliàs sit aridum guttur suum exiccat,  
 85 sepeque ex vnguibus cum frigus tenet. Hyber-  
 na autem nunc exuberans grandio, omnia mem-  
 bra degrauat. Crebro etiam biliosos ventris sui  
 tumores expuit, toto corpore pallens, ac hu-  
 90 mens circa membra sudor inuis iactu frigidior  
 circumfunditur. Colorem interdum liquidum plu-  
 mbi gerit, aliàs obscurem, mox floribus flauis est  
 æris. hæc tenus Nicander. Præstat igitur (vt Aë-  
 tius author est) priusquam cruenta prodeat vri-  
 95 na, alij plurimum deuorare, & vinum meracè  
 copiosum bibere, excitatis subinde vomitibus.  
 Efficacissimum enim eis remedium est alij efus  
 ac meracior vini potio, inquit Archigenes, adeo  
 vt si quis multum eius sustineat vsus, itémque  
 100 meri potum, nullo alio auxilio opus habeat.

*Viperarum  
morsus et  
medicæ.*

*Viperarum  
morsus et  
medicæ.*

**VIPERARYM** historiam exactius, vt pu-  
 10 to, latiusque libro secundo tractadimus, quam  
 vt operæ pretium sit hic eandem repetere, vel  
 plura nobis superfluis addenda. Quare tantum  
 reliquum est, vt iam de earum morsu indicis,  
 & remedijs differamus. Reperiuntur itaque in  
 15 eis (vt Aëtius memoriam prodidit) quos vipera  
 mas mordit, vulnera in loco binariis ve-  
 rò qui à femina demorsu sunt, quaternaria. Pri-  
 mum autem ex eis excernitur sanguis, deinde  
 sanies sanguinolenta, & oleosa. Adest tumor bi-  
 liosus, feruidus, bullosus, sabruber, deinde li-  
 20 tidus, denigratus, & proserpens. Siccatas vehe-

Conuenit item maximè theriaca ex viperis sine  
 25 dilutione pota, & vulnere melleo superposita.  
 Quin & ipsa vipera excoriata, capite, & capsa  
 abscissis, interaneis omnibus reiectis, angustula-  
 rum modo cocta, & à demorsu deuorata, ma-  
 ximum ictus præsidium offert. Caput autem à  
 viua amputatum, diligenter per vollesum pre-  
 30 hesum, morsusque impositum, ea parte adhuc  
 calente, quæ ceruicem contigit, venenum id mi-  
 rificè extrahit. Conducit & dissectam gallinam  
 adhuc internè calentem morsui imponere, id-  
 35 que alijs pariter dissectis, frequenter, & assidue  
 repetere. Oportet etiam scalpello per ambitum  
 demorsum

demorsum locum circuncidere, & cucurbitulis  
subinde admovere. A cucurbitulis foliorum  
fraxini succus in potu exhibendus est, & ex-  
pressa à succo folia vulnere illinenda: est enim  
valde efficax ad viperarum morsus fraxinus ar-  
bor. Melissophylli item folia, & succus tum ex  
vino potus, tum vulnere exterius illitus, euidēs  
auxilium confert, & eiam si iam moriatur zger.  
Aiant præterea, si quis melanchij drachmas  
quatuor edat, non moriturum. Similiter etiam  
melaphroditi herba efficax est, & cancri flu-  
viales cum lacte triti, & poti, & vulnere adhibi-  
ti. Magnificē etiam profunt ranæ coctæ, & in  
cibum sumptæ, & iusculum earum subinde bi-  
bitum. Præstat & nasturtium plurimum edere,  
vel tritum ex vino bibere. Facit autem ad id  
mirificē testudinis sanguis exsiccat, & cum syl-  
vestri cumino potus. Vtendum etiam omnibus  
communibus remediis, suprà sepius relatis:  
quippe superuacaneum fuerit eadem tam sepe  
repetere. Maximē verò utendum est anchusæ  
radice, & heliotropio cum vino. dandus & hæ-  
matites lapis. Auxiliantur & raphani in cibo  
accepti, & deinde vomitu reiecti, exhibita sta-  
tim à vomitu Andromachi theriaca. Post scarifi-  
cationem, & gallinarum impositionem, vul-  
nus ex trifolij bicuminosij decocto calido, diu  
proluendum ac fouendum est: nam si pauco id  
tempore fiat, demorsus peius afficiuntur. Deinde  
porrum & panem cum sale illini conuenit,  
aut allium cum aceto, aut ipsius exusti, aut fra-  
xini cinerem, aut alium quēuis cum aceto, aut  
hastulæ regiz, aut sycomorij folia cum pane: aut  
lauri tenellis folijs, coctis & cum oleo tritis in-  
tegitur locus, aut caprino stercore, priusquam  
claudatur. Cæterum, vt libro de theriaca ad Pi-  
sonem author est Galenus, non modò de viperarum  
morsibus reteratur venenū appposito tan-  
tū, vt Aëtius inquit viperæ capite, sed ipsa  
quoq; vipera tota confusa, & vulnere imposita.  
Contra viperarum morsus mirificē medetur  
echiz epotus succus, herbaq; ipsa vulnere im-  
posita, vt superius libro quarto prodidimus, illius  
Alcibij historiam referentes, & quo echii Alci-  
bitadis cognomen accepit, quando quidem  
planta hæc (vt ipse Dioscorides testatur) facu-  
tatibus adeo præstantibus insignitur, vt epota  
eius radix ex vino, nō percussis modò à serpen-  
tibus opuleatur, sed eos quoq; qui antea bibe-  
runt, feriri non patiatur. Comēdauit etiam nūm  
medicamē aduersus viperarum morsus Dioscorides spar-  
ta ex Dio sim in suis de medica materia libris, præter ea  
quæ hoc capite retulit, alia præstantissima sim-  
plicia medicamenta, partim exterius applicanda,  
partim bibenda, vel comedenda, quorum non-  
nulla hic subiiciam. Vulnere igitur exterius il-  
lita conferunt, iuniperi, & fraxini folia, tritici  
furfures ex rure decocto incoctæ, cerui farina vi-  
no macerata, scilla ex aceto fervefacta, persona-  
tæ, ebuli, & sambuci radices in vino elixatæ,  
fermentitius cinis aceto subactus, aliq; com-  
plura, quæ breuitati studentes nunc silentio in-

*simplicia  
medicamē  
ex Dio  
scorides.*

uoluimus. Porta verò profunt cassia odorata, co-  
stum, myricæ semen, pistacea, cerui genitale  
exsiccatum, tritum & potum, condrylla, anagal-  
lidis succus, ferulæ medulla, aparine, rubiz ra-  
dicis, & terrestris tribuli succus: auxiliatur  
etiam bryoniæ radix. Admirandus insuper præ-  
bet effectus radix illa, quam Goritienfes ab au-  
xiliari eius vi Serpentinam vocant, cuius histo-  
riam, pariterq; vsus rationem superius libro se-  
cundo tradidimus. Verim præter hæc præsen-  
taneo remedio sanæ nostra quæritæ essentia, co-  
chlearis mensura pluries eodem die potatam  
oleum nostrum de scorpionibus, de quo etiam  
sepius dictum est, ea ratione inunctum, quam  
superius ipse conficiendi modum describeres  
retulimus. In viperarum quoque genere ea ni-  
mirum inmanis fera recenseri potest, quam  
AMMODITEN vocant, cuius est musquam, *Ammodi-  
ta histo-  
ria, & se-  
nectus etc.*  
quod extet, meminerit Dioscorides, minimē  
tamen silentio prætereundum est, quin hæc  
eiusq; veneni remedia describantur. Siquidem  
Ammoditæ, meo iudicio, in pluribus Italiæ &  
Illyriæ locis reperiuntur, præsertim in Gori-  
tienti comitatu, & Iapidiz montibus. Est enim  
fera hæc viperæ omnino similis, præterquam  
quòd capiz sit ampliore, & maxillis latioribus,  
quòdq; vltimo rostro superiori parte eminen-  
tiam quandam habeat, acutæ verrucæ similem.  
Vnde circumsoraneæ, qui serpentes eorumq; ve-  
neni remedia profectur, hanc feram vulgò ap-  
pellant Aspido del corno, hoc est, Aspidē cor-  
nutum. Neq; sanè ineptum illi nomen inde re-  
runt: namque non minori cum velocitate inter-  
fiscit, quam aspis. Scitnus enim quosdam ab his  
inopinatē demorsos, tribus tantum horis mor-  
te occubuisse. Proinde scitè lib. xi. r. cap. xxv.  
de eo ita scriptum reliquit Aëtius. Ammodites  
magnitudine quidem cubitalis est (maior enim  
non pingitur, neque scribitur) colore verò ære-  
nosus, per corpus autem maculis nigris insigni-  
tus: caudam habet prædurā, supernè difflisā.  
A quibusdam verò Cenchris, hoc est miliaris,  
ob caudæ instar millij duritiem, appellatus est.  
Latioribus autem maxillas, quam vipera habet,  
cūq; in multis, aliis ei similis sit, coloro magis  
discerni potest: vipera enim subflaua est. Cæte-  
rum ab Ammodite percutissos festina vt pluri-  
mum mors sequitur, qui verò tam breui au-  
percuti, si sanguis est vulnere manat, & vulnus *Ammodi-  
ta morsu  
signa &  
curatio.*  
intumesce: sed paulò post sanies effertur, se-  
cūturq; capitis grauitas, & animi deliquium.  
Qui verò optime dispositi sunt, & robusti, in  
triduo intereunt: quamquam reperti sunt, qui  
in septimum vsque diem durant. Celerius ve-  
rò mors aduenit his, qui à femina fauciantur.  
Auxilium porro & ij ferunt, primū quidem à  
communibus remediis, vtore ad adfixis cucur-  
bitulis, circunciso prius per ambitum vulne-  
ris loco, & superioribus partibus artissimis vin-  
culis confistricis: quin abscessu, dilatazq; statim  
scapello plaga. Proprie autē eis auxiliatur men-  
tha ex aqua mulla pota, castorium, cassia, & ar-  
temisæ

40

41

42

43

44

45

46

47

48

temisse succus cum aqua. Danda etiam in potu theriace, necnon vulnere eadem illinenda. Ventum & emplastris attractoriis, & subinde cataplasmat, quæ ad nomas sue viceræ serpentina conducunt, imponenda. Viperæ præterea similis, vbi quidam tradunt, ea etiam fera fuisse, quam *sepa* nominant, cuius historia superius libro secundo retulimus. quan-

*Sepe fera  
quædam.*

quam inibi Dioscorides *Sepe* lacertæ generi assignavit, unde & eam lacertam Chalcidicam quibusdam vocari tradidit. Itaq; cum varia sit apud autores *Sepe* historia, facili adducor, vt credam, *Sepe* reperiri non modo in lacertarum, sed etiam in mortiferarum serpentium, & viperarum genere. Quod siue videatur afferere Nicander in theriacis suis. Siquidem cum inquit primo, Præterea nivalis, & asper admodum mons Othrys rubentes bestias proferit, canèque vallis, & salebrosa rupes, nemorosæque promontoria, vbi subibundum ingrediatur *Sepe*, colorè nunquam vno visus, &c. haud dubiè ostendit serpentem, immanèque feram se repræsentare, non autem lacertam. Cum verò secundo ait, *Sepe* item corpore demisso, exiguis haud dissimilem lacertis, declinabis, nulli dubium est, quin eam descripserit, quàm Chalcidicam lacertam vocant. Nicandro subscribit Dioscorides, quippe qui etiam libro secundo ea ratione *Sepe* statim post lacertis reddiderit, quod lacertis corpore, & forma sit similis, atamen libro quinto, *Sepe* viperarum generi adscripsit, vbi de aceti multo viribus differens, inquit. Acetum nullum contra morsum eius viperæ, quam *sepa* vocant, haustum meconium, ixiame auxilio est. Aëtius tamen eius *Sepe* tantum meminit, quæ inter mortiferos serpentes, vel viperæ generis recensetur, his verbis. Serpens, qui *Sepe* appellatur, longitudine quidem duorum cubitorum reperitur: ex crasso autem in tenuem abit: restat vnde ac tardè proserpit. Caput habet latum, os acutum: vniuersum autem corpus multis albis notis perspersum. Sed aliter de *Sepe* forma, magnitudine, & gressu tradidit Pausanias, vt superius libro secundo suo loco adnotatum reliquimus. Cæterum ab ea percussus (vt tradit Aëtius) sanguis è vulnere manifestus excutitur, & paulo post sanies græuolens, tumior, & dolor segnis est: sed affectæ partes putrefactæ deambulant, & rotum corpus vitiliginis, quæ alphas appellatur, simili colore infectæ. Nil, capillæque è toto corpore desunt, atque infra tres, aut quatuor dies idi pereunt. Porro opem & hi sentiunt ex iisdem rebus, quæ in viperæ, & cerastæ, & ammodiæ morsu relata sunt. Exhibenda est præterea portulaca plurimè in cibo, & vinum bibendum myrtes meracius. Conuenit item spongiam calido aceto insutam, morsui imponere, & ex butyro cum melle locum illinire, aut nilum cum melle, aut pascas vni cum terra, quæ eis adhæret, exustis imponere. hæc Aëtius. Ex quibus facili conici-

*Sepe morsu  
suo signa  
et reme-  
dia.*

potest, cum ambæ hæ feræ è viperarum sint genere, his tunc antidotis earum venenum superari posse, quibus viperum frangitur, & euincitur. Sed quoniam hæc humanæ vitæ tam inimica animalia aliam admodum perniciosam feram mihi in mentem reuocant, quæ Græcis ideo *ACONTIA* appellatur, quod iaculi, vel sagittæ modo in hominem profilit, cum nihil de ea à Dioscoride memoratè proditum sit, scierimq; & hanc in Italia reperiri, non alienū duxi de eius historia ac veneni curatione ea hoc loco commemorare, quæ ex probatis authoribus excerpti. Hanc itaque describens Galenus libro de theriaca ad Pisonem, inquit. *Acontias* serpens, vbi se multum extendit, ceu iaculum quoddam corporibus insiliens, sic perimit. Hæc, vt Aëtius scriptis tradidit, serpens est duorum cubitorum magnitudine, figurâ autem crassâ in tenuem abeunte, colore viridi, præsertim iuxta ventrem, vt miliolum colore referat, vnde & cenchris, hoc est miliaris, appellatur. Aiunt hanc fortiozem fieri, cum nulum floret. Porro vbi se ad lædendum parat, extendit se ipsam, ac veluti iaculum vibratum corporibus inuolat, atq; hoc modo verberat. Ab huius morsu omnia, quæ de viperâ dicta sunt, sequuntur accidentia, atque etiam grauiora, adeo vt etiam putrefactiones & carniū defluxus consequatur, ac grauior item mors succedat. Cæterum remedia similiter eadem, quæ ad viperæ morsum his conducunt. Est qui refert inter recentiores non obscurus author, quod cum pastor quidam missus, sub cuiusdam arboris vmbra ætate mediâ quietem somnūque caperet, cuius socij non procul oues pascebant, ab *Acontia*, quæ in arbore ascendere, ita percussus fuit in sinistram mammillam, vt illico perierit. At socij audito percussione sonitu, viso serpente, quem nouerant, super defuncti pectus, relicto grege in propinquum rus, pauore territi, auigerunt. Repertur hoc fleuissimæ serpentis genus, vt quidam mihi retulerunt, in quibusdam Calabriae, & Sicilia locis, vbi ipsum incolæ à sagitta Saetone vernaculo nomine appellant.

*Actia hi  
floris, met  
su mta,  
et cura.*

#### CAECILIA, ET AMPHISBAENA. CAP. XLVIII.

CONSILIA supra dictis in viperâ eueniunt iis, qui à crechta nomine, & amphisbæna demorsu sunt, eademq; ferè auxiliantur. quare hoc venenum priuatam descriptionem sortitum non est, neque visum est dignum, quod alio genere comprehendatur. De his autem mentionem hoc loco fecimus, quoniam ferè remediis ad viperas scriptis, percussus ab eis adiunari solent.

*Amphis-*  
*bana, &*  
*cacilia con-*  
*sideratio.* No n defunt, qui scripserint, Amphibaznam  
præter naturæ institutum duobus cum capitibus  
gigni, quæ utranque serpentis extremitatem  
occupant: fierique ob id putent, ut fera in  
vitamque partem repat. Quod tamen fabulosum  
censemus: nam & hydram potius, septem capi-  
tibus constare fabulatur: id quod nihilominus  
falsum est. Verum tamen non negauerim  
ego id monstrosè, & præter naturæ intentionem  
euenire non posse in omni serpentium  
ouiparorum genere, quemadmodum & volatili-  
um. Siquidem pluries compertum esse, ex vno  
tantum quo duobus vitellis refero, nasci pul-  
lum modò habentem quatuor alas, modò toti-  
dem crura, totidèquè pedes: acque etiam la-  
certæ hæc sunt aliquando bicipites. Sed hæc  
non utiq; statuunt, haberi aliquod serpentium  
genus natura biceps. Hoc scitissimè, & apertissi-  
mè confirmat Aristoteles libro 1. & cap. 111.  
de generatione animalium, sic inquiens. Mon-  
stra ratio admodum sunt in iis, quæ singulos  
pariunt, sed crebrius in iis, quorū partus est nu-  
merosus, & præcipue in auium genere, potissi-  
mèquè in gallinis. Iis enim parvus numero-  
sus, non modò quòd sæpe pariant, ut columbæ,  
verum etiam quòd multos simul conceptus intra  
se contineant, & temporibus omnibus co-  
cant. Hinc gemina etiam pariunt plura: cohæ-  
rent enim conceptus, quoniam in propinquo  
alter alteri est, quomodo interdum fructus ar-  
borum complures. Quòd si vitella distinguun-  
tur membrana, gemini pulli discerni sine vlla  
superuacua parte generantur. Sed si vitella con-  
tinuantur, nec vlla interiecta membrana dis-  
tinguantur, pulli ex iis monstrifici prodeunt, cor-  
pore, & capite vno, curibus quaternis, alis toti-  
dem. quoniam superiora ex albumine gene-  
rantur, & prius: (vitellum enim cibo iis est)  
pars autem inferior postea instituitur. quanquã  
eibus idem, indifferetissque suppeditatur. Iam  
serpens etiam biceps visus est, videlicet eadem  
de causa: nam id quoque genus oua parit, &  
multa numero. hæc Aristoteles. Quæ sanè mi-  
hi faciliè persuadent, ut credam, omnino falsum  
esse, quod Amphibazna ex sui generis natura  
biceps perpetuò nascatur. Verum quandoqui-  
dem hoc serpentis genus terrestrium lumbrici-  
orum modo vtriusque extremitatibus, capite  
scilicet & cauda, acuminatis gignitur, adeo vt  
difficillimè possit capiti à cauda discerni, existi-  
mauerè quidam hanc feram duobus constare  
capitibus. Proinde Aërius libro x 111. capite  
x x 111. scribit, Seytalam (hæc alij Cæciliam  
interpretantur) & Amphibaznam animalia esse  
inter se similia. Non enim, inquit, ex crassis in  
caudam tenuem abeunt, sed æqualis crassitudi-  
nis in vniuersum existunt, ut neq; cognoscant  
videntes ea, iuxta vitam partem caput aut cau-  
dam sint sita. Quod equidem tum in terrenis &  
alui tinea, tum in erucis quibusdam, tum etiã  
in hirudinibus conspicitur. Differt autem, ut  
idem tradit, amphibazna à scitula, quòd illa ex

vtraque parte progrediatur, vnde à Græcis illi  
nomen inditum est. Galenus porrò libro de the-  
riaca ad Pisonem, Amphibaznam bicipitem esse  
existimat: (si tamen liber is adscripticius non  
est) ut hæc verba, quæ in eo leguntur, aperte ostē-  
dunt. Amphibazna (est autem animal biceps,  
quemadmodum sanè & nauigia vtriusque pro-  
ram habentia, cui natura ex superfluo substanti-  
æ bina capita est largita) hoc inquam animal,  
aiunt, si mulier grani da supergressa fuerit, male  
abortum facit. hæc ille. Cæterum, ut ipse Aë-  
rius scriptum reliquit, ab vtraque demorsis con-  
tingit morsum obsecum esse, ac vix apparere, nisi  
veluti sunt muscularum ictus. quapropter etiam si  
mordeant, non enecant tamen, sed inflammatio-  
nem excitant, ut apum & vesparum stimulus.  
Quare transferantur ad hos quoque, quæ de  
illis sunt relata, verum facultate intensiore. Ex  
his etiam Aërii verbis conici potest, cum ho-  
rum animalium ictus admodum tenuis, & ob-  
securus sit, Amphibaznæ caput inesse terrenis  
vermis, vel alui tinea persimile: ac prout  
adeo etiam caudæ æmulum, ut alterum ab al-  
tero non nisi difficilè discerni possit. Cæciliam  
autem Hetrusci vulgò appellant Lucignola.  
Amphibaznæ corium, auctore Nicandro, olea-  
stri baculo circumuestitum, si manibus frigore  
torpentibus traheatur, calorem statim adfert,  
articularumque nexus dissoluit.

## DRYINVS.

## CAP. XLIX.

A DRYINO morsus pustula, mole-  
stique dolores incidunt, præsertim quã  
dilata saniei emissarium subest: quin-  
etiam erosio, torminæque consequun-  
tur. Ab eo ictus conuenit aristolochia  
cum vino pota, trifolium herba, radix  
hastula regie similiter assumpta, & fru-  
ctus ex omni glandiferarum arborum  
genere: & tussæ illic radices, & illitæ par-  
ti istæ auxiliantur.

DRYINVS, vt in theriacis testatum reli-  
quit Nicander, in quercubus latebras parat, hisoriae  
aut alicubi in concauis fagis, in montibus ves-  
situr. Appellat eum alio nomine etiam hydru-  
sed & alij chelydram, qui relictis bryis, palude,  
suarque naturæ idoneo lacu venatu incipit  
in pratis molurides, & ranas. Hic si à myope  
musea illa quævis animum prouocante, petra-  
tur, insuetum illum imperum suscipiens, cum  
concauæ quercus robur celeri saltu subit, stru-  
cto sibi in imo cespite cubili. Candet tergo, ca-  
put illi æquale, adeoque hydro simile: grauis  
autem fetor à corpore eius exoratur. Quem-  
admodum quando incurus, necnon abrasa co-  
rij præsemina sub teretibus ferramentis circa  
humente s

*Amphis-*  
*bana bi-*  
*ceps nō est.*

*Prinſus  
morsus si-  
gnæ, & ca-  
ratio.*

40

50

*Dryini  
historia  
eius itine  
nota ex No-  
cand.*



Isumentes eorum exuuias, & pelles hument. Si quempiam is vel in talum, vel pedis plantam percussit, à corpore istius hominis difficilis odor sparsus fertur, atque circa ictum niger in acutum surgit tumor, mentemque morientis angor, & tristitia, quibus decinetur, obscurant. Species nimio dolore conflaccescit, & perit: cutis cum corpore admodum male olet, adeo ipsa atrum venenum semper depalcens consumit: quin & caligo lumina eius obfuscans, occultansque, male affectum perdit. Alij à dryino istius caprarum instar seu outum balant, ac omnino difficiles redduntur, impediendique cruciantur. Vrina eis decutitur, & pallescit. Ipsi verò dormitantes stertunt, frequentibus singultibus correpti, alias per collum vomitum felli similem, alias eruentum eruant, ipsūque malum acrem sitim generat: postremo laborantibus membris tremorem effundit. hæc Nicander. Cæterum Dryini nomen huius feræ mortiferæ inditum est, quod in quercuum cauernis, quæ prope radices sunt, habuletur. Græcis enim quercus *Απιδ* dicitur. Proinde Galenus libro de theriaca ad Pisonem, de dryino ita scribit. Dryinus serpens sic nominatus, quod in radicibus quercuum viuat, tam malignus ad perendum proditur, vt eius, qui supergreditur imprudens, cutis à pedibus excorietur, tota crura admodum intumescent, & quod magis mirificum est, manus quoque ipsæ curantium eodem modo periclitentur. Si autem quis aggrediatur eum perimere, obstat adeo multari aiunt, vt quemlibet gratum odorem prauum esse existimet, nec alterius præterea rei queat sentire. hæcenus Galenus. Dryino, vt Aëcius inquit, abundat Hellespontus. Is latibula in quercuum radicibus habet, atque adeo foetidus est, vt etiam si quis eum non videat, fetore loci cognoscatur. Est autem cubitorum duorum longitudine, obesus, ac asperimis squamis circa vniuersum corpus munitus. Porro qui ab eo percutiuntur, his tumor insurgit nigricans, dolor vehemens, nomæ, delirium, corporis siccitas, singultus, biliosus vomitus, aut omnino simplex, vrinæ suppressio, tremor, interceptio vocis, stapor, scissura, & mortificatio percussorum locorum: plurimi etiam intereunt. Porro & hi quoque ex iis, quæ in viperæ morfu dicta sunt, opem sentiunt: itaque ex communibus remediis iuxta consuetudinem accessionum proportionem adhibitis.

## HÆMORRHOVS, ET DIPSAS.

## CAPVT 2.

AB HÆMORRHOO istis vehementes cruciatus accidunt, qui angustia, contractaque corpora ex continuo dolore reddunt. Ex plaga copiosus sudor effluit, & quacunque parte corporis cicatrix vlla fuerit, ea sanguine ma-

nat. Excrementa per aluum cruenta eiciuntur, profluensque sanguis in globo coit. Apulmone sanguinem extussunt, & in vomitione effusi sine remedio commoriuntur. Quos verò dipsas percussit, solutus ac non constrictus tumor premit, sitisque vsque eò pertinax, vt satiari non possit, ac sine vlla intercapedine excruciet: & si potum pleno ore affatim trahant, illico in eandem sitim relabuntur: proinde toto habitu similes sunt iis, qui antea potus nihil hauserint. quare propter continuam sitim, & præster, & causon, aut dipsas appellatur. Hemorrhoi, dipsadisque morsus velut immedicabiles à plerisque maiorum deplorati relinquebantur. quare si peculiaribus contra dipsadem remediis egamus, communia experiri operæ pretium erit. Protinus autem scarificatione vti, vitionem facere, & si locus patiat, extremorum amputatione opus erit: consequenter quàm acerrima cataplasmata admoovere, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fugit, acres cibos, maximè à salsamentis, vitales esse. Meracæ poriones, & laucra profunt, quæ subinde interiecto breui spatio assumenda sunt, priusquàm morbi genus emerferit. quo semel erupente opem ferre non potest vlla medicorum opera. In istu hæmorrhoi eadem profunt. Insuper quæ in commune opitulantur, vt scarificationes, vitiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in dipsade definiuimus. Quinetiam decocta vitis folia, & cum melle trita.

HÆMORRHVS, & Hæmorrhoides, à theore Galeno in libro de theriaca ad Pisonem, suis ipsorum nominibus similem hominibus perniciem inferant. quippe percussus, sanguine per os, & nares, totoque corpore effuso, intereunt. Hic (vt in theriacis cecinit Nicander) petrosas rimas assiduè incolit, asperum, supinum, & modicè pendente lectu illic sumens, vbi tractum suum habeat, deinde pabulo satur fiat. Longitudo eius pedis velligio æqualis: cæterum quod ad latitudinem attinet, à capite ad usque caudam totus & subtilis, & minor est. Alias colore igneo alias rufum candens. Collo satis constricto est, gracilis cauda necessest.

Hæmorrhoides perniciem inferunt in Pison. Et hæc.

tionem, nec similitudinem. Ea autem de causa Cenchrus dictus est, quod maculis perquam minimis (vt Lucanus est auctor) nulli magnitudine, & colore, vniuersum eius corpus respersum appareat. *Auicēna cenchrum sanctum appellat.*

## CERASTES. CAP. LIII.

A CERASTE percussis locus attollitur, cum duritia pustulosus ē plaga sanies profluit, modò atra, modò pallidior: sed toto concretu varicosus intumescit: genitale intenditur, mens labat, & oculorum caligo exoritur: denique rigore nervorum distēti commoriuntur. Si cerastes percusserit, cita partis amputatio suffragatur. quare sine morā istam partem amputare, aut scalpro confestim circuncidere, & iis scilicet prosequi oportet. Vrentia insuper reliquiis admouenda, siquidem virus hoc veneno basilisci simile est.

*Cerasta  
morbus  
exitialis,  
& acri-  
bilis.*

CERASTAE, quorundam probatissimorum auctorum testimonio, in Aphrica duobus in capite cornibus cochlearum instar oriuntur, a quibus cerastæ, hoc est cornuti, nomen inuenerunt. Horum morsus lethales fore semper fuisse, nisi (vt Dioscorides inquit) demorsum membrum statim a reliquo corpore abscindatur, amputeturque, aut saltem illico omnis caro, quæ demorsum ambit locum, circuncidatur. Immanis hæc fera (vt refert Aëtius) cubitalis est longitudinis, longissima duorum est cubitorum, corpore verò arenosa, & iuxta caudam desquamata. Eminencias habet in capite duas, cornuum similitudine: partes verò circa ventrem ex ordine squamis oblitæ sunt. Quapropter in serpendo sonum sibilis similem edit: per obliquum autem, non recta propestat. Cæterum percussis ea, eleuatio ac tumor plagæ capitis elui similitudine insurgit, & sanies profluit viui colore, aut nigricans, & maxime per ambitum, velut in eruentatis ac suppuratis aliis fieri consuevit. Reliqua item, quæ in viperæ morsu dicta sunt, etiam his succedunt, cum intensione vehementiori. Vt plurimum verò vsque ad nonum diem superfluit. Remedia autem eadem, quæ morsus à viperâ conferunt, hæc Aëtius.

## ASPIS. CAP. LIIII.

AB ASPIDE ictis vulnus exiguum prorsus, quasi ab adacta acu citra tumorem conficitur: sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat: ca-

ligo velox oculos obnubit: labor in totum corpus multiplex, omnino leuis, & non sine voluptate cōsequitur. Ideo Nicander perpulchrè cecinit. At vir perit absque labore: virens atque discolor. mediocris stomachi dolor afficit: frons perpetuò renellitur: genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno vacillent. hos mors tollit, ad diei trientem non dilata. Cæterum iis, qui ab aspide feriuntur, quæ de ceraste scripta sunt, auxilia dari debent. Nam venenum hoc, quemadmodum basilisci, aut sanguis bubulus, celerimè in arteriis sanguinem cogit.

REPERIO apud eos auctores, qui animæ liliū historias tradunt, tria Aspidum genera conseruata, & vnumquodque, vbi hominem morsus ictus. su comprehenderit, celerimè mortem inferre: quippe tanta est earum veneni vis in hominum necem, vt rarissimè seruentur, qui ab eis percussifuerint. De his scribens Galenus libro de theriacâ ad Pisonem, sic inquit. Inter aspides nominata pyras collum exporrigens, & spatij metica longitudinem: perinde ac si tunc rationalis fera facta esset, venenora solenter corporibus inspicit. Harum itaque ferarum vna (siquidem tria sunt Aspidum genera: pyras dicta, chersæa, & chelidonia) reginam ferunt Cleopatram, cum vellet custodes latere, statim, & citra suspicionem mortem sibi consciuit. Hæc ille, qui subinde pluribus historiis enarrauit nam inuicti anni huiusce moribundæ reginæ. Cæterum chelidoniam vocatam, id nominis sibi comparasse voluit, quòd hirundinum modo dorso nigricet, & candidec aluo. quemadmodum & pyras altera dicitur, quòd in hominem expuat. chersæa verò ita dicta est, quòd in mediterraneis semper degat. Harum omnium meminit Aëtius libro x l i i. cap. x sic inquit. Aspidum apud ferarum scriptores tres species reperiuntur. quædam enim ex eis terrestres appellantur: quædam verò chelidoniz, quæ circa fluuiorum ripas, præsertim Nili, latibula habent: aliz verò pyrades nominantur. Terrestres quidem igitur maiores sunt, & quandoque vsque ad quinque cubitorum longitudinem reperiuntur. Maximæ verò pyrades, cinereo sunt colore, viridique, & ad auri colorem inclinante. Terrestres verò vt plurimum & ipse cinerei sunt coloris, quantum & subitridēs reperiuntur. Cæterum accessiones, & signa communia sunt in his, quos aspides momorderunt. Vulneta enim in demorsu loco, veluti ab acu puncta inveniuntur: bina quidem ex maris morsu, ex fœmelle verò quatuor citra magnū dolorē, a quibus nihil effluit, nisi violentū animal sit, quod morsum indixit. Consequi-

*Aspidum  
pernicio-  
sus ictus.  
& gene-  
ris.*

40

50

*Aspidum  
historia  
pauca  
& cura.*

tur autem stupor, pallor, frontis refrigeratio, assidui hiatu, palpebrarum nictationes, collis inclinatio, capitis grauitas, segnities, & collapsio in somnum profundum, ad finem verò & conuulsio. Mors autem in tribus ad summum horis ex terrestribus morfu sequitur: in chelidoniz verò ictu presentissima adest. Porro his, quã prave conspiciuntur, caligo oculorum succedit, & cordis dolor, faciei tumor, ac auditus corruptio: tardius autem mors consequitur. Auxilium autem ab aspide morfi ferunt, & præsertim quos pyras momordit, ex acerrimi aceti potu: dandum autem est, quoniamque aceti qualitate circa dextram præcordiorum partem perceptet. hepar enim in morfis ab aspide primum aliut sensu primari. Cæterum ad prænotionem, an victurus sit percussus, centaurium cum vino tritum bibendum præbent: siquidem enim euomet pharmacu, morietur, si nò, viuet. Quo verò veneni in corpus distributi vis probe euomatur, allia trita cum zytho exhibenda sunt, donec nauseabundus reddatur malè affectus. aut opopanax cum vino diluto detur, & confestim euomet. Numius autem inquit. Organum viridem, aut aridam pro ægri viribus cum vino dato. Post vomitum antidotis theriacis vtendum, & communibus remediis prædictis. Vtiliter autem ad plagam imponuntur post cucurbitarum adhibitionem, & scarificationem, centaurium cum myrrha, & modico opio. Rumex autem si cataplasmatim modo imponatur, nihil laderet. Præter opinionem verò auxiliatur theriace tum plaga imposita, tum pota. Prostant autem & assiduas excitationes cum emulsionibus, & plagis, & vniuersi corporis motus, & aqua marina calida pro fontento aspersa. hætenus de aspidibus Aëtius. Efficacissimum porro, & omnium, quantum eundem expertus sum, præstantissimum antidotum contra venenosum ictum aspidum, quas surdas dicunt, quæ in Italia pluribus in locis reperiuntur, est nostra quinta essentia, ex aqua vitæ & antidoto nostro confecta. Quippe cum tenuium admodum sit parcium, ictu oculi in vniuersum corpus diffunditur, venas, & arterias confestim permeans. Vnde prohibet, ne sanguis & spiritus in vasis refrigerati cogantur: atque aucto calore innato, veneni vim arceat potentissimè, idque superat citissimè.

BASILISCVS.

CAP. LV.

ERASISTRATVS in libro, quem de medicaminibus, & venenis condidit, de vocato basilisco scitè ita refert. Cum basiliscus momorderit, vulnus ad auri colorem efflauescit. Itaque in plurimis, quæ virus ei aculantur, comites notæ ita se habent. Ad basilisci morsum, vt idem Erasistratus author est,

auxiliatur castorij drachma in vino posita: item papaueris succus. Ictuum remediata se habent.

MVLTIPLIX varique est apud ferarum scriptores Basilisci historia, quem Latini Regulum vocant. Sunt enim qui scribant tantæ perniciæ animal esse Basiliscum, vt solo oculorum intuitu, alij sibilo tantum, alij halitu, alij verò morfu, homines statim interimat. Nec desunt qui vulgi opinionem secuti, ex antiqui galli ovo hanc seuissimam feram nasci putant. Ex hac itaque historiarum varietate, ac inconstantia facile adducor, vt credam, plerosque historiam basilisci, vt fabularem, descripsisse. Id quod etiam probè Dioscorides sensisse, atque adeò nostro iudicio adspiculari videtur. Siquidem is ne cum aliis accusaretur, Erasistratum citauit, auctorem que historiarum huius fecit. Basilisci meminit Galenus libro de theriaca ad Pisonem (si tamen liber ille inter legitimos censetur) vbi sic inquit. Basiliscus belua subfæua, & triplici frontis apice munita, tantummodo conspectus, & quando sibilat auditus, videntes se, & audientes necat: atque si quod aliud animal illum etiam mortuum attingit, statim moritur. Hinc aiunt omne aliud reptilium genus cauere, ne basilisco vicinum habitet. Libro verò x. cap. primo de simplicium medicamentorum facultatibus idem contra Xenocratem scribens, non omnino Basilisci historiam comprobare videtur, sic inquit. Nam bestiam seu feram regiam, quam vocant *Baseliscus*, ne videre quidem mihi vnquam contigit: & si vera sunt, quæ de illa referuntur, periculosum etiam est vel propè accedere ad hoc animal. Aelianus præterea Basiliscum tanta veneni acuitate, & immanitate polere ait, vt quantum magnitudine dodrantalem non excedat mensuram, serpentes tamen omnes etiam ingentes suo duntaxat halitu extringat, adeò vt virga quoque è longinquo contractus, illico tangente conficiat. Huius item horrendissimæ feræ historiam tradidit Plinius libro vii. ca. x. x. i. vbi ita scriptum reliquit. Apud Hesperios Aethiops fons est Nigris, vt plerique existimauerunt, Nili caput, vt argumenta, quæ diximus, persuadent. Iuxta hunc fera appellatur Caroblepas, modica alioquin, ceterisque membris iners, caput tantum prægrauæ ægrè se rens: id deiectum semper in terram. A ias inter necio humani generis, omnibus qui oculos eius videre, confestim expirantibus. Eadem & Basilisci serpentis est vis. Cyrenaica hunc generat prouincia, duodecim non amplius digitorum magnitudine, candida in capite macula, vt quodam diademate insigni. Sibilo omnes fugat serpentes: nec flexu multiplici, nec vt rel quæ, corpus impellit, sed celsius & erectus in medio incedens. Necat frutices nò còtactos modò, verum & afflatos: exurit herbas, rumpit saxa. Talis vis maiò est. Creditum quondam ex equo occiso

Basilisci  
varia his  
historia.


Catoblepas

hæta

hastâ, & pe eam subeunte vi non equitem mō-  
dō, sed equum quoque absumptum. Huic ta-  
li monstro ( sæpe enim enectum concupiere  
reges videre) mustelarū virus exitio est: adeo  
naturæ nihil placuit esse sine pari. Iniiciunt eas  
cauernis, faciliè cognitis sola tabe. Necant illæ  
simul odore, moriunturq; & naturæ pugnam  
conficiunt. Hæc de basilisco Plinius. Quem  
tamen plura cū aliis fabulosa narrasse pu-  
amus. Nam si tantū oculorum intuitu, sibilo,  
aut halitu hominem interficit, non equidem  
videō, quomodo factum sit, vt ij qui ipsum vi-  
derunt, eiusq; faciem adnotarunt, ex quorum  
postea relatione huius ferè historiam plerique  
descripserunt, incolumes euaserint: præser-  
tim cum tam parū sit animal, vt nisi è propin-  
quo loco cōspici possit. Atque adeo hinc mihi  
impossibile videtur, quin ipsæ aspicientes non  
viderit, cūm (vt Plinius refert) non multiplici

flexu incedat, vt reliquæ feræ, sed celsus, & ere-  
ctus: vel quod ex insecto circumstance aëre, qui  
viderunt non perierint. Ceterū cū Eras-  
stratus his fabulis nullam fortasse fidem adhi-  
beret, certoq; sciret Basiliscum morsu tantū,  
vt aliæ feræ, homines interimere, eius dunta-  
taxat morsus curationem instituit. Verū quan-  
doquidem huiusce veneni vis adeo vehemens,  
& immanis existit, vt expugnari non possit,  
non est cur plura hic referam, quā ex Eras-  
trato memoriæ prodidit Dioscorides. Quem  
ducem & authorem secuti, vt ipse suis de me-  
dica materia libris hoc sexto finē imposuit, ita  
nos nostris in eos commēcariis, quos ad nostrā  
cōmunemq; rei medicæ studiosorū utilitatem  
cōscripsimus, iam extremā manū imponemus.  
Non obliui immensas gratias agere vobis opti-  
mo maximo, cui & omnia accepta referimus,  
& honorē ac gloriam tribuimus sempiternam.


LIBRI SEXTI ET VLTIMI  
FINIS.



Plura fa-  
bulosa in  
Basilisci  
historia.







Petri Andreae

# MATTHIOLI SENENSIS

Serenissimi Principis Ferdinandi Archi-  
ducis Austriae &c.

Medici,

## APOLOGIA

ADVERSUS AMATHVM LVKITANVM

*Cum Censura in eiusdem enarrationes.*



LVGDVNI.

Apud Gabrielem Coterium.

M. D. LXIII.



Εἰς τὴν Πέτραν Ἀνδρῆς Μαρτίου Ἀπολογία  
Μαρτυρῶ. Κολλῶ. Βοῶμε.

Ἐργα Διοσκουρίδ' ὁ Βοτανῶν πέρι, καὶ περὶ δένδρων.  
Σὺν πολλαῖς μελέταις ἔστι Μαρτίου.  
Οὐ πόνοι ἐκλείει τε καὶ ἐν φρονήσιν ἡμεῶν  
φαντασίᾳς εἶναι ἀξίον ἀδυνάτε.  
Εἰς τίς ἀνὴρ ἀγαθὸν ἔχον ὄνομα, εἴδ' ὅγ' ἂν μάρτυρ,  
Ἀ' ἡ ἀμαθὴς, τὸ τοῦ χέσσιμα ἔργα ψέγει.  
Τῷ γ', ὑπερφανίᾳς τοῖς χάριν ἀντιβολήσας,  
Τῆς βίβλου τὸ γέρας δώκεν ὁ Μαρτίου.

# FRANCISCVS PARTHINVS RO- BORETANVS

Serenissimi Maximiliani Regis Bohemiæ  
MEDICVS PETRO ANDREAE MATTHIOLO

PRAECLARISSIMO MEDICO.

S. P. D.



**N**EMINI hoc vñquā mortaliū hactenus cōcessum fuisse video (praestantissime Matthiole) quantuncunque in quauis præcelleret facultate. vt in tanta passim iudiciorum, sententiarumq; varietate, omnium desideria, & omnium animos æqualiter expleret. Atque in hac communi mortalium quidem infelicitate nescio quomodo placiores, & longè plus semper moderatos se exhibent boni viri, in quibus & virtutis, ac singularis probitatis, simul & eximia eruditionis lux enitescit, quim prauis, & neruosis, qui quod maiori implicati sunt infirmitatibus, tantò & difficiiores, & in omnibus se morosiores præbent. Vt quod ignauia, vel mentis hebetudine, siue suo quodam infortunio non valuerint adipisci, id lux imperitiæ tenebris in aliis obruere contendunt. Quorum quum molestia, & inhumana sit ingratitude, tum non serenda est hæc in eis arrogans, & effrenata libido, qua non modo ipsi, quibus nihil bonum, & elinacum placere potest, in optimis fastidit, sed & eò prorumpunt, vt etiam cæteris omne tollant emolumentum, & omni doctrinæ fructu, & vtilitate spolient. Ac quanuis ea sit in te constantia, eamorum grauitas, vt parum, aut nihil curandam, & omnino negligendam tibi arbitreris Amathi cuiusdam Lusitanus hominis ingratiissimū, & ab

omni humanitate alienissimū, imperitiissimū in tuis scriptis temeritatem, tamen post modum nonnihil vereri mecum cæpi, ne hæc animi tui magnitudo longius quā par sit, euadat. Nam quum iam frequenter ad me delatum foret, te apologiam, quam contra hunc ineptum hominem institueras, pariter & Censuras in eius grauissima errata penè ad finem perduxisse, non minus tua, quā omnium reliquorum causa, capiebam animo non mediocrem voluptatem, quòd has defensionis partes per neminem commodius subiri, nec per vllum facilius, & clarius huius insanam vecordiam, quā per te ipsum rectegi posse existimare. Nunc autem quo consilio, quæue mentis altitudine te aut cædeat, aut pudeat publicè facessere aliquid negotij cum illo nugatore, nescio laudem, an (quod mihi certè potius videtur) tuum hac in re nonnihil vituperem propositum. Quod si ita tibi persuades, vt non tanti æstimes Lusitanum, quem nemo aditu, nema congressu, nema conspectu aliquo doctorum virorum meritò dignatur vt indignum planè tibi iudices, vt illam dissolutam, & præcipientem loquacitatem irrisitam recondas, magis tuam eruditionem, quā summam esse nullus dubitat, quā reliquorum consulis iudicium. An quo singulari doctrinæ lumine faciliè tu huius falsitatis animaduertis, idem quoque de omnibus censeres. Erras profectò mihi eruditissime Matthiole.

Quot erunt, qui casu in hunc hominem inciderint, quos illius falsitas veritatis studio impediatur? Quot ille nondum satis instructus, & in hac facultate roboratus suis calumniis à tuis pulcherrimis operibus auerter? Qui quò infirmiores adhuc circa huius scientiæ tyrocinia adhaerescunt, aut nec dum tua doctissima scripta expenderint, tantò periculosius ab hoc veteratore inducentur. Qui adeò perfrictæ frontis est homo in aliena reprehendendo, in suas fabulas intrudendo, & adeò perfidus in alienis scriptis violandis & (qui imperitorum mos esse solet) adeò proclius est in sua constituenda sententia, ut vel mediocriter doctos nonnihil forte commoveat. Huius impudentiæ tu non occurreris? Eam quum tu sine omni tua molestia comprimere valeas, cum omnium reliquorum detrimento libidinose grassari pariteris? Dicam id, quod sentio Mathiole, non tam, ut cæteris in hac nostra medica disceptatione præstantissimis viris aliquid derogem, qui pro sua humanitate summa omnia tibi tribuunt, quam ne tui oblitus esse videaris. Quis hac nostra ætate doctius in hac medica facultate elaboravit? Quis vtilius, & luculentius hanc nobis maiori diligentia, & eruditione illustravit? Ut excellentissimi ubique viri, quos maria, terræ, iuncum immensas diuidunt à tuo conspectu, hi animo sermonibus, scriptis, literarum missione (ut tu optimè nosti) certatim velut ingentes, & immortales tibi gratias agant. Ego quidem (ut de me privatim ingenuè fatear) his tuis amplissimis communibus beneficiis sic me tibi deuinctum, & adstrictum cognosco, ut nihil tui causa detrectare nec debeam, nec velim. Quis ita sit inhumanus, quæ in quoquam tanta sit immunitas, ut tuis pulcherrimis, & fructuosissimis elucubrationibus adiutus, his fruens, his quotidie se oblectans, non dico ingratitudinis vel minimum indicium ostendat, sed hos tuos præclarissimos sudores immortalitatis, si possit (id quod fore non ambigo) gloria non compenset? non omnibus monumentis decorandos eos putet? licet nulla gloriæ cupiditas ad hoc te stimularit, quia maior est tuus animus, nec ea te huc impulit, sed solus communis, & publicæ utilitatis amor, quo incredibiliter flagras, te inflammavit, ut omnes grauissimos susceperes labores. Tantane fuit in Lusitano ingratitudo, eain inhumanitas, ut nihil istorum recorderetur? Non quidd vili tantum largiar homini, ut tantam ei vindictam excellentiam, quasi nil omnino in eo deprehendi valeat, quod non leuiter aliquem offendar, quod non tenuem aliquam apud alios mereatur reprehensionem. Nec tantum tu tibi asseris, ut (si quidem id fecisset) emendatum te à Lusitano dolere queas. Vtque adeò ne hominem esse immoderatum? Ita in aliorum labores impudentem? Sic ubique in alienis repellendis imperitum? Et quod ad te at-

tinet, minus equidem sum sollicitus de ea modestia, pietate, gratitudine, quam ille imperitissimus homo tuæ præstare debuerat humanitati. Non tanti est id incommodum, ut corrigi, & refutari posse à quamplurimis doctissimis, & grauissimis viris dubitem. Nam ut innumeris hoc nostro præteritatem tempore, eruditissimos, & plenos leporis, venustatis, humanitatisque viros, qui quo sunt ingenij cultu, quo flagrantissimo literarum amore, in perpetuum obligatos se tibi profitentur, tum vel vnus Cronenburgius Coloniensis summus, & præstantissimus medicus tuo cordi hac in parte abunde satisfaciatur. Cuius etsi doctissima, ac clarissima scripta à te versata non ignorem, audi obsecro quæ gratitudine, autoritate, quàm doctè, quàm luculentè in suo de compositione medicamentorum libro breuiter suum in te intimum affectum declarat, & Lustani illius nequitiam, & indoctam improbitatem redarguat, ac perstringat. AMATHVS, INQVIT, LVSTANVS frequenter odiosa confidentia virus identitæ suæ in clarissimum, modestissimumque virum Matthiolum Senensem eructat, dum passim nimis intempestiue huius doctrinam super commentariis in Dioscoridem editis coarguit, ac insectatur: quibus probatæ fidei hominibus nil aliud, quàm malignum animum, & perniciosam inuidiam ostentat, ipse interim infinitis modis dignus, qui ob magnam stirpem imperitiam, atque improbam in se translatam operam alienam (quod crimen est longè omnium turpissimum) velut è sublimi doctis veniat deridendus. Ecce quid etenim enarrationibus suis inseruit, quod non iustissimo titulo viro Matthiolo acceptum referre debeat? Aquo dum æmulandi studio dissentit, in graues, manifestosque errores imprudens homo prolabitur. Cuiusmodi exemplum tum in hac planta, tum in Acanthio tum Coronopo, tum Elichryso, ac in plerisque aliis visitur. Multò facius fuerat, quò doctiorem se æstimaret, eò quoque modestiorem præstare, quod ingenuum Philosophum decet. attenderis ille. Quid fyncerius? Quid magnificius huiusmodi viri grauissimo testimonio? Ut recreare potius te debeant taliù, & tot clarissimorum virorum centuriæ, quàm ut te moueat vnicum inter homines esse portentum, quod omnem comitatem, gratitudinem, beneuolentiam, & ipsam humanitatis naturam exuerit. Si monstri hoc sit similem in lucem esse editum, & de bacchetur, de quibus humaniter pares agere gratias nunquam poterat, minime tamen reformido, quin parum multi sint futuri, qui sua modestia istius intemperantiam conuincant, qui sua gratitudine, & candore, illius insolentem malignitatem, & infan-

sanam superent. Quorum sinceritas, honestas, probitas, non te plus reuocent, ac consolentur, quam istius barbaries te deiciat. Absit, ut non multo plus eruditissimorum virorum iudicia valeant, quam importunitas vnus Lusitani. Hoc porro multo magis me affligit, quod quum tu ipse per te commodè, & opportunissimè confutare possis hanc audaciam, id per te fieri nolis. An aliorum patrocinia expectas? Quum alios non animus, sed ingenuus pudor ab hac delibetur molestia cum isto subeunda homine. Alij suis impediti negotiis, alienæ difficulter se sufficiant falci. Cæteris aut non innotuit Amathus, aut (quod mihi est verissimum) tibi hanc reseruant prouinciam. Indignum se arbitrantur de eius discipulare mente, & iudicio cum aliena temeritate, eo incolumi, & adhuc superflite, cuius labores sint attentati, cui sua eruditio optimè sit cognita, & explorata, qui optimè se ipsum intelligat. Non decere id onus in cæteros reici, quod ab eo sit accessum, qui & id faciliè ferat, & maiora portarit. Neminem aliena censent tutius, diligentius, fidelius protecturum, quam sua ipsius, in quibus suus honor, sua laus, sua gloria versatur. Cur defendam Matthiolum? Viuit ipse, ipse est superflus. Quæ studiossimè, & doctissimè est commentatus, ea nobis seruet integra, hæc custodiat nobis salua, contra peruerfionem calumnias hæc nobis tueatur. Quare tuæ sit prudentiæ excellentissime Matthiole, ut quid hic te facere conueniat, sedulo prospectas. Et quid opus est magna hic, & longa consultatione? Quasi sit obsecrum, quasi te ipsum id lateat, magis te in isto negotio tuæ obtemperare mentis generositati, quam nostri omnium expectationi. Vide *μὴ ἀλλοτρίαν ἀντιρροπὴν καὶ ἀσφάλειαν*. Suspecta tibi sit ea securitas, ex qua & tuæ authoritati, & cæterorum studio non leuis fortasse imminet iactura. Ne nimis securè permittas obrepere in premium tuorum librorum *τὴν ἀμύλην τῶ ἀπαυλίστου* Lusitani. Excute istum scarabeum ex tuis floribus, nec sinas, ut suis molestissimis susurris, & fetore ista contamine, ex quibus opima, & roscida mella reliqui se consecuros sperant. Hic labor (& quis labor?) nisi ad cætera tua præstantissima monumenta, velut cumulus accedat, ea nos à te acceptisse cognosceremus beneficia, quæ fuerint inchoata, nõ absoluta, splendide adumbrata, non expressa. Quid? Vereor Matthiole, ne qui sint futuri, qui istuc tuum silentiū molestè, ac adeo ferant acerbe, qui & priorū amplissimorum beneficiorum pœnituisse te dicant, cum tanti ea non ducas, ut ea nobis ab hac contagione liberet. Propulsa nobis hanc molestiam, declina, obtunde omnem improbitatem, ut tuto nos in tuis luculentissimis operibus sciamus posse versari. Si te mortuo (quod Deus Opt. Max. avertat) Lusitanus ita nequitæ tua inuassit opera, implorandus, & exci-

tandus (credo) nobis eras, ut omni ignominia, macula, omni vel tenuissima aspersa labecula, tua nitidissima nobis restitueres opera. Nunc quid viuus cessas? Quod tunc à mortuo nos obtinere non posse penè iniquum putaremus, quantum id erit deploratius, quantum iniquius à viuo non impetrasse? Quid illud? Nihil ne te hoc mouebit, quod victus, & tuo iudicio, quod g. a. u. s. s. u. m. est, superatus manum conferere cum isto imbelli transfuga abnuere cen seberis? & ea iam tacite condemnare, ob quæ cæteri suæ sollicitati cum primis gratulantur? Scimus iam hanc operam à te incepiam, plus increbuit hic rumor, quod latinus, & liberius hunc calcographus dissipare. Ut hac quoque opera suas bibliothecas doctissimi complures locupletandas expedient. Hanc spem comprehensam, & mentibus nostris infixam, si tua præstantia defraudet, quid cogitabimus, cur ab incepto desisteris? Cur non id perfeceris, quod tu ipse inchoaris? An cedere te posse quisquam credat Lusitanis ineptissimè iure te reprehensum ab isto imperitissimo calumniatore fateri? Nulla vel tenuissima irrepit huiusmodi suspicio. Da quod à te magnificè expectamus. Exhibe quod lectu, & visu iucundissimū erit omnibus. Emitte quod iam penes te habes paratum. Quid abdis, quod non in lucem dare tuæ derogat existimationi, Lusitani inanem augeat confidentiam? Quid dicet calumniator profligatissimus? Scripsi contra Matthiolum, rapui, suffuratus, de prædatus sum, quæ volui. Viuit Matthiolus, nil contradicit. Adde nonnunquam plus inuat perfricare frontem, quàm omnia tribuere doctrinæ. Vici nil repugnantem. Cedit Matthiolus Amatho. Hæc ne pro sua impudentia, si non esset, secum volutabit? Noli tantum locum dare huius amentiz. Nobis nihil erit iucundius tua existimatione, nil dignius, nil contra huius furorem vehementius, quàm quod ex tuæ eruditionis armario deprometur. Effecit id iam antè tua præstant eruditio Matthiole, ut nihil vulgare, nihil mediocre, nihil non præclarum, & eximium omnes à te sperent. Noli te (rogo) in eam precipitare opinionem, ut aliquid in tuis bibliothecæ serinis delitescat, quod nobis subtrahas, quod nobis inuideas. Non patitur nostræ consuetudinis, & familiaritatis amor, ut hæc parum sollicitè, non satis anxie tecum petractem. Tamest de medica his materia ita bene, & præclare meritis, ut nemo tibi desce, nemo non omnibus beneficiis te cumulatissem prosequi valeat, timeo tamen subindè, ne homines ingrati, inuidi, maligni tua aburantur humanitate, & summo reipublice amore. Qui tunc demum veram se venari putant gloriam, si (id, quod nunquam, te confido, adipsentem) suis maleficiis tuos nentur præclarissimos obliterare labores: Ut quod liberali do-

Erina non potuerunt consequi, id imperitia, impudentia, furore nanciscantur. His, quæso, per nostram amicitia, per communem omnium literarum amorem, quibus animum semper habuisti deditissimum, declara, quàm mala cæcitate ruant. Aperi horum vanitatem, concute, dispeile istorum inuidentia virus. Indica eis quàm longè fuerat tutius sana in eis mente uti, quàm in illis suum furorem patefacere, ex quibus haurire poterant cum sapientissimis summam vilitatem. Infringe nobis hunc Amathum, qui antequàm sapere didicerit, omniū

se agitatore præbet. Quod quum tua postuler sapientia, eruditio, exultatio, tum nihil prius, nihil potius nos à te expectamus, quàm ut ea, quæ antea doctissimè nobis elucubraſti, ea nunc aduersus hunc prædonem calumniatorem tuta, salua, & intacta posteritatis memorie tradas, simul & ipsum sua imperitia, & erroribus infinitis ornes. Vale mi eruditissime Matthiole, & quamcelerrimè nostræ satisfacias omnium expectationi. Viennæ Austriz Quarto Nonas Septembris. 1557.

MAGN





# MAGNIFICO, AC CLARISSIMO

D. Petro Cannizero Serenissimi

Regis Romanorum &c. Archiatro

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS

SENESENSIS MEDICVS.

S. P. D.



**N**ESCIO quo passo et fere  
semper et sine venie animad-  
uertimus (clarissime Vir)  
summos, et praestantissimos  
Viros, quo magis excellent,  
et quantoque ceteris bonis,  
acutiusque Viris magis satisfac-  
fiant, tanto importunius

inprobrarum nequitia, et calumniis impeti, ac  
laesae. Quo minus mihi dolendum censeo, si ego  
quicquam (quantum in me quidem, et in hoc meo  
seculo satis acri publica Utilitatis non id praesentia  
culmen Videam, quod eos summopere effen-  
dat) post tot consumptos labores, horum improbi-  
tatem, invidiam, et irritos morsus evadere non  
poterim. Quod quidem neutiquam in huiusce  
visi improbitatem (Et quidam fortasse putant)  
id in impiorum hominum impietatem reuocan-  
tum arbitror. Quod tamen mihi sit novum,  
minus innotatum, et ab honestis quicquam  
impediat instituto, tamen mihi non est. Et certe  
deplorandum, quum una cum ipsa Virtute nata  
sit invidia, huius cum principibus emergerit. Et hac  
omni tempore suam exeruerint improbitatem. In-  
vidia vero Virum improbitatis suae nunquam in  
obscuris, ignotis, abiectionis, exercere solet, sed in  
eos plurimum, qui ceteris vel doctrina, vel sa-  
pientia, vel alijs quibuscunque animi, vel fortu-  
nae dotibus praeflores, eminentioresque evaserunt.  
Et potest quae cum eo loci cubi non possit, quo pra-  
dolari Viri propria Virtute praeferantur, fraudibus  
tantum et technis se extollere nitantur. Nec id-  
circo mirum videri debet, si quo magis quis in-

clarescat, eo vehementius in illum haec se iaculetur  
Viperæ, et sauiat tigris. Adhuc autem quum  
quandoque animadvertissem, et labori, et maturoque  
nostris ab invidis dilacerari comperissem, gaude-  
bam sane, et mea prope cuiusdam felicitatis esse  
ducebam (licet nunquam mihi tantum tribuerim)  
a clarissimarum hominum communi fortuna me  
non segregari. Ob idque decreveram potius ini-  
diarum rabiem silentio extinguere, quam scriptis  
respondere, palam facere eorum latratibus mihi  
negotium fuisse, praesertim cum in omni Vita  
principios comites meam altionum, consiliorum,  
voluntatum, pudorem, modestiam, humanita-  
tem esse veluim. Verum quum vidissem, legis-  
semque venissimas quasdam calumnias in me fieri  
in Dioscoridem commentarios editas ab Amatho  
quodam Lusitano homine sane non solum, et cuius  
fere nomenclatio, apprime indocto, sed etiam,  
quantum ex eius scriptis colligi potest, omnino  
arrogantissimo: quomodo, praeter id comperissem  
huic quamplurima ex commentarijs nostris fur-  
tim in suas transfuisse enarrationes, et in illis  
innumeros commisisse errores, qui rei barbaria  
studiosi magno fuissent detrimento (hoc enim pra-  
teteris me maxime angerebat) nisi à nobis palam  
repellerentur, pietate potius, quam cupiditate  
aliqua contendendi, à qua maxime sum alienus,  
excitatus pati sane non posui (et si aliter necum  
prius statueram) quum scriptis in publicum editis  
eius calumnias contunderem, errata repende-  
rem impossibilis contenterem, furta perscrutarem.  
Quod quum tandem fecissem, dubios subinde di-  
strabebatur animus, an quam conseceram Apo-  
stolam

giam, Quā cum Censurā in eam deliramenta in lucem proferrem, an Verò datus domi nostra premerem. Siquidem tametsi non Verebar hinc aliquam me reportaturum Victoriā, non tamen ducebam eam mihi fore gloriosā, eò quod cum homine nullius fore frugū, & pauca admodum existimationis in certamen descenderem. Ob idq; consultus Videbatur scripta illa iam odorata in aliquem tenebriosum angulum abdere, quam in lucem eculgare. Ad hoc accedebat, quod audirem, & iam etiam Viderem quamplurimos doctissimos & honestissimos viros (quos nunquam nouimus) non tam nostra, quam Veritatis causa patrocinium suscepisse. ac iam tandem pro me tulisse sententiam, Amatum Verò causa cecidisse. Verum diuersum suadebat genus meus, subinde Velut insasurans indignum fore si meos partem tanta iniuria affectos hac tantum ratione destituissem. Idq; eò magis mihi sciendum suadebat, quò iam in prompta essent, qui suis scriptis ad hoc munus exequendum me plurimum compellerent. Dum itaque anceps in his Versor opinionibus, & in altera mihi animus repugnat, in altera Verò conscientia, & ipsius hominis damnoſa imperita me admonet, & vbi potius negotium hoc honestè subterfugere cupiebam, quā ex: qui, tot accesserunt doctissimorum Virorum suasioes, tot amicorum litera, tot calographi nostri preces, tot quorundam allatationes. Ut tandem (quamquam fore inuitus) decreuerim eorum potius sequi sententiam, quā meam. Atqui inter tot suasiores, amicos & studiosos nullus mihi sese obtulit, qui animum magis

Vinceret meum, quā Francisum Parthium Serenissimū Maximilianū Regis Bohemæ Medicum apprime eruditū, & in omni studiorum genere optime Versatus, cuius litera omnium postrema adeo me à priori instituto renouarunt, Ut eius opinionī, & consilio, quod semper plurimi feci, assentiri decreuerim. Ceterum quam iamdū noverim (Vir clarissimū) quantum doctrinā, eruditione, ac sinceritate praestet, quin etiam tantum iudicio summo, ingenio, aequitate, & authoritate Valeas, quum te habeam precipuum inter eos, quos mihi eximie obseruandos proposui, hos Vltimos labores nostros non tantum tibi legendos, Videndosq; mittere decreui, sed etiam nuncupari Volui. Nec (mihi crede) eo animo, Et hac re tua in me collata beneficia rependere Velim, ac potem, sed quòd eximia Virtus tua id miritū à me exposcat. Doctrina enim tua, ac singulari eruditione imperitissimū huius hominis nequissimū in me calumnias, & errata quamplurima facile nescire poteris, animi sinceritate discurrere, iudicio & ingenio ponderare, aequitate indicare, & postremo authoritate corrumpere. Hoc si (ut spero) eo feceris animo, quo in omnium amicorum, bonorumq; Virorum negotijs semper esse soles, Verendum mihi non est, quin tui etiā praecantjs nostra amgeatur praedicta. Nā vbi Videris hac omnia partim in me falso esse collata, partim in rei me dica nostra, & studiosorum, tyrunculorumq; discrimen esse deprompta, tu, qui omni pietate ducere, ne cuiquā te cōtinere poteris, quin omnibus modis labores nostros tuerari, Vale. Praga Quarto Calend. Septembris,

PRAE

PRAEFATIO.

*Commen-  
sarv in  
Dioscori-  
dem ma-  
gno labore  
sunt edidit.*



VVM NON Sine magno labore, magnaque industria Commentarios in Dioscoridē edidissim, quem admodū doctis quā plurimis, praclarisq; materiæ medicæ studiosis hosce labores nostros non ingratos fore sperabam, sic neminem tam peruersum, inuidum, improbumque fore iudicavi, qui non potius optimi consuleret ( vt ingenuē fatear ) candidos nostros, & synceros conatus, quā iniquius quidpiam de his existimaret. Etenim quum semper me admodum delectauerit medica materia, & temperis & studij illi tantum impenderim, vt aliquid quoque nostrum in hac facultate valere iudicium crediderim: ingenui honestique viri munus esse putaui, suā industriā, & labore parata, ne Reipublicæ inuidere videretur, in commune omnium studiosorum vsum in publicum promere. Hanc itaque ob causam hoc mihi ingenuum, honestūque videbatur, vt id quod vnusquisque in quolibet scientiæ genere, vel ingenio, vel doctrina, vel longa, diuturnaque lucubratione, obseruantiaque sibi priuatum, & non quasi priuatum, & sibi proprium fuerit assequutus, contineat, sed in commune totius reipublicæ emolumentum pro viribus libenter effundat. Hoc cum iam pridem à me esset factum, non sine fructu fortasse, nec ( vt audio ) absque magna multorum praclarissimorum virorum laude, quibus meæ elucubrationes placuerunt, tamen si ij nec me nouerint, nec viderint vnquam, non leuiter sum excitatus, vt libentius, & alacrius nouum susciperem laborem, vt ex auerentur, plantarum imaginibus decorarentur, & Latino sermone cuderentur. At dum acriori, in-

tenriorique, quā hactenus in hac versor opinione, & iam opus prelis Valgrasiinis subisset, frequentibus amicorum literis ad aures meas peruenit incredibilis Amathi cuiusdam Lusitani intemperantia. Id quod non parum fortassis ab hoc meo me diuertisset instituto, nisi ab hoc vno contemni, & arrodi audissem, quæ tot praestantissimorum authorum iudicia comprobarent. Veruntamen non adeo horum tot hominum iudicio stare volui, quin & ille Lusitanus, quem immodestissime in meos inuehi commentarios audieram, non nihil me commoueret. Non enim arbitrabar hominem illum tanta posse duci temeritate, vt ea, quæ passim ab omnibus penè probarentur, sine magna ratione, & consilio conuelleret, & lacerare auderet. Quamobrem curavi sedulo, vt eius libri ad me deferrentur, non alio profecto animo, quā quod philosophi munus, & meæ modestiæ semper duxi, non ea perueciacia propriis affigi, vt eorum improbaretur opinio, qui melius & sanius aliquid sentirent. Equidem putabam quod cum Lusitanus ille omnium vltimus Dioscoridis codicem expendisset, adeo omnia cribasset, & excussisset, vt nullus reliquus fuerit ambiendi locus. Monebat quoque illius Centurionis nomen, quem centurias quasdam digessisse aiebant. Sed vbi primum eius narrationes intueri ceperam, longè aliter quā putaram, euenisse cognoui. Quandoquidem præter calumnias mihi falsò ascriptas, nil aliud quā inuidentissimum animam, ac loquacem, & ineptum hominem obseruare potui. Nescio profecto magisne me offenderit hominis imperitia, qui nullo iudicio, nulla ratione aliena præceps & insanissimè damnet, an improbitas, & insignis nequitia, quod tam impudenter ex his ipsis, quæ in alios calumniatur, suas agit prædas, & tanquā sua quasi vindicet. Verū vt suam agnoscat insci-

*quam  
cania Co  
mentarij  
in Diosc.  
latine scrip  
tis. Et  
p. 1. 2. 3. 4.  
imagini-  
bus illu-  
strati.*

*Cur a d. 1. 2.  
has ser. 1. 2.  
p. 1. 2. 3. 4.*



tiam, nec suis calumniis quicquam nostræ detrahat auctoritati, aut publicè vituperari, quin & ne in posterum fortè honestissimum nostrum, vel aliorum impediatur cursum, cogor sanè eius ineptias aperire, ne videar id mali ad posterum relegare, si præsentibus culpis ignoscerem. Licet itaque nobis nostra pro virili defendere, & ex omni parte tueri, ne si hæc silentio dissimularem, quis deinde modestiam nostram in conscientiam duceret. Et primò ne aliqua iniuria, aut fraude hic qui tam improbè nos lacepsit, secum agi putet, ac etiam ut candidus lector facilius deprehendat, & æquissimè discernat utriusque controuersiam, antea eius verba ob oculos ponam, ad quæ singulatim mihi respondendum meminerò.

*Celsina  
prima de  
Mæ.*

Ar Videte obsecro, quàm graviter, ac vehementer me primum adoriatur Lusitanus, non quasi de herba sibi sit certamen, sed quasi mecum de religione contendat, quam homo inconstans iam pridem turpissimè, ac impudentissimè deseruit. Nec enim (inquit) veritas ipsa occultanda est hac de causa, quia Plinius scriptum reliquerit, suo tempore Meum in Italia non nisi à paucissimis medicis feri, quem sequutus postea Marcellus Vergilius vir aliqui doctissimus, rei tamen herbariæ non admodum peritus, dixit, nunc, quod sciam, nullum Italiæ Meum est. Ob quæ verba Matthiolus Senensis in Italia quoque Meum non reperiri clamat, immò contra Patres Mæfues interpretatores acriter agit, qui in Calabria, & Nursiæ montibus Meum nasci affirmant. Quod ita esse crediderim, cum apud Bononiam quoque nascatur, ut testes sunt Nicolaus Nicolucci pharmacopola Ferrariensis, & Gaspar de Gabrielis nobilis Patavinus harum rerum maximus indagator. Accusandus igitur Matthiolus est potius, cum

magis negligens in inquirenda hærēba fuerit, quàm diligentissimi Patres, qui defudantes Nursiæ montes, ut eam inde eradicarent, ascenderunt. Sed frustra me tanta acerbitate persequitur Lusitanus. Attendat ipse, quantum vsus sim modestia in huius rei assertionē. Non enim clamo Meum in Italia non reperiri, sed plura sanè esse scribo, quæ me ancipitem reddiderunt, an Meum, quod nunc pro genuino sumitur, legitimum fuerit. A Lusitano iam pridem non didici in Italia quoddam circumferri Meum, cum ante ipsum hoc scierim. In hac tamen inclinari me disto opinionem, illud à genuino ac vero Meo mihi videri longè dissimile. Hoc etsi simpliciter à me esset dictum, ut meam hac in parte solum exponerem sententiam, nescio tamen cur accusandus magis illi videar quàm leniter admonendus. At quòd in hanc venerim opinionem, illud in causa fuit, quòd plures huius rei mihi constarent rationes. Etenim est in primis quòd viderim nostratis Mei radices longè crassiores, vegetioresque quàm genuini expetat historia: quippe longas, & renues radices Meo reddidit Dioscorides. Est deinde quòd eadem graviter potius, quàm suauiter oleant, quum tamen Dioscoridi Meo radices requirantur odoratæ non graueolentes. Est præterea quòd mansæ parum omnino acrimonie respiciat. At quum Galeno auctore, Meum tertio excessu calfaciat, cur non illud genium acriori vi pollere existimauerim, quàm quod nuperrimè in usum medicum concessit? Est etiam, quòd extent manu scripti Dioscoridis codices, qui Meum non Anethi, sed Anisi foliis, conferant. Quod & idem refert Plinius, quem licet reiciat Amathus, non tamen sine ratione est adductus, ut scriberet non nasci in Italia Meum. Nam cum non nisi à medicis, usq; admodum paucis ipsam

*Calisia  
refellitur.*

*Mei consi-  
deratio.*

*Mæi, quod  
circumfer-  
tur à ge-  
nino plu-  
ribus dis-  
sides non  
est.*

feratur,

feratur; magnum & euidentis est argumentum non ibidem sua sponte pro-  
gigni. Quorsum velut peregrinum à  
medicis excolebatur, si vbiq; in Italia  
nunc illud exfrescere videmus? His ita-  
que palàm est, vt non ab re in censendo  
Meo mihi plurimùm fuerit ambi-  
gendum. Etenim mihi perpetuò decre-  
tum volui, non ita facile de rebus dubiis  
affirmare, ne id arrogantiè potius,  
temeritatique, quàm doctrinæ, & dili-  
gentiæ nobis ascriberetur. Verumta-  
men nolui ob id pratermittere, quin  
huiusce Mei imaginem appingerem,  
non tamen, vt hoc tantùm argumen-  
to fateri viderer illum genuinum re-  
ferre Meum, sed vt illud nobis antea  
non ignoratum (vt opinari videtur Lu-  
sitanus) ostenderem. Quam ob causam  
non modò illos mihi semper detestandos  
propofui, qui tam facile de incertis  
sententiam ferunt, sed & eos longè ma-  
gis, qui, vbi fatear, hanc vel illam me  
non vidisse, nec nouisse stirpem, mox  
clamitant, & erroris me arguunt. Equi-  
dem semper optimi viri manus esse cre-  
didi, ignota, vel dubia potius silentio  
involucre, & nihil de illis determinare,  
quàm in posteritatis discrimen, falsa  
pro veris describere, & dubia pro cer-  
tis asserere. Quod quandoque fecisse  
Monachos illos, quos, vulpina quadam  
religione, patres Lusitanus appellat,  
non ambigimus. Sed sanè mirum vide-  
tur, quum nostram, & suam religionem  
omni flagitio polluerit, dedecore macu-  
lauerit, scelere obligauerit, & eam  
tantùm ob causam è sua exulauerit Lu-  
sitania, quòd hic tam acriter pro Mo-  
nachis illis depugnet, qui Iudæorum om-  
ne genus maximè persequuntur. Sed  
& illud etiam mirandum nobis sese  
offert, quòd hic me tantoperè lacefsi-  
uerit, quòd in eoshæc scripserim, quum  
tamen ipse pluries Monachos illos  
aliàs damnet. Id quod etiam cum Plinio  
fecisse constat. AT IAM HOMI-  
NIS videte inconstantem feuerita-  
tem, qui & si paulò antè (puto enim

me aliter inuadere non potuisse) Plin-  
ium ipsum, & alios grauissimos au-  
thores explodere, ac damnare non est  
veritus, me tamen quasi rigidus pa-  
truus feuerè increpat, quod à Plinio nõ  
nihil in Iridis mentione discessem, ea  
ratione adductus, quòd is præter Dio-  
scoridis sententiam, candidam Iridem  
rufæ prætulerit his verbis. Illyrica quo-  
que duorum generum est. Raphanitis,  
à similitudine, quæ & melior: Rhizoto-  
mos subrufa. Nouam hic quandam ex-  
cogitat Lusitanus artem, qua me ad-  
oriri posse putat. Nam quum idem Plinio  
alibi scripserit Iridis radicem ex-  
calumnia, & fuscantem,  
teris præfate, quæ rufa fuerit colore,  
ne vlla in tanto viro observari possit  
dissensio, eam inuenit defensionem si-  
dus patronus, qua haud scio an defen-  
di se velit ipse Plinius. Atqui Lusitanus  
priorem clausulam dissoluens ita legit.  
Illyrica quoque duorum generum est,  
Raphanitis à similitudine. Reliqua quæ  
sequuntur in vnum coërcet cum rela-  
tuo, Quæ & melior Rhizotomos sub-  
rufa. O insignem Palæmonem. Non  
equidem rogabo Amathe, vt dicas, in  
quo codice tales videris interpunctio-  
nes, cum certò sciam in nullo inueniri.  
At afferatur iam in medium Frobenia-  
na editio, quam tibi patrocinari putas.  
Afferatur (inquam) vt statim confu-  
sus silcas. An non te pudet editionem  
hanc vocare in iudicium, vt illicò pa-  
làm fiat, quàm grammaticorum om-  
nium iudicio, ET particulam, pro  
ETIAM ibi sumi? Quæ ista connexio?  
Quæ etiam melior, Rhizotomos sub-  
rufa. Nimis sanè multa nobis affers de  
verbo, cuius sensus cuilibet legenti so-  
le lucidius apparet. Istis grammaticæ  
confusis legibus nolit (me hercule) de-  
fendi Plinius. Malit is communi obli-  
uionis quoddam errore (quod & do-  
ctissimis & summis viris inter multa  
quandoque contingit negotia) lapsus  
videri, quàm huic grammatico sua sub-  
iici opera. Id ne nouum tibi est in Plinio,  
vt aliquoties sibi non satis confect?

*Plinius  
quantum  
non satis  
sibi confidit.*

Mihi quidem & studiosis lectoribus nequaquam. Etenim de Castore scribens Plinius libro octauo, capite 30. castores affirmat dentibus sibi testes abscindere, quum venatu vrgentur, ob hoc se peti gnaros, id quod postea libro 32. capite 3. apertissime negauit, & tanquam tabulosum exposcit. De Populo autem agens libro 16. capi. 23. nullum hanc florem, nullumque fructum edere ait, quorum oblitus libro 23. capite 8. eandem Populum dixit, & uas, & semen gignere, hoc comitalibus, illas ad vnguenta praferens. Quid igitur mirum, quod scelus id erit, si & in Iride, & sibi, & Dioscoridi Plinius repugnasse dicatur? Equidem id flagitium non dico in Plinio summo utique auctore, si in tanto opere, & tam varia lectione aliquando memoriae fragilitate sit prolapsus, praesertim cum is potius alienam recitet historiam, quam propriam. Te potius miror Amathe, qui quod tibi lubet, idem ceteris, quum ramen iusta id ratio suadeat, non licere censeas. Nos veritatem ubique sequimur, eam nulla hominum autoritate, quoad possumus, patimur obfuscari. Non tanti (mihi crede) est aestimandus in Plinio aliquis memoriae lapsus, quantum ti eam, quam de laboribus nostris agis, rapinam aestimandam censemus. Quid enim turpius, impudentius, detestabilisque quam furcivum frugem ex aliena messe in suum transferre horreum? Quid deinde inhumanius, quam quem expoliaueris, gladio & conuitiis adoriri? Optimorumne haec sunt hominum? Grassatorum, praedonumque potius mihi videntur, quos tu maxime sequutus videris. Quo fit ut mirum non sit, si primum è Lusitania pulsus, ac deinde è Germania in Italiam reiectus, iam inde etiam profugus aberras, adeo ut solum ferè non iuenias, ubi iam tutus esse possis. Porro haec mihi de Lusitania illo dixisse liceat, non ut videar cum homine pugnare, quem non est ut timeam, neque etiam ut odio prosequar

aliquo, praesertim cum nihil sui possideat, ubi possim postea refici, ubi vicirim, sed tantum medicae materiae vindicandae, & honoris nostri sustinendi causa. Potuisssem quidem Amathum hunc acriori, vehementioriique sermone reprehendere, primum quod tam temerè labores nostros depradatus sit, deinde quod falsissimas, friuolasque calumnias in me excogitauerit. Postremo quod ubi aliquid suo Marte cudit, ingrauiissimos, frequentesque labatur errores. Atqui quum probi, ac candidi hominis non sit munus conuiuiis, ac maledictis, sed propria virtute pugnare, ca utar in dicendo modestia, quam animi nostri sinceritas, & eius insolentia exposcere videbuntur. Quod si quandoque pietate summa adductus, vel calumniarum iniquitate lauciat, paucam quædam acerbiora fortasse in hunc deprompsero, rogo atque etiam obsecro, ne quis id mihi vitio vertat. Scio quidem in respondendo me magnam non habere expectationem, quod nemo iam sit, qui eius legerit libros, quin prius nouerit non modò hominis imperitiam, sed etiam temeritatem.

AMEO LVSITANVS de Amomo hac in re confert. At Matthiolus Senensis cum nos vero carere Amomo sciret, ut illum tamen habeamus, in Lusitaniam nos remittit, ubi ex India nunc delatum contendit: mea tamen sententia fallitur, cum hucusque Amomum verum incompertum sit. Hæc ille. Sed planè falsò, cum plura me dixisse scribat, quam rei veritas exposcat. Quandoquidem cum nunquam meis scriptis affirmarim Amomum ex India in Lusitaniam conuehi, nec eò quemquam remiserim, ut ille somniasse videtur, dum meas mentitur lucubrationes, & eas (quæ illius est liberalitas) suis verbis amplificat. Scripsi quidem me à quibusdam non sperandæ fidei medicis accepisse iam primum ex India in Lusitaniam afferri Amomum, nec sanè plura, quam hæc.

*Calumnia  
tertia  
de Amomo.*

*Calumnia  
deplurima.*

Ceterum

*Anima  
uerbo in  
Lusitaniam.*

Ceterum cum eorum sententiam nec probauerim, nec damnauerim, cur hac in re me adeò vellicet, cōicere quidem nō possum, nisi quis fortasse in eius maleuolium animum hæc reliciat. Quod autem ille perperam meam acceperit mentem, id arguēto esse potest, quòd in commētaris i. ossi latino sermonē editis, nihil huius se fabulæ meminere.

*Calamita  
quæ ut de  
Calamo  
Odorato.*

AD CALAMVM. Odoratum veniamus, ubi ille grauiore, sicut ipse, putat, in me admouet machinas, quas idcirco non magno sanè negotio à nobis amolierimur, quòd non aliquo consilio, non aliqua prudentia, aut ratione, sed suo more (propè dixeram moria) id in nos moliri contendat. Arguit me, quòd nixus Theophrasti, & Plinij testimonio certò affirmauerim radicē, qua passim Odorati Calami vice vtuntur Seplassi, legitimum, genuinūque esse Acorum: quā & quòd scripserim Calamū Odoratum harundinem esse, non radicem, quibus refragatur his verbis. At mea sententia decipitur Matthiolus, cūm licet Theophrastus, & Plinius in Calamo Odorato calamum, & non radicem laudare videantur, alibi tamen Calami Odorati radicem desiderāt, & eam cæteris calami partibus anteferunt, vt apud Plinium est legere lib. 24. cap. 11. in quo cum Calami Odorati iuuentutem enumerat sic inquit, Efficacissima autem in omni harundine, quæ proxima radici: efficacissima, & genicula. Per quæ verba manifestè percipitur, quòd in omni calamo, siue harundine, radix efficacior est pars. Quæ de causa Calami Odorati radix potius, quàm calamus in opus trahenda est, vt meritò hætenus pharmacopolæ hac preciosa, & exotica radice pro vero, ac genuino Calamo Odorato vsi sunt. Quantum verò ad Dioscoridem attinet, si quis introspicies eum accuratius expendit, inueniet illum de radice potius loqui, quàm de calamo, cūm radix geniculata dicitur, calamus verò potius nodis cinctus. Hisne tā stolidè me putat cōcludi

Lusitanus? Sed audiat ipse non quàm Matthiolus, qui hæc accuratius prius, quàm scripserit, pensitauit, sed quàm turpiter ipse potius decipiat, quippè qui temerè Plinij, & Dioscoridis grauissimorum authorū abauit testimonij. In primis enim vt eius argumenta dissoluam, & tāquam inania, & irrita mostrem, non vereor, ne Plinius, aut Theophrastus Calami Odorati radices adeò desiderarint, vt nusquam earū fecerint mentionem. Nam quòd Plinius ait, efficacissimā in omni harundine eam esse partem, quæ radici proxima, quis fuerit Pliniani lætioni, Latiniq; sermonis adeò imperitus, vt non videat de harundine non de radicibus intellexisse Plinium. Nanque examinaturus quænam partes in vniuerso calamo cæteris præstent, nā non radices, vt Lusitanus sua quadam malitia, vel fortasse imperitia in me distorquet, sed partes radicibus proximis cæteris præstare inquit: quod facillè prudens animaduertet lector. Nec enim aliam ob causam putat Plinius maiori vi pollere eas calami partes, quæ præ radices habentur, quàm eadem ibi crassiores, vegetiores, robustioresque in omni harundinum genere reperiantur, quàm in cæteris earundem locis, quo fit, vt etiam calami ipsius genicula efficaciora pariter ipse existimauerit Plinius. Quippe & genicula robustiora sunt, & crassiora. Quam ob causam Calamum illum prætulit Dioscorides, qui densè fuerit geniculatus. Sed iam ipsum quæso intueamur locum, quē ille quasi violentum quoddam telum in se vibrat. At si vlla in eo sit prudentia, si leuius & consideratius verba Dioscoridis mecum perpēderit, non solum deponet hanc iracundiam, sed fortasse etiam noscet, quàm magno ducatur errore. Nam quòd Calamum, non radices describat Dioscorides, aperte quidem constat, cūm ait. Calamus Odoratus in India nascitur, melior est fuluus, densè geniculatus, & qui assulosè frangitur, plena araneo-

rum fistula. Hæc ille. Quæ tamen perperam Lusitanus intelligit. Quippe calamus in primis harundinem designat, non radicem. Præterea proprium harundinis est pluribus constare geniculis, & assulosè frangi. Deinde fistula, in qua quoddam araneæ telæ simile cōcluditur, calamo tantum debetur, non radici, quæ solida, dura, lignosa, & vbiq; occlusa spectatur in omni harundinum genere. Ad hæc fulvus color calamo sanè debetur, non radici. Quippe quòd radix in harundine perpetuò albicet. Ad id autem quod proprium sit radicis (vt ille contendit) vt ipsa geniculata dicatur, calamus verò potius nodis cinctus, Dioscorides ipse respondet. Quandoquidem is non modò quarundam plantarum radices geniculatas facit, sed etiam caules, & calamos nonnullarum stirpium reddidit geniculatos, vt faciliè quis certior fieri poterit, qui eius codicem legerit in Hydropipere, in altera Cyclamino, in Gentiana, in Panace Asclepio, in Ligustico, in Elaphobosco, in Cræteogono, in Gramine, in Equiseto, in Cicuta, in Pityufa, in Ebulo, aliisq; nonnullis. Sed relinquamus hæc (inquam) quæ legere non vacauit Lusitano, & alios consulamus authores. Plinius tritici culmis genicula quaterna, farris sena, hordei octona tribuit. Hinc libro de senectute Culmo geniculato inquit Cicero. Hæc si animaduertisset Amathus, aut si non tam negligenter & oscitanter Dioscoridis codicem legisset, tam non fuisset insulsus. Illud tamen maximè in hoc homine ridiculum videri debet, quòd quum tam excellentem se haberi velit medicum, rei que herbariæ peritissimum, eius sententiæ, quam damnat, nullam soluat rationem, & omnia relinquat intacta argumenta. Porro ego in illum tam vecors non ero, vt hominem potius, quàm opinionem parum validam nullæ veritatis imagine fultam videar persequi. Solus seuerus

hic iudex in nos ex alto tribunali fert sententiam, damnat nostra. Tantum sibi temporis superesse non putat, vt vel aliquid probabilius afferat, vel rationes nostras dissoluat: vt non veritatem, cui à quouis prolata semper fui addictissimus, sed solam suam sequi malevolentiam femonstrer. Nos (quod præcipuum sanè nobis est studium) ne calumniatores potius, quàm veritatis putemur indagatores, multa habemus, cur Amathi huiusce nobis displiceat opinio. Primū quòd nusquam visa sit radix inter valdè admodum innumeras, quas ille falsò genuini Calami esse censet, quæ secum vel minimum harundinis trunculum cacumini adnexum deferat: sicuti quamplurimæ visuntur, quæ ab ipso cacumine folia emittunt Iridis, vt quisque faciliè certior fieri poterit, qui diligenter hæc radices explorauerit. Constat præterea hæc radices ex Lituaniæ, & Tartariæ finibus, quin etiam ex Ponto, vbi passim ferè proueniunt, ad nos conuehi. Quod maximo cuique argumento esse potest, eos prorsus hallucinari, qui eas ipsas radices Calami Odorati esse contēdunt, quòd nullus extet author (quod viderim) qui scripserit Odoratum Calamum alibi prouenire, quàm in India, & Syria. Quin & illud in nostram concedere sententiam Lusitanum fortassè monebit, quod à Galeno dictum est, quippe qui scripserit Calami Odorati, partium essentiam esse in caliditatis, frigiditatisque coniugatione temperatam, & minimum habere acrimoniam, cum tamen gustantibus palam sit, radicem hanc non obscure esse acrem, pariter & amaram, id quod Odorato Calamo minimè tribuit Galenus. Hisce itaque satis iam comprobatum censemus sua in sententiâ hic hallucinari Lusitanum: nec pluribus est hæc nostra defendenda causa. In sequentibus tamen & rationibus, & autoritatibus ostēdemus,

*Calamus  
Odoratus  
communis  
est  
de affera  
tur.*

*Calumnia* radices has legitimi esse Acori. NEC  
*quinte de* MINVS FALLITVR, quæ de Aspalatho  
*Aspalatho.* contra nos affert. Est verò Aspalatho,

„thus (vt Ruellius testatur, & recentior  
 „res Græci confirmant) lignum, quod à  
 „Rhodiorum insula affertur, & illud, li-  
 „gnum Aloës, Rhodiorum officinæ ap-  
 „pellant, ex quo coronæ ad fundendas  
 „preculas Deo parantur. Nec enim Mat-  
 „thiolus, qui hoc tanquàm falsum euer-  
 „tere contendit, audiendus est, quum re-  
 vera lignum hoc, ex quo coronæ paran-  
 tur, ex arbuscula humili crebris spinis  
 aculeata in insulis Rhodiorum, & aliis  
 Græciæ locis ceditur, non verò ex oli-  
 uæ speciem referente arbore. Vidimus  
 enim nos apud Thomam Lucensem in  
 signem apud Ferrarienses pharmaco-  
 polam huiusce ligni frustum brachia-  
 lis crassitudinis, solidum, graue, multis  
 interceptum nodis, quod à Græcis ho-  
 minibus sub nomine Aspalathi accepe-  
 rat. Erat enim lignum coloris subrubi,  
 cui simile in Hispania apud Tاراconen-  
 ses, & Valentinos magna in copia repe-  
 ritur, Haëtenus ille. O felicem discipu-  
 lum, qui vbique magistros habet phar-  
 macopolas, à quibus sic institutus di-  
 scedit, quasi ab Apollinis, aut Aescula-  
 pij reuertatur oraculis. Sed venit mihi  
 in mentem, ne quoque iniuriam his fa-  
 ciat, quibus præceptoribus se toties  
 vsum iactitat. Verùm seu ab iis hæc sit  
 edoctus, seu ipse suo ingenio hæc exco-  
 gitauerit (malo enim non à me hæc agi-  
 tari testimonia, quàm ad hæc inuesti-  
 ganda tantum frustra suscipi laboris)  
 ego profectò Rhodium illud lignum  
 multum distare ab Aspalatho certò  
 scio: quòd primum illud cortice tenus  
 rubens non sit, sed potius albicans. As-  
 palathus enim Dioscoridi detractò cor-  
 tice adeò rubet, vt purpuram penè re-  
 ferat. Quo argumento credere quidam  
 Santalum rubrum legitimum esse  
 Aspalathum, quanquàm & illi aberrau-  
 erint. Sed & id clarissimè demonstrat.  
 Rhodium lignum nullam cum Aspalatho

*Calum-  
nia refutatur.*

*Rhodium  
Oleastrum  
non esse  
Aspalathum.*

tho habere cognationem, quòd I scribat  
 Galenus, qui legitimum in Græcia for-  
 tasse pluries degustauit, hunc gustu ef-  
 se acri, & simul adstringenti vi prædi-  
 tum. Id, quod minimè in hoc Rhodio  
 ligno reperitur, quemadmodum nec  
 præualens amaritudo, quam illi reddi-  
 dit Dioscorides. Quòd autem huiusce  
 ligni planta sit Oleastri species, id ma-  
 ximè fatentur Rhodij, qui eius histo-  
 riam ex Melita insula ad me scripserunt  
 his verbis. Lignum ex quo torno globu-  
 li fiunt ad fundendas preces, truncus est  
 „ arboris longitudine hominis metam  
 „ non excedentis. Nasctur arido, & saxo-  
 „ so tractu, fròde perpetua oleastri amu-  
 „ la, floribus albicantibus, baccis nigri-  
 „ cantibus, paruis, caudice breui contra-  
 „ cto, brachij instar crasso, à quo rami  
 „ prodeunt rari, spinis ferè nullis, aut ad-  
 „ modum paucis, albicante toto cortice.  
 „ Ligni materies cortice tenus candicat,  
 „ medullitus verò nigricat. Radicibus ni-  
 „ titur firmis albicantibus. Quibus pal-  
 „ lam esse arbitror Rhodium hoc lignum  
 „ ab Aspalatho admodum esse diuersum:  
 „ & Lusitanum vnà cum Ruellio in eo-  
 „ dem versari errore. Quippè (vt præmi-  
 „ simus) Aspalathus tantum cortice te-  
 „ nus, non vt ille existimasse videtur, in  
 „ tota ligni substantia, adeò saturatè ru-  
 „ fescit, vt purpureus appareat. Quin-  
 „ etiam cum Aspalathus in Rhodo pro-  
 „ ueniens frutex sit furculosus (vt testis  
 „ est Dioscorides) non arbor procera, ra-  
 „ tionis consonum non est, vt ad brachia-  
 „ lem crassitudinem adolefcat. Cæterum  
 „ quòd de re incerta non modò contenda-  
 „ tur, sed tam faciliè audeat affirmare,  
 „ detestandum mihi videtur. Quippè nil  
 „ tam temerarium, tamque indignum  
 „ sapientis granitate crediderim, quàm  
 „ aut falsum sentire, aut quod non satis  
 „ exploratè perceptum sit, & cognitum,  
 „ sine vlla dubitatione defendere.

*Rhodij  
Oleastrum  
historia.*

HINC AD HELENIVM VENIO, *Calum-  
nia vi. de  
Helenio.*  
 in quo quum Lusitanus existimet, me  
 pluribus modis hallucinatum, adeò vt  
 nullis

nullis possim me defendere rationi-  
 bus, acriori morsu in nos inuehitur his  
 verbis. Confirmat Marcellus Vergilius  
 se sic in antiquissimo Dioscoridis codi-  
 ce legisse. Caulem ex se mittit Heleniū,  
 crassum, hirsutū, cubitalem, & aliquan-  
 do maiorem, angulosūque, flores lu-  
 teos, & in iis semen Verbasco simile, ta-  
 ctu pruritus faciens. Vnde facile cre-  
 dere est, vt hæc peruersa, & immutata  
 fuerit, ita quoque pars hæc ad amaritu-  
 dinem attinens: quanquā eam quo-  
 que à Plinio prætermisam animadu-  
 erit. Vnde Matthiolus Senensis hic falsò  
 admodum Plinium adducit libro x i x,  
 cap. v. qui vltra quòd in eo capite nul-  
 lam penitus de Helenio mentionem fa-  
 ciat, libro tamen x x i. cap. x. vbi Hele-  
 nij meminit, non de hac loquitur, sed  
 potius de Aegypcia, cui Dioscorides in  
 hoc capite ex mente Crateuæ herbarij  
 ramulos Serpylli modo humi sparfos  
 tribuit, folia verò Lenti similia: cui quo-  
 que eo in loco nullam tribuit amaritu-  
 dinem. Immò in describenda hac her-  
 ba Plinius à Dioscoride variat, cum Dio-  
 scorides folia Lentis, & ramulos Ser-  
 pylli per terram sparfos Aegyptiam  
 Inulam habere tradat. Ille verò non  
 Lentis folia, sed Serpylli potius possi-  
 dere dicit. Accedunt ad hæc, quòd cap.  
 x x i. eiusdem libri, vbi medicamenta  
 Helenij pertractat, dulcem esse asserit,  
 non amaram: vt liquidò constet Plin-  
 ium de illa tantum dulci Aegypcia  
 Inula memoriam fecisse, non verò de  
 hac à nobis amara tractata. Proinde  
 Matthiolus, si Plinij authoritatem in  
 hac parte subiciuisset, prudentius du-  
 bio procul fecisset, ac non ita duplici er-  
 rore hallucinaretur. Primum cum cred-  
 dat, Plinium de hac Inula prima men-  
 tionem fecisse, quum (vt diximus) po-  
 tius de secunda Aegypcia agat. Secun-  
 dò cum dicat Plinium illi amaritudi-  
 nem tribuere, cum re vera illi dulcedi-  
 nem condonet, & non amaritudinem,  
 vt cuique legenti notum erit.

*Calam-  
 nis rebus  
 datur.*

HAEC ITAQVE SUNT, quæ in

me spicula mittit Lusitanus. Sciat igitur  
 velim, culpam, qua me accusat, non  
 in me, sed in Typographum esse rei-  
 ciendam, quippe qui imprudenter meā  
 peruerterit sententiam obliis quibus-  
 dam lineis, in quibus Plinij verba ad-  
 notaueram, quæ de Helenio primi ge-  
 neris ab eo scribuntur (præter Lusita-  
 ni opinionem, quòd hunc Plinij locum  
 semidormiens pertransiuerit) libro  
 x v i i i. ca. v. & quibusdam aliis lineis  
 priorum loco acceptis ex decimo vige-  
 simi primi libri capite, quæ postea in  
 mediū adduxerā de altero Helenij ge-  
 nere, quod in Aegypto provenit. Facilis  
 enim ac lubricus fuit lapsus, quippe quū  
 propè essent duæ illæ Pliniana authori-  
 tates, Typographus, q̄ ē codice nostro  
 manuscripto hæc in suam transferebat  
 typum, oculi imprudentia deceptus  
 primum Plinij locum tanquam dor-  
 miens præterit, & secundum in eius lo-  
 cum reposuit, quod ad alterum specta-  
 uerat Helenium. Cuius erroris illud  
 semper omnibus fuerit argumentum  
 (ne fortasse quis putet me id totum  
 subdolè in Typographum reticere)  
 quòd non modò in commentariis no-  
 stris Latinis factis pluribus antea annis  
 in lucem editis, id erroris fuerit expur-  
 gatum, sed quòd ea quoque Plinij ver-  
 ba per Typographum eò translata lib.  
 x i x. cap. v. ibi ascriptis non legantur,  
 sed libro x x i. cap. x. vbi de Aegypcio  
 Helenio isegit. Quin & illud de inno-  
 centia nostra maximè testari poterit.  
 quòd illa per Typographum transpe-  
 sita authoritas, nil penitus ad rem ne-  
 stram faciat, neque concludat, vt pri-  
 ores Italicae editiones nostræ vnūquem-  
 que certiore reddent. Non enim pu-  
 tet velim Lusitanus quòd adeò sim ex-  
 cors, vt tam indecenter, tamque fatuè  
 Pliniana illa verba, quæ nihil pro sen-  
 tentia nostra concludunt, in prædicto-  
 rum sulcimentum attulerim. Quando  
 quidem si æquo animo is accuratius  
 perpenderit, quæ Plinius de Helenio  
 verba fecerit libro decimo nono, capite  
 quinto

quinto, à me eo loco citatis, nec ofcitat Plinium relegerit, me omni culpa vacare compulsus veritate fatebitur. Ipse enim Plinius ibi sic habet. Siferis <sup>33</sup> fatus mēsis Febuario, Martio Aprilis, <sup>33</sup> li, Augusto, Septembri, Octobri, breuior is est, sed torosior, amariorque. <sup>33</sup> Inulaper se stomacho inimicissima, eadem dulcibus mista saluberrima: pluribus modis austeritate iuncta gratiā inuenit, Haftenus ille. Hæc itaq; sunt à Typographo oblita, quæ ad probanda ea, quæ diximus, afferebamus ex quinto capite decimi noni libri. Cate- <sup>33</sup> rium, vt suam Lusitano detegam negligentiam, vel fortasse imprudentiam, dicat sanè cur tam aperta fronte negauerit, Pliniū lib. decimo nono, cap. v. Helenij siue Inulæ, de qua primò scribit Dioscorides, nihil penitus meminisse, cum tamen ea omnia, ac etiam per plura ibi habeatur, quæ hic his per paucis lineis in mediū attulimus. Quibus etiam videre poterit, qua ratione negauerit reperiri apud Plinium Inulam esse amaram. Hisce igitur de causis iam primū Lusitanus conficere poterit id, quod in me reprehendit, tantum quidem à veritate distare, vt potius sibi ipsi, quam mihi iniuriā inferre videatur. At insignè & arrogantem hominis temeritatem audiamus, qui quò magis præceps est in rebus maximè ambiguis, hoc manifestius suā prodit inscitiam. SED IAM sese offerunt recriminanda, quæ in vnguento Sampsuchino aduersum me scribit, tamen si iongè magis ipsum accusent: quòd ea, quæ nullis argumētis probari possunt, falsò probare contendat, & quæ pluribus sanè modis probata sunt, nullis in contrarium allatis rationibus, inani quadam arrogantia, improbare nitatur, sic iniquens. Etsi apud Theophrastum, vel Plinium, nonnullosq; alios celebres viros Sampsuchus eadè cum <sup>33</sup> Amaraco, siue Maiorana herba sit, <sup>33</sup> apud Dioscoridem tamè, & Galenum, <sup>33</sup> ac Paulam Aeginetam multum inter

se differunt, cum Sampsuchus Maiorana herba hodie in fistilibus & vasculis reposita ad fenestras pro delictis habitata sit. Amaracus verò Parthenium est, quæ an Matricaria officinarum sit, tertio dicemus libro. Hanc verò animaduertentes inter vtraque differentiam Galenus, & Paulus, diuersa capita tanquam de rebus diuersis fecerunt, videlicet de Sampsucho, & Amaraco, quam prius nocens Dioscorides vigilantissimus, oleum Sampsuchinum ab oleo Amaracino, tanquam rem diuersam distinxit. Nā Amaracus Galeni, & Pauli proculdubio apud Dioscoridem Parthenium est, vt tertio libro facile quis comprehendere poterit, cum ibi Parthenium Amaracum esse dicat. Qui verò Amaracum Galeni, & Pauli Marum Dioscoridis esse opinantur, miro modo cœcutiunt, nam etsi verum sit, quòd Galenus, & Paulus in libris de facultatibus medicamentorum simplicium de Maro nullam faciunt mentionem, non proindè Amaracū illorum Dioscoridis Marum ob nominis vicinitatē esse dicere debent: & eò magis quia Galenus in libris de Antidotis, & Amaraci, & Mari tanquā rerū diuersarum meminit. Quare Matthiolus Senensis, si hæc animaduertisset, nō sic facile cœspitasset, nec hæc sic cōfusa reliquisset. Haftenus ille. Sed cur hæc Amathe? Tu id mihi turpè ducis homo præceps, quòd in rebus dubiis meā suspenderim sententiā? an velis tu potius, vt præcipiti quādā arrogantia in istam tuam incurra veccordiam? nisi incredibili arderes libidine nostros oppugnādi labores, tu tā esses inter hos scopulos præceps adeò temerè de his decerneres? Nos sanè longè aliter sentimus. Etenim malo ceteris veritatis indaganda apertā relinquere viā, quā noua temeritate eos hinc auertere, præsertim cum non desint clarissimi viri, qui hac Galeni lectione plurimūm hæsitauerunt. Siquidē nō desunt rationes, quæ ostendunt Amaracum Galeno & Paulo tam

Lusitani  
imprudens  
ita.

Calennia  
vii, in  
vnguento

Calennia  
cōfusa.



Parthenium, quàm Marum posse designare. Quà ob rem nec hanc, nec illam opinionem probare, vel improbare libuit. At aliquid in re difficili & suspecta asserere liceat, quod neutiquam in tanta antiquitate nouū esse debet, magis in hoc inclinor, vt libriorum negligentia hunc Galeni locum corruptum putem, ac hoc errore Mari titulum in Amaracum esse translātū. In qua re tamen auctoriū certa desint testimonia, non tamē huius rei absunt indicia, quæ Amaracum Galeno, & Paulo Marum designare præ se ferant. Siquidem cū sit Galeni proprium institutū simplicium medicamentorum vires ex Dioscoride describere, idq; præsertim feruare in his, quæ viribus non vulgari-  
bus præstant, neutiquam crediderim, si Amaracum Galeno Parthenium designasset, quin scripsisset ex Dioscoride id Epithymi modo bilem atram, & pituitam detrahare, supiriosos & melancholicos iuuare, calculosos expedire, anhelosos liberam spirandi facultatem reddere, quin & eius decocto insidentibus foeminis vteri duritias emollire, & inflammationes arcere, illitu verò ignem sacrū extinguere, collectionesq; consumere. Quandoquidem tam raras, vtilēq; facultates haudquaquam putarem silentio inuoluissē Galenum, si de Parthenio eo capite egisset. Verū cū Maro nil aliud viriū tribuerit Dioscorides, quàm quod illitu serpentina vlcera sistat, & quod invnguentis addatur, mirum sanē non est, si de Maro tractaturus Galenus lib. v. 1. de simplicium medicamentorum facultatibus, vbi fortassē deprauata lectione de Amaraco legitur, de eius viribus sobriē admodum tractauerit, paucisque perstrinxerit, nec plura dixerit, quàm quod sua vi excalcaceret, & siccaret. Id quod etiam egit fortassē lubens, quod latius de eo scribere statuisset lib. 1. de antidotis in Hedichroi compositione. Hæc nobis dicta velim, nō affirmandæ tantū huiusce opinionis causæ, sed

tuz refellendæ temeritatis, ac impudentiæ. Quamobrem eos mihi impugnare non libuit, quorum tu opinioē sequeris. Nimirum quod in obscuris, incertisq; nusquam soleam in aliquem verba facere, nec quicquā agere, cuius nequiuim causam probabilem reddere, eoque; præsertim quod sciuim iis esse etiā rationes, quibus se tueri possint, nempē Serapionis testimonium, qui id tantū quod Galenus de Amaraco scripsit, Matricaria tribuit. Sed hæc etiā posset destrui autoritas. Hæc itaque si rectē, syncerēq; perpendissem, non modō te ipsum nouissem, sed & fortassē puduissem ita te iniuriā in me cōspirasse. Reliquum nunc est, vt iam tibi tua detegam errata, ne alios in posterum ducas in errores. Inquis tu Lusitanæ, apud Dioscoridem, Galenum & Paulum Sampsuchum, & Amaracum admodum inter se differre. Id, quod esse falsum, & a veritate alienum, illico probari potest ex ipso Dioscoride, quip pē qui lib. tertio de Sampsucho agens, scriptum reliquerit, Sampsuchum à Siculis, & Cyzicenis, apud quos laudatissimum prouenit, Amaracum vocari. Hoc idem facili videtur probare etiā Galenus. Ipse enim libro primo de antidotis, Amaraci plurimum in Cyzico nasci scribit, & Amaracinum vnguentum in Cyzico parari ait libro secundo cap. 1. de compositione medicamentorum secūdum locos. Id quod omnibus palām facit, nil aliud Galeno designare Amaracū, quàm Sampsuchum. Etenim cū Cyziceni Sampsuchi Amaracum appellent, quis nam fuerit ille tam amens, excors, obtusq; ingenij homo, qui non nouerit Amaracinum vnguentum in Cyzico paratum ē Sampsucho fieri? His subscribit etiam Plinius lib. x x 1. cap. x 1. Sic inquit. Amaracum Diocles medicus, & Scicula gens appellauere, quod Aegyptus, & Syria Sampsuchum. & capite x x 1. eiusdem libri, Sampsuchum (inquit) siue Amaracum in Cypro laudatissimum,

mun, & odoratissimum. Fit ex eo oleū, quod Sampsuchinū vocant, siue Amaracinum ad excalfaciendos, emolliendosq; neruos, & vulnus. Quibus palām est, quā imprudenter hęc asserat Lusitanus. Nec obstat quod in quibusdā Dioscoridis codicibus legatur Parthenium etiam aliquibus Amaracum vocari. Siquidem hoc non tueretur huius vniuersalem negationem. Adde quod illa verba Dioscoridi spuria à quā plurimis rei plantaria studiosis non ab re iudicantur. Nimirum extant Græci codices antiquissimi manu scripti, in quibus nō legitur in Parthenii capite particula illa *αὐτὸ ἐστὶν ἀμαράκινον*, quēadmodum nec apud Serapionē, qui Parthenium ex Dioscoride transcribit. His accedit aliud stolidum Lusitani erratū, quod facile quis intueri poterit, quum asserat is Amaracinum vnguentum odore iucundissimo redolens parasse antiquos non ē Sampsucho, quod Cyzienis, qui illud olim præstantissimum parabant, Amaracum dicitur, sed ex Parthenio, quod etiam falsō eam esse plantam existimat, quam ob odoris virus Seplasiæ meritō Cotulam foetidam vocant. Sed quantū in Amaracino vnguēto, quod odoris fragrantia plurimū præstasse scribit antiquitas, hęc foetens planta conueniat, ij certō iudicare poterunt, quibus longē magis: quā illi res medica cordi fuerit. Et quidē fatetur Galenus libro primo de antidotis, ac aliis etiam locis in Cyzico, quēadmodum in vniuersa minori Asia, Mari & Amaraci oriri plurimum, parū verō in aliis regionibus præsertimque in Italia. Id quod Lusitanum hic maxinē hallucinatum palām facit. Quandoquidē nullo magis herbarū genere vbique abundat Italia, quā Cotula foetida dicta. Ea enim vbique scatent campi, horti, aræ, plateæ, semitæ, ac colles, adeo vt nullus in Italia sit locus, vbi hęc herba non proveniat. Adde quod cūm dicat Galenus in Cyzico Amaraci nasci plurimum, vbi Amaracinū vnguentū

omniū odoratissimū parabatur, & nobis iā cōprobatū sit Sampsuchū à Cyzienis Amarici nomine appellari, satis cōprobatū esse putamus, Lusitanū medicæ materiæ ignarū, & tam Dioscoridi, quā Galeno idē esse Sāpsuchū, quod Amaracū. Demū an Dioscoridis Partheniū Cotula foetida sit ita vulgō vocata (vt Lusitanus certō sibi persuadet) is postea audiet. DE IASMENO VNGVENTO multū quoque mecū contēdit & exiis floribus parari Iasmenū, quos Itali vulgō appellant Gelsimini, cūm tamen id nullis rationibus cōprobet, sed tātū suis nitatur verbis, non est cur multis cū illo agā. Sat enim mihi esse existimo, cūm scribat Dioscorides parari Iasmenū (id est Violaceum vnguentū) ē floribus albæ Violæ, nullo pacto fieri posse, vt ex aliis paretur floribus, & ex iis præsertim, quorum apud Dioscoridē, & antiquos nulla prorsus habetur historia. Quin & superuacaneā hic omnē verborum sitatem esse censeo, eod quod in cōmentariis nostris satis, superq; comprobatur mihi, eos proculdubio decipi, quos Lusitanus sibi imitandos proposuit. Præterea cūm is rationibus argumentisq; nostris nullis prorsus obstat verbis, nec vlla dicendi facultate ( si philosophum medicūq; vt au dio se putat ) non vereor, quin faciliē scire possit, me ad suas non teneri obiectiones, nisi primū ad nostra responderet argumenta. Quibus nulla alia de causa illum nihil in contrarium adduxisse putamus, quā quod is longē magis defendendæ pertinaciæ, quā veritati fuerit addictus.

IN PINO autem vt Theophrastum defendere videatur, sic mecū agit Lusitanus. Longum profectō, nec minus difficile esset omnes Pini species percurrere. Illius tamē Theophrastus auctore libro tertio de historia plātarū. cap. x.) duæ sunt species, altera urbana, altera verō syluestris. Syluestris verō in Ideā, & Maritimā partitur. Nam idea, id est mōtana rector, celsior, materiæq;

Calissia  
xij de Ias-  
meno vng-  
uento.

Depulso.

Calumnia  
ix de pino.

11 crassior est, sed maritima folio ornatur  
 12 tenuiori, imbecilliori, & cortice læ-  
 13 uiori ad coria vtili, in qua nux conspi-  
 14 citur rotunda, breuiq; dehiscens. In  
 15 Idea verò tanquam nux sylvestrior,  
 16 oblongior est, viridis, minusq; hiscens.  
 17 Hæc ad Theophrasti mentem, quæ vera  
 esse nullus hucusquæ in dubium tra-  
 xit, præter vnum Matthiolum Senen-  
 sem, qui omnino hæc suo tantum iudi-  
 cio fultus euertere conatur, dicens, se  
 in sylvestri maritima Pino obseruasse  
 nuces non quidem rotundas, sed ob-  
 longas, potius solidas, difficulter dehi-  
 scentes, in montana verò non oblon-  
 gas, sed breues, & ad aperendum faci-  
 les. At nos reuera Theophrastum ve-  
 rum vniuersaliter dixisse obseruani-  
 mus, ac Matthiolum aut non rectè ap-  
 prehendisse, aut potius vt noui aliquid  
 aliis dixisse videretur, in medium hæc  
 afferre voluisse. HÆC ILLIUS  
 SVNT VERBA. Cæterum an vera, vel  
 falsa, sincere, vel subdole prolata, can-  
 didissimus quisque lector, qui nostros  
 legerit commentarios facile conicere  
 poterit. Explodenda enim detestandaq;  
 sunt Lusitani signenta, quæ hic aduer-  
 sum me habet. Siquidem ego recitara  
 Theophrasti historia, nec enim hallucina-  
 tum, nec delusum asserui, sed id  
 tantum Theophrasto repugnare dixi,  
 quod vtriusq; Pinastris strobilus in no-  
 stro climate testatur. Quod autè vera,  
 non ficta, nec fabulosa scripserim (vt  
 ex se ipso fortasse me indicat Lusita-  
 nus) is proculdubio fateri poterit, qui  
 in agro Tridentino Ideam, in Senensi,  
 ac Pisano maritimam obseruauerit Pi-  
 nastrum. Quippè in maritimis hisce lo-  
 cis duo habentur Pinastris genera, quo-  
 rum alterum strobilos profert spirita-  
 ma longiores, alterum verò breuiores  
 paulò, compactili duritie conclusos,  
 nec per se facile dehiscentes. In Tride-  
 tinis verò montibus quemadmodum,  
 & in Bohemia, quæ Pinu vbicunque  
 effluecit, Pinastris nuces in vniuersum  
 suntur lōgè maritimis breuiiores, in-

firmioresq; quæ cum primùm inaue-  
 rint, illicò dehiscunt, & ab arbore de-  
 cidunt. At si quis ad vinas, virentesq; hu-  
 iusce Pinorum plantas se conferre ne-  
 quiuert, nouas Pinorū imagines pos-  
 tremæ commentariorū nostrorū edi-  
 tionis apicetas intueri poterit. Quod si  
 sincero animi affectu fecerit, non vere-  
 mur, quin facile cōiciat, nostrā in plan-  
 tarū historia fidem falsò à Lusitano im-  
 probatā: & subindè etiā noscet magnā  
 illius imperitiam, & apertam in nos in-  
 uidentiam. Ego quidem nunquam pu-  
 tauī hæc in Theophrastum reicere, sed  
 nostro climati causam assignauī. Quā-  
 obrem non possum nō admirari Lu-  
 sitanū, quippè qui non sit veritus tam  
 euidentes in me asserre calūnias, Equi-  
 dem nunquā negauerim Pinastris,  
 quæ in Ida monte proueniūt, quin &  
 eas, quæ in Græciæ maritimis crescunt,  
 in nucibus edendis cōtrario modo for-  
 sitan se habere, cæli, soli; illius immu-  
 tata natura.

VENIO AD Hippocampū, cuius *Calūnia  
xin Hip-  
pocampo.*  
 historia à nemine descriptam hactenus  
 reperi. Quo fit, vt difficile admodum sit  
 absq; vlla dubitatione affirmare, quod  
 nobis sit pisciū genus, quod Hippocam-  
 dum appellauerit antiquitas. Nec dis-  
 pliceret Lusitani opinio, quā lōgè ætea  
 audierā à Luca Ghino medico clarissi-  
 mo, quod Græcis rectè idē sonet Hip-  
 pocāpus, quod latinis fluxuosus equus,  
 si quo probari possit, esset ad manus.  
 Verūtamē cum nulla extet Hippocā-  
 historia, cur eius opinionē accipiam, fa-  
 non habeo: quin nec etiā cur refellam.  
 Plinius lib. xxxv. l. cap. v. dum Pra-  
 xitelis admiradā percurrit marmora,  
 videri scribit in maxima dignatione  
 Gn. Domitij delubro in circo Flammi-  
 nio Neptunum. Thetim, atque Achil-  
 lem, Nereidasq; supra delphinos, & hip-  
 pocampus. Quæ quāquā demonstrat  
 Hippocampus equorum effigiem  
 præ se ferre, non tamen hac Plinij  
 autoritate quis vnquā rectè affirmare  
 poterit, Hippocampus, quorum ille  
 meminit,

Lusitani  
 signenta  
 explodun-  
 tur.

Lusitani  
 opinio nec  
 refellitur,  
 nec pro-  
 batur.

meminit, eos esse pisciculos Equi vel Dracunculi formâ habentes, quos quidam veros esse Hippocampus nō ambigunt. Quandoquidem Plinij verba luce clarius demonstrant Hippocampus paruos nō esse pisces, sed ingentes fortasse beluas, corporis mole Delphinis minimè inferiores. Nisi hæc potius fabulosa censeamus, quàm vera. Nos autē cū iamdiu nō ignorauerimus non deesse rei medicæ studio, qui Equiculos illos, vel marinos Dracunculos veros esse Hippocampus putarēt, non abs re esse duximus horū Equiculorū imagines commentariis nostris adiungere, non ea tantum causa, vt horum placitis subscribere, sed vt vnū quēque, præsertimq; Zoilos admonerem, me hæc prius non ignorasse. Verū non ob id absurda vocari expedit (vt Lusitanus putat) quæ de Hippocampo antea scripsimus, doctissimos Dioscoridis interpretes, & Græci sermonis peritissimos secuti, quorū nō desunt, qui asserant in Locustarum genere haberi Hippocampū. Quibus subscribere videtur Plin. lib. xxxi. l. cap. xi. At cum inter Locustas nulla spectetur, quæ magis flexuoso dorso erucas, quas Græci *καλαρα* vocant referat, quæ ea, quæ ibi pariter picta spectari potest, nefas sanè fuerit tam petulantia ore affirmare, nostrā, & aliorū opinionem, tanquā absurdā esse spernendā, cū tamē rationibus, & autoritatibus comprobata vnusquisque facillè cernat. **M V L T A**

**E T I A M C O N T R A** Nos de satiuo Cucumere effandit Lusitanus procacius magis, quàm verè, sic inquit. Cucumer nō vbiq; satius reperitur, quæ de causa inulti non sine ingenti errore Citrulū, quem Peponē esse certò scimus Cucumerē appellant, vulgariū forsitan voce seducti, qui in Italia ferè vniuersa & Flandria, ac Germania Citrulū Cucumerē vocant, sed, vt dixi, nō sine magno, nec dicam pudendo errore, inter quos nouissimus extat Matthiolus Senensis in suo Dioscoride Hetrusca lin-

gua cōfecto. Est igitur Græcorū Cucumer, siue Cucumis dictus sic (vt Varro ni placet) quia facillè curuatur baculi crassitudine, colore viridi, longitudine cubitali, & maiori, præsertim si in flore existens in fistulā mittatur. Tunc enim (vt tradit Plin. lib. x. l. cap. v.) mira longitudine, & ad fistulæ cōplementū crescit, & hac de causa Columella Anguinū Cucumerē etiam appellat, quia oblongus, crassus, atq; instar anguis flexuosus sit. Nascitur enim in simili plāta, quæ Cucumis syluestris oritur. Raro in Lusitania Cucumer videtur, secus autē in altera parte Hispaniæ præcipuè apud Salmaticenses, vbi in magna cernitur copia hirsutus, colore omninò viridi, lōgitudine cubitali, & curua. At Pepo is est, quē Officinæ ob colorē Citri in maturitate acquisitū, Citrulū appellant. Græci verò illū *πεπων* id est maturū Graia voce dixere. Quam vocem Hispani vel hodiè seruantes nulla mutata litera, aut syllaba illum quoq; Papanū vocant: & eius supremā partē concisam fronti æstus hora, in quā illū plerunq; comedimus, tanquā refrigerantē admoenimus. Quod olim quoq; à Græcis fieri Dioscorides innuere videtur. Vescimur enim Pepone hispani, dum viret, nā postquā maturuit, & colorē luteū Citri maturi contraxit, tanquā cibo inutilē reiciimus. Si quid tamen illius comedendū sit, eius suprema, & cartilaginea pars tantum pro victu, reiecta eius medullari parte, accipienda est, vt apud inferiores Germanos plerunq; fit, qui Peponibus iis non nisi maturis cōtra Hispanorū cōsuetudinē in victu vtuntur: quorū medullarem, & interiorē partem in quā semen continetur, tanquā improbā & malam reiciunt, suprema & cartilaginea illa, crebris verrucis ornata parte cōtenti. Quimos apud Græcos quoque fuit, vt ex Galeno deprehenditur libro i. de Alimentorū facultatibus, vbi inquit. Huc accedit quòd in Peponibus homines à carne intima, in quo semē ha-

betur, abstinēt. Sed hæc ignorans Matthioli, nil in hoc capite facit, quā vellicare alios. Sed audias Amathe. Solus ne inter tot eruditissimos viros, quibus eadem placuit opinio, à te reprehendor? Solum inter innumeros alios Matthioliū infectari. Quapropter non alia opinor causa, nisi vt tuam malitiosam inuidentiā in eius tantū nvidearis monumenta effudisse, ex quibus tu opima spolia congesisti. Egregiā certē hominis in furando prudentiam, vt tacitē iis secum gaudeat, quæ publicē criminari putetur. Idcirco, homo vaserime, tot hæc contra me construunt hic verba? Sed audiat ipse Lusitanus quā hic toto aberrauerit cælo. Etenim sententiæ nostræ haudquaquā obstare, sed plurimū astipularicensesmus, quod dixerit Varro Cucumim à curuore esse dictum. Quippè quod Cucumeres, qui passim in Italia proueniunt, & quos falsò Lusitanus Pepones esse cōtendit, plerumq; incurui spectantur, vt à state tota videre quis potest in clarissimā vrbiū plateis, vbi innumeri venduntur. Porro si hæc ignorat Lusitanus, nō medicos consulat, sed olitores. Nam ij ostensis incuruorum cucuminiū millenariis, facilē crassam hanc caliginem ab ipsius oculis detergent. Præterea vulgarem Cucumim, quo passim vituntur, verum & genuinum esse manifestò comprobat Plinius libro x i x. cap. v. his verbis. Particulatim Cucumis floret, sibi ipsi superflouescens, candida lanugine obductus, magisque cūm crescit. Hæc ille, quibus palām est Cucumeres nostri vsus legitimos esse. Quippè si Lusitanus (vt prædiximus) olitores adibat, & ad eorū hortos sapē se contulerit, vniuersos videbit cucumeres, illos scilicet, qui nuper emerferunt, & iam primū ad inglandium quantitatem intumuerunt, sibi ipsis in cacumine superflouescere, & alba quadam contegi lanugine. Ad hæc sententiam nostram, ac quam plurimorū clarissimorum scriptorū à Lusitano falsò

improbata illud sanè luce clarius ostēdit, quod si fariūus, ac vulgaris Cucumis fructu tantū aberraticō differat. Vtriq; enim eadē sunt folia, idem flores, eadē viticulæ, & eadē in vniuersum deniquē facies, vt libro i i i i. testatur Dioscorides, & lib. v i i. cap. v i. de historia plantarum posteritatis memoriæ prodidit Theophrastus. Tāta enim inter hæc plantas intercedit similitudo cognatioque, vt si simul serātur, vel alter alteri conferatur, nulla serē differentia dignoscantur. Nec propterea negauerim, quod cucumis ille, qui sua longitudine serpentis speciē refert, & quem Herurria falsò Melonem vocat, inter Cucuminiū genera non fuerit recipiendus, cū & ipse olitorū mangonio, è vulgaribus nostris in eam formam fuerit redactus: id quod Hippocrati primū, dein Plinio, & Palladio referunt acceptum, quippè qui scripserint flore in fistula, vel harundine demisso, Cucumim indē mira longitudine crescere, & omni alia, qua coguntur, forma: id quod etiā de Cucurbitis tradidit Columella. Hinc itaq; suā traxit originem illud Cucuminiū genus, quod ita prælongū se diffundit, & anguiū modo cōtorquetur. Quippè sato subindē semine, quod exemptū sit ex hisce prælōgis mangonio illo paratis, in posterū per sese eadē forma proueniunt, vt & nos experimento comprobatum scimus, non solum in Cucumeribus, sed etiam in Cucurbitis, præsertimque in iis, quas Indicas vocant. Id quod etiā Plinius affirmat loco prius citato. Nam cū maximē compertū haberet in Campania oriri Cucumeres mali Cotonei effigie (ij autē vt Lusitanus fert opinio prælongi non erant) & huiusce formæ causam reddere vellet, Fortē (inquit) primò natum ita audio vnum, mox semine ex illo genus factum. His itaque palām sit (vt Lusitanus illius verbis utar) in quā magno, ac pudendo is versetur errore. Quippè si (vt idē falsò contendit Lusitanus) vniuersum

*Amathus  
sua enar  
ratione  
in Dio.  
ex Mat  
thioli trā  
scripsit.*

*Columella  
restituit.*

*Cucurbi  
ta. & cu  
cumeres  
sunt  
litorum  
mā.  
genio  
Cuc  
urbit  
indū  
mā.  
mā.*

uersum Cucuminum genus sponte sua ita prælongum proueniret, stolidum sanè esset id arte vel maugonio moliri. Sed Cucumeres sui natura nõ esse adeò in longitudinem protensos manifestò demonstrat Plinius, quippè qui scribat Cucumeres in Italia, esse quàm minimos, in prouinciis quàm maximos. Nã si sponte sua ea essent forma (vt Lusitanus somniasse videtur) scripsisset quidem nasci Cucumeres in Italia quàm breuissimos in prouinciis quàm longissimos. Adde quod etiam experimento cõstat (vt ego mihi testis, esse possum) quòd Cucumeres sic Italici vocati in suppositam aquam descendere nitantur appensi, & contrà refugiant, & vni modo recuruentur, vbi vas oleo plenum supponatur apertum. Id quod proprium esse Cucumeris affirmant præclarissimi rei rusticæ, platiaricæque scriptores. Præter id si gustum cõsulas nulla penitus saporis, vel odoris differentia inter prælògos Cucumeres illos, & vulgares nostros cognosci potest. Ad hæc cum tria Theophrasto, & Plinio sint Cucumerum genera Laconicum, Scytalum, Beoricumque, hoc maxime etiam Lusitano aduersatur, quòd vnũ tantum Cucumerum genus statuerit. Ad id autè, quod Columellæ testimonio asserit Lusitanus satium Cucumim Anguinũ vocari, quòd forma anguium referat speciem, nil aliud nobis respondendũ sese offert, præterquàm quod falsò id Columellæ acceptum referat. Constat enim Anguinum Cucumim nil aliud fuisse Latinis, quàm Cucumim syluestrem, quemadmodum syluestre Allium Dioscoridi Anguinum vocatur, non quod forma referat angues sed quod in syluestribus nascatur locis, vbi facilè stabulantur angues. Cæterum quod Anguinus Cucumis syluestris sit, non fatius, testatur in primis Lucius Apuleius suo de simplicium medicamentorum libro, capite proprio de syluestri Cucumere, quin & quidam Dioscoridis codices,

vt Hermolaus & Marcellus legunt, quibus etiam subscribit Plinus libro xx. cap. 11. Sed cur hoc nitrantorum virorum testimonium comprobare, cum Lusitanus ipse capite de Agresti Cucumere sui ipsius oblitus id aperit fateatur, & suo se iugulauerit gladio? Sed quod falso Columellæ testimonio fuericis vsus, præter id quod nusquam ab ipso hoc scriptum esse scimus, testem habeo Hermolaum virum sanè præclarissimum, qui in suo Corolario Lusitanum mendacio redarguit his verbis. Cucumeres in fistula apud Hippocratem demisso flore mira lōgitudine quasi anguina specie proueniunt, quanquā Anguinus cucumis idem videtur esse, qui Syluestris multo infra magnitudinē fatiui, Erraticus & Angucus Columellæ appellatus à satino penitus differens. Hactenus Aermolaus. At si ita, demus huic bono viro à sua forma longiores illos cucumeres ab aliquibus Anguinus vocari. At nõ intelligit quàm non choerentia, quàm in se ipsam repugnantiã dicat? nõ quid nõ videt homo miser, quòd non aliam ob causam hæc differentia plantis addi solent, quàm quòd à reliquis eandem generis distinguantur? Non ne statim ob hoc sequitur esse etiam alia cucumerum genera? Respiat miser, & sua iam recognoscat errata. Respiat, inquam, cum signis omni luce clarioribus vineatur à testibus, & propria confessione vrgeatur. Comprobat etiam cucumrem nostratem non esse Peponem, cum in primis sapor, tum deinde facultas. Sapor quidem, quòd cum scribat Symeon Serhi Græcus author Pepones sapore esse dulces, nulla sanè ratione fieri potest, vt Cucumeres nostri vsus fuerint pepones, quippè qui eò magis amarescant, quòd maturiores euadūt, vt Theophrastus scribit lib. vi. cap. xiiii. de Plantarũ causis. Præterea si Peponũ facultas expèdatur, constabit sanè ex Galeni sententiã, quòd deuorati biliosos excitant morbos, quin & vomito

*Lusitanus sui ip-  
sus la-  
queo ca-  
puit.  
Lusitanus  
mendax.*

*Cucum-  
inum tria  
genera.*

*anguinis  
Cucumini  
quæ.*

missiones, & id quidem (vt Symeon ille asserit) sua dulcedine efficiunt, præsertim cum in biliosum inciderint ventriculum. Ad hæc confricata Peponum caro (vt Galenus ait) vitia cutis in facie, nempe alphas, lentiginis, ephelidasque abstergit dulci, quo imbuitur, succo. Id quod ex nostratis cucumeris affrictu nunquam consequeris. Nec obstat quod Hispani cucumerem nostrum (vt Lusitanus inquit) Pepanum vocet. Quippe cum Italia à Latinis originem ducant, omnino credendum videtur Latinas rerum nomenclaturas rectius asseruisse eos, quam cæteras nationes.

*Lusitani  
figmentum  
explosum.*

Demum fabulosum esse scimus, & Lusitani figmentum, quod Flandri vulgares Cucumeres edant, cum penitus consenserint. Sunt enim domi nostræ Flandri, qui nobis seruiunt, & qui Flandriam, & Germaniam ferè totam peragrarunt, id penitus detestantes. Nec obstat scripsisse Galenum à Peponum carne intima, quæ semen cõtinet, abstinere homines, quum id fiat potius in Peponibus nostris, quam in Cucumeribus, quorum seminibus vnâ cum carne vescimur. His itaque poterit Lusitanus fortasse noscere, quàm in censenda Cucumeris historia fuerit hallucinatus, & subindè palinodiam meditari. Nam si secus fecerit, quum scribat Plinius Cucumeres in Italia quàm minimos, in provinciis vero quàm maximos prouenire, cumque Lusitanorum regio, qua se oriundum facit, ad vltimas Europæ oras habeatur, & ob id cæteris fortasse magis ab Italia distet, verendum sanè est, ne rei medicæ studiosi, qui hæc perlegēt Cucumerem Lusitano maiorem nusquam se vidisse affirmant. Sed nimis fortasse prolixè Cucumeris causam egi. Equidem hæc nimia esse fateor in re minimè obscura. Veruntamen vt huius calumniæ & maledicta aliquando cessent, omnis eius est obrudenda verbosa importunitas, ne si sortè breuior sim, iure sibi cedi putet, minisque sibi a nobis sa-

tisfactum clamiter, & qua est inani arrogancia, non silentio, vel dissimulatione vanè se victorem gloriatur.

*Calumniæ  
xij de Car  
pesio.*

Iam DE CARPESIO pauca ei respondendo, de quo agens Lusitanus capite de Pipere, postquàm ibi de Caryophyllis agit, nostrum ibi ordinè, & doctrinâ quemadmodum in cæteris sequutus, ita aduersus non scribens cõminicitur. Caryophyllis Carpesiũ proximũ est, quod Cubeba Officinis dicitur, vt libro primo meminimus, & Actuarius confirmat. Non enim Carpesium Zedoaria, siue Zurumbet Arabũ est, vt Matthiolum augurat, quum potius, vt dicimus, Carpesium Cubeba sit. Hæc falsò Lusitanus. FALSO, inquã, quòd nobis nusquam scriptũ sit Zedoariam, siue Zurumbet esse Carpesiũ. Quis ergò non miretur hominis impudentiã, infidelitatẽ, mendacemq; locutionẽ? Quis non detestetur huiuscemodi hominũ genus, qui tam euidentibus calumniis, ac imposturis cãdidissimos quosque lacerat? Huic adhibenda fides? huic credendum? huic assentiendum? Nequaquã. In confesso enim est omnibus hominis huiusce scripta sui ipsius esse figmenta, mendacia, vanitates, adeò vt iam omnibus stomachum cõmouerint. Sed quantum hallucinetur miser, dum sibi persuadet Zedoariam, & Zurumbetum Mauritanis nihil inter se differre, postea audiet, cum innumeros illius errores promulgauerit.

*Lusitanus  
impudentis  
mendacis  
mentis.*

SEQUITUR, VT qui de Artemisia dicas, videamus. Artemisia duplex est, altera latifolia hortensis, hodore acuto, sapore verò amaro, altera verò Matricaria dicta tenuifolia à Græcis Leptophyllus appellata. Nec enim in eam imus sententiam, quod Matricaria hæc Parthenium sit, vt Matthiolum contra omnes grauissimos medicos contendit, quum re vera tenuifolia Artemisia vulgaris Matricaria est. Nam Parthenium, Brusaculũ, Herba fætida Chamomillæ similis est vt suo dicemus loco. Hæc illius

ad vn

ad vnguem sunt verba. Inania tamen, nihilque ponderis referentia. Quum enim Lusitanus argumētis, rationibus, & authorum testimoniis, quibus satis, superque nobis comprobatum est, Matricariam vulgō vocatam, alteram non

*Amathū in se ipsū latrare.*

esse Artemisiam, nihil responderit, nec subinde vllis indicis, ac rationibus contra sententiam nostram scripserit, sed sua tantum falsa opinione ductus, non est sanē cur cum illo pluribus agam: sed illum in se ipsum latrātem relinquam. Verum vt huiusce hominis imperitiam pluribus detegam, & procacitatē compescam, libebit sanē nobis nonnulla in contrarium afferre. Scribit itaque Lusitanus Artemisiam duorum esse generum, alteram latifoliam, hortensemq; , alteram Matricariam tenuifoliam dictam, quibus illicō deprehēditur, quā obsecratē Dioscoridem legerit. Qui etsi scripserit alterum Artemisiæ genus folio esse tenui, non tamen ob id eam propriē appellauit *λεπτοφύλλου*, quum ea propriē *λεπτοφύλλου* dicatur, quam quidam Dioscoridi adulterinā putant, cuius capitis titulus sic habet. *πρὸς Ἀρτεμίσιας λεπτοφύλλου*. Ad hæc non reperi-

*Matricariam nullā esse Artemisiā speciem aperte probatur.*

usquam scripsisse Dioscoridem, quin nec etiam Plinium, primi generis Artemisiā hortensem esse plantam, sed quod in maritimis spontē, & per se proueniat, vt ille, vt sibi aliquid arroget, fatetur. Adhæc duo sunt argumēta, quibus refragari nemo potest, quæ maximē obstant Matricariam nō esse secundi generis Artemisiā. Alterum quod hæc flore sit paruo, tenui, in vniuersum cādidō: id quod sanē in Matricaria non vñsitur, quum flos illi insit Artemisiæ maioris decuplo maior, firmus, non tenuis, non in vniuersum candidus, sed vmbilicotenus aureus, candidus foliolis circumseptus, vt in Anthemide. Alterum, quod planta sit ad manus pumila, ac tenuior, quæ adeo maiorem Artemisiā æmulatur, adeoque illi congener est, (vt fatetur etiam Brasavolus) vt ambigendum non sit, quin

ipsa sit altera Artemisia. Adde quod cum Matricaria foliis, caule, floribus, sapore, odorēque plurimum à prima Artemisia differat, non est sanē censendum, quin eius differentias, ac notas silentio inuoluisset Dioscorides, sed cum inter primum, & alterum Artemisiæ genus nulla intercedat differentia, præterquā magnitudinis, crassitudinisque, vt ipse aperitissimē fateatur Dioscorides, non fuit illi opus, alterius Artemisiæ notas pluribus explicare. Demum & illud vnicuique contra Lusitanī sententiam verum potest esse argumentū, quod antiquorum nullus scriptum reliquerit, Artemisiā alteram nec etiam primam esse amaram, quem admodum reperitur vulgaris Matricaria, quæ amaro admodum gustu sentitur, adeo vt parum ab Absinthio differat. Quod etiam argumentum præbet, in caliditate, & siccitate hanc longē magis excedere, quā ipsa Galeni testimonio excedat Artemisia. Hæc itaque si quis rectē perpenderit, nobis quidem minimē verendum fuerit, quin Lusitanī inscitiam, & iudiciij vanitatem facili deprehenderit. Quod autem Matricaria nō sit Parthenium, & quod ea planta Parthenium sit, quam vulgari appellatione Cotulam foetida dicunt, nos penitus detestamur, quippe si Cotula foetida Dioscoridi Partheniū esset, quū hæc omni ex parte Anthemidem adeo referat, vt tantū ferē odoris diuersitate altera ab artera dignoscatur, quis nā dubitauerint, quin Dioscorides Parthenio Anthemidis folia reddidisset, non Coriandrī? Coriandrī folia Cotula foetida profectō nō habet, sed Anthemidis, Matricaria verō contrā. At si forte obiecerit Lusitanus cum ad summum vsq; Coriandrum adoleuerit, & suum iam ediderit semen, quæ in summitatibus sunt folia adeo parua tenuiaq; spectari, vt Anthemidis folia quadantenus referant, quūque dicat Dioscorides, Parthenium foliis esse Coriandrī tenuibus, is ad minora tantum folia respexit, non

*Cotula foetida nō est Parthenium.*



ad maiora. Vide quàm hoc ego argumentum propulsabo facile. Siquidem cum neque Oribasius ex Dioscoride, à quo verbum ex verbo transcribit, neque Serapio, qui eandem seruat regulam, legat particulam illam *λερσε*, arbitrandum sanè est, particulam *λερσε* Dioscoridi impertinenter accessisse scriptorum incuria, vel potius temeritate, præsertim cum plantarum comparationes rectius, exactiusque fieri debeant, cum plantæ ipsæ adolefcunt, vel consiluit, quoniam hoc tempore foliorum, ac caulium notæ apertissimè conspici possunt, non autem cum primùm oriuntur, vel cum conseruerint, quo tempore genuina foliorum forma videri non potest. Quin & illud contra Lusitanum maximè pugnat, quòd cum Cotula foetida longè acrior sit, quàm amara, adeò vt ea sedem abstergentibus ardorem non obscurum inferat, ob idque vulgò Ferrariensibus (vt Brasauolus inquit) dicatur Brusciaculo: Parthenium esse non potest. Quandoquidem Dioscoridi Parthenium nulla saporis acredine commendatur, sed tantum amaritudine, quæ in Matricaria manifestò percipitur sine acredinis tantillo. Postremò cum sexcenties iam expertum sit Matricariam ea omnia præstare, quæ Parthenium describuntur, palàm sanè est maximè deludi eos, qui contra sententiam nostram frivolis quibusdā argumētis, ac captiuiculis machinantur. Sed utinā tam facile vera inueniri possent, quàm falsa cōiun-

*Calenia*  
*de*  
*Symphytum*  
*Petræ.*

CAETERVM quum antea scripsissem in meis cōmentariis italico sermone primùm in lucē editis Symphytum Petræum à me hæcenus non visum, quasi me negligentiæ inertiaque; accusare velit Lusitanus, hæc suo more aduersum me scribit. Ex verbis, quas Ioannes Falconerius Anglus fecit asserbat, Symphytum Petræum erat, quod Consolidā non nulli appellant, quæ (vt testatur Ruellius) familiaris Gallis admodum est, & eam sua lingua Buglam vocat. In Italia quoque nasci eum paulo Castilione me-

dico affirmamus, quanquàm Matthiolum eam nunquam se vidisse tradat.

HIS LVSITANVS Non tantum in me inuehitur, vt putaram, nostræ accusandæ gratia negligentia, sed etiam suæ extollendæ gloriæ, quippe qui se nobis rei medicæ peritiore ostendere ambiret. Verum si (vt solertis decet scriptores) Italica eadem cōmentaria secundò edita anno à CHRISTO Nato. M.D.L. perlegisset, comperisset quidè Symphytum Petræum me memet adinuenisse. Id quod is nunquam per se, vel per alios fortassè fecisset, ni Falconerius ille (si tamè vera refert) id illi ostendisset. Non enim vna die vniuersa seges in horreum congregari potest. Quo fit, vt accusari iure non possim, vbi quandoque passus fuero, me hanc vel illam non nouisse stirpem. Præstabat quidem tunc mihi Symphytum Petræum nunquam me vidisse fateri, quàm mentiri, vt doctior, diligentiorque viderer, quo nihil detestabilius, execrabiliusque dici potest.

AD SPARGANIUM veniamus, in quo ita me taxat. Sparganium siue Xiphidion Officinatum Spatula foetida est, cum inter se maximè conueniant. Vnde Matthiolum Senesem hic errare certum est, qui Sparganiū non esse Spatulam foetidam contendit, & eò magis, quia in Spatula foetida pilulas non comperi, in quibus semen claudatur, dicat: quod falsissimum esse, qui Spatulæ foetidæ medicæ habent notitiam, nō runt. Mediocrè Sparganium Spatulam foetidam esse certum est. Hactenus ille. Demiror sanè tam perfrictam hominis frontem, qui quasi omnium rerū naturam, plantarum omnium intimam notitiam perdidicerit, ac imbibere, adeò audacter hos graues mihi imponit errores, cōfestim me errare accusat. Cogno scitis, vt opinor, hominis eruditione, & vitæ consuetudinem. Porro non modò omnibus rei herbariæ studiosis (num tantum Ruelliiu excipio) sed & cæteris omnibus, quibus aliqua sit stirpium cognitio in confesso est, nil aliud esse Spatulam foetidam

*Consuetudo*  
*110.*

*Calenia*  
*xv. De*  
*Spargani-*  
*is.*

*Calenia*  
*conueniens*  
*est.*

*Spatula*  
*scitida est*  
*Xyris, no*  
*Spargan-*  
*nium.*

scetidam vulgò appellatam, quam Xyridem. Xyris enim præter id, quòd omnibus notis, Spatulam scetidā referat, foliorum odore faciliè indicat nomenclationis occasionem, quippè quoniam si digitis confricentur, scetidum admodum odorem fundunt, vnde illi nomē, adeò vt Tiresia, vel Talpa caciore sit, qui non viderit, Spatulam scetidam vocatam omnibus sanè notis Xyridem referre. Hanc à nemine descriptam reperio, præterquam à Matthæo Syluatico Pandectarum auctore, qui eam Iridi similem reddidit. Id quod Lusitani cornulantiam palam facit. Siquidem nulla extat planta, quæ magis Iridem referat, quam Xyris, adeò vt scripserit Oribasius appellari aliquibus Sylvestrem Iridem, à quo quantum distet Sparganium, eos iudices velim, qui in materia medica indaganda plus operis, ac laboris, quam Lusitanus impenderit. Ne c

*Calum-*  
*nia xvij*  
*De Seden*  
*te.*

FLVRIBVS verbis ea refellam, quæ de Siderite obiiici, in quam magis, ac magis tuam detegis rei plâtarie inscitiam, cum ita memoras. Conspicitur Sideritis hæc in nonnullis vallibus folio aspero Saluæ magnitudine tanquam Marubij albicante, & per circuitum tanquam Quercus detato, quod fricatum ex se odorem, qualem ex Cydoniis optime maturis oriri videmus, emittit, què Dioscorides subintelligit, cum dicit gustu non iniucundo, cum adstrictione aliqua. Hanc verò Fuchsius in suo herbario nouisse videtur, quanquam Matthioli oppositum contendat. Sed reuera Matthiolus eam nunquam vidit, quia si eam cognouisset, illius odorem suauissimum nunquam prætermisisset. Hæc eius sunt verba: sed quam omni succo inania, ipse videat. Quòd enim de Siderite prima, quam se in doctissimi viri Fuchsij herbario narrat inuenisse, suas proferat commentitias nugæ, hic faciliè demonstrat, quòd eius folia non modò non spectentur Quercus instar lineata, sed nec per ambitum nulla parte laciniata, tamen si Lusitanus, vt

potius suam tueretur opinionem, quam veritatem, id non sit veritus affirmare. Ipsa enim Fuchsij pictura de Lusitani fide maximè testatur. In primis enim flores ostēdit spicatos in caulium summitatibus erumpentes, non autem in ipsis caulibus orbiculatæ vertebrae instar, vt in Marrubio, per interstitia dispositos. Præterea folia nulla ex parte correspondē, nec pomorū Cydoniorū odor, quem solus Lusitanus illi tribuit. Dioscorides enim Cydoniorum odore, nec quouis alio Sideritem hanc commendauit, sed gustu nō iniucundo, multa enim habentur, quæ odore maximè placeant, & sapore displiceant. Sed mihi satis verendum est, an Lusitanus Cydoniorum odorem huic plantæ tribuerit, vt vera fateretur, an fortasse suæ sustinendæ opinionis causa. Quippè Fuchsius huiusce odoris nō meminit, nec nobis periculum faciētibz percipi potuit. Non enim hanc stirpem ignoramus, vt sua potius temeritate, quam scientia existimat Lusitanus. Sed non fortasse à scopo aberraret, qui diceret Lusitanum Fuchsij Sideritem nusquam vidisse, nisi apertè, quod falsò feribat, Sideritem hanc in vallibus nasci, vbi plerumque solum viginosum esse solet, Fuchsius verò perinde, ac Dioscorides in asperis, petrosis, ac incultis locis. *Calumnia xvij. De Trago.* *MI-* *N* vs acerbè aliquantò parior, cum de Trago nostrâ studet emendare opinionem, vbi Lusitanus ita suâ exorditur calumniam. Non prætermittēdus quoque, est Ruellius, qui proculdubio in dignoscenda herba ista multum hallucinatus est, qui Tragum Iunci speciem esse crediderit, cui quoque Matthiolus Senensis subscribit nulla fultus ratione, cum è directo Tragum herba sit, ex qua vitrum conficitur. Atqui inter omnia, quæ hactenus nobis obiecta sunt à Lusitano, & satis dilucidè, vt arbitror, refutata, nihil iustius, nihil æquius fateor, vnquam in nobis est calumniatus, quam quæ de Trago hic recitat. Hoc modò si capere potuisset, dum nimis se sollicitum

*Suis ipsius*  
*mugis con-*  
*futur*  
*Lusitanus*

tum exhibet circa exiguam in nobis labeculam, non ipse pluribus se maculis contaminaret. Equidem fateor, olim in Tragi historia ancipitem me habuisse opinionē, quanquā inclinaret quandoque animus ad credendum, nil aliud Tragum esse, quā quoddam humilis Iunci genus in maritimis proveniens, cui semen acinosum in cacumine nascitur rubrum, adstringenti sapore. Eram enim fretus hoc argumento, quod scilicet scripsisset Dioscorides, nasci Tragum sine foliis, pusillis circum ramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, quā omnia potius ad iuncos spectare, quā ad aliā quamvis plantam videbantur. Opinionis inditia subinde augebat, quod sequenti statim capite idem Dioscorides de Iuncis vulgaribus egerit. Verum quod & summis, & præclarissimis contingit ingeniis, ut temporis processu plura quoque inuenerint, & diligentius examinauerint, id mihi accidisse fateor. Re nanque in posterum exactius agitata, ac perpenſa, melioribus adiuuentis, minime puduit priorem deponere opinionem. Etenim cum animaduertenter apud Theophrastum, & Plinium, quorum etiam iudicium in nostris Latinis commentariis secuti sumus, Tragum vtriusque Scorpionem appellatum, quem admodum & Dioscoridi aculeatam in vniuersum esse plantam, priorem, quæ in animo versabatur, opinionem diutius sequi non libuit. De hac enim planta scribens Theophrastus libro vi. capite i. de Plantarum historia. Aculeatarum, inquit, alia ex toto aculei sunt, ut Corruda & Scorpium. Hæc enim nullam, præter aculeum folium gerunt. Id quod postea repetiit tertio eiusdem libri capite his verbis. Inter ea verò distincta genera plurimum quæ aculeato folio constant, nimirum dixerim, quod ex toto spinosum inspicitur, exiguo est numero, quemadmodum diximus, & difficile quicquam ferme inuenies, præter Corradum, & Scorpium, quæ post

Aequinoctium Autumni florescunt. Scorpium enim florem in carne extuberante sub extremo aculei profert, initio candidum, postea leuiter accedentem ad purpuram, & singulari radice, eademque breui adhæret. Hæc ille. cui subscribit Plinius libro x. i. capite x. v. sic inquit. Spinosarum multa species. In totum spina est Asparagus, Scorpium. Nullum enim folium habet. Quibus palam est Tragum, quem Dioscorides etiam Scorpionem vocat, nullis provenire foliis, sed scaterere tantum aculeis. Id quod etiam videtur fateri Dioscorides, quod dixerit, Tragum, quem alij Scorpionem vocant, sine foliis eriri, acutis tantum circa ramos adnatis granis. Quamobrem libenter hac in re postea meam correxī sententiam, quam Lusitanis dispicuisse summopere gauderem, si quid hac mea dubitatione melius, ac certius aliquid deprehensisset, sed quod vix venire nimis temeritati plerumque solet, dum nimis in me exandescens maius aliquid asseuerare nititur, longè turpissimè labitur, quod eam velit plantam legitimum esse Tragum, quæ Mauritanijs Kali, & Alkali appellatur, nobis verò Hetruscis Soda, cuiusque imaginem vltimæ huius editioni addidimus libro secundo inter Attricipes ad viuum expressam. Quandoquidem planta hæc, ex qua alumen conficiunt, quo vitrarij vtuntur, Catinum appellatum, quin & sal, quod à planta Alkali vocant, folijs non vacat, quum admodum sit foliosa, nec vllis penitus riget aculeis. Ipsa enim cum primum emergit, folijs proflit minori Sedo amulis, quæ tractu temporis dodrantali ferè longitudine augentur, geniculatimque protrahuntur. Cum verò iam adoleuerint, prodeunt è geniculis folia pinguia, crassaque incurua, ex lata origine in acutū definita. Vbi verò ad summum confiterint, in caulium cacuminibus longè minoræ, exilioraque spectantur rufo colore, à quorum exortu paræ, rotundæque prod

Kali, &  
Alkali  
Arabum.

Kali bisfe

prodeunt pilulæ, in quibus minutum semen concluditur, vt videre est extra Tergesti mœnia, iis præsertim locis, quibus salinarum arces circumdantur. Quæ Tragi notis prorsus repugnant. Adde quod Kali sapore sit admodum falso, Tragus verò non falso, sed adstringente. Quæ omnia circa controuersiam attestantur, quod legitimum Tragum nunquam viderit, nec nouerit Lusitanus. Qui tã excors, obliuiosusq; deprehenditur, vt eandem herbam legitimum Tragum esse affirmet, quam prius asseruit esse Anthyllidẽ, vt postea disseram.

Lusitanus  
non vidit  
Tragum

Tragum  
non vidit

Cæterum eam constat plantam genuinum esse Tragum, quam nos suo loco appproximus. Quippe ea sola, Corrua excepta, tota spinosa visitur, nullis circumdatur foliis, & in maritimis tantum nascitur, fruticosæ, humilis, humi accubens, innumeris triangulis, quadrangulisue, tritici magnitudine vbiq; scatens, in quorum medio (vt Theophrastus inquit) post Autumni Aequinoctium flos emicat albus, qui paruo temporis tractu purpureus euadit, adstringenti sapore, perinde ac tota plãta, adeo vt nihil repugnet, quin hæc genuinum Tragum dici queat. Hanc inueni ego primus in Tergestino solo in Hadriatici littore, vbi frequentissima, copiosa que oritur. Nec immerito Scorpion eam appellauere antiqui, quippe quod aueli non possit, nisi istis ab ea manibus, vt ego mihi testis esse possum. Tantum igitur abest, vt celari velim mea, sicubi sunt errata, vt ea etiam ipse non verear emẽdare, gaudeo que hæc à cæteris aperiri, modò ista semper adhibeatur moderatio, vt potius veritas exquiri videatur, quàm imbrobæ calumniæ, quæ in optima quæque inuehantur, instrui sentiantur. Etenim id longè honestius arbitramur, vbi quis se lapsum nouerit (quum proprium sit hominum labi se hallucinatum aliquando agnoscere, quàm, quod extremæ est pertinnaciæ, ac vecordix, quod semel arripueris mordicus adeo tenere, vt illinc auel

Author  
Tragum pri  
mam viderit  
non.

li non consentias. Ac sanè in commentariis, quæ antea Italico euulgaui sermone, nonnulla postmodum deprehendi, quæ minus quàm decreueram à nobis enucleatè, exactèque essent scripta. Quorum & eo ipso tempore non eram nescius. Verebar quidem scire ne tãti operis festinatio inter tot alia, quibus in dies distinebar, iudicij fortè extremam maturitatem in aliquibus peruerteret. Quod sanè peccatum leue (vt credo) & in paucissimis repertum, quamuis reliquorum vtilitate, tum facile compensari, tum rectè obscurari posse censebam, sciebam tamè prauos, ac maleuolos homines minimè defuturos, qui etiam rectissimè à nobis dicta lacerare, & caninis dentibus arrodere non cessarent, & qui citius reliquorum omnium fructu se expoliari mallent, quàm vt leuissimè alicui condonarent erratum. Sed quid? Tot amicorum erant interpellationes, qui hoc opus à me quotidie flagitarent, & prope suo iure postularent, ne hoc meorum studiorum partu eos diutius defraudarem, & suspensos tenerem, vt improborum, inuidiorumque iniquis moribus me intèpestibus obici maluerim, quàm horum resistere voluntati. Emisi tandem opus non tam maturum, quàm amicorum precibus, & obsecrationibus efflagitatum. Quorum desideriis satisfactum à nobis plurimum gaudeo. Si qua verò erant nimis accelerata, ea sanè longè accuratius in Latinis nostris commentariis agitata sunt, & discussa. Id quod tunc me maximè solabatur. Quæ si ante me ita deprehendisset Lusitanus, vt nullã in me ostentasset acerbicatem, nullas in optimè munit, firmatæque suas ingessisset calumnias, & non sua infidelitate in alienas possessio nes irrumperet, gratias ei profectò agerem, quod suo studio, & sinceritate hsec nos subleuasset laboribus. Tam verò optima quæq; scdissimè lacepsit, conuellit, diripit, & in quibus aliquã veniã mereri poterat eius calumniã, hæc maiori offu

*Lusitani  
obscure in  
Amaranthi  
vires*

iori offuscat falsitate. Dixi paulo ante in Trago, quam sua reprehensione turpiter aberrauerit, nunc quoque in Amarantho nihilò cautius, & peritius se gerit. Scio in Italica editione Aetium de Amaranthi viribus differentē me citasse in vulgari Amarantho, quā Aetio nil sit aliud Amaranthū, quā Dioscoridi Helichrysum. Nec tamē à Lusitano admonitus facillē, & non inuitus quædam reuocare, & omnia prorsus trutinare decreueram, in Latinis postea cōmentariis: quod & iam pridē est factum. At ne Lusitanus vanē contra nos exultet, ac nulli incogitantia indulgendum vociferetur, videat ipse quā falsò sibi persuadet vulgaris vsus Amaranthū esse Chrysocomem. Nam si (vt audio) Græci sermonis peritum se ipsum facit, maximo illi vitio adscribendum fuerit, quòd Græcorum verborum vires tam negligēter expenderit. *χρυσός* enim Græcis, aurum Latinis designat, *κόμη* verò coma. Ad eò vt id sit Græcis *χρυσόκομη*, quod Latinis aurea coma, quo manifestē deprehenditur Lusitani inscitia. Quandoquidem cum vulgari Amarantho spicatus flos insit, nō aureus, sed in purpurea ardens, quo pacto fieri possit vt rectē is *χρυσόκομη* Græcis rectē dicatur, ij diiudicent, qui Græci sermonis peritiores habētur interpretes, quique hæc diligentius explorauerūt. Quòd autem Chrysocome flore sit aureo, vt ipsa fert nomenclatio, testis est Plinius lib. xxi. cap. vi. i. i. vbi sic inquit. Chrysocome, siue Chrysitis non habet Latinam appellationem, palmi altitudine est, comantibus fulgore auri Corymbis. Quamobrem nō solum constabit, quā lubricè lapsus sit Lusitanus, sed quā falsò, ac iniquē accusauerit Ruellium, & Fuchium. Quippe cum Chrysocome, & Amaranthum longē inter se differant, vt clarissimi illi viri rectē norunt, non ab re illis dictum est Amarantho purpureo vim esse adstringentem, siquidem māsā coma folia, ac etiam radix adstringentem facultatem non obscuram præ se ferunt. Hic s. A. C.

*Turpia ac  
ridendae  
Lusitani  
error.*

*Ruellius  
& Fuchs  
flos à Lus  
sitani ca  
lūcia dicitur.  
Calēcia  
xviii. de  
mācri &  
da.*

CEDUNT, quæ in minori Sedo Lusitanus enumerat ita exordiens. At minus Sedum (vt ego opinor) faba, crassa siue faba inuersa herba dicta est, natura frigida, non autem Vermicularis, vt Matthiolus, & alij putant, quia Vermicularis herba sapore acris est, natura verò calida, quæ duo minimè Sedo minori conueniunt, cum, vt dixi, Sedum minus natura frigidum, vt Maius est. Cæterum & planta ipsa descriptioni in toto respondet, vt iure cōcludendum sit, vt Faba inuersa, siue crassa dicta minus hoc Semperuium sit. Hæc illius sunt deliramenta. Sed sanè vereor, ne hæc tam crassa, tamque frigida herba cerebrum ei totū perfrigerarit, inuerterit, insatuaueritque, ac Amathum nostrum penitus amentē fecerit. Inquit Dioscorides, Semperuium minus in petris parietinis, & maceris, necnon scrobibus opascis nascitur, cauliculis ab vna radice multis, tenuibus, crebrò foliatis, exilibus foliis, rotundis, pinguibus, mucronatis, caule à medio emicante, palmum alto, umbellam, herbidosque flores, & tenuis gerente. Dioscoridi subscribit Plinius libro xxv. cap. xi. i. i. his verbis. Minus Semperuium in muris, parietinisque nascitur, & regulis fruticosum à radice, & sursumque ad cacumē, foliis angustis, mucronatis, succosis, palmo alto caule, radice inutilis, quibus maximè omni ex parte refragatur omnes fabarum illius notæ. Quandoquidē Fabæ inuersæ vocatæ cauliculi nō insunt tennes, sed crassi, ac pingues, bicubitales, & quandoque maiores, nec lucinatū folia quidē exilia, rotundaque, sed magna, lata, ac prælonga, flores in umbella non herbidi, sed plerumque melini, vel in purpurā cādicantes. Radice quoque nō est inutili, nec superuacua, sed bulbosa pluribus adnatis tuberculis Asphodeli ferè modo. Colore cinereo, cortice laui, & succo plena ad multa expetita. Quæ in vniuersum notæ, si cū minoris Sedo hiltoria cōparētur, clarissimè demonstrant tantū ab illo differre Fabarum, quantū à Lusitania

*Lusitania  
reprehenditur.*

*Calēcia  
refertur.  
& da  
lucinatū  
esse ostenditur.*



boues, equos, suæque necare, cum tamen Albo nullo incommodo depascantur. Quo fit, vt iniuria in me reiecerit Lulstianus, quæ non nostræ, sed Plinianæ sunt lésionis. At quum is ad nostros perdendos labores inuidientia, ac liuore setotum accinxerit, eò cæcitate, amentia, insolentiaq; processit, vt etiam aliorum errata in nos remiserit, vtpotè, qui mentiri nunquam erubuerit, non alia opinor causa, quàm quòd voluerit monimentum sceleris, atque audaciæ suæ esse in conspectu omnium.

*Animadu-  
uersio in  
Amathi  
de iuramē-  
tu in ius-  
titiæque.*

Hactenus Amathe tuis ineptissimis calumniis satis, superque puto à nobis esse responsum, atque ita clarè, tantàque luce eas me diluissè nunc arbitror, vt si vlla in te fuerit ratio, si qua probitas, si quod etiam scientiæ vestigium, facilè seu in me, seu in alios istam sis posthac depositurus temeritatem. Est quidem, vt discas, quid docti sentiant, priusquàm tã arrogàter, tam temerè in eorū labores insolescas. Quinetiã quo pacto eorū sudoribus potius cãdidè & gratàter fruaris, quàm vt eos imperitè laceßas, & tuis calūniis obruas. Etenim nõ iccirco has vigilias libentissimo animo suscepimus, vt tu eas obscures tua inuidientia, ac etiã imperitia. Etenim si nostras has lucubrationes tibi vsui esse nolis, cur talem clandestinum furem te exhibes, vt solum tua furta commenta aliis esse velis, cetera verò, quæ tua libido sibi non vendicarit, ea malitiosa studeas opprimere inuidientia? Patet faciam in aliis tuū infidelem in meis scriniis animum. Nunc satis mihi est, si tuas contuderim calumnias, quibus si tuo quoque iudicio à me est satisfactum, vehementer tua causa gaudeo, sin is maneat, ac perseueres, qualem te esse prædicant, certè non omnium iudicium, candor, ac æquabilitas ex vna tua indocta, & præcipiti pendebit malevolentia. Narrat vetusta gentilitas eos, qui se intulissent magnæ Deæ sacrificiis, cõsestium excæcari, quam quidem cæcitatem illi nõ tam ad oculos, quàm ad mentem referebãt, At ego Amathe

non te ideo cæcū dico ductus hac gentiliū superstitione, quòd Cibeles alicuius te inferneris sacris, sed ea tantum ratione, ac sententia (vt tu ipse iam pridem in te experiris) quòd à Deo immortaliperfidissimè desciscas. Etenim cùm (vt audio) nunc nostræ religionis te ipsum facias, nunc Iudaicis legibus, superstitionibûsq; te totum addicas, & ita non solum in homines, sed in ipsum Deum Optimum Maximum insolescas, minimè id est mirū, si à te ipso queque deficias, & omni statu mentis dimouearis. Vt non modò in te nulla vigeat pietas, nulla religio, verum & in ipsa medica facultate, quam immeritò proferis, plurimū cæcitas. Hinc ego fieri arbitror, vt non solum tibi, sed & cæteris omnibus molestissimum, ac infestissimum te exhibeas: & tumultuosissimis mentis furiis impulsus modò huc, modò illuc agiteris: quin etiam vt tu, qui tam diu tuā impierare in diuinā cæcitis veritate, nunc nec alios, nec te ipsum in ipsa medica facultate intelligas. Quare nulla mouebor admiratio, si tuam obstinatam detrectes exuere vesaniam. Non id iam animo mecum proponebam, non iccirco tuam reprimere sum conatus insanabilem (vt timeo) libidinem, vt te tuæ aliquandò in tanta veritatis luce peniteat insanix, sed id magis elaborauī, ne tyrones, & huiusce medicæ materiæ studiosos tuæ fortè impedirèt calumniæ. Nihil tuam Amathe moror Censuram. Iudicabunt syncerius docti, ac præclari homines, utrū tu iustus me inuasferis, an ego maiori vi te in me temerè irrudentem declinauerim, penitusque profligauerim. Quapropter aut cessa Amathe posthac calumniari, aut tam quæso non sis inutilis, & inanis, vt quum reliquorum labores & scripta explodas, tu nihil melius afferas, aut, quod vltimum est, caue, ne apud eruditos, & æquissimos lectores, ac iudices, qui nunquam deerunt, tua inuidia, & calumnia nostrum augeant, & amplificent honorem.

*Lulstianus  
Semijuda-  
eus. Hi-  
spani ta-  
les Ma-  
nos vocat,  
quæ ma-  
ximè dete-  
stantur.  
Cur Ama-  
theus tan-  
ta Liborē  
cæcitate.*

*Cur An-  
thor hanc  
conferat  
Apologiā.*

PETRI ANDREAE  
MATTHIOLI IN AMATHI  
LVSITANI ENARRATIO-  
NES CENSURA.



*Praefatio  
in Censura  
T. 1.*



AM MINVS vereri debeo, ne quis potius gloriæ captandæ cupiditate me putet adductum, vt homini impudenti & rerum omnium imperito, suos patefaciã errores, quàm ad id vera, rectaq; duci ratione. Quod si liberius in hominem petulantem adeò importunè lacesitus inueherer, quis probus non id mihi iure concedat? In Amathum, inquam, qui suis iniquissimis calumniis, non modò honestissimos labores nostros opprimere nititur, sed &, quantum in ipso est, sua imperitia, & impudentissima confidentia rem medicã obscurare conatur vniuersam. Nec sanè aliud sibi quis de eo persuadere potest, qui aliorum scripta à quàm plurimis comprobata, atq; cõmunia, sua temeritate incensat, & violare molitur. Hoc si impunè, & tacite sit improbis permittendũ, vt suo tantum iudicio audacter reprehendant, ac cõtaminent omnia, quò nam omnium præstantissimarũ facultatum cultus deueniat? Quis posthac istorũ se obiectioni ingratitudini? Verum vt & ipsum, si qua adhuc in eo viget ratio, pœniteat istius calumniandi insanissimæ licentiæ, & non solum ex aliis, verũ ex se ipso suã cognoscat omnĩ rerum inscitiam, infringeda est hæc nimis ar-

rogans, & effrenis audacia. Nò arbitrabar quemquã tam perfrictæ frõtis esse posse, qui ibi tam seuera in alios censoria vtatur virga, vbi ipse tot vbiq; sca-teat erratis. Molestũ, friuolumq; penè credidissem grauioribus impeditus negotiis, vt cũ huiusce hominis disceptare ineptiis, nisi ipsum in me tam petulanter insultare à pluribus audissem. Nunc autè eadem molestia, qua istius impetũ, & vanam incursionẽ à me prohibui, ne quis istius seueri censoris impellatur iudicio, vt statim approbet, quæ ab isto viderit proferri: Audiatur bonus, & egregius vir, quantò tutius fortassè fuerat honestè tacere, quã eo pacto contra ceteros insanè oblatrare. Atqui hæc in re ea neutiquã vtar vanitate, qua ille cõtra nos, & ne hominem potius persequi, quã veritatis studiosi videamur, nihil nobis erit negotij cum Amatho. Etenim eius errata sic in lucẽ producã, vt si vel ipsemet aliquid habeat, quo iis, quæ à nobis afferuntur contradicere valeat, doctorũ iudicio longè libentius acquiescam, quàm vt aliqua pertinacia reliquorũ studia retardem. Idem qui hoc promitto, hoc quod est acquisitum, si non ab Amatho, quem redditurum vix ad mentem spero, saltem ab erudito lectore id peto, ac postulo, ne qua mora, ne quod impedimentum rerum, & medicinæ fiat can-



didatis, vt tum demum de vtroq; nostrum suam ferat sententiam, vbi nostras rationes diligenter expenderit, ac pensitarit. Amathus non nisi quadam precipiti dementia nostros inuasit labores, cōuulsit, distraxit, nullā huiusce facti afferens rationē, nisi quod suæ authoritati, hoc est stultissimæ libidini, tantū putauerit vbiq; concessum. Ego sanē, quæ in isto reprehendo, nisi apertissimis, & ipsa luce clarioribus argumentis inductus videar, cupio me eiusdem argui temeritatis, stultitiæ, ignorantia, quam de se prodidit ille. Atque sicut cādidus lector, qui hæc in manus sumperit, facili discernet, ira fore arbitror, vt minimè eum pœniteat eius lēctionis, vbi nō tantum istius terribilissimos lapsus, sed & non sine nostro labore, rerum plurimarū cernit explanatas naturas. Ideoq; hæc, quod maiori cum facilitate, & emolumento distinctius ab omnibus legeretur, incerta hæc digestissimis capita, ac iam tandem aliis innumeris silentio inuolutis, ad ea, quæ sunt præcipua, in quibus ille turpissime offendit, veniamus.

## ACORVM,

*De Acoro*  
*Censura*  
*Galanga*  
*Cyperifolia*  
*lia.*  
DE ACORO suum ipsius, quod olim tenuit reprehendit iudicium, sed quantò præstiterat à priori non discedere sententia, ipse videat, qui vegetiorē Galangam nihil ab Acoro discrepare putat, cuius error multis patet rationibus, & indicis. Nimirū quod neutrum Galangæ genus folia proferat Iridis (vt qui viderunt testantur) sed Cyperi, quo fit (Lusitano etiā ita restante) vt non desint, qui Galangā ipsam Cyperum Babylonicā vocent. Tum quod vegetioris Galangæ radix cum Iride nihil habeat cognationis, nec illius faciem vlla ex parte referat, adde quod radix hæc rufescat potius, quàm subalbicet. Præterea Galanga nusquam reperiata est, quæ gustu fuerit subamaro, vt de Acoro fatetur Galenus, sed tantum acri. Quocirca non immerito Sc-

rapioni, qui inter Arabas in enarranda simpliciū medicamentorū historia primas tenet, aliud est Galāga, aliud verò Acorum. Ob eandē quoq; causam inter græcos Actuarius, & Nicolaus Myrepicus in parāda Aurea Alexandri antidoto, & Acorum & Galangā inponunt, tanquā medicamenta inter se diuersa. Quibus luce clarius quis intueri poterit, Galangam, & Acorū pluribus sanē notis differre. Acoro enim folia non debentur Cyperi, sed Iridis, quin & radices Iridi proximæ, geniculis interceptæ, subalbicantes, non subrufescentes, & (vt Plinius inquit, cui & Lusitanus subscribit) ruptu faciles, non vt in Galanga, vtraque fractu cōtumaces, quibus perspicuū, satisq; comprobatū censemus, neutrum Galangæ genus esse Acorū. Nec profectō intellexerim vnquā (vt aliās meminimus) quo pacto, quæue metamorphosi factū sit, vt Galanga illa, quæ ab aliā non genere, nec viribus, sed tantū magnitudine differt, quum primū ad nos ē Syria, vel Memphis aduecta est, in Acorum se cōmutauerit: nisi quis fortassis dixerit, euenisse hoc magicis præstigiis, quod suā tuetur opinionē. Ac cum ad nostra penitus obmutescat argumenta, quibus in hac re sumus vsi, illud sanē suspicari libet, hæc potius retractasse Lusitanū, vt Brasauolum à nobis reprehensum (illi enim vbiq; plurimū videtur addictus) sui immemor defenderet, quàm vt veritate, quam prius ferebatur, sustineret. At Fuchsius vir profectō clarissimus, & qui potius philosophū se existimat, quàm vt pertinax sit author, etsi iam pridē in Brasauoli concesserit sententiam, visis fortasse Cōmentariis nostris, ac pariter argumentis, quibus eorum detestamur opiniones, qui existimant, maiorem Galangā esse Acorum, honesta quadam dicendi serie, qua suā tuetur existimationē, postremo quem edidit, de compositione medicamentorum libro, à priori opinionē non parum videtur abesse. Quod fortasse fecisse

*Lusitanus*  
*Brasauolum*  
*addictum*  
*Fuchsius*  
*inueniatur.*

*Acorum*  
*quid*

*Acorum  
quid.*

cisset etiam Brasauolus, nisi immatura morte fuisset præventus. Porro Acorū non mea tantum, sed plurimorum sententia, qui in re medica multum præstiterunt, ea sanè erit radix, quam perperam Calamum Aromaticum appellant. Ipsa enim si primum recto oculorum intuitu expendatur, ac deinde syn cero ruminetur gustu, nulli dubiū esse opinamur, quin adeo singulas Acori notas sit representatura, ut is merito stuppidus appellari debeat, qui aliter se ferit. Quo fit, ut ridendum videatur Lu

*Ridiculus  
argumentum.*

sitani argumentū, quo ducitur, ut credat Galangam eam ob facultatē, qua ad venerca præstare fatentur Mauritanī, genninum esse Acorum: quoniam Apuleius Acorum Venercam herbam quibusdam vocari scribat. Quandoquidem cum nullā explicauerit illi rationem, qua illi Venerca herbæ nomen accesserit, non tanti nobis fuerit Apulei autoritas: præsertim cum plurimæ aliæ præter Galangam habeantur radices, quæ hac polleant facultate. Cum enim antiquorum nullus scriptis commendauerit Acorum ad Venerca præstare, facile quis opinari poterit Latinis (ut audio) Venercam herbam vocari; quod fortasse ob plantæ pulchritudinem, amœnitatem, & odoris fragrantiam Veneri illā dicauerit antiquitas, quemadmodum & Myrtum. Plures enim habentur plantæ, quæ Venerca appellantur nominatione, nempe, Venercum labrum, Venercum pecten, Venercus capillus, Venerensymblicus quin etiam Thymum, & Stirax, quod suauiter spirent, Venerca dicuntur plantæ. Adhuc in Acori historia parum videtur, quippe qui non satis cōstanter de Acoro scripserit. Primum enim nasci Acorum scribit in locis cultis, hortis, ac prætis contra omnium penitus sententiā, deinde verò illico asserit idem inuentum rarum nec inueniri, nec sciri posse, nisi cum flosculum emiserit. Quæ omnia si cum iis conferantur quæ à grauissimis

scriptoribus de Acoro scripta sunt, fallè fabulosa deprehendi poterunt. Nec minus insipidum videtur aliud Lusitani argumentum, quod eam ob causam velit Galangam esse Acorum, quoniā à Plinio dictū sit libro xxv. cap. xiii. Acorum nigras habere radices, quandoquidem crassioris Galangæ radices nigræ nusquam repertæ sunt, sed subrufescentes. Atqui illi venia dāda est: quippe quod (ut aiunt) de coloribus cæci non iudicant. Cæterum extant apud non Pliniani codices mendis vltimo loco expurgati, ac restituti, qui non nigras sed subnigras legant Acoro esse radices. Quā quidē lectionē magis probamus, quod scripserit is paulo infra, Creticas Acori radices esse Poricis candidiores: quinetiā quod hæc lectio Dioscoridi adstipuletur q. Acoro radices tribuit subalbicantes. Subalbus enim color is (mea sententiā fuerit) qui ex nigro albicat, subniger verò qui ex albo nigricat, adeo ut subalbus, & subniger color parum inter se differat. Talis autē visitur color iis in radicibus, quibus passim vtimur Calami Odorati vice.

#### CARDAMOMVM.

Nec sanè minus in Cardamomo cœcutit Lusitanus, ut potè qui putauerit Cardamomū quo vsi sunt antiqui, lignum fuisse, non semē. Patet non levis error, quod, esse plenum, frangētī contumax, ocellusum sarctumq., potius seminis sit propriū, quā ligni. Sed Cardamomū antiquis fuisse semē, nō lignum, testatur apertissimè grauissimus author Galenus libro primo de Antidotis capite quinto, ubi sic habet. Fructus autē, qui vna cum virgultis, folijs, calicibus, ac floribus in Theriacam mittuntur, ii sunt, Scordij, Nepitæ, Marubij, Stæchadis, dictāni, Polij, chamædryos, Chamæpityos, Hyperici, Cētaurij. Radices autē hæ Zinziberis, Iridis, Rhei, Quinquesolij, Costi, Nardi Indicæ, Nardi Celticæ, Gentianæ, Mei, Athamantici, Phu, Aristolochiæ

*De Cardamomo  
Censura*

*Apuleio  
in Acori  
historia  
non asstipulandū.*

tenuis. Semina verò hæc. Napi, Petroselinum, Thlaspis, Ameos, Anethi, Fœniculi, Dauci, Cardamomi. Hæc ille. Recensuit etiam inter semina Cardamomum senior ille Andromachus, vbicarmine de Theriaca scripsit his versibus.

*καὶ μετὰ σίσημα, καὶ ἰδιώτη καρδίουμαρ  
καὶ ψαφίον ἑλένη παρδίουσι & ὁμοιοι.*

Hæc Andromachus, & Galenus adversus Lusitanum ante tot secula scripta reliquerunt.

#### NIGELLA CITRINA.

ERRAT Lusitanus, quod recētiore quosdam fortè sequutus sibi persuaserit Nigellam Citrinā (liceat mihi nūc pharmacopœorum vti vocabulis) Maius Mauritanorum esse Cardamomum, Minus verò id, quod Meleggetham vocant. Quandoquidem Serapion<sup>1</sup> ni Maius Cardamomum semen est, quod oblongis quibusdam concluditur capitibus, iis ferè similibus, quæ è Rosis prodeunt, granis subnigris, rotundis, in quibus minuta continentur semina angulosa, farsæ, & odorata. Id quod manifestò arguit Nigellam hanc, quæ Melanthij est species (vt nobis aliàs satis, superq; ostensum arbitramur) Maius Mauritanorum Cardamomum esse nequaquam. Adde quod Nigellæ calix nullum intra se habeat granum, quod ipsum semen excipiat, sed parva femina tantum intercurfantibus mēbranis papaueris modo. Præter id cūm sui Cardamomi colorē subnigrū fecerint Arabes, non video cur Nigella Citrina vocata, quæ colore spectatur Citrei mali, à quo illi nomē, Maius illorū Cardamomū appellari possit.

#### MELEGGETA.

Quod præterea Meleggeta, Minus Mauritanorum Cardamomū non sit, quis facile conicere poterit, quippè cum hoc semen calice quodam, Melanthij instar cōcludatur, Cardamomum verò Minus (vt Serapio inquit) suum

ferat semen nullis occlusum capitibus, colore Maiori æmulo. Qui tamen color subniger Meleggetis minimè est assimilis, eò quod hæ colore sint subrufo Indici Milij instar, quod Tusci Saginā vocant, Infubres verò Melegami, vnde fortasse accessit his seminibus Meleggethe nomen. Ad hæc cūm Meleggethæ semen longè maius habeatur, quàm Nigella Citrina, non video sanè cur consentaneum fuerit id Minus vocari Cardamomum.

#### CUBEBA. CARPESIVM

*Censura  
de Cube-  
bis & Car-  
pesio.*

IN CUBEBA, & Carpesio censendis quantum aberrat, quod Cubebas velic, quibus passim vtuntur Officinæ, tum veras Arabum esse Cubebas, tum etiam legitimum Galeni Carpesium. Verum, vt apud Arabes nullus habetur, qui scripserit vsquam Cubebas esse baccas, vel semen, ita nec apud Græcos vllus extat author, qui Carpesium fateatur esse semen. Galeno enim Carpesium tenues sunt festucæ, siue sarmenta parua, Cinnamomi virgultis similia. Quare quum Mauritanis idem sit Cubeba, quod Græcis Carpesium, nullo pacto fieri posse putamus, vt vulgaris Cubeba, quæ baccarū generibus ascribenda est inter festucas, & tenuia virgulta, Carpesium esse possit, ac debeat, quin etiam nec genuina Mauritanorū Cubeba: vt pluribus rem hanc in cōmētariis nostris explicatam habemus.

#### SALIUNCA.

MVLTO verò apertius suam declarat inscitiam in Saliunca, quam eandē arbitratur esse plantam, quā Itali Spico, recentiores quidam Pseudonardum appellant, ad quod quoq; genus refertur, quæ passim vulgò vocatur La uendula: in quo certè miror maximam hominis nescio imperitiam, an stuporem dixerò. Etenim quid alienius? quum manifestè Plinius Saliuncam foliosam asserat esse plantam adeo breuiem,

*Censura  
nij. de Me-  
leggetis.*

ue mvt necti non possit, quin & herba  
verius, quā flos, dēsa & eluti manu pres-  
sa, radice numerosa cohærens. Quantū  
ab hac differt Pseudonardus? quū plan-  
ta est fruticosa, lignosaq; Rosimarini  
Coronarij instar non brevis, sed bicu-  
bitalis, & flos verius quā herba, & quæ  
in corollis facilè necti possit. Florum  
enim lōgiore pediculi iunceo ferè len-  
tore præstant. Præterea Pseudonardus  
numerosis radicibus non cohæret, nec  
adeò densè fruticat, vt folia tam perti-  
naciter sibi ipsi inhæreant, vt tanquā  
manu pressa cernantur. Adde quòd in  
Pannonia, & in Noricorū Alpī apricis  
locis, nusquā Pseudonardus proueniat,  
vbi Plinio ipso teste, numerosa proue-  
nit Saliunca. Humilis autē & brevis Sa-  
liunca herbula est, nō bicubitalis & Pseu-  
donardi modo fruticosa, ac lignosa,  
quamobrē in Buccolicis poëta cecinit.

Puniceis humilis cedit Saliunca  
rosetis.

Tantum discrimen inter Saliuncā &  
Pseudonardū non cernit Lusitanus, vt  
humillimā herbā à bicubitali non di-  
stinguat frutice. Timendum, nisi hanc  
oculorū curet caliginē, ne culicem pro  
cane, vel fortassè etiam equo accipiat.

#### CINNAMOMVM.

REDIBO in gratiam aliquandò cum  
hoc homine, qui alienis (vtinam tam  
verè) nos locupletet diuitiis, & opti-  
mo Cinnamomo capsis (vt illè inquit)  
cannella refertis, quæ ab Indiā deferū-  
tur Antuerpiā, nos abundare iactat, &  
contra omniū præclarissimorū aūtho-  
rum sententiam sibi persuadet, Cinna-  
momū esse corticē tantū suæ arboris  
non lignū. Nouitatis auidus nouū cre-  
do aliquid asserre studuit. Fidē idcirco  
suæ authoritati adhibendā minus du-  
bitauit, quòd iam fama increbuerit  
apud omnes Lusitanos, peragratīs Af-  
ricæ & Indiæ regionibus, Aromatum  
multa genera esse aduecta. Miror cur  
non se in his quoq; partibus fuisse sin-  
gat, vt maiorē huius cōmenti faciat fi-  
dem. Sed cū nec ipse id asserat, nec Lu-

sitani, qui nauigiis istas terras petierūt  
vllam huius rei afferant historiam, nos  
Lusitano in istis commentitiis inuentis  
astipulemur. Præsertim cū nō desint  
probatissimorū scriptorū testimonia,  
q; repellentes has nugas apertissimè fa-  
teatur Cinnamomū virgultū esse pumi-  
læ arboris nō corticē tantū. Id enim in  
primis testatur Dioscorides, sic inquit  
In Cinnamomi Mosylitici vocati gene-  
re præstat recens nigrum, ex vino so in  
cinerē vergens, laue, tenuibus ramulis,  
ac frequentibus nodis cinctū, perquā  
iucundè olens. Quibus palām fit Cin-  
namomum virgultum esse tenue no-  
dis pluribus constans. Huic subscribit  
Galenus lib. 1. de Anridoris his verbis.  
Quæuis autem Cinnamomi species ab  
vna radice, ceu frutex quidam paruus  
consurgit, emittitq; hæc sex, illa septē  
virgulta, vel paulò plura, paucioraue,  
non æquali tamen omnia longitudine  
sunt. Verū quod maximum est, pedis  
Romani dimidiū non excedit. hæc ille.  
Adest adhæc liber de simplicibus me-  
dicamentis ad Paternianum Galeno  
ascriptus, qui etiā de Cinnamomo sic  
habet. Cinnamomum sunt rami ferè, ac  
virgulta, quæ ab vna radice plura ex-  
crescunt, recta & minuta, breuiāque  
colore subrufo, & cortice extenso non  
ragoso, qui cortex non ita facilè vngue  
à ligno abraditur: nodulos plures, &  
internalla habet, & in medio laues ha-  
bentur. Si verò frangantur, quasi pul-  
uerem emittunt, odore omnia vincen-  
tem. Ferè enim hæc maxima probatio  
Cinnamomi est, quod sit omnium re-  
rum odoratissimum. Quibus gravissi-  
mus accedens author Aristoteles Cin-  
namomum furculum esse testatur lib.  
1 x. cap. x i i. de historia Animalium,  
sic inquit. In Arabia & Auis Cinna-  
momus appellata, quā furculos Cin-  
namomi portare, & nidum ex his con-  
ficere aiunt. Nidificat excelsis arbori-  
bus, & ramis, ferè incolæ sagittis plum-  
batis nidum petunt, atque ita discussio  
in terram, Cinnamomū legunt. Adhæc

Cinnamo-  
mum est  
Virgultū  
pumilæ ar-  
boris.

CINNA-  
MOMVM.  
Sij. de Cin-  
namomo.

*Cinnamomum virgultum tenax  
Hellebori radicem modo.*

Cinnamomū furculacetum esse virgultum fatetur Galenus loco superius citato, vbi ait plura apud Imperatores extare Cinnamomi genera, quorum nullum veluti truncus in ramos plures diuisum multū attollebatur, sed Hellebori figuram præ se ferebat, vel potius Damafonij. Quibus palām est Cinnamomi virgulta adeo tenuia haberi, vt Hellebori, vel Damafonij radices non excedant. Adde quod quum ipse dicat Galenus ramulosus accepisse Cinnamomi, non cortices ex eo quod à Traiano, & Hadriano imperatoribus repositū fuerat, vel eos quidē ramulosos apud se seruasse, facile constabit omnibus Cinnamomi virgultū esse tenue, & nō solum in ipso cortice, sed in ligno odoratam reperiri facultatem. Quandoquidem si Cinnamomū cortice tantum præstitisset, cur prætulerit Dioscorides ramulos, quemadmodū & Galenus, sanē non video. Quamobrem Lusitano fabulā hanc ego tantum acceptam referā, præsertim cum præter assignata testimonia nemo sit, Lusitano excepto, qui Venetiis, quod vulgare Cinnamomum ex India affertur, perindē ac Antuerpiam, vnquam viderit, repereritq; Cinnamomi virgultum, quod genuinum repræsentauerit. Nimis quoq; vana est opinio, qua credit Galeni tempore nō eam fuisse Cinnamomi penuriam, quālē recentiores quidam existimant. Id quod Galeni ipsius testimonio falsum esse conuincitur. Ipse enim libro primo de Antidotis, vbi Cassiā expendit, sic inquit. Hæc aduersus Quinti dictū obiecta sint, eod quod mihi reiiciendū omnino non videtur. Porum præceptū, qui pro Cinnamomo duplum Cassiæ imponendū censent, quanquā eam semper Cinnamomum impouerim. Nam quibus ego Romæ antidotos composui, cum vel Imperatorum amici, vel diuites essent, facile fuit illis Cinnamomum à Regibus petere, iis verō Cinnamomū emere. Hæc itaque Galeni sunt verba,

*Lusitanus opinia Cassiæ.*

*Cinnamomum Galeni tempore etiam.*

quibus facile quis certior fieri poterit, an Galeni tempore tanta fuerit Cinnamomi copia, quantā Lusitanus describit, vt suam tueatur fabulam. Non enim fuisset opus medicis aliis pluribus, qui Romæ Galeni ætate florebat, suis in theriacis modō Cassiæ duplum, modō Carpesium (vt Quintus) Cinnamomi loco substituere, si genuini consequēdi Cinnamomi illis tam amplā fuisset facultas.

#### LACCA ARABVM

CONSULTVM longē melius (mea quidem sententia) fuisset Lusitano, si poetica potius quā medica facultati se totū addixisset, nam qui eo in effingendis fabulis aptior, promptiorq; se præstiterit, video profectō neminem. Id enim omnibus palām fiet diu in re medica versatis, qui diligenter istius intuebuntur Centurias, in quibus innumera sese offerunt figmenta, adeo rem seriā præ se ferentia, vt ea quis difficillimē fabulas esse noscat, nisi medica facultatis fuerit rectē peritus. Verum cum ad hoc illum natura pepere-rit, mirandum sanē non est, si à fabulādi facultate discedere nequeat, sed potius illi venia dāda: quippē qui diu propria agat natura, qua in præsentia ductus de Mauritanorum Lacca scripturus euadere non potuit, quin fabulosi aliquid admisceret his verbis. Qui huc vsque Cancamum Laccam esse putarunt, miro errore deprehenduntur, cum Cancamum Gummi odoriferum sit, Lacca verō siue manfa, siue suffimentis explorata inodora percipitur. Quam hodie Lusitani ex India afferunt rubram, translucidam, tincturis præcipuē deseruientem, & ex ea Officinæ compositionem quandam præparant, Dialaccam appellatam, quæ (vt certō scimus) non gummi, aut arboris, plantæve alicuius gutta est, sed potius formicarum alatarum sterces, fænaq; velut cera apum. In regno igitur Pegu dicto apud Indos cum terra, vel pluuia, vel arte plus iusto irrigatur,

*Censura Viri de Lacca Arabum.*

*Lusitani Centuria fabulosa.*

*Lusitani Lacca hinc florica fabulosa.*

form

*Lusitani  
fabula ex  
ploditur.*

formicæ prædictæ ligna quædam subtilia ab incolis sic disposita in altum ascēdunt, in quibus Laccam generāt, & hac de causa in Lacca ligna ipsa percipimus, quæ dubio procul arboris nō sunt Laccam ferentis, vt hucusq; omnes ferē crediderūt. Hæc illius est fabula. Atqui illi maximē refragatur Ludouicus ille Romanus libro sextosui nauigationis, vbi de his agit aromatis, ac mercimoniis, quæ Sumatra insula, siue Ta-probana mittit, siue inueniens. Mittit etiam ea regio Laccam, vnde conficiunt rutilum colorē. Gignitur hæc in arbore inglandibus nostris haud absumili. Hæc ille. Cui subscribit Ioseph Indus cap. cxxli. vbi fatetur in Cambaia Lac-cā vberius nasci, quā alibi gentiū, nō autem fieri, gignue formicis, aut scarabæis, vt lepidius & facietius quā verius fabulatur Lusitanus. Præterea cum duplex sit Lacca, quæ Alexandria Aegypti Venetiās cōportatur, altera lignis quibusdam inherens Sumatri à Sumatra fortasse insula nuncupata, altera Cambaiti à Cambaia denominata, in glebas Myrrhæ instar cōcreta, nulli inherens ligno, non est, cur Lusitani fabulam, historiam putem. Siquidē gleba illa sole clarius palām facit. Laccam gummi esse arboris, non quidē, vt per somnium vidit Lusitanus, formicarum alatarū sterces, quibus etsi vbique scatet tota Europæ regio, nusquā tamen visæ sunt alate formicæ, quæ Laccam, aut simile aliud excernerent. Cæterum quum satis superq; nobis comprobatū sit in Commentariis in Dioscoridem editis Mauritanorū Laccam. & Græcorū Cancamum esse eadem, adeo vt pluribus id comprobare testimoniis non sit opus, cadit, peritq; Lusitani sententia, quam sequi nemo debet.

## ELAEOMELI.

*Censura  
in de Elco  
rele.*

TRIPLICI se pariter implicat errori in Elæomele, quod ipsum defluere suo more fingat ē Palmarum caudicibus. Tum quod hinc duo liquorum ge-

nera putet apud Dioscoridē defluere, non vnum tantum, Mel nimirum per se & Oleū ex eadē arbore manātia. Præterea vt noui semper aliquid apporet, quod hunc liquorē ex Indica nuce credat distillare. Deprehēditur in primis error ex ipsiusmet Dioscoridis verbis, qui Elæomelis historiā ita præfatur. In Palmyris Syriæ, quod Elæomeli vocant ex quodā caudice manat oleū melle crassius, sapore dulci. Quibus palām est de vno tantum liquore scripissē Dioscoridē, nempe de Oleo, quod ob mellē daleccedinem vno verbo tantum Græcis *Ελαόμελι* vocatur, nam & capitis titulus *πρι Ελαομελιος* habet, nō autē *πρι Ελας ητι μελιος*. Præterea ex Dioscoridis historia nunquā probari poterit Elæomel ē Palmarum caudicibus fluere, quum is nusquam descriperit caudicis illius nomen, à quo in Syria funditur. Sed esse falsum palmas liquorem hūc fundere manifestō fatetur Plinius libro xxxiii. cap. iiii. vbi ex Olearum quarūdā truncis, non ex Palmis fluere Elæomel affirmat. Quod autem ex Indica nuce Elæomel manare non crediderim, id sanē mihi licere perscraserim, quod huius historię neminem habeam authorem præter Lusitanum.

## MACER.

CONTENDIT maximē Lusitanus, vt pote qui semper falsa tueri nititur, *Censura in de Macere.* Macin, quo Myristicæ nuces prætextus instar conteguntur, & Græcorū Macerē nihil inter se differre. Cui nisi quæstipuletur, illū seuerus iudex contumacē declarat: tācā sibi arrogat autoritatē, vt certō putet vnūquēque suis debere stipulari deliramentis. Verū quid id nūlla asserat ratione, vel autoritate, ipse meritō nō modō cōtumax fuerit declarāus, sed insolens, vecors, ac delirus. Quippē qui potius errori parocinari voluerit, nihil perpendēs, & aliorū scribere ineptiis, quā veritatē amplecti, ac tueri. Atqui quū nobis in Commentariis nostris in Dioscoridē editis,

*Lusitani  
fabula ex  
ploditur.*

abundè comprobatū sit, cum Græcorum, tum etiam Mauritanorum testimoniis, horum Macim Myrsinū nunc esse tegumentum, ut ipso oculorum intuitu unusquisque videre potest, illorum verò Macerem corticem esse radicis magnæ (ut apertissimè lib. xii. cap. vii. testatur Plinius) non est ut hic pluribus istius Centurionis insolentia, & inscitiam redarguam. Eo itaque se conferre poterunt, qui hæc differentias hætenus non considerarunt.

## ERICA.

Nec minus in Erica hunc decipitum reperio, quippe qui neget contra omnium doctissimorum virorum sententiam eam plantam, è qua vniuersa ferè Hetruria ad mundandas ædes scopas sibi parat, vilo pacto esse Ericam, hoc tantum inani argumento fretus, quòd hæc semel tantum in anno floreat, quum tamen Erica Theophrasti testimonio bis in anno florere debeat. At quàm decipitur. cum non nobis tantum, sed aliis quàm plurimis obseruatum sit plantam, quam Ericam vocamus bis in anno nêpe verno, & autumali tēpore sine vlla controuersia florescere. At cum libro tertio scribat Dioscorides Corim herbam Ericæ foliis provenire, constatq; id Ericam nostrā per omnia referre, palām sit omnibus hanc legitimam esse Ericam.

## ACACALIS.

ACACALIM nasci scribit apud suæ gentis Olysiptonā Lusitanici regni metropolim fructu albo, pusillis margaritis signis, ex planta quadam inter Myricam & Ericam media. Sed quòd ad fabulas redeat, palām facit Dioscorides, qui scripsit Acacalim semen haberi Aegypti fruticis Myrica semine simili, non autem Acacalim fruticè esse Myricæ similem. Cæterum cū duo sint Myricæ genera, alterum fructū gerens quæ florem compage museolum, al-

terū verò Galia similè, videat obscuro, qui rem medicā profitentur, quàm negligenter Dioscoridè legerit Lufitanus, quā & qua auctoritate, vel ratione ductus affirmare ausus sit Acacalis semen pusillis margaritis non esse ab simile: quā antiquorū quispiam (quod sciam) nusquam id scriptis commendauerit.

## PALIURVS.

IN PALIURO confundens historiā pede prolabitur, siquidem putat Dioscoridis Paliurum & eam, de qua libro iii. cap. xvii. de historia plantarum tradidit Theophrastus, & Galenus octauo de simplicium medicamentorū facultatibus, illam esse arborem, quam Agrifoliū vulgò vocamus, folio lauri, per ambitū aculeato, crasso, ppetuoq; fructu Rusci modo rubente. At tã Dioscoridi, quàm Theophrasto citato loco Paliurus frutex est, non arbor, & semē in siliquis profert, fuliginosum, mansu lentorem relinquens, seminis lini modo. Id quod in Agrifolio nusquam spectari potest, cū baccifera sit arbor. Nec propterea negauerim Agrifoliū aliud esse Paliuri genus, quod (ut ipse quoque Theophrastus inquit libro & cap. iiii. de historia plantarum) in Africa nascitur, quum notis omnibus illam referat. Verū nō ob id affirmauerim Agrifolium alterum illud esse genus, quod siliquis profert. Sed cū Lufitanus fortasse audierit Agrifolium inter Paliuri genera haberi, nec vnquam legerit Paliuri differentias apud Theophrastum, nulla adhibita distinctione pro omni Paliuro Agrifolium adducit. QVIN & in hoc decipitur, quòd certò crediderit Paliurum à Plinio descriptum libro xii. cap. xi. & à Theophrasto libro & capite quarto esse Dioscoridis Paliurum. Error sanè per se patet, quòd Dioscoridi Paliurus semen in siliquis ferat, Theophrasto verò & Plinio citatis locis fructum ferat rubrum siliquis nullis interzum. Nam tametsi siliquarum nō meminerit

Censura  
xij. de  
Palma.

Censura  
xi. de  
Erica.

Erica bis  
in anno  
floret.

Censura  
xij. de  
Acacali.

Myrica  
duo genera  
sunt.

meminerit Dioscorides, sed tantum seminis, quum tamen rara in arboribus sint semina, quæ siliquis, vel vasculis quibuslibet non asseruentur, non temere censeri potest siliquas prætermisisse Dioscoridē. Nam si de Africana Paliuro scripsisset is, fructus meminisset non seminis. Adhæc quum Theophrastus Paliuro siliquas ferenti easdem tribuerit tum vires, tum qualitates, quas suo red didit Dioscorides, ambigendum sanè non est, quin Dioscoridis Paliurus semen in siliquis ferat.

## RIBES.

*Censura  
xvi. in Ri-  
bem.*

MAVRITANORVM Ribem vulgi opinionem sequutus eam arbusculam censet hortis, & viridariis familiarem, quæ folio exit vitigineo, paruo, albæ Poptulo æmulo, ramulis lentis, obsequiosisq; topiariis aptissimis, è quibus fructus racematis dependent, acinis magnitudine piperis, rubentibus, sapore subacido. Sed manifestè refellit eum Serapio (Ribes enim Arabica planta est) Ribem asserens esse arborem capreolos proferentem colore viridi rubescente, foliis latis, magnis, rotundisq; : quæ quidem notæ in nostra Ribe omnes desiderantur. Vulgaris enim Ribes nec fert capreolos, nec lata, nec magna, nec rotunda folia, sed parua, vitiginea, & diuisuris per ambitum laciniata.

*Ribis legi-  
tima histo-  
ria.*

## ROSÆ DAMASCENAE.

Quo in altum magis in hoc turbulento mari vela facio, eò flagrantius ad portum aliquem me receptum velim. Tædet profectò cum istis ineptiis me diutius ad nauseam usq; consiliari. Sed quid agam? In portu erat respiciendum, nunc danda vela, quæcunque se offerat molestia. Maxime cum ita diluantur ipsius nugæ, vt hinc ad seriam reuocemur. Audite quæso lepidam hominis peritiam. De Rosis enim scribēs, quas Damascenas appellat, quasque vulgus Moschettas vocat, quòd odoris

forrasse fragrantia Moscum respiciant, non solum has non minori vi deiectoria pollere existimet, quàm Scammonia, sed exitiosissimum esse medicamentum pariter contendit. Hoc vt confirmat, anilem prorsus huic subtexit fabulam, quòd Venetiis viderit (liceat mihi nunc suo vti testimonio) nobilissimam quandam suæ gentis mulierem Beatricem à Luna vocatam, quæ quum semel tantum saccharum ex hisce Rosis paratū à medico quodā Veneto tanquam medicamentū quod nullo incommodo aluū cie- ret, degustasset, statim faucibus & lingua desquamnationem, quin & ventriculi erosionem contraxit. Nihil ad me attinet de illa, quam adducit, muliercula. Primum (vt ego mihi testis esse possum) id contra Lusitani sententiam maxime pugnat, quum sapius ipsemet id sumpserim medicamentū, aliisq; frequenter dederim sine vilo prorsus incommodo, adeò vt quandoque pueris felicissimè propinauerim. Præterea non magno negotio deprehendi potest Lusitani iudicium esse falsum, quòd māsā hæc rosa nullam penitus gustui relinquat acredinem, sed tantum se ostendat tum adstringentem, tum etiam subamaram. Id quod manifestè indicat, vt nulla faucium, aut linguæ erosio, inflammatione hinc degustantibus accedere possit. Mihi enim hæc rosas sæpe mandenti, vt quandoq; adstrictam excitarem aluum, nihil erosionis, inflammationisq; accessit. Quo fit, vt quis rectè opinari possit, suo inconstanti iudicio delusum esse Lusitanum, vt potè qui huiusce medicamenti facultatis penitus ignarus, symptomatis illius causam in illud perperam reiecerit. Cum potius credendum sit id ab acrimia, salforumque succorum defluxu provenisse, qui fortè fortuna eo tempore, quo rosaceum illud saccharum mulier illa sumpsit, à capite in eas partes labi cepit. Nec parauerim vnquam medicum illum Venetum, quem tamen nominare non audeo Lusitanum, adeò excoedem, impru-

*Lusitani  
iudicium  
falsum.*



dentem, negligentemq; fuisse, vt tam nobili, ac diuiti mulieri medicamentum praeberit, cuius ignorauerit vires, praefertim cum ad huiusmodi ditissimos aegrotates ij plerunq; accedant medici, qui primas in ciuitatibus tenent. Atqui magis sane demior hominis imperitiâ, quod tam acriter damnauerit has Damascenas Rosas odore per quam suauifragrantes, et quibus clementissimū illud paratur medicamentum nullo penitus incōmodo aluum ducens. Contrā verò tam magnis laudibus praeulerit ad eandem exoluendam Persici arboris flores, quin & syrupum ex eorundem diluto paratum. Quandoquidem (vt iam sexcenties obseruauimus) Persici arboris flores ad ducendā aluum deuorati, incommodis quam plurimis fumentes afficiunt, nempe crebris, vomitionibus, ventriculi & intestinorum torminibus, animi deliquio, & crebris alui defectionibus, quae omnia plerunq; sequitur frigidus sudor, astuatio, virium amissio, & corporis vniuersi imbecillitas. Praeter id, quis nam Amathum hunc merited *Amathum* non appellauerit, cum eo ignorantiae peruenisse constet, vt certo sibi persuaserit Ieleniabine Persicis rosas paratum, de quo pluries in febrium curatione, & ventriculi dolore meminit Auicenna, ex Persici arboris floribus parari debere? Sed quam falsa, acridenda teneatur opinione, luce clarius ostendit ipsa medicamentī nomenclatio, quippe Ieleniabine Magritanis omnium praclarissimorum medicorum consensu nil aliud designat, quam Mel Rosaceū. Sed quonā pacto Rosaceum Mel ē floribus Persici arboris parari possit (ah, ah, ah praerisu scribere ferē nequimus) qui sciunt, doceant, quum id haecenus nec viderim, nec legerim vsquam. **C**onstat enim per Rosas Persicas nil aliud voluisse Auicennam, quam Puniceas. Siquidē libro quinto, vbi is de compositione medicamentorū omnium egit, de quibus in vniuerso meminit volumine, Ieleniabine ad febres, & ventriculi dolo-

res parari iubet ē rubeis Rosis, non autem (vt Lusitani vana fert opinio) ex Persici arboris floribus. Id quod manifestē indicat, nil aliud Persicas Rosas Auicennae designare, quam Puniceas, Persicas ille fortasse vocatas, quod à Persis in suas venerint regiones. Nam nos Damascenas vocamus eas, de quibus diximus, quod ē Damasco Syriae primò ad nos peruenirent?

## PALMAE INVOLUCRUM.

**F**ALLITVR Praeter id Lusitanus in ea examinada palma, quam Graeci *ἐλάτη* vocant. Is enim nil aliud Palmae Inuolucrum *ἐλάτη* Graecis vocatū primū esse existimat, quam Nucis Indicae villosū tegumentum, hoc tamen argumēto fretus, quod Nux Indica vocata ab arbore proferatur (vt referunt qui in Indiam peregrinantur) Palmae simili. Deinde verò sua fortasse inconstantia ductus, in eiusdē capitis processu, reuocata priori sententia, (quitaliū pererratum est mos) nil aliud tandem affirmat apud Dioscoridē esse Elaten, quam Palmae germen, quod Graecis *Ενκεφαλος* dicitur, ea ratione innixus, quod scripserit Galeus libro octauo de simplicium medicamentorum facultatibus, id rectē Elaten vocari. Sed gemino hic se implicat errore. Quandoquidē Dioscoridi Palma Elate nil aliud est, quam fractus Palmarum adhuc florecentium inuolucrum, calixq; non nucis alicuius tegumentum, nec germen. Indicē enim Nucis nusquam meminit Dioscorides, nec (quod si uerum, legerimus antiquorū aliquis. Quo fit, vt censendum sit, huiusce Nucis inuolucrum nunquā antiquis, innotuisse. Porro Palma arbor, quae dactylos proferit (id quod penitus ignorare Lusitanum non ambigimus) primò inuolucrum magnum edit folliculi cuiusdam instar, in quo quā plurimi flores includuntur, qui longo pediculo serie quadam pendentes racemento cohaerēt; id tractu temporis dehiscit, emergūtq; flores. Carpitur deinde inuolucrum ad plura vtile: idq; est, quod

*Insensibilis in re medica esse non potest.*

*Lusitani inoleuita bene inferunt.*

*Rosa Persica quae a pul. Auicennam.*

*Censura xvi. in Palma in uolucro.*

*Palma Elate Dioscoride quid.*

*Palma Elates infra via.*

quod Dioscoridi Elate appellatur: quæ  
 si non ignorasset Lusitanus, non ita for-  
 tassisè facitè, dum duabus vult insidere  
 fellis, duabus hinc parietibus caput im-  
 pegisset. Nec nobis sanè obstat Galeni  
 autoritas, qua nititur Lusitanus. Siqui-  
 dem Galenus loco superius citato, duo  
 facit Elates genera, vnum quod ger-  
 men est ipsius Palmæ, aliud verò tegu-  
 mentum, de quo tantum scribit Dio-  
 scorides, cui etiam Elates duo produn-  
 tur genera, quorum vnum illud est, de  
 quo diximus, aliud verò id totum, quod  
 inuolucro illo concluditur, quorum  
 nullum Nucis Indicæ regumentum, nec  
 Galeni Encephalon esse potest. Cate-  
 rum vt fortassisè probet Elaten plura  
 apud antiquos designare, Plinium in  
 medium affert, quippè qui scripserit  
 libro duodecimo, capitulo vltimo,  
 arborem quandam esse Abietem voca-  
 tam vnguētis experitam, quam alij  
 Elaten vocant, alij Palmam, alij Spa-  
 then. Id quod maximè palam facit,  
 quàm imprudenter velit Lusitanus alio-  
 rum errorum inscitia suam tueri opi-  
 nionem. Siquidem Plinius non satis  
 aptè locutusprehenditur vocabulo-  
 rum similitudine deceptus. Ipse enim  
 cū legisset apud Græcos *δάκτυλ* Abie-  
 tem arborem designare, quia & *δάκτυλ*  
 quibusdam vocari Palmam Elaten siue  
 Spathen, & hanc in vnguētis addi, ma-  
 gno ac pudendo errore putauit, idem  
 esse Abietem arborem, & florescētium  
 dactylorum Inuolucrum, quod ad vn-  
 guenta spissanda expetebat antiquitas.

## PERSEA ARBOR

REPREHENDIT Aliorum opinio-  
 nem, vt vanam, qui Perseam arborem  
 existimant à Persico nosstrate differre.  
 Sed quàm ille totus sit vanus, & quàm  
 magno ducatur errore, facitè quis ani-  
 maduertet ex probatissimorum au-  
 thorum testimoniis. Nam (vt Theo-  
 phrastus memoria prodidit libro quar-  
 to, capite secundo, de Plantarum histo-  
 ria.) Persea arbor est Aegypti aspectu

magna, formosæque folio, flore, ramo,  
 totaque figura potissimum Pyro pro-  
 xima, nisi quòd altera folio perpetuo,  
 altera deciduo est. Fructum abunde pa-  
 rit, omnique tempore perficit. Nouus  
 anniculum semper occupat, maturitas  
 anniuersariorum assilam conficitur, re-  
 liquum crudiorum auferunt, atque re-  
 condunt. Fructus est magnitudine Pyri  
 figura oblongus, Amygdalæ modo co-  
 lore herbidus, nucem intus habet, vt  
 Prunum, verum longè minorem, mol-  
 liorèmq. Caro eius suavis, ac prædul-  
 cis manditur, concoctusque facilis, & in-  
 nocua etiam largiore cibo sumpta. Ra-  
 dice arbor exuperat tum longitudine,  
 tum etiam crassitudine, multitudine-  
 que. Materie constat robusta, dura, vi-  
 scosæque decora, veluti Lotus, quapro-  
 pter ex ea, & simulacra, & lectulos, &  
 mensas, & reliqua similia fabricant.  
 Hæcenus Theophrastus. Caterum si  
 Persæ Aegyptiæ nota cum Persico nos-  
 strate conferantur, qua vnuiuersos sca-  
 ter orbis, liquidò constabit hæc plantas  
 nihilò minus inter se distare, quàm à  
 Quercu Salicem. Persicus enim arbor,  
 quæ nostris in hortis, viridariis, ac vine-  
 tis passim frequentissima visitur, pro-  
 cera, magna, formosæque nusquam vi-  
 situr, nihilque cum Pyro cognationis  
 habet: sed potius per omnia Amygda-  
 lum refert. Quin nec fronde perpetuò  
 vires, nec fructum omni tempore per-  
 ficit, nec oblongus is est Amygdalæ in-  
 star, sed orbiculatum in spheræ mo-  
 dum, colore minimè herbido, sed cū  
 maturuerit, aut sub pallido, aut subcan-  
 dicante, aut rubente, aut flauo. Huic  
 ossiculum præter id Pruno minus non  
 visitur, sed quandoque duplo, triplò-  
 que maius, nec illi figura simile, quin  
 nec fractu facilius, sed longè contuma-  
 cius. Adhæc nostratis Persici fructus gu-  
 stu prædulci non percipitur, sed potius  
 subaustero, aut vinoso. Adde quòd vul-  
 garis Persici fructus maximè dama-  
 nerit Galenus libro secundo de Ali-  
 mentorum facultatibus, vt prani succi

aliment

*Galeni  
Elates  
genera.  
Quin etia  
Diosco-  
ridi.*

*Plinij er-  
ror, quon-  
iam  
maximè  
sequitur  
Amathius*

*Censura  
Nij. de  
Persea.*

*Persea ar-  
boris hys-  
ta Theo-  
phrastus.*

alimentum, & qui faciliè corruptatur, & noxam ventriculo inferat. Contrà verò qui ex Aegyptia Persea proueniunt. Postremò Persicus nostràs radicemittit breui non longa, tenui non crassà, rara non multiplici, & proinde rarissimè annosa reperitur. Contabescit, peritque, faciliè, quòd imbecillibus admodum sustentetur radicibus. Ob idque ligni materies illi rara, fungosàque cernitur, nec nisi ad ignem apta, quum tamen Aegyptiæ Persea solida, compacta, pulcherrimàque spectetur, vt potè quæ in multiplices veniat vsus. Quo fit, vt omninò Amatho amentior, & Lusitano lusciosior fuerit, qui non nouerit Perseam Aegypti arborem à vulgari Persico plurimùm, atque plurimùm differre. Id quod etiam comprobatur Plinij testimonio, qui libro

xx. capite xlii. sic scripsum reliquit.  
 Nam Persicæ arbores serò, & cum difficultate transferre, vt quæ in Rhodò nihil ferant, quod primum ab Aegypto eorum fuerat hospitium. Falsum est venenata cum cruciatu in Persis gigni, & pœnarum causà à Regibus translata in Aegyptum, & terra mitigata. Id enim de Persea diligentiores tradunt, quæ in totum alia est, nec extra orientem nasci volunt. Eam quoque negauerunt eruditiores ex Perside propter supplicia translata, sed à Perseo Memphisaram, & ob id Alexandrum illa coronari victores ibi instituisse in honorem arauis sui. Semper autem folia habet, & poma, subnascentibus aliis. Hæc Plinius. Verùm non modò hic & pariter Theophrastus destrunt Lusitani enanidam sententiam, sed etiam grauissimus author Galenus, qui libro secundo de compositione medicamentorum secundum locos, manifestè testatur in nulla alia Romanis subdita gente vidisse Perseam arborem, præterquam in Alexandria Aegypti. Sed vbi rerum testimonia adfunt, quid opus est verbis? Hoc tamen tantùm addam, quòd cum per longas ante Gale-

num ætates Persicus, vulgaris notitiæ arbor, vniuersam occupauerit Græciam, Italiam, ac alias passim regiones, si Persicus nostràs ab Aegyptia non differret Persea, nullo pacto credendum est, eò dementiæ peruenisse Galenum, vt posteritatis memoriæ commendauerit, nusquam gentium vidisse Perseam, nisi tantùm in sola Alexandria:

#### FLUVIATILES CANCRI.

Quum Lusitanum de Fluiuatilibus Cancris differrentem legerem, tenere me non porui, quin in vehementem solueret cachinum. Siquidem illum eo inscitia peruenisse offendi in hisce censendis, vt Aquatiles Testudines Cancrorum affirmauerit esse genus eò grauissimo argumento impulsus, quòd hæcticis, & lenta febre laborantibus maximè commendentur. Olepidum caput, sine helleboro tibi cerebrum demulecam. Serióne hæc dicuntur ab Amatho an risum sua vecordia mouere studet? Nimirum adducor, vt credam (si id serió fatear, quòd sentio) aliquo amentia genere illum quandoque vexari, & proinde tunc temporis non nisi huiusmodi deliramenta describere. Nam & Ranæ, & Cocleæ in Cancrario genere erunt, quòd hæcticis maximè conferant, si potius Lusitani delirio addicimur, quàm veritati.

#### MARINVS SCORPIO.

MARINVM Scorpionem paruulum quoddam putat esse animalculum, quod ex Cancrario genere existimauerim (vidimus. n. illud sæpè in Hadriatici litore tanquam inutile à Piscatoribus reiectum) longis, ac tenuibus cruribus, corporis forma terrestri scorpionis simili, chelis pariter tenuissimis, cauda nulla, & omni penitus pulpa carens. Gulielmus Rondeletus libro xviii. cap. xlii. de Marinis piscibus animalculum hoc Cancrum *καρκινον* vocat. Verum Aristoteli, Nicetio, Galeno, Athæneo

*Censura  
xix. de flu  
uati lib.  
canceris.  
Ridenda  
Lusitanus  
amentia.*

Athæneo, Plinio, Aelianoque Scorpius pelagijs est piscis, & inter nullos asellos, lacertos, cernuas, & quotquot sunt, alios duræ carnis recēsetur, non autem in Cancrario genere. Quum autē eius historiam in commentariis nostris in Dioscoridem pluribus descripserim, & veram Scorpionis imaginem appinxerim, eò se conferre poterit Lusitanus, si cæcitatē suæ remedium nō neglexerit.

## RANAÆ.

*Censura  
xii. de Re  
med.*

Vbi Ranarum vires expendit Lusitanus, proculdubio aberrat, quòd omnes in vniuersum Ranas venenosas censet, adeò vt in Aetium inuehatur, quòd is lib. i. i. cap. l. v. palustres ranas inter venenatas recenset, & tamen libro secundo earum ius tanquam alexipharmacum prætulit ad venenatorum reptilium ictus. Error nimis est manifestus, quòd quotānis infinitis ranarum numerus Italis in cibum veniat ex his, quæ in paludibus, & scrobibus morantur, & nullo tamen incommode comedentes afficiunt. Nam si (vt Lusitanus inquit) Ranae omnes venenosæ essent, nulli dubium est, quin quā plurimi earum esu interirent: quum non desint homines innumeri, qui iis tantum sæpius fientur, nulla ob id accedente noxa. Nec sanè sententiæ nostræ obstat, quòd Galenus lib. de Cibis boni & mali succi scriptum reliquerit, à Ranis esse abstinendum. quippe is ranas non testatur, quòd veneno aliquo sint infectæ, sed quòd malum in corpore succum procreant, perinde ac pisces in stagnis & paludibus degentes. Quippe si Galenus putasset venenosas esse Ranas, nunquam eas inter cibos retulisset. Sed magis fortasse Lusitanus credo lege percitus Mosaica, quā veritatis sustinendæ desiderio in Aetium inuectus est, quem (pace eius dixerim) non intellexit. Ipse enim libro secundo de Viribus animalium agens, quæ in vsum medicum veniunt, vbi deuenit ad pa-

*Lusitani  
Religio.*

lustres Ranas, quæ passim ab omnibus eduntur, Rana palustres (inquit) in aqua elixa, salæque & modico oleo cōdita, venenosorum reptilium ictus, si ius earum bibatur, magnum præsidium afferunt. Id quod ex Dioscoride deprompsit, qui pariter de his egit iisdem verbis. Quibus manifestè suffragatur Plinius libro xxx i. capite quinto, vbi non modò Ranarum ius prætulit contra serpentium ictus, sed etiam ad Marini Leporis venenum, hausta venena, deuorata Rubetam. Salamandramque iis laudibus prætulit. Nec ob id velim fortasse puter Lusitanus Aetium sibi ipsi repugnasse. Quippe qui dixerit libro xii. quòd deuorata palustres Rana tanquam venenosa variis, ac multis vexet incommodis. Quandoquidē ibide palustribus Ranis non egit, quæ in cibum veniunt, sed de venenosis, quæ Bufonum sunt genere, & in paludibus præsertim fetidis morantur. Ipse enim cū proximo capite de Rubetis Ranis egisset, quas Bufones alij appellat, voluit de aquaticis etiam Bufonibus, quos Graeci sub Rana palustris nomine comprehenderūt, verba facere, quoniam sciebat Bufones, & terrestres, & aquatiles reperiri, vt vnumquemque cōpertum habere non ambigimus, qui diligentius, accuratiusque materia medicæ operam nauarit, quā fecerit Lusitanus. Id quod manifestè declarat libri illius titulus, qui de noxiorum animalium morsu, & de bestiis virus eiuculantibus inscribitur, Nam & idem legitur apud Dioscoridem, quippè qui libro secundo de Ranis, quæ in cibum veniunt, egit, sexto verò, vbi peculiariter de Venenis, & venenatis animalibus tractauit, de Rubetæ, & palustris Ranae curatione caput proprium edidit. Adeò vt iam nobis fateri liceat, nequaquam in re medica Lusitano esse ad stipulandum.

## GALLINAE.

Atque nulla mihi amplius est con-

tentio

*Lusitani  
in re me-  
dica non  
esse astra  
pericula  
Censura  
xii. de  
Gallinis.*

tentio cum Medico, optimè lector, verum cum solertissimo degustatore, vel coquo potius, quo plurimum recreatur officio regalium epularum: Gallinas inferioris Germaniæ præ nimia algoris inclementia carnes habere scribit hircinis, vel caprinis deteriores, & proinde malū, vitiosumque præbere alimentum, quin & raro ibidem homines idcirco vesci gallinis. O indagatorem omnium eduliorum. Patere id me te percontari. Quis amabò te ibidem Princeps suis præfecit culinæ, vt istis eum spoliare delitiis? Id quum ego mecum admiratus Flandris quibusdam exponerem, fabulam esse aiebāt. Quippe quòd non minus in eorum regionibus carniūm probitate, saporisq; iucunditate præstent gallinæ, quàm alibi. Adhæc pariter fabulosum esse fatentur, quòd raro gallinis ibidem vescantur incolæ, ea ratione innixi, quòd earum cibus reprobūm generet alimentum, sed quòd multi fortasse à gallinis abstineant sumptui parentes. Quòd autem præter rationem ij medici agant (vt ait Lusitanus) qui post exactam purgationem ad ventriculū abstergendum ab inhærente medicamento simplex gallinarum ius exhibent, sanè non improbanus, sed qui sint ij prorsus ignoramus, quum in communi omnium medicorum vsu perpetuò esse scierim, ius illud hoc in negotio nunquam exhiberi, nisi saccharum admisceant rubeum. Nec id temerè factum putauerim, quum non ambigam ius ita paratum non modò abstergere, sed etiam posse roborare. Id quod à purgatione plurimum præstat.

## LAC SCISSILE.

LAC SCISSILE nil aliud esse censet, quàm lac ipsum simplex per se accensum. Coniunctur ipsius Dioscoridis testimonio, qui huiusce parandi lactis rationem scribit his verbis. Ex omni lacte sit, quod Scissile appellant, hoc modo. Lac scissile nouo seruet, ramòque si-

culneo recenti mouetur, insparsis, postquam bis vel ter efferbuerit, totidem aceti mulsi cyathis, quot sunt lactis heminæ. Ita enim serefcens liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum concreuit, sed cum feruet, ne superfundatur, conueniet spongia ex frigida continuo scissililabrum detergere, sextariumque argenteum frigida aqua plenum demittere. Hæc ille. Dioscoridi subscribit Galenus libro decimo, de simpliciū medicamentorum facultatibus, vbi de Canino stercore egit: quin & Paulus libro primo cap. lxxviii. Non possum satis cogitare, quæ fuerit in homine tanta imprudentia, aut somnolentia, quòd cum tam splendidis enarrationibus explanandum Dioscoridem suscepit, ad cògruū labascaret negligetia.

## OLYRA.

IN FRUMENTACEO genere eam magno errore Olyram censet Lusitanus, quam nos Secalam, & Plinius Secalem, & Farraginem appellat, è qua rustici panem conficiunt nigrum triticeo longè deteriore. Sed cadit Lusitani opinio, quòd Galeno primo de alimentorum facultatibus Olyra colore sit albo, adeò vt dixerit Plinius lib. xiiij. cap. octauo, esse, qui ob Olyræ candorem, illam Oryzæ esse putarent. Præterea scribit idem Plinius ex Olyra dulcem confici panem, id quod ex pane ex Secale còfecto minimè percipitur, cum potius quodammodo amarorè respiciat. Adhæc Secala ita vulgò vocata, cum in area flagellis decutitur, illicò omnem exuit tunica, & tritici modo nuda colligitur: sed aliter Olyræ euenire fatetur Galenus loco superius citato, dū Olyri nos expedit panes, sic inquit. Habet autè Typha semen extrinsecus corticē, veluti Olyra, & Hordeū, verum decorticatum in panes congeritur: & paulò inferius ait. Ex nobilissima, Olyra, cum; vt decet, fuerit decorticata, nominatim Tragum còficiunt, quo pleriq; vtuntur. Quibus

Censura  
xxiii. de  
Olyra.

Censura  
xxiii. de  
Olyra  
lactis

Lactis  
Olyra  
ratiōe  
lao.

Quibus planè constat Olyram decor-  
tari in area non posse flagellis, quem-  
admodum nec Hordeum, nec Zea, nec  
Avena, dum in area cõcutitur, sed opus  
esse, vt in pilis pinsentur, vt etiam hoc  
auro moris est apud omnes.

## CHONDROS.

*Censura*  
*xxvi. de*  
*Chondra.*

EX EA fruge parari Chondrum ex-  
stimat, quam quidam in Italia, vt in Tri-  
dentino agro, Scandellam vocat: quod  
merito redarguit omnium agricolarum  
consensus, qui dicunt hanc esse Hordei  
genus, non Zea. Hordei enim plura ha-  
bentur genera, vt quis ex Theophrasto  
nosse potest libro octauo capite quarto  
de plantarum historia. Quæ si rectè ex-  
pendantur, nil aliud Scandella erit,  
quàm Hordeum minus, quæ binis tan-  
tum versibus spicam gerit, rotundiore  
etiam grano. Nam præter id, quòd per  
omnia nempe facie, & viribus. Hor-  
deum referat, constat non esse Zeam,  
quam Dicocon appellant, quòd nun-  
quam Scandella reperta sit, quæ Zea  
illius modo in geminis putaminibus  
coniunctum semen habeat. Quo fit, vt  
nullo pacto Scandella inter Zeas recen-  
seri possit. Zea autem Dicooco abun-  
dat Goritienfis ager, & Foroiulienfis  
arua, ibique vulgo Pirra Farra dicitur,  
quòd Zea ibi ab incolis in vniuersum  
Pirra vocetur. Cæterum quia ex hoc  
Zea genere Halicam, siue Chondrum  
sibi parant, quam ipsi Far appellant, li-  
cet falsò (differt enim ab Halica Far)  
ideò eadem Pirra Farra nominatur à  
ruricolis. Huic alius eius affinis est er-  
ror, quòd scripserit, putaueritque Far  
ab Halica nihil differre, idque ex Scan-  
della parari, quam Zeam Dicocon  
cèset. At Plinij testimonio Far nil aliud  
est, quàm frumenti, vel tritici genus  
Adoreum vocarum. Ille enim li. xvi. l. i.  
cap. v. l. i. ita scriptum reliquit. Fru-  
mentum genera non eadem vbique, ne-  
que vbi eadem sunt, isdem nominibus.  
Vulgarissimum Far, quod Adoreum  
veteres appellauerunt. Item eodem capi-  
te, vt palam faciet et aliud esse Zeam, è

qua fit Halica, aliud verò Far, Qui Zea  
vtuntur, inquit, non habent Far. Item  
capit. v. l. i. eiusdem libri, populum Ro-  
manum, ait, Farre tantum è frumento  
trecentis annis usum. Verrius scribit,  
Quo tempore Romanis nullus fuit Ha-  
lica vsus, vt ipse met testatur Plinius li-  
bro xx. l. i. capite xxv. cum inquit. Ha-  
lica res Romana est, & non pridem ex-  
cogitata, neque arbitror Pompei ma-  
gni ætate in vsu fuisse. His accedit Ascle-  
piadis, & Galeni authoritas libro septi-  
mo de compositione medicamentorum  
secundum locos in quodam ecle-  
gmate ad cruenta sputa, vbi sic habet.  
Farris Clusini appellari sextarij dimi-  
dium, decocti Marrubij viridis sexta-  
rium vnum. Hæc in vas vitreum conie-  
cta per diem & noctem macerari finito,  
sequenti die pharmacum molito, quem-  
admodum Halicam maceramus. Hæc  
Galenus, quibus palam est à Farre dif-  
ferre Halicam. Galeno subscribit Aë-  
tius libro ix. capite xl. v. his verbis.  
Quod verò latine in regionibus Romæ  
vicinis Far appellant, hoc modo para-  
tur. Frumentum modico tempore aqua  
madefacito, indeque extractum, ac in  
pilam cõiectum, veluti Psisanam à cor-  
tice repurgato, vbi verò corticem ex-  
uerit tollito, atque in sole siccato, de-  
inde manibus tritum, donec penitus à  
cortice fuerit mundatum, crassissimè  
molito, ita vt granum vnum in qua-  
tuor aut quinque partes redigatur, &  
siccum asseruaro. Vfus autem tempore  
Halicæ modo coquitur, & à fanis in  
cibum sumitur. Hæc ille, ad quæ certè  
pertingere debuerat ille magnarum  
centuriarum constructor.

## PHASEOLVS.

PHASEOLVM, siue Phasiolum, non  
paruam illam, & vulgarem, quam Ga-  
lenus Ochron appellat, sed magnam  
esse Eruiam falsò contendit. Quando-  
quidem Eruiia illa maior latinis Pi-  
sum dicitur, non autem Phaseolus. Dif-  
ferre autem Phaseolum ab omni Erui-  
lia & Pise testis est Plinius lib. xv. l. i.  
capite

*Censura*  
*xxvi. de*  
*Phaseoli.*

*Far ab*  
*Halica dif-*  
*ferre.*

capite v. 1. sic inquit. Frumentis folium harūdinaceum, Fabæ rotundum, & magnæ leguminum parti. Longiora Eruiiæ, & Pifo. Phaeolis venosa. Quibus palām est, nec Eruiiæ genus, nec Pifum esse Phaeolum. Constat præterea Eruiiæ cuiusque generis, vel Pifi siliquas elixas in cibus à nemine mandi, quod aded dura sint cartilagine, vt nullo mansu dentibus confici queant. Contra verò vulgaribus, genuinisque Phaeolis accidit. Id quod idem faretur Plinius capi. x. 1. eiusdem libri, vbi sic habet. Siliquæ rotundæ Ciceri, cæteris leguminum longæ, Pifo cilindriacæ, Phaeolorum cum ipsis manduntur granis: id quod nostris Phaeolis vulgaribus accidit. Nam tenellas eorum siliquas suis granis refertas, modò in acetariis Asparagorum modo, nunc vnà cum brassicis elixas, ante maturitatem æstas te comedimus, quod tamen nulli alij leguminum generi à natura datum esse comperimus. His itaque palām est Phaeolum Dioscoridi nullam esse Eruiam, sed vulgaris vsus Phaeolum, qui passim in campis feritur. Quippè non tantum folia illi insunt (vt Plinius inquit) venosa, sed (vt Dioscorides ait) deuoratus inflat, spiritus ciet, & ægrè concoquitur. Quinetiam viridis cum siliqua sumptus aluum emollit. An non in idem cadit erratum, quum Eruiam, quam confundebar cum Phaeolo, Dolichum à Theophrasto credit appellari: quum Dolichum ille testetur apertè adactò longo palo confurgere. Id quod maximè denotat, Dolichum nil aliud esse, quàm varium Phaeolum illum, qui Dioscoridi Hortensis Smilax dicitur. Quippè in primis hic longissimos ascendit palos, quibus Lupi Salictarij modo se circumuoluit, nec alibi, quàm in hortis feritur. Quinetiam eius siliquæ simul cum granis, perinde ac aliorum Phaeolorum manduntur in cibus. Id quod in præfatione secundi libri de Alimentorum facultatibus testatur Galenus, & Paulus Aegineta libro pri-

Censuræ  
xxviii. in  
Dolicho.

mo. Atqui si pluribus inanem suam velit sententiam confutari, commentarios nostros in Dioscoridem consulat. Plura enim ibi reperiet, quæ hic silentio prætermittenda duximus, ne plantarum potius historiam scribere, quod in alijs vberius exequuti sumus, quàm istius temerarij hominis imperitiam, ac negligentiam videamus, aperire, quod iam nostrum est institutum, sed id breuiter: ne, si omnino tacuerimus, ille sua temeritate in cæteris nostra abutatur modestia, sin copiosius, ne iustum excedamus modum.

LAPATHVM, SIVE RUMEX.

AC IAM Propemodum vereor, ne quis eruditus tandem fastidiat in audiendis innumeris, & turpissimis istius hominis erratis. Quæ si nuda in medio ponerem, cui non ista stomachum moueant? Nunc ita vniuscuiusque occurrere studeo prudentiæ, vt non parum hoc quémque consolari debeat, quod in huius refrenanda audacia plura interea à nobis afferuntur non infrugifera, & (nisi me spes fallit) non indigna eruditis auribus. Id vnum siquidem hic vbique laboro, vt & Lusitani, qui tam inficè, ac improbè aliorum versat scripta, patefiant audax inficitia, & veritas simul in his tenebris non sine lectoris emolumento elucescat. Verum sic à nobis vtrunque est peragendum, vt plura, & absolutius nos aliàs de his acturos meminerimus, vtq; contra Lusitani insultos, ac imperitiam non parur hinc quoque roboris, & Incis acceda. Quare (quod in cæteris sum facturus) iam accedam ad ea, quæ de Spinachio, seu Rumice ille profert. Nam quod hortense olus Spinachium nobis passim vocatum, Satiuum Lapathum esse asserat, meo certè iudicio longissimè aberrat, quod Spinachium cum Rumice, vel Lapatho nihil habeat cognationis, siquidem nec folio, nec caule, nec flore, nec semine, nec radice Spinachium Lapathum simile cernitur, quemadmodum nec gustu, nec viribus. Constat itè

Censura  
xxix. de  
Rumice.

Galenum

Galenum (& si contrarium fortasse somniauerit Lusitanus) Spinachij, quin nec Hortensis Lapathi meminisse inter olera, sed tantu syluestris Lapathi, cum inquit. Licet cuius (vt ante diximus) Lapathum appellare Betam agrestem, vt quod non gustu modò, sed viribus etiam Beta Hortensi est ad simile. Veru cum Beta Lapathu sit suauior, iccirco nemo est, qui non ipsa libentius vescatur. Hactenus Galenus. Quibus palam est Spinachium Lapathu esse non posse, nam prater id, quod Spinachiu nihil cum Lapathu habere similitudinis, syluestre olus non est, sed hortense. Quo fit, vt syluestris Beta etiã appellari nequeat. Adde quòd Spinachium suauius, & cibo gratius olus sit, quã Beta. VANE idem sibi persuadet Lapathum communis vsus nunquam in ciborum vsu concessisse, cum Galenus loco iam citato, vbi syluestre Rapum inter olera, quæ comeduntur, recessit, & syluestre appellari Betam. Quinetiã & Tridentina, & Goritienſia rura, toriusq; ferè Italiæ agrestes homines id maximè comprobant, cum vere Syluestris Lapathi plurimùm manducant, quòd eo tempore tenella habeat folia.

## CHONDRIYLA.

CHONDRIYLA Dioscoridi caulem, flores, & folia habet Cichorio similia, adeò vt inter Cichorij species veniat numeranda, tenuior tamè tota Cichorio est. At Lusitanus, qui in Dioscoridis lectione maximè versatum se vbique cenſet, Chondryllam folio esse hortensi Intybo minus rectè scribit. Id quod proculdubio ostendit Chondryllæ stirpem aliquam nunquam vidisse Lusitanum.

## GINGIDIVM.

Nec Errore vacat, quæ de Gingidio cenſet, quippè qui veliſt recentiores quosdã sequutus nil aliud Græcis esse Gingidium, quàm vulgare illud Olus, quòd Cherophyllu, vel Cherosoliu vocant. Atqui Cherophylli folia, pariter

ac radices nihil amaroris, adstrictionisq; mandentibus relinquunt, sed potius dulcedinis, & acuitatis tantillum respiciunt, quum tamen Dioscoridis, & Galeni testimonio Gingidium herba sit adstrictioſis, & amaritudinis non obscuræ, adeò vt sit etiam Syluestri Pasticinae amior, & ob id (vt Galenus inquit lib. 11. de Alimentorũ facultatibus) potius fuerit hæc herba medicamentum, quàm alimentu. Adde quòd Galeno lib. de Cibis boni, & mali succi cap. 1111. & de Attenuante victus ratione ca. 111. Gingidium herba sit syluestris, contra verò Cherophyllu, quòd passim in horris seritur, ad obſonaria.

## SCANDIX.

Nec Minus improbari debet, quòd ſenſerit legitimam Scandicem eam esse herbam, quæ in segetibus nascitur, plerumq; in agrorũ extremitatibus Cherophyllo similis, flore albo, mucronatis in cacumine corniculis, Geranij æmulis, in quibus conditur semen, quandoquidem hæc herba nec amara est, nec ſuacrigaſtu deprehenditur. Id quod in Scandice Galeni testimonio non obſcurè percipitur, adeò vt hanc ille retulerit inter ea medicamèta, quæ ſecundo ordine intendo, vel tertio incipiente exal faciant. Præterea quum Scandicis hiftoriam (quod viderim, legerimq;) nemo ſcripſerit antiquorum, arduum sanè videtur, vel potius temerariu decernere, & pro certo affirmare hanc vel illam plantam esse radicem. Quippe hæc, quam alios ſequutus Scandicem appellat Lusitanus (vt rei herbariæ periti exiſtimant) eam maximè refert plantam, quæ Plinio Veneris Pecten appellatur, vt latius in commentariis noſtris ſcriptum reliquimus.

## HIRCI BARBYLA.

QUANTVM in cēſenda Hirci barbula fallatur Lusitanus, ij facit enoscet, qui in re herbaria eius legerint enarrationes. Ille enim, vt noui aliquid afferre videatur, si vera deſint, fabuloſa af-

D ferre

Spinachiu  
non esse in  
ter Lapath.  
th. genera  
recenset lū.  
Vana Lu  
sitani per  
ſuſio.

Cenſura  
xxx. de  
Chondrylla.

Cenſura  
xxx. de  
Gingidio.

Cenſura  
xxx. de  
Scandice.

Cenſura  
xxx. de  
Hirci Barbyla.



ferre non ambigit. Scribitis duas Tragopogoni esse species, alterâ flore purpureo, alteram luteo, sed utriusque radicem esse parvâ, bulbosam aliquantulum oblongâ, Auellanae nucis magnitudine, dulcem, & esui aptam, quam pueri in Hispania in campis eradicâtes à similitudine paruarû nucum Nucellas appellant, & illarum esu maximè delectantur. Sed aberrasse deprehenditur, quod nō solum Dioscorides, sed & Theophrastus, & Plinius scriptum reliquerint Tragopogono radicē esse longam, ac dulcē. Id quod sole clarius videtur in genuina Hirci barbu, non autem bulbosam Nucis Ponticæ magnitudine. Quibus palam est, quā diligenter, quāq; accuratè diligēs enucleator legerit Dioscoridē (ut Theophrastum, & Plinium præterea) quem enarrandum suscepit. Is enim (quantum video) eam plantam Tragopogonem putat, quam Fuchsio in Commentariis de Stirpium natura Apios admittitur. Planta hæc in Bohemia frequens non in agris tantum, sed etiā in vineis. Germani Terræ Nucem appellant. Sed quam habeat cum Tragopogono cognationem, ego sanè nullam video.

## SMILAX HORTENSIS.

NON PARVO profectò etiam errore notatur Lusitanus, ut Dioscoridem de Hortensi Smilace differentem, de omni Phaeolorû genere sub Smilacis illius nomine scripsisse arbitretur, cum vulgares Phaeoli, quibus passim in cibis vescimur, dum sati in campis virent, non repant, nec adeo frutices descendant, ut Smilacis modo topiarias scænas inumbrare queât. Præterea quum vulgaris Phaeolus passim in campis seratur, cæterorum leguminum more, quo pacto, quæ ratione Hortensis Smilax vocari possit, profectò nescio. Sed quoniam hæc longè pluribus nobis comprobata sunt in commentariis nostris in Dioscoridem,

eò Lusitanum remittimus.

## THLASPI.

NEC minus decipitur Lusitanus in expendendo Thlaspi, quod dixerit in eo latum percipisse semen, & folia in cacumine diuisa. Ac si ex verbis eius coniecturam facere licet (quod tamen pace eius dixerim) nunquā vidit Thlaspi. Non enim Thlaspi semē latum est, ut Calenus testatur, sed rotundum, simile milio, & aliquandò longiusculum, & proinde rectè scripsit Dioscorides, Thlaspi semen esse Nasturtio simile. Latius quidem folliculus est, qui semen ipsum includit, sed qui folliculum dicant esse semen, neminem habeo præter vnum Lusitanū. Cæterum Thlaspi folia (ut intuentibus facile patebit) nusquā in cacumine diuisa spectantur, sed folliculi, qui semen concludunt, ut in commentariis nostris quis legere poterit, ubi hunc Dioscoridis locum restituimus.

## ZEDOARIA.

QUOD Zedoaria & Zurbetum Mauritanis idem non sint, aduersus Lusitanum reclamationem Serapio, qui de his diuersis capitibus diuersam scribit historiā. Deinde quod Zedoaria radix sit herbæ, Zurbetum verò arbor procera, infrugiferaque citreum odorem spirans, folio Salicis colore ex viridi in luteum languescens, ut idem Serapio scriptum reliquit. Zurbetum Paulo Arnabo appellatur. Aetius tamen utriusque meminit, Zedoaria, scilicet & Arnabonis variis in locis, tanquam de medicamentis inter se differentibus. Sed Lusitano perinde ac aliis quibusdam errandi ansam dedit Serapionis interpretis, qui capite c. l. xxii. Zedoariam falsò Zurbetum appellat. Patet interpretis error Serapionis ipsius testimonio, quippe qui cap. c. l. xxi. de Zurbeto egerit, & longè aliud à Zedoaria fecerit

Censura  
xxxvi. de  
Thlaspi.

Censura  
xxxvii. de  
Zedoaria.

Serapio  
mis. inter  
p. et. l. xxi.

## STRUTHIVM.

*Censura*  
XXXVII.  
de *Struthi*.

STRUTHIVM, siue Radiculā, siue, Lanariam herbam magno sanē errore nihil à vulgaribus Saponariis differre putat Lusitanus. Quippè quod harum nulla spinoso proueniat folio, quum tamen Theophrasto, ac Plinio Struthium aculeata sit planta, & caulem proferat fœnilaceum, qui talis iis Saponariis, de quibus meministi, non visitur. Adde quòd neutrum Saponariæ genus sternutamenta ciere valeat. Ad fabulam autem maximè ridendā, & potius longo cachino explodendā, quàm verbis refellendam, quam narrat Lusitanus de herba illa in eius castelli mœniis nascente, à quo se oriundū facit, quæ flore sit Passerculi effigie, eò quòd ibi passeret quàm plurimi nidificent, & semine in coitu eiuciatulo herbæ radices respergant, nil aliud dicendum censemus, nisi quòd hic suis deliramentis colophonē addiderit Lusitanus. Ceterum si propè nidificantes passerulos, nascentes plāta ob id flores passerulorum illorum formā proferāt, quòd earū radices eorum spermate madescant, cur fiat igitur quòd plurimorum animantium formas, qui in campestribus, & syluis morantur, in quàm plurimis non reperiatur herbis. quotidie eorum semine perfusus, Lusitanus ipse dicat, qui sua singulari amentia nouam hanc philosophiā excogitauit, in qua si fortasse perseuerandum statuerit, discat etiam à circulatoribus scribere Mandragoras ex humani seminis profusione oriri: quin & Antirrhinum ex bubulo, quod eius semen vasculis includatur, quæ vitulina referunt capita.

## CYCLAMINVS ALTERA.

*Censura*  
XXXIX. de  
altera Cy.  
clamino.

GRAVE, & permolestum mihi est, quòd in Cyclamino sui erroris mesciat authorem, cum dicat Matthiolum Senesem alterā Cyclaminū à se conspectam affirmare, radice parua Auellanae persimili tamen si habemus ille nūquam viderit. Quibus conicere quis rectè poterit, quàm ille oscitantur commen-

tarios nostros legerit, & inaniter me citauerit, quandoquidē nobis nusquā dictū est Cyclaminum Alteram, cui superuacua radice assignat Dioscorides, radice constare parua, Nucis Ponticæ magnitudine, quum ibi rectè affirmauerim Cyclaminum hanc me nusquam vidisse in Italia.

*Enfira*  
non max.  
ter Mal.  
tholam  
citat.

## BVLBVS ESCULENTVS.

NVLIVM discrimen cernit diligēs, & solertissimus rerum inspector inter Esculentū Bulbū, & Ascalonicū Cæpe, quod nos vulgò vocamus Scalogna. At quantum distant? Ascalonicum enim Cæpe inter Cæparū genera antiquis recensetur, non autem inter Bulbos. Lusitano refragatur maximè Theophrastus, quippè qui libro VII. cap. IIII. de Plantarum historia, Ascalonicum Cæpe, ac alterum eiusdem generis Fissile appellatum inter Cæparum genera recensuit, non inter Bulbos, de quibus speciatim egit cap. XI. eiusdem libri, cui subscribit Plinius libro XIX. cap. VI. sic inquit. Allium, Cæpāq; inter Deos iure inrando habet Aegyptus, Genera apud Græcos plura. Sardia, Samothracia, Alsidena, Setama, Schista, Ascalonia ab oppido Iudeæ nominata. Demū Galenus libro VI. de simplicium medicamentorum facultatibus Esculentos Bulbos amarosos, ac pariter adstringentes facit. Id quod rursus repetit libro secundo, de Alimentorum facultatibus. Quæ tamē qualitates in Ascalonica Cæpa non reperiuntur. Ipsa enim acris est valde, perinde ac cætera Cæparū genera, nec quicquā ei inest amarosi saporis Equidē putabā hæc nō ignorasse Lusitanum, quum illū compertum habeam oriundum à locis quibusdā non procul ab Ascalone Iudeæ.

*Censura*  
ch. de Bul.  
bo Esculē.  
to.

*Cæparum*  
genera.

## ARGEMONÆ ALTERA.

ALTERAM Argemonē Dioscoridi adulterinam esse non ambigimus, vt in Commentariis nostris diffusius diximus, sed hoc fortasse nesciēs Lusitanus, ne huius plantæ videretur ignarus,

*Censura*  
vt. de A.  
tera A.  
gemone.

Argemonem alterâ eam plantam esse cenſet, quæ recentioribus quibuſdam Argentina dicitur, non alia (vt opinor) ratione, quàm quòd Argentina folia gerat vulgari Agrimonio ſimilia, quæ quantum cum Sylueſtri Papauere habeant cognationis, ſimilitudiniſve (talia enim Argemoni alteri requiruntur folia) ii iudices erunt, qui plantarum hiſtorias diligentiſſimè explorauerunt, & Luſitani imperitiâ norût. Qui cùm fortaiſſis ſibi perſuaſerit, eam ob cauſam Eupatorio Argemonii nomen acceſſiſſe, quòd foliis & facie Argemonem hanc referret, nomenclationibus magis innixus, quàm plantarum ipſarum notis, hic etiam miſer ſe deridendum dedit.

## TELEPHIVM.

QVANTVM in cenſura Telephij hallucinetur, qui vult Telephiũ Dioſcoridi nil aliud eſſe, quàm tertiuũ Semperniũ, illud ſanè ſtatim oſtendit, quòd Dioſcorides de Telephio libro ſecundo, & de Séperuiũ illo libro quarto ſcripſerit, & quòd nec nobis ſcriptũ reliquerit Dioſcorides tertiuũ Semperniũ quibuſdam Telephium vocari, Siquidè Dioſcorides has nomenclaturas nõ recipit, ſed tantũ adducit, quã obrem non eſt propterea dicendũ tertium Semperniũ eſſe Telephium, quemadmodum (exempli gratia) nec Helſine, quam Parthenium quoſdam appellauit Dioſcorides ſcribit Parthenium eſt, nec Aſarum Bacchar eſt, nec Aſplenum Hemioniũ, nec Gingidium Lepidium: tametſi hæc omnia aliarum plantarum nomine quibuſdam appellantur. Nam ſi Dioſcoridi idè eſſet Telephium & tertium hoc Séperuii genus, non fuiſſet illi opus de altero per ſe ſecũdo libro ſcribere, de altero verò libro tertio inter Séperuii genera, vt etiam compertum habemus ſeciſſe Plinium, qui libro xxviii. capite xiiii. de Telephio egit, libro verò xxv. de tertio Séperuiũ, poſtquàm de aliis duobus generibus diſcernit. Adhæc ſi Telephii fa-

cultates apud Dioſcoridè, & Pliniũ expèdâtur, Telephiũ videmus vitiligines fanare quinetiâ vulnera, & ſinus, hoc verò Semperniũ ſtrumâ tantũ diſcutere.

## AGARICVM.

LONGE ab omni ſcopo eos medicos aberrare ſcribit Luſitanus, qui Agarico in paſtillis conformato paſſim vtuntur, noua ſua quadam opinione ductus, quòd Agaricũ contritum nullo pacto diu ſuas vires ſeruare poſſit. At nos illum errore ſanè longè maiori proculdubiò duci cenſemus eoq; præſertim quòd nullam afferat rationem, nec probatiſſimorum ſcriptorum authoritatè, qua ſuâ fulciat ſententiam. Porrò Meſues clariſſimus inter Arabas & qui in componendis medicamentis primas tenet, Agaricum in paſtillos redigi ſuadet, vt vnâ cum iis, quibus excipitur, medicamentis tractu temporis debitâ acquirat mixtionè: id quod expedit omnibus cõpoſitis medicamentis. Nec video cur tam facilè quicquid tenuium partiũ in eo extiterit (vt friuolis admodum verbis contendit Luſitanus) euaneſcere poſſit. Siquidem cum Meſui paſtilli de Agarico, Salè ſoſilem, Gingiber, & Oximel excipiant, non ſanè conſtat cur tã facilè tenuior Agarici pars in aurâ reſolui poſſit, cùm mellis propriũ ſit in ſuo vigore admiſta diutius aſſeruare, Salis verò & Gyngeberis huic medicamento facultatem augere. Fruſtrâ quidem tot cataportiorum maſſas, quæ Agaricum excipiunt, Seplaſia conſectas aſſeruarent, quin & electaria alium ducentia, ſi Agaricum in puluerem iis additũ ſuas ſtatim perderet vires, fruſtraquè illud in Theriaca addidiſſet Andromachus. Quã obrem omnino explodenda erit Luſitani ſententia, qui præter omnium clariſſimorũ virorum placita ſolus iubeat Agaricum ea ipſa hora eſſe contundendũ, ac aliis addendũ medicamentis, qua expedit illo vti.

## RHABAR

## RHABARBARYM.

*Censura  
xliij. de  
Rhabar-  
baro.*

CAETERVM de Rhabarbaro scribens Lusitanus, medicos illos magno teneri errore cōtendit, qui tostum, vel vstū Rhabarbarū dysentericis p̄pināt, ea ratione adductos, quòd omnia quæ igni torrētūr ob cōtractā acredinē abradāt. Quare suadet, vt Rhabarbaro in dysētericis omninō abstineāt medici. Atqui si Rhabarbarū dari libeat, nō vstū, neq; assū esse propinandū, sed crudū, hac tamē cōditione, vt prius auferātūr ab eo tenuiores partes. Id quod facile (vt ipse ait) effici potest, si ex aqua Plātaginis, vel Rosarū maceretur. Verū Lusitano maximē refragatur Mesues, vbi Rhabarbari vires expēdit his verbis. Rhabarbarū tostū dysentericis probē confert. Et paulō superius ait, Quòd si post hāc functiones viscera adstrictione roborante egerint, ipsum quidē Rhabarbarū in puluere cōtritū exhibendum fuerit. At illud, quod igne torrefcit, vehemētior operatur, ac etiā vehemētius id, quod comburitur. Hāc Mesues. Sed audiat etiam Galenū, qui lib. ix. de Cōpositione medicamētōrū secundū locos cōbusta, torrefactaq; medicamēta dysentericis dare suadet, nempē Cochleas, Cornu Ceruinū, Opium, Gallās, Malicōriū, Pini corticē, Hyosciamū, Acaciā, & alia plura vino nigro excepta. Praterēa x. de Simplicium medicament. facultatibus, exultas etiā Cochleas cū Galla, & Pipere dysentericis commendat. Quibus sanē patet non modō hoc in medicamento spernere Galenū Coclearū, & Gallarū combustarū acredinē, sed etiā addere Piper acerrimū medicamentum. Huiusmodi medicamentis nulla dubitatione vtuntur etiā posteriores Græci, Paulus (inquā) Oribasius, Aetius, Alexander. Adde quòd vbi intestina vlceribus fuerint affecta, Auripigmentum, Sandarachā, Alumē, Calcē, Aeris squāmā, & alia plura erodētia medicamēta clysteribus infundunt. His itaq; palām est, cōbusta, tostaq; medicamenta non

*Rhabar-  
barum to-  
stum dysen-  
tericis ma-  
ximē con-  
uenire.*

modō nullo prorsus incōmodo dysentericis dari posse, sed magno sanē iuuamento, quòd crudis longē magis excicent, ac etiā adstringant. At si vsta, & in cineres versa dysentericis tutō exhibere suadēt tot grauissimi auctores, cur illis tostū Rhabarbarum interdicit Lusitanus, cōlicere nequeo. Nā si Medicorū omniū cōsensu, dysenteria affecti ali debēt aflatīs volatiliū carnibus, ouorū vittellis ignitis tegulis tostis, & aliis quā plurimis alimentis foetis, torrefactisq; cur igitur à Rhabarbaro illo fuerit abstinentū, nulla penitus (ni fallor) sese offert ratio. Porro ad aliud Lusitani figmentū, quo fretus ait, plures vidisse Lusitanos sui generis homines dysenteria affectos vsti Rhabarbari potu interiisse, nil aliud respōdendū in p̄sentia succurrit, quā quòd nobis minimē sit approbandū, cū sexcētos homines ad vitā reuocatos sciamus tosti Rhabarbari potu. Equidē nō possum mirari Lusitanū, q̄ suā tantū gentis Lusitanos Rhabarbari vsti potu interēptos in exemplū adducat, ac si illis tantū fuerit letale medicamentū, cū tamē is (vt ipsius testātūr scripta) toto ferē atatis suā decursū apud inferiores Germanos primū, & deindē apud Italos suā exercuerit medicinā. Demiror itē, q̄ ita temerē quasi diuinitus edoctus affirmare nō sit veritus potius ex Rhabarbari vsti potu interiisse eos, quā ex morbi natura, quā hāc sciri nō possint. Prater id, mihi nunquā persuasum velim, longē magis dysentericis Rhabarbarum illud profuturū, quòd aqua Plantaginis vel Rosarū fuerit maceratum, quā tostum, vel vstū. Quandoquidem Galeni testimonio aflatio, vstioq; plurimū siccitatis, adustionisq; medicamētis cōfert, contrā verō euenit iis, quæ aquis macerātūr. Sed hāc fortasse in mediū adducit Lusitanus Auicennæ testimonio confusus, qui dysentericis Rhabarbarū nullam vstionem, aflatio- nemq; expertum ex Plantaginis aqua bibendū suadet, quòd fortasse nesciue-

*Lusitani  
infestio in  
conf. nio  
Aureana  
Rhabar-  
baro.*

rit Rhabarbarum nil aliud Auicenna designare interpretis lapsu, quā Græcorum Rhaponticum. Quod quum nulla deiectionaria vi polleat, citra vitionem, assationemque propinat Auicenna ex Plantaginis aqua, nec id macerat, vt sibi fingit Lusitanus.

CHAMÆLEO ALBUS,

ET NIGER.

*Cēsu. xlv.  
de Chamæ  
leonibus.*

AC CVM ille Chamæleonē Album censet esse stirpē spinis vndiq; horrentem, folio grandi, lactis quasi maculis interlito, quā quidā Carduum Mariæ, quidā à maculis Carduū Lactariū vocant, quidā Suarium, quod eo sues pascatur, quis eius opinionē probeat: cum Chamæleo albus nullū producat caulē Dioscoridi, sed ē medio spinas echinatas Cinaræ modo. Carduus autem Lactarius caulē profert bicubitalem, & quandoq; maiore adnatis pluribus refertū, longis, prædurisq;. Radici nulla est odoris præstātia, nec Chamæleonis facultas. Siquidē deuorata, Dioscoridis testimonio canes, sues, murēsque necat. Contrā verò hæc sues nō modò alit, sed etiā saginat, vnde illi nomē. Postremò albo Chamæleoni, Theophrasti testimonio, caput requiritur magnū Acano simile, non autē paruū, quale in Lactario Carduo spectatur. Sed qualē in albo, talem & in nigro se declarat Chamæleone, existimans hūc inter illud Cardui genus, quod à Carduo Lactario nulla alia dignoscitur differentia, quā quod huic folia nō sint lacteis illis maculis respersa, sed potius nigricantibus. Cui istud comprobabitur? Spina hæc caulē nō rubrū, nec doxandralē, sed bicubitālē, ac colore viridem effert. Deindē huic flores nō sunt versicolores, sed purpurei. Præterea carduus hic radice nititur alba, integraq;, non Chamæleonis Nigri modo exterius nigra; interius verò flaua & pluribus in locis exesa, nō acri, sed potius subamara. Adde quod Dioscoridi Nigri Chamæleonis folia requiruntur rubro colore distincta, nō maculis in-

fecta nigricantibus. Quibus certū facit omnibus, quanta iudicii maturitate in plantarum censura ducatur Lusitanus.

CROCODILIVM.

AT QVAM nec sui se præstat dissimilem in Crocodilio? Eam hæc opinatur esse stirpē, quam vulgus herbariorum Carlinā appellat, ea tantū ductus ratione, quod hæc non solum in syluis, sed etiā in arenosis (vt Plinius inquit) & sitientibus nascatur locis. Sed cæcutit nō leuiter, quod Carlina, quæ caulē profert, adeo omnibus in vniuersum notis nigrū Chamæleonē repræsentat, vt neutiquā quis persuaderi possit eā esse Crocodiliū, præsertim cum facto periculo, iis sanē viribus non præstet, quibus præstare Crocodiliū Dioscorides, Galen. Plin. ac alij pleriq; posteritatis memoriæ prodiderūt. Crocodilij enim decoctū (horum omnium testimonio) potui datum sanguinē copiosum per nares pellit. Quod si præstaret Carlinæ radix, magno admodū pretio æstimaretur à Medicis. Adde quod Crocodilio radix sit longa, lauis aliquantulum lata, odore, vt Nasturtij, acuto: Carlinæ verò crassa, rotunda, aspera, inæqualis, exesæque, nullo Nasturtij odore predata. Adhæc Crocodilij semen Galeni testimonio acre, odoratumque percipitur: quæ facultates in Carlina proculdubio desiderantur.

*Censura  
xlvj. de  
Crocodi-  
lio.*

*Crocodilij  
mira vis.*

POTERIVM.

POTERIVM eam vult esse arbusculam, quā Germani Schlehē, nos verò syluestre Prunum nominamus, quod idē existimauit Cornarius vir alioqui insignis, cuius opinionē magis hic sequitur Lusitanus, quā genuini Poterij historiam. Ego verò nihil hic cōtra Cornariū dicam, quē vir clarissimus Fuchs pluribus argumentis copiosissimè refellit. Quo circa his iā superfedemus, solū, vt nostri memores instituti, dicimus vtrunq; deceptum, & plurimum aberrasse Lusitanum, quod syluestris Prunus potius in fruticosarū arborum recēseri debeat, quā inter herbas: item quod

*Censura  
xlvij. de  
Poterio.*

*Cornarius  
reprehendit  
arborum  
dicitur.*

quòd nulla penitus cōuestiatur lanugi-  
ne, quòd item ramulis non habeatur  
longis, actenuibus Tragacathæ modo,  
sed breuibus, solidis, duris, contortisq;  
quin nec fructu eit acuto, nec odorato,  
sed inodoro, austero, adstringēti admo-  
dū succo: adeò vt qui dixerit syluestre  
Prunum esse Poterium( Cornarij, & il-  
lius pace dixerim ) Tiresia cæcior dici  
possit, vel mente captus. Quo fit, vt mi-  
rari non debeant Medici, si clarissimus  
ille Fuchsius plura in Cornariū vberri-  
mè conscripserit.

*Fuchsj  
l. III.*

## LEUCACANTHA.

*Censura.  
xlvij. de  
Leucacanthæ.*

NEC ASE ipso dissentit, quòd etiā  
Leucacantham herbam eam esse arbu-  
sculam cōtendat, quæ in sepibus, & fru-  
tetis provenit, folio Pyri, fructu in ma-  
tritate nigro, ligustrinis baccis non ab-  
simili, è quibus elegantissimum colorē  
viridem parant pictores. Quandoquid-  
em Dioscorides hoc loco de aculeatis  
herbis egit, non autem de arboribus.  
Adhæc arbuscula hæc, quam nos voca-  
mus Spino Merlo, quidam verò Spino  
Zerbino Cyperi radices non habet, sed  
arboreas, lignosas, longas, prædurasq;  
austero sapore, nulla admista amaritu-  
dine, adeò vt nihil succi indè exprimi  
possit, etiam si arctissimo prelo stringe-  
retur, quum tamen è Leucacanthæ ra-  
dicibus succum exprimat Dioscorides  
adrupta, & conuulsa sananda.

## CRETENSE DICTAMNVM

## ALTERVM.

*Censura  
xlvij. de  
altero Cre-  
tensi Dic-  
tamno.*

CAETERVM & de altero Cretensi  
Dictamno exentisse Lusitanum non am-  
bigimus, quippè qui scripsit videri hoc  
nò modò in hortis, sed etiam in fistili-  
bus ad fenestras frequenter reponi so-  
lio(vt illius verbis vtar) Cresonis, flore  
pulchro, purpureo, qui fricans odorē  
ex se refert, qualem ex flore Narantij  
oriri videmus. Sed quàm sibi ipsi impo-  
nit primum quòd hoc Dictamnū Theo-  
phrastu testimonio in Creta tantum

proueniat. Id quòd videtur etiam fate-  
ri Dioscorides, cum dicat, & hoc ex Cre-  
ta ad nos aduehi. Præterea quòd non  
scripserit Dioscorides, quin etiam nec  
Theophrastus, nec Plinius Dictamnū  
hoc folio esse Sifymbrij Aquatici, quòd  
Lusitanus, vulgus sequutus, Cresonem  
appellat, sed Sifymbrij absolute, quòd  
indicat, hos præclarissimos authores  
de primo Sifymbrij genere intellxisse.  
Sifymbrium enim primi generis folio  
est Mentha, rotundiore tamen, non  
autē Eruca, qualia sunt Cresoni folia,  
quæ an magis Dictamni foliis sint com-  
paranda, quàm primi generis Sifym-  
brij, ij diiudicent, qui rem herbariam  
doctissimè profitentur. His accedit,  
quòd Dioscoridi huiusce Dictamni fo-  
lia odorem ex se mittunt mediū inter  
Sifymbrium, & Saluiā, à quo omninò  
eum diuersum putamus, quæ Aratio-  
rum flores suauissimè fundunt,

## CALAMINTHA.

Eo quòd Ferrarienses, & Longobar-  
di Gattariam herbam Neuedam (quasi  
Nepetā) vocent, magno errore sibi per-  
suasi Lusitanus Gattariam hanc esse se-  
cundū Calaminthæ genus, sed aberras-  
se videtur, quippè Dioscoridi Calamin-  
tha secundo loco posita, folio est Pule-  
gij, quemadmodum & sapore, nò autē  
Apiastrj, vel Vrticæ, quibus Gattaria  
vocata maximè visitur æmula. Nec mi-  
nus item decipitur in cēsenda tertij ge-  
neris Calamintha, quòd crediderit hæc  
eam esse, qua passim in Italia vntur  
Seplassæ. Pater error, quòd hæc folia ha-  
beat Pulegio grādiōra, rotundioraq; nò  
autē præloğa Mentastri modo, cui ter-  
tiā Calaminthā similē fecit Dioscorides.

*Censura  
L. de Cal-  
amin-  
thæ.*

*Censura.  
Lij de ter-  
tie cala-  
minthæ ge-  
neris.*

## SAMPVSCHVS.

QVANTA sit Lusitani inconstantia, Censura  
quāta in nos inueniendi fraus, quātaq;  
is sui ipsius capiatur obliuione, is facile  
intueri poterit, qui legerit eius enarra-  
tiones libro primo in Olei Sampsa-  
chini

chini confectiōe, & libro tertio cap. proprio de Sampfuchō. Quandoquidē libro primo apertissimē contendit aduersus nos scribēs Dioscoridi Sampfuchum nulla ratione esse Amaracum, & ob id plura ibi in nos machinatur, vt in Apologia superius præmissimus. Libro vero tertio euidenter fatetur magno suæ leuitatis dedecore nil aliud esse Sâpsuchum, quàm Amaracū, vel Maioranā. Quare non modò se ipsum euiderer cōfutat, & grauissimē vulnerat, sed etiā palām declarat, non aliā ob causam non strā impugnasse sententiā, quàm vt nobis aduersaretur, & quocunque modo suū virus in nos euomeret. Tāta in nos inflammatus rapitur cupiditate, quæ mentem ei excœcet, memoriam tollat, & insano quodam modo se ipsum destruat, ac penē subuertat.

## RUTA SYLVESTRIS.

SYLVESTREM Rutam, quam Capadocibus Mōlyn, Syris Bēsafa, quibusdā verò aliis Harmosā vocari Dioscorides inquit, eam esse plantam existimat Lusitanos, quā Caryophyllos vltamarios, vel Indicos vulgus appellat, sed manifestē decipitur. Quādoquidē hæc herba præter id, quod folia Rutæ non proferat, flores aureos gerit magnos, ad luteum vergētes, non, vt Ruta sylvestris, candidos. Quinetiā capita nō prodeunt alterius Rutæ modo, sed longa pluribus eminetibus costis striata. Præterea, nec semē illi visitur trianguli speciei referens, neq; subrusum, sed longū, nigrumq; nulla amaritudine præditū. Adde etiam quod Galeni testimonio Sylvestris hæc Ruta radicē proferat nigrā, id quod in hisce Caryophyllorum Indorum plantis maximē desideratur.

## CUMINVM SYLVESTRE.

SYLVESTRE Cuminum quum non viderit, nec nouerit Lusitanus, illud Officinis Rusticū Cuminū vocari ait, perindē ac si adeo vulgaris notitiæ fuerit, vt nullo sit opus examine, quū tamen pauci (ne dicam nulli) reperiātur Phar-

macopœi, qui vnum vel alterum Sylvestris Cumini genus legitimē cognoscāt. Nam præter satiū, nullum aliud nouere Seplasiā. At Amathus, ne videatur id ignorare, Sylvestre Cuminū adeo vulgare facit, vt quis illud apud Myropolas intueri possit. Quo fit, vt rectē intuētibus palām sit non modò Amathum Sylvestris Cumini historiā confundere, sed quid sit Sylvestre Cuminū penitus nescire, & ignorare tanquā cognita, & vulgaria fateri. Duo enim Dioscoridi, quæ nunquā accuratē Legit Lusitanus, sunt Cumini genera inter se pluribus repugnātia: sed hæc negligens Amathus rem omnē confudit. Siquidē nulla generū habitū differentia absolute protulit Sylvestre Cuminū Officinis Cuminū Rusticū vocari, quū tamē non desint rei herbariæ peritissimi, qui hætenus de Sylvestris Cumini generibus nihil affirmant.

## CORIANDRVM.

INCENSENDO coriandro quum non hallucinatur, nō decipitur, sed penē delirat? quod vulgaris vsus Coriandrū scribat, nō esse antiquorū Coriandrū, sed illis Coriandrū fuisse aliā plantam Cicutariā dictam, folio nostratis Coriandri simili. Id quod tueri nititur hocrātūm argumēto, quod Coriandri plantā Hispani nullo incōmodo olereis cibis admisceāt. Quin & quod eius semen odoratū sit, & eius pariter herba optimi sit odoris, vel saporis. Cæterum hæc quum legissim, mirari sanē desij, quod alia etiam innumera deliramenta in mediū duxerit. Quis autē (Dij boni) Lusitanum hunc nugantem, immo & amentem ignoret, quum dicat Coriandri vulgaris herbam odoris quidē foetidissimi leætulariorū cimicū inflat optimi esse odoris, ac saporis? Equidē censebā vtero tantū gerētes mulieres citta, picaq; corripī posse. Sed (vt video) Amathus etiā eo morbo laborat, quod fortassē ob multam præstitam in re medica operam, & ob magnas illas

Centurias

Lusitani  
leuitat.Censura  
lviij. de  
Ruta syl-  
vestri.Censura  
lvj. de eo-  
dem.Censura  
lvj. de  
Coriandro.Insens.  
insignis  
amentia.Censura  
lv. de Syl-  
vestri Cum-  
in.

Centurias adeo intumuerit, vt pręgnati similis euaserit: Vel quod fortasse Coriandri tantum inter olera esitauerit in Hispania eius saporis, odorisq; præstantia allectus, vt inde facillè amertiam contraxerit, quam facere Coriadrum scribit Dioscorides, vbi largius assumatur in cibum. Quo postea factum est, vt inde Amathi nomen fuerit consequutus. Præterea cur suam probare possit Amathus stultitiam, quod Coriadrum communis vsus veterum Coriandrum non sit, quod in cibo acceptum nil mali inferat, nihil sanè rationis adduci potest. Quandoquidem etiam Galeni tempore Coriadrum in obsoniorum venerat vsus, vt ipse testatur Galenus libro secundo, de Alimentorum facultatibus, & libro de Attenuante victus ratione. Quin & Dioscorides non nisi à largiore Coriandri esu abstinere prohibet. Proinde mirum non est, si cum aliis oleribus pro obsonio deuoratum nihil incommodi afferat, perinde ac Papauer.

## PETROSELINVM.

*Censura lxxi. de Petroselino.* GENVINVM Græcorum Petroselinum idem, quod seplasia, & Herbariorum vulgus passim Apium vocant, magno sanè lapsu esse credit Amathus, quod hoc Paludapiū sit in hortis translatum, riguis, & vliginoso solo gaudēs. Contrā verò Petroselinum, quod Dioscoridis, & Galeni testimonio in præruptis, & saxeis motium locis, vt ipsamet indicat nomenclario, tantum proueniat, femine Ammi odoratiore, sapore acri aroma olēre. Id quod in communi Officinarum Apio nusquā percipitur.

## ELAPHOBOSCVM.

*Censura lxx. de Elaphobosco.* ERRARE in Elaphobosco non modo Amathum censemus, sed pro more etiam falsa narrare scimus. Nam vt se ipsum præclarum ostendat, ait in quærendo Elaphobosco sibi adiunxisse duos doctissimos viros, quos etiam nominat. At quum horum alter, cuius in commentariis nostris pluries meminimus ob præstantissimam eius doctrinam, in

tegritatēque, mihi pluries affirmauerit illum nec nouisse, nec fortasse vidisse vnquā, quod illic credam non habeo

*Amathus infidelitatis arguitur.*

## COLLYTEA.

COLLYTEA quibusdam rei agrariæ autoribus Alburnum vocari affirmat, Italis verò vulgò Aorno. Verum quantum ego legi, cum Alburnū planta nō sit, sed pars tantum arboris, idem qui semper fuitprehenditur Amathus, Plinii primū testimonio, qui libro xv l. cap. xviii. de Alburno hæc scriptis mandauit. Humor & cortici arborum est, qui sanguis earum intelligi debet. Pro cute cortex est. Proximi plerisque adipēs. Ii vocantur a colore Alburnum, mollis, ac pessima pars ligni, etiam in robore fragilē putrescens, tere dini obnoxia: quare semper amputabitur. Hæc ille. Quibus facillè Amathus conuincitur ignorantia. At si fortasse, vt nostram effugiat censuram, dixerit, non dixisse Colluteā vocari Alburnum, sed Laburnum, & id erroris in Typographum reiecerit, facillè respondi poterit & hoc esse falsum. Quadoquidem Laburnum, teste Plinio, Alpina tantum est arbor dura, & candida materie, cuius florem cubiti longitudine apes non attingunt. Id quod in Collutea sanè desideratur, quum hæc Alpina non sit, sed vbique ferè proueniat, materie non alba, sed exterius buxea, medullitis nigra, flore non cubiti longitudine, sed breui, Genistæ modo.

*Censura lxx. de Collutea.*

## S E N A.

CAETERVM magno etiam errore scribit Senam herbam alium exolentem eam esse plantam (vt ipse opinatur) quæ Theophrasto Collytea appellatur. Nam cum apud Theophrastum duplex sit Collytea, nec de qua intelligat, explicet, non solum hallucinatusprehenditur, sed & confusus, adeo vt quid sibi velit nesciat. Præterea cum Collytea vtraq; Theophrasto lib. i. l. cap. xiiii. & xv. de historia plan-

*Censura lxx. de Sena.*



taram arbor sit non herba, & utriusque meminerit inter arbores, minus constare sibi vana Lusitani potest opinio.

## GLAUCIVM.

*Censura  
lxiij. de  
Glaucio.*

Nisi alium prater se testem adduxerit Lusitanus, qui Glaucium herbam apud Louanenses viderit, quæ cum Dioscoridis historia concordet, ego illi credam. Nam cum illum tam sæpe hallucinatum offenderim, ac fabulosum, vitio mihi dandum non censeo, si nisi dato pigrore illi non credidero.

## ALYSSVM.

*Censura  
lxiij. de  
Alyss.*

NULLAM constituit differentiam inter Dioscoridis Alysson, & Pimianum. Sed quam Penitus neutrum intellexit? Siquidem Dioscoridi Alyssum exiguum est frutex vnicaulis, subsæper, rotundis foliis, fructu duplicium scutorum effigie, quadrantem latum, in montibus, & asperis locis emicãs, quæ sanè omnia in Sylvestri Rubia, quæ Plinio Alyssum est, desiderantur. Siquidem hæc non adeo exigua est, planta, sed plerumque bicubitalis, non vno tantum caule crescens, sed pluribus, foliis minimè rotundis, sed stelle modo decussatis, semine rotundo non lato, nec duplicem, nec simplicem scutum referente. His accedit quod Dioscorides de utraque Rubia majori nempe, & minori tradidit vno, & eodem capite. Id quod illum fecisse putandum non est, si Sylvestrem Rubiam ab Alyssio diuerfam non indicasset, de quo prius dixerat eodem libro.

## ATTRACTYLIS.

*Censura  
lxiij. de  
Attractyl.*

REDIT austerus & immitis censor, virgam, vel fustem potius profert. Elicir omnes ex medicorum, id est ex suo senatu, & grauissimè hallucinari eos contendit, qui negant Attractylida alteram Sylvestris Cnici esse genus, eo argumentum innitens, quod scribat Plinius, primam sylvestris Cnici speciem Attractylida quibusdam vocari: sed, quatum videre, aut conicere possum, Amathus

ipse potius hallucinatur. Nam quamuis scribat Plinius primi generis Sylvestre Cnicum quibusdam Attractylida nuncupari, non tamen affirmat, Cnicum illud esse Attractylida, nec eorum recipit sententiam, qui putant genuinum sylvestre Cnicum nihil ab Attractylide differre, quemadmodum superius diximus de Telephio differetes, Telephium non propterea esse Sempervivum minus, quod hoc etiam Telephium) ut Dioscorides scribit) quibusdam dicatur, nec Heliand Parthenium, nec Asplenium Hemionium: quoniam iis etiam nominibus à nonnullis appellantur. Quamobrem Plinius ipse eodem libro speciatim de Attractylide egit his verbis. Acarna colore tantum rufo, à Scoli modo distinguitur, & pinguiore succo. Idem erat Attractylis quoque, nisi candidior esset, & nisi sanguineum succum funderet, quæ de causa Phonus vocatur à quibusdam, odore etiam grauis. Quibus palam est Plinio Attractylida nullum sylvestris Cnici esse genus. Id quod maximè attestatur Theophrastus libro v. cap. lxiij. de plantarum historia. Is enim postquam de omni Cnici genere differuit, de Acarna, & Attractylide speciatim egit. Adde quod experimento etiam liquet, neutrum sylvestris Cnici genus sanguineum succum fundere. Vnde Amathi minus probari potest sententia.

## TEUCRIVM.

SANGVISORBAM, quam Itali Pimpinella propriè appellat, quamque frequentissimè in acetariis addunt, Amathus Teucrium esse indicat. At in pinsina sua versatur cecitate, quippe quæ scribat Dioscorides Teucrium herbam virgæ effigiem referre. Trifaginis similitudine, faciliè palam sit inter Teucrium, & Sanguisorbam maximam intercedere differentiam. Siquidem hæc nobis Pimpinella vocata iuncis constat cauliculis, foliis utrinque pinatis, nullam virgæ effigiem, nec Trifaginis formam referentibus. Quod verò Pimpinella

*Censura  
lxiij. de  
Teucris.*

*Amathi* pinella hoc nomine sit appellata, eò quòd odore sit Citruli, quem Hispani Pipinum vocant, nobis probare non libet, quum compertum habeamus vocatam fuisse primum Pimpinellam à bipinnatis cauliculis, vnde postea corrupta appellatione Pimpinella est appellata. Nam cum nullo Citruli odore, vel sapore sit prædita, cur Amathi sententiam probem non video.

## LYCHNIS.

*Censura*  
*beij. de*  
*Lychnide.* QUAE de Lychnidis viridibus foliis scribit Amathus, quòd scilicet ea oleo illita igne flagent, & indè nomen traxisse stirpem, fabulosa omninò videntur, cum re vera Lychnidis folia, non viridia, sed sicca ad lucernarum vsum pro elychnio vsurpauerit antiquitas, vnde sibi nomen inuenit, non quòd viridia flagent, vt Amathus putat. Quippe *λυχνος* Græcis lucerna dicitur, *ελυχνος* funiculus, qui è gossipio lucernis inditur ad ignem excipiendum. Sunt enim Lychnidis folia admodum villosa, tomentosaque, & proinde arefacta ignem faciliè concipiunt, perindè acililius Verbasci folia, quod Lychnite ab eodem effectū pariter appellatur.

## MARTAGVM.

*Censura*  
*beij. de*  
*Martago.* MARTAGVM flores edere Lilio albo similes, sed croceos assenerat, & proinde Martagum Plinio eam plantam esse existimat, quam ipse ab Hercule Petilium vocatam scribit libro xxi. capite vii. At demiror, vbi Lusitanus, qui tanto vsu, tanta omnium rerū peritia est præditus, Martagū viderit croceos emittens flores. Mihi enim ante hunc diem id est inauditum, cum flores proferat purpureos, rubetibus quibusdam punctis resperfos. Id quod manifestè arguit Hemerocallē pro Martago accepisse Lusitanum. Namque is flore constat aureo Lilij tum facie, tum etiam magnitudine. Cæterum an Martagum, vel Hemerocallis Petilium sit à Plinio descriptum, sateri sanè nō ausim, quum Petilium Plinij ipsius testimonio autumnali tempore floreat inter vepres

colore rosæ sylvestris, illa verò cum aliis liliis media floreat æstate.

## TRIFOLIUM.

QUOD Bituminosum Trifolium nunquam viderit, noueritque Lusitanus, hoc argumento faciliè conici potest, quòd asserat Pratense Trifolium omnibus vulgò notum primò Rutam olere, vbi verò adoleuerit Bituminis odorem reddere. Atqui hoc falsum esse vnicuique constabit, qui Pratenis Trifolij odorem olfactu explorauerit. Siquidem id nec Rutæ, nec Bituminis quicquam vlllo tempore respicit. Et enim aliud genus est à communi Trifolio, quod Græci Asphaltite ab odore, nos Bituminosum vocamus. Iccirco rectè scripsit Plinius libro xxi. capite ix. Trifolij tria esse genera, Asphaltite aliud, aliud Acutū, Minutum itē aliud, quo prata ferè omnia scatent. Hinc itaque apertissimè constabit Pratense Trifolium longè ab Asphaltite diuersum haberi, & Lusitanum non paruo in errore versari.

## AMBROSIA.

AMBROSIAM ait ille esse herbam, quam vulgo Tanacetum vocant Septisiz. Verum pariet eius non medicis lapsus. Siquidem Ambrosia Dioscoridis testimonio pusillus est frutex, adeò vt trium palmorum longitudinem nō excedat, foliis exiguis circa imum caulem, Rutam referentibus, cauliculis perindè quasi racemulis grauidis, qui nunquam florent, odore vinoso suauique, radice tenui sesquipedali, quæ omnia in Tanaceto maximè desiderantur. Námque Tanacetum bicubitales gerit caules, ac etiam quandoque longiores, folia non Rutæ, sed Maioris Milesolij amaro sapore, flores aureos globuli modo, odore (quod maximè refert) grani, ac ingrato. Nullos fert hæc planta racemos cauliculis appensos, nullus sibi vinosus odor, nec alius suauis. Illud etiam addi potest, quòd Tanaceto nusquam visa sit radix sesquipedalis, sed brevis, & superuacua.

## GNAPHALIVM.

*Censura  
lxx. de  
Gnapha-  
lio.*

ADEO breuiter, perplexéque Gnaphalij historiam scribit Dioscorides, quin etiam Plinius illum sequutus, vt non decernas, quæ nam planta ex his, quæ in ipso naturæ viridario coluntur genuinum Gnaphalium repræsentet. At Lufitanus, qui hæc quemadmodum & cætera leuiter admodum expendit, quandam herbam Gnaphalium esse asserit, quæ Anconitanis Zigi appellatur, ea tantum ratione ductus, quod hæc planta tenuibus sit foliis, mollibus, albicantibusque, quum tamen plura habeantur herbarum genera, quæ his notis insigniantur, perinde ac herba illa, quæ vulgaribus herbarijs Gnaphalij nomen mentitur. Etenim adeo Plinij Impiam repræsentat, vt post hac ambigendum non sit, quin Impia nobis sit desideranda.

## OENANTHE HERBA.

*Censura  
lxxi. de  
Oenanthæ  
herba.*

RECENTIORES quosdam sequutus Oenanthem eam vult esse plantam, quam Filipendulam vocat, cum potius Oenanthæ Dioscoridis testimonio caulem crassum palmi longitudine gerat, semen quale in Atriplice spectatur, radicem magnam in multa rotunda capitula extuberantem, nascaturque in petris. At longè aliter provenit Filipendula. Etenim non in petris, sed in pratis, & lato solo nascitur, radice nusquàm magna, quæ in rotunda capitula extuberet, sed sili modo tenuis pluribus apensis globulis, non rotundis, sed potius glandium figura, vt in Pæonia, sed longè minoribus, vnde illi nomen. Semen præterea Atriplicis illi non inest, sed globuli instar quadruplici apice mucronati, vt in Buxo: quin nec caulis illi visitur crassus, sed tenuis, non palmari longitudine, sed bicubitali. Quibus palmam esse non ambigimus. Oenanthem à Filipendula quàm maximè abesse.

## PHYLLVM.

*Censura  
lxxij. de  
Phyllo.*

DVM in Phyllo Ruellij sententiam improbat Lufitanus, se ipsum ignorantiz manifestè accusat his verbis. Hanc

Ruellius Alteram Persicariam esse credit, quo verò iudicio alij iudicent. Est verò hodie herbula quædam vnico tantum ornata folio, & inde Vnifolium dicta. Semen racemosum serpentis similitudinem ferens. His herbam illam describere videtur Lufitanus, quam quidem Ophioglossum, id est serpentinam linguam vocauere. Sed plurimum is à veritatis scopo, & à veris ipsius herbæ delineamenti digreditur. Etenim præter id, quod semen racemosum non proferat, id nullam serpentis imaginem ostendit, sed serpentis potius linguam imitatur. Id quod certò arguit, Lufitanum hanc plantam negligeret admodum examinasse. His accedit alius illius lapsus, quod affirmauerit Dioscoridis Phyllum esse Ophioglossum, cum nullis prorsus notis conueniant.

*Censura  
lxxij.*

## HORMINVM.

*Censura  
lxxij. de  
Hormino.*

ALIORVM quorundam insistentia vestigia pro certo asseuerat Horminum eam esse, quam quidam Sclaream, alij Marrisaluiam, nonnulli herbam Sancti Iohannis vocant. Sed cum Horminum Dioscoridi planta sit Marrubio similis, caule semicubitali, circa quem eminentiæ siliquarum forma prodeant ad radicem spectantes, in quibus semen includitur oblongum, nigrumque, neutiquam crediderim Sclaream ipsam, quæ miro odore fragrat, esse Horminum. Quandoquidem hæc folio est Venbaſci, non Marrubij caule bicubitali, non semicubitali: Præterea Sclareæ caulis nullis vestitur siliquis, sed rami, qui ex caule ipso prodeunt multi. Adhæc siliquula, in quibus semen concluditur, rotundum, non oblongum ad radicem non spectat, sed ad verticem. Adde etiā quod nulla odoris præstantia Horminum commendauit Dioscorides. Etenim illius odoris fragrantiam nunquam silentio inuoluisset Dioscorides. Quo fit, vt cum hæc non perpenderit Lufitanus, aliorum tantum opinione imprudens abuteretur, perierit vnā cum illis, quorum

## ONOSMA.

*Censura lxxv. de Onosma.* ONOSMAM inter vulgares Rapunculos, quibus passim utimur in acetariis, nasci Lusitanus scribit: quin & illis adeò Onosmam similem facit, vt difficile ab ipsis dignoscatur. At quum Onosma folio sit Anchusæ Dioscoridis testimonio, quæ non minus distat à Rapunculo, quàm equus à lepore, illicò friuolam, & stolidam nimis, vt ceteras omnes, opinionem induit Lusitanus. His accedit, quòd Onosma non nisi in asperis nascitur, radice sanguineum succum fundente: id quod maximè desiderari potest in Pseudorapunculo illo, quòd is radice sit alba, tenui, ac superuacua, nullo vnquam tempore cruenta.

## ANTYLLIS.

*Censura lxxv. de Antyllis.* QVIN & in Antyllide censenda plurimum decipitur, cum velit, quinimò & affirmauerit eam legitimam, genuinamque esse Antyllidem, quæ Mauritanis Kali, sine Alkali appellatur, cuius cinere vtuntur ad cõflanda vitra. Error non magno negotioprehenditur. Etenim cum Dioscoridi duæ sint Antyllidis species, Altera quæ lèri sint similima, foliis mollibus, ramulis recti palmi altitudine, altera verò foliis Aiuagæ hirsutioribus, non video, cur credam Alkalim Antyllidas vtrasque referre, quum nullis conueniat notis: quippè Alkali, cum primum è terra emerferit, folio est tereți, pingui, Minori Sedo non absimili, quod postea in dodrantalem serè longitudinem adolefcit, geniculatimque protrahitur Equiferi modo. Quum verò iam adoleuerit (vt de Trago differentes in Apologia superius diximus) prodeunt è geniculis folia pinguis, crassaq; incurua, ex lata origine in acutum desinentia. Vbi verò ad summum planta excreuerit, in caulium cacuminibus longè minora, exillioraq; spectantur rufo colore, à quorù exortu parua rotundaq; pilulæ prodeunt, in quibus semē minu-

tum concluditur. At quum huiusce plantæ tam varias mutationes non animaduenerit Lusitanus, proinde factum est, vt ipse crederet Alkali diuersi esse generis, quorum vnum alteram Antyllidem, aliud secundam esse contendit. Sed cum Alkali nullam cum Aiuaga habeat similitudinem, cui alteram Antyllidem similem fecit Dioscorides, nec foliis vnquam hirsutis sit, visa, nec vlla ex parte Lentis figuram referat, cui prior Antyllis est æmula, fateatur ex veteri suarum opinionum promptuario constanter hæc se protulisse Lusitanus. Adhæc cum ipse de Tragum agens asserat Alkali esse Tragum deducor in eam opinionem, vt credam Lusitanum Circæ veneficis incantationibus imbutum, vnam, & eandem plantam in varias transmutare formas. Quod in Alkali factum videmus, quam nunc Tragum, nunc Antyllidem facit.

## LITHOSPERMVM.

GENVINVM Dioscoridis Lithospermum eam memorat esse plantam, quæ globulos illos (lacrymas vocant) mittit, quibus vtuntur funiculo traiectis ad numerandas preces. In quo manifestè peccat, quoniam Dioscoridi Lithospermum planta est foliis Oleæ longioribus, latioribusque, ac mollioribus humi accubantibus ramulis, rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, lignosis, in quorum cacumine bifidi exortus cauliculorù speciem exhibeant, foliis longis, interque paruum semen rotundum Erui parui (vt Oribasius & Serapio ex ipso Dioscoride transcribunt) magnitudine, nascaturque in asperis. Quæ omnia in planta lacrymas illas ferente desiderantur. Siquidem hæc folia profert harundinacea, quemadmodum & culmos per intervalla geniculatos, in quibus semen Orobo duplo grandius visitur, quæ quantum cum Lithospermi notis habeant similitudinis, ipse videat. Adde etiam quòd

Litho

*Censura lxxv. de Lithospermum.*

Lithospermum in editis, & asperis locis per se sponte nascatur. Lachryma verò vocata non nisi fata proueniat, erectis omnino calamis non humi repentibus, vt scribit Plinius.

## ALISMA.

*Censura  
lxxx. de  
Alisma.*

CAETERVM Alismam herbam credit Lusitanus Ruellium & Cordonum sequutus eam esse plantam, quam quidam Plantaginem Aquaticam, alij Barbam Syluanam vocant: sed falsum non obscure liquet. Etenim Alisma folia fert Plantagini similia, sed angustiora, in terram reflexa, laciniaque caule simpliciter tenui, cubito altiore, capitibus Thyrsi, flore candido pallescente. At plantagini Aquaticæ folia insunt Plantagine latiora, acuto cacumine, sursum spectantia, neutiquam laciniosa, caule plurimo adnatis multis referto, nulla Thyrsi effigie, radice inodora, nec etiam acri. Quæ omnia palam faciunt maximè deludere eos, qui vnà cum Lusitano in hoc versantur errore.

## BRITANNICA.

*Censura  
lxxx. de  
Britannica  
ca.*

ALIORYM iterum adhærescens errori credit nil aliud esse Britannicam, quam eam herbam, quæ passim Seplasiis, ac vulgaribus herbariis Bistorta dicitur, eo tantum fortasse argumento ductus, quod hæc planta Rumicis sit folium. Verum mea sententia fallitur. Etenim quamuis Bistorta folio sit Lappathi, aut Rumicis nigriore, pilosiore tamen non visitur, sed glabriore, læuioreque, rubeis intereuntibus fibris, & à terra quadamtenus Cassio, quæ omnia in Britannica maximè desiderantur. Adhæc Britannicæ radix requiritur tenuis, ac brevis. Cōtrā verò alteri. Nāmq̃ Bistortæ radix quandoq; nobis visa est brachiali ferè crassitudine, bipollicari autè spississime, colore in nigrum rufescente, non (vt in Britannica scribit Plinius) nigro. Præter id Britannicæ ra-

dicibus tanquam breuibus, ac tenuibus, nihil virium attribuit Dioscorides, sed tantum foliorum succum ad medicamenta prætulit. At Bistorta contrario modo se habet, cum tantum radicibus præster, & nullus sit eius foliorum vsus.

## ALTERA CLEMATIS.

NEC minus in Altera decipitur Clematide, quippe qui censent Flammulam vulgò appellatam, genuinam esse Dioscoridis Clematidem in Alteram. Clematis enim hæc Dioscoridi per arbores repit, id quod in Flammula nusquam mihi videre licuit, cum planta sit recti caulis. Legitimam Clematidem nos eam esse non ambigimus, cuius imaginem dedimus in commentariis nostris, quanquam ob id haudquaquam negabo, Flammulam hanc Clematidis non esse genus, sed non propterea affirmaverim vnquam Clematidem Alteram esse Dioscoridis.

*Censura  
lxxx. de  
Alter  
Clemati  
de.*

## POLEMONIA.

NIMIUM additus Brasauoli viri alioqui eruditissimi, non tam vt veritatem videatur indagare, quam vt pro sua fide, & antiqua consuetudine huius patrocinetur sententiæ, Polemoniam esse herbam contendit, quam quidam Rutam Caprariam, alij Galegam appellant. Multa porro sunt (vt in Commentariis nostris ostendimus) quæ vtriusque sententiam confutent. Primum si natale solum expendamus, id profectò facile indicabit Galegam non esse Polemoniam, quod hæc in montibus, & asperis proueniat, illa in campestribus læto, & vliginoso solo, adeò vt propè aquas, & in scrobium aquarum marginibus plurimum oriri videatur. Præterea nihil in summis caulis habet, quod corymbæacem effigiem referat, sed corniculos Fœnograci, amulos, in quibus semen occluditur rufescen

*Censura  
lxxx. de  
Polemo  
nia.*

rufefcente colore, quod in Polemonia nigrum requiritur. Hæc itaque si diligentius explorasset Lusitanus, non ita fortasse facile in Brafaoli sententiam concessisset. Nec sanè video cur sibi tantum arrogantia ascuerit, ut tantum Brafaoli tuendi causa, Alyosium Mundellam medicum huiusce tempestatis eruditissimum, & medicæ materiæ studiosissimum sua tantum garrulitate fretus adeo temerè maledictis, conuitiisque lacefsuerit, præsertim quum, pro more, illius argumentis, quemadmodum & nostris nihil responderit. Obsecro dicas Amathe, quo furore agitaris? qua temeritate ducis? ut ausus sis, ubi de Sorbis egisti, Mundellam ipsum virum circa omnem controuersiam clarissimum Sycophantam appellare? Tu mihi crede, potius Sycomoros appellandus fueris, cum tantum ad amentias, & fatuitates te procreauerit natura, illum verò ad totius reipublicæ commodum. Depone istam mentem, desine impudentissime, isto modo doctissimos viros laceffere. Omnes, qui istam in te audient ingratiæ contumaciam, quamuis de facie te nunquam viderint, quum tamen talem te audierint, nonne stolidum, vecordem, insanum, & omnimentis statu dimotum te iudicabunt? Aliter iam pridem nullus prudens de te existimat, hoc vnum tibi patet refugium, si istius insanæ dementiæ infames velis delere maculas, ut aliquando te ad mentem reuoces, & præstantissimos viros optime de literis meritos non tuo more sycophantas, sed modestius nominare assuescas.

## LAGOPVS.

LAGOPVM magno errore eam plantam existimat Lusitanus, quæ à triplici foliorum apice Trinitas appellatur. Quandoquidem cum Dioscorides, Plinius, & si qui sunt alij, qui Plantarum historiam scribunt, nullis penitus notis Lagopum descripserint, non video cur solus Lusitanus diuinare velit, quasi oraculo quodam doctus, quamam plan-

ta antiquis fuerit Lagopus, Verum quòd Trinitas Lagopus non sit, id argumento esse potest, quòd ille Plinij & Dioscoridis testimonio inter segetes nascatur in campis, illa verò in frutetibus iuxta sepes, & in opacis proueniat.

## XYPHIUM.

Quod Plinius libro xxv. capit. xi. per Xyphium intelligat Pseudoacorum, quod in paludibus prouenit flore aureo Iridis amulo, ut Lusitanus perperam intelligit, minimè probamus, non solum ea ratione, quòd Xyphij historiam Plinius accuratè, probèque describat, non Pseudoacori, sed quòd etiam genuinas eius facultates, quas Dioscoridi acceptas facile referre potest. Præterea Pseudoacoro radicem esse Iridis grandiore nemo ambigit. At Plinius ibidem rectè Xyphion dixit esse radicem Nucis Auellanae figura. Nec obstat quòd scripserit nasci Xyphion in aquosis, Dioscorides verò in aruis, quum & in aruis, & in palustribus locis magis quoque proueniat, ut perinde ac nos rei herbariæ studiosos obseruasse non dubitamus. At Plinius, qui longè melius Yyphij natale solum explorauerat, quàm Lusitanus, non aliam ob causam in humidis nasci dixit, quàm ut eorum refelleret opinionem, qui Lonchitium à feminis figura Xyphium esse censebant. Hinc itaque is argumentum sumens, probat Lonchitium Xyphium non esse, quòd illa in sitientibus tantum proueniat locis. His alius accedit Lusitani lapsus, quo facile adducor, ut credam, ipsum nusquam vidisse Xyphium, nimirum quòd scribat illi esse radices Caninis testiculis similes, quum nusquam Xyphium repertum sit, quæ Cinororchi modo radices gereret. Xyphij enim radices rotundæ sunt, & compressæ verticilli modo, vel ibisciformis instar, cui plurimum aspersetur, inuolueris simul conclusæ, iis similibus, quibus Croci bulbus contegitur. Quæ tamen de his scripturus animaduertisse debuerat Lusitanus.

Arrogantia Amathe.

Alyosium Mundellam à callina Sindica.

Censura Lxxxij. de Lagopo.

Censura Lxxxij. de Xyphio.

## GRAMEN HARVNDINACEVM.

*Censura  
lxxxvij. de  
de Harun-  
dinaceo  
gramine.*

LVSITANI opinionem de Harundinaceo Gramine earatione improbamus, quod scribat plantam esse vulgarissimam ad Eridani ripas nascentem, quin & iumentis gratissimum esse pabulum. Nam cum (Dioscoride teste) hoc Graminis genus iuxta vias oriatur, non iuxta flumina, non magno mihi negotio credendum fuerit, Aquaticos Calamos, qui propè fluuiorum aquas nasci solent, pro Harundinaceo Gramine accepisse Lusitanum.

## RVBVS IDAEVS.

*Censura  
lxxxvj. de  
Idaeo Ru-  
bo.*

TAMETSÍ Idæum Rubum in Ida monte plurimum nasci scribat Dioscorides, & sapientia Idæum pro montano accipiatur, Lusitanus tamen ad Padi fluminis ripas oriri hunc Rubum affirmat. Sed minimè vereor, quin pro more, cæcutiat, quum quæ montana sunt, fluuiatilia fecerit.

## CHRYSANthemVM.

*Censura  
lxxxvj. de  
Chrysan-  
themum.*

QVVM nufquam verum Chrysanthemum viderit Lusitanus, quo tamen abundat Italia, passimque omnibus sit notum, quumque oscitanter eius historiam examinasset apud Dioscoridē, eam herbam Chrysanthemum esse putat, quam herbariorum vulgus, quod vnoquoque mense floreat, Calendulam vocat. Apertè conuincitur error, quod Chrysanthemum Dioscoridi folia gerat plurimis incisuris diuisa, id quod in Calendula vocata prorsus desiderat, quum illi Minoris Anchusæ modo longa spectentur nullis prorsus incisuris laciniata. Sed id fortasse illum in hanc opinionem adduxit, quod habeantur aliqua Dioscoridis exemplaria, quæ habeat Chrysanthemum quod alij Caltham vocant. &c. Nam quum non desint rei herbariæ periti, qui Calendulam hanc non sine ratione Caltham esse existiment, ille nominis tantum argumento fretus, neglecta penitus Chrysanthemum historia, Calendulam ipsam Chrysanthemum esse putauit. At si in simplicium facultate, ac hi-

storia, vt illum sanè decebat, se exercuisset, & varia Dioscoridis exemplaria habuisset ad manus, eaque præsertim, quæ à doctissimis viris magno labore sunt restituta, vidisset quidem in Chrysanthemum non legi καλθα, sed χαλθα.

## ASTRAGALVS.

*Censura  
lxxxvij. de  
Astragalo.*

ASTRAGALVM oriri radice rotunda, Raphani modo magna scribit Dioscorides. Quibus quis facile coniecere potest Astragalo radicem non esse rotundam in pilæ modum, sed tereti forma, quæ talis sit Raphani radix. Quamobrem in Astragali censura inaniter Lusitanum hallucinari deprehēdimus, quod scribat Inferioris Germaniæ incolæ Astragali radicibus vesci sub cineribus Castanearum modo assatis, eafque Inglandiæ em nucum figura, magnitudinēque esse asserit albo intus colore, & nigro exterius cortice. Hinc itaque suspicor ego Lusitanum pro Astragalo eam plantam accepisse, quæ Fuchio, & recentiorum aliis Dioscoridis esse Apios, quæq; Germanis Erduassen, id est, Nux Terræ vocatur. Sed quam magna inter has plantas interfit differentia Tiresia cæcior fuerit, qui non viderit.

## ACONITVM.

*Censura  
lxxxvij. de  
Aconito.*

DVM in censendo primi generis Aconito Fuchium virum apprimè doctum accusat Lusitanus, ille tamen longè grauius aberrat, quippe quicquid cæcus indicet de coloribus, & nulla ratione scribat Aconitum Pardalianchen in multis reperiri locis, radicibus nigris ad rubedinem declinantibus. Quibus facile palam est, quam fuerit ille negligens in explorandis, legendisque plantarum historiis. Etenim Dioscorides primi generis Aconito radicem facit Scorpionis caudam emulantem & Alabastri modo splendentem. Verum an Alabastrum colore sit nigro rufescente, statuarij iudicent, & lapicidæ, & qui Romæ columnas ex Alabastro vident, ad Constantinum lauerum propè sacrum

facrum, Lateranense, & ad D. Agnetis  
ædes extra Viminalem portam.

## COLCHICVM.

*Censura  
lxxxix. de  
Colchico.*

QUANDO hic homo semel errandi  
faciet finem? quousque tot vitis hic om-  
nium cæterorum nos obtundet iu-  
dex? nusquam ne dabit breue aliquod  
spatium in omnibus paginis respiran-  
di? Vbi que (vt verè fatear) ad nauseam  
vsque omnia passim Amathi sapiunt  
Officinam. Tædet omnia huc coacer-  
uari, quibus ille suum volumen expoli-  
uit. Transcurro innumera, & ad finem  
strictim per omnia propero. Quid ta-  
men boni de Colchico sentit? cum hoc  
nihil refert disfidere ab Hermodactylo,  
de quo scripsere Paulus, & Serapio.  
Verum nihil est, quo minus Lusitano  
merito relictetur, cum Paulus diuer-  
sis capitibus eodem libro de Colchico  
& Hermodactylo tractauerit, hunc per  
se, vel ex decocto porum arthriticis  
commendans, illud verò quod letale  
sit ab vsu medico abigens. At Lusita-  
nus, vt suam tueatur sententiam, mi-  
randum non esse dicit, quod Paulus  
seorsum de Hermodactylo, tanquam à  
Colchico differentem sermonem ha-  
beat, alibi verò de Colchico caput præ-  
figat, quum id consultò fecerit, videns  
vtique Colchicum non adeò veneno-  
sum esse, præcipue vbi Hermodactylus  
dicebatur, sed rei medicæ potius con-  
ducibile. Quæ de causa de eo, vt vene-  
noso cum cæteris Græcis caput consti-  
tuit, alibi verò tanquam de re sibi no-  
uiter comperta, & non admodum ve-  
nerosa sub Hermodactyli nomine. Ve-  
rùm hæc Lusitani figmenta, cur sanè  
proben, non video. Siquidem si Paulus  
hac fuisset ductus opinione, creden-  
dum quidem non est, quasi ille eò insa-  
niæ, furorisque peruenisset, vt Colchi-  
ci nomen in Hermodactylum peruer-  
tisset: quin etiam nec quod in medicum  
afferret vsus mortiferum medicamen-  
tum, de quo paulò post egit sex tantum  
interiectis capitibus, proprio occulta-

to nomine, quum rectè sciuerit Paulus,  
vires & facultates in plantis haberi,  
non in earum nomenclaturis. Nec pa-  
riter obstat alia Lusitani ratio, nimi-  
rum quod in vno loco de eo tanquam  
veneno sub Colchici nomine scripse-  
rit Paulus, in altero tanquam medica-  
mento sub Hermodactyli appellatio-  
ne. Quandoquidem cum Paulus libro  
quinto, inter cæteras venenosas stirpes  
Colchici latius meminerit, non fuerat  
illi opus iterum de eo scribere libro se-  
ptimo, vbi de medicamentis salubri-  
bus, non de venenis egit, nec tam hor-  
rendam facere metamorphosim, vt me  
dicos deciperet. Nec item obstat Sera-  
pionis autoritas, quod is Colchicum  
Dioscoridis Hermodactylum appellet.  
Quippè hoc in loco, sicuti in aliis non-  
nullis Colchicum, quod Hermodacty-  
lum vocat, cum genuino Hermodacty-  
lo, de quo speciatim egit Paulus, con-  
fundit. Etenim scaterere mendis Her-  
modactyli caput in Serapione quis fa-  
cilè nouerit, quum ea, quæ Dioscoridi  
accepta referre debeat, Paulo ascribat,  
& quæ Pauli sunt in Hermodactylo,  
Galeno accepta referat. Quod autem  
(vt Lusitanus putat) in sola Colchide  
Colchicum plantæ venenosum, ac letale,  
alibi verò minimè, non facilè proba-  
mus, cum nulla huiusce rei sit nobis ve-  
terum autoritas. At quum Dioscori-  
des libro quarto, vbi de Colchico scrip-  
sit, non Colchicos tantum admoneat,  
ne huiusce plantæ radicem deuorent  
eius dulcedine allesti, sed omnes in vni-  
uersum homines, maximo est argu-  
mento, hanc plantam nò tantum apud  
Colchos, sed vbi que nasci venenosam.

*Serapio  
non lapsus.*

## EPHEMERVM.

LVSITANVS recentiores quosdam  
sequutus Liliom, quod Conuallium  
vocat, magno errore Ephemerum es-  
se putat. Nam huic Lilio, folia non in  
sunt Liliij, quin nec radix longa, quæ di-  
giti sit crassitudine, sed tenuius in ca-  
pillamenta desinens. præterea nec cau-

*Censura  
xc. de Ephe-  
mero.*

E

*lilij*



lis illi videtur Lilio similis, sed gracilis, flexilis; tenuissimi iunci instar. Adhæc nec credi par est, Dioscoridem silentio inuoluisse, quin etiam nec Galenum, qui eius quoque historiam narrat, suauissimi odoris præstantiâ, quo Liliū Conuallium fragrat, si hoc illis Ephemerum esset, Quo fit, vt vnâ cum Lusitano cæcutiant, qui hac ducuntur opinione.

## UMBILICVS VENERIS.

*Censura  
scilicet de  
Veneris  
umbilico.*

Vbi de Veneris Umbilico scribit Lusitanus, tam primum quàm alterū parietibus hæere asserit, & humectis nasci in locis folio crasso, rotundo, concavo, coxendicis figura, quibus palam fit, quantum in re herbaria præstet, valeatque Lusitanus, quippè qui hallucinatus existimauerit inter Veneris Umbilicos nullam intercedere differētiā foliorum, radicū, ac etiam locorum, in quibus proueniunt. Quam tamen Dioscoridi Coryledonis primum genus folia ferat Acetabuli figura, & radicem Oliuæ modo rotundam. Alterum verò Maius referat Sedum, & maiori nitatur radice. Adde etiam quòd neutrum in humectis nascatur locis, quum primum in tectorum tegulis, & collapsis ædificiorum parietibus proueniat, maritimis præsertim locis, vt Plinius inquit: Alterum verò inter ingentissima saxa in mōtibz nascatur.

## TALICTRVN.

*Censura  
scilicet de  
Talictro.*

Ruellius vir profectò clarissimus, & in stirpiū historia nō postremus author Talictrum in Gallia nasci scribit, ibiq; appellari Argentinam, eò quòd eius Coriandrina folia argenteo splendore micent. Nos autem quòd hanc herbam nusquam viderimus, Ruellij sententiam probare, nec improbare possumus. At Lusitanus, qui nulla ratione omnes impugnare solet, statim id falsò sensisse Ruellium scribit,

tametsi eius Argentinam nec viderit, nec nouerit vnquam. Nec valet Lusitani argumentum, quòd Argentinam herbam; sic aliis vocatam à Talictro maximè distinguat. Siquidem de hac Lusitani Argentinā haudquaquam intelligit Ruellius. Hæc enim foliis non est Coriandri, sed vnico tantum folio assurgit nullis laciniiis interfecto. Quo fit, vt ille meritò veniat accusandus, quum iniuriâ alios accuset.

## POTAMOGETVM.

POTAMOGETON sic dicta est Græcis, quòd fluminibus sit vicina, aut in ipsis fluminibus nascatur. Id quod clarissimè demonstrat Dioscorides, quum inquit, Potamogetum folium Betæ simile gerit hirsutum paulò supereminens extra aquam. Id quod facile comprobatur etiā in hac planta halucinari Lusitanum. Quippè qui Potamogetum eam herbam esse contendat, quam Seplassæ Pulmonariam vocant. Siquidem hæc primum in fluminibus non nascitur, nec propè eorum alueos, sed secus vias propter sepes, & frutera, præsertimq; opacis locis, folio non Betæ, sed Buglossi, cuius saporem etiam adeò imitatur, vt eo sicut & facie Buglossū referat. Adde quòd huic maculæ quædā in foliis cernantur albo colore, de quibus nihil inuenio scripsisse eos, qui Potamogeti historiam narrant.

*Censura  
scilicet de  
Potamogeto.*

## LOTVS VRBANA.

O QUAM vehementer decipitur Lusitanus in censenda Urbana Loto. Constat id, quòd nulla ratione nec authorum testimoniis temerè affirmauerit eam esse Lotum Vrbanam, quam quidam Trifolium Acerosum, alij Pannem Cuculum, nonnulli Alleluia vocant. Etenim legisse apud antiquorum aliquem Lotum hanc sapore esse acetoso. Præterea Plinio quis non viderit aliud

*Censura  
scilicet de  
Urbana  
Loto.*

aliud esse Satiuam Lotum, aliud Trifolium Acetosum, quod ipse speciatim Oxyn à sapore merito vocat, quod nominè, & viribus differant, siquidem ille Oxyn ad enterocellas, & dissolutum stomachum prestare ait, id quod facile quis gustu deprehendere potest. Lotum verò Satiuam ad discutiedas oculorum cicatrices, argema, & nubeculas ex Dio scoride proposuit, tanquam excussorium, deterforiumq; medicamentum. Id quod nunquam Oxys prestare poterit.

## ANTIRRHINUM.

*Censura  
xlv. de Ant  
tirrhino.*

IN existimando Antirrhino immerito sanè Lusitanus Pliniū criminatur, quòd Antirrhini plantam lino similem fecerit, ac etiam quòd Lychnin Agriam appellauerit. Nec alia ratione Plinium impugnat, quàm quòd nō liceat (ut ipse putat) Antirrhinum appellari Lychnin, quod florem habeat illi similem, & magna sit inter has plantas differētia. Qua in resanè quid arguat in Plinio nescit. Cuius inscitia id in causa esse putauerim, quòd Lusitanus Plinianæ lectionis, perinde ac aliorū authorum impatiēs, & rudis fuerit. Nam quanquā Plinius libro x v. cap. x. Antirrhinum Lichnin Agriam vocari scribit, non tamen ob hoc affirmat, quòd Antirrhinum, & Lychnis Agria vna & eadem sint planta, sed tantum admonet, à quibusdam ita vocari Antirrhinum. Id quod etiam inuenitur in quibusdam Dioscoridis codicibus, qui ita habent *αντιρρινον, ος δε αντιρρινον ος δε λεγαται λυχνιν ος δε λεγαται κελιδον*. Nectamen ob id accusandus est etiam Dioscorides, qui non ob hoc prætermisit, quin Lychnids Agria meminerit, ubi libro tertio de Domestica scripsit. Aliās enim nobis superius dictum est, præsertimq; de Telephio differētes, non deesse plantas, quæ aliarum etiam Plantarum nomēclaturis appellentur, quoniam tamen nihil cum illis habeant cognationis. Præterea cum plures hodiè habeantur Antirrhini species, qua-

*Plinius à  
calamita  
vindicatur.*

rum alia, quæ maior est, folia gerit multifida, alia Lino similia, alia parua, ut Anagallis, quæ fortasse genera nunquā vidit Lusitanus, hic Plinium defendere non verebor, quem tamen miror accusare Lusitanum, quum is de Iride differens, acriter me accusauerit, quòd ibi quædam in Plinium deprompserim.

## POLYGALA.

POLYGALAM scribit Dioscorides ad palmi altitudinem adolescere foliis Lenticulæ, gustu adstringenti, cui ita subscribit Plinius libro xxvii. cap. xii. Polygala palmi altitudinem petit, in caule summo foliis Lenticulæ, gustu adstricto. Quibus tamen notis difficile admodum videtur, ut quis herbam asferre possit, quæ legitimam Polygalam referat, quum horum neuter caulium, florum, radicum, natalisq; soli huiusce plantæ meminerit. At Lusitanus, qui (quantum video) longè potius Oedipum, quàm medicum proficitur, quandam plātam Polygalam esse putat, quæ virgas Genistæ mittit, in quarum summitate flores emicant, aurei, præstanti odore, ex qua (ut ipse ait) magna pars Italiæ scopas parat. Quin & hanc quoque plantam scribit sapore esse amarissimo. Veruntamen cum à nemine memoriæ proditum sit Polygalam hisce notis haberi, coniecturas, quas se dicit habere Lusitanus, præsertim quum eascribere non sit ausus, friuolas, ac inanes putamus. Adde quòd Dioscorides, Galenus, Plinius, Oribasius, & quotquot sunt alij grauissimi auctores nusquam Polygalam scripserunt esse amarā, sed adstringenti sapore. Præterea Polygalæ planta tota, omnibus consentientibus, lac prouocat, non flores tantum, quorum nemo meminit. Sed hoc ignorans Lusitanus putat hæc facultatē floribus tantum deberi, quòd siiani præsent odore, ac si odorata omnia lac prouocando sint idonea.

*Censura  
xlv. de Polygala.*

*Lusitanus  
coniectura  
inuitae.*

## OCHRA.

PUTAT Lusitanus Rubricā, quā vtū-  
tar pigmentarij, ac Sarcinatores, quaq;  
vt sunt hactenus Myropolæ lapidis  
Hæmatitis vice, genuinam esse O-  
chram. Sed magno tenetur errore.  
Ochra enim ( vt Dioscorides scribit )  
luteo est colore, non rubro, vt pro-  
pria indicat nomenclatio. *Agos* enim  
Græcis, pallor Latinis interpretatur.  
Id quod etiam fatetur Galenus Com-  
11. in libro Prognosticorum Hipocra-  
tis. Quæ si legisset Lusitanus, non ira  
fortasse temerè de rebus sibi ignotis  
tam ridiculum protulisset iudicium.

Censura  
xviii. de  
Melante-  
ria.

## MELANTERIA.

MELANTERIA nasci in fauci-  
bus cuniculorum, in quibus æs fodi-  
tur, salis modo concretam, quin & in  
summa facie eorundem locorum, tes-  
tis est Dioscorides: quo fit, vt æris po-  
tius aliquid hanc continere credide-  
rim, quàm argenti, vt sibi falso persuase  
Lusitanus. Ipsa enim in argenti metal-  
li non reperitur, sed in æris cuniculis,  
cuius facultates possidet, perinde ac  
Chalcantū, Sori, Chalcitis, ac Misy: &  
proinde rectè vim causticam obtinere  
Melanteriam scribit Dioscorides, quā  
& Misy. Argento enim nulla vis cau-  
stica inest, sed æri quàm plurima.

## SORY.

IN censendo Sory non minori duci-  
tur errore, quod pro certo crediderit,  
Chalcanthum factitium, quod Phar-  
macopœi Vitreolum Romanum vo-  
cant, genuinum esse Sory. Patet error,  
quod Sory res sit effossa, non arte pa-  
rata, tum etiam quod Chalcanthum  
sue fossitum, siue sit arte paratum à  
Sory omni uocōsensu plurimū differat.

## AURIPIGMENTVM.

EODEM ferè tenetur errore etiam  
in Auripigmento, quod pro more, te-  
merè asserat id coctum esse. Error fa-  
cilè palam fit, quod scribat Dioscori-  
des, Auripigmentum per se signi iis in  
metallis, in quibus gignitur Sandara-

Censura  
c. de Au-  
ripigmen-  
to.

cha, non autem excoqui, & arte pa-  
rari. Crudum itaque est Auripigmen-  
tum non coctum. Quippè si coquatur,  
& igne torreatur, magnoperè rufescit,  
adeo vt Carbunculi speciem induat, &  
pellucidum fiat.

## GAGATES.

QV ID de Gagate, tandem eius opi-  
nionem referam? quem nigrum illud  
Succini genus esse arbitratur, quo ima-  
gines parantur eorum galeris affigen-  
dæ, qui peregrè proficiscuntur vel ad D.  
Iacobi ædes, vel ad alias quascumque.  
Nihil Lusitanum sui pœnitet. Quātum  
illa inter se dissonant? Quum Succin-  
num hoc lapis non sit, sed potius, vt  
quidam putant, Bituminis, aut Pif-  
saphalti genus. Gagates porrò lapis  
est bituminosus, non autem Bitumen  
ipsum, squallidus, & crustosus, contra  
verò illud, quum lapidis speciem præ-  
se ferat, nulloque squallore, crustisue  
sit vitiatum. Genuino, ac vero Gagate  
vtuntur Septentrionales quàm pluri-  
mæ regiones, quæ lignis non admo-  
dum abundant, ad fouendum ignem.  
Plurimum Gagatis foditur in Leodien-  
si agro apud Flandros, Brobandosque,  
qui plurimum differt ab illo Succini  
genere. Sed præcidamus tandem quæ-  
so alia, quæ restant innumera, ne vi-  
deamur pilos quosque carpere, qui ve-  
ritatis candorem impediunt, & ne cir-  
ca minutias cauillari nos arbitretur  
Lusitanus. Mihi quidem ( vt ingenuè  
fatear ) non leue fuit incommodum  
cum huius friuolis ineptijs colluctari.  
Veruntamen tum istius proteruitate  
laceffit, tum multorum ( vt prædi-  
ximus ) honestissimorum virorum pre-  
cibus excitatus, id diligentius facere  
non sum coactus, quàm vel meæ occu-  
pationes, vel istius leuissima, & impe-  
ritissima temeritas à me exigebant. Si-  
mul & commonebat non mediocriter  
illius sæuissima auctoritas, quàm in  
omnibus tam temerè, tamque vanè  
sibi

Censura  
c. de Ga-  
gate lapin-  
de.

Gagatis  
descrip-  
tio.



*Animad-  
uersio in  
Amathin*

sibi vendicat. Cui tantum ceteros ex-  
stimauit adhibituos fidei, vt ea quo-  
que, quæ nulla confirmaret ratione,  
eodem mentis stupore excepturos al-  
ios putarit. Hoc si vel temeritate, vel  
fortasse simplicitate, aut inscitia po-  
tius, quibus plurimum valet, fecerit,  
agnoscat iam denique quam ei pericu-  
losum fuerit aliorum carpere, & im-  
modestissime damnare labores, prius-  
quam sua valeat intelligere foedissima  
errata, quibus omnia eius volumina,  
& præclaræ illæ Centuriæ vbique sca-  
rent. Nunc cum & tela repulerim, quæ  
tam insipienter ille in me iecerat, & pa-  
riter hominem ex suis prædiis citra  
omne negotium dimouerim, non ty-

ronibus modò sed etiam doctis non  
ingratam me in hoc collocaſſe operam  
arbitror. Nec verò tanti mihi erit, si  
Lusitanus, quo est furore iniuste se ar-  
gui clamat. Quin & hoc fingulare suæ  
dementiæ dabit indicium, quo mani-  
festius nullis argumentis, nulla ratio-  
ne, nulla veritate satisfieri posse con-  
queratur. Equidem quantum potui,  
hoc vnicè sum conatus, vt non solum  
se reprehendi doleat, sed & suæ confi-  
dentissimæ imperitiæ ipsum iure pœni-  
teat. Quin etiam vt ſciat, ac noscat se  
errorum Centurias feciſſe, quemad-  
modum & æritudinum. In quo quan-  
tū profecerim Lectoris candidi, &  
eruditissimorum virorum erit iudiciū

FINIS.

Lugduni,

Excudebat Ioannes d'Ogerolles.

M. D. LXIII.



Confusa  
xxvii. de  
Melante-  
ria.

bus  
tur,  
sum  
fti  
ti




Gen  
xx  
Sur

Exhibenda Johannis Ogerolles  
M. D. LXII

Confusa

Obj. 1193011



60

AND

OF

IN

OF

82